

F R I D E R I C I
H O F F M A N N I
M E D I C I N Æ
R A T I O N A L I S
S Y S T E M A T I C Æ
T O M I Q U A R T I.

Q U O S P E C I A L I S M O R B O R U M P A T H O L O G I A
& huic superstructa solida Therapia cum medendi methodo
cautelis Clinicis & morborum enarrationibus
adjuncta Epicrisi exhibentur.

P A R S S E C U N D A

*Doctrinam bæmorrhagiarum & dolorum perspicua &
demonstrativa methodo tradens.*



V E N E T I I S ; M D C C X L V .

Ex T Y P O G R A P H I A B A L L E O N I A N A .
S U P E R I O R U M P E R M I S S U , A C P R I V I L E G I O .

PRÆFATIO.



Eundam therapiæ rationalis partem, veritatis Medicæ cupide Lector, Tibi jam exhibeo: cuius maturiorem editionem, occupationum & consultationum, quæ me in senio plurimum urgent, assidua multitudo, quodammodo retardavit. In præsenti hoe libro, difficilem & perplexam admodum maximique in praxi medica momeuti materiam, de hæmorrhagiis & doloribus, paulo curatius evolvendam atque observationibus clinicis illustrandam mihi sumsi. Nam primo ex omnibus, quæ in genus humanum incident, morbosis afflictionibus, febres si exceperis, vix ultæ dantur, quæ frequentius invadant, quæ nulli ætati, nulli temperamento, nulli sexui patcunt, quam spontaneæ a natura per varia corporis loca excitare sanguinis eruptiones. Hæ, probe consideratis phænomenis & paulo pensculatiis subductis rationibus, iisdem propemodum utut non satiis completis motibus, quibus febres oriuntur, prognuntur. Nam sicut duo principales motus ad febrem constituendam necessarii sunt, alter qui præcedit & qui ab extima corporis humani superficie ad interiora sanguinem & reliqua fluida urget atque propellit; alter qui sequitur & ab interioribus versus exteriora rursus eundem cum aucta cordis & arteriarum celeritate protrudit; ita similes etiam motuum species in hæmorrhagicis excretionibus concurrere animadvertisimus. Etenim a nulla causa interna suscitatur hæmorrhagia præsertim paulo gravior, quæ non extermorum refrigerationem, & spasticam habitus corporis constrictiōnem, cum alvo plerumque stricta, urina tenui, & parciori per cutis cribrum perspiratione, comitem habeat, sanguinem ad interiora & cor pellendo: quem motum postea celerior & vehementior, non lecus ac in febre sit, arteriarum motus & ad certam partem directus sanguinis impetus consequitur. Præterea, quemadmodum motus febiles in se & sua natura motibus vitalibus alieni, per sapientissimam autem DEI providentiam, quam in fabrica corporis humani dilucide commonstravit, subinde salutarem effectum exerunt, causamque ipsam a qua originem habuerunt expugnando, hominem sanitati restituunt; ita etiam sanguinis quæ præter naturam sunt excretiones, ipsam causam quæ eas excitavit quando subtrahunt, a gravissimis malis & periculo-

P R A E F A T I O.

corpus s^æp^e vindicant. Cujus rei periodicæ menstruales in sexu sequiori sanguinis profusiones, atque per venas ani in sexu nobiliore institutæ a natura sanguineæ evacuationes, testimonio esse possunt luculentissimo. Quando autem febrium vel hæmorrhagiarum causæ ita sunt comparatae, ut neque motibus istis justo-intensioribus, neque evacuatoriis tolli possint, quemadmodum sit, si vitium non tam in materia mole, quam in perversa & maligna humorum indole, aut visceris cuiusdam corruptela vel obstruktione, aut in motu animi immoderationi consistit, nunquam tales motus salutares censendi sunt, eo quod in detrimentum & præsentissimum s^æp^e exitium convertantur. Et quia ejusmodi motus excretorii hæmorrhagici, incompleti febriles, non rationali & intentionalí quodam actu, multo minus ad salutarem finem destinato, sed ex causis physicis necessitatem affectus quæ inferrunt peraguntur; sit utique, ut non modo vel in excessu vel in defectu sanguinis emitendi peccetur, verum etiam, quod s^æp^e numero evenit, per partes nobiliores & vias plane inconvenientes & alienas, conservationi vitali proxime inservientes, ut sunt cerebrum, pulmones, ventriculus, intestina tenuia, vesica, renes, plane perverse & erronee, cum ingenti harum partium corruptela nec non cum summo vita^m dilapidatione, sanguinis subindevalde copiosi exclusio suscipiatur. Ceterum etiam doctrina hæmorrhagiarum ea de re multum difficultatis in usu artis habet, quod aliis iisque gravissimis tam acutis quam chronicis affectionibus s^æp^eissime conjungantur, & supervenientes quandoque, sed rarius, morbum solvant, s^æp^eissime vero in extremum exitium terminantur. Ex quibus omnibus adductis & paulo penitus consideratis facile intelligi posse arbitror, quam difficilis ardua & intricata res sit, prudenter motus hos sanguinis excretorios tractandi, nec non, ut in salutem & conservationem corporis humanicedant, eos convertendi & dirigendi; atque hæc ipsa difficultas non parum succrelcit & augetur, quod nullum in tota rerum natura divina sapientia constituerit remedium, quod tanta polleat efficacia, ut Medicus, pro suo arbitrio & rei exigentia, sanguinis fluxum si deficit, provocare vel restituere cum certo effectu possit. Enimvero Medicus, pro variis indicationibus & præservandi & curandi morbos, multi generis evacuantia possidet, ut pro lubitu excretiones per alvum, per urinam, per sudorem, per nares, per salivam, per expectorationem movere possit; sed ejusmodi medicamina, quæ sanguinem per certa loca pro Medici arbitrio evacuandi certa potentia instructa sint, plane non reperiuntur. Inter ceteras insuper difficultates non minima est, quod neque ullum ceterum detur remedium, quod sine majori detimento enormem sanguinis profusionem expedite compellere possit. Quæ cum ita sint, intelligere quisque poterit fa-

P R A E F A T I O.

cillime, quare post doctrinam febrium, quæ in priori tomo paulo penitus agitata & excussa est, intricatam & plane difficilem hanc in praxi frequentissime occurrentem materiam, paulo curatus præ ceteris evolvendam & illustrandam utilissimum imo summe necessarium judicaverim. Præter hæc placuit quoque in hoc Tom. II. dolorum pathologiam & theoriam paulo accuratori scrutinio committere, & hæmorrhagiarum tractationi subiectere, eo quod inter hæmorrhagias & dolores magnus sit nexus, magna consensio, & inter causas quoque & curationem conspiratio. Dolores præsertim acerbiores certis paroxysmis certisque periodis invadere, ac semper fere cum febriculosa quadam partium solidarum & fluidarum commotione, quam extremonum constrictio, excretionum per alvem, per sudorem quæ fiunt retardatio, pullumque postea celeritas & duries subsequitur febribus communis, fieri nunquam non observatur. Et sicuti febrium paroxysmi, per motum sanguinis versus corporis superficiem restitutum & subsequentem sudorem salutariter finiuntur: ita etiam observamus dolorum tormenta non facile conquiescere vel sopiri, multo minus ex toto abigi, nisi prius sanguinis circulus uberior cum calore & madore subsequente ad partes extremas fuerit conversus. Neque iis qui assidue in artis exercitio versantur obscurum esse potest, omnis generis dolores, sive internas sive externas partes infestent, potissimum a sanguinis consuetis excretionibus retardatis vel plane cessantibus aut suppressis originem suam trahere, & vix aliter citius, nisi in ordinem iis prius reductis, perfectam sanationem recipere. Testimonio poslunt esse cardialgici, colici, nephritici & podagrici dolores, qui, in feminis, fluxu mensium, in viris confueto hæmorrhoidum fluxu restituto, ligno allevamentum accipiunt. Denique conspiratio & harmonia inter hæmorrhagias & dolores vel exinde elucescit, quod in utroque affectu, non tam sanguinis puri, consistentis & fibrosis, sed potius vitiosi seri intra vala collecti redundantia magis peccet atque delinquat. Et quemadmodum porro hæmorrhagiæ in iisdem locis, ubi semel vel iterum proruperunt, reverti solent, ob debilitatem relictam: ita etiam res cum doloribus comparata est, qui, ubi semel radicem egerunt in nervosis quibusdam partibus, quam facile has rursus occupant atque invadunt. Postremo quantum difficultatis atque negotii, hæmorrhagiarum atque dolorum opportuna cura medentibus faciliat & quod plurimorum remediorum efficaciam eludant, ita ut ab anodynis saepius exacerbentur, in praxi notissimum est. Prægnantes itaque & justæ causæ hæc fuerunt, quare præ ceteris morbis, maxime præsenti hoc in secundo tomo, de hisce affectibus paulo curatus agere proposuerim. Et quoniam catus clinici & complectæ de morbis historiæ unicum & verum pathologiæ & therapiæ rationalis fundamentum constituunt, sine

P R A E F A T I O.

quarum sufficiente apparatu nihil solidi Medicus in theoria statuere, neque in praxi praestare & efficere potest, cuivis morbo notabiliores quae mihi ad manus fuere adjeci observationes, in quibus fideliter & candide morbi cuiusvis historiam & progressum, quae remedia, quo ordine usurpata & qualis effectus consecutus fuerit, exposui, atque simul in subnexa epicrisi insignem usum & fructum observationum ad circumspectam & auspicatorem praxin exercendam demonstravi. Ego nihil magis in votis habeo, quam ut etiam alii qui ingenio possent & in ampla praxi versantur publicumque bonum promovendi ardorem habent, me hac in parte sequantur. Ceterum nullus dubito, fore, ut plures ex Medicis, si scripta mea practica usque eo in lucem edita, quae non precipitavi quinquaginta annorum per DEI gratiam experientia innixus, cum attentione legant & perlegant, non modicum fructum in misere affictos redundaturum abundanter percepturi sint. Sin autem invidi quidam aut in praxi rationali minus versati, haec vel quæcumque alia mea scripta vilipendere verint, id certe parum curabo.

CONG

C O N S P E C T U S
P A R T I S S E C U N D Æ
S E C T I O L

De hæmorrhagiis partium tam externarum,
quam internarum.

P R O L E G O M E N A.

De Hæmorrhagiis in genere.

I. De Hemorrhagia narium.	pag. 3
II. De sanguinis fluxu ex pulmonibus.	16
III. De vomitu cruento, sine & cum secessu nigro, sive morbo ni-	
gro Hippocratis.	34
IV. De hemorrhoidalii fluxu nimio.	44
V. De uteri hemorrhagia immoderata.	54
VI. De hemorrhagia ex primariis visis.	66
VII. De hemorrhagia cerebri.	82

CON-

C O N S P E C T U S .

S E C T I O I I.

De Doloribus & spasmis varii generis internis , &
externis , nec non arthriticis , &
rheumaticis .

Caput I. De dolore cephalico .	pag. 93
II. De dolore cardialgico spasmatico & flatulento .	111
III. De doloribus & spasmis praecordiorum , a calculo felleo ortis , & de ejus generatione .	126
IV. De dolore & spasio iliaco .	143
V. De intestinorum doloribus , atque in specie , de colica flatulenta & spasmatica .	158
VI. De acuto dolore & spasio ex calculo renali .	182
VII. De spasio & dolore vesice & adjacentium partium .	201
VIII. De doloribus & spasmis externarum partium rheumaticis , & arthriticis .	217
IX. De rheumatismo odontalgico .	242
X. De dolore & spasio otalgico .	252
XI. De dolore podagrico & arthritico vero & inveterato .	257

SECTIOL. DE HÆMORRHAGIIS PARTIUM

Tam internarum quam externarum.

PROLEGOMENA DE HÆMORRHAGIIS IN GENERE.

§. I.

In quibus locis ordinario hemorragiae sunt. PRIMO commemorandum est, quod sanguinis, quæ sponte a natura fiunt, excretiones, ordinario ex illis locis fiunt, quæ textura gaudent teneriori ac rariori, per quam vasa tenuissima undique disperfa serpunt, neque firmis membranis circumtensa latitant, sed potius in superficie morantur: quo privilegio quam maxime gaudent interior narium pars, pulmonum bronchia, caro gingivarum, ventriculi pars amplior sinistra, intestinum ileum, recti intestini extremitas, exterior uteri & vaginæ substantia; ex quarum partium nimium diligentis & apertis arteriolis cum impetu sæpe sanguis prorumpit. Verum extraordinarie quandoque fit, ut per alias vias plane insuetas, & in quibus paulo profundius vasa latitant, sanguis sese exoneret. Ita per minimum digitum sanguinem excretum vidit SALMUTHUS cent. 2. obser. 36. it. HENR. AB HEER obf. 36. Ex genu & manu profilientem san-

*In quibus extraordi-
nariae?*

Hoffm. Syft. T. IV. P. II.

guinem menstruum BARTHOLINUS obser. anat. cent. 1. hist. 30. & ex mammis saltu eundem prodeuntem PANAROLLUS Pentec. 4. obseruat. 15. item AMATUS cent. 2. obser. 24. & cent. 7. curat. 48. memorant: menstrui vero in viris per penem profluvii observationes numero plures in STALPARTIO VAN DER WIEL cent. 1. obser. 80. conspicuntur.

§. II.

Sanguinis eruptions per quam *Hi differunt, ratione subiecti.* familiares solent esse iis, qui habitus corporis mollioris, spongiosioris, atque texturæ tenerioris sunt, quorum vasa copioso sanguine & sero turgent, qui secundum veterum denominationem dicuntur sanguinei; his enim hæmorrhagiae per omnem fere ætatem solennes esse solent. Qui vero sunt cholericæ temperamenti, & vasa ampliora, strictioreaque corporis habitum possident, per quorum vasa sanguis celerius fertur & circulatur; ii in juventutis annis hæmoptysi maxime sunt obnoxii. San-

A

gui.

2 Sectio I. Cap. I. De hæmorrhagiis in genere.

guineo-melancholicis fluxus hæmorrhoidum frequentior; & sanguineo-phlegmaticis foeminas cruentus vomitus familiarior esse solet.

§. III.

Memoratu quoque dignum est di-
statis, versas excretionum sanguinearum
species in diversis ætatibus contingere;
quemadmodum id etiam jam
olim recte notatum fuit ab HIPPO-
CRATE Sct. 3. aphor. 27. 29. 30. Vi-
delicet pueri & adolescentes sanguinis
profusum e naribus potissimum pa-
tiuntur: in juvenibus crux exitum
suum per pulmonum vasa magis mo-
litur, unde hæmoptysis & inde orta
phthisis haec ætati familiarissima; in
viris & qui in consistente ætate sunt
constituti, sanguis per sedis venas, in
decrepita autem ætate per vias urina-
rias plerumque exitum affectat.

§. IV.

Anni tñ. *Annotationem deinceps meretur*
hæc observatio, quod vere & autum-
no, præsertim circa tempora æqui-
nocialia, sanguis nimium redundans
plus quam alio tempore ex alveis
suis effundi soleat, atque maxime per
nares, in viris per hæmorrhoides,
si alias ad hunc fluxum dispositi
fuerint, fluat. Sanguineæ quoque
apoplexiæ, quæ non nisi eruptions
sanguinis in cerebri meditullio sunt,
circa hæc tempora & potissimum vere
contingunt; vomitiones vero & mi-
ctiones cruentas plus autumno quam
vere incidisse, a nobis annotatum est.
Atque etiam circa hæc anni tempora
solemnitè ejusmodi sanguinis excre-
tiones & periodice redire atque rever-
ti solent.

§. V.

Subiecta hæmor-
rhagia. *rum.* *Observamus porro, omnes fere*
eos, quibus sanguis copiosius & fre-
quentius in primis annis per nares
erumpit, natura valde imbecilles,
animo quoque sensibiores, variisque
morborum afflictionibus, spasmis &
doloribus per omnem fere ætatem
subjectos esse, rarius etiam vitam, diu
protrahere: quippe in juventute in

phtisis inclinant, in consistente
 ætate in malum flatulento-spasmodi-
 cum sive hypochondriacum facile in-
 cidunt, atque ætate proiectiori ad
 dolores nephriticos & podagricos
 multum proclives sunt.

§. VI.

Dispositio ad hæmorrhagias est ple-
rumque nativa, quæ a parentibus in
liberos transfertur; promptissime ve-
ro, per causas externas, quæ motum
validiorem sanguini inferunt, aut
eius intestinam partium agitationem
intendunt, in actum deducitur: in-
ter quas omnes animi & corporis mo-
tus solito intensiores, atque interna ex
alimentis vel medicamentis assumta
valde calida acria & spirituosa, intem-
petivus quoque balneorum, sudorifer-
rum, vel purgantium usus, prin-
cipem sibi locum vindicant.

§. VII.

Quemadmodum sanguineæ excre-
tiones, quando a nimia vasorum re-
pletione & sanguinis ac seri redun-
dantia fiunt, multum corpori salutis
afferunt & promittunt: ita, quando
a maligna acri materia, ut fit in fe-
bribus malignis exanthematicis, fu-
scitantur, periculi sunt plenissimæ;
& quandocunque a viscerum, præ-
fertim hepatis, lienis aut etiam pul-
monum obstructionem, induratione
& corruptela proficiscuntur, lethum
plerumque post se trahunt; quando-
quidem facile in cachexiam, hydro-
pem, morbum sic dictum nigrum Hip-
potratis, vel in hecticam lethalem
terminantur.

§. VIII.

Qui sanguinis boni, & consistentis, sangui-
fibrosi, purpureo colore prædicti abun-
dantiam, pro causa hæmorrhagia-
rum præcipua & proxima materiali
agnoscunt, hi multum errare viden-
tur. Nam, qui sanguine valde crâ-
so, denso abundant, quales sunt,
qui corpus fibrosum & robustum possi-
dent, atque illud ipsum labore stre-
nue exercent, vi tüque duro utu-
rum, rarius sanguinis excretiones pa-
copiosus.

tiun-

riuntur: ubi vero major & ultra proportionem seri copia in vasis continetur, sicuti fit in corporibus mollioris: texturæ vitæ otiosæ addictis & quæ seroſioris naturæ sunt, ſanguinemque copioſius quam par eſt e vena emitunt, transpirationem impeditiorem habent, atque plus appetunt quam digerere & excernere posſunt; ii quam maxime hiſce præternaturalibus excretionibus & ex his provenientibus incommodis & morboſis affectionibus ſubiecti & expoſiti ſunt. Excessiva quoque & incredibilis propemodum ſanguinis, quæ non raro per nares vel per uterum excernitur, copia, pléthora magis ferofæ quam ſanguineæ teſtimoniū ſatis firmum exhibet: quod vero per pauca ſæpe ſit maſſæ rubicundæ portio, reſpectu ferofæ; id ex eo, quando e vena ſecta in ejuſmodi enorribus hæmorrhagiis emiſſus ſanguis in vasculo colligitur, luculenter commoniſtrari potest..

§. IX.

Notabile insuper est, ubiunque in quadam parte plus ſolito ſanguiferum peregetit, in hac singularia prius quædam phænomena obſervari: ita totius faciei plus juſtior rubedo ac calor, tumor quoque cum arteriarum majori pulsatione & diſtensione ſanguinis naribus profluviū pronunciant. Ante ſanguinis per uterum fluxionem, laſitudi corporis, dolor dorsi & lumborum, tensio circa hypochondria, facies pallida, cutis horripilatio pororumque cutis conſtrictio, contingunt. In hæmoptycis præcordiorum anxietas, spirandi angſtia, dolor gravatius undulatorius circa diaphragma, flatulentia in abdomen, extremonum refrigeratio, ante eruptionem percipiuntur. Cruoris vomitum frequentissime dolor tensivus ac pressorius in hypochondrio ſinistro antecedit, quinimo hæmorrhoidum eruptionem, ſpasticæ quædam conſtrictæ, flatulentæ abdominis, in oſſe ſacro tensivus & pressorius dolor corporis languor & extima-

rum partium refrigeratio indicare ſolent..

§. X.

Ex quibus jam adductis & probe invicem expensis, liquido conſtarē arbitror, hæmorrhagias, quibuscumque etiam in locis prodeant, neque a ſanguinis copia, neque ab ejus nimia turgescencia exitum per vasa affeſtante, neque ex ſeri & ſanguinis acrimonia, diareſin producente, aut ab ejus nimia tenuitate per vasorum poros tranſudante, ut veterum fuit lententia, proxime & direcete proficiſci; ſed potius ab extra ad intus converſo motu atque inæqualitate circulationis ſanguinis oriri: id quod efficitur, quando certæ partes, præfertim extrema & a corde valde remota, intensiori fibrarum ſtructura ac contractione ita anguſtantur, ut ſanguis per venas refluere nequeat, ſed harum aucta ſystole, majori copia & impetu, ad alia loca eaque inconvenientia transferatur; unde lateralia arteriolarum vasa, quæ ordinario non ſanguinem ſtricte ſic dictum, ſed tantum tenuem lymphaticum humorem vehunt, plus juſto diſtendantur & tandem aperiantur necesse eſt.

§. XI.

Ceterum cauſa quoque hæmorrhagiarum præferim enorrium & symptomaticarum, quæ aliis morbis præcipue longis accedunt & ſuperveniunt, in valorum & viscerum infarctu, obſtrutione, induratione, quæ liberiori curſu obicem ponunt, quærenda erit. Videmus id in hydraulicis machinis, ubi obſtructis quibuldam canalibus, fluidum per reliquos apertos majori impetu & celeritate erumpit. Atque idem fit in corpore nolto: nam quando per venas certa partis ſpasmus conſtrictas, vel obſtructas non libere transire & verſus cor circulari potest ſanguis, viſ & impetus ſuum impellens creſcit in ramis & ramulis & arteriolis, qui humore purpureo replete & turgidi in extremitate aperiuntur. Declarant

Anæcœdens.

4 Sectio I. Cap. I. De hemorrhagiis in genere.

id maxime sectiones cadaverum, quarum leviter quasdam attigisse sufficiat. Sic in hæmoptyo dissesto, latus sinistrum pulmonis a tumore obfessum vidit WILLISIUS in *Pharmacia p. 90.* Ita etiam in hæmoptyo reperti fuerunt pulmones copiosissima materia argillacea per totum obsiti, & ventriculi dextri auricula insignis magnitudinis. vid. M. N. C. Dec. 2. an. 6. obs. 217. BLANCARDUS in *anatom. pract. obs. 46.* lienem tumentem & vasa mesenterii atque omenti sanguine infarcta invenit. In vomitu cruento demortuo hepar durum & scirrhosum, lien quoque tumidus & sanguine impletus repertus fuit ab eodem Auctore l. c. obs. 23. it. 32. conf. B. WEDELIUS in *amœnit. mat. med.* BARTHOLINUS in *bistor. anatomi. p. 249.* it. M. N. C. Dec. 2. an. 4. obser. 86. Rectissime hinc scribit FERNELIUS meth. med. p. 14. quibus viscera & jecur imbecillum & scirrhosum evadit, illis sapient sanguis e naribus fluit, non secus ac hydropicis: id quod confirmat HEURNIUS aphor. Hippocr. p. 191. his verbis: quibus facies colore subviridi suffusa est, hepate laborant; & signum est jam adfuturi hydropis frequens in iis cruentis per nares effusio.

§. XII.

Quare hypo-
pochon-
driaci he-
morrhoi-
dazii? Quoniam autem, ex spasticis partium contractionibus & venae angustationibus, sanguinis preternaturales eruptiones plerumque suum ortum & causam mutuantur; liquido nunc intelligitur, quare hypochondriaci, in quibus ventriculus & universus intestinorum canalis mernosus, ob motus peristaltici per-

versionem, flatulentis distensionibus, spasticis quoque stricturis assidue afflictatur, ad motus & fluxus hæmorrhoidales valde sint proclives, atque, si sanguis ibi non exitum inveniat, hypochondriacorum pathemata plurimum exasperentur.

§. XIII.

In genere circa curationem omnis generis hæmorrhagiarum id vel notetur, inconvenientissimam esse eorum medendi methodum, qui, dum sanguinis rubundi & ~~et~~ ~~et~~ sic dicti abundantiam pro causa unica materiali & occasionali nunquam non agnoscunt, crebro institutis sanguinis missionibus audacter utuntur; ut ut, præsertim inter initia & præservacionis gratia, in sanguineis præcipue, tempestivum venæ sectionis usum plurimi faciamus. Recta autem medendi ratio unice in eo reposita est, ut primo impetum sanguinis a parte laborante, opportunis remedii, ut sunt pediluvia, clysteres, diaphoreticæ, ligaturæ, calida tegumenta, fatus, balnea, derivemus; deinceps ut spasticas nervosarum partium stricturas relaxemus; & demum lenioribus per epicrasin laxantibus, & moderatis diaphoreticis, item inedia sive abstinentia a victu pleno sanguinem ingenerante, nimiam serosæ colluvie abundantiam subtrahamus & præcaveamus.

§. XIV.

Hæc de doctrina hæmorrhagiarum in genere dicta sufficient: specialior & fusior hujus in praxi utilissimi argumenti evolutio & discussio in sequentibus capitibus conspicenda erit.

C A P U T I.

D E

HÆMORRHAGIA NARIUM

T H E S E S P A T H O L O G I C Æ.

§. I.

Narium
hemor-
rhagia
quomodo
fit.

Sanguinis per nares profusio debetur copiosiori ejusdem per validiorem cordis motum ad caput appulsi, quo arteriolæ in pituitaria tunica plus justo opplentur, earumque extrema nimium distenta tandem dehiscunt & sanguinem effundunt.

Nares ad
sanguini-
nis eru-
ptionem
prone.

S. II.
Narium ea fabrica, ut eruptioni sanguinis facile obsecundent. Etenim in earum interioribus sanguifera vasa in minutissima capillamenta direnta, per tunicam, quæ vomeris os, spongiosa ac ethmoidalia ossa investit, copiose distribuantur, ac tenui admodum membrana exterius obteguntur. Unde facto validiori sanguinis eo affluxu, is difficulter admodum per venulas refluit, sed ex facilis in arterio lis restitat, harum extremitates ultra modum diducit, perrumpit ac effluit, quin haud raro easdem in exigua aneurismata elevat, quæ postea stillicidium faciunt effusum.

§. III.

Eruptio-
nes an-
secedis
copiosor
eo constu-
tus.

Ad nares ipsumque caput validior-
em sub hac hæmorrhagia fieri sanguini-
nis & humorum confluxum, cordis
& arteriarum vehementior motus,
arteriarum in collo ac temporibus poti-
ssimum intensa pulsatio, gravatus
vus in capite sensus, faciei rubor ejus-
demque cum capite toto intumescen-
tia, naresque interius siccæ & calidæ,
luculenter faciunt testatum.

§. IV.

Congestio-
nis causa
inæqualis
circitus, maxime partium extimarum tubulos,

Hujus congestionis palmaria cau-
sa inæqualis sanguinis, per minimos,

Hoffm. System. T. IV. P. II.

progressus, tantum per venas non re-
ducens, quantum per arterias addu-
ctum. Quo dein fit, ut ad quasdam
partes sanguis justo parcus volvatur
ibique deficit, ad alias vicissim co-
piosius cum impetu ruat, ibidemque
canales ad crepaturam usque farcien-
do, exundet.

§. V.

Igitur quodcumque inæqualem san-
guinis per canales in corpore comme-
atum facit; id etiam ad excludendas
hæmorrhagias consert. Jam nullum
sanguinis profluvium, maximeque
omnium hoc per nares succedens, un-
quam facile sine cutis partiumque ex-
tremarum strictrura, vasorum detu-
mescentia, horripilatione, refrige-
ratione, sine alvi adstrictione, fla-
tuum retentione, borborygmis in
ventre, membrorum lassitudine, doloribusque in ventre contingere solet,
ut potius hæc phænomena ipsam pro-
fusionem ordinari vel comitari, vel
antecedere soleant. Ex quo fit planum
spasticam quandam fibrarum & vaso-
rum in extremis maxime partibus mi-
nimorum strictroram, inæqualis sanguini-
nis circuitus esse causam. Nimi-
rum, quando per crispaturam hanc
spasticam vascula sanguinem potissi-
mum, tum etiam lympham, aut
alios succos revehentia, nec non
excretorii illi in eute tubuli per quos
juxta naturæ legem serosa sanguini-
nis portio expurgatur, comprimun-
tur, sanguis ad vasa interna ma-
jora regurgitat, quo major citatior-
que cordis & arteriarum prorita-
tur contractio, & ipse sanguis ad
partes, præsertim debiliores, vali-
dius

6 Sectio I. Cap. I. De haemorrhagia narium.

dius appellitur, ubi ejusdem conges-
tio, aut decubitus, demum causam
eruptionis sanguineæ, vel aliorum
gravium affectionum præbet.

§. VI.

An pletho- Quæ quum ita sint, expedita nunc
vicissima- est disquisitio, quo pacto alia adhuc
gratio- cause concurrent ad excludendum
sanguine- sanguinolentum hoc stillicidium. Jam
scilicet ex facili reddenda ratio, cur,
qui succis & sanguine redundant, quieti ac sedentariae vitae indulgent, voraces sunt & laute vivunt, corpus tamen, præsertim pedes, frigori incautius exponunt, accedente impen-
siori corporis vel animi motu insueto, aut assumptis iis, quæ sanguinem plus exigit, aromaticis, spirituosis, cerevisiis, vinis, pharmaciis calidis volatilibus, nec non admisis balneis fervidis, sanguinis per nares fluxum crebro & promte incurvant; eo quod his liber ubique & æquabilis sanguinis commeatus intercipitur, ut is per minima vasa farcta ad omnia loca æqualiter distribui nequeat, sed dispositas partes nimium obruendo, ibi erumpat.

§. VII.

Sub no- Haud difficulter quoque reperiunda
ris, aut- sic causa, cur ad certam aeris atmo-
summo & spharici constitutionem crebro hæc
vero, vi- hæmorrhagia erumpat. Per observa-
cissitu- tionem enim in comperto est, plures, vere potissimum & autumno circa
æquinoctia, in provectione etiam æ-
tate narium incurrere stillicidium, non sine levamine. Tum quippe in-
æqualis admodum esse solet aeris habitudo, & frequens ex calido in
frigidum, ex sicco in humidum, ac vice versa mutatio. Qua vicissitudine
crebriori, quia instratum corpori ner-
veo-vasculosum cutis emunctorium male afficitur & tonus ipsius cum transpirationis successu labefactatur;
mirum non est, sanguinis cursum ordinatum turbari & ad sanguinis eruptions anam præberi.

§. VIII.

Eidem causæ tribendum, quod

narium profluvium quandoque popu-
lares habeat circuitus, tum scilicet *Et ex fissa*
quando nimis frigidam & humidam *gido ac*
aeris ex austro & septentrione consti- *humido*
tutionem, subito excipit in elasticam *In elasticis*
habitudinem mutatio, vel eratam ver- *cum &*
fa vice vicissitudo succedit. Sic enim *vite ver-*
illa per cutis poros succedens copiosa *sa mutua*
humidi exhalatio turbatur, serosior *stone.*
sanguinis pars augetur, majori copia
ad vasa ampliora ipsumque cor reddit,
quo validior in his systole & validior
quæque fluidorum impulsus, sed in-
æqualiter procedens, inducitur.

§. IX.

Neque minus in prono est judicare, *In illis*
qui fiat, ut sanguinis per nares ex *qui mori-*
cretionem sape incurvant viri, qui *bis spa-*
rheumaticis, nephriticis, arthriticis *sticis ob-*
& ischiadicis doloribus sunt obnoxii. *noxit.*
Absolvuntur enim hi morbi motibus
& stricturis spasticis, quibus redditio
inæquali sanguinis meatu, ejusdem
collectiones & eruptions in aliis lo-
cis præter naturam contingunt. Unde eximium utique *Hippocratis lib. de*
prædict. 2. monitum, præcipientis,
ut ex ægris provectione ætatis ischia-
dicis & rheumaticis doloribus affec-
tis queratur: num ipsis adolescentibus
vel juvenibus ex naribus san-
guis fluxerit.

§. X.

Non adeo insolens porro est, ut *Quibus*
restante in feminis præsertim junio-*restita.*
ribus, gravidis quoque, mensium, *runt a-*
& in puerperis lochiorum, nec non *lia san-*
in viris hæmorrhoidum fluxu, facta *guinis*
palindrome, narium stillicidium ex-*vacua.*
cipiat sanguinolentum. Nulla tamen *sideris.*
alia pariter subest causa, quam quod
spalmis, quibus omnes hæmorrhagia
slipari solet, æquilibrium motus
sanguinis progressivi tollatur, si que
ad loca excretioni dicata cum impetu
agatur, ibi vero exitu præclusus,
ruat ubi congruum invenit locum
ibidemque egrediendi sibi paret viam.

§. XI.

Frequenter præterea incidit, ut,
in iis potissimum, qui tenerum, spon-
gio-

*Qui se-
bribus cū
spasmis
detinens
tur..*

giosum & ad hæmorrhagias dispositum corpus naſti, febribus, præfer-
tim synochæ exquisitæ, ſeſe affociet,
nec non quartana ſuperveniat, atque
etiam in exanthematicis morbillolofis
& variolofis, ante eruptionem acce-
dat ſanguinis per nares profuſio.
Cujus phænomeni ratio non niſi ſpa-
ſtis nervosarum partium vehe-
mentibus ſtricturis, tribuenda. Haſ enim
nunquam fere non hiſ in morbis præ-
ſto eſſe, quæ antecedere ſolent lucu-
lenter indicant, urinæ ſciliſet tenues,
alvus ſtricta, cutis ad levem auram
admiſſæ horripilatio, refrigeratio,
inquietudines & anxietates, donec
accedente faciei rubore & inflatione
capitisque dolore, erumpat ſanguis.

§. XII.

*Culbus:
etiam
grandius
membrā
adēmū:*

Nec prætereundum, Medicorum
observata ſubinde fidem facere, quod
iis, quibus grandius paullo ex corporis
membris mutilatum, aut amputatum,
frequens eſſe soleat ſanguinis e naribus
ſtillicidium. Etenim eadem po-
ſtea adhuc eſtque manetque ſanguini-
ſ & chyli quantitas, ſpatium ve-
ro, quo diſfundendi ſucci, mi-
nus quam antea, unde crux ſta-
gnat in minimis, & ut aliorum
vergant motus eluctatorii, facit.

§. XIII.

*Aut vi-
ſceri ſan-
guinea
obſtructa:*

Accedit alia inæqualem ſanguinis
motum præter ſpasium inducens
cauſa, viſcerum ſciliſet ſanguineo-
obſtructarum, hepatis & lienis, infarctus at-
que obſtructio. Hic enim dum obex
ponitur ſanguinis per vafa cum hiſ vi-
ſceribus communicantia commeatui,
aliorum convertitur ejus motus ac
impetus, ac non raro ſuperiora ipſum
que caput petit. Atque hinc accidit,
ut inveterato ſcorbuto, hydropi &
cachexie demum, accedat hæmor-
rhagia ſæpe funesta. De quo priſcum
jam Hippocratis de prædict. testimo-
nium, magnos lienes comitari hæ-
morrhagias.

§. XIV.

*Narium-
hæmoro-
hagiæ:*

Ipſum autem ſic concurrentibus
variis cauſis excludum ſanguinis ſilli-

cidium, vel ex dextra, vel ex ſinistra
nare, raro ex utriſque ſimul, ſuc-
cedit, ac præterea, pro uberiori, vel
parciore ſanguinis ad caput affluu-
ejusdemque ibi facto decubitu, ratio-
ne quantitatis multum diſſert. Inter-
dum enim aliquot tantum ſtillant gut-
tulae, quandoque effluunt aliquot unciae,
non nunquam vero tam effuſe
per aliquot horas manat ſanguis, ut
quinque vel ſex librarum pondus
æquet.

§. XV.

Dein hæc narium hæmorrhagia, *Ratione
ratione ſuccellus, quibusdam lon-
gius, quibusdam brevius accidit. Et fre-
Quosdam etiam ſepiuſ, quosdam quantia-
rarius, infenſat. Pueris ſciliſet &
adolescentibus familiarior eſt, ra-
rior viriſ ac ſenibus. Incidit quoque
frequentius in virilem, quam foemini-
num ſexum, cui exundans ſanguis ſo-
lenniter expurgatur per uterina vafa.
Neque minus ut plurimum & crebrius
observatur in iis, qui ſpongiosiori,
copioſis atque exilibus dotato corpo-
ris habitu prædicti, non vero ita in
macilentiſ & ampliſ vafis pollentiſbus,
quibus tamen ſi accidit hæc hæmor-
rhagia, eſſe ſoleat effuſior.*

§. XVI.

Præterea attentior docet obſerva-
tio, eo, quibus ineunte aetate copioſa
mucida & ferofa per aures, nares ocu-
loſque exierunt, ſuperatis pubertatis
annis, narium hæmorrhagiæ fieri ob-
noxios. Hæreditariam etiam ſepiuſ
eſſe hanc ſanguinis evacuationem & a
parentibus tranſire in liberos expe-
riencia conſtat. Et nullam hæmor-
rhagiam tam facile repetere, quam
quæ per nares contingit, eſt pariter
certum; ita ut elapſo diei, aut tan-
tum aliquot horarum ſpatio, ſæpe
recrudescat.

§. XVII.

Jam omnes quidem ſolitæ & fre-
quentes ſanguinis fluxiones, debilio-
rem naturam, hoc eſt, talem par-
tium corporis ſtructuram, quæ im-
diſtiori minusque ſequabili ſanguinis
*Quando-
que ſa-
lutoris
est ple-
thoriciſſi.*

8 Sectio I. Cap. I. De hæmorrhagia narium:

progressui faveat, indicant. Interim tamen salutares omnino sunt, quando a nimia sanguinis mole, in spongeo maxime corpore, stagnationum pessimarumque passionum metus est. Nec desunt numerosissima apud observatores medicos exempla, quibus vertiginem, scotomiam, gravativos capitis dolores, phrenitidem, convulsiones quoque & epilepsiam, per narium hæmorrhagiam soluta annotarunt. Vicissim quam gravia damna a præpostera hujus excretionis suppressione insequantur, vertigines, apoplexia, epilepsia, convulsiones, aurium cum auditus difficultate tinnitus, nec non serena gutta, velsolus primus artis parens Hippocrates, passim confirmat, maxime prædict. & in coacis.

§. XVIII.

*non
in syno-
eba.* Criticæ quoque & salutares sunt ut plurimum narium hæmorrhagiæ, quæ in synocha febre, semicritico die, inter tertium scilicet & quartum, vel etiam critico pleno, septimo erumpunt, & has febres, a plethora ut plurimum ortas, solvunt.

§. XIX.

*Frequens
nimis
pueris
juveni-
bus &
adultis
morbos
inducit.* Attenta in artis exercitio observationis docet, & ab Hippocrate jam noveris, eos, quibus in pueritia frequentia fuerunt narium stillicidia, accedente juventute, facile incurrisse pectoris morbos graves, hæmoptysin, pleuritides, peripneumoniam ipsamque phthysin; in provectioni autem ætate virili, hæmorrhoidal fluxui, affectibus rheumaticis, arthriticis, ischiadicis, nephriticis & colicis factos fuisse obnoxios.

§. XX.

*Enormis
ac diu-
turna
secas.* Enormes ac diurnæ sanguinis per nares profusiones, quando ex vehementioribus internalium partium spasmis pendent, præcedentibus extremorum refrigerationibus & lipothymis, tandem in mortem terminari solent. Vidimus id ante quadraginta annos in foemina generosa, in qua post mortem carotides mirum distentæ & duplo capaciores, inferior autem coli portio

arctius stricta, comparuerunt.

§. XXI.

Quæ febris exanthematicis, vel *Sympat-*
etiam malignis, ubi summa *virium* *matica*
in exan-
prostratio, accedere solet narium hæ-*thematis*
morrhagia, monstri aliquid alit sem-*cis, ma-*
per, viresque magis adhuc dejicien-*lignis &*
& sanguinis ad corporis superficiem *chronicis*
cursum una cum materia pec-*mo-bis*
cantis expulsione minuendo, pericu-*pericu-*
lum adducit gravissimum. Quæ etiam in *losa.*
chronicis morbis, ubi viscera destru-
cta, erumpit, ad mortem dicit, ea-
que propter cachecticis & hydropicis
funesta ut plurimum observatur san-
guinis per nares evacuatio.

C U R A T I O.

§. I.

Si enorme sanguinis profluvium *Remedias*
præsens est & periculum minatur & *opponen-*
nimium destruit vires, utique auxilio *da cas-*
medici opus est. Versantur autem me-*sist.*
dendi rationes potissimum in eo, ut
perspectis genuinis causis, ea opponamus, que illis tollendis sufficiere possunt.

§. II.

Quando itaque nimia humorum & *Reduci-*
sanguinis redundantia atq; expansiva *dantis*
ejus vis & turgescencia liberiorem & *sanguis or-*
æqualem per minima vasa transitum *gasme.*
impediens, immodicam tamē fluxionem causatur, quod præsertim fit in
corpo juvenili, verno tempore & a motu corporis paullo fortiori, vel etiam ab ingestis spirituosis sanguinem exagitantibus, præter venæ sectionem, quæ etiam simul divertit motum sanguinis a capite, nitroso omnibus aliis, ad nimium orgaſmum compescendum & relaxandas etiam spasticas partium stricturas, palmam præripiunt. Olim jam ipse Paracelsus, nec non Hildanus, hoc sale tantum purificato, in omnibus hæmorrhagiis cum fructu usi sunt. Et Riverius in praxi & observationibus suis, hujus remedii efficaciam in sistendis fluxibus sanguineis non satis dilaudare potest. Similis tamen effectus, ut & acida, ut paullo inferioris, sunt ipsa acida, tam-

temperatoria ex vegetabilium familia,
ut citri succus, berberum, aqua & suc-
cus acetosellæ, quam potentiora ex
mineralibus, ut phlegma, seu spiritus
vitrioli dilutus, vel tinctura rofarum,
& florum bellidis, cum aqua acetosel-
lae, & spiritu vitrioli preparata, & cum
aqua fontanæ potu, cuius etiam magna
vis est, intestinam illam sanguinis elas-
ticam vim componendi, propinata.

§. III.

Spastice Quia vero in effrenibus ejusmodi,
fricture & pericolosis sanguinis profluviis spa-
stends ita quædam nervofarum partium
anodynæ. strictræ plerumque subest, quam pres-
so, ut dicunt pede, inæqualis fluidorum
sequitur progressus, præter jam lauda-
ta nitrofa, ad blanda anodyna subinde
est confugiendum, quorum in numero
papaveracea, ut aqua, vel etiam extra-
ctum, aut syrups papaveris rheados,
syrups papaveris albi, emulsiones, que
semina quatuor frigida & semen papa-
veris albi habent, & ex aquis florum
acaciae, sambuci, tiliae, ulmariae, chamo-
millæ vulgaris, primulæ veris coactæ
funt. Persistente vero pertinacijs va-
lidiore solidorum impetu, descendend-
um ad efficaciora, & aliquot grana
massæ pilularum de cynoglossa offe-
renda. Camphora quoque, propter
sulphureas, quas copiose spargit, ex-
halationes, sedativum præstat effectu,
præsertim si cum nitro, antimonio dia-
phoretico, parcior & refractiore juis do-
sis permixta fuerit. Qualis pulvis insi-
gnem in primis locum invenit, si ex an-
thematica quædam materia, ut sepius
evenit, ejusmodi sanguinis profusioni,
causa fuerit. Ex omnibus vero ad me-
derandas sanguinis tam per narium,
quam alia loca profusiones, vix tutius
& certius datur illum remedium, li-
quore meo anodyno minerali, qui sul-
phure vitrioli anodyno fetus & penitus
satur est, & sive solus, sive adhuc me-
lius, pulveri nitrolo nuptus & cum a-
qua tantum fontana datus, orgasmum
sanguinis illum effrenem protinus
compescit,

§. IV.

Præterea urgente gravius malo, ut ^{Sanguini}
^{nis ad} sanguinis impetus a superioribus diver-
tatur & alio dirigatur, curandum: ^{afflu-}
^{xus de-}
^{vertens} hunc in finem plura sunt proficia, Pal-
marium venæsectio in parte inferiori
instituta. Dein egregia pediluvia tem-
perata, vel immissiones manuum in a-
quam tep idam, quibus laxantur fibræ,
partiumque vasculosarum tonus re-
mittitur, & sic quodammodo nimius
sanguinis ad superiora affluxus impe-
ditur.

§. V.

Cum porro materia acris biliosa, ^{Ajorum}
flatum & spasmorum genetrix sepius,
& præsertim in hypochondriacis im-
modicæ sanguinis fluxionis causa sit;
derivandi scopo certe egregia virtus
eorum, quæ canalem intestinalium
blande expurgant. Quæ interius dan-
tur, sint temperatoria roborandique si-
mul facultate donata, cuius generis
sunt rhabarbarina, rhabarbari pulvis,
in substantia cum aliquot salis poly-
chresti & nitri granis permixtus, vel
passula rhabarbaria. Exterius idem
præstant clysteres ex emollientibus,
carminatibus temperatis & oleosis pa-
rati, qui latentes in intestinali canale
spasmos & flatus mulcent ac evehant.

§. VI.

Divertunt demum etiam nimium
sanguinis affluxum simul atque imbe-
cillorem partem roborant exterius ^{Especi-}
applicata fronti, naribus & collo refri-
gerantia, cum disentientibus mixta, ex
quibus probatissimæ virtutis epithé-
ma, quod ex aceto rofaceo, rotaceo, ni-
tro, camphora, oleo ligni Rhodii pa-
ratur, atque etiam naribus attrahi pot-
est.

**Cantela. & Observationes:
Clinica.**

§. I.

Ad præ- serva- tionem ad per- spiratio- Qui impetuosis & frequentioribus narium hæmorrhagiis obnoxii sunt, ad has præcavendas, corpus, maxime pedes, ipsumque caput, a frigore probe defendere debent, ne perspiratio impe- diatur, quæ sicuti ad omnes hæmorrhagiæ, sic etiam hanc, multum confert, dum abundantia sanguinis, & humorum etiam impurorum inde prolignitur. Consultum igitur est, præter abstinentiam a largo victu, hanc excretiō- nem corporis motu, & infusis thei for- mibus, ex herba veronica, sumitatibus millefolii &c. servare ac promovere.

§. II.

Vitanda exstua- tio & clamor. Qui hæmorrhagiis in juventute fre-quentius fuere tentati, postea iüs cessan- tibus & neglecta etiam sanguinis mis- sione, cavere maxime debent ab omni vehementiori corporis motu, etiam intenso clamore, sermone ac voce. Obser- vavi enim in aliquot litteratis docenti- bus capitis morbos, sere immedicabiles aurium tinnitus perpetuum, capitis dolorem, paralysin, quoque superve- nisse.

§. III.

Refrige- rator. Maxime omnium vero post enormes hæmorrhagias cavendum est a refri- geratione corporis, etiam capitis, nec non a terrore. Hoc enim neglecto, ingentem torporem, stuporem, dolorem gravativum capitis, cum dolore oculo- rum, visus imbecillitate, vertigine sub- ortum observavimus, quin summam totius corporis debilitatem ipsiusque apoplexiæ metum. Nam quo plus ex- haustum sanguine corpus, eo magis ca- venda sunt ea, quæ sanguinem ab exteriis partibus ad interiores repellont.

§. IV.

Eandem ob causam in profusa hæ-

morrhagia caute, & quidem statim ab initio, mercandum est cum frigidis & adstringentibus, tam per narcs, attra- hendis, quam epithematis forma exte- rius applicandis. His enim incautius, admotis, sanguinis impetus, obstructis, naribus, vel ad asperam arteriam & pul- mones, suffocationis metum, vel ad in- teriora cerebri conversus, apoplexiæ periculum infert. Tuttius potius est & consultius, præmissis pediluvii, & alvo per clysteres soluta, ac venæsectione, si opus fuerit, in pede administrata, ex- ternis hisce demum uti.

§. V.

Illæ sanguinis fluxiones, quæ a san- guine nimium redundante, omissa con- sueta venæsectione & deficiente in fe- minis menstruali purgatione, vel ema- nente lochiorum in pueris, aut in viris hæmorrhoidum fluxu, oborun- tur & plus salutis quam periculi affe- runt, nullo modo sistendæ sunt cum vi. Si vero modum excesserint, præter de- rivantia jam dicta, corallia cum specie- bus de hyacintho & nitro mixta, ac succo citri imbuta, propinare sufficiet.

§. VI.

Neque minus maximopere est ca- vendum, ne consuetæ per periodum recurrentes ejusmodi hæmorrhagiæ periodi- subito cohibantur externis, aut inter- nis. Inde enim in senibus lethargum, imo apoplexiæ obortam, non semel observavimus.

§. VII.

Solo frigidò aquæ fontanæ in & ex- tra-paroxysmum potu, modo externa corporis superficies convenienti fovea- tur calore, successive ad duas vel tres mensuras singulis diebus hausto, na- rum hæmorrhagias compositas esse novimus, præsertim in cholericis, biliosis, & ubi intensior partium sulphurearum orgasmus est, qui hac ra- tio-

Exter- nis qua- cauti- ne Iusti- dum.

In ple- thoricas hemor- ragia non vi- sitida.

Neque etiam se- recurrentes ejusmodi hæmorrhagiæ periodi- subito cohibantur externis, aut inter- nis. Inde enim in senibus lethargum, imo apoplexiæ obortam, non semel obser- vavimus.

In cho- leticis frigido- potus prodes-

tione optime complacatur & blandus plerumque sudor optimo effectu suscitatatur. Quare non improbandum consilium, ut qui immodicis & crebrioribus vexantur hæmorrhagiis, aquam fontanam, sed puram, ordinarii potus loco bibant.

§. VIII.

In sym. proma. i. guid fa. ciedum In symptomaticis & raro cum bonis agrorum rebus recurrentibus ejusmodi profluviis, qualia febres exanthematicas, variolas, morbillos, purpuram scorbuticam, imo ipsas petechias comitantur, non alia convenit exhibere quam quæ nimium estum moderando, cuticularem perspirationem blande promovent, inter quæ frequentis & probati usus mihi est mixtura ex aqua florum sambuci uncis quatuor, acetii destillati uncia una, lapidum cancerorum, diaesordii Fracastorii, ana drachma una, nitri scrupulo uno, addita syrupi papaveris rheados sufficiente quantitate; de qua bihorū quovis eger duo cochlearia capiat & temperato lebit calori se committat. Ac si quippiam malignitatis subest, pulvis ex antimonia diaphoretico, nitro depurato, & camphora propinandus.

§. IX.

Emans. quibus proritā. de. Quibus in pueritia, & adolescentia sanguis frequentius e naribus stillavit, si haud raro, cessante postea hac fluione, capitis, oculorum, & aurium vitiis, necnon tumore parotidum vexantur, vel etiam gravioribus malis, epilepsia, phrenitide, idiopathica, vel symptomatica, affliguntur. Quod ubi incidit, tum utique commode, si caput ejusque vasa sanguine turgent, nares ad sanguinem fondendum externo artificio irritandæ & aperiendæ sunt, idque plerumque penna, vel stramine in nares fortius intruso, vel instrumento scarificatorio perficitur. Idem cum fructu adornatur, si in febris synochis & sanguineis impetus ad caput praesto est, & gravia symptoma sine ejus effusione efficit.

§. X.

Hæmorrhagiae impetuosaæ, que sunt a gravibus animi affectibus, peculia-rem tractationem postulant. Quod *sig. nomodo traxit.* enim ab animi excandescientia sunt, pulveres antispasmodici, nitrosi, cum pura aqua frigida successive dati, eximie profundunt; si vero a gravi mœtore oriuntur, diaphoretica cum antispasmodicis mixta, liquor noster anodynus mineralis, cum quarta parte spiritus Bussi, cum regimine blande diaphoretico, omne curationis absolvant punc-*da*rum.

§. XI.

Cachectica si fuerint corpora hæmorrhogiam hanc incurrentia, rhabarbarina, variis modis crebriusque obblata, sive sola, sive cum salibus digestis permixta, omnibus aliis id genus remediis præferenda esse experientia didicimus; si vero scorbutica viscerum labes subest, serila lactis cura, interpositis rhabarbarinis, erit omnium optima.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

O B S E R V A T I O I .

Vir sanguineo-phlegmaticus, quadragesimum ætatis annum egressus, a multis jam annis, tam cerevile, quam vini potui nimium indulgens & cacheticus redditus, incidit in icterum, qui congruis remediis rhabarbarinis & aperientibus item discutientibus externis aliquoties sublatus, saepius rediit, ac tandem cutis nigrore prorsus fuit tintata, simul narum erupit hæmorrhagia, quæ remediis compesci potuit nullis, sed diu noctuque sanguis tenuis, lividus, coagulum prorsus responens extollavit, subsequuta virium jactura summa, & externis semper frigescitibus, mente constanti obiit.

Epi.

Epicrisis.

Omnis sanguinis profusiones in cachecticis corporibus, si modum excedunt, atque ex vitio & obstrukione hepatis vel lienis fiunt, multum periculi alunt, nec facile admittunt sanationem duplarem potissimum ob easam. Scilicet propter obstructa alicubi vasa æqualis sanguinis cursus turbatur, & ad aliam partem plus, quam secundum naturam debebat, sanguinis convehit, cui postea facile super venit eruptio ipsa. Dein si viscus nobilior, quod, uti hepatis, sanguinis repurgationi, sulphureas acres partes fecernendo, dicatum, est obstructum, remanentibus intus his recrementis, succi in corpore fiunt falsi, acres, impuri ac intemperati, qui postea partim spasmos concitando intensos, partim tenera vascula erodendo, plane hemorrhagias faciunt incomprehensibiles. Id quod saepius evenisse vidi itero nigro laborantibus, inter quos etiam fuit, cui ex gingivis sanguis tam effuse profluit, ut nullo modo posset reprimi. Narium quoque hemorrhagiam ex itero nigro lethalem annotarunt M.N.C. Dec. 2. an. 2. obs. 114. pag. 318. Et maxime omnium hanc in rem notandum Heurnii testimonium, quod notis in S. 3. aphor. 20. ita habet: *vidi nonnullos, quini a vini liberali usu æstuarent & in hemorrhagiam transirent, tandem evasisse ictericos moxque in hydropem abiisse calamitosum hoc malum.* Necnon illud, quod epid. L. 6. consignavit: *qui vitio lienis laborant, & quibus viridi atroque colore tinti, narres sanguinem fundunt, malum.*

OBSERVATIO II.

Hæmorrhagia narium in pueris. A triginta, & quod excurrit, annis a-nimo adhuc obversatur memoratu dignum de hæmorrhagia narium lethali exemplum in femina illustri, tum heic degente. Erat hæc circiter trigenaria, macilenta & natura alvi segnioris, &, cum utero gereret, perpetuas, ultimis praesertim mensibus habuerat quere-

las, de calore lento continuo, vires mirum atterente, cum intercurrente cordis palpitatione & quandoque tanta pulsuum debilitate, ut vix persentinentur, & ægra vernacula asseveraret: *Es uvare ihr, als uven das Hertz gar keine Kraft hatte und in Wasser lage.* Post superatos partus labores, lochia manant non sufficienter, & successit e nari bus fluxus satis largus sanguinis tenuis non coagulum assumentis. Subsistente hæmorrhagia hac interjecto aliquot horarum spatio, incessuvat pueroram pathemata spastica truculenta, cum extremitorum frigore summisque anxietatibus, sub quibus mens ipsa sibi non constabat animusque desperans erat de salute, donec erumpente rursus e nari bus sanguine, pathemata sensim remitterent & mens ad se rediret. Discelit postea hoc sanguinis profluviu m iterumque accessit per paroxysmos, ita, ut per duas vel tres horas succederet, postea ad duodecim vel octodecim horas inducias daret, tum præviis anxietatibus, inquietudine, extremitorum frigore, & faciei rubore rediret, inter quæ antecedentia pathemata mens semper erat aliena & desperatis cogitationibus adeo turbata, ut nec divini verbi solatia eidem erigendo sufficienter, quæ tam extra paroxysmum avide sibi applicabat decumbens. In hoc tam gravi malo, consilia & auxilia adhibita multa; venæ sectionem natura horruit ægra, laxantia autem, clysteres, pediluvia, frictiones, nitroso omniaque alias præstantissima fuerunt frustranea. Unde percontinuans sanguinis profluviu m vires prorsus exhaustæ atque dejectæ, pulsuum iectus facti inæquales, inquietudo perpetua, donec exactis inter hæc quatuordecim diebus, lipothy-mia tandem sub ipso paroxysmo spastico occumberet lethali.

Epicrisis.

Quamvis narium profluviu m hoc in casu speciem præbuerit critici & salutaris in locum lochiorum minus sufficien-

eienter fluentium succedentis; tamen propter pathemata in tenera & debili puerpera supervenientia spastica hysterica, utique exitii fuit plenissimum. Tanto certius autem fuit periculum ad damnum, in persona, cuius vires propter astum, diutius jam corpori tempore, quo utero gessit, inhaerentem, crassis sanguinis & temperiem naturalem destruentem, unde etiam sanguis sine coagulo prodit, jam attritæ, & postea per ipsum profluvium penitus quotidie magis prostratae sunt atque dejectæ. Nam spasmi semper in corpore viribus substituto graviores sunt & pertinaciores, & vel hæmorrhagias, vel inflammations, aut congelationes sanguinis, in capite relinquunt. Unde, quando gravidae, ultimis præsertim mensibus, cum astu interno de virium debilitate valde queruntur, vidi sepe & prædixi in puerperio pravos eventus. Lique etiam ex hac morbi historia, in paroxysmis spasticis redeuntibus, desperabundas illas & melancholicas anxias mentis alienatæ cogitationes originem suam in foemina alias eximiae pietatis, a congestione & stagnatione sanguinis in cerebri vasibus traxisse, minime vero, ut vulgus autumat, a malo dæmons fuisse obortas, quum fluente sanguine per nares & spalmis remittentibus, omnia pathemata desperabunda simul quoque & semel exspirarint.

OBSERVATIO III.

Hæmorrhagia naria. Juvenis perillustris, sanguineæ belitis constitutionis & facie floridus, in pueritia & adolescentia crebro jam fuerat potu fr. expertus narium stillicidium, & post gide, quam in nostram hanc ante aliquot annos concessisset Academiam, tantam sanguinis e naribus profudit successive copiam, ut sex, vel octo mensuras compleret. Quo inducta ingens virium dejectio, cum appetitus languore visus que hebetudine. Data quidem plura congrua alias remedia, sed frustra. Tandem & ego in consilium vocatus suasi, ut ordinarii potus loco aquam fonta-

nam frigidam, cum tinctura rosa- rum, spiritu vitrioli acidulata & syrupo berberum remixta biberet, corpusque exterius, præsertim pedes, probe a frigore defenderet. Quæ cum aliquando per quatuordecim circiter dies servasset, substitit sanguinis fluxus, ac poste aquam jusculis nutrientibus gelatinosis ex carnibus sanguis exhaustus nimis reparatus, convaluit æger ex votu & ipsa quoque visus hebetudo cef-savit.

Epicrisis.

Hæmorrhagiis sunt maxime obnoxii juniores, sanguinei & sanguineo-chole- rici, habitus corporis spongiosi, iidemque miram sic sepe quantitatem san- guinis, citra vitæ periculum, profun- dunt. Consignatae sunt ejusmodi largi profluvii historiae a *Zacuto Lusitano*, *Valleriola*, necnon *Forestio*. Et nuper admodum retulit mihi Theologus, se per multos jam annos obnoxium esse tam largo narium stillicidio, ut non nunquā uno die vel quinque mensuras perdat, facie tamen semper rubicunda, pulsusque auctiori manente, nec quicquam proficere adhibita media, quin cohibito per spiritum vini naribus attractum fluxu, spirandi accedere anxietatem. Sed modo viscera salva sint, nec san- guis impurus scorbuticus; restitutionis tamen spes est, licet vires haud leviter per nimiam sanguinis jacturam atterā- tur. Ex omnibus vero ejusmodi in cali- bus presentane virtutis frigidus potus, ex aqua tantum simplici, sine additione acidorum, eaq; sæpius cohibitam e naribus hæmorrhagiam vidi. Id tamen monendum, hoc remedium in iis tantum obtinere locum, qui non ex viscerū ob- structionibus, & internarum partium spasticis stricturis, sed ex nimia elasticiti- tate & expansione partium in sanguine sulphurearum, atoniā vasorum indu- cente, hoc malum incurvant. Frigus enim sic cum potu intro ad initium, compescit orgasmum fibrasque ni- mium remissas adducit, eoque facit, ut sap-

sanguinis impetus ab affectis locis discedat, & ad exteriora ab interioribus divertatur, ac haud raro sudor erumpat, boni in hæmorrhagiis. semper omnino. Eadem hæc medicatio etiam locum habere potest, ubi a fortiori corporis motu, calida tempestate, potu spirituoso atque etiam ardenti veneris maxime desiderio, sanguis valide exagitatus prorumpit. Quo casu præterea. *Hildanus* non sine ratione immissio nem in balneum frigidum suadet.

OBSERVATIO IV.

Hæmorrhagia narium. Generosa femina, quinquagesimum sextum annum ingressa, vegetæ alias chære constitutionis, per quinquennium admettere noluit suetam alias venæ sebata cætionem, sed inter ea aliquotus hæmorrhoidalium venarum stillicidium fuerat experta. Hæc ante mensem, eo tempore, quo propter aeris constitutionem insalubrum variii generis febres circumabant, etiam paroxysmo corripiebatur febrili, accidente tertio die delirio, levi, & narium stillicidio parco, quo tamen delirium non remisit, sed persistit potius cum leni quodam, & continuo cutis madore. Medicus in consilium vocatus dedit nitrofos, & cinnabarinos pulveres & quotidie aliquot mensuras aquæ frigidæ eibere jussit. Accidente sexto die graviora facta sunt, cum delirio pathemata, unde medicus, quod primis diebus faciem domum fuisse, veniam secare jubet in pede & decem circiter sanguinis uncias emittere. Inde quidem æstus & pulsus sedator factus, delirium quoque remittere vixum, remansit tamen languor maximus, quin octavo die redierunt pristina pathemata, si non majori acerbitate, tamen eadem. Tandem quoque per uterum & annum excreta fuit ingens non tam sanguinis, quam seri sanguinolenti quantitas. Hinc iterum remittere visa, primum morbi atrocia, sed exacerbata, paullo post denuo. Accessit præterea sanguitus, quem medicus frigida aqua-

clystere ano infusa compressit. Post hunc rursus par uterum magna seri colluvies evacuata, ac postremo fatis cessit ægra.

Epicrisis.

Ad hanc ægram accersebar die septime & ego; sed malui spectatorem agere tantum, quam medicationem suscipere. Exspectavi potius exitum, quem prædixi, brevi funestum, tanto magis, quum de evacuatione feri sanguinolenti per uterum & anum reddecer certus. Interim testimonio est hæc morbi historia, venæctione non intercipendum, aut anticipandum esse criticum sanguinis fluxum, qui in synochæ febre septimo die solet erumpere. Haud dubia & fallacia enim fuerunt indicia, naturam ejusmodi criticum fluxum fuisse suscitaturam, eaque propter venæctione primis, non postremis diebus, fuisse instituenda, naturæ negotium certo turbatura. Vicissim nunquam ego cum bonis ægrarum rebus accidisse novi secessum non sanguinis, sed seri sanguinolenti per uterum. Etenim putrida talis hæmorrhagia labem in in utero haud obscure innuit inflammatoriam, tanto certius, quo magis delirium, & symptomatum inde oriundorum nullum levamentum, ferunt testimonium.

OBSERVATIO V.

Juvenis Hebræus, constitutione sanguineus, decimo octavo ætatis anno *Hæmorrhagia morbillis accdens sanata.* morbillis correptus, experiebatur simul narium hæmorrhagiam copiosam cum anxietate præcordiorum, pectoris que oppressione eximia. Vocatus ego dedi mixturam, ex decocti cornu cervi aquæ florut sambuci uncis quanto, succi citri uncia dimidia, coralliorum drachma, nitri puri, diascordii Fræcastori scrupulis duobus, syrapi aceto. statis citri uncia semis. Qua per vices cochleatim assumita, eruperunt nocte una.

una morbilli, sedata symptomata, compressa hæmorrhagia.

Epicrisis.

Morbillis complicari narium stillicidium non adeo rarum est, præsertim in plethoricis. Quin in sequiori sexu non modo per nares, sed vomitum etiam ac uterum sanguinem effusum esse novi, in primis in iis, quæ exquisitus sentientis, & ad iram pronæ naturæ. Sed si in exanthematicis ejusmodi incidit hæc hæmorrhagia, eadem neutiquam sedanda per frigida, sed illa, quæ materiam illam acrem causticam nervis membranis insidentem eisdemque ad spasticas stricturas sollicitantem contemperant simulque blande expellere juvant. Et hunc utique effectum adhibita mixtura præstat ergie, de quo præterea multiplicia experientiæ sunt mihi testimonia.]

OBSERVATIO VI.

*Memor.
rhag. cū
quarantæ
annæ.* Puer generosus tener, ostennis, ipso quo febres admodum frequentes, incidit in quartanam, quæ licet aliquoties depelleretur, semper tamen rediit, ut æger demum abdomen inflatum & faciem lividam circumferret, quibus crebriores accesserunt hæmorrhagiae narium. Minus fausti hæc videbantur ominis; nihil minus adjuvante DEO, infuso rhabbarino, cum lixivio alcalino & nitroso, admixtis extractis amaris, inter potum dato, febris ex toto quievit, omninaque pathemata cum hæmorrhagia discussa.

Epicrisis.

Mala utique fuerunt hæc indicia. Sed in infantibus, non tam facile obstrunctiones & indurations viscerum accident, quam in adultis. Et si etiam adfuerint primordia ejusmodi labis, facilius tamen hæc amaricantibus, & salinis iterum disjiciuntur ac tollun-

tur. Atque eidem causæ tribuendum, quod in nostrø feliciter cesserit medicatio, quum, si in adultis eadem occurruunt phænomena, ex quartana facilis, quin certus, in cachexiam & hydrozem sit transitus.

OBSERVATIO VII.

Virum novi triginta circiter annos natum, spongiosi corporis habitu & temperamento, ut vocant, sanguineo, qui a primis ætatis annis frequens expertus fuerat, circa æquinoctia potissimum, narium stillicidium. Adultior postea factus, sanguinis missionem vere & autumno admisit, liberalem, quo natum hæmorrhagia quidem emanxit, sed solennes facti circa id tempus capitales dolores, sponte tamen iterum discendentis. Quum vero aliorum concedens, ex consilio medici, suetam omitteret venæ sectionem, vere incunte gravativum capitum incurrit dolor, cum faciei tumore ac rubore]. Nihil scimus docentis, quod gerebat, munere strenue alta & elata voce fungens aurium tinnitus. & auditus gravitatem passus est cum torpore pedis & manus in latere dextro, quæ ipsum per multos annos ad mortem usque afflixerunt.

Epicrisis.

Patet ex hac relatione, consuetas fieri plethoricis, circa æquinoctia præterim, narium hæmorrhagias, eisdemque instituta sanguinis missione posse intercipi. Quia igitur omessa postea venæ sectione sanguis pristinam ad caput viam legit, mirum non est, subsequetas ibi stagnationes ipsius, & gravativum sensum. Quin, quum per sermonem crebrum elatum magis augeretur ad caput affluxus, factum utique, ut a cruro stagnante secederet serosa portio, ad inferiora descenderet, ibique aurum tinnitus atque etiam torporem pedis manusque induceret. Ex quo id in usum practicum tenendum: pessima es- se

se medentium consilia, quæ contra experientiam suadent, ut sueta sanguinis missio, propter vanum decrementi vi-
rium metum, omittatur.

C A P. II.

Dé sanguinis fluxu ex pul-
monibus.

Theses Pathologicæ:

§. I.

*Hemo-
rrhysis.
quid.*

Illa hæmorrhagia, qua sanguis flori-
dus & spumans mediante tussi ex
pulmone fertur, recepto in scholis me-
dicis nomine, origine Græco, hæmo-
ptysis appellatur.

§. II.

*Differ-
a sputo
cruento.*

Non omnis sanguinis e faucibus re-
jectio hæmoptyseos nomine insigniri
debet. Nam sæpe e naribus in fauces &
pulmones sanguis descendit, ac inde
postea screatu grumosus per os rejici-
tur, præcedente in palato titillatione,
in capite dolore, aut gravitate. Inter-
dum quoque per acrem tenuem destil-
lantem humorem, ab erosio & fauci-
tis faicum, vel etiam ipsius asperæ ar-
teriæ interioribus ramulis, sputum san-
guine, vel sanguinis striis imbutum, e-
ducitur cum ipsa tussi; proprie tamen
hæmoptysis dici nequit, nisi spuriam
eam vocare velimus.

§. III.

*Ab indu-
ctio per
violen-
tiam.*

Neque etiam nostræ considerationis
hic erit sputum illud subcruentum,
quod inflammatum in pleuritide vera
pulmonem, circa quartum, aut quin-
tum ut plurimum diem, sequitur; neq;
etiam illud, quod a causa externa vio-
lenta, vulnere, contusione, vel graviori
casu in pulmones subnascent confluecit,
sed quod a causa interna excitatur, &
a læsa vasculari pulmonum substantia
oritur, sive proprie & stricte hemor-
rhagia pulmonum dici potest.

§. IV.

*Differ-
entia*

Pro differente vasorum pulmona-
lium læsione & ejus quoque causa, va-

rie, tam ratione modi, quam periculi &
curationis, hic se habet affectus. Scili-
cet ubi sanguis spumans, floridus ac te-
nuis per intervalla, cum tussi, sine dolo-
re, non adeo multis educitur, latera-
lium vasorum apertione id denotat;
ubi vero ubertim & magno impetu,
quasi vomitu quodam, prorumpit, adeo
ut interdum magna inde pelvis imple-
atur, grandiorem venæ ramum vel in
varicem expansum, vel in aneurisma
arteriæ, quod sæpius accidit, abeuntem
& ab Hippocrate jam animadversum,
disruptum fuisse, est indicium. Qui ca-
sus, quo frequenter incidit, eo plus ha-
bet periculi, & repente non nunquam
tam grandis sanguinis effusio homi-
nem examinat, dum vel intus intra
tracheam cohibitus crux, ob defectum
virium, pulmones obruendo suffocat,
vel vacuato nimium sinistro cordis
ventriculo a sanguine, lethalem exci-
tat syncopen.

§. V.

Ut vero ipsa hæc eruptio fiat, aliæ *Causa*
variæ easq; concurrant necesse est. Im-
mediata quidem, sive proxima, est in-
qualis & impeditior sanguinis per pul-
monum vasa transitus, seu circulatio ,
lis cir-
dum majori copia & impetu in arte-
riam pulmonalem ejusque ramulos af-
fluit & appellitur, quam venæ eum re-
cipere & reddere possunt, quo dein suc-
cessive fit magna tenuium ramorum,
qui substantiam cellulari & vesicu-
larem ipsaque, bronchia perreptant,
expansio, tandemque varicosa, seu an-
eurismatica potius intumescentia, &
denique violenta ruptio .

§. VI.

Confirmant hoc uberioris signa, & *Quod*
symptomata, quæ malum hoc solent
antecedere ac comitari. Scilicet inva-
dit illud per vices insultibus, & quasi
per paroxysmos revertitur sic, ut æger
antea percipiatur horripilationem in eu-
te atque extremis maximeque pedibus
refrigerationem, vasa in manibus dis-
pareant, dolor in dorso, lassitudo &
gra-

Iassitudo & gravitas artuum affligat, borborygmi in imo ventre sint & alvus adstricta, in pectore gravatus sensus cum difficultiori spiritu observeatur, donec sequente in faucibus titillatorio, & secundum asperæ arteriæ tractum quasi pruriens sensu, sub calida ebullitione, & undulatorio in dextro latere motu, ipsa eruptio sanguinis accidat. Hæc enim omnia indicant spastica-
lēm cir-
culū
facit sā-
guinis
orga-
mus.
cam quandam externarum, & internarum partium strictroram, sanguinisque motum non modo esse inæqualem, sed & a peripheria introverti, ad pectus vasaque majora cogi, ibi plus justo coaccervari, impedito libero per pulmones ad cor transitu, regurgitar e versus dextrum latus, ibique calidi ebullientis sanguinis undulatorium sensum concitare.

§. VII.

Sunt autem plura, quæ æquabilem illum, & liberum sanguinis progressum in quo maxime integritas functionis, in quaunque parte constat, per pulmones turbant, pervertunt, & sic ad generationem hujus mali conferunt. Nimirum quandoque nimia tantum & simplex sanguinis intra canales, ob auctum intestinum partium sulphurearum aereo-ætherearum expansivum motum, turgescens, seu orgasmus subest, quo systaltica & elastica in vasis potentia minuitur ac demitur, unde stagnatio & nimia sanguinisibi fit collectio, accumulatio, tandemque rami arteriæ pulmonalis apertio, vel ruptura.

§. VIII.

Partium nervosarum spasticarum, pariter equabilis & liber sanguinis per minima motus impeditur, ejusdemque impetuoso cursu & apulsu ad alia loca, maximeque pulmones, inducitur. Unde frequens admodum in praxi est observatio, hypochondriaca passione laborantes, necnon pathematicis hysterics obnoxias

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

fœminas, in quibus ut plurimum mensium fluxus sub multis, & atrocibus spalmis difficulter succedit, incidere in hunc sanguinis e pulmonibus fluxum, non sine periculo.

§. IX.

Haud dispar est ratio & effectus, quando obstructo, vel infarcto viscere sanguineo, præsertim liene, & inde affecto ventriculo, quod ex dolore tensivo in hypochondrio sinistro concludendum, incidit hæmoptysis. Etenim intercepto alicubi sanguinis libero per vasa transitu, vi legum hydraulicarum, impetus eius sic increvit, ut ubi minorem resistentiam invenit, copiose confluat, vasa diducat tandemque perrumpat. Tanto vero certius tantoque gravius hoc malum excluditur, quando ipsius in pulmonibus magna consistit labes, ac vel vomicae, aut tubercula in ipsius substantia, vel polypose concretiones in ramis vasorum majoribus hærent, quibus, dum obex ponitur sanguini transuenti, si utique qua datur via ruit, aut ubi subsistere cogitur, perrumpit & hemorrhagiam facit admodum effusam.

§. X.

Porro de iis, quæ remotius ad inducendam sanguinis e pulmonibus eruptionem faciunt, per ipsam experientia constat: corpora graciliora, tenerroribus fibris & vasis prædicta, quæ collo instructa longo, pectore angusto simulque quadanteus depresso, in quibus pulsus celerius micat, cor etiam subinde palpitat, una cum iis, qui a parentibus phthisicis progeniti, in iram atque impatientiam sunt proclives, ac in juventute fluxum sanguinis per narres frequenter experti, desinente corporis augmento, & in longum incremento, intra spatium anni vigesimi quinti ad trigesimum quintum usque, accendentibus aliis causis externis, per quam facile in hunc anticipem morbum prolabi.

B Non

§. XI.

Sanguinis abo. Non minus per observationem me-
dico practicam in comperto est, ut plu-
dantia rimum & omnium facilissime, hoc san-
guinis profluvium accidere sanguineis
causis corporibus, & juvenibus nec non ces-
sante sanguinis, sive per nares in adoles-
centibus, sive per mentes in feminis
sive etiam per ani venas in prove-
ctoris & tatis hominibus spontanea e-
vacuatione, vel etiam omessa artificiali
subtractione. Qui effectus tanto certius
subsequitur, quando accedit, vehementer
corporis, & animi motus, aut cali-
dorum in cibis, potus spirituosi abusus,
intensus clamor, tussis vehementior,
inflatio diuturna & violenta tubarum,
necnon nimius in fetibus vel partu e-
dendo conatus.

§. XII.

Aeris quoque consitu- Autumno præterea, quando tempe-
stas regnat inæqualis maximaque fri-
goris & teporis est vicissitudo, tum non
modo frequentiores esse solent deflu-
xiones immodicæ variæ, atque etiam
in dispositis illa, quæ fit per pulmones.
Idem accedit, quando hyeme sub in-
tensissimo gelu corporis superficies
stringitur & sanguis ad interiora ma-
gis compellus inque pulmonum cana-
libus accumulatus nimium, facile per-
rumpit. Unde haud raro accedit; ut hæ-
moptysis sit anniversaria, quæ Februa-
rio mense, necnon ante æquinoctium
erumpere atque redire solet, utque et-
iam circa hæc tempora idem hic mor-
bus plures attentet & quasi popularis
sit.

§. XIII.

Non in omnibus ejusdam periculis. Ceterum de hoc sanguinis profluvio
recte utique scribit Hippocrates Sect. 5.
pag. 10. edit. Foesian. qui sputis cruentis
detinentur, ex his quidam brevi tempore
pereunt, quidam vero diutius trahunt;
præstat enim corpus corpori, atas atat,
& affectio affectioni, anni tempestas
tempestate in qua ægrotant: quidam e-
nim morbos facile tolerant, quidam vero

omnino tolerare nequeunt. Etenim non
omnibus idem hic morbus eodem mo-
do observatur esse, aut exitialis, aut
transitorius. Iis scilicet, quibus hæmo-
ptysis ob solam abundantiam, aut e-
bullitionem sanguinis accidit, si recta
medicatione & vita vietusque ratione
excipiatur, nec periculosa est, nec capi-
talis. Ego certe vidi cessantibus in gra-
vidis mensibus sanguinis expunctionem
singulis mensibus redeuntem, partu ve-
ro excluso & redeunte menstruo fluxu
sponte sine periculo emanentem. Vicis-
sim notavi hæmoptysin tempore gra-
viditatis cessantem & enixo factu ute-
roque vacuo prodeuntem & sine peri-
culo per aliquot annos insistentem.
Vidi quoque sanguinis sputum pericu-
li expers in iis, quæ parcus justo tribu-
tum solvebant lunare.

§. XIV.

Id vero omnino certum, ex omnibus *Omni-*
quæ preter naturam accident hæmor-
rhagiis, vix ullam esse frequentiorem *tanen-*
non modo & sæpius redeuntem, sed et-
iam magis anticipem & periculosam, *hemor-*
quam hæmoptysin. Nam haud facile *rhagia-*
secundam valetudinem perfecte recu-*rum fe-*
perat hoc malo semel gravius correpti, *re peri-*
nisi qui magna cura vitam postea col-*sima.*
lunt & sanitatis regulas obseruant, ne-
que etiam tum speratus semper conse-
quitur sanitatis effectus. Pulmo quippe
ex visceribus est nobilissimus, qui, dum
sanguinem ex uno cordis ventriculo ad
alterum transmittit, vite servit insigniter,
quia vero ea propter, dum vita est,
in continua expansione & compressio-
ne versatur, vas in ipso ruptum vel sau-
ciatum sanguiferum difficulter admou-
dum coalescere & consolidari potest.
Accedit, quod extravasatus in pulmo-
ne sanguis, non facile penitus per bron-
chia & asperam arteriam evehatur,
sed in vesiculosa substantia restans,
putrefact & teste jam Hippocrate in-
pus, ulcus ac denique in heclicam & ta-
bem lethalem transeat. Quare ve-
ritati omnino respondet Tralliani
lib.

lib. 7. Cap. 1. testimonium, ita habens : ipsa quidem sanguinis exscreatio per se, dummodo non immoderata evacuationem inducit, vitam non adimere consuevit, sed pessimorum morborum longorum magna ex parte causa redditur.

effuso multo spumoso obrutos & nigris inveniri, restitante adhuc exigua in vasis sanguinis quantitate.

CURATIO.

§. I.

Quum, ut dictum, causæ hujus mali *Medendi* admodum differant, diverse quoque curandi indicationes sint necesse est; præcipue tamen illarum redeunt *indicationes.* *huc:* primo, ut sanguinis orgasmus nimis vasa plus justo venoſa expandens compescatur; secundo, ut ejusdem affluxus copiosior & impetuosior a peſtore ad exteriores corporis partes derivetur; tertio, ut spastica illæ stricturæ, quæ sanguinem ad pulmones validius congerunt, laxentur, & sic liberior reddatur per totum corpus sanguinis circulus; quarto, ut læsa pulmonum substantia vaseculosa in integrum refluiat, & sic tam mali recursus, quam oriundi ex leſione alii morbi arceantur.

§. II.

Primum ut perficiatur, & sanguinis *sanguinis orga-* ebullitio componatur, apprime conducent refrigerantia. Inter hæc potissimum connumerandus aquæ potus frigidæ, paulatim quidem, sed sufficienter *quibus compendus.* quotidie haustus, recto probe corpore. Novimus aliquot exempla, solo hoc medio, debita cum cautione & præmissa vena lectio adhibito, periculose hunc sanguinis fluxum substituisse. Idque tanto felicius succedit, si corpus juvenile calore interno æfluat; quem potus frigidus reprimendo madoremque tepidum in peripheria corporis eliciendo, partes simul sulphureas calidas sanguinis exæstuationem inducentes evenhit. Non minus præstans pariter ac probatissima est in reprimendo calido sanguinis partium aereo ætherearum æstu virtus nitritate tantum depurati, & crystallisati, imprimis si cum aquis refrigerantibus, ut plantaginis, portulacæ, aut etiam sero lactis, convenienti, *B. 2. parca.*

Potissimum majus vel minus est discrimen quod infert hæmoptylis ratione causarum & illorum, in quæ incidit, corporum. Scilicet si senioribus accidit, debilior quantumvis & non tam vehe- mens quam juvenibus sanguinis eva- cuatio, major tamen virium sequitur dejectio & facilius putrida pulmonum corruptio, quam excipit hecticus calor, qui corpus & vires tandem cum vita perit consumit. Gravius quoque ac certius subest periculum, quando diuturnum profundum merorem insegu- tur hæc sanguinis evacuatio, quando infimi ventris viscera una obstruta, atque humores dyscrasia scorbutica acri biliosa simul infecti.

§. XVI.

Nec non ubi pulmones labefacti, vel vomicis resolutionem eludentibus obsidetur, vel vasa polypolas concretiones redundunt, vel etiam varices, vel potius aneurismata in canalibus præsto sunt, quibus crebra, & profusissima sanguinis fit effusio, tandem funesta. Has enim plerumque in hæmoptycis subesse mortis causas, edocet cadaverum sectio, qua patefit, non modo pulmones maxima ex parte ut plurimum esse corruptos a sanguine ibi effuso purgante & ipsam substantiam membranaceam solidam depascente, sed & hospitari sèpius polypolas concretiones in vasis pulmonalibus, & quidem magis iiii, quæ plus cum sinistro, quæ dextro cordis ventriculo communiant; iis autem, qui rupto sanguineo tumore pereant, pulmones a sanguinet

parca tamen, sed saepius repetita dosi, assumatur. Spiritum quoque vitrioli, vel etiam ejus phlegma acidulum, praे omnibus aliis mineralibus, imo vegetabilibus acidis, peculiarem ad organum sanguinis compescendum possidere virtutem, experti novimus, tanto certiorem, si cum his ceu menstruo ex rosis extrahatur tintura.

§. III.

Ad obtainendum secundæ indicatio-
sanguinis a pulmonib. nimium imperum, præ-
cipuum certe momentum repositum
est in venæ sectione, in brachio, vel et-
iuvadus iam in pede instituta. Præstans etiam
hoc nomine virtus pediluviorum tem-
peratorum, nec non immisionis ma-
nuum in aquam tepidam. Neque mi-
nus ad derivandum proficia ea, quæ
alvum expurgandi facultate pollent,
inter quæ ex internis præcipuum lo-
cum inveniunt tamarindinata, passu-
lata, rhabarbarina, & inter externa,
elysteres emollientes, stimulo quo-
dam acutati..

§. IV.

Spasticæ. Tertium medendi momentum in
stricturæ eo versatur, ut spasticæ stricturæ, præ-
quibus sertim quæ in minimis vasis sanguife-
ris & partibus nervosis consistunt, relaxentur. Hic egregie satisfaciunt oleo-
sa demulcentia, ut oleum amygdala-
rum dulcium, vel etiam lini, sine igne
recenter paratum, cochleatim assum-
tum. Spectata quoque virtutis emul-
siones ex seminibus cucurbitæ, pineis,
semine papaveris albi & aquis quas vo-
eant hypnoticas, ut rosarum, papave-
ris rheædos, nymphæ, liliorum convalli-
um, florum tiliæ, necnon cerasorum
nigrorum paratis, quibus nitri & syru-
pi papaveris albi parum adjiciendum.
Vel etiam loco harum aquarum ad e-
mulsiones parandas adhiberi potest de-
coctum cornu cervi, eboris, nec non
dentis hippopotami; quia in his duris

animantium partibus singularis quæ-
dam spasticis motibus resistendi facul-
tas inest. Si vero adeo rebellis hæc stri-
tura est, ut mitioribus hisce cedere &
sanguinis profluvium subsistere nolit,
ad paulo valentiora recurrere licet: in-
ter quæ semen hyoscyami albi ad dra-
chmam dimidiæ, cum æquali pondere
lapidum cancerorum, duodecim
nitri granis & uno camphoræ grano
mixtum, omnibus aliis, etiam opiatis,
palmam præripit. Securioris tamen, ac
nihilominus egregii effectus est mixtu-
ra nostra tonica, quæ ex tinturæ anti-
monii acris, sive tinturæ tartari, li-
quoris anodynæ mineralis ana uncia se-
mis, liquoris nostri bezoardici Bussiani
drachmis duabus & olei macis guttis
sex est composta; quippe quæ spasti-
cas non modo stricturas mulcet, sed &
diuresin & diaphoresin lenius moven-
do, sanguinis ad pectus affluxum di-
vertit efficaciter.

§. V.

Quatum in hæmoptyseos curatio-
ne est, ut disrupta vasa consolidentur,
tenues acres humores affluxum eo pro-
ritantes attemperentur, & incrassen-
tur, ac partis affectæ tonus roboretur.
Hoc autem non obtainendum uno eo-
demque modo ac medio. Quare quæ
ego inter plura proficia deprehendi,
candide edieam, certus, si cum debito
judicio & congruo tempore adhibeantur,
eadem, si medicinæ adhuc locus,
non fore frustranea. Est autem ex his
primum mixtura, cuius formula hæc:
recipe aquæ plantaginis, scorzonerae,
veronicae, scabiosæ, aceti destillati ana
unciam, coralliorum rubrorum præpa-
ratorum, specierum de hyacintho ana-
drachmam dimidiæ, syrupi papave-
ris rheædos drachmas duas, M.
Quæ mixtura tribus vicibus assumen-
da, & si vehementius sanguinis pro-
fluvium, addenda adhuc pulveris hæ-
matici drachma dimidia. Alterum
remedium, quod tam in hæmopty-
si simplici, quam etiam in ea, cui
com-

complicata est phthisis, conductus est de-
coctum, cuius hec est compositio. Reci-
pe florū bellidis, rosārum rubrarū, ^{Si plae-}
chamomillæ vulgaris, summitatū millefolii ana pugillos quatuor, herbae ^{shora}
consolidæ saracenice, hederæ terrestris,
urticæ mortuæ, veronicæ, sani-
culæ, pyrolæ ana manipulum, feminis
ſceniculi, nucifæ ana drachmas duas.
Mixta concisa, contusa dentur, signen-
tur species, davon 3. Loth in 2. maas Bi-
er zu kochen. Tertium quod mihi pro-
bati usus fuit auxilium, sunt pilulae ex
massæ pilularum de cynoglossa drach-
ma dimidia & massæ pilularum balsa-
micarum Becheri drachmis duabus
concinnatæ, ad scrupulum unum circa
lecti introitum sumenda. Quartum &
ultimum quod in hoc gravi morbo
commendem habeo pulverem hunc:
Recipe lapidum cancerorum, antimonii
diaphoretici, cornu cervi sine igne,
dantis hippopotami, lapidis manati a-
na drachmam, nitri depurati drach-
mam unam cum dimidia, misce fiat
pulvis, optime sic usurpandus, ut scrup-
ulus unus ipsius viginti guttis liquo-
ris nostræ mineralis anodynæ imbuatur,
& cum aqua antispasmodica propine-
tur.

Cautela & Observationes Clinicae.

§. I.

In gravi illa & vera hæmoptysi, qua-
sis sit ea uta in
gravi
hæmo-
ptysi
ob ruptum majorem arterię pulmo-
nalis ramum, magna sanguinis copia per
brevia intervalla erumpit, caveat me-
dicus, ne promissis de restituenda sani-
tate sit dives, nisi fluxus sanguinis intra
triduum cōvenientibus remediis com-
pescant. Interim tamen minime vicissim
laborantem gravi metu mortis ita
percellat, ut indicet magno periculo,
omnibus viribus, ut, sœpe vidi, eum
privet & mortem acceleret.

§. II.

Si sanguinis abundantia urget, &
Hoffm. Syſt. T. IV. P. II.

manifesta adeſt vasorum plenitudo, ^{Si plae-}
statim inter initia instituenda est, five ^{shora}
in manu, five etiam in pede, sanguinis ^{ad eſt}
missio, & quidem largior, ad octo, vel ^{sanguis}
mittens plures uncias, ex ample foramine: quo ^{dus.}
sanguinis impetus eo efficacius a loco
affectio divertatur, & rupti ac fauciati
canales eo melius iterum coire & coa-
leſcere possint.

§. III.

Illa quoque anniversaria hæmopty- ^{Neenou-}
sis, necnon qua ex hæmorrhoidalī flu- ^{ſi hæ-}
xu emanente proficiscitur, inferre solet ^{morr-}
circa tempus anni recurſus rheumati- ^{rhoides-}
cos in pectore dolores, junctos cum ^{eman-}
sanguinis ſputo. Habetur hinc a minus ^{ſeruante.}
periis morbus haud raro pro pleuriti-
co, ſed ſecta in pede vena, & provocato-
ſic hæmorrhoidum fluxu, non modo
ſanguinis expulſio, ſed & reliqua pa-
thema ſimul & ſemel ſolent con-
quiſcere.

§. IV.

Ubi acri catarrhalī defluxione exci- ^{Si ad æ-}
tatur cum titillatione in fauicium pro- ^{eri de-}
fundō tuſſis accerrima, qua ſimul per vi- ^{fluxio-}
ces floridus & ſpumofus ſanguis cum ^{ne fit,}
muco exſereatur, apparentibus nullis ^{demul-}
plethora ſignis manefiſtiſ, emulſio tan- ^{centia}
tum amygdalarum dulciū ſeminisq; ^{danda.}
papaveris albi pro potu operam locat
preſtabilem; ac præterea pilulis nostris
balsamicis aliquot grana massæ pilula-
rum de ſtyrace aut de cynoglossa ad-
miſcere expedit. Neutiquam vero in
uſum vocanda conſolidantia & adſtrin-
gentia, quia minima tantum vafcula
arteriæ bronchialis non vero pulmo-
nalis, ſunt fauciata.

§. V.

Quando effuſior ſanguinis fluxus: In re-
præfens minatur periculum atque in- ^{belli ſe-}
terna auxilia non ſufficiunt, conſu- ^{garuſis}
giendum utique eſt ad remedium a ^{utondū,}
veteribus frequentius uſurpatum, nem-
pe ligaturam artuum. Hac enim ſan-
guis in extremis tantisper retentus,
non tam cito ad cor & ex hoc ad pul-
mones redit, atque adeo imminuſo
ad pulmones ſic fluxu, rupti ramulū

non ita sanguine implentur, sed concidunt faciliusque coeunt. Ne tamen ex stasi sanguinis partibus ligatis inferatur periculum, haec adhibenda est cautio, ut sedata haemorrhagia, ligaturae non omnes simul, sed successice una post alteram solvantur.

§. VI.

*genuis
pochon-
driorum
vitio.
tempe-
ramento
rum ha-
benda
ratio.*

Quum haemoptysis sepiissime ex primarum viarum & hypochondriorum vitio, intestinis flatibus ac spasmis distentis accidat, maxime in adolescentia & juvenili etate, ob sedentariam nimis vitam, studiorum intemperantiam, vel etiam affectuum impetum; ad hanc utique causam dirigenda etiam est in curatione meditatio, ita tamen, ut exquisita temperamentorum servetur distinctio. Quodsi enim juvenes sunt cholericae constitutionis, exquisitoris sensus, ad iram proni, palpitatione cordis subinde afficiuntur, & pulsus exhibit magnum, tum abstinendum est ab omnibus alias egregiis carminativis, stomachicis, salibus volatilibus oleosis, necnon purgantibus acroriibus, ac potius pulveres temperantes nitrosi, ad alvum laxandam mannata, passiflora, tamarindinata, & ad corrigendam sanguinis intemperiem diluentia, serum lactis caprilli, decocta hordeacea, avenacea & id genus plura, cum fructu adhibentur. Contra ea, ubi peccant humores viscidi, ubi infarctus viscerum, intempories frigida & humida, & habitus corporis spongiosus, tunc pilulae balsamicæ polychrestæ, necnon spiritus salis ammoniaci, vel volatilis oleosus. Sylvii, cum tintura tartari mixtus, item essentiæ temperatores carminatiæ, tinturæ martialibus mixtæ, utiliter exhibentur.

§. VII.

*Adstrin-
gentia
nocent.
valida.*

Sicuti remedia que validiori adstringendi facultate possint, nunquam ullo in morbo, ita nec in haemorrhagiis secundum operam præstant; omnium ve-

ro minime in haemoptysi, præsertim illa quasi critica, necnon ab initio & in paroxysmo ex usu sunt. Etenim, licet fluxum ad tempus sistant, relinquunt tamen in pulmonalibus vesiculis sanguinis grumulos, qui in corruptionem abeunt, inflammationem, putredinem, phthisin & hecticam expedito & facili modo inferre possunt. Interim tamen, neutiquam ex toto repudianda sunt leniora adstringentia & roborantia, opportuna extra paroxysmum & in fine fluxus, ad tollendas reliquias & præscindendam recidivam. Inter haec laudem merentur eximiam solutio corralliorum cum succo citri vel aurantiorum facta, & in syropi formam redacta, confectio de hyacintho, conserva rosarum rubrarum cum terra sigillata, aut haematitis pulvere mixta. Chinæ corticem mirifice commendat Morton in phthisiologia, in electuarium cum syrupo rosarum redigendum, cui extractum calcarilla aquolum, succinum & pulvis nucis commode adjiciuntur. Hæc enim, dum partibus motricibus a robore defectis debitum tonum blande reddunt, ut sanguis per totum corpus promtius & expeditius cum omnibus luccis circumeat simulque cuticularis excretio liberius succedat, faciunt & sic utilitatem præstant. Nec minus eximia est efficacia infusorum theiformium, item decocti roborantis propositu ordinario. Infusa quidem optime ex vegetabilibus supra memoratis traumaticis, cum herba polygoni, millefolii summitatibus & foeniculi semine cinnari & quotidie forbillari possunt. Decoctum vero ex radice sarapariliæ, chinæ, rasura ligni saffali rubri, citrini quoque, ligni lentisci, vel loco hujus mastiches, una cum passulis possunt confici.

§. VIII.

Lactis & lacticiniorum usus omnino præltans est in hoc morbo. Novi, solo lacte caprillo cum floribus papaveris, rhœados cocto, admixta dimidia aque *Dela-
lacticinis
caerule-
par-*

parte, & adiecta portione mellis, quotidie largius assumto, immodicam etiam ex pulmonibus sanguinis profusio nem optime conqueivisse primum, ac postea usurpatissimul multo inter cibos confeccis ex amylo, ex toto fuisse sanatam. Id tamen de usu lacticiniorū omni tenendum: ut non modo ventriculi, an ea ferre possit, habeatur ratio, sed & ne simul & semel, sed parcis & repetitis vicibus, ingerantur.

S. IX.

*In seni-
bus re-
nomda,*

Si seniores hunc morbum incurunt, haud leve ipsis imminet periculum, licet sanguis non adeo largiter profundatur. Penitus vero in his abstinentium est tam a fortiter adstringentibus ad sistendā hæmoptysin, quam ab opiatis ad procurandum somnum, ne vires magis dejiciantur & corruptio, in quam senilia corpora ipsorumque sanguis prouus, præcaveatur.

S. X.

Minera. Caveant sibi hæmoptyci omnes, pre-
les aquæ sertim ubi profusio gravior est & copio-
que pre-
fuit, ab aquarum mineralium, herma-
lium & acidularum usu, maxime om-
nium illarum, quæ sale qodam copio-
so acri & principio calcareo alcalino
imbuta sunt, Carolinis, Pyrmontanis,
Egranis, Sedlicensis. Ubi enim partis
aut visceris cuiusdam interni substan-
tia læsa est aut corrupta, labem hæ-
quæ augent & exacerbant, adeoque
nunquam profund. Vicissim acidula te-
peratores, ut Selterans, quæ purum
sal alcali recondunt, præsertim si cum
laete asinino vel caprillo miscentur,
usus sunt saluberrimi, eo quod sanguinis & humorum salsam & acrem dyscrasiam contemperant non modo, sed & obstrunctiones & infartus pulmonū referant, simulque acres particulas per urinarias vias, ne denuo noceant, eveniunt. Est autem sic institutus acidularum potus tunc quam maxime utilis, quando a scorbutica & icterica sanguini-

nis, & humorum intemperie malum hoc inducitur & fogetur.

§. XI.

Ultimo loco addendum eximium *In vita
Celsi lib. 10. cap. 4. consilium, de iis, quæ
victus
servanda in vita victuque ab hæmopty.
que re-
gimine
tenenda*

autem lib. de internis affectionibus co-
mendat hæmoptysi affectis aquæ po-
rum, item lac bubulum tertia parte
aquæ mulæ remixtum & copiosius as-
sumtum, item lac caprillum, coctum cu
semine lini & semine sesami; porro fa-
rinam cum lacte coctam. Quæ omnia
proficia esse, experientia & ratio testa-
tur, eo quod tali diæta humores tenues
increassantur, acres mulcentur & lafarū
partium conglutinatio promovetur.

ENARRATIONES
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Perculta fuerat nobilis foemina, 30. *De his
annorum, ipso illo quo menses fluebant
tempore, terrore ingenti, quo illico
subsistit sanguis, & inducta pectoris
gravitas, præcordiorum anxietas, &
cordis palpitatio impensa. Recurrente
dein menstrua periodo, redit quidem
sanguinis stillicidium, sed admodum
parcum, præcedente pressorio & tensio-
rio dorsi ac hypochondriorum dolore,
pectoris angustia & gravativo in præ-
cordiis sensu. Accessit vero etiam san-
guinis e pectore per tussim ejactio. post
quadrividuum sponte iterum cessans.
Quin quotiescumque postea utero pur-
gata, toties per quinque vel sex dies,
sanguinis plus vel minus e pulmonibus*

ejecit, idque per novem annos continuos; ita tamen, ut quum impregnatione facta menses retinerentur, hæmoptysis etiam quiesceret, post partum autem mox rediret, atque etiam sub ipsa lactatione sueta periodo succederet. Interim nihil inde detrimenti redundavit in sanitatem, neque quicquam incommodi sensit femina, frustra tamen ad compescendam hanc pulmonum hæmorragiam variorum medicorum conquisivit & consilia, & auxilia.

Epicrisis .

Singulare hoc est hæmoptyseos menstruæ, diuternæ quidem, sed periculi expertis exemplum, quo aperte confutatur falsa nonnullorum opinio, qua hæmoptysis omnem phthisin habere, aut comitem, aut pedigree putant. Duxit autem originem ex sanguinis ab utero ad pectus, propter terroris vehementiam, facta regurgitatione, qua vasta pulmonalia diducta tandem aperta sanguinem eructarunt, sed remittente sanguinis ad interiora mensium tempore solenni restrictione, & evacuato superfluo, liberior iterum factus progressus, vasa occlusa & sic sponte cessavit hæmoptysis ac damni intulit nihil. Interim per quas semel iterumq; sanguis elatus est vias, ex facili postea relegit, & accedit quasi quedam naturæ consuetudo, certa scilicet solidarum partiū dispositio, qua appulso validius sanguini, prompte viam concedunt ac diverticulum, egre postea, ac nisi statim in principio, medicamentis iterum tollenda.

OBSERVATIO II.

De hæmoptysi Juvenis 20. annorum, corpore tenero, animo ad iracundiam admodum propenso, & autumno clivis, per aliquot jam annos circa veris periodis & autumni ingressum tussi ex pulmonibus ejecerat sanguinem; novissime autem accidit, ut circa idem tempus ira excandesceret vehementius, eoque hæmoptysis incurreret largissimam, certis quotidie periodis accidentem,

hora scilicet matutina quarta & vespertina nona. Eruptionem semper ingens præcordiorum anxietas, frigoris notabilis in pedibus ac prefforius, & tensorius in hypochondrio sinistro sensus præcesserunt; postea successit screatus sanguinis, qui per quatuordecim dies perstet, & octo minimum libras sanguinis evexit, non sine magna vi- rium jaætura. Medicus in consilium vocatus, neglecta sanguinis missione, deœcta adstringentia, incrassantia & pectoralia, ipsum quoque hæmatitis pulvorem obtulit, sed frustra prorsus, ac potius sanguinis evacuatio statas luas semper servavit periodos. Advocatus & ego in auxilium quaternis singulis horis propinavi salis volatilis oleosi genuini 20. guttas ex aqua ceralorum nigrorum; circa somni tempus pulveris antispasmodici, ex dente hippopotami, unicornu vero, lapidibus cancrorum, unguis alcis, nitro, diaphoretico antimonia, pulvere lumbricorum terrestrium & cinnabari, dosin, cum tantillo massa pilularum de cynoglossa, sumere jussi, alvum liberam servare emollientibus clysteribus nitro largius conditis, ac pedes non modo aquæ tepidæ subinde immittere, sed & calidis integumentis a frigoris accessu solicite defendere, suasi. Quibus, fortunante DEO, curationem ex voto confeci.

Epicrisis .

Periodica fuit hæc hæmoptysis tam ratione recursus vernalis & autumnalis, quam etiam eruptionis ipsius mane & vespere factæ, simulatque testimonio est, quantum valeat iracundiae affectus ad provocanda sanguinis profluvia. Quia autem periodos servantes morbi somitem utplurimum habent sordium in prima corporis regione colluviem, in promtu est judicare, vulgaria illa pectoralia, incrassantia, adstringentia, efficere potuisse nihil, ac præter leniora evacuantia, recte in usum vocata fuisse ea, quæ spasticas stricturas, in con-

consuetudinem & habitum quasi
tranteuntes , laxarunt , antispasmo-
dica scilicet , maximeque illam cum
cynoglossa confectam pilularum mas-
sam . Sed minus obvium erit nonnullis id , quod sal volatile oleosum , cu-
juvis languinem exstans & humores
commovens alias passim decanta-
ta , usurpatum cum fructu . Verum
candide profitemur ac confidenter ,
nos ipso hoc remedio saepe saepius su-
stulisse cito ac secure nimia sanguinis
profluvia , per quæcumque loca facta .
Id tamen monendum , neutquam
exhibendum esse efficax hoc auxilium ,
in , aut mox ante paroxysmum , sed
cessante ac remittente fluxu . Etenim
quia impensiores spasmos , eruptionis
auctores , excipere solet debilitas &
relaxatio , ad stagnationem novam
adeoque inducendum denuo spasmum
postea ansam præbens , hæc utique
non melius potest præscindi , quam
roborando partes atonia affectas ,
quod per ejusmodi volatilia oleosa
perficitur commodissime .

OBSERVATIO III.

*De his-
moprys-
alvi flu-
zu soluta.*

Theologus , vigesimumquintum æ-
tatis annum egreditur , succis & sanguini-
ne plenus , incidit postquam e fugge-
stu verba fecisset voce intensa in næ-
moprys largam , qua tantum san-
guinis evacuatum , quantum replende-
pelvi integræ sufficiebat . Hinc debili-
tatus admodum a Medicinæ Studio-
fo petit consilium , qui tincturam sul-
phuris vitrioli cum laudano opato
mixtam propinat , eo cum effectu , ut
æger post aliquot doles suffocationem
cum maxima præcordiorum anxiera-
te incurreret . Ad hanc itaque levan-
dam sanguis subtractus & mixtura da-
ta discutiens ex aqua chærefolii , sca-
biosæ , florum sambuci , destillato ace-
to , lapidibus cancerorum cum nitro &
dicordio Fraesterii . Quibus quidem
urgens malum discussum , sed inter-
positis aliquot diebus redit sanguinis
creatus , non mediocri copia , cuius

accessum , aliquoties postea factum ,
æger exhorripilatione & refrigeratio-
ne partium externalium , faciei pallo-
re & sensu e dextro pectoris latere ca-
lidi sanguinis adscendentis , prænun-
ciavit . Licet autem huic malo com-
plura prestantissima opponerentur au-
xilia , & æger etiam aliquod inde ac-
ciparet levamen , penitus tamen sub-
sistere noluit sanguis , sed subinde ali-
quot sanguinis floridi cochlearia eru-
perunt . Interim accidit , ut æger ci-
bum caperet flatulentum ex pomis
terræ , radicis cyclaminis vulgaris ,
vulgo Erd-aeffeln , & stomacho ad-
modum debili existente , inde tormentis
in ventre atrocibus afficeretur ,
quibus in copiosum alvi fluxum solu-
tis , id commodi tulit , ut sanguinis
e pulmonibus fluxus prorsus ex eo sub-
sisteret , nec unquam postea rediret ,
in primis quum decoctis vulnerariis ,
admixtis balsamicis temperatis , no-
vum accessum declinare satageret .
Inter cibos commendavi pultem cre-
brios assumendam ex farina farris ,
Rocken-mehl , aqua & butyro .

Epierisis .

Caute mercandum esse cum sipti-
cis adstringentibus , cuius generis est
tinctura sulphuris vitrioli , antiphthisi-
ca Gramanni , in hoc sanguinis
profluvio maximeque ejusdem princi-
pio , uberioris confirmat hæc historia ,
nisi suffocationem , vel etiam ipsam
phthisin arcessere velimus . Patet
quoque , tormenta & cruciatus imi-
ventris cum alvi copiosis dejectioni-
bus , sanguinis a partibus superiori-
bus ad inferiores impetum derivasse ,
& sic mali pertinaciam expugnasse .
Quo egregie confirmatur insignis eo-
rum utilitas , quæ alvum subducunt
& biliosum serum educunt in rebel-
libus ejusmodi pectoris morbis . Si-
mul vero innotescit : per accidentem
quandoque salubritatem afferre , per
le nociya , uti in nostro cibus incon-
gruus flatulentus , tormenta impensa-
fuscitans . Ceterum hac observatio-
ne docemur , decocta ex herbis vulne-
ra-

rariis, quæ temperata amaritie & adstrictione nimis relaxata vasa firmant & robort, ad perfectam hujus mali sanationem, ut non amplius redeat, modo viscera adhuc sint integra, utilissimam exhibere efficaciam.

OBSERVATIO IV.

Hemoptysis per recursus de senescens lenifissima curata. Theologiæ studio addictus juvenis, temperamento melancholicus, corpore procerus & macilentus, primis quidem ætatis annis sanus fuerat ac vegetus, sed ante sex annos in schola defundans, repente correptus est totius corporis refrigeratione, maxime pedum manuumque, cum virium languore, inappetentia, & nauseabundo anxo circa pæcordia sensu, quem nostri vocant *Ubelseyn*, nec non pectoris angustia ac stimulo ad tußim. Nocte insequenti præter opinionem sanguinem exspuit sincerum, idque postea successit per biduum & priora pathemata infestarunt per hebdomades sex, donec Medici ope iterum convalesceret, & per sexennium ab hemoptysieos recursu degeret libér. Sed quum in Academiam concedens erudiendis liberis operam suam addiceret saepiusque ob id animo commoveretur, accedit, ut idem morbus, iisdem quam antea symptomatibus rediret, extremonum frigore, pæcordiorum anxietate, spiratione difficulti, virium & appetitus dejectione somnique defectu. Dato tum pulvere antispasmodico, morbus paulisper inducias dare visus est, sed remansit languor, ac cum ad pristinum docendi munus rediret æger, rediit & morbus, ita ut per quinque hebdomades quotidie successive sex vel septem sanguinis floridi cochlearia ac intermedio tempore viscidam pituitam pure remixtam, screatu redderet. Adhibita igitur venæ sectio in pede, dati pulveres antispasmodici, quin dulcis effentia & solaris pulvis, verum frustra, morbus potius persistit

idem, pulsus præterea fuit inæqualis, celer ac debilis, extrema frigida & tanta virium prostratio, ut vix loqui & corpus loco movere valeret, macilentus simul ob appetitus defectum redditus. Sic rebus fere conclamatissime accersit & meum auxilium imploavit, ego vero renui primum medicationem, parentis tamen precibus demum inductus, bina ipsi suasi auxilia, quorum solo frequenti per octo hebdomades continuo usu divina gratia convaluit, ac non modo ab hemoptysi & omnibus symptomatibus liberatus est, sed & somnum, appetitiam, vires & carnem recepit. Scilicet præter potum ordinarium ex decocto avenaceo cum semine fœniculi, suasi, ut quotidie minimum mensuram decocti temperantis, mane cum tertia parte lactis caprilli & vesperi sine lacte tepide biberet, quod conficiendum ex rasuræ cornu cervi uncis tribus, radicis scorzonerae uncis duabus, herbae veronicae manipulo, summitatum millefolii, florum papaveris rhœados tantundem, cornu cervi usci uncia, coquendo binas harum specierum uncias in tribus aquæ libris. Circa somni autem tempus drachmam sumere jussi ex aqua cerasorum nigrorum hujus pulveris : recipe lapidum cancrium unciam, coralliorum rubrorum præparatorum, matris perlarum, nitri depurati, cascarillæ singulorum drachmas duas, olei de cedro, nucifæ destillati ana guttas sex. M. f. pulvis D.

Epicrisis.

Ex hac morbi historia id utique notandum, hoc sanguineæ excretionis genus, quod per pulmones fit, si primis annis infestat & conquiscit dein per aliquot annos, postea ex facili, nimio corporis, vel animi motu, maximeque vociferatione & intentione sermonis excitari posse. In ejusmodi autem debilibus & ad spasticas turbulentas solidorum ac fluidorum motiones pronis corporibus, plus utique va-

valent simplicia ac temperata dome-
stica quasi auxilia continuato usu ,
quam validiora chymica , concisa
dosidanda , ipsa etiam pharmaceuti-
ca artificiosa & sic dicta pectoralia .
Illa enim agunt mitissime , nec adeo
moleste afficiunt sensiles nerveas par-
tes , simul blande acrimoniam diluen-
do temperant , humores crassos atte-
nuant , nutritur & sic infirmo corpori
præstant robur . Et quoniam non
frigida , sed calida sumuntur decocta
hæc domestica , id præterea ferunt uti-
litatis , ut sanguinis motum ab inter-
ioribus ad exteriora ipsumque cutis
emunctorium dirigant . Pulvis autem
ille absorbens nitrosus temperat aci-
dam & biliosam acrimoniam , quæ in prima corporis regione hospitans ,
occasionalē materialem plerumque
causam præbet , stimulando & irri-
tando nervosas corporis partes , irreg-
ulari sanguinis motui inducendo .

OBSERVATIO V.

*Hemo-
pyxis ,
hysterico-
cachecti-
ca letba-
tis .*

Generosa virgo triginta sex anno-
rum , sanguineæ complexionis & ani-
mi in hilaritatem proni , per quatuor-
decim & ultra annos inordinatam in
aula , ratione victus , somni & animi
motuum agens vitam , incidit saepius
in anomalum mensium successum ,
dum illorum fluxus quandoque nimius ,
quandoque parcus , quandoque
plane deficiens erat . Inde male sa-
pius habuit in ventriculi regione , ac de
anxio pressorio dolore , nautea , vomi-
tione , virium collapso oder *Ubelscyn* ,
conquerens , potu aquarum spirituo-
farum , usu elixiorum stomachi-
corum , neque minus frequenti esu
pomorum citreorum , per integras fe-
re quatuor annos hisce symptomati-
bus , succurrere laboravit , sed penitus incassum . Accidente demum gra-
vi diuturno tristitia affectu viribus
orbata , ante anni dimidium in epi-
lepticum incidit insultum , qui idoneis
remediis usurpatis quidem eman-
sit , inflationes tamen circa præcor-

dia , cum sensu anxietatis , eructationibus , conatu ad vomitum , alvi strictura perfiserunt . Postea per qua-
tuor fere mensium spatiū ex toto
mensiles substiterunt , neque ter cele-
brata venæ sectione in pede , neque
moderate sumptis balsamicis & emme-
nagogis revocari potuerunt . Inde fa-
ctum est , ut denuo ex fratria subita
morte superveniente tristitia , non ita
multo post in gravem sanguinis per
pulmonem refectionem incideret , a-
deo , ut aliquot librae intra triduum flo-
ridi & spumosi sanguinis cum tussi &
sereatu ejiceretur . Sanguis ter in pede
missus quidem , sed ex improviso suc-
cessit paroxysmus epilepticus , tam gra-
vis & continuus , ut omni sensuum &
rationis usu extincto , vitam tolleret .

Epicrisis .

Gravis & lethalis hæc hæmoptysis
non ut morbus principalis , sed ut
symptomaticus considerari debet ,
qualis , si cachecticis , spleneticis su-
pervenit , ut plurimum funesta est .
Ego bis in simili casu , facta dissectio-
ne corporis , lienem magnum cor-
rupto sanguine turgidum inveni , va-
saque brevia ventriculi atro sanguine
valde distenta , ipsumque ventricu-
lum nimis expansum . Neque dubium
est , quin in nostra sedes insultuum
epilepticorum , etiam hæmoptyleos ,
in vitiato & corrupto liene ac ventri-
culi ob summam atoniā inflatione
constituta fuerit ; siquidem intercep-
to libero sanguinis per vasculosum
lienī viscus transitu , per consensum
vasorum non modo ventriculus pati-
tur , sed & facile regurgitat sanguis
ad ramos superiores magnæ arteriæ &
versus cordis sinistrum sinum , unde
obice hoc posito , sanguinis impetus
per arteriam pulmonalem in ipsam
substantiam pulmonum vesicularem
increcit , vasa minima a sanguine
nimium dilatantur , tandem rupta
excretionem sanguinis per bronchia
& asperam arterianam efficiunt . Ad hu-
jus mali nec non epileptici genera-
tionem , utique nimius usus acetosifatis
citra .

eitri & aquarum spirituofarum, in-
gens quoque tristitia mensumque de-
fectus plurimum valuerunt. Præterea
nobis documentum hæc historia mor-
bi præberet, quod sanguinis missio
crebrius instituta, neque ad menses
in ordinem redigendos, neque ad hæ-
moptysin fistendam per se efficax &
promptum satis sit remedium, item,
quod spasticae stricturæ ventriculi,
præsertim si lien obstructus fuerit, gra-
via mala, ut hæmoptysin, epilep-
siam, facillime causari possint. Epilep-
sia vero superveniens hæmoptysi,
effato Hippocratis lethalis est, præ-
sertim quando per venæ sectionem
multum sanguinis simul amissum fuit.

OBSERVATIO VI.

Hemo-
ptysis co-
piosa cū
convul-
sionibus
lethalis. Prædictæ generosæ virginis frater
ante sex menses eodem morbo eo-
demque fere modo occubuit. Is ante
duodecim annos a lapsu equi in ter-
ram in sputum incidit sanguineum,
quod tamen sanatum. Jam erat æta-
tis 30. & aliquot annorum, staturæ
macilentaæ, tristioris animi, faciei
pallidae; & conquerebatur sæpius de
anxietatibus & pressionibus præcordi-
orum sub costis spuriis, præsertim
sinistri lateris, cum ardore ventriculi
impenso. Passionum harum origi-
nem rejecit in potum frigidum forsan
calenti, post venationem, cui deditus
erat, corpori ingestum. Accidente
postea conjugio & insigni animi tri-
stis affectione valde est debilitatus, in
festivitate vero quadam aulae solen-
ni, præter morem & consuetudinem
corpus vehementer saltatione exer-
cuit, quo factum est, ut elapsi circiter
14. diebus, anxietatem & con-
strictivum senserit circa præcordia do-
lorem, cum vomendi conatu, postea
ex improviso sequuta vehemens ad-
modum sanguinis per pulmones eje-
ctio cum suffocationis metu, sequutæ
simul brevi convulsiones epilepticae
fatis fortes, quæ intra biduum vitam
abstulerunt.

Epicrisis.

Viscera abdominis sanguinea, ut
hepar, lien, si insolite magnitudi-
nis sunt sanguine & humore infarcta
& obstructa, dum æquabilem san-
guinis circulum, obice quasi positum,
impedit, ad immodicas & subinde
exitiales sanguinis tam per vomitum
& secessum, quam per vasculosam
pulmonis substantiam profusiones,
disponunt. Quia vero tanto impetu
& copia erupit e pulmonibus sanguis,
nullum dubium est, quin ipso in pul-
mone jam vitiosa quedam adfuerit
dispositio, quæ & Hippocratis &
nostra sententia in eo consistit, quod
rami arteriæ pulmonalis, dispersi per
vesicularē & celulosa substantiam,
nimium distenti in tenera an-
evrismata diducantur, qua tandem
rupta tantam sanguinis copiam fun-
dunt, ut hærens in trachæa metum
injiciat suffocationis. Venam vero
secare in tali paroxysmo, subtrahen-
do plus sanguinis adhuc magis nocet,
quam prodest, & ad movendam ma-
gis epilepticam convulsionem, quam
ad eam minuendam, confert.

OBSERVATIO VII.

Theologæ Studiosus, vigesimum *Hemo-*
quartum ætatis annum agens, Pome-
ptysis
ranus robustus, biennio abhinc febre
correptus est autumnali, tum epide-
micæ, post quam insequentis anni
mense Februario, sub ascensi scalari-
rum calidam ebullitionem & fluctua-
tionem in sinistro thoracis latere sub
mammilla persensit, quam exceptit
tussis cum spirandi angustia ac de-
num sanguinis screatu evacuatio,
intra duas horas, ad uncias aliquot.
Quam ut compesceret, ingessit lar-
gam pulveris antispasmodici dosin, ad
unam & dimidiam circiter drachmam
eo cum effectu, ut sanguis subsisteret
& ipse per annum valetudine sic satis
commoda frui videretur. Sed anni
subsequentis vere redit sanguinis
screatus, ac primo crux pituita re-
mixtus

mixtus, dein noctu sanguis sincerus ad duas libras tussi exturbatus est. Aperta vena, hæmoptysis paulisper siluit, mox autem recruduit, ac per quinque dies, duodecies intra diem & noctem accedens, duravit, tandem tamen usu pulverum nitroforum cohibita, per tres hebdomades dedit inducias. Quibus exactis 13. Januarii die noctu redit, & ex eo ad sextum usque Maji diem, singulis veneris diebus periodicum quasi servavit accessum. Ingesta interea pulverum tantum non moles, hæmoptysin cohibuit, sed successit mane ingens sputi viscidi flavelcentis rejectio. Initiante vero autumno iterum apparuit in sputo sanguis, ac misto fere ad libram in pede sanguine datisque nitrofis pulveribus, rursus disparuit. Januario sequenti anni redit hæmoptysis, eodem modo sedata. Martio repetit jisdemque remedii iterum est depulsa, copiosa autem sputi viscidi rejectio mansit, ac præterea in hypochondrio sinistro sub spuriis e regione ventriculi costis, intolerabiles succelserunt dolores pungitivi & spastici, qui in hunc usque diem affligunt. Id vero memorandum, sanguinis expunctionem semper præcessisse cutis horripilationem, manuumque refrigerationem, cum pungitivo in latere sinistro sensu, phlogosi caput & faciem occupante, nec non rustibus. Ut igitur tam screatum matutinum tolleret, quam etiam mali recursum antevertet, accessit æger ad me. Et quum vires non adeo ex haustæ, appetitus etiam adhuc constaret, sub spe successus felicis suauum elixirii balsamici temperati, item mixtura ex liquore anodyno minerali, tintura tartari & spiritu bezoardico Bussia constantem, laxantia ex rhabarbaro, terra foliata tartari & nitro, loco potus decoctum ex cornu cervi raspato, radice scorzonerae, chinæ, semine foeniculi ac passulis, nec non infusum theiforme, ex scolopendrio, melissa, polygono, veronica, scordio, mil-

lefolio, salvia, cum radice glycyrrhyza & semine foeniculi.

Epicrisis.

Cruenta hæc tussis orta fuit post febrem intermittentem, qua non modo diurna, sed & forsan non adeo dextre percurata, vitium reliquit in lienis, aut hepatis viscere. Id quod haud obscure arguit paroxysmi accessus, quem semper cum lateris sinistri dolore & exin propagata quasi fluctuatione, & calida ebullitione inspectus cum phlogosi factum esse, æger alleveravit. Fere semper autem spastica tam exteriorum, quam internarum partium constrictio hæmoptysin præcedit, qua impedito sanguinis ad externa & libero progressu, ipse in interioribus & majoribus vasis uberiori copia colligitur, accumulatur atque congeritur, unde vasa nimium distenduntur, tandemque dehiscunt ac sanguinem effundunt. Quoad medicationem dein tenendum, medicamenta ex nitro & absorbentibus, item venæ sectionem, egregio utique esse præsidio, ad derivandum ac intercipiendum impetuosum sanguinis ad pectus affluxum, ad cohendam hemorrhagiam atque etiam præscindendum novum insultum. Interim minime morbo tollendo penitus sufficit instantum instituta curatio, sed temporarium modo præstat levamen ac ceu cura palliativa consideranda. Etenim sanguinis missio in talo instituta liberalius, minuit omnino plenioram & sanguinis impetum aspectore ad inferiora revellit, sed si jam obstructio in vase aut viscere, haud raro sit, ut elangescente inde pulsu, expediri nequeat is qui impactus hæret sanguis, & effectus sic subsequatur pravus. Nitrola-utilissima, quia intestinum nimium particularum sulphurearum orgasticum motum componunt, & relaxando amulcendo strictas nerveas partes, spasmis occurunt. Ast non sufficit

refrenasse impetum & excretionem, sed eo potissimum medicatio dirigen-
da, ut tollatur fundamentum mali, obstructa viscera, hepar maxime &
lien, expediantur, dolores hypochondriorum depulsentur atque etiam pos-
tea relaxati nimium pori ac distenta vasorum orificia in pulmonibus ad
naturalem habitudinem reducantur & roborentur, ne ibi stant stagnatio-
nes, quibus tam copiosius screatus, quam etiam effluxus sanguinolenti re-
cursus, merito tribuendus. Hunc igitur in scopum data a me remedia mem-
orata, quibus a prioribus medicis omis-
tis, spes jam haud vana est melio-
ris effectus. Novi quoque in curato
sic hæmoptyo morbo ad arcendum
phthisicum malum, egregie profusse
lac cum Selteranis acidulis, vel etiam
aqua calcis remixtum, & perite dex-
treque usurpatum.

OBSERVATIO VIII.

*Hæmo-
pty-
sis.
sim-
plex,*

Plethoricus vir quadragenarius, cor-
pore spongiosus, ingenio fœcundo &
ameeno, laute vivens, omissa pri-
mum sanguinis missione, vernali sem-
per & autumnali tempore expertus est
hæmorrhoidalis fluxus indicia ac cum
fæcibus quippiam sanguinis excrevit.
Hinc ad minuendam plethoram vere
& autumno venam incidi passus est
cum euphoria, sed quum æquinoctio
vernali omisisset forte suetam sanguini-
nis missionem, post vehementiorem
corporis motum & liberaliorem vini
Rhenani potum, incurrit hæmopty-
sis & cum tussi aliquoties sanguinem
spumosum & floridum rejecit. Ad-
misit igitur sanguinis e tali vena sub-
tractionem largam, ac pulverem
præcipitatem nitrosum cum liquo-
re anodyno minerali sumvit, quibus
sanguinis expulsiō constitit ac infuso
dein veronicæ, melissæ, pulmona-
riæ, saniculæ, cum semine sceniculii
& licti ita convaluit, ut nec amplius
hæmoptysis redierit, neque etiam
quicquam incommodi reliquerit.

Epicrisis.

Simplex recte dicenda hæ-
moptysis. Quæ enim sic ex sola sanguini-
nis plenitudine & suppressa solenni
ejusdem, vel spontanea per menses
& hæmorrhoides, vel artificiali ex
incisa vena, evacuatione, sine labe
visceris cuiusdam, sine cacochemica
etiam humorum dispositione, obori-
tur, pallidrone quasi ad pulmones
facta, periculo vacat, si cito succur-
ritur. Sed tunc maxime juvat venæ
sectio, quæ sanguinem copiosum non
modo demit, sed & a parte affecta
efficaciter revellit impetum. Juvant
vero etiam ea remedia, quæ organ-
um sanguinis contemperant, nitro-
sa, latis serum, nec non aquæ fri-
gidæ perite admisitus potus, cum iis,
quæ stagnantem in pectori sanguinem
relolvunt ac ne putrefascat ibi efficiunt;
quibus demum subjugenda pectora-
lia & remissum pulmonum tonum
firmantia. Hac methodo ego com-
plures plethoricos, maxime juvenes,
ex corporis exæstuarione hæmoptysi
affectos, facili & explicita curatio-
ne ad sanitatem reduxi. Sed si differ-
tur medicatio, neque adhibentur re-
media sanguinem in pulmones effu-
sum dissolventia, & disrupta vasa
consolidantia, purulenta gignitur ma-
teria, ipsaque phthisis.

OBSERVATIO IX.

Vir literatissimus, quinquagena-
rio major, cujus fata ob merita illu-
stria adhuc luget nostra hæc academ-
ia, nunquam antea hæmoptycus
aut phthisicus, vitæ maxime seden-
tarie adductus, quum studiis intem-
perantius aliquamdiu invigilasset ac
præterea animo sepe multumque ira-
ac solicitudine fuisse commotus, ne-
glecta sanguinis per venam subtra-
ctione, corpus exagitavit valide &
extuans adhuc frigidum ingessit hau-
stum liberalem. Quo illico sensit vi-
rium corporisque languorem, & quum
voce elata doceret auditores, incidit
*Hæmo-
pty-
sis ext-
labe vi-
serum
funesta..*

in hæmoptysin, eaque successive rejicit aliquoties uncias aliquot. Ipse autem periculi ex hoc malo probegnarus, gravi inde mortis percussus est metu, quo vires conciderunt penitus; erectus tamen paullisper animo melius habere cœpit, sed variis usus medicamentis, aqua frigida, sero lactis cum vino cocto, nitrosis, pectoralibus aliisque pluribus, parciorem quidem habuit sanguinis excretionem, tussis autem cum raucedine restitut, appetentia periit, somnus absuit, vires indies magis collapsæ, caro consumta, & febris glicere cœpit, ex pulsu celeri cum æstu cognoscenda, qua succi roscidi prorsus absunt, & mente ad ultima usque alacri, mors exceptit insperata, licet nec pus, neque etiam sputum copiosum antecessisset.

Epicrisis.

Mortis causa principalis in erudito hoc viro neutiquam fuit sanguinis exsputio, sed procul dubio tabescentia ac corruptio nobilioris cujusdam visceris, pulmonis, vel forte lienis. Hanc enim corruptivam labem semper fere prodit appetitus viriumque prostratio enormis, quæ, si in viscere stomacho propinquo, omnem ipsius appetentem & digerentem vim pefundat. Causa vero fatalis hujus morbi, nimiis curis, labori erudito impensiore, ac potui frigido, corpori calenti ingestu, tribuenda videtur, quo sanguis & omnes corporis succi labi infecti, & in progressu impediti, stagnarunt, ac putrescentes, funestam induxerunt catastrophen.

OBSERVATIO X.

Hæmoptysis phthisica cum hepatica. Locum tenens generosus, viginti quatuor annorum, sanguineo cholestericus, corporis constitutione debilis, & ab ineunte ætate morbis, præser-tim acutis, crebro afflictus, decimo quarto ætatis anno, ex terrore sub somno, incidit in grave delirium periodicum, quod per biennium fere

persistit, ac tandem iterata sapientis alternis diebus sanguinis missione est abactum. Ex eo natura ita venæ selectioni assuefacta, ut quotannis minimum ter vel quater eandem admittere cogeretur, simul pectori inducta morbida ejusmodi dispositio, ut sapientis ex eo laboraret, & pleuritide vera, nec non vehementi spasmatica angustante strictura subinde afficeretur. Quin, quem ipsi ex collato interea militari officio iter longinquum sub frigido & humido celo faciendi necessitas imponeretur, illico post redditum correptus est tussi vehementi, qua subinde non nihil sanguinis floridi ejecit, & post octiduum, admisso adhuc dioretico delicto, successit ipsa hæmoptysis larga, intra quadratum minimum duas sanguinis spumosi rubicundi libras evehens. Licet autem exhibitis remediis sanguinis screatus remitteret, remansit tamen tussis molesta, pectoris gravitas, spiratio difficilis & nocturnus sudor admodum infirmans. Tussis per totum morbi decursum valida admodum erat, plus sicca quam humida, paucam quidem materiam flavescentem evehens, sed quia dies noctesque vires & corpus nullis cedens remediis convellebat, nihil boni præfigiebat. Nihil vero magis affixit egrorantem, ac dirus & intolerandus fere sub osse humeri sinistri consistens dolor pungitivus & tensivus, qui per vices totum pectus ipsamo adeo constringebat, ut omnem fere respirationem ad suffocationem usque tolleret. Quin dolor hic postea se extendit ad regionem lumbarem, sub tussi semper vehementior, adeo, ut æger vix per clavæ pedibus incedere posset. Vespere & maxime post cenam, frigus cum horripilatione quadam extrema occupabat, quod non vehemens æstus, sed effusus per noctem sudor sequebatur, cum pulsu duro & frequenti, urina rubicunda, cum copioso albo sedimento. Lateri sinistro ægre in-cumbere potuit, ac validior semper inf-

in sequuta tussis. Ceterum tot passionibus indies vires cum carne consumebantur, ac præterea phlogosæ interdum cum dolore & fudore in fronte caput occupabant, ac licet medicus nihil omitteret, tam ex diæteticis, quam pharmaceuticis remedii, quod curationi hujus affectus, vel mitigationi symptomatum idoneum, omnia tamen erant frustranea. Demum meum etiam exquisitum ante duos menses consilium, qui pariter tristem exitum ominatus, nil nisi usum seri lactis dulcis commendavi. Invalecente itaque hectica febre & perseverantibus spasmis ac doloribus in dorso acerbissimis, æger in delirium tribus ante obitum hebdomadibus incidit, & sic etiam rationis usu privatus obiit. Facta ex decubentis voluntate post mortem sectione, tota pulmonum substantia, præsertim vero lobi sinistri, scirrhosa, multis volumicis, pure crasso, glutinolo refertis, plena, fuit inventa, ac præterea in arteria pulmonali polypus instar minimi digiti longus & latus. Ipse pulmo non tantum cum pleura, sed & cum pericardio & diaphragmate tam firmiter concretus & quasi conglutinatus erat, ut vix commode cultro separari potuerit. Tam pertinacis vero & molestissimi in regione lumbari doloris causa nulla alia reperta fuit, quam quod ob firmam cohesionem pulmonis cum diaphragmate, sub vehementi & peccus concutiente tussi, processus & tendines diaphragmati lumborum vertebris annexi nimis vehemente tensi ac distorti.

Epicrisis.

Hæc morbi historia paulo curatius inspecta, haud exigua in usum theoriz & præxeos medicæ præbet argumenta. Scilicet innotescit: quod delirium decimo quarto ætatis anno per duos fere annos integros durans, crebrius & fere alternis diebus repetita venę sectione quidem conquieverit, sed quod eo natura ita affuefacta eidem quin debilitata fuerit, ut ter,

vel quater singulis annis, sanguinem mittere fuerit coactus, neque tamen sub tanta sanguinis imminutione, a rheumatismis in pectore & pleuritide cum febre, congestionibus etiam sanguinis ad partes superiores, potuerit liberari. Deinde id quoque in usum medicum cedere potest, quod post morbum pleuriticum, quum debiles adhuc sunt pulmones, nihil sit deterius, ac corpus diu atmosphæræ frigidae & humidæ exponere, & quod hoc modo hæmoptysis ac phthisis, magna pulmonibus labo & obstructione inducta, ingenerari possit. Deterior porro semper est post hæmoptysin tussis secca & vehemens, quam humida purulenta & copiosa, quam ego aliquoties in juvenibus sanavi lacte incoeto cum speciebus vulnerariis, usurpato balsamo pectorali Meibomii & ordinario seri lactis potu. Præterea patet: quod dolor in lumbis fixus & intolerabilis a tensione nimia processuum diaphragmatis oriri possit, id quod etiam in Principe juvēne Cizenfi, ante viginti aliquot annos hic mortuo, a copia extravasati puris processus diaphragmati comprimentis, observatum. Tandem notabile est, quod delirium in febre hectica & phthisi supervenire possit in corpore disposito.

OBSERVATIO XI.

Studioſus quinque supra viginti annos habens, constitutionis fatis robustæ, ante anni dimidium a motu & exercitatione corporis vehementiori, sub hyeme frigida incurrit in ejectionem sputi cruenti, ita ut per vires aliquot cochlearia exscrearet. Administrata in talo sanguinis missione sponte cessavit malum, quum vero post aliquot menses, in aere frigido & humido pedibus iter faciens, potu spiritus vini repletus, cum sodali graves moveret rixas, & ira candens, frigidam cerevisiam copiose superberet; ingentem quantitatem sanguinis spumosi tussi excrevit, ut intra diem

diem & noctem libræ minimum quatuor fuerint rejectæ. Conquerebatur autem simul de vehementi incendio circa præcordia & pectus, partibus externis penitus refrigeratis; aderat continua sitis, pulsus durus & vehemens, nullus somnus, & quando sanguinem non expuebat, miram quantitatem pituitæ viscidæ ore rejiciebat. Nihil levaminis a secta vena, ab usu seri lactis, a pediluvii, a lacte amygdalato cum nitro mixto, nec ab aliis medicamentis inflammationi resistenteribus expertus est, sed potius ab omnibus ingestis major oborta est anxietas & dolor, donec tandem persistenteribus symptomatibus & fatiscentibus omnibus viribus, decimo quarto ab invasione morbi die, periret.

Epicrisis.

Videmus ex hac morbi historia, quomodo & a quibus causis simul concurrentibus, in homine plethorico & qui jam tum levem hæmoptysin expertus est, gravis hæmoptysis una cum inflammatione ventriculi lethali progigni possit. Nam atmosphæra frigido-humida existente, fortior motus, prout copiosus spiritus vini, ira, vociferatio, in homine plethorico sanguinem tantam ebullitionem, orgaſmum, congestionem & impetum a partibus exterioribus ad interiora urgere & pelere valet, ut ruptis vasis pulmonalibus, hæmorrhagia periculosa, ventriculi vero a potu ingestu frigido inflammatio, nullis levanda auxiliis, accedit. Post excretionem autem cruentam magna phlegmati ejactio successit in nostro, propter majorem humorum ad pectos affluxum, & ni-miam membranæ in bronchiis glandulosæ relaxationem.

OBSERVATIO XII.

*Hemoptysis per-
storalis rheuma-
tica.* Fœmina generosi stemmatis valde teneri corporis animique mobilioris, annorum quinquaginta, per decem fere annos menstrua caruit purgatio-

Hoffm. System, T. IV. P. II.

ne, & hinc etiam subinde flatulentis, præcordiorum anxietatibus, animi perturbationibus, phlogosibus cum strictiore alvo junctis, a longo tempore fuit obnoxia. Ante annum & quod excedit, circa os sacrum & in imo ventre dolorem pressorum cum ardore & pruritu ani persensit, & paucis diebus elapsis, portionem sanguinis secessisse per alvum, quem eam depositisset observavit, idque aliquoties. Sed ab hoc tempore protinus omnis evanuit dolor & imi ventris molestia, brevitatem post cum ab dominis ventris alvique stricture percepit dolorem pungitivum in sinistro thoracis latere, cum titillatione in epiglottide tuſique valida & sicca, qua demum aliquot sanguinis floridi & coccineo tincti colore extrusit per intervalla cochlaria, & sic iterum cunctæ molestiæ remiserunt. Quum vero talem accessionem per quatuor menses circa plenilunii tempus, cum iisdem antecedentibus symptomatibus simili etiam eventu & solutione mali, generofissima foemina experiretur, metu majoris periculi postulavit meum consilium. Ego igitur tres ante accessionis hactenus consuetum tempus dies venam tali tundendam curavi, & minimum ut tres vel quatuor sanguinis unciae emitterentur jussi, pulverem etiam rhabarbari cum lapidibus cancrorum & nitro bis in septimana cum haustu aquæ frigidae circa lecti introitum, & infusum theiforme mane sumendum suasi, quorum remediorum ope ab omni accessione hæmoptyleos postea libera permanxit.

Epicrisis.

Rectius hæc hæmoptysis pectoralis rheumatica appellari potest, quæ ex palindrome, sive translatione sanguinis affectantis exitum per venas hemorrhoidales ad pectus, ubi etiam in musculis thoracis pleuritidem speriam intentavit, fuit profecta, & soluta per operationem valorum sanguineorum, quæ

G in-

interius bronchiorum tunicas investiunt. Tenuis enim, floridus, & spumosus sanguis rarius immediate ex pulmonum substantia, frequentius ex bronchiis & aspera arteria vasis sanguinis venit. Quum autem vena sectio validum sit sanguinem a partibus superioribus ad inferiores revellens medium, non sine levamine circa tempus accessionis instituta fuit.

Plures memorabiles observationes legas in *Consult. Medic. Tom. I. Sect. 2. cas. 69. 73.*

C A P U T III.

De vomitu cruento sine, & cum secessu Nigro, sive morbo nigro Hippocratis.

Theses Pathologicae.

§. I.

Vomitus cruentur quid? **S**icut in hæmoptysi sanguis subinde spumosus, tenuis & floridus cum tussi ejicitur; ita ex ventriculo crux concretus, ex atro-rufescente colore tinctus, multo cum phlegmate insipido, acido, aut viscido mixtus, per vomitum exturbatur.

§. II.

Eius symptoma & signa. Antecedit hunc sanguinis vomitum ut plurimum punctoriis, & tensivis hypochondrii sinistri dolor, & ipsa eruptio nunquam fere non cum praecordiorum anxietate & dolore compressorio, nec non constrictione in hoc latere jungitur; atque etiam nulum sanguinis profluvium tam facile ac saepè lipothymiam habet comitem, quam hoc, præsertim, quando crux graveolens, corruptus exit.

§. III.

Sedes in ventriculo & liene. Sedes morbi & scaturigo unde sanguis venit, est in ventriculo, ita tamen, ut in consortiu[m] mali, ceu sedes causæ morbi, veniat & ipse liene. Id enim aperte monstrant sectiones cadaverum hoc morbo defunctorum. De liene quidem, quod is semper fere sanguine tumidus, infarctus &

quandoque plane induratus deprehendatur. De ventriculo autem, qui copiosis ubique vasis distinctus est, quod brevia potissimum sic dicta arteriosa & venosa, quæ in superna & sinistra tenuiori parte excurrunt, ibique admodum tenera membrana teguntur, si aperiuntur, vel disrumpuntur, sanguinem qui vomitu ejicitur, fundant & fuderint, eaque propter varicosa & nigro sanguine distenta deprehendantur, corrupta simul ibi ipsius ventriculi substantia. Sic *Riolanus anthropolog. Lib. 2. Cap. 17.* vas breve minimo digito latum deprehendit in refectione sanguinis per superiora & inferiora. Idem testatur *Columbus rerum anatom. Lib. 15.* de Cardinali Cibo, nec non *Wedelius in Physiolog. reformat.* *Platerus Obser. Lib. 2.* & *Bonetus medicin. septentrion. Lib. 3. Sect. 5. Cap. 4.*

§. IV.

Interim non adeo videtur improba. *Non solum* licet rarius contingat, quod ex *per ex brevibus* aliis etiam stomachi vasis, si a succis acido-corrosivis, vel etiam a venenis, fuerint erosa, vomitus cruentus succedit. Quod tanto magis factum fuisse concludendum, si dolor stomachi præcessit acutus, atque materia, quæ vomitu rejicitur cruenta, nigra simul est & acida, dentes stupefacit, fauces ac os adurit, & pavimento injecta ebullit, qualem descriptionem *Hippocrates Lib. 2. de morbis §. 71.* tradit.

§. V.

Jam sicuti corpora graciliora & teneriora omnium facillime hæmorrhagias, quæ fiunt in partibus internis, possunt incurrit; ita etiam idem fieri in ea, quæ succedit in ventriculo, testatur experientia, præsertim si subjecta sensibilioris & mobilioris simul sunt animi. Ejusmodi enim corpora vasa ut plurimum gerunt subtiliora & quo ad substantiam teneriora, quæ & facile distensionem & rupturam, atque hinc sanguinis effusionem, admittunt.

§. VI.

§. VI.

In primis frequens malemb- stratis. Potissimum atroci huic malo obser- vantur obnoxiae femellæ, in primis quæ alvi sunt adstrictioris, puber- tatis tempore, quo menses primo im- minent, nec non quando postea sup- pressi sunt, aut parcius succedunt. Tum enim, quando gravi ira, vel terrore commoventur, & inferiorum partium accedit refrigeratio, vel etiam medicus pathemata a regurgitante ab utero ad stomachum sanguine orta per emesin excitatam perperam tollere contendit, per quam facile sanguinis eructatio procuratur.

§. VII.

Post in- temnit- tentes male cu- ratas. Pari ratione post intermittentem perversa methodo a medico tracta- tam & justo citius cohabitam, in te- nerioris texturæ foeminas novi substi- tisse menses. Quos si postea validis & calidis emmenagogis iterum emovere ausus fuit morbi artifex, enormem & lethalem cruentam vomitionem suc- cessisse bis observavi.

§. VIII.

Mensibus emanen- tibus. Annosiores quoque foeminas, desifi- nente mensium fluxu, graviori & diuturniori mœrore confectas, de do- loribus pressoriis in sinistro hypochon- drio, cum inappetentia & virium debilitate, diu conqueftas notavi; quibus tandem subito impetuosa san- guinis per vomitum mortifera eru- tio accidit.

§. IX.

Gravidis plecho- nictis. Neque minus gravidas, si sanguine nimis redundant, ejusdemque missionem intermittunt, cruento vomitu tentari in experientia est fundatum; præsertim, quando circa medium gestationis tempus stomachus ipsis crebrius fuit subver- sus. Quia tamen is, quem vomitu rejiciunt sanguis, parcus est ac te- nuis, magis videtur verosimile, eundem ex arteriolarum in œphago & faucium furculis, non vero ex ipsis stomachi vasis venire, ea- que propter minus periculi alere.

§. X.

Contra ea capitale sanguinis obser- vavi cum vomitu profluvium, in fo- minis, quæ partu difficultimo ex pra- vo foetus situ laborarunt, & immen- sam sanguinis molem cum vita eru- starunt. Vidi tamen etiam, vomi- tionem cruentam in parturientibus non funestam; sed in his parcius seces- sit sanguinis quantitas & puerpera admodum fuerunt plethoricæ, ac ul- timis temporibus venæ sectio male- fuit intermissa.

§. XI.

In virili etiam sexu occurrunt sub- *Hemor- rhoida- riss vi- ris.* inde valetudinarii & hæmorrhoidarii, qui succedente parcius, vel cessante penitus hæmorrhoidalí fluxu, de præcordiorum anxietatibus, constri- ctionibus cardialgicis, cum sudore frigido, alternante calore & frigore, conqueruntur. Quibus, si tandem evacuatio sanguinis fœcuenta & ca- daverolens per superiora & inferiora accidit, recurrente aliquoties paroxysmo, brevi post sub animi defec- tione ipsi perire solent.

§. XII.

Minoris periculi fuit ille cruen- *Ex aeris- vito nō adeo pe- riculo- sus.* tus vomitus, quem superiori anno Septembri mense Martisburgi fre- quenter observavi. Litteret enim cruar bruno-nigricans, ad aliquot mensu- ras, in plebejis maxime foeminas ac viris, eructaretur, præter virium debitatem, vita tamen fuit super- stites. Quin, eodem tempore, occur- rerunt in plæthoricis maxime hæmo- ptyses, quæ pariter sine singulari ar- tificio iterum discesserunt. Circa æ- quinoctiale enim tunc tempus, ob- subitas & multiplices aeris ex calido in frigidum, & ex frigido in calidum vicissitudines, sanguinis æ- qualis ac liber circulus turbatur, ut hic, maxime ubi redundat, ad hanc vel illam partem cum impe- tu ruat & ubi exitum invenit, perrumpat, effuso autem nimio, iterum cesseret.

§. XIII.

Ab infi-
ma-
ventri-
cult di-
sanguen-
dus. De ipsius morbi decursu porro temendum, spasticum illum & gravatum ventriculi dolorem, ut plurimum cum ardore sanguinis vomitui jungitur, non pro stomachi inflammatione esse habendum. Inflammatio enim nunquam non extremonum frigore, vehementi circa praecordia astu, siti, febre, pulsu contracto, debili & celeri stipatur, quæ tamen in cruento vomitu non sic adsunt. Neque ventriculus inflamatus ferre potest calidum potum, nec non exteriorius applicationem regularum calidarium, vel calidorum pannorum, quæ tamen vomitu cruento laborantes eximie solantur.

§. XIV.

Facile
recidi-
uat. Sicut autem omnes haemorrhagiae facile recrudescent & post hebdomadem non modo, sed mensium etiam, quin annorum decursum, revertuntur; sic etiam idem in hac ventriculi haemorrhagia accedit. Nam quia per effusionem partibus inducitur debilitas, minus postea resistere possunt sanguini copiosius & validius affluent, sed is pristinas servat vias; subsistit ibi tandemque etiam erumpit. Quin ea quandoque observatur naturæ quasi consuetudo, ut locum pristinum exacte repeatat, & maxime in narium haemorrhagia, ex nare illius lateris, quo primum successit, postea semper fere succedere soleat sanguinis stillicidium.

§. XV.

Quæ ma-
gis, que
minus
pericu-
lo-
sa. Periculum quidem, quod morbus hic inducit, non in omnibus idem, id vero certum, vix ullam haemorrhagiam periculosiore esse hac. Interim non tantum discriminis subest, si febris abest, si a suppressis evacuacionibus ex plethora oriundis ortus. Contra ea, si febris jungitur, si sanguis corruptus, graveolens & niger prodit, si ex magno & corrupto liene, vel indurato hepate proficiscitur, animique tandem jungitur defectio, sumum adest periculum & mortem pro-

ximam jam portendit. Hippocr. apb.
37. Sect. 6. nec non in prognosticis.

§. XVI.

Longe gravius longeque certius est *Periculum* perieulum, si, uti subinde accidit, *vomiti* cruento, nigra & pici similis *caque* graveolens alvi dejectio jungitor. Hæc enim subitum ut plurimum denunciat interitum, ipsius *Hippocratis* testimonio, qui sub morbi nigri nomine hanc passionem describit.

§. XVII.

Proficiscitur cruenta hæc, tam per *inferius*, quam per *superius* os ejus, non immediate *ex ventriculi* *vasis*, nec a sanguine in stomachi *cavum* extravasato, sed potius *ex alio viscere*, vel intestinis tenuibus, maximeque ileo, & ruptis in ipso mesentericis, quæ tenuissima testa sunt tunica, vasis. Hæc enim in defunctis sepe adhuc nigro sanguine valde distenta deprehendi, simulque totum ventriculum cruenta ejusmodi materia refertum.

§. XVIII.

Qui autem funetis ejusmodi nigris *hemorhoidiis* *hypochondriacis* *mesentericis* *freq*. *alvi* dejectionibus, cum vel sine vomitu cruento, afficiuntur, vel hypochondriaci sunt, aut *hemorhoidarii*; in quibus sanguinis cursus per mesenterica vasa non recte, sed impeditius succedit, unde dolorificæ vasorum sub membranis excurrentium distensiones, spasmi, congestiones & tandem effusiones perniciose sequuntur. Quibus optime distinguuntur. Quibus fluxu sanguinis *hemorhoidali*, qui licet interdum etiam subnigricans sit; nequitam tamen tam immenso dolore intestinorum spasmatico stipatur, neque etiam praesentem interitum, sed potius magnum levamen, afferit.

§. XIX.

Materia illa nigricans, quæ sic per alvum exit, solet esse foetidissima, quia sanguis effusus, cum sterquilinibus in cavo intestinorum quasi fermentatus, exaltato principio res viscosæ sulphureo alcalino, in foetidissimam abicit.

abit putrilaginem. Quæ quia infensissima fluidi nervorum naturæ, hinc mox cito vires deprimit & vitales in corpore motus destruit. Atque adeo summa, quæ fere morbo huic perpetuo jungitur virium dejectio, non adeo ex nimia sanguinis profusione ejusque natura, sed potius ex ipsius corruptione putrida est derivanda.

Theses Therapeuticæ cum Cautelis Clinicis.

§. I.

*Medico-
tio causis
acom-
modanda.* In hujus tam horrendi & gravis morbi curatione Medicus utique pro diversitate corporum, causarum & temporis, prudenter & circumspete lese gerere debet. Etenim alia medendi ratio est in paroxysmo, alia extra eundem; alia, ubi a sola sanguinis abundantia & orgasmo malum suscitatur atque excretio quasi critica est, alia, quando a doloribus & spasmis sanguinem ad interiora urgentibus oritur; rursus vero alia, quando a corrupto aut obstruто vīcere, aut a causa externa, veneno vel corrosiva materia, morbus inducitur.

§. II.

*In paro-
xyjmove-
na secan-
da ple-
shorticis.* Ipso in paroxysmo, si corpus est plēthoricum, ipseque sanguinis motus ab exterioribus ad interiora præter naturam conversus est, commōdissimum locum habet vena testio in brachio. Tenendum vero est, sanguinis mensuram missionisque repetitionem a perito & circumsperto Medico pro corporis, vasorum repletionis, virium & ætatis ratione, esse præcipiendam.

§. III.

*Sanguine-
stuant
profund
refrigi-
rantes
possum.* Quādūcunque sanguis nimium æ- & pulsus impetuolus ac validus est, aquæ fontanæ, vel plantaginis potus, in cuius libra nitri puri drachma & syrapi papaveris rhœados uncia dimidia soluta, successive & temperate

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

sumtus, egregie conducit. Refrigera- rans enim hæc potio temperat simul humorum acrimoniam, elasticam partium sulphurearum exæstuationem intra vasa componit, & relaxata vasculorum apertorum orificia ita firmat & roborat, ut postea eo facilius coeant iterumque coalescant.

§. IV.

Porro nunquam non egregiam opem præstant emulsiones, imprimis quando præcordialis regio, circa sinistrum potissimum latus, pungitivis & vellicatoriis doloribus spasticisque stricturis affligitur ac sitis cum astu urget. Possunt autem confici ex seminibus quatuor frigidis & papaveris albi, cum aquis antispasmodicis, florum tiliæ, litorum convallium, primula veris, acacia papaveris, rhœados, pœoniae, cerasorum nigrorum, admixto nitri momento & convenienti- ti syrapi papaveri albi quantitate.

§. V.

Præterea ad laxandas spasticas intestinorum stricturas & divertendum impetuolum humorum ad partem affectam affluxum, desideratum subinde levamen afferunt clysteres emollientes ac demulcentes, stimulo tamen quodam leniori armati, nitro conditi & frequentius injecti.

§. VI.

Neque minus inter externa hujus mali remedia connumeranda ea, quæ spasmo sistendo, ventriculum roborando, nec non discutiendo, virtutem suam exferunt. Hoc nomine ego nihil præstantius deprehendi ipso oleo camphoræ, quod paratur, si drachma una camphora solvit in uncia una olei amygdalarum dulcium & postea viginti guttae olei ligni Rhodiū instillantur. Inungitur hoc oleo tota præcordialis regio cum toto hypo- chondrio sinistro, & postea sacculus, cui species ex floribus chamomillæ Romanæ, sambuci, herba menthae & absynthii inditæ, in aceto rosa- ceo, vel vino rubro coctus, subcalide applicatur.

C 3

§. VII.

§. VII.

Ligatura item, & lavatio- Quod si jam enormis cruentis copia profusa cum summa virium iactura , *nes ma-* injicienda sunt ad compescendum ni- num per medium fluxum artuum ligaturæ , quæ duumque postea uti capite antecedente moni- tum , circumspete iterum solven- dæ . Novi etiam non sine successu fuisse consilium , ut manus & pedes ad malleolos usque aquæ immittantur frigidæ , quo frigus sanguinem in mi- nimis vasis diutius detineat , & sic ejusdem ad cor refluxus aliquantis per retardetur.

§. VIII.

Recursus quibus arcundus. Extra paroxysmum ad arcendum mali recursum eximie conductit rhabarbariæ electri pulvis , ad dimidiam drachmam , vel solus , vel cum can- erorum lapidibus , aut duodecim tro- chisorum de carabe granis & dimidio camphoræ grano , bis singulis septem manis , ante lecti introitum , cum hau- stu aquæ fontanæ sumtus . Est enim rhabarbarum quasi specificum ad re- serandas paullatim obstrunctiones . Egregia quoque virtus est infusi thei- formis ex herba veronica , centum- nodii , summitatibus millefolij , radice glycyrrhizæ & semine foeniculi , ad aliquot patellas quotidie poti . Potui ordinario infervit commode aqua fon- tana pura & levis , in qua ferrum ex- tinctum , vel etiam serum lactis aci- dulatum .

§. IX.

Sex me- fluis suppres- sis quo- Peculiaris ratione huic malo occur- rendum , si ex menstruis suppressis , vel obstructis oritur . Tum scilicet facienda , vena secunda est in pede , & præterea clysteribus ex mensibus provocandis idoneis confectis , ut artemisia , pu- legio , floribus cheiri , baccis lauri & juniperi alvus frequentius eluenda , vel etiam temperata ejusmodi species emmenagogæ in infuso aut decocto , simul sunt propinanda .

§. X.

A corrosio- vis quo- modo ex- cipien- Alia quoque ratione medicatio in- stituenda , quando ab assumptis acri- bus & acidis liquoribus stomachi vasa

erosa & ex sanguine sic effusus evomi- tur . Tum scilicet ad contemperan- dam acrimoniam & cicurandam ro- dentem facultatem , eximie condu- cunt pulveres absorbentes terreo alca- lini , ad consolidanda autem vascu- la sauciata optimum remedium lac- cum amylo coctum .

§. XI.

In omni , a quacunque causa fuerit *Anodynæ* producta , stomachi hemorrhagia , *& stipiti-* caute mercandum est cum opiatis & da- narcoticis , eo , quod virum deje- ctionem , quæ nunquam non in hoc morbo praæsto est , magis adhuc cum summo detimento augent . Summo etiam studio cavendum est a validis itipticis , adstringentibus & vitriola- ceis pharmacis . His enim sanguinis eruptio quidem sistitur , sed cruar in valis stagnans putrescit & gravis in- flammatio cum sphacelo metuenda , aut minimum , si cachecticum corpus est , expeditus sit in hydrope trans- fitus .

§. XII.

Superato vomitu cruento , absti- *Nendum postea a ca-* nendum postea omni cura ab emeti- *poſte a ca-* nendis , nec non ab aloeticis , quibus *venda.* sanguinis orgasmus , ejusdem inordi- natus progressus & ad stomachum confluxus inducitur , ac sic facilime malum revocatur . Repte etiam mo- net Hippocrates : fugienda esse oleo- la & pungua , quibus addenda etiam dulcia . Nam licet haec inter alimen- ta sint præstantissima , recursu ta- men & generationi hujus mali favent , quia valcula dilacerata nimium rela- xando , sanguinis affluxum potius in- vitant , quam arecent .

§. XIII.

Ceterum digna utique sunt , quæ subjugantur Hippocratis de morbo nigro monita practica , quæ libro 2. de morbis Sect. 5. consignavit & sic ha- bent : Morbo atro laboranti medica- mentum purgans crebro propinato , *O* serum *O* lac , si anni tempus ferat , *O* cibis abstineat dulcibus , oleosis *O* pin- guibus ; utatur potius frigidis *O* al- vum

vum subducentibus, & nisi debilis fuerit, sanguinem e brachio detrahito. Quod si alvus non dejicit, molli infuso subluito, a crapula & venere abstineat, neque multum exerceatur, neque deambulet, calida non laret, acria non edat, neque falsa, que cum fecerit, cum atate etiam morbus fugiet.

ENARRATIONES
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vomitus *cruentus* *in juvenili* *etula cu-*
status. Virgo, decimum octavum aetatis annum agens, corpore procera, mala silentia ac tenera, facie pallida, anno aetatis decimo quarto, post vehementissimam iracundiam, tantam cruoris copiam evomuit, ut mensuram fere completeret. Subsequuta tum febris assidua, qua discussa, mensum fluxus erupit & in hunc usque diem satis ordinate successit. Interim haud raro emicuit sensus doloris pungitivi in sinistro latere & pressorii in ventriculo, quo medicus consultus inductus, cruditates in stomacho subesse suspicatus est, & ob id porrexit vomitorium salis validum antimoniale. Sed inde dolores & pressiones ventriculi mirum exacerbatae & accesserunt præterea strictræ præcordiorum anxie, cum intenso capitinis dolore, quin triduo post, sanguis magno cum impetu per os erupit, sub extremorum algore, aphonya, animi profunda defectio alisque adstrictione, quæ insequutus astus ingens, cum magna siti; postero ramen die per vomitum nihil amplius sanguinis, sed tantum ingesta rejecta, & ante meridiem semper ægra melius, post meridiem pejus habuit. Cum demum ego in consilium adsciscerer, his usus sum magno cum fructu remidis. Binis scilicet singulis horis porrexi paulatim sorbendum haustum aquæ fontanæ frigidæ, cum pulvere nitroso absorbente & quindem liquoris anodynæ mineralis gut-

tis. Deinde ter successive injicere jussi clysterem emollientem domesticum, quo alvus ingentem viscidorum incrementorum colluviem dimisit. His levata quidem ægra, conquivit etiam astus nimius & urgens præcordiorum anxietas, nihilominus maneat semper conatus ad vomendum, junctus interdum, non cum sanguinis, sed pituitæ vomitu, neque capitnis dolores, neque anxietates præcordiorum prorsus cessarunt, sed interjecto aliquo tempore redierunt & vires præterea multum fuerunt dejetæ. Quare emulsionem parare jussi ex decocto cornu cervi & scorzonerae, aqua melissæ & mentha sine vino, cum seminibus quaruor frigidis, papaveris albi & syrupo papaveris, quam ægra insigni fumis cum euphorbia. Præcordiali vero regioni, faculum herba menthe, floribus sambuci & chamomillæ Romanæ plenum inque vino coctum saepius applicare jussi. Et ad levandum capitinis dolorem liquoris anodynæ mineralis guttas quinque, vel sex, frustulo sacchari Canariensis instillatas, saepius ori indere suasi. Sic demum effectum est, ut & vomitus cruentus, & omnia reliqua pathemata discederent, & ægra pristinam perfectam recuperaret valetudinem.

Epicrisis.

Quando mensis primum instant, decimo tertio, vel quarto aetatis anno, & juvenculæ ob id habent male, fortior animi, per merorem, aut iram commotio superveniens, sanguinis e stomacho eruptionem per quam facile suscitare potest, idque tanto certius, quando exhibetur emeticum, tum certe veneni vim habens. Quod si eriam semel hæc adfuit hemorrhagia, post longum annorum decursum, eadem, quavis data occasione, facile reddit, ut quidem in nostra factum est per vomitorium validum, quo sanguinis impetus non modo ad ventriculum, sed & ad caput translatus, in illo cruentum.

vomitum, in hoc autem gravia pathemata induxit.

OBSERVATIO II.

Vomitus & feces niger brevile stabilis. Laborarat per longum tempus quartana febre, juvenis, & tandem ab Empirico, nescio quibus, curatus, pravum inde corporis contraxit habitum, cum livido ac plumbeo faciei colore, aliquali etiam circa palpebras tumore & virium languore continuo. Præterea sæpius conques-
tus est, imprimis post usum flatulento-
rum, vel animi commotionem, de dolore sinistri lateris, alvo simul dura & tensa. Tandem cum pedibus iter aliquot milliarium conficiens cor-
pus valide exagitasset, & rixas etiam cum sodalibus habuisset, incidit inopinato in vomitū nigrum, largius & ali-
quoties erumpētem; simul feceserunt per alvum fæces instar picis nigrae ac foetidissimæ. Sub his æger sæpius ani-
mi deliquium, si erigeret corpus, incurrit & intra viginti quatuor ho-
ras plane exspiravit. Dissecto altero statim die cadavere, tam infacetus nares seruit foetor, ut non fere possent adstantes. In ventriculo vasa brevia nigro colore conspicua & disrupta apparuerunt, & tam in ejus cavo, quam etiam ileo intestino, liquamen ni-
grum foetidum comparuit, vasis ilei simul nigricantibus. Hepar, naturali aliquanto durius visum fuit, sed lien adeo durus, ut pene cartilaginis spe-
ciem præberet, atque exterior ejus sub-
stantia albescens vix acuto cultro di-
scindi posset; mollior autem interior
exigua compages superstes, atro san-
guine erat plena.

Epicrisis.

Subitanæ hoc est exemplum mor-
tis, ex sola sanguinis effusione, me-
moratu utique dignum. Nam in aliis sanguinis profluviis, licet is majori copia effundatur; non tamen tam su-
bito mors, vel etiam animi deliquia accedunt. Quare alia utique subfese-

debet hujus eventus causa, quam ego quidem putredini cum intolerabili foetore tribuendam esse confeo. Quæ quia intimæ ad cerebrum nervosaque partes admissionis, subito fluidum illud inficit, quod vires præstat, eodem modo ac in iis, qui sphacelo partium tantum externarum af-
ficiuntur, nec non qui cancrum exulceratum gerunt, & ea propter vitam cum viribus subito perdunt. Quoad causam vero hujus mali, febris quartana diurna & forsan male etiam curata, reliquit insigne vi-
tium in lienis viscere, quo obstru-
cto, accidente spastica sub ira strictura, sanguis in progressu magis ad-
huc impeditus, nec ea propter mi-
rum est, eundem tam brevia vasa quam quæ sunt in ileo, disruptæ
& effluxisse.

OBSERVATIO III.

Fœmina sexagenaria, plethora, *Vomitus cruentus cum se-cessu ni- gro post 14. dies lethalis,* sedentariæ vitæ & crassiori vixti ad- dicta, post perpeccam diutinam mœstitudinem, conquesta est aliquam- diu de lassitudine corporis & dolore in sinistro latere. Quum vero curru aliquando veheretur & simul ven-
to frigidiori corpus exponeret, vomitu ejecit magnam materiæ nigri-
cantis copiam, mox etiam similis coloris per alvum secessit cum foeto-
re ingenti, ipsa autem sub his dejec-
tionibus aliquoties redeuntibus ani-
mi semper passa est deliquium. Da-
ta fuerunt interne analepticæ mixtu-
ræ, cum aceto destillato & cancro-
rum lapidis. Exterius ventriculi re-
gioni applicatum balsamum no-
strum vitæ, ac præterea sedato post vomitu, rhabarbarum in substan-
tia cum manna datum. Videbatur malum hisce mediis aliquantis per inducias dare, & spatio triginta horarum, neque per superiora, ne-
que inferiora, contigit ejactio; ni-
hilo tamen fecius rediit postea ali-
quoties anotera & catoterica de-
jactio.

jectio, cum animi deliquio, appetitus fuit simul prostratus, somnus turbulentus, paucus & nihil reficiens; quibus tandem, elapsis duabus hebdomadibus, consumta femina occubuit. Tradito ad balsamationem cadavere, inspeximus mortis & morbi causam, ac invenimus, vasa ventriculi brevia tumida & sanguine atro facta ac in intestino ileo affatim cruentum atrum. Hepar magnum erat valdeque induratum, lien non quidem durus, sed naturali duplo major, adeo mollis, ut ipsius substantia digito pressa mox dehisceret, & sanguis foetidus, obscure nigricans quaqua versum diffueret.

Epicrisis.

Ortus fuit funestus hic morbus procul dubio ex emanente sanguinis per uterum purgatione, qua cessante, in femina plethorica, neglecta præterea venæctione, necesse utique fuit, ut sanguis in visceribus stagnaret, ea infarciret, & subtracto tandem per animi mœrem eorum robore, mortemque hac ratione inferret. Quod autem diutius malo hoc affecta traxit ægra, neque etiam tam ingens adfuit foetus, tribuendum videtur, tum, quod sanguis non simul & semel, sed successive effusus, tum etiam, quod sanguis in ætate senili non adeo paticulis sulphureis scatet, quam quidem in ætate juvenili.

OBSERVATIO IV.

Successus niger ex sumore brachii sanguis lethali Prodierat in dextro brachio infantis mensis unius unica nocte tumor inflatus, qui mox lividus ac duruscum venis inflatis redditus, tenello, postquam per tres dies, & noctes continuo ejusisset, & per alvum materiam instar picis nigras egessisset, vitam eripuit. Dissecto mali moris tumore, cuncti substituti musculi, una cum vasis, exsusti, corrupti, putrefacti, sanguine foetido infarcti comparuerunt, & exigua admodum sanguinis quantitas in reliquis

corporis canalibus: Illam vero nigricantem materiam per alvum ejecnam, partim ex ventriculo, partim ex intestinis venisse, arguebat, quod adhuc ibi non nihil ejus supererat, & vasa intestinalia nigricante sanguine turgida apparebant.

Epicrisis.

Nutricem hujus tam misere pereuntis infantis fuisse impuram & luc gallica ante annum laborasse, fuit post fataliter compertum. Interim non dubium est, quin ob motum sanguinis in parte inflammatam, & corrupta interceptum, is alias vias qualiter ac demum tenuja ventriculi, & intestinalia vasa perpperit, eodem modo ac subinde evenit, a gravibus partium externarum contusionibus, sanguinem e naribus, vel etiam per alvum, aut alias vias protrahere. Quam in rem consentit peritissimus Platerus, qui in praxi pag. 326 scribit: *a contusione aliqua facta circa viscera ventriculo vicina sanguis non nunquam evomitur.* Nigredo autem sanguinis intimam omnino corruptionem ejus indicat, quæ sine omni dubio a corrupta illa potida tumoris materia profecta, & communicata. Neque etiam alia ex causa, nigri & picci coloris cruentum, qui per anum in ejusmodi affectibus fertur, quam ex valde corrupto in viscere quodam sanguine, totius massæ instar fermenti texturam invertente, petendam esse arbitror.

OBSERVATIO V.

Non ita pridem femina Hebræa *Vomito us* Amstelodamo meum exquisivit *cruento* con filium. Agit hæc quinquagelinum *modo* annum, & ante octo jam fere annos, *vacuus* tribus, vel quatuor, ante men- *mon-* sium fluxum diebus, sanguis e via *fluis* arteria ribus per intervalla notabilem quan- *dens*. titatem profudit, donec prodiret uterina purgatio, & narum stilli- cidiun tolleret! Successit hoc per sexennium, postea vero non amplius

et varibus menstrua periodo sanguis prorupit, sed precedente leviori tussi, et faucibus aliquot successive cochlearia screata evanescunt. Tum semestri abhinc spatio, circa mensium tempus persensit, vomitus, sine tamen singulari conatu, e ventriculo sanguinem ad aliquot per intervalla, cochlearia protrudi; idque adhuc, quotiescumque redit tributi lunaris periodus, accidit. Ceterum foemina est succi plena, vita sedentaria, lauto victui & potui vini addicta, & ex eo quo vomitu egessit menstruatim sanguinem, ob periculi metum virium experta est languorem, cum appetitu prostrato & exiguo somno, que tamen post mensium fluxum & exacto octo dierum spatio, inducias dederunt. Accepit & conquisivit huc usque multa & varia medicamenta, sed frustra. Neque venæ sectio, quæ tantum circa æquinoctium fuit celebrata, ullam attulit opem. Ego igitur consilium dedi, ut ante immensus mensium tempus, venam pedis aperiendam curaret, & tres tantum uncias sanguinis effluere permetteret; dein ut singulis hebdomadibus bis rhabbari pulverem, cum lapidibus canorum & nitro permixtum, mane, vel vespere, circa letri introitum cum hauisu aquæ frigidæ sumeret, frequentius infusum theiforme, ex veronica, scabiosa ac summitatibus millefolii mane biberet, a vino & carnibus penitus abstineret, pro potu vero ptisana utetur, usque ad tempus vernum, quo fontis Selterani cum quarta parte lactis mixti potum per quatuor vel quinque hebdomades instituere & ipsam certum hilari animo esse jussi.

Epicrisis.

Patet manifesto: hanc sanguinis eruptionem, non symptoma, vel effectum morbi cuiusdam in viscere vasculo so obstructo consistentis, sed salutare opus naturæ esse. Etenim in femina hac valde plethorica, per spasmos, solenniter mensium fluxum præcedentes, pars sanguinis ad superiora, & primis annis

ad caput, postea ad pulmones & denique ad ventriculi vascula translatas fuit, quam translationem veteres palindromen, vel metastasis appellant cōsuēverunt. Quia vero jam tempus adest, ut plenarie mox emaneant menses; hinc quasi singulis mensibus sanguinis missionem & abstinentiam ab iis, quæ multum sanguinis ingenerant. Et quia præterea crux vomito nunquam non valde suspecta, metuēdus omnino est gravior si viscera abdominis sanguine forte opulentur, & infarciāntur, progressu temporis, effectus; quem potus aquæ Selteranae, cum victu tenui & moderata diæta utique avertere & præcavere valet.

OBSERVATIO VI.

Triennio abhinc peregre vocatus vomitus fui ad generosissimam foeminam, deliciatam & teneram constitutionis, vomitu sanguinolento enormi corruptam. Accedens illico obvium habui maritum, monstrantem binas argenteas pelves, liquamine ex cruce concreto & phlegmate plenas, quod vomitu fuerat exturbatum. In agro offendi pulsum valde debilem, & vires ita dejectas, ut erecto capite in animi incideret deliquiū. Quare ingens periculum subesse dixi. Dedi quidem analiptica & roborantia sed altero die, post aliquot adhuc in star lotura carnis, intermixtis sanguinis fusci coloris grumulis, vomitus, placide occubuit. Quum in causam morbi mortisque inquirerem, rescivi: defunctionem, post puerperium laborasse tertiana, tunc temporis gravante genii valde anomali; hanc post quinque accessiones a medico vicini oppidi, missis pulveribus fuisse sublatam, ex eo vero per tres menses restitisse fluxum uterinum & successisse dolorem hypochondrii sinistri gravativum. Hinc matrem permoram fuisse, ut ab extraneo medico petierit & filiae miserit medicamenta, elixirium scilicet, quod quum explorarem gustu, proprietatis sine acido, cum essentia zedoaria & succini erat,

de.

de quo ter quotidie guttas quinquaginta cum vino Rhenano veteri, & generoso, sumferit ac pro ordinario potu cerevisiam valde lupulatam habuerit. Sed elapsio, vix trium hebdomadum spatio, incidisse ipsam in funestum hunc morbum.

Epicrisis.

Tragicus hic casus doceat juniores praticos: quam perniciolum sit, emmenagogis, ad ciendos menses, paulo validioribus uti in subjectis tenerioribus, in quibus post puerperium & febrem magis deficit, quam abundat sanguis; tanto magis, si ex dolore gravativo hypochondrii sinistri, labis in visceribus, post febrem, sine dubio adstringentibus cohibitam, & in primis lienis, justa est suspicio. Nam ubi obstaculum ponitur in interaneis transeunti sanguini, is calidioribus medicamentis valde exagitatus & expansus, venas ventriculi teneriores facile vi perumpere & exitum affectare, atque etiam sibi parare valet.

OBSERVATIO VII.

Morbus niger ex hepatis vitio lothalis. Causidicus clarus, quadragenario major, corporis habitu gracilis, & inter labores fori assiduos ledentariam admodum vitam colens, a pluribus iam annis cerevisiam partim, partim vinum in seram usque noctem bibere consueverat, tam largiter, ut quotidie vix tres, vel quatuor vini mensurae sufficerent. Dum vero potui sic indulxit, ciborum appetentia cum viribus languescere coepit, corpus quoque marcescere & sapientius gravativus dextri hypochondrii dolor affligere, facie simul existente plumbea & coloris ad ictericum vergentis. Venæctionem natura quasi horruit, eandemque vix semel, vel bis, per totam vitam admiserat, in juventute tamen narium stillicidium expertus fuerat frequentius. Quam

denuo in convivio plus quam tres potentis Hungarici vini mensuras ingurgitasset, saltando quoque corpus valide exagitasset, domum delatus, summam praecordiorum anxietatem perfensit ac paulo post iterato per intervalla sanguinis fuscī, ex parte concreti, colluviem evomuit ingenitem. Injecto ex jure galli, oleo amygdalarum dulcium, nitro & sale aliquoties clystere, ejusdem indolis etiam per alvum fecessit liquamen, ut adeo intra viginti quatuor horas plus quam tres sanguinis mensurae per superius & inferius os exirent. Vocatus ego, porrexi interius mixturam analēpticam leniter adstringentem, ex aqua menthae, melissæ, theriacali, cinnamomi sine vino, succo citri, cum corallis, speciebus de hyaciatho & syrupo papaveris albi. Exterius praecordiorum regionem innungere jussi linimento ex oleo amygdalarum dulcium, nucis & camphora, & superimponere sacculum herba menthae, abfynthii, floribus rosarum rubrarum, chamomilla Romana plenum, ex vino rubro coctum. Quibus quidem sensim sanguinis superserna eructatio constitit, sed remansit magna virium dejectio, cum ciborum plenaria inappetentia, successit tandem ventris, cum superiorum tabe, tumor, & intra bimestre spatium mors ipsa.

Epicrisis.

Cruentam vomitionem ex liene & hepate proficisci, prisca jam fuit Galeni sententia, & ego idem aliquoties experientia habeo confirmatum in iis, qui postquam aliquamdiu de dolore hypochondrii dextri pressorio diuturno conquesti, accidente gravi iracundia, motu corporis impenso, vini potentis abusu, aut refrigeratione externa, vomitus, necnon fecessus alvinos sanguinolentos incurserunt, tam largos, ut intra exiguum tempus, ejecta plus quam tres vel quatuor

tuor mensuras æquarint. Quare mihi omnino videtur verosimile, non tan-tum ex brevibus ventriculi vasis, uti in sola vomitione cruentis accidit, sive secessum per alvum, verum etiam per epaticos ductus nimium ampliatos, vel plane disruptos venæ portæ ramulos, ad duodenum perrumpere sanguinem ibique effusum, non modo vomitus, sed & dejectiones alvinas sanguinolentas facere. Discant vero etiam ex hac observatione strenui illi spirituorum in primis potatores, quam male consulant suis visceribus. Ego enim inde obstrunctiones, indurations & rupturas in mesaraicis vasis sanguineis & lymphaticis vidi, unde postea ater funestus morbus, cruentus vomitus, hydrops, lentæ & hectice febres.

OBSERVATIO VIII.

Percelebatur ingenti terrore feminis na trigenaria ipso illo tempore quo & fæces menstrua purgatio succedebat, & tressus cruentus a mens adhuc ingerebat aquæ frigidæ haustum liberalem, eoque in artuum tremorem validum, & inappetentia ciborum delabebatur. Redeunte menstrua periodo, sanguis quidem comparuit, sed justo parcior, ac maximæ præcordiorum anxieties, cum nausea, vomitu, extremorum frigore, & faciei rubore ipsam infestarunt. Tertio mense priora redierunt patemata cuncta, & præterea accessit per triduum vomitus largus sanguinis, vires summopere prosternens.

Epicrisis.

Nihil certe deterius & feminatum sanitatem magis lœdit, quam gravis animi ex iracundia, aut terrore commotio, incidens in illud tempus quo uterina purgatio succedit. Salutares enim illi motus sueti excretoriis, sic statim invertentur, ad interiora vergunt, ac facile postea in habitum transeunt, nisi cito emendentur iterum. Quare si incidit

ejusmodi noxa, quam fieri potest citissime succurrentum congruis auxiliis, inter quæ præter venæ sectionem, & clysteres demulcentes, quam maxime proficia theiformia infusa, cum iis que sanguinis ad exteriora motum rursus revocat, blanda scilicet diaphoretica.

C A P. IV.

De hemorrhoidalí fluxu nimio.

Theses Pathologicæ.

§. I.

Non omnis liberalior sanguinis *Nimius* per sedis venas secessus, pro eo, *hemorrhoidum* qui præter & extra naturæ legem fit *fluxus*, ac nimius est, habendus; sed consideranda vasa, corporis habitus, vires, *ætas* ac *temperamentum*. Non enim infrequens, quod ea sanguinis effusi quantitas, quæ certis corporibus legitima est ac salutaris, aliis vicissim sit nimia ac perniciosa. Neque enim omnis solito largior, a mole sanguinis valde aucta eaque paullo impensis commota, suscitatus hemorrhoidalis fluxus, censendus est morbosus, sed is demum, qui diutius insistit, qui vires prosternit, quo appetentia, laudabilis alimentorum digestio, nutritio aliæque functiones lœduntur, ac metus tandem est, ne via ad graves, & chronicas passiones pandatur.

§. II.

Nimium hemorrhoidum fluxum antecedunt ut pluriū, & comitantur *Ejusdem signa*. hæc: dorsi & lumborum gravatus pressoriusque dolor, interdum crurum stupor, extimatorum partium cum levè horripilatione constrictio, vasorum in iis subsidentia, pulsus durior, & constrictior, oris faeciumque siccitas, urina parciors & frequentius pallida, sensus ponderis in podice ad perineum se extendens, ventriculi imbecillitas, fla-

talentia in imo ventre, frequens ad me-jendum, & desidendum stimulus, subin-de cum muci albi, & biliosi exclusione, ac senioribus magisque imbecillis accidit præterea ani procidentia.

§. III.

Quæ sanguinis excretae ex quæ sanguinis excretae Sanguis in nimio hoc profluvio ater plerumque in principio excernitur val- qualitas de quo grumulos, interdum etiam in frusta quæ palmam manus æquant coa- Etus e varicosis vasis vacuatur; postea sequitur rubicundus, & demum admodum ferosus, quandoque pituitosus, sive mucus albuminis ovi speciem habens. Copia sanguinis exeret nonnunquam oppido magna, ac uti Montanus nota-vit, quotidie duas libras, vel uti Panar- röllus vidit, quotidie libram, equat. Diu etiam sæpe insistit profluvium, idque per integrum mensem, viginti, quin quadraginta quinque dies, factum esse, ob servatorum fide dignorum testimo-nio constat.

§. IV.

Ex haemorrhoidib. in arteriis venis Sanguinis per intestinum rectum ex-cretio omnis fit per vasa sic dicta hæ-morrhoidalia. Extremæ tamen hæmor-rhoïdes rarius fluunt, sed in varices do-lorificas facile abeunt, quæ apertæ san-ginem plorant, neque tamen crebro-nimium fundunt. Ac internæ hæmor-rhoïdes, quæ propagines sunt splenici rami, & ad intestini recti interiorem substantiam, quin ani usque sphincterem porríguntur, una cum arteriolis ex mesaraica inferiori productis, non modo fluxus effusioris fontem præbēt, sed & suppressæ, morbos, qui ex labe hepatis, lienis, pancreatis, mesenterii & intestinorum fiunt, ingenerant.

§. V.

Arteriis maxime ramis venis. Ipse fluxus immediate proxime arteriarum ramos sanguine nimium distentos tandemque disruptos contin- git. Neque tamen ex toto negandum, e vena etiam hæmorrhoidalī, propter laxam quæ ipsi cum arteria est anasto-mosi, multum sanguinis ibi collecti & sæpe viciōsi prodire. Patefacta enim sic

via valvulae egressum ibi impedites desunt, & si vel maxime essent, varico-sa tamen venarum habitudo multum & valvularum situm immutet necesse est.

§. VI.

Salutarem illam per sedis venas sanguinis evacuationem, difficiliori per hæmorrhoidales venas, ob situm ea-rundem perpendicularē, progressu & ad portæ venam ipsumque hepar redi-tui, in acceptis ferendum esse, & quan-do vasorum in recto extrema ab ac-cumulato ibi sanguine nimis diducta aperiuntur tandem atque deliscunt, sus-continere, inter omnes constat. Unde qui excedentis etiam, & perniciosi hæ-morrhoidalis fluxus causam atque ori-ginem ab impedito sanguinis per hæ-morrhoidales & mesaraicas venas ip-sumque hepatis viscus motu progre-sivo repetit, is minime a vero aberrat. Testatum id sane faciunt observatio-nes anatomico-practicæ, quibus con-firmatur, illum venæ hæmorrhoidalis ramum, qui juxta colic tractum excur-rit ad anum, multum quam quidem se-cundum naturam esse fuerit, ac vel tripli ampliorem, in iis qui hæmor-rhoidum excessu perierunt, offendit. E-tenim quo major sanguinis per arterias est affluxus, & seignior per venas reflu-xus, eo magis a collecto sero & sanguine fibra laxantur, vasorū alvi diducun-tur, & labefactato sic magis magisque partium tono ac robore, profluvium diutius durat, facilius etiam recrude-scit.

§. VII.

Quæcunque igitur sanguinem inga-nuant nimium, ejusdemque per portæ ramos commeatum remorantur, aut etiam copiosorem ad loca hæmorrhoi-dalia affluxum invitant, ad hæmorrhoi-dalem tam moderatum, quam etiam immoderatum fluxum disponunt. Hinc est, quod qui laxum, spongiosum, obe-lsum, plurimis vasis sanguine turgidis distinctum corporis obtinent habi-tum, qui lauto fruuntur vietu, vix-

et genus colunt sedentarium motusq;
expers, & a majoribus hoc morbo affe-
ctis prognati, hæmorrhoidum excessui
quam maxime sint obnoxii. Eadem
quoque ob causam accidit, quod acro-
ra purgantia, aletica crebrius usurpa-
ta, calidorum ciborumque aromatico-
rum, necnon potus vinosi dulcis atque
potentis liberalior usus, omissa sueta
sanguinis subtractiones, animi affectus,
ira potissimum & tristitia diurna, &
corporis quoque, maxime per equita-
tionem, commotio impensior, aliaque
id genus plura, ut imperat hic sanguini-
nis fluxus præternaturalis, faciunt.

hecticam febrem, cum extrema virium:
jactura terminatur.

§. X.

Frequentioris observationis est, ni-
mias sanguinis per sedis venas profu-
siones ducere ad hydrope^{dropem}, idque præ-
terim in phlegmaticis, & qui rarum
corporis obtinent habitum. Si autem
hydropi ex hepate indurato supervenit
ejusmodi excessiva hæmorrhagia, cer-
tum mox subsequituræ mortis præbet
indicium.

C U R A T I O .

Variæ, & differentis indolis sunt
causa, quæ ad excitandum nimium hæ-
morrhoidum profluviū faciunt atque
concurrunt; ideo variæ etiam meden-
di sunt indicationes, & varia quoque ac
diversæ naturæ ad arcendum illud ac
persanandum remedia.

§. I.

Non adeo insolens est, ut in corpo- ^{sanguino-}
re plethorico, resistante aliquandiū ^{nis co-}
fæto alias fluxu, a vehementiori cor- ^{pia mi-}
poris vel etiam animi commotione, a
potu spirituoso liberalius assūpto, bal-
neo nimis calido, aut medicamento in-
testinum sanguinis motum nimium
intendente, non modo subito & con-
fertim fiat, sed & solito diutius insistat
sanguinis, cum pulsu magno & vehe-
menti, per hæmorrhoides profusio^{ace-}
Quod ubi accidit, primo omnium di-
vertendus ac derivandus sanguinis im-
petus, eumque in fluxum sanguinis mis-
sio in brachio, vel brachiorum in liquo-
rem aquoso-vinosum tepidum immis-
sio, apprime ex usu est. Dein usurpan-
da ea, quæ excedentem intestinum par-
tium in sanguine sulphurearum motū
componunt, diluentia maxime & refri-
gerantia, potus aquæ frigidæ, præfer-
tim chalybeatæ, vel mineralis tempe-
ratæ, serì lactis cum succo citri coacti,
qua plantaginis, fragorum, acetosæ,

*Pericu-
losus
fluxus
nimius.*

Ceterum periculum utique est ef-
fusus hoc sanguinis hæmorrhoidalis
profluviū. Inde enim vires conve-
luntur, corpus marcescit, femora gra-
vantur, somnus fit laboriosus, pectora gra-
vativo sensu anguntur, venter cum
borborygmis tumet, ac pulsus micat
debilis. Urgente postea diutius fluxu,
pedes circa malleolos intumescunt, fa-
cies item & oculi, color illius fit luridus
ac plumbeus, spiritus arctius meat, &
postremo in cachexiam, hydrope^{dropem},
lentam & hepticam febrem fit transi-
tus. Ut adeo pateat: ex defectu etiam
sanguinis graves subnasci ægritudines,
ac utique vitæ viriumque thesaurum
esse sanguinem, nec quantitate, nec
qualitate peccantem.

§. IX.

*Dicit ad
hepticam*

Exitialis hæmorrhoidum exceden-
tium eventus certius imminet, si tu-
mor hepatis, vel lienis, hypochondrio-
rum inflatio, cum alvo adstrictiore, in-
cipiens cachexia & hydrops, morbo-
sam hanc sanguinis effusionem indu-
xit. Sic enim sub ipsa priora mala
ingravescunt, obstrukciones increscunt
& obfirmantur, ac vitiola quoque san-
guinis & succorum constitutio augen-
tur. Unde profluviū fit chronicum,
tandemque in atrophiam lentamque

acetosellæ, decoctum cornu cervi citratur, tintura rosarum cum spiritu vitrioli præparata, & confecta ex his cum sirupo rosarum, julapia. Eundem in finem præstans est virtus nitroforum, nitri tantum purificati, vel artificialis, ex spiritu nitri, & sale tartari parati, vel in pulvere cum absorbentibus, & roborantibus, vel etiam in potu dati. Porro operam locant egregiam quæ impetuolum solidorum, & fluidorum motum placant, simulque dolores & spasmos levant, anodyna, inter quæ spectatæ virtutis est liquor noster anodynus mineralis, spiritus etiam nitri dulcis ritu paratus, aqua item florum camomillæ vulgaris, & summiratum millefolii, necnon ex papaveraceis, semen papaveris albi, sirupus papaveris utriusque, aqua & extractum papaveris, aut si fortioribus utendum, semen hyosciami albi.

§. II.

Humores impuri per alvum Quando cum virium jaætura, & nobiliorum functionum læsione effusior fluxus diu persistit, incipiensque viscerum labes subelt, & magis serosi aquei, quam consistentis fibroli sanguinis copia delinquit, conferunt quam maxime ea, quæ succos vitiosos ac biliosos clementer paullatimque per alvum adducunt, simulatque hutaorum motum a recto intestino ad tunicas, & glandulas reliquorū intestinorum alliciunt, eoque nomine merentur laudē rhabarbarina, cū passulis minoribus, & tamarindis, vel quod idem, cum tremore tartari, si corpus est biliosum, in potionem elæosaccharo citri condita. Tum quoq; temperatiora diaphoretica, corrugendo, & expellendo acres humores, officium faciunt opportunum, ibi maxime, ubi scorbutici, vel purpuracei aquæ, aut alias exanthematicæ materiae, sanguinis, & seri contexui altius inhæret. Horum in numero sunt cornu cervi ustum, vel uti vocant philosophice præparatum, unicornu fossile, diaphoreticum antimonium, acetum vini cum lapidibus cancerorum mixtum, a-

qua galegæ, florum sambuci, carduī benedicti theriacalis, simplex mixtura, diascordium Fracastorii, quæ in potionem lege artis possunt redigi. Nec proletaria virtus est liquoris anodyni mineralis, cū quarta liquoris bezoardici Bussiani parte nupti, infusi cum theiformis ex millefolio, veronica, pilosella aliisque concinnati, & cum dispositione in lecto aut conclavi ad blandum sudorem, poti. Atque etiam non possumus non hoc loco merito commendare refractam camphoræ dosin, ad granum dimidium, præfertim quando nitrosis, & bezoardicis pulveribus commiscetur. Hac enim ratione acris, & caustica materia, quæ sèpe spasmorum & qualem sanguinis commeatum turbantium, & hemorrhagiam largam inducentium causa est, obtunditur, & foras ejicitur, simul adstringentium, & anodynorum vis, tantisper, ne noceat, refrænatur. Itaque non ineptus censendus ille Veterum mos, quo camphoram præcipuis ad sistendas etiam hemorrhagias medicinis, cōmiserunt, ut ut exigua ad modū dēsi, cujus generis sunt species de hyacintho, diatron sanctali, diatron Abbatis, trochisci de carabe, sperniola Crolii, necnon famigeratissimus *Heurnii* ad sistendum sanguinis fluxum pulvis.

§. III.

Obstruções referentes.

In graviori illo, & difficillimæ medicationis fluxu, qui obstruktione, vel infarctu moleque adaucta visceris cuiusdam, hepatis, lienis, aut in feminis uteri, nittitur, eligenda, si medicinæ adhuc locus, ejusmodi auxilia, quæ dum obstruktionum repagula solvunt, humores non nimium commovent. Inter haec a præscis jam temporibus usu, & securitate celebres pilulae, de bdellio Messiae, a *Foresto*, *Soleandro* & *Riverio* laudatae. Nec contentanea pilulae Becheriana methodo ex amaris extractis, & gummatibus temperatioribus concinnatae, ita tamen ut a loes in locum, rhabarbari extractum, largius paulo com-

com mixtum surrogetur, si hisce nitrosi pulveres pro re nata interposantur. Nil vero ad expedienda obstructa aquae & diluentibus est praestabilius. Unde quam optime in usum trahuntur minerales aquæ, subtilitate atque temperie nobiles, quarum cladem ducent Antonianæ, Wildungenses & Selteranæ, vel cum, vel sine lacte potæ. Et certe prudens ac moderatus harum aquarum, ad aliquot hebdomades, sub debito regimine & interpositis pilulis dictis, necnon elixirii balsamici temperati martialis pharmaci mixtura acuati usu continuatus potus, palmam precepit reliquis cunctis. *Montanus* præterea in consilio, jus pulli copiose tribus ante prandium horis bibere jubet, eoque plures hoc malo se liberasse testatur. Majoris tamen adhuc efficacitæ erit, si juseculo incoquantur acetosæ, cicchorii & scorzonerae radices, aut etiam medicamentum martiale temperatum, cuius generis est illa cum pomorum succo parata martis tintura, cum extracto cascarillæ aquoso, primo mane sumatur, ac postea supra laudatum jus copiose bibatur.

§. IV.

Atonia recte in- resini firman- da. Demum inter præcipuas copiosissimæ affluxus & effluxus causas referenda merito recti intestini, ejus membranarum & vasorum atonia. Quare adhibenda etiam utique ea, quæ relaxatis nimium & a tono dejectis partibus foenerant iterum robur. Interius laude sua hoc nomine non defraudandas sunt species de hyacintho, trochisei de carabe Mesues. Ex martialibus est maxime ipse hæmatics in subtilissimum pollinem redactus, tintura martis Zwolferi, crocus martis antimonialis subtilissimus cum conserva rosarum antiqua exhibitus, tintura item florarum salis ammoniaci martialium, cum rectificatissimo vini spiritu parata & cum æquali portione elixirii amari temperati mixta. Inter resinoa & balsamica nobilis est virtus succini præ-

parati vel alcalifati, extracti cascarillæ santalii rubri. Et hæc omnia cum prudentia convenienti ordine ac dosi usurpata, fructu non desituantur, si modo malum recipit adhuc sanationem.

§. V.

Adhibenda præterea etiam sunt topica constringentia, ad obtainendum effectum speratum. Si igitur venæ in anilymbo varicosæ, citra alvi depositum, magnam sanguinis, non sine syncopes, vel mortis metu, fundunt copiam, colcothar vitrioli, vel etiam lupi crepitum, sine noxa admoveare licet. Tanto magis, si leniora prius adhibita profecerunt nihil, cuius generis est decoctum ex floribus balaustiorum, rosarum rubrarum, myrrha, plantagine, malicorio & chinæ cortice cum vino rubro præparatum & cum sporgia recto intestino post dejectionem alvinam applicatum. Ubi autem impetus sanguinis effluentis jamjam compositus, ossi facro cum perinæo & pube apponendum crebrius epithema ex herba menthae, sumach, floribus rosarum rubrarum, hyperici, rasura ligni santali rubri, masticæ, cardamomo & chaccarillæ cortice, in vino rubro coctis. Neque minus ad firmandum intestini recti tonum ex usu est, idem hoc decoctum anno injicere syringa.

Cautelæ & Observationes
Clinicæ.

§. I.

In medicacione effusi hemorrhoidum ac morbos profundi hæc servanda methodus: ut præmitatur sanguinis missio, & primarum viarum cum recenti cassia, vel rhabarbaro electo in decocto repurgatio; postea vero roborantia, & leniter adstringentia, & in externa, tutius adhibere licet. Ex nimia enim sanguinis profusione tanta oritur imbecilitas,

litas, ut medicamenta efficaciora rarius felici cum successu applicare sit integrum. Generalis quippe medendi est regula: quo major naturæ est imbecillitas, eo leniora & diæteta magis remedia, minus vero validiora pharmaceutica usurpare decet.

§. II.

Cautela Nitrosa, acidula, & refrigerantia, ut in principio, & ubi ingens æstus & orgasmus sanguinis præsto est, usurpantur cum euphoria; ita minustutus eorumdem est usus, sanguine cum viribus jam nimium profuso & ventriculo debilitato, præsertim, ubi ex viscerum obstructione fluxus est symptomatus.

§. III.

Venescæ Actionem. De phlebotomia usu tenendum, eandem nos facile in ægro absente esse adornandum; eo quod multum refert, ut justa & conveniens sanguinis quantitas emitatur. Etenim in principio, si corpus sanguine valde torget, major ipsius, ad derivandum e brachii vena, copia, peterit subtrahi. At ubi jam multum cruxis sponte effusum, parior & partitis potius vicibus, cum prudenti & cauta ratione, instituenda est missio.

§. IV.

Circa Buxus cohibitionem. Optime jam monuit Hippocrates hæmorrhoidibus nimium fluentibus occlusis reliquis venis, unam servandæ esse apertam, ne hydropis, vel tabis fiat metus, facta scilicet sanguinis ad pulmones vel hepar, palindrome. Ut ut vero effatum hoc proxime intelligendum sit de externis venis nimium fundentibus, & per unctionem, vel stiptica occlusis; recte tamen etiam applicari potest, ubi ex internis, uti nostris solenne est regionibus, effusus sanguinis fit profluviu. Tanto magis, quia has occcludere, sive potius fluxum sistere, non ita promptum est ac expeditum, nec nisi per validiora interna perficiendum, quod, si non perite & valde circumspete adornatur, datum redundant, effato Hippocratis certissime.

§. V.

Quæ quam ita sint, valide adstringentium usus utique sit cautissimus. Neque enim in principio, multo minus quando vires cum sanguine jam exhaustæ, utilem locant operam, ac potius in corporibus imbecillis, & exquisitius sentientis naturæ, spasmatica pathemata, convulsiva, animi deliquia, summas præcordiorum anxietates, cum tremore, & palpitatione cordis concitant. Quod si itaque fluxum compescientibus uti necesse, consultum est, non vi, & magnis dosibus id perficere, ne noxam inferant. Oportet quoque subiungere diluentia, temperantia, & leniora laxantia, inter quæ præstantissimum est asinum lac, vel serum laitis dulce. Potissimum vero præstat, martialia liquida cum ipsis diluentibus assumere.

§. VI.

Quando tamen sanguinis ex hæmorrhoidalibus locis fluxum subito sublatum summae præcordiorum anxietates, inflationes, cum inquietudine, & angustia excipiunt; revocandus est lenioribus elicientibus, & laxantibus, clysteribus quoque emollientibus ac suppositoriis.

§. VII.

Pari ratione cum hypnoticis, opiatice & narcoticis mercandum est cautissime, quippe quæ, tanto magis intempestive data, insaniam plane inducere apta sunt. Ex optimis, si locus, est illa massa pilularum, a Wildegansio nomen gerens, quæ etiam cū fructu exhibetur, quando atrox dolor & spasmus sub prima lumborum vertebra, nimiam sanguinis effusionem movet, eaque propter est placandus.

§. VIII.

Si ullo morbo exquisita vitæ virtus quo ratione opus est; in hoc certe id quam maxime necessarium, eaque neglecta auxiliis, vel præstantissimis, obtinendum nihil. Quocirca ægris commendanda serio abstinentia a fructibus horæis, leguminibus,

acetariis, lacticiniis, carnibus vetustis, induratis fumo atque salitis, ab aromatibus, allio, cepis, vino potenti spirituosisque cunctis. Dissuadenda etiam venationes, omnes impensiores corporis commotiones, per equitationem maxime & vecturam, in locis præsertim lapidosis & inæqualibus, & placidum potius motus genus, supernam magis, quam inferiorem corporis regionem afficiens, sub æquo ameno, sereno, concedendum. Nihil vero sic laborantibus pernicioſius animi commotione, ira in primis ac terrore, unde occasio ad eas studiōse præscindenda omnis. Neque minus multum interest, ut congruo potu utatur hæmorrhoidibus effusis obnoxius. Nos quidem potum aquæ, vel seri lactis, item decoctum santali rubricum mastiche & cinnamomo, necnon julepos, ex decocto cornu cervi, syrupo acetosifatis citri, additis aliquot guttulis olei de cedro, vel unciis aliquot aquæ florum citri, maxime commendare solemus, tum præservandi, tum curandi scopo.

S. IX.

Composito morbo hæmorrhoidum profluvio, ne iterum erumpat, danda est opera. Obtinendum id exacta vivendi, modo commendata, ratione, sanguinis missione, ter, vel quater quotannis instituta, primæ regionis quovis mense per epicrasin repurgatione, ac dextro-aquarum mineralium, vel solo laetis chalybeati usu. Sedulo denique cuncta ex alimentis & laxantibus vitanda, quæ dolorem excitant, quia hæc sequitur desideri cupiditas.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

O B S E R V A T I O I .

Hæmorrhoidum excessus lethalis post Pyrmontanas.

Celeberrimi nominis vir, corpore plenus atque robustus, sexagesimum tertium ætatis annum egressus, a multis jam annis liberale sanguinis per ve-

nas sedis passus est stolidum, fere menstruum, eodemque rite succedente valetudinis incommoda sensit nulla. Sed posteaquam diurno affectus fuerat cum tacita iracundia moerore, restitit hæmorrhoidum fluxus, & facies ante florida facta flavescens & flaccida, cum oculorum intumescientia. Ob metum igitur cachexia Pyrmontanas adiit acidulas easdemque ingenti copia hausit, neque tamen in, neque post eam usum, conveniens coluit in vita vi-
et quoque regimen. Inde effusissimus sanguinis puri per anum lequutus est fluxus, non compescibilis, licet nitrosis pulveribus Becherianisque pilulis ute-
retur. Pedes potius facti cedematosi, venter intumuit, vires collapsæ, anhe-
litus factus difficilis, superiora conta-
buerunt tandemque exceptit mors.

Epicrisis.

Nihil certe ex animi etiam commotionibus hæmorrhoidariis est pernicioſius, quam angor & molestia diutius extracta, quæ vires, tonum ac robur partium labefactando, efficiunt pri-
mum stagnationes, quæ postea obfirmando in abdominis visceribus infarctus, excessivas inducunt hæmorrhagias atque funestas. Pyrmontanæ autem acidulae, si quis illis uti velit cum fructu, exquisitum postulant regimen, tam sub, quam aliquot hebdomades post usum, tanto magis, si potans jam tum viscerum affectus est labe. Quod quia in nostro non factum, sed potus pro lubitu, sine observatione debita institutus, malum exacerbatum & ad exitum tristem traductum esse non est mirandum, nec ea propter dextro usui quicquam detrahendum.

O B S E R V A T I O II .

Judæus annorum quinquaginta, na- *Hæmor-*
tus patre hæmorrhoidario, & ipse a *rhoideis;*
prima statim ætate sanguinis stolidi- *nimia*
diis, in variolarum quidem & morbil- *campho-*
lorum morbo e naribus, ac postea hæ- *rato cō-*
mo. *posito.*

moptysi obnoxius, quadregesimo anno cœpit primum pati hemorrhoidalem fluxum, qui postea singulis fere mensibus, ac non nunquam sub fortiori in itinere maxime corporis commotione, rediit effusior. Quod quum sine sanitatis detimento contingenter, tulit patienter; sed quum aliquot abhinc annis insisteret profluvium diutius, idque largum, inde admodum fuit debilitatus & appetentia cum digestione labefactata. Quare ut auxilium quereret fuit coactus ad moderandum fluxum. Ex variis autem multisque remediis obtinuit nullum. Optimum tamen tulit antimonii tinctoria, ex sale tartari & regulo antimonii parata, & non tam acris, quam quæ cum nitro conficitur, in cuius uncia soluta camphoræ drachma dimidia, & mane vesperique cum aquæ frigidæ haustu sumta ad guttas viginti.

Epicrisis.

Perperam utique putant præjudiciis toti inhærentes & parum periti, camphoram nimium concitare sanguinis astuosum orgasmum eaque propter esse reformidandam, multo minus in immodicis sanguinis fluxionibus in usum trahendam. Alia enim omnino docet experientia, quin camphora, quandoque etiam in majori paullo dosi, ad scrupulum unum sumta, plus refrigerii sentitur, quam incandescentia. Veteres sane non adeo alieni fuerunt a camphoræ uso, sed eandem præstantissimarum medicinarum compositionibus commiscerunt multis, ut quidem ex Augustana patet pharmacopœa. Ne dicam, Riverium & nos quoque eadem in inflammationibus, in malignis, magno cum emolumento in dosi non exigua fuisse usos. Atque etiam in nimis hemorrhagijs, roborans simul atque anodyna camphoræ virtus utilitatis est maxima, in primis si aliis medicamentis sociatur & parva dosi exhibetur. Cum antimonii potissimum tinctoria mixta camphora, diuresin, neque minus diaphoresin augendo, ac imbecilles

partes roborando, sanguinis & seri affluxum a recto intestino diverit aliorum, ac ob id ex imie prodest.

OBSERVATIO III.

*Hæmorrhoidales
nimia
exterior
in virgine
curate.*

Virgo novem ac decem annos habens, venæ sectionem nunquam passa, sed nimio mensium fluxui subinde obnoxia, cruentas ex perta est sedes, sine molestia tamen atque dolore, idque per dies aliquot. At cum gravi percipetur iracundia, ingentem sanguinis puri ac sinceri alvo exclusit copiam, non sine summa virium jactura. Substitit tamen rursus effusus hoc profluvium, quin hausto frigido potu, fluxus restitit penitus. Sed inde ingentes incurrit præcordiorum anxietates & constrictiones, quasi cōvelleretur cor ipsum, als wenns ihr das Hertz abstoßen wolte, extrema facta frigida, facies rubicunda, venæ in capite inflatae, arteriæ pulsarunt valide ac celeriter cum quadam duritate. Datus ipsi pulvis ex diaphoretico antimonio, cancrorum lapidibus, nitro & cinnabari, cum infuso summitatum millesfolii, data quoque simplex mixtura cum croco, & habuit melius.

Epicrisis.

Fœminas etiam hæmorrhoides pati, non novum est: neque etiam rarum, ira affectum fluxum earum reddere immoderatum; id vero non adeo obviom, solum frigidum haustum sub ipso fluxu tam gravia concitare posse pathemata. At frigus nervosis partibus spastico jamjam affectis, uti sit sub iracundia, est inimicissimum, & intensiores spasticas constrictiones augendo, tam gravia pathemata inducere valet utique.

OBSERVATIO IV.

*Nimia
hæmor-
rhoides
sanata*

Præfectus militum quadragenario major, natura sanguineus, atque robustus, a multis jam annis expertus fuerat hæmorrhoidum fluxum cum euphoria. Sed quum a sueto vini Rhenani potu transiret ad vini Gallici Pontack potum, elapsus aliquot mensium spatio, hæmorrhoides præter morem sunt retentæ, & successerunt dolores atrocissimi in lumbis & abdomine, cum virilio dejectione, inappetentia, vigilia pulsusque celeri & frequenti. Exhibita vero ter laxante potionem ex tamaridis, rhabarbaro & passulis minoribus, non modo soluta est alvus, sed & ingens nigri & congrumatis sanguinis copia excreta, summo cum levamine. Diutius tamen quam par erat perdurabat fluxus sanguinolentus; quo quia vires nimium atterebantur, datum est electuarium ex rosarum conserva, speciebus de hyacintho, succino, croco martis tenui, & granatorum syrupo, cuius usu ad hebdomadem continuato, ad saniram traductus est æger.

Epicrisis.

Vina illa Gallica coloris saturate rubicundi, uti est Pontack atque Vin de Gray, si sine aqua & liberaliter bibuntur, propter adstrictionem quam alvo præstant, utilia sunt minime, sed experientia teste, admodum noxia. Unde omnibus etiam modis in periodicis & criticis sanguinis evacuationibus sunt vitanda, atque etiam in ipsis excedentibus hæmorrhagiis provide adhibenda. In omnibus autem hæmorrhoidalibus affectibus, sive sanguis fuerit suppressus, sive fluxerit immoderatus, præstantius non datur atque accommodatus purgans, quam quod nostro datum, quo diuturnum etiam fluxum, a copia serosi ac biliosi sanguinis oriundum, feliciter sanatum fuisse, ego vidi multoties.

OBSERVATIO V.

*Hæmor-
rhoides
nimia
in hy-
perbo-
drisco
funesta*

Ante triginta circiter annos Secretarius Regiminis quinquagenarius, corpore spongiosus & carnosus, ob assiduos muneres labores vitæ sedentariæ deditus, ab aliquot jam annis anxiis cardial-gicis doloribus & circa præcordia constrictiōibus, noctu præsertim, subinde fuerat afflitus, alvique ordinario erat strictioris, flatulentis ac ructibus obnoxius, dolores quoque lumbarem sepius obsidebant regionem, urina cum difficultate & saepè arenosa procedente. Hinc calculum subesse renalem judicarunt & varia ad eum proposuerunt amici domestica remedia, inter quæ etiam fuit spiritus baccharum juniperi, cum earum robore subactus, saccharoqne edulcoratus. Ab horum vero usu potius ingravescebant symptomata. Mox enim truculentis spasmis & doloribus inflativis circa hypochondria & abdomen torquebatur, cum partium extremarum frigore & inquietudine, qui emollientes & discutiendi facultate pollentes clysteres etiam eludebant. Tandem accidente cum pulsum celeritate internarum partium æstu, mitescebant quidem dolores, remansit tamen inflatum abdomen, quod nec tactum manus tolerare poterat ob dolorem, appetentia cum viribus, persistente per quatuor septimanas affectu, concidebant. Celebris tum Medicus vocatus, causam horum symptomatum hepatis judicans obstructionem, pilulas Becherianas & mercurii dulcis aliquot doses præbuit. Sed his omnibus irritis, præter omnem expectationem, alvi fluxus, sine torminibus tamen, fecit id corruptæ ex atro-gryseæ materiæ erumperebat, quem animi intercurrentis defectio cum extrema virium jactura tandemque mox excipiebat.

Epicrisis.

Ex vita sedentaria cum arduis mentis laboribus, ob difficultorem redundantis in venis mesaraicis regressum per hepar, hypochondriaca patemata, sive spasmatica flatulenta, quæ calidorum & sanguinem exagitantium immodico usu exacerbantur, accedere, non novum est. Hæc autem tempestiva vescitio ne corporisque moto, & exercitatione omnino posse averti, experientia confirmat, quæ etiam inconfesso est, dolores hypochondriacorum diutius perdurantes demum fluxu sanguinis per venas sedales corrupti hemorrhoidal solvi salutariter. Notavit id jam Solenander, & memoratu digna utique suus ipsius de hoc observato verba, quæ conf. 7. Sect. 2. p. 121. sic habent: Observavimus hypochondriacos aliquot, quibus istæ corporis regiones, & potissimum sinistrum hypochondrium, multo nigro succo, tanquam aro jure distente ac repleta erant. Novimus, quibus similis ex iis locis humor supra infraque obsecrit quod licet cum periculo conjunctum esset, tamen evasisse plures scro, & honesto viro, Johanni Philippo Seidano, fratri, bis illud intra annum accidisse memini, & ante mensem honesta, & nobilis matrona de Luttersdorff, istius atrii succi, & quod mirum est fere insipidi, e dextro hypochondrio, ad libras sex, vel septem, vo mitu rejecit, sed hi plurimique ascite moriuntur. Alia vero ratio, & difficilior evadendi modus est, quando per rectacibus ejusmodi in hypochondriacis doloribus assida lentaque febris jungitur, quæ ab interna visceris corruptione suborta depascens vires, nunquam non periculosa est.

OBSERVATIO VI.

Effusa hemorrhoides soporem discutentes
Non ita pridem generosissima in comitatu Mansfeldensi femina vidua, quinquagesimum annum egressa me accivit, quæ ob lautam, & motus expertem vitæ rationem, sanguine,

Hoffm. Syt. T. IV. P. II.

succi & pinguedine plena, semel tamen tantum ab eo tempore quo menses prorsus cessarunt admisit vescitionem, & ante octo annorum mensum fluxus simul apertas fluentes hemorrhoides passa fuit. Hec diu jam de latitudine corporis & viribus languentibus conquesta, incidit circa æquinoctium autumnalem in gravem morbum soporosum, adeo ut excitari omni sensu penitus privata nullo modo ab eo potuerit. Medicus hujus urbis famigeratus in auxilium vocatus, venam in pede secandam suavit, & potum fontanæ frigidæ præbuit sat largiter ita ut singulis horis uncias aliquot caperet. Absumpsit sic intra biduum 5. vel sex mensuris, post clysterem stimulantem admissum, ingens sanguinis copia, primum crassi, postea tenuioris, per alvum exiit, ita ut intra viginti quartuor horas, plus quam 5. mensuræ profluxerunt. Ex eo illico ægra rediit ad se, sopor discussus, collectæ sensim paulatimque vires, datisque analgeticis leniter adstringentibus, injecto etiam clystere ex pura aqua, frigida, pauca tamen, concocto, bene convalluit.

Epicrisis.

In aqua communi pura fontana & pluviali, eaque frigida, sumnum adversus plures, & magnos morbos repositum esse præsidium, antiqui Medicorum Græcorum, & Arabum sat agnoverunt; recentiorum vero plurimi, qui vulgaria, & simplicia spernere & exoticæ pretiosa magna arte parata tantum in usum vocare solent; tam præstantissimam medicinam, quæ fere universalis est, si cautus & peritus Medicus ea uti scit, hucusque & neglexerunt, & propemodum rejecerunt. Ego vero ante viginti jam annos scripsi dissertationem de aqua medicina universalis, nec non de simplicissimo doloris podagræ remedio, & haud ita pridem de salu-

D. 3. bri-

britate frigidus potus; quin propria experientia, & Medici, qui heic in curationibus suis aqua frigida utitur fere semper, convictus testor, quod potus aquæ frigidæ generosum & valde efficax sit remedium, quo nimia redundantis & ebullientis sanguinis expansio, motibus vitalibus nunquam non adversa, efficaciter componitur, humores viscidi diluuntur & acres mordaces demulcentur, & quod præcipuum, ipso frigore, partibus a tono & robore defectis, conveniens elastica systaltica virtus restituitur, adeo ut magnum roborans sit remedium. In nostra ægrotante valde plethorica, præmissa venæctione in pede, potus aquæ frigidæ immodecum sanguinis ebullientis & vasa distendentes, quæ etiam causam morbi soporosi dedit, vim compressit, & robur systaticum adducendo ac firmando fibras, sanguinis ad venas ani extremas majorem appulsum earumque apertio- nem concitavit. Qua sanguinis effusione, revulsio magna feri stagnantis a capite facta & tota symptomatum depulsa fuit syndrome. Ex quo intelligitur: arte etiam inductum, immoderatum alias & nimium hæmorrhoidum fluxum, sub certis, quod bene notandum, circumstantiis, corporis & causæ morbisca remedium saluberrimum quandoque esse posse.

C A P U T V.

De Uteri Hæmorrhagia Immoderata.

Theses Pathologicae.

§. I.

Non omnis larga sanguinis per uterum fluxio, quæ in foemini sanguineis subinde ob nimiam redundantiam accidit, ac si nimia, & noxia esset, censenda, sed ea demum, quæ vi- rium imbecillitate stipatur, quam posse aliae functionum lœsiones conspi- cuæ, ut inappetentia, cruditas ex mala

digestione, gravatus circa ventriculi regionem sensus, foetus faciei color, pulsus languidus & frequens cum len- to æstu, pedum oedematofus tumor, turbatus & minus reficiens somnus, insequuntur.

§. II.

Hæc nimia sanguinis ex utero effu-
Differe-
sio, ratione temporis quo impetrat mul-
tum variat. Nimirum quandoque statu-
ratione
temporis.
quo erumpere solent menses tempore,
sanguis copiose, & cum impetu effer-
tur; quandoque extra illam lunarem
periodum, bis vel plures in mense, re-
dit fluxus; quandoque ipsa menstrua
purgatio solito diutius per complures
dies liberaliter succedit. Quæ etiam
parturientibus & abortientibus haud
raro accidit hæmorrhagia, aliquando
ante, aliquando post abortum vel par-
tum, erumpit.

§. III.

Sanguis qui utero sic effunditur, tam Quætitu-
ratione quantitatis, quam qualitatis, Quætitu-
taris &
item odoris, & coloris, a medico probe qualita-
debet considerari. Interdum cum im-
petu exit tenuis & satis floridus san-
guis, quem vulgo dicunt das hertz Ge-
blut, idque frequentius in abortu, vel
post eum, a retentis secundinarum fru-
stis, quibus orificio vasorum aperta te-
nentur. Quandoque cum sanguine co-
pioso coagulatæ & carnem referentes
massæ, ovi minoris magnitudine, ex-
cluduntur, quod fit, ubi uterina purga-
tio ad duos vel tres menses subsistit.
Nonnunquam valde grumosus, ater &
coagulatus sanguis nigricans erumpit,
idque subinde primis puerperii diebus,
in gracilioribus & sanguine plenis. In
cachecticis sique diutius jam duravit
profluvium, sanguis effunditur aut val-
de aquosus & tenuis, aut mucidus. In
scorbuticis corruptus, foetidus cum a-
crimonia & dolore. Frequentius etiam,
præsertim in junioribus, vel quæ non-
dum pepererunt, immoderatam san-
gu-

gvinis vacuationem, fluor albus, sive sillicidum materiæ mucidæ albantis impuræ sequitur.

§. IV.

Causa immoderatæ & noxiæ ejusmodi hæmorrhagiæ, in copiosiori & impetuosiori sanguinis ad uterum per gressus arterias affluxu quærenda. Hoc enim si penitus contigit a sanguinis turbato motu, vasa uterina nimium distenta, aut relaxata, dehiscunt tandem, vel disrumpuntur, aut eroduntur, ut sanguis liberaliter effluat.

§. V.

Sola saepius plethora adeo exuberat, ut non solum vasa uterina diducat, sed & interdum plane disrompat. Id vero his fere accidit, quibus menses diu suppressi, postea confertim ac citatius erumpunt; necnon iis, quibus abortus, aut veri aut spurii fetus, quavis ex causa contingunt. A partu quoque laborioso evenit, vel difficiili, quum scilicet vel grandior fetus, vel oblique sit us, nimio conatu excludendus, sub quo vasa vel rumpuntur, vel nimis dehiscunt.

§. VI.

Ordinario fere contingit, foeminas circa illud tempus, quo menstrua purgatio sua sponte desinit, ante annum videlicet quinquagesimum, inordinatâ diuturnam admodum, neque omnispiculicu expertem, ex utero sanguinis fluxionem pati, qua cessante, cessat etiam penitus, dein per uterum sanguinis menstrualis excretio. Interdum etiam, quod aliquoties observavimus, accidit, foeminas annosiores, sexagenarias circiter, subito & ex improvio, immensam cum male odore sanguinis utero excernere copiam, quæ, juncta tandem febre lenta, interierunt.

§. VII.

Emmoderatius sanguinis ex utero

profluvium, eo tempore, quo incipit, vel per intervalla revertitur, ut plurimum præcedunt & comitantur hæc: tensio & inflatio hypochondriorum, circa lumbos dolor gravatus & pressorius, quandoque cum sensu refrigerii junctus, extremarum partium refrigeratio, vasorum detumescens, color faciei pallidus, pulsus citatior, cum interiorum ardore, alvi strictura, urine parcius fluxus. Hæc omnia autem satis abunde testantur, non a causa solum passiva, id est, nimia debilitate & laxitate uteri, sed ab activa etiam, spasmoidicis partium vasculorum & nervearum stricturis, sanguinem ad uterum nimis urgentibus; hoc vitium proficiunt. Unde etiam ratio repetenda, quod foeminae hypochondriacæ, hystericae, & quæ tenerioris sunt ad animi commotiones proclivioris naturæ, hoc molesto malo frequentius afficiantur.

§. VIII.

Nil frequentius est, quam si in puerperio salutare negligitur regimen, neque in eo, neque post illud, uterus a sorribus probe expurgatur, elapsò aliquot mensium spatii, impetuosa hæmorrhagia cum animi saepius deliquio subsequantur, quæ etiam per intervalla repetunt, & non prius desinunt, quam ejecta foras una vel altera massa carnosa, pugni interdum magnitudine, quam femella molam dicunt. Et haec mala procul dubio ex laciniis placentæ relicitis, & succo nutritio in iis per calorem condensato, non secus ac carnes luxuriantes in fauciatis partibus, gignuntur. Dum vero postea mole sua comprimunt venas uteri, sanguinis circuitum per eas retardant & ad impetus ejusmodi hemorrhagicos ac motus uteri spasticos, quibus ille concretiones carnosæ eliduntur, cavam præbent sufficiendum.

§. IX.

Si corpus est caccochymicum, pravis succis plenum; si scorbutica, vel etiam

venerea lue infectum; ubi viscera non sunt integra, hepar, lien, aut vasa mesentaria sanguine crasto infarcta, non caret malum periculum, sed multum negotii medico facerit. Etenim sub ejusmodi fluxu, succorum labes & cachexia semper increscit: eo quod quo plus debilitantur vires, eo minus ventriculus bene appetit & digerit, eo magis crudii succi, qui difficilium in sanguinis boni & liquidi cerebri substantiam transeunt, generantur, eoque minus dein per sueta & congrua emunctoria fit recrementorum excretio.

§. X.

Maxime in parturientibus & viuentibus. Vita valde periclitatur in iis, que ante partum, foetu existente mortuo, magnum sanguinis patiuntur profluvium. Nisi enim extraordinario nature robore & praesertaneo medici auxilio foetus excludatur, vel operatione chirurgica opportune eximatur, mortem sequi certissimum est. Periculosae etiam ex uteri haemorrhagiae sunt, quæ ex ruptis ob secundinam cum violentia extractam vasis oriuntur, necnon quando frustula retenta, postea, in deformes massas, molas dictas, concrescunt, mensum fluxum semper vitiant & nimium reddunt.

CURATIO.

§. I.

Si san. guis abundat, mettentur. In medicatione dextre adornanda, omnino medicus ad varii generis causas & alias atque alias circumstantias, & symptomata debet respicere, quo iis removendis idonea & efficacia convenienti tempore opponere possit remedia. Igitur, ubi nimia sanguinis redundantia & quidem a retardato sanguinis menstrui consueto fluxu immoderatoris haemorrhagiae causa est, non melius ac certius ad præservationem ejusmodi mali suspetit præsidium, quam venæsectio, aliquot dies ante suetum ordinarii fluxus tempus, in partibus superioribus instituta, sufficientem sanguinis copiam, ad sex vel octo uncias

evacuando. Rectius adhuc, si uterinæ purgationis per aliquot menses superessio impetuosa haemorrhagiae causa est, tempestiva sanguinis missione in pede, hæc ipsa avertitur commodissime. Ubi vero jam multum sanguinis profluxit, ad ejus impetum divertendum & ad superiora loca revocandum, parior quantitas est emitenda. Et certe quam præstans sit in venæsectio ne præsidium adversus hunc morbum, conceptis verbis testatur Hollerius in comment. ad aphor. L. Hippocr. Sect. 5. vidimus, inquiens, quæ sanguine multo e vena detraicto convalescunt, quum nullis aliis remediis fluxus sanguinis reprimi posset.

§. II.

Quando nimius ebullientis sanguinis orgasmus sovet & auget hoc malum, ob motum intestinum partium sulphurearum concitatiorem, diluuntur humectantia, refrigerantia auxilio sunt efficacissimo. Atque inter hæc excellit quam maxime sola aqua frigida fontana, modo satis sit pura & subtilis, aut quæ melior adhuc pluvialis, probe conservata & putredinis expers, vel admixta nitri decenti quantitate alterata, vel cum spiritu vitrioli, & syrupo papaveris rhœados in julapii formam reducta, & sufficienti copia pota. Etenim simplex hæc medicina, & diluendo spissos humores, & acres contemperando, nimiumque astum restinguendo, fibras quoque relaxatas firmando, plus certe præstat, quam tantopere a medicis, alia varii generis ad hoc malum domandum laudata specifica. Non tamen postponenda virtus qua pollet hunc in finem ferum lactis dulce, & acidulum, item chalybeatum, necnon aqua Selterana cum latte asinino, præsertim ubi corpora sunt graciliora, tenerioris & sensibilioris indolis, & lenito calore macerantur, item ubi seorbatica & exanthematica acris materia vitalibus succis immixta, graviorem hunc & difficiliorem reddit affectum.

§. III.

§. III.

Spasmodi compone- Ubi spasmodorum & dolorum fero-
di per anodyna. cia, quod subinde in puerperio, item post abortum, atque in hypochondriaca & hysterica passione affectis evenit, sanguinis profluvium ciet, configiendum utique ad ea, quæ blanda & anodyna vi dolores & motus effrænos solidorum placant atque sedant. Hoc nomine liquorem nostrum anodynū mineralē cum pulvere nitrolo simul sumtum, pulveres anti-spasmodicos, qui ungulæ alcis, dentem hippopotami, lapidem manati, cornu cervi philosophice præparatum, pulverem marchionis, nitrum, cinnabarinum, succinum, castoreum recipiunt, merito laudamus, quorum virtus eo fit efficacior, si unum vel alterum granum laudani hysterici, item mastæ pilularum de cynoglossa additur ipsis. Papaveracea quoque, anodynorum lenissima, ut folia papaveris rhæados, in infuso theiformi cum summitatibus miliefolii, & floribus chamomillæ vulgaris, aqua, syrpus, extractum papaveris, laudabilem, præsertim ubi simul humorum peccat acrimonia, opem locant.

§. IV.

Serum impurum alia ad congrua enuncto- ria diver- Quia in hoc affectu frequentius copiofum & vitiosum serum sanguinis immiscet, opus est, ut ad alias vias id dirigatur & per congrua excretoria evacuetur. Perficitur id optime & efficaciter per epicrasin operantia lardendum. xantia, inter quæ manna, rhabarbaro, cassia & tamarindis nihil datur convenientius & præstantius, modo in convenienti & sufficienti quantitate exhibeantur. Nam manna tabulata, ad duas uncias cum drachma una cremenis tartari in infuso ex aqua florum acaciae cum oleo citri, præscribenda pro dosi, alias non sufficiens, & tatis valida fit purgatio. Rhabarbarum optime milcetur cum passulis Corinthiacis in infuso, vel si cum iis in syrupoformem massam redigitor. In paulo robustioribus pulvis mechoa-

cannaæ albæ, ad drachmam dimidiā, vel scrupulos duos, cum æquali tremoris tartari parte permixtus, locum perquam commodum invenit. Divertenda vero etiam serosa illuvies ad renale cibrum, quod præter serum lactis, vel aquam Selteranam, terra foliata tartari, solutio oculorum cancri, nitrum antimoniatum, tintura tartari cum spiritu nitri dulci & spiritu tartari mixta, præstant efficaciter.

§. V.

Impetu sanguinis nimis vehemen- *In rebelle* te ad lipothymian usque persistente, *fluxu ad-* configiendum utique demum ad ea, *ad finem* quæ adstrictoria pollent facultate effi- *gentia* caci, cuius indolis sunt species de *interne-* hyacintho, trochisci de carabe, hæ- *matites*, bolus Armena, essentia *terre catechu*, cum liquore anodynæ & refracta dosi essentia anodynæ remixa, famigeratissima Sylvii mixtura, ad omnes immodicas sanguinis profusiones utilis. Externe vero in *Et ex-* forma emplastri itercus suillum, ace- *terne.* to fortis imbutum, regioni pubis applicatum, sistendi facultate gaudet haud proletaria. Vel concinnandum cataplasma ex foliis plantaginis & polygoni, floribus rosarum, balaustio- rum, coquendum in aceto rosaceo & subfrigide apponendum. Nec minus præstans hoc nomine est effica- cia emplastri spermatis ranarum * cum alumine, oleo hyoscyami & camphora permixtri, ac regioni lum- bari admoti.

§. VI.

Quando fluxio jam per aliquod *ad prius* tempus conquevit, præservandi *securatio-* caufa ad arcendam recidivam, præ- *nem rau-* fertim si corpora sint ferociora, & *bar vis-* cachezia jam adeit, aut imminent, *cervibus* reddens *robur non modo utero*, *sed & dum* omnibus visceribus conciliare oportet. Id vero comode & efficaciter præstari potest pilulis methodo Becheriana paratis, aliquoties assuntis; item elixirio nostro balsamico viscerali, cum tintura

58 *Sectio I. Cap. V. De uteri hæmorrhagia immoderata.*

martis Zwolfferi, vel etiam Ludovicæ, permixto. Laudem etiam merentur juscula alterata cum succo plantaginis, cichorii, acetosæ. Potus fit aqua frigida, in qua aliquoties frustum chalybis candefacti extinctum. Aque quoque Selteranæ solæ per plures dies epotæ, laudabilem præstabunt opem. Contra ea fugienda, vina, carnium, ovorumque esus & omnia ea, qua sanguinem nimium adaugent & exagitant.

§. VII.

Pt. uterustestante, quam maxime abortio & puerperium ad enormes hæmorrhagias, præsertim si uterus postea non bene purgatus fuit, disponere solent; providendum utique omni cura erit, in puerperio, vel etiam post illud ut ipse satis mundificetur. Cui scopo obtinendo feliciter & efficaciter omnino pilulæ Becherianæ, & quæ ad earum imitationem paratæ sunt extractis amaris, temperatis resino-so-gummatis, extracto rhabarbari & refracta aloes gummofæ dosi, concinnatae inserviunt, si non modo duobus aut tribus diebus post partum per aliquot dies sumantur, sed & medio puerperii tempore, simili modo per tres aut quatuor dies ipsarum usus continuetur. Vel pilularum loco infusum ex aqua melissæ, vino, rhabarbaro, herba melissæ, rorifmarini, radice pimpinellæ, agarico, passulis minoribus, corticibus aurantiiorum & citri per aliquot dies hau riendum. Quibus remediis id efficiatur, ut uterus ejusque vasa ab omnibus succorum vitiorum illuvie, atque etiam laciniis, quæ ex retenta secunda remanent & rudimentum molarum carnearum præbere possunt, expurgetur ac liberetur.

Cautelæ & observationes clinicae.

§. I.

Ad persanandum æque ac prote landum hoc malum, potissimum

*Vene se-
cutoris
monita
& cau-
tele.*

prudentiæ medicæ momentum in eo repositum, ut pro differente corporum & causarum ratione, mensura, modus, ac tempus, mittendi eena sanguinis, rite perspiciat & observertur. Scilicet quæ habitioris sunt corporis & a sola sanguinis abundantia sæpe cum immani hæmorrhagia abortiunt; illæ sola subtractione sanguinis, tempestive in brachio celebrata, vel etiam si res postulat repetita, ab incurso hujus morbi possunt vindicari. Contra ea ubi viribus jam valde exhaustis, nimia sanguinis copia profusa, præstat a venæ sectione abstinere. Tum vero e re est, brachium utrumque tepidæ aquæ, cui quippiam vini admixtum, per horæ dimidium immittere, quo sanguinis impetus ad exteriora divertatur. Idque remedium longe efficacius est ac utilis ipsis cucurbitis ad mammae applicatis, quasramen Hippocrates passim in scriptis suis in ejusmodi casibus magnopere commendat.

§. II.

*Si diutius hoc malo colluctantur Aluum-
fœminæ, sive sint biliosæ, sive phle- solventia ne-
gmatico-sanguineæ constitutionis, ceffaria.*
rarius feliciter sine alvum solventibus remedii sanantur. Sunt autem inter hæc optima rhabarbarina, rhabarbarum cum cremore tartari, aut si multum ferofæ colluviet evacundum est, cum tertia parte mechaocannæ albæ acuatum. Utiles quoque pilulæ temperatae balsamicæ, secundum exemplar Becheri, refracta bene preparatae aloes dosi concinnatae, vel loco harum alcephanginæ, vel de succino Cratonis, quarum virtus interpositis nitroso salinis pulveribus, utique exaltatur.

§. III.

*In tenerioribus biliosis & cachecti- Quando-
cis leniora emetica, cuius generis est que eme-
radix ipecacuanha, singulis mensi- tica les-
bus ad arcendum malum exhibita, nia.
non male cessisse novi, a qua methodo ipse Hippocrates & Riverius quo-
que non alieni. Prima enim regio,
ob.*

ob deperditam digestionem, haud infrequenter multorum chronicorum uteri affectuum causam & somitem foyet ac præbet eaque propter ut effaciter depleteur expedit.

§. IV.

Adstringens genia & axodyna causa danda. Validiora adstringentia caute & provide admodum adhibere oportet, quod etiam de narcoticis tenendum, quæ neque in principio, neque etiam ubi vires a nimia sanguinis profusione penitus jam exhaustæ, imminentे fere semper animi deliquio, conductunt. Quin vidi sepius, ab adstringentibus fluxum exacerbatum fuisse; vidi quoque non nullas, ab immoderationi horum uso in immanes & graves chronicas pessimes, cachexiam, hydropem, lentam & hecicam febrem, perpetuum lymphæ ex utero stillicidium, cum intumescientia & tumore duro circa dextrum latus inguinalis regionis, fuisse præcipitatas.

§. V.

Eiam Heurnii pulvis. Pulvis *Heurnii* cuius descriptionem in commentario ad aphorismos Hippocratis Lib. 5. aphorism. 50. exhibet, & quem maximo cum successu semper in immoderationi uteri fluxu se adhibuisse refert, non contemnendus est. Compositio autem ita habet: accipe feminis hyoscyami, papaveris albi ana drachmam unam, hæmatidis, roralliorum rubrorum ana drachmam semis, camphoræ scrupulum dimidium. M. de quo mane & vesperi dimidia drachma pro dosi sumenda. Nos quoque ab ejus usu olim laudabilem effectum vidimus, sed convenit eum exhibere, ubi omnia in actuo. so sunt motu, arteriarum pulsus celesti & vehementi, cum assidua vigilia, atque tum etiam securius, cum ipsi additur nitrum ad dimidiam drachmam; minime vero ubi vires cum sanguine exhaustæ sunt, & pulsus vix digito tangi potest. Nam a feminis hyoscyami uso paulo largiori, in dementia conjectas fuisse quasdam personas novimus. Idem monitum

etiam tenendum de pilulis de cynoglossa, quæ pariter subactum in exhibitione desiderant judicium practicum.

§. VI.

Quando a viscerum obstructione *Minera-les aquæ ad curam* chronicum malum foyetur, cura sine legitimo aquarum mineralium, vel *potissi-acidularum*, vel thermarum temperatiorum usu, rarius ex voto succedit. Expedit vero medicamentis temperate balsamicis hanc curam secundare; & exterius quoque ad robora da viscera ipsumque debilitatum ute-*rum*, silente fluxu, balneo aquarum subadstringenti virtute gaudentium, cuius indolis sunt nostræ Lauchsta-dientes, uti.

§. VII.

Maltum interest, quo potus gene-re utrantur illæ, quæ ejusmodi immo-dicis sanguinis fluxionibus maceran-tur. Neutquam enim ventriculus, in hoc affectu valde imbecillis, omnia æque bene ferre potest. In primis abstinentum ab omni cerevisia, a potu quoque vinoso, ac potius in usum vo-canda decocta, ex rasura ligni santali rubri, citrini, radice cichorei, semine foeniculi & passulis, parata. Qui-busdam solus potus aquæ fontanæ fri-gidæ, alteratus quodammodo syrupo acetositis citri, veltantillo nitri in-jecto, optime cessit. *Ludovicus Se-ptalius* Lib. 7. animadvers. medicar. artic. 144. decoctum corticum auranti-orum, mane ad octo vel novem uncias potum, tanquam remedium cer-tissimum deprædicat, eoque fere in-finitum mulierum numerum ab hoc morbo se liberasse asseveravit, sed inter secreta id servavit. Recepit au-tem aquæ libras septem, in hac in-coxit cortices trium pomorum auranti-orum, aliquando adhuc viridium, interdum etiam addit in fine aliquid *que vi.* herbae pilosellæ. *te vi.*

§. VIII.

Uti in omni præternaturali hæmor-rhagia, ita etiam in hac ipsa, ventri-culi & exacta vivendi ratio maxime *ratio re-nunda tū in cura* ha-

habenda est. Ob vires enim cum sanguine desperitas, ventriculus nec bene appetit, nec decenter digerit, nec rete egerit, sed cruditatum & flatuum copia turget ut plurimum venter. Optimus est cibus siccus, modicus & salubris; minime gelatinosus, difficilioris solutionis & qui inflat. Potionibus, si fuerint aquosæ, subinde modicum vini optimi rhenani, vel genuini viini Pontack, admiscendum est. Ac uti nimium frigus, ita etiam immoderatus æstus aeris nocet. Neque admissenda est nimia corporis quies, neque nimia ejus exercitatio, veneris usus sit parcissimus. Demum si unquam affectus animi præsentaneum damnum inferunt, certissime id contingit in sanguine exhaustis corporibus.

§. IX.

Quam post morbum. Multum tandem refert, ut qui extreme immodicis sati guinis fluxionibus debilitatem, sedato fluxu, convenienti dixit pristinam sensim recuperent sanitatem. Nam si repente cibis se replent, quos imbecillis ventriculus non satis digerere potest, facile incurunt ob cruditates in alias chronicas passiones. Nimurum uti effato *Hippocratis* impura corpora nutrientibus lœduntur: ita etiam valde debilitata. Habenda igitur est quam maxime ventriculi ratio, & analepticis ac nutrientibus cibis quidem restauranda sunt vires, sed parca manu offerantur necesse est.

*ENARRATIONES
MORBORUM.**OBSERVATIO I.*

*Hæmorrhagia uteri cū febre leu-
tæ lethæ-* Vidua hujus loci honesta, jam se-
ptuagenaria, extenuati corporis, se-
dentariæ vitæ multum addicta, post
quinquagesimum annum celsante ex-
tis in toto menstrua purgatione, assueta
vescula, fuit singulis annis circa æquinoctia
sanguinis missione, post annum an-
tem sexagesimum ex muliercularum
consilio eam omisit. Unde intra se-

xagesimi & septuagesimi anni spatium aliquoties pathematibus spasmodico-
flatulentis, tumentibus quoque venis hæmorrhoidalibus externis, inter-
dum etiam sanguinis mictione, tentata fuit. Medicus salutari consilio
fusalit venæ sectionem crebrius repe-
tendam, sed ipsa hujus moniti negligenter, incidit tandem in ingentem
animi mœrorem eumque diurno-
rem, ac paulo post ex improviso im-
modice sanguis per uterum effluxit,
& frustra datis optimis analepticis &
roborantibus, per menses aliquot &
longius continuavit. Tandem cum
intolerabili fetore profluit ex pu-
dendis crux, lenta succedit febris &
summa virium dejectio, donec placi-
de obiret misera.

Epicrisis.

Neque ab immoderata uteri hæmor-
rhagia vetulæ immunes, si plethori-
cæ sunt & sanguinis missione negligunt. Quin si cum vita sedentaria
animi mœror jungitur, quam facile
ab abundante sanguine & in visceri-
bus abdominis, praesertim utero, fla-
gnante, sphacelosa corruptio succre-
scere potest, quam fetor subinde in-
dicat, qui intolerabilis fit, maxime
quando hæc corruptio ad ipsum inte-
stinum rectum penetrat. De fetidis-
simo uteri profluvio historiam quoque
refert *Heurnius in'notis ad aphorism.*
Hippocrat. & quidem 56. Sect. 5. vidi
inquit, nobilem matronam, quæ pro-
fluvio uteri extabuit & tanto fetore
effundebatur, ut nullus non existi-
maret alvo venire. Sed hic fœror longe
alvum superabat. Existimo totum ejus
uterum, in teterimum tabum eliqua-
tum, una effusum fuisse. Languebat
hæc mirum in modum, ac quasi lethar-
go stupebat mente, lente obiit intole-
rabilis fœtoribus, ego sane nil fœtidius
unquam olfecii.

OBSERVATIO II.

Illustris stemmatis femina, flori-
dæ formæ, sanguine & succis plena,
vige-

Hæmorrhagia uteri pessima stipita co-sana-
vigesimo octavo ætatis anno tertium
jam mensem gravida, ex uteri sinu
sanguinem per duas hebdomades exi-
gua quidem quantitate profluere sen-
tit, vehementioris vero saltationis
motu mox in talen incidit hæmorrhagia,
ut universus propemodum
sanguis, usque ad mensuras sex, vel
septem, floridus & fluidus, intra ali-
quot horas, e corpore promanasse vi-
sus fuerit, intercurrentibus subinde
animi deliquiis. Nihil auxilii tam in-
tra quam extra ad cohibendum tan-
tum languinis impetum prætermissum
fuit, sed frustraneo effectu. In tanto
itaque vita periculo coactus ego fui ad
anceps & extremum confugere auxili-
um, linteum scilicet apte contor-
tum & probe solutione capitis mortui
vitrioli imbutum, quod in uteri si-
nam quoisque penetrari potuit, in-
trudi curavi. Hoc non multo post
substitut fluxus, & exhibitis anale-
pticis medicamentis & alimentis ere-
clus quodammodo animus cum viri-
bus. Tertia die post, tentata est ex-
tractio lintei, quæ non fuit sine diffi-
culty, quia illud plane exsiccum
& siccatum erat, ipsique superne con-
grumatus, niger, aridus sanguis ad-
hærescebat. Factum hinc est, ut
quum secessum peteret ægra frustum
massæ carneæ ex utero simul, cum
aliqua sanguinis fluidi portione pre-
laberetur. Quo excluso, quum nihil
amplius exiret, postea per commo-
dam diætam & medicamenta, ven-
triculi digestionem ac vires restauran-
tia, generosa hæc fœmina successive
convaluit.

Epicrisis.

Non novum est, ab incoercibili
sanguinis ex utero profusione in partu
laborioso, in abortu etiam, in le-
thalem syncopen incidere posse fœminas.
Sub tanto autem mortis pericu-
lo, anceps etiam remedium experi-
xi non inconsultum est. Et licet tale
stipticum uteri internis partibus ap-
plicare nunquam antea observatum

vel visum fuerit; tamen hæc ob-
servatio docet, stiptica etiam inter-
nis uteri partibus non adeo esse ini-
mica, siquidem post hæc fœmina
gratiosa admodum & concepit &
peperit feliciter.

OBSERVATIO III.

Judæi uxor annorum sexaginta te-
nerioris & mobilioris naturæ multo
rum liberorum mater, quum tertio
jam mense crederetur gravida, citra
ullam manifestam occasionem copio-
se sanguinem ex uteri sinu prorumpere
senit, exclusa simul non ita mul-
to post massa carneæ pugni magnitu-
dine. Hoc facto nihilo minus per-
mansit fluxio puri & etiam fibrofi
sanguinis cum virium insigni decre-
mento; quin quum gravi terrore
percilleretur, mox continua ad lipot-
hymiam ingruit proclivitas, cor pal-
pitavit, & tremuit cum magna præ-
cordiorum anxietate spirandique angus-
tia, extrema friguerunt, & quandoque,
ut in epilepsia fit, sub ani-
mi deliquio, pollices cum reliquis
digitis fortiter constricti fuerunt. At-
que hæc omnia sub suavi quodam ob-
lato odore, graviora; remissiora vero
sub graveolenti adhibito remedio
fuerunt. Quum itaque omnia despe-
rata adstantibus viderentur, in con-
silium vocatus ego, bono animo ip-
pos esse jussi, ac remotis aliis medi-
camentis, clysterem injici curavi
carminativum, postea ad violentas
systematis nervosi illas commotio-
nes sedandas præscripsi pilulas, quæ
extraictum florum chamomillæ, mil-
lefolii, crocum, castoreum, cam-
phoram & asam fetidam habue-
runt, quarum singulis tribus horis
numero 5. vel 6. deglutitæ fue-
runt. Quibus ægota successive fa-
nata fuit.

Epicrisis.

Uti vehementiores animi com-
motiones in plethoricis magna, ita
in sanguinis defectu longe majora-
dam.

damna procreare possunt, potissimum pathemata spastmodica convulsiva & quæ vulgo in foemini appellari solent hysterica, quibus frequentius puerperæ post lochia infestari solent. Terror vero, si ullus ex animi affectibus, in immodicis haemorrhagiis perniciössimus. Nam sicut quidem ipsas, sed postea graviora concitat mala. Imprudentiae hinc esset, denuo sanguinis missionem tentare. Nihil potius a prudenti medico aliud agendum; quam ut antispasmodicis convenientibus motus hosce intensiores nervosarum partium componat, & per diaphoretica & analeptica sanguinis liberum cursum, per extima etiam corporis, promoveat.

OBSERVATIO IV.

*Memor-
rhagia
uteri post
menstru-
em manen-
tes rebel-
lis sanati-*

Fœmina quinquaginta trium annorum, temperamenti colerico-melancholici, in animi commotiones valde prona, ante annum & dimidium incidit in immodicam sanguinis ab utero fluxionem, quæ die nocte que integrum per annum duravit, & subinde parcior, quandoque vero tam larga fuit, ut cyathos aliquot compleret. Inde maxima animi ad lipothymiam usque nec non virium & appetitiae dejectio sequuta est, intercurrente saepius, mox singulis, mox tertio die, cum horrore præcedente, febricula. Varia frustraneo eventu opposita fuerunt remedia, tandem vero martialium usu cohibita fuit hac sanguinis profusio, sed in ejus locum fluor albus successit, cum tumore pendulum cedemato, spirandi difficultate, inappetentia & alvo adstrictiore junctus. Crebriori tamen pilularum nostrarum, item tinturæ antimoniæ acris, cum spiritu Balsi & liquore nostro anodyno permixta uisu, fluor albuscum tumore cedemato sublatus ad tempus est, licet non ita multo post rufus infestaret, ac tandem suffigio, ex tacamahaca, succino, rasura ebori & floribus sulphuris, ali-

quoties in die usurpato, cum continuatis superioribus remedii, ex toto etiam sanatus est.

Epicrisis.

In hac historia venit illud notatum perquam dignum, quod post illud tempus, quo alias ordinario cessat menstrua purgatio, excessiva adhuc tamdiu prodierit ab utero fluxio; id quod ex parte iracundæ animi affectioni adscribendum. Quoniam autem hic morbus ingentem atoniam viscerum abdominis, præsertim uteri, habuit pro fundamento, ad eam expugnandam & totum restituendum, præter amara atque memoriam efficiam, quæ simul diaphoresis & diuresis movet, nec non suffigia, ad sistendum album fluorem nihil unquam inveni præsentius, & hinc quoque in nostra felicis & saluberrimi fuerunt effectus.

OBSERVATIO V.

Illustris fœmina, constitutione *Hemor-
rhagia
uteri im-
modica
cum me-
ta sanati-*

nerioris, triginta & aliquot annorum, inordinatum mensium saepius experta fuit fluxum, ita, ut ad duos & plures menses retinerentur & postea impetuosis sanguis, primo grumosus, dein tenuis, magna copia profundetur. Tum quidem remediorum convenientium beneficio malum depulsum, sed sequentibus annis, mensibus præsertim hyemalibus, Januario & Februario, suppresso tributilunaris in tertium mensem rufus accessit, ac postea fluxus effusissimus rediit, ex euentibus simul frustis duris foetentibus, cum magna portione aquæ. Tertio anno species molæ prodidit, dura nempe carneâ massa, pellucida alba cincta, multis cellulis referta cum excessiva sanguinis profusione, quam magna virium jactura, inappetentia, ventriculi imbecillitas, nausea, præcordiorum anxietas, dolor dorsi & artuum, cum paucō somno sequuta. Quare ego in consilium adscitus, hac medicationis

methodo, divina favente gratia, æ-
gram à molestissimo hoc affectu libe-
ravi & integre restitui, ita, ut gra-
vida aliquoties facta, singulis binis
mensibus misso e brachio sanguine,
feliciter liberos sanos pepererit. Me-
thodus vero curationis, quæ tribus
vicibus adhibita, in eo consistebat:
per tres dies circa somnitum tempus deglu-
titæ fuerunt pilulae balasticæ no-
straæ, ad quarum operationem pro-
movendam mane post summis drach-
mam pulveris salini, ex tartaro
vitriolato, lapidibus cancerorum, ni-
tro, sale Ebshameni, æquali pon-
dere permixtorum, post quinque dies
descendit mane in balneum, para-
tum ex aqua pluviali, in qua infusa
herba menthae, melissæ, origani,
hormini, salvie, flores spicæ, adje-
cta convenienti quantitate aluminis
& cinerum clavellatorum.

Epicrisis.

Mirum forsitan cuiquam videri poter-
it, quod inter casus nimia hæmor-
rhagia uteri laborantium etiam abor-
tus recensuerimus; verum cum hi
ipsi non aliter fieri possint, nisi præ-
cedente ex utero hæmorrhagia, ea-
que præternaturali, utique curanti
incubit, convenienti methodo, &
foetum in utero servare salvum, &
feminam a gravibus & fonticis pathe-
matibus, quæ a nimia sanguinis pro-
fusione, ceu causa, oriuntur, vin-
dicare. Quæ omnia melius præstari
nequeunt, quam methodo jamjam a
nobis proposta. Potissimum balnea
& in secessu ex convenientibus reme-
diis parata, in diuturnis uteri morbis
& vitiis corrigendis, si ullum aliud,
plurimum valent. Et sic multæ ad
foetum vivacem edendum inhabiles
ac laxe abortientes, ad gestationem,
partum & grata matrimonii pignora
idoneæ redditæ fuerunt.

C A P U T VI.

Generosa fœmina 40. & aliquot
annorum, fluxibus ex utero immo-

dicis saepius laboravit, tandem a ve-
hementi terrore in immanem hæmor-
rhagiam incidit, ad quam sifendam, ^{Hæmorr}
Medicus venæ in brachio sectionem, ^{rhagia}
pilulas Stahlianæ, pulverem anti-
spasmodicum, neque minus essen-
tiæ millefolii, tincturam martis ^{uteri}
Ludovici, massam pilularum de cy-
noglossa, sed omnia incassum, ad-
mixta ^{ana} ^{leptica} ^{phoretica}
hibuit. Eruperunt potius frusta san-
guinis congreymati cum foetore, cui
malo mixturis analepticis, item tin-
ctura martis cydoniata cum arcano
tartari maritata, & ad alvum perti-
naciter constrictam, magnesia alba
frustra obviam ivit, & iterata rursus
venæ sectione in brachio, sanguis
serosus lixiviosi saporis, profluxit.
Diutius itaque perleverante hoc flu-
xu, mirum non modo vires langue-
scabant, sed & lipothymiaæ, capitis
dolores, vertigo & aurium impotus
accedebant. Unde ego in auxilium
vocatus, sequentem dare jussi mixtu-
ram: Recipe aquæ florum sambuci,
tiliæ, liliorum convallium, melissæ,
ana unciam semis, theriacalis, cin-
namomi sine vino ana unciam semis,
aciti destillati unciam, lapidum can-
cerorum drachmas duas, antimonii
diaphoretici drachmam, spiritus nitri
dulcis guttas 30. syrupi acetosi-
tatis citri drachmas sex, M. D. de
qua quotidie bis vel ter, duo co-
chlearia sumere præcepi. Ad regio-
nen pubis vero epithema ex herbis
menthae, melissæ, rosmarini, origani,
floribus rosarum rubrarum,
& cortice chaccarillæ, cum vino
rubro, Pontak, coctum tepide ap-
plicare, manusque saepius de die in
aquam tepidam cum vino rubro
mixtam, immittere jussi, pro potu
suasi decoctum santali, lentisci &
radicis cichorei. Quibus dextre ad-
hibitis remedis, hæmorrhagia ute-
ri cum omnibus symptomatibus ces-
sit, & generosa patiens, recuperatis
sensim viribus, optime convaluit.

Epicrisis.

Nimis frequens & repetita uterina hemorrhagia ingentem eteri ejusque vasorum atoniam subindicat, ad quam removendam, Medicus maxime apta remedia porrigerere debet. Huic vero scopo obtinendo, neque adstringentia, neque anodynæ, neque nitrofa, aut sola refrigerantia interne sumta, respondent, sed applicanda etiam ad confirmandum harum partium robur externa idonea remedia. Præterea mixturaæ analepticæ & diaphoreticæ, cum convenientiæ regimine calido, ad transpirationem, si malum urget, & alia, spectatissimæ alias virtutis remedia respuit, augendam, divertendo non modo languinis imperuæ, sed & acrimoniam, quæ sèpius abest, demulcendo, insigni emolumento sunt.

OBSERVATIO VII.

*Hæmorrhagia
uteri ex
infelici
secundi-
ne extra-
ditione.*

Ediderat felici partu gemellos foemina fere trigenaria, sed retentis paullo diutius secundinis, extractionem eaurundem molita est obstetrix. Quod quum non sine violentia perficeret, remanserunt frustula nonnulla, & sequutus tam immodicus lochiòrum fluxus, ut aliquoties animi deliquium incurreret puerpera. Quin ex eo per dimidium anni stillicidium successit ex pudendis sanguinolentum, plane refractarium & fere perpetuum, vix quandoque ad aliquot dies inducias concedens. Bis etiam interea simul excreta massa ovi gallinacei minoris magnitudinem referens, cuticula obducta pellucida & intus habens liquorem spissiusculum turbidum atque foetentem. Pessime ea propter habuit misera, appetitus periit, vires considerunt, caro contabuit & vix corpori movendi superfuit potentia. Tandem haud ita pridem a me salutare petiti consilium, qui ipsi fasili usum pilularum Becherianarum, cum æquali portione extracti rhabarbari & aliquot grani pulveris antimonii martialis sic dicti cacheoticæ, mixtarum,

& exterius pubis regioni admovere, ac si fieri possit, ipsum in uterum injicere jussi, decoctum melissæ, menthae, caryophyllorum, mastiches, florum rosarum rubrarum & balaustrorum, ex vino Gallico, quod vocant Pontak. Qua methodo quibusque præsidiis plures sanitati redditas fuisse novi.

Epicrisis.

De infelici extractionis secundinæ cum vi quadam factæ successu, plures in artis exercitio notavimus observationes. Nam si quando dissiliunt in frusta secundo partu edenda, & ex his non nulla remanent, in corruptionem ipsa abeunt, & colliquata ichorosum faciunt fluxum, simul lentum quandam accidunt calorem, vires mirifice dejicientem. Quandoque præpostero hoc molimine enor- mis inducit hæmorrhagia, cum omnimoda fere virium jactura, quin ipsius vita periculo. Non nunquam etiam ex relictis frustulis succrescent postea concrementa fungosa, ex membranis in variam formam & magnitudinem contexta, quæ molas dicunt spuriæ, continuo materiaæ sanguinolenta serosa fecit & stillicidio stipata. Frustra autem, teste experientia multipli, pugnatur contra hæc mala internis solis, ac potius locis affectis ipsique utero, nimis partim laxato ac debili, partim lasso & exulcerato, admovenda injectionis, aut epithematis forma, ea, quæ roborant ac putredini resistunt. Interna enim salva sua textura eo pervadere & virium tollere nequeunt; sed quæ immediate labi affectas partes tangunt operatio- nis sunt & celerioris, & melioris. Unde longe profecto opportunius & efficacius iuxcurri posset gravibus & diuturnis in utero morbis, qui haud raro post partum accidentunt, si tam lubenter admitterentur injectiones ejusmodi & topica uterina, quam quidem veteribus pessos admovere moris fuit.

OBSERVATIO VIII.

*Ex ha-
morrhagia uteri
Heurnii
pulvere
sublata
pathemata
ta cura-
ta.*

Adiit Carolinas thermae foeminae viginti quatuor annos habens, sanguinea, iisdemque ad hystericae qualiter detinebatur, passionem debellandam ex medici consilio usus est. Sed ipsum inter usum, minus forsitan dextrum, experta est inordinatum copiosum sanguinis ex utero fluxum & postea ad aliquot interdum hebdomas durantem. Inde virium debilitatem, appetitus defectum & languorem cum lurido faciei colore incurrit. Medicum igitur vocavit in consilium, qui pulvere Heurnii sanguinis profluvium composuit quidem; at ingens postea praecordiorum anxietas cum cardialgia infestavit, ipsam suffocationem minitans. Unde ad hanc mala depulsanda multis variisque usus est remediis, quorum tamen nullum effectum edidit speratum. Sumsit quoque ex aliis medici suauem emeticum, quo multum viscidæ ac viridecentis materia exturbatum, & nonnihil levaminis allatum. Nihilo fecius sanguis paulo post largius profluxit & ægram ut de malo funditus extirpando esset sollicita coegit, id quod etiam fortunante Deo praestitum est his; pilulis nempe nostris balsamicis, quotidie ad aliquot grana, interposito pulvere ex antimonio martiali cachectico, nitro antimonio & depurato, assumtis, usurpata subinde tintura martis Zwolferi, & poto cerevisiae loco decocto ex radicibus & lignis temperato.

Epicrisis.

Mineralium aquarum usus non minus nimium fluentibus, quam suppressis ex utero fluxibus, opitulanter; sed prudentem & peritum desiderat medicum. Nam morbus uterque, inveteratus præsertim, ab obstructione & farctu vasorum uteri dicit haud raro natales, ea tantum cum differentia, quod nimio profluvio obstaculum liberi progressus sit in va-

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

sis majoribus venosis; in deficiente vero in vasis minoribus, maxime arteriosis. Minerale autem aquæ utique impedimentum hoc tollere valent, eaque propter præstant utrumque. Id vero tenendum: utendum esse iisdem non ipso sub fluxu, sed extra eum, ad arcendum recursum. Si fecus fit, augetur uteri laxitas, augetur affluxus. Tum potius per balsamica roborantia interius & exterius utero remissi robur reddere, ac postea, ne repetat profluvium, minerale aquas ad eluendos meatus eosdemque servandos apertos, in usu vocare convenient.

OBSERVATIO IX.

Illusterrimi Consiliarii uxor, quæ quadragesimum jam compleverat annum, habitus valde teneri ac gracilis, animique admodum mobilis & sensus exquisitissimi, aliquot abhinc annis per semestre fere spatium diuturno & fere assiduo ex utero fluore alternante cruento laboravit. Hinc primum medicis loci usus, ab eorum medicatione effectum sensit nullum. Unde contulit se ad virum quendam celeberrimum, qui brevi felicem ac certam opem spondens, pilulas suas ipsi commendavit, ut de his quavis hebdomadeter vel quater sumeret, idque aliquamdiu. Sed inde etiam vix quicquam levaminis est experta. Demum meum petiit consilium, quo potum Selteranarum per mensem & ultra in cura cum debito regimine, interposito interdum laxante, suasi. Quod priusquam faceret, B. D. Brunneri judicium exquisivit, qui meo pariter calculum adjecit consilio. Unde tanto majori fiducia ad usum hujus præsidij accessit; atque etiam ex eo tam salutarem percepit effectum, ut haemorrhagia sensim remitteret, penitus tandem cessaret, ac ipsa ad pristinam perfectam sanitatem rediret.

E Epis.

Epicrisis.

Concinnatæ illæ ad mentem & methodum Becherianam balsamicæ pilulae utique in affectibus ex utero, præsertim in serotinibus, item puerperii tempore, debita sua non defraudandæ sunt laude. Sed quod medicus pro lumbitu iisdem & inordinatas ac nimias hæmorrhagias moderari ac sistere, & vicissim menses, si suppressi sunt, revocare possit, id non sine ratione inter fabellas reponendum. In nostra certe id docuit eventus. Fons autem Selterianus acres & tenues humores diluendo & temperando, eosque per diuresin efficaciter evacuando, sive causam spasmos hæmorrhagiarum auctores suscitantem tollendo, non potuit non prodidisse egregie.

Confer quoque eos casus, qui *Sect. 3. 110. & 111. item 126.* legi possunt.

C A P U T VI.

De hæmorrhagia ex urinariis viis.

Theses Pathologicae.

§. I.

Hæmorrhagia per urinarias vias quid? **V**enit hæmorrhagia in scholis plerumque mixtus cruenti nomine, & est sanguinis per urinarias vias, cum, vel sine urina, sive ex renum, sive vesicæ valsis, nimium ampliatis, ruptis, aut arrosis, emissio, pro circumstantiarum ratione plus vel minus periculi habens.

§. II.

Quomodo dignoscere fatus mixtus. Haud raro accedit, ut medici in di-gnoscendo: utrum sanguis cum urina mixtus sit, nec ne? eximie fallantur. Si quidem majori in copia, ut interdum contingit, ad libram & ultra, sanguis sincerus cum urina mixtus, vel pars aliqua cruentis sine urinæ connubio, prodit per urinarium meatum, res nullo eget discrimine. Si vero cruentus urinæ fuerit admixtus parcius, tunc paulo curatori opus est scrutinio. Sapere enim mingitur lotium coloris sanguinei; sœpe etiam deponit sedimenta-

tum non aliter ac sanguis solet, nullo tamen præsente sanguine. Sæpius viscidissimum bruni, vel nigrescentis coloris urina emittitur, ut nulli suspicio sanguinis, qui tamen mixtus est, in sensu & mentem incurrat. Quare suggerenda utique sunt certa indicia, e quibus hoc tam multiplex discrimen perspiciendum. Scilicet si rubedo urinæ sanguini emula a particulis sulphureis, mixtura salium, præsertim alcalinæ indolis, exaltatis, proficitur; tunc quam primum emissâ fuit, clara & perspicua appetat, sedimentum vero incarnati & cinnabarini coloris est; quod tamen, sufficienti calore admoto, mox in supernatante liquorem se recipit, ut clara rufus & perspicua ut antea appareat. Contra vero quem urina rubet a sanguine, tunc opaca & crassiuscula sine perspicuitate mingitur, sedimentum vero est grumosum, ex rubro nigricans, idque non dissolvitur, aut rufus ab urina absorbetur. Si etiam lotium rubedo est a sanguine, linteum per quod colatur, tingit rubore, quod non fit, quando est a salibus color tantum intensus.

§. III.

Quia plures urinæ secernendæ & *Et unde excernendæ* serviant viæ; scire refert discrimen: unde profluxerit mixtus redditus sanguis. Quod si itaque sanguis sincerus consertim, repente & sine dolore mingitur, ex renum substantia languineo vasculosa illum prodidisse recte jam judicavit *Hippocrates Sect. 4. aphorism. 78.* Sed ubi parcior sanguinis quantitas, obscuri nigricantis coloris, cum vel sine materia purulenta, maxime si cum dolore & ardore in pube sub mixtione, vel post eam redditur, tunc ex vesica lœsa, aut exulcerata illum stillasse eertum. Quod autem renalis sanguinis effluxus sine, & qui ex vesica venit cum exquisito dolore succedat, id diversitatè structuræ tribuendum: renes enim exquisito carent sensu. Sed quando sanguis per nervosas acutissimæ sensationis vesicæ tunicas viam

molitur; dolor non potest non oriri atrocissimus, nec mirum gravissima tum incidere symptomata, animi deliquia, spirationem difficultem, pulsum obscurum, parvum & frequenter nonnunquam, nauseam, animi anxietatem & frigidum sudorem. De quo mictu etiam conferri meretur, Hippocratis aphorism. lib. 4. aphorism: 80. Si quis sanguinem unaque grumos s^ep^e mingat ac stranguriam habeat, unaque dolor incidat in aquiliculum & in interfemineum, huic vesice vicinae partes laborant. Quando porro ex uretheribus, a calculo magno, vel aspero le^sis, sanguinis quippiam cum urina miscetur, dolor circa lumbos & ilia acutus, difficilis fabulosa mictio, aliaque calculi in uretheribus harentis signa id manifestant. Propter le^sis a calculo vesica ejusque tunicarum sanguinea vascula, si excernitur quippiam cruoris, non modo cum summo dolore & prævia obstructione quandoque urina prodit, sed & grumi interdum cum moleculis crassioribus fabulosis firmiter compatti una cum ea emituntur, quod etiam interdum accidit, si calculus in rene firmiter impactus eum fauciatur.

§. IV.

*Allaspe-
cies ex
vesica
ejusque
spincter-
is.* Alia adhuc mictionis cruentæ species datur, cuius tamen raro mentio fit a scriptoribus medicis, quæ videbilec^t ex ipsis vasis vesicæ, vel potius ipsis sphincteris contingit, quando nimium hiant & a sanguine distenta aperta fuerunt. De hac mictionis cruentæ specie notatu dignum est Galii Aureltani lib. 4. tardar. passionum cap. 4. effatum ita habens: solent, sicut in podice, vel feminarum sinu, aut matricis collo, etiam in vesica, hemorrhoides generari, que fluorem sanguinis praestant, qui busdam intervallis variatum. Quod oportet apprehendere prudentem, cum non coaceruata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interjectis deflectionibus, ac retento

sanguine dolore circa pubem, siquidem aliquando inflatæ ac tumentes hemorrhoides difficultatem vel abstinentiam faciunt mictus, dysuriam Græcis vocatam, vel ischuriā. Archigenes vero dicebat, ut stotis periodis menses & hemorrhoides, ita & certis vicissitudinibus interdum plethora se effundit per renes & vesicam. Cui merito addendum Heurnii Comment. in aphorism. Hippocratis 78. de signis discriminis loci præceptum: sanguis qui a musculo vesicæ emingitur, non exakte permissoetur urina, sed in fundo depositus grunescit, quin hic grumus, qui interdum citra urinam excidit, dolorem circa vesicæ musculum consistentem facit; a rene vero qui mingitur sanguis & copiosus est, & urine exakte miscetur, videturque tota urine consistencia nihil aliud esse, quam tenuis ac dilutus sanguis; mox tamen sedet liquidus minimeque concretus & rubicundus.

§. V.

Non autem confundi debet ipsa *Differ-
sanguinis mictio cum gonorrhœa, gonor-
rœive seminis fluxu sanguinolento.* Non enim adeo est insolens, ut in *sanguini-* *olentiis*, qui gonorrhœa laborant virulentia, ex glandulis prostatis valde relaxatis, ob majorem lymphæ, vel seri affluxum, non modo seminalis liquor, sed & serum mucidum, arenulis etiam resertum, interdum quoque per intervalla plane sanguis ex hiantibus nimium, aut ab acrimonia materiæ effluentis arrosis valorum osculis, per urethram, citra urinæ fluxum, emittatur.

§. VI.

Probe etiam a sanguinis mictu *Abs hei-
gnoscere oportet illum sanguinis morbi
fluxum, qui fit per membra virilis
integumenta.* Nos aliquot memoria tenemus exempla, ubi certis periodis in viris ex ipso pene fluxit sanguis per aliquot hebdomades purus, satis largiter, præcedente tensivo quodam in sanguine ac fe-

moribus dolore. Collegit etiam ejusmodi exempla *Stalpart van der Wiel*, Cent. 1. observat. 80. Sed tum sanguis non prodit urinæ mixtus, sed stillat seorsim guttam, ex ramo vasorum hæmorrhoidalium exterio- rum, qui ad pudenda excurrit.

§. VII.

Salutaris est quan-
doque. Dein tenendum discrimen mictio- nis cruentæ criticæ & salutaris, a mi- nus tali & morbosa. Illa quippe fit frequentissime per renes magna in copia, rarius & in minori quantitate per sphincterem vesicæ, citra do- lorem & magnum incommodum, & redit etiam certis periodis. Contingit hoc maxime per translationem, sive quæ Græcis dicitur metastasis, excernendi sanguinis per menses, aut hæmorrhoides, iis vel cessantibus, vel obstructis, aut suppressis. Vidimus nos talem criticam mictio- nem liberaliorem in viris, sanguine abundantibus, sive plethoricis, ju- venilis, vel etiam senilis ætatis, sup- presso, vel etiam penitus cessante hæmorrhoidalí fluxu, aut consueta omissa sanguinis missione, periculi tamen prorsus expertem. Vidimus quoque in foeminis octogenariis, ve- getis & laute adhuc viventibus, præ- fertim si cessantibus mensibus sanguini- mis missio vel fuerat neglecta, aut plane omessa.

§. VIII.

Poſt sup-
preffas
hemor-
rhoides. Præterea non semel, sed aliquo- ties notavimus in senibus, deficien- te fluxu hæmorrhoidalí, item in vi- ris ætatis consilientis, hæmorrhoidi- bus cæcis & tumentibus si afflicti fue- rint, a motu corporis & animi for- tiori, sanguinis portionem non ex- iguam, bruno colore instar decocti caffee tincti, citra urinæ difficultatem cum mictu prodiisse; qui procul omni dubio ex vasis vesicæ sanguineis circa sphincterem ejus tumentibus & apertis profectus fuit. Venæ enim hæmorrhoidales externæ communi- cant cum vesica & ramos etiam ad eam spargunt; minime vero, ut non-

nullorum fert opinio, de internis id putandum, quarum ramos ad vesicam excurrentes anatomicus huc usque vidit nullus.

§. IX.

Succedit vero hæc sanguinis cum *Quomodo*
mictu excretio, ex aliis sanguineis *fuccedas*
suppressis, hæmorrhoidalibus potissi- *ex reni-*
mum, per renes, dum videlicet san- *bus.*
guis accumulatus & per arteriam me-
laraicam inferiorem ad tunicas inte-
stini recti adductus, ibi cum exitum
non invenit, quasi regurgitat ad
truncum arteriæ magnæ, sive potius
majori copia ibi colligitur, & ad
vasa renum arteriosa, quæ & copia,
& magnitudine, venas emulgentes
superant, delatus, orificia eorum ni-
mis distendendo & aperiendo, ad tu-
bulos urinarios, qui cum arteriola-
rum finibus connexi sunt, ex his in
papillarum oras, in pelvem, inde
tandem ad uretheres & vesicam tran-
sit. Atque adeo in tali casu nec ana-
stomosis, nec diæresis, nec diape-
desis, tantopere ab auctoribus de-
cantata, locum obtinent.

§. X.

Vesica tam etiam excretiori san- *Quomodo*
guinis obnoxia est, quia valde diffi- *ex ves-*
cili est, ob perpendicularē & valde *ca.*
demissum ejus situm, sanguinis per
venas ex ipsa regressus. Quo fit, ut
sub hæmorrhoidibus externis tumen-
tibus, vel internis obstructis, in ple-
thorieis præfertim, accumulatus &
ibi stagnans sanguis, præter naturam
orificia vasorum capillarium ipsius
vesicæ, vel magis sphincteris, ape-
riat atque perrumpat.

§. XI.

Maxime omnium fluxus hæmor-
rhoidalis suppressus, vel ex quacunque *Causa*
alia causa cessans, causam mictionis *potissi-*
cruentæ, maxime illius, quæ fit per re- *ma sup-*
nes, subministrat. Notatu dignum *preffæ*
hanc in rem est exemplum, cuius me- *hemor-*
nimit *Hercules Saxonia lib. 3. cap. 4.* *rhoides.*
nobilem Batavum, fluxu hæmor-
rhoidum suppresso laborantem, per
quinque annos, ex intervallo, mul-
tum

tum sanguinis sponte & subito ante urinam ex urethra emisso. Rofinskijus quoque *Dissert. anatom. Lib. 5. cap. 26.* aliam historiam refert: *Illustris vir,* scribit, *hemorrhoidali fluxui assuetus, eo suppresso, incidit in mictiōnem cruentam, multarum septimanarum spatio durantem, que evanuit hemorrhoidibus apparentibus, levi fluxu & parco satis, ita, ut vix aut terga tingeret.* Neque minus Reifelius ejus. *64. casum memorabilem enarrat, de paatore quodam, ob hemorrhoidum a triennio suppressionem, magnam sanguinis crassi & sinceri, sine urinārum aquis, cum impetu promanantem & matulam replentem quantitatem, excernente, qui tamen per totam vitam nihil sanguinis e vena misserat.* Cum vero hic eundem paroxysmum, ter statim circuitu, expertus fuisset, secesserunt tandem naturales & limpidae urinæ. Postquam autem medici consilio vino usus fuerat paulo largius, & diebus aliquot continuatis pilulis ex aloë, succo cichorii imprægnata & extracto trochis corum alandal, hemorrhoides ei fluxerunt & malum cessavit.

§. XII.

*Motus
dein cor-
poris for-
tior ma-
xime
equitatio.*

Utut vero omnis motus corporis fortior in plethoriciis facile ad hemorrhagicas excretiones suscitandas anfam præbet; speciatim tamen ad mictionem cruentam nulla ipsius species majorem vim habet equitatione. Possemus ejus exempla plura afferre, quæ etiam paucim apud auctores reperiunda. Sic *Riverius Centur. 2. observ. 36.* memorat de quinquagenario, qui quoties equitationi peregrinationis causa sese commisit, urinas sanguinolentas reddit. *Hollerius quoque in Aphorism. 78. Sect. 4. Hippocratis inquit: Sunt nonnulli, qui si durius equitant, aut sese exerceant immoderatius, ex cæsacitis renibus, sanguinem mejunt.* Et paulo post: arbitramur, ait, *sanguinolentam urinam & turbidam reddi ab hoc Re-*

Hoffm. System. T. IV. P. II.

*verendissimo Episcopo propter dilatationem factam tum in cavitatibus renum, tum in vasis urinariis, propter intensam caliditatem, a motu violento primo generatam, dum currū, salebroso itinere concuteretur, præcipue circa dorsi regionem: deinde succedente ingenti calore, dum cum ueste pellicea sub sole ardente montem ascenderet. Ex his igitur omnibus tantus calor circa partes renum fuit excitatus, ut ob nimiam dilatationem, urina sanguinolenta excreta fuerit. Et inde est, quod nunc quoque quotiescumque fatigatur corpus exercet, in idem symptoma incidat, turbidae scilicet sanguinolenta urinæ. Ratio vero, quare equitatio, cujus alias in præcavendis & etiam sanandis chronicis affectionibus magna vis & efficacia est, ad hemorrhagiam renum & velicæ plurimum disponat, inde pertenda venit, quod propter compunctionem venarum in femoribus, in perineo etiam & ano, sanguinis recursus multum retardetur. Hinc copia sanguinis major fit & incrementat in arteriis, motusque sanguinis in superioribus partibus augetur & intensior fit præsertim circa lumbos, per motum succusorum. Sic facto citatori sanguinis affluxu, emulgentes tandem arteriæ quam facile aperiuntur. Recte enim scribit *Malpighius tractatu de renibus: In nostro corpore, præter pulmones, non alia est pars, quæ exundantis sanguinis injuriis magis subjiciatur, quam renes.**

§. XIII.

*Deinceps sanguineæ mictionis, Calculus
sed magis prioris infestæ & periculo-
sæ, causam non infreenter calculi
in rene delite-
scens.*

Deinceps sanguineæ mictionis, *Calculus* sed magis prioris infestæ & periculo-
sæ, causam non infreenter calculi
in rene delite-
scens.

Multa enim hujus succurrunt exempla, & tale quoque habet *Hoffm. libr. 4. observ. 37.* ubi sine omni lumborum dolore, calculosi, præsertim qui sanguine plus justo abundant & corpus vehemen-

ter motu exercent, sanguineam emit-
tunt urinam. Quomodo vero hoc fiat,
vero videtur simillimum, quod cal-
culus mole major ac figura asper, sine
dolore quidem intra renes diu delite-
scere possit, nihilo minus haud levem
compagi renum vasculosa labem suo
afficit ac compressione inducat, eo-
rum quoque functionem naturalem
laetatur, & sic ansam erumpendi sanguini
præbeat. Scilicet quando calculus
mole & pondere suo ramos venæ
emulgentis comprimit, liberiorem
sanguinis transitum perhos impediens
do, efficit, ut per arteriolas emul-
gentes adductus, nimia copia & im-
petu earum tenues & capillares ramu-
los, qui ultimo terminantur in tubu-
los urinarios, valde distendat & tan-
dem viam sibi faciat in eos, qui se-
cundum naturam tantum urinam
vehunt, eosdemque subeat ac in urinam
transeat. Id quod longe adhuc
magis fit, quando in dispositione ad
calculum, variis generis remedia,
qua urinam & calculum pellunt, com-
mendantur & applicantur, ut qui-
dem communis & pessima est consue-
tudo, præsertim si calidiora fuerint,
ex terebinthina, succino, vel juniper-
o parata. Fit etiam tali in casu,
ut calculus in renalibus tubulis incar-
ceratus, arrosione & excoriatione di-
lacerando minima renum vacula, si-
ve sphunculos, exulcerationem effi-
ciat. Qua facta, pus cum sanguine
per uretheres in vesicam instillat, &
sic mictum valde dolorificum, exeunte
puris & sanguinis corrupti cum urina
portione, producit. Id quod tamen
etiam quandoque fieri potest, quan-
quam rarius, ab uretheris per calcu-
lum exulceratione.

§. XIV.

A vesica Mictionis quoque cruentæ, copio-
arrosione sae & valde ancipitis species est, quan-
& ulcerare do ex vesica, ab acriori præsertim ibi
stagnante copioso sanguine, exulce-
rata, mucosa valde, ex parte puru-
lenta & cruenta materia in ejusdem
cavitatem descendit. Tum enim cum

intenso ardore, intolerando dolore
& difficultate urina redditur, simul
que tremores & convulsivæ artuum,
cum frigore & tremore stipatae mo-
tiones, sese jungunt. Vidimus id
aliquoties in gonorrhœa desperata &
inveterata laborantibus, acri simul
& corrosiva materia e genitalibus
profluente ac partes vicinas arroden-
te. Quæ labes interna ubi adest, ac
renum, vel vesicæ substantia simul
corrupta est, & purulenta ac putrida
materia copiose fecedit, urinæ exeunt
furfuraceæ, & parvæ carunculæ, aut
corpora, capillos, vel vermiculos
æmulantia, in urina conspicuntur,
quæ a vesica nequaquam possunt ab-
scedere. Hæc enim resolvi nequit in
ejusmodi filamenta. Sed a contenta
mucosa, vel in renibus, vel in ves-
ica, materia, concrescunt in ejusmo-
di figuram & consistentiam.

§. XV.

Accedit aliud cruentæ mictionis *A vita-*
genus, a causa videlicet externa, *lentia*
contusione, lapsu in terram, leva-
tione onerum & percussione produ-
ctum. Hoc quidem in vita civili &
praxi sæpius occurrit, causam tamen
ipius reddere non tam promtum ac
obvium est. Quod si enim vasorum
in renibus ruptio, vel continui solu-
tio, causa foret, non tam subito,
uti tamen fit, per venæ sectionem &
sanguinem dissolventia posset sanari.
Nos potius modum ita concipiendum
esse censemus, quod a contusione &
contorsione vasorum, in primis san-
guineorum, & ibi stagnante sanguine,
ejus circulatio per has partes la-
fas impediatur; hinc crescere impe-
tum & copiam sanguinis in vasis in-
ternis; atque hæc nimium inde,
præsertim in plethoricis, distenta,
ut sanguis locum mutet ac effluat, fa-
cere. Tale quid enim commode ma-
xime fit in renibus, si ibi facta fuit
percussio. Unde sunt inter exempla,
ubi etiam a subluxatione vertebrarum,
cruenta inequuta fuit mictio.
Quis sicuti ex tibia amputata dysente-
riam

riam *Hildanus Centur. 2. Obser. 10.* sic etiam & nos observavimus, ex osse tibiae fracto, urinam cruentam redditam fuisse. Ut adeo facile concipiendum sit, a contusione venarum & sanguine sic stagnante alicubi fieri posse ejusdem per urethram stillicidium.

§. XVI.

Anormi- A terminibus atrocibus ventris, *nibus &* item a sumtis acrioribus purgantibus, nec non a diureticis acrioribus, ut cantharidibus, urinam reddi postle cruentam, experientia est confirmatum. Debetur autem hoc symptomam spasticis venarum strictris, quibus liber sanguinis circulus intercipitur. Unde ex facili jamjam ratio reddenda, quare morbillis, & variolis in primis malignis, funestus ejusmodi affectus interdum associetur. Prostant quidem observationes apud auctores, quod a vesicatoriis quæ habent canthrides, externe applicatis, cruenta fuerit mictio exorta, interim nos fatemur candide, a nobis nunquam tale quid visum vel observatum esse, ut haud injuria hanc operationem in dubium vocare liceat, ac forsitan longe ab alia causa in morbo sub applicatione vesicatoriorum hæc cruenta urina excreta fuisse possit.

§. XVII.

Mictus Omnis vero cruentus mictus est periculi non expers. Etenim licet etiam *pericu-* in principio salutaris & criticus, a *lus.* palindrome facta ob mensium vel haemorrhoidum suppressionem, visus fuerit; tamen quia non modo facile revertitur & vires exhaustit, sed & si error accidit, vel in diaeta, aut si imprudenter sipticis tractatur, inflamatio ac corruptio facile ipsis renibus, vel vesicæ induci potest, utique periculum alit. Incidit præterea & hoc frequentissime, quod grumus quidam sanguinis ex renibus descendens, in ea parte, ubi urethra ductu obliquo inseritur vesicæ, impensus, valde infestam & difficulter sannabilem inducat ischuriam. Quan-

doque etiam congrumatur in vesicæ cavo sanguis, & sphincteri firmiter int̄rærens, implacabilem cum urinæ suppressione præbet dolorem, id quod etiam accidit, quando vasa sphincteris sanguinea, non secus ac hæmorrhoides cæcæ, sanguine crasso admodum turgent.

§. XVIII.

Pericu- Ex pericolissimis mictus sanguinolenti speciebus est, quæ ex rene, *loffi.* vel vesica profundius læsa & ulcerata *mus cum* venit, & junctum habet cum acerbo *mictus.* dolore puris mictum. Interim tamen cavendum ne mucosum & glutinosum quod in urina subcruenta subinde conspicitur sedimentum, pro pure habeatur, quod supernatare magis solet. Sedimenti enim hujus sæpe tanta est copia, ut, si a renum exulceratione esset, jam centies assumti ipsi fuissent. Est potius mucofitas, quæ ex nimis relaxata glandulosa vesicæ & urethræ tunica, aut ex prostatis læsis extillat & urinæ permiscetur.

C U R A T I O.

§. I.

Vene se- Perspectis sic paulo penitus variis excretionis per urinam cruentę causis & sedibus, prudentis nunc est *atio uti-* medici, tum ad avertendas præservative, tum ad tollendas in cura differentes has causas judicium in propinrandis convenientibus remediis paulo exactius adhibere. Igitur, quando ex nimia sanguinis redundantia oritur, vel metuendus est affectus, sanguinis missione nihil tutius & præstabilius est, hac tamen observata cautela, ut ipso in paroxysmo in partibus superioribus, brachio videlicet, sanguis detrahatur, & ejus mittendi copia ex virium & habitus corporis ratione astimeatur. Quod si vero a consueto hæmorrhoidum fluxu suppresso, insolita hæc evacuatio ortum traxerit, ad præservationem tutius est ve-

nam pedis aperire. Idem tenendum est, quando in colica spasmatica & vehementibus ventris tormentinibus, ut interdum fit, urina cruenta mingitur, ob sanguinem stagnantem & congestum circa intestinorum tunicas, exitumque per venas hæmorrhoidales non invenientem. Quin potius, quia hic affectus per certas etiam periodos reverti solet, tempestiva venæ sectio ne ut ipsi occurramus, eo magis est necessarium.

§. II.

*Danda
refrig-
erantia.*

Si a vehementi, cum, vel etiam fine plethora, orgastica sanguinis ebullitione & expansione, qualis subinde a fortiori corporis, vel etiam animi commotione, vini & calidorum sanguinem nimis moventium remediorum abuso accidere solet, malum hoc ortum suum habet, praeter sanguinis per venam sectam subtractionem, nitrosis & intestinum elasticum motum sanguinis refrenantibus, sive refrigerantibus, nihil certius & praestabilius. Hoc nomine depuratum nitrum, vel artificiale, ex spiritu nitri & sale tartari confitum, cum terreis & absorbentibus mixtum, vel in forma pulveris, vel etiam potui inditum, plurimum commendamus. Cui pro vehiculo in hisce casibus serum lactis dulce, & acidulum, aqua decocta hordeacea, & sola aqua pura fontana, vel ad dimidiā partem cum Selterana, aut Tonnsteinensi mixta, decoctum cornu cervi & scorzonerae, optime inserviunt, vel etiam cerevisiae tenuiores, quibus tinturæ rosarum, florum bellidis, cum spiritu vitrioli, minime vero salis, cuius acrimonia volatilis pulmonibus & renibus infesta est, paratæ, sunt sufficienti quantitate instillandæ.

§. III.

*Allous
survanda
opera.*

Quum alvi adstrictio, seu tardior fecum secessio, plurimum ad ingenrandum, imo ad fovendum & sustentandum hoc malum habeat momenti, partim quod oriundis inde

flatibus & spasmis intestinalibus æqualis sanguinis circulus & distributio impediatur, & ad unam, præsertim debiliorem partem, solito plus sanguis feratur, partim etiam, quod multæ insipuae, acres, biliosæ ex prima regione particulæ ad sanguinis & humorum massam adducantur; hinc, si quid aliud, ad illud avertendum ejusque recidivam præscindendam, certe alvi laxitas & subductio admidum proficia est ac necessaria. Id vero minime purgantibus, seu acrioribus stimulantibus, vel salibus copiose assumtis, multo minus aloeticis & pilulis, quas etiam refracta dosi aloë ingreditur praestandum. His enim exacerbatur malum certissime. Lenientibus potius laxantibus & quæ simul robore gaudent virtute, id exsequendum, inter quæ, ut in omni immodica & praternaturali sanguinis excretione, rhabarbarina, imprimis cum passulis mixta, uti sunt passulae Corinthiacæ, solutione rhabarbari per blandam insipisationem laxativæ redditæ, vel pulvis rhabarbari cum cremore tartari remixtus, nec non clystères emollientes, ita etiam heic primas tenent.

§. IV.

Ad vasa vero nimium in renibus deducta & aperta roboranda & leniter adstringenda, vel etiam si eorum substantia læsa fuerit, consolidanda, decocta, vel infusa, ex lenioribus vulneratiis & leniter constringentibus, uti sunt agrimonie, hedera terrestris, equisetum, herba millefolii cum summitatibus, virga aurea, radix consolidæ majoris, cum melle Prussico, renibus mirum amico, quodammodo dulcificata, opem ferunt laudatissimam; quæ decocta pro re nata etiam inficeri possunt cum lacte. Neque minus egregii ad demuleendum & consolidandum usus erit lac amygdalinum, præsertim si bolus Armenia cum ipso cœu vehiculo sumatur.

§. V.

§. V.

*Rembus
aut ves
ca exul-
ceratis
danda
acrimo-
niam se-
peratia.* Si renum, uretherum, vel vesicæ, ar-
rosio & exulceratio præfens est, ut sæ-
pius sit in continuo & diutius cum do-
loribus vexante malo, ad humorum a-
crimoniam temperandam, præci-
pua medentis debet esse directa inten-
tio, eaque neglecta, nullum doloris le-
vamen, nulla etiam partis sauciatae &
læsæ consolidatio & restitutio speran-
da, aut obtainenda. Hunc autem in fi-
nem nobilis est virtus syrapi dialtheæ
Fernelii, item decocti Foresti, necnon
ejus, quod Mysichtus contra mięcum
cruentum laudat. Facit huc quoque in-
fusum, quod præter jam dietas herbas
vulnerarias, corticem radicis acaciæ,
gummi cerasorum habet; necnon, pul-
vis ex radice altheæ, glycyrrhiza, sper-
mate ceti, seminibus quatuor frigidis,
papaveris albi, lycopodii & croco, cum
f. q. sacchari candi conditus.

§. VI.

*Grumi
sanguini-
nis dis-
solvendi.* Ad dysuriam, immo ischuriā, quæ
frequens, & periculōsum, renalis vel et-
iam vesicalis hæmorrhagia symptoma
esse solet, dum sanguinei grumi ure the-
ris principium, ubi inseritur vesicæ, vel
ipsum sphincterem vesicæ obstruunt,
non certe efficacius & promptius auxi-
lium, quam aqua pura calida copiose
hausta, & exterius balneum applica-
tum, prostat. Tum quoque præstat a-
quam tepidam syringa in urethram &
vesicam injicere, quo acris humor di-
luatur & grumuli hi dissolvantur. At-
que etiam ipse Hippocrates l.c. eadem
hæc remedia commendat, lavaerū
nempe aquæ calidæ & tepesatoria ad
locum affectum apposita. Quod si vero
ob grumos sanguineos in ipsa vesica,
seu sphinctere ejus obvios, spasmus or-
riatur, ut inde totalis & pernicialis
ischuria inducatur, interne emulsionem
ex seminibus quatuor frigidis, cum lapi-
dibus cancerorum & antimonio diaphem-
retico, item pulverem ex spermate ce-
ti, lapidibus cancerorum & nitro; exter-
ne vero vesicam repletam decocto fla-

rum emollientium ex lacte abdomini
applicatam, necnon alvi apertione, cum manna, vel clystere emolliente &
oleoso, usus deprehendimus longe pre-
stantissimi.

§. VII.

Præter hæc autem omnia ad renum &
vesicæ vitia detergenda, inveterata
etiam sananda, nihil unquam aquis me-
dicatis temperationibus, ut sunt Selt-
eranæ, Antonianæ, Wildungenes, effi-
cacious, tanto certius si cum lacte, in pri-
mis almino, fuerint remixa. Id enim
dōcent non modo saluberrima ipsarum
elementa, sed potissimum multiplex de-
hoc effectu experientia, de quo omnes
qui de viribus medicarum aquarum
experti scripserunt, testimonium fe-
runt consensu unanimi.

§. VIII.

Neque minus egregia virtus & ad-
versus hunc morbum præsidium est in
lacte, necnon lactis sero. Hæc enim jam
olim suo tempore, in urinæ mictione
cruenta, magni fecit Hippocrates l. de
internis affectionibus §. 17. Si, inquiens,
urina prodit veluti a bubulis carnis,
assatis succus, ægrotus pro temporis op-
porunitate serum & lac bibat; serum
quidem ad purgationem, lactis autem
potum faciat in tempore, per quinqua-
ginta aut quadraginta dies; hæc si se-
ceris, morbum in melius vertes. Lac
quoque ovillum vel caprillum laudat
Riverius obs. 13. centur. 17. necnon Ga-
tinarias atque Forestus, qui hoc solo
remedio sanguinis mięcum sæpè se cu-
rasse gloriantur; ita tamen, ut unicuique:
dos, boli Armena drachmam unam
permisuerit. Id quod etiam in graviosis
sanguinis mięcu vtique convenit, in
leviori autem minus faciendum censet
idem Riverius.

Cautele Clinica.

§. I.

Venæ & Cœliæ De venæ sectione, in qua præcipuum tam ad curationem quam præservationem, si malum a criticis hæmorrhagiis suppressis oritur, repositum est momentum, hæc adhuc tenenda: quod sanguinis missio in principio sit instituenda largior. Sic enim non modo evacuantis, sed & divertentis remedii vicem gerit. Quando vero sanguinis mictus suas servat periodos, duabus vel tribus ante accessionem horis, vena pertundenda & prout corporis conditio fert sanguis emittendus.

§. II.

In vino potu. Hippocrates l.c. in mictione sanguinea ab ulcerato rene, vel vesica, vinum album, mellei coloris jucundissimum, probe temperatum, bibendum peritissime & suadet. Nam vina nimium spirituosa, aut acido abundantia, ut Rhenanum, minime ubi nimia & dolorifica adest sanguinis mictio, conferunt, sed potius vina dulcia, ut Hispanicum, Canariense, Hungaricum præstant, dum ventriculi digestioni & simul vesicæ affectæ favent.

§. III.

In potu ordinato. Quum porro multum inter sit, quale potus genus in usum ducat renum & vesicæ vitio laborans; tenendum omnino: ab omnibus cerevisiis crassioribus & acidis abstinentum esse, potum eligen dum copiosum, ex cerevisia tenui, quippe quæ medicamenti aquosi instar, acre & arenosum eluit ac diluit. Testis hanc in rem gravis est Sydenham, qui eandem ceu saluberrimam commendat Lib. de mictu cruento a calculo renibus impacto pag. 705. a deo, ut ipse, quoties curru vehi debuerit, non prius rhedam ingressus sit, quam haustum cerevisia tenuis paulo liberaliorem ingesserit,

I eundemque pariter iterare ante regressum domum versus, si forte alicubi diutius fuerit commoratus. Et hoc pacto semper sibi a mictu cruento satis præcautum esse, afferit. Observandum tamen, cerevisiam bene coctam esse debere & fermentatam.

§. IV.

In corpore motu. Ut ut motus & exercitatio corporis conveniens magnum sit, tam ad præcavendas, quam persanandas chronicas passiones præsidium, attamen in excretionibus sanguinis, & præsertim quæ sunt urinarias per vias, res longe aliter est comparata. Etenim vix aliud, motu corporis citationi, præsertim equitatione, ad propagandum hoc malum magis valet, quin solam loquellam paulo elatiorem & longius continuatam, in mictione dolorifica & cruenta, quæ per vesicam laesam fit, vidimus damnosam. Jam dudum etiam id notatum fuit ab antiquissimo medicinæ nostræ parente l.c.p. 16. perhibente: si quis sanguinem cum urina mittit, & corpus quietum habet, citius sanabitur, si vero laboraverit, dolores multo graviores obtinebit. Neque minus Sydenham in opp. p. 700. suo exemplo rem optime decidit. Nam quoties permultum itineris pedibus confecit, vel in curru per platearum pavimenta vectus est, quantumlibet tardo equorum gressu, toties mictum reddidit cum sanguine, permistum, quoties vero per viam regiam lapidibus non strata, licet perquam longissime, curru vectus est, tale quid ipsi accidit nunquam. De somno etiam peritissime referit, quod ipsi curæ fuerit, ut lectum citius peteret, quo eo magis concoctio recte perficeretur, sicut ex adverso nocturnæ lucubrations eam imminuant.

§. V.

Inter ea vero demum, quæ in medicatione hujus mali vitanda, nihil certe esse potest infestius, quam si cruenta hæc mictio, sive ex renibus, sive ex vesica.

sica fiat, sive critica, sive symptomatica sit, remediis adstringentibus, fluxum nimis impetuose silentibus, ut communis fere & detestabilis medentium error est, excipiatur. Hoc enim facto, a grumis intra vasa retentis inflammations fiunt, exulcerationes & putredines. Sicuti enim hæmoptyfis iisdem his remediis tractata, quam facile in inflammationem & phthisin, vel pulmonum exulcerationem, ita etiam miętus cruentus in inflammationem, exulcerationem & putredinem abit. Nihilo minustamen, si excretio sanguinea effusissima fuerit, cum summa virium jaetura, mixturam, qua *Sylvius* feliciter in cruento miętu usus est, ex aqua planthaginis uncii duabus, portulacæ, cinnamomi, aceti destillati ana uncia una semis, coralliorum rubrorum præparatorum, lapidum cancerorum, terræ sigillatæ ana scrupulo uno, laudani liqui di granis tribus, syrapi coralliorum Quercetani, vel de symphyto Fernelii, q. s. ad gratum saporem, experientia inventimus olim comprobata.

§. VI.

Externa adhibenda. Externorum quoque non inutilis est ad lumbarem regionem applicatio. Hoc nomine venit emplastrum spermatitis ranarum, quando cum a lumine vel saccharo saturni & pauxillo camphoræ miscetur. Vel meretur etiam commendari albumen ovi cum alumine conquassatum & subfrigide regioni pubis appositum, sub forma epithematis. Nam blanda refrigerante & adstringente vi, hæc sanguinis impetum quodammodo refrenant.

§. VII.

Ad arcendam recidivam servandam. Qui ejusmodi malo subinde conflantur, vel ad illud inclinant, providam omnino & diætae & vitæ regimini curam habeant necesse est. In vîtu quam maxime a vini potu, ab omnibus aromatibus, præsertim allio & cepis, radicibus aperientibus, ut petroselini,

pastinacæ, Selleri, asparagi, prorsus abstineant, neque somnum in dorso capiant, atque nimis calidis pannis, seu pellibus illad suffalcent. Vitandus etiam est nimius potus calidus infusi Thee, vel aliarum herbarum, sed potius frigidus, vel subfrigidus concedi debet. Decoctum potissimum cerasorum exsiccatorum in ptisana, non sine euphoria, saepius pro potu sumendum commendavimus.

ENARRATIONES
MORBORUM.

§. I.

Fœmina illustrissima 52. annorum, sanguineo cholerici temperamenti, ab ineunte fere ætate catarrhis, tussi, cephalalgiis, vere præsertim & autumno fuit obnoxia. Menses semper largiter fluxerunt, qui nunc a biennio penitus cessarunt. Ex quo tempore doloribus ex calculo saepius conflictata, subinde quoque intensi spasmi, tensiones & dolores occuparunt abdomen, cum alvi strictura & urina aquosa copiose secedente. Nunc saepius in extremitatibus manuum & pedum dolores persentit satis exquisitos, tunc maxime, quando dolores ex calculo conquiescunt. Nam his præsentibus protinus artuum dolores evanescunt. Anni vero spatium ferme est elapsum, ex quo miętu cruento, sine omni dolore lumborum vel artuum fuit afflita, qui potissimum sub motu corporis, qualicunque etiam recrudescit. Originem hujus profluvii derivandum esse arbitratur ex nimio lithontriptorum a medicis exhibitorum usu; quotiescumque ad cruentam midionem comprimendam utitur remediis, protinus se pejus habet, & de tensivo hypochondrii sinistri dolore, de nausea, de flatibus, capitisque dolore conqueritur. Contra hæc vitia tollenda aliquoties secta est pedis vena, quam in brachio minus belle potuit ferre; invalescentibus inde mox symptomatisbus frequentavit acidulas Selteranas, ther-

*Mitius
cruentus
ex pla-
thora.*

mas Embenses, sed frustraneo effectu. Exegit a me salutare consilium, impetravi, ut singulis binis mensibus, sanguinis missionem sive per scarificationem, sive per incisionem venæ in pede admittat: secundo, ut loco potus ordinarii utatur sequenti decocto: Recipe santalum rubrum, radicis scorzonerae, ana unciam, tremoris tartari drachmas duas, saechari Canariensis unciam, eoque in mensuris duabus aquæ communis per horæ dimidium: in fine addantur guttulae duæ vel tres olei de Cedro, cum saccharo subactæ. Infusum quoque theiforme ordinari ex summitatibus millefolii, floribus papaveris rhœados, hyperici, herba veronicae, pilosella, & semine scenicali adornandum; & ad singulas lunæ phasæ, ad alvum laxandam assumere jussi decoctum rhabarbarinomannatum, & circa proximum verenuo cura fontis Selterani per integros duos menses, cum tripla latæ asinini parte remixti adhibere. Aliquot menses, post relatum mihi est ex Holstia, insignissimum mali levamen ab hac cura fuisse expertam feminam illustrissimam.

Epicrisis.

Sanguineam mictionem infestare quam maxime feminas plethoricas, post cessantem menstruam purgationem, neglecta sanguinis mitione, subiectu præsertim lauto, & motu corporis concitatori, multis exemplis in praxi confirmatum habemus. Nihil vero ad calculi generationem & mictum cruentum prioritandum, si dolores jam adsunt lumborum, magis valere, quam inconsulto, & temere, calculum quæ pellunt propinare, etiam nobis compertum est. Optandum itaque foret, ut omnia lithontripica, quæ rarissime optatum habent usum, e praxi medica ejicerentur, præsertim si acriora, & calidiora fuerint; neque enim ante affectum nephriticum; neque in eo,

neque post eum, utilitatem quædam habent. Denique quam circumspectam, immodicæ omnes sanguinis profusiones, tractandi methodum expostulent per adstringentia, etiam nostra historia docere poterit, quum represso sanguinis fluxu, mox sæva internas abdominis partes incesserunt symptomata. Venæ in brachio aperto, ubi jam plurimum sanguinis per inferiora profluxerit non semper tuta & utilis: quia largius extracto sanguine partes vitales, cor & cerebrum, eo si deferuntur, cum tota functionum economia labefactantur. Fons Selteranus cum asinino nuptus lacte, in omnibus renum vitiis & doloribus ac spasmis nervosarum partium in scorbuticis, est præsidium omnibus aliis longe superius.

OBSERVATIO II.

Vir 60. annorum, olim hæmorrhoidum fluxui circa æquinoctia obnoxium, per annum iis caruerat & ex pruriginosa scabie in toto corpore, tuis. præsertim circa anum, fuerat vexatus. Ad hanc tollendam variis usus est medicamentis sanguinem purificantibus, ut tinctura antimonii, tinctura sulphuris tartarisata, quam cum decocto temperato ultra mensem assumit. Externe, unguento ex balsamo sulphuris, cum oleo amygdalarum dulcium, & saccharo saturni parato, frequentius cutem inunxit. Quibus remedis adhibitis, feliciter quidem molestum cutis malum evanuit; sed præter omnem opinionem, quum urinam redderet, apparuit illa crassa, sanguineo colore tincta, secessitque mox in fundum subnigricans cruar. Sic reddebatur aliquoties lotium, semper fere sine incommodo, sed quando alvum exonerabat, sub illo nisu, immanni fere dolore cruciatus fuit; cum magna stranguria. Venæ sectione in pede, singulis mensibus instituta, exhi-

hibitis simul infusis ex manna, rhabarbaro, passifl. & nitro, laxantibus, ac decocto ex avena, radice cichorii, floribus papaveris rheados, summitatis millefolii, successive malum discessit.

Epicrisis.

Notatu in hoc casu per quam dignum est, quod a retropulsione scabie sanguis cum mictu prodierit. Sed dubio omni procul id factum esse arbitror, quod materia ferosa, tenuis, caustica, renum & vesicæ validis se insinuavit & acrimonia tenues eorum furculos sauciavit, non aliter ac id a cantharidibus intro subinde obtingere solet. Notabile etiam hoc est, quod exiguis dolor fuerit, quia sanguis ex renibus promanavit, quando urina copiosa emissa fuit, gravior autem factus sub alvi depositione, quia sub vehementi nisu fallitus sanguis & acris sine dubio ex vesicæ valculis expressus, dolorem auxit.

OBSERVATIO III.

*Mictio
truenta
venese-
tione
curata* Accersitus ante aliquot annos ad Quæstorem, virum quinquagenarium floridi, sanguinei & carnosæ habitus, qui semper sanus ac vegetus, nunquam etiam dolore ex calculo vexatus, vel hemorrhoidum fluxu affectus, & qui nec sanguinis missione per totam vitam, nisi bis, vel ter admiserat: is mane quum surgeret, emisit præter omnem expectationem, sine magna alteratione, urinam cruentam. Ego quum advenirem, fluxus jam per duos dies durarat, sedimentum erat valde turbidum, crassum, subnigricans. In patina uncias aliquot hujus urinæ probe subacta super prunas ardentes curavi incoquendas & vix dimidia parte exhalata, crassamentum instar albuminis ovi coagulatum, nigricantis tamen coloris remansit, non lecus ac sanguis quando in cochleari argenteo supra candelam incoquitur. Inquisivi in hujus fluxus, insolentis plane, causam, nullam tamen

aliam asserre potuit, quam quod liberalius potasset vinum in urbe vicina & post nocte mense majo valde frigida, mane per tria millaria equo concitatus vectus sit. Altero enim die post, hoc symptoma fuit sequutum. Quare quum pulsus adhuc satis magnus & citator esset, venæsectionem in mano, & loco cerevisiae, quam ordinario bibebat valde saturatam, decoctum avenaceum ex avena, radice scorzonerae, cichorii, floribus papaveris rheados, nitro & melle paratum, item pulverem præcipitantem cum liquoris anodynæ aliquot guttis assumentum: infusum quoque theiforme ex herba veronicae, agrimonie, polygoni, summitatis millefolii, floribus papaveris rheados, semine foeniculi, kepius haeriedatum suasi, & præcepi, ut a vino abstineret & singulis anni quadrantibus venæsectionem admireret. Quo facto, non ulterius mictionem cruentam est expertus.

Epicrisis.

Non semel sed sæpius observavi copiosi, & sinteri sanguinis mictum ex improviso simul & semel factam & per intervalla ex levicaua recurrentem sine ullo apparente signo vel veitigio calculi renalis ante & post illum fluxum, idq; in corporibus sanguine temperato valde diffluentibus nullum dubium est quin in plethorici, præfertim post equitationis motum, factio concitatori sanguinis ad renes affluxu, & impeditiori ejus per venas refluxu, extremitates arteriolarum emulgentium quæ principium canalicularum hydragogorum constitunt, nimis dilatatae & disruptæ, eum effuderint in canaliculosam & papillosum renum substantiam. Tali in casu quies, aquæ frigidæ potus, abstinentia ab omnibus spirituosis, venæsectionem, omnia optima sunt prædia.

OBSERVATIO IV.

Mictio. Laboravit ante aliquot annos vir *eruentia*, consularis vicinæ celebris urbis quin, *cum do-* quagenarius, laute & vinosæ diætæ de- *lore if.* chadiaco ditus, tranquilli infuper vita generis, *curata.* dolore gravativo lumborum, cuius causam consulti medici judicabant esse calculum renalem. Quidam tinteturam *Amelungii* lithontripticam, alii baccas juniperi quinque singulis diebus mane devorandas suaserunt: sed nihil inde levaminis consecutus est, ut potius dolores invaluerint, ipsum lateris dextri femur in consensum trahentes. Commendatus ipsi fuit pulvis specificus antinephriticus, cuius basis millepedes & sal succini volatile erant, quem circa singulas lunæ phases assumit, urinæ quidem fluxus liberalior inde redditus, sed per mensum usurpato hoc pulvere, observavit quum urinam redderet, eam sanguinolentam, ita ut interdum plus, interdum minus crux haberet. Medicus ordinarius a specifico hoc ut penitus abstinenter sua sit, & medicamenta ad fluxum sanguinis restringendum dedit, unde *mictio* restincta quidem, sed non multo post ardor in osse sacro ingens cum difficultate magna fæces egerendi fuit subsiccatus, dolore mortuum femur, qui ad pedem usque se protendebat, occupante. Hic postea venæctione in pede afflito admissa sati larga, & decocto temperante usurpato superius a nobis descripto, convaluit.

Epicrisis.

Ex hac constat historia, aliisque innumeris comprobari exemplis potest, pernitiale admodum eorum, quæ urinam & calculum valide pellendi polent facultate, usum esse in plethoricis & quando de doloribus lumborum conqueruntur. Optandum certe foret, ut acriorum & nimis calidorum diureticorum, quæ sale subtili caustico vesica-

torio agunt, ut sunt quæ ex insectis produdent medicamina, non secus ac acriora & valentiora purgantia penitus in praxi & usu medico exularent; quippe natura in excretionibus blande vult duci, non vi cogi; fortiora enim diuretica nunquam non teneram & vasculo-sam renum substantiam ledunt, calculosque, si non adsunt, ingenerant, vel si adsunt fortiter expellunt, vaisque fauciatis inde crux educunt aut inflammations & exulcerationes contumaces & exitiales relinquunt. Nova crebriori pulveris millepedum in asthmate humorali usu corporis atrophiam & funestam renum exulcerationem cum febre hectica successisse. Si quis autem ejusmodi causticis, cuius generis sunt cantharides, aranearum, vermium majalium, & millepedum species, ut in gonorrhœa virulenta non nunquam accidit, uti velit, suasor sum ut nunquam sine miscela nitri & camphoræ quæ omnium optima eorum, sunt corrigentia, ea adhibeat.

OBSERVATIO V.

Ineunte anno noctu colica prehendebatur vehementi sexagenarius vir, *mictus* qualem jam ante novem etiam menses *cruci* circiter fuerat percessus, cui nunc ac- *specie* cessit mingendi difficultas. Post aliquot ce *eius*. dies remisit quidem colicus dolor, sed que frequentior ad matulam stimulus fuit *Sphin-* perpetuus, quin quandoque sine causa *terris.* conspicua, mirum fuit exacerbatus. In- terfecto aliquo tempore accedit tertium *mictus* sanguinis, qui quandoque per octo & quatuordecim dies succedit, quibusque elapsis urina iterum quidem tantisper inclarescit, sine tamen ægroti levamine. Atque hic *mictus* cruentus, citius aut serius impetrat, quo magis vel minus corpus motu exagitavit. Sic miser jam septem anni quadrantes sub perpetuis vicissitudinibus affligitur, nec unquam penitus cessavit dolor, licet interea varie adhibitæ sint medica-
tio-

tiones, inter quæ etiam bis reperitus Egranarum potus. Post emissum in pede sanguinem & appositas ano hirudines, datisque subinde per epicrasis laxantibus, sincerus sanguis cum lotio non amplius profluit, sed postquam refrixerat urina, dimisit crassum subrubicundum sedimentum, tandemque plane moleculæ sanguinis congruumati exciderunt intra aliquot dies vel viginti, quarum nonnullæ magnitudinem digiti fere auricularis æquabant & quali in carnem videbantur mutatae. Post aliquot dies ægrum incessit colica nephritica, & lapillos binos miliares elidebat, atque elapsis quatuordecim diebus eodem modo. Ex eo urina aliquamdiu mansit pellucida, neque etiam quicquam ex ipsa ad fundum secessit, sed illud crebrioris mihius malum mansit, ita ut singula hora dimidia, quin quadrante, matulam poscere eogeretur, cum ardore in ano, tenesimo & spasmo circa glandem, ac pungente, ardente, scindente tam exquisito in glande dolore, ut rigida penis subsequeretur tensio. Interim urina nunquam plane fuit suppressa, alius autem plerumque officii obliviscitur & flatibus tumer, appetitus quoque vacillat cum ructibus, succussatorium motum ferre nequit æger & circa lunæ phases tam notabile doloris percipit incrementum, ut plane non sese movere ipse sit licitum. Somnus propter crebram urinæ emissionem interruptus. Vires mediocri adhuc sunt firmitudine. In osse sacro & dorso dolor non sentitur; sed in pubis regione exterius quandoque pruritus, interius pressorius & traxtorius dolor versus dextrum latus, quasi ibi præternaturale quid consisteret, qui sensus, motu, tussi, sternutatione exacerbatur. Urina interdum tanta vehementia exstremum molitur, ut vel involuntarie erumpat: vicissim nonnunquam talis in membro est sensatio ac si exstilleret urina, quod tamen non sit, post

aliquas vero sanguinolenti mihius indicias, redit tandem illa eadem vehementia. Quare meum postularunt consilium, qui quidem candide edixi periculo non vacare ejusmodi malum, inveteratum maxime & in senili corpore, ne tamen ex neglectu ejus corruptio, & sphacelus lethalis partibus affectis accedat, utique omni cura esse providendum. Hunc in finem susci, ut quotannis minimum ter, vena in brachio pertunderetur; deinde ut æger a vini ac cerevisiæ potu abstineat, ac ordinarium habeat decoctum ex radice chinæ, salsaparilla, ligno santalo rubro & citrino, necnon radice glycyrrhizæ, & stomachi causa unicum vini Burgundiæ aut similis vitrum bibat. Tum videndum ut alvus semper sit aperta, idque ope maxime passularum rhabarbarinæ; aloetica vero & acria purgantia cum cura esse vitanda. Exterius nihil fore conducibilis aqua sclopatoria, triplicatis linteis pubis & perinæ regioni noctu maxime admota. Sic me spem fovere haud dubiam, fore, ut æger exinde levamen obtinet exoptatum.

Epicrisis.

Venit redditus a nostro mihius sanguis, non ut communiter sit, ex renum vitio, aut vasorum emulgentium aeratione, sed potius ex ramo venæ hemorrhoidalis externæ hypogastricæ, quæ in viris præsertim, ad vesicam maximeque ipsius cervicem complures surculos spargit, testantibus anatomicis oculatissimis, in primis Bauhino. Est itaque mihius cruenti genus oppido rarum, non tamen desunt inter observata medica ejus exempla. Sic HOECHSTATTERUS, in obs. Dee. 1. schol. in cas. 2. fundit saepius, ait, hemorrhoidis externa sanguinem in vesicam, ut absque vitio renum mingatur, quod in nobili quodam licuit videre. Ejusdem indolis & nostro per quam similis calus relatus legitur in M.N.C. Dev.

Dec. 1. Ann. 8. Obs. 23. Quod autem ex hoc fonte venerit sanguis, testatum faciunt pathemata. Nullus enim in lumbis & renibus adest dolor, sed continuus ad mingendum stimulus, cum doloribus in ano, pube, & perinæo multis & variis. Quod si itaque sanguis, sub vita præsertim sedentaria, accumulatur, & circa hæc loca stagnat, vasorum in cervice vesicæ orificia tandem dehiscent, & sanguinem in vesicæ cavum fundunt, tumque multum sanguinis illabitur. Quod si vero per tunicas aliquid tantum mora transudat, sensim coagulatur, & cum vesicæ muco miscetur, concrescunt inde ejusmodi molecule sanguinis congruumati quasi membrana vestitæ, quæ postea excernuntur. Atque idem etiam factum esse habet allegata ex M.N.C.observatio, conceptis sic verbis: *tandem cum maximo cruciatu & ardore vehementi in ima pube, & circa virgam, varios magnos, ac oblongos sanguinis grumos, instar hepatis lucii piscis, mingendo ejuculabatur.*

OBSERVATIO VI.

Micatio subatra oruenta instar coffee-satata. Ante duodecim circiter annos, vir generosissimus, aulæ Cellensis minister, meam opem ac consilium requisivit. Is jam septuagesimum & sextum annum complevit, constitutionis, per omnem ætatem, validæ & robustæ, ut nunquam fere ægrotaverit; lauatori quidem gaudebat vita, ita tamen, ut in poculis & vene re modum servaverit. Solitus erat longo abhinc tempore, sub cælo sereno corpus equitatione exercere, idque, cum paulo fecisset validius, mane urinam, quæ antea semper erat natura lis, bruno & subatre colore tinctam prodigiis observavit, aliquot sanguinis grumis urinalis vasis fundo adhaerentibus, & quotiescumque equitatio ne vel alio fortiori motu paulo validius corpus agitaret, idem expertos est; quādīu vero corpus permanxit quie-

tum, urina & colore, & consistentia naturali erat, nihilque vitii habebat. Per aliquot jam menses hoc insolito accidente affectu, de nulla corporis lassitudine, de nulla circa pubis vel lumborum regionem molestia, de nulla dysuria conquerebatur, nullo unquam calculi vestigio apparente, neque ullas unquam molestias ex hemorrhoidibus percepit: interim bene appetebat, dormiebat. Venæfectionem per totam vitam rarissime admisit. Delectatus multum cibis qui grata acrimonia linguam feriunt, germanice vom hohen Gout. Medici ejus loci peritissimi de morbi causa & effectu nihil certi decernere poterant, & medicamentis, quæ nihil proficiebant exhibitis, per litteras petiit meam opem & consilium. Judicavi mali originem & causam esse plethoram, quæ etiam senibus bene appetentibus & lauitius viçitatis familiaris esse solet, præfertim si a sanguinis missione, quæ in florida senectute longe utilissima deprehenditur, prorsus abstineant. Suasi itaque singulis mensibus venæfectionem in brachio, parca tamen manu, ad uncias tres vel quatuor administrandam, & ut loco potus ordinari decoctum ex radice chinæ, scorzonerae, rasura cornu cervi, santalo rubro & aniso stellato biberet; subinde quoque pulverem ex lapidibus cancri rum, rhabarbaro & saccharo assumere, ab omnibus acribus & spirituolis abstinenter, corpusque in quiete servaret. Quorum remediorum energia ita adjutus est, ut generosus ejus gener, exactis aliquot leptimanis rescriperit, illum immunem hoc malo fuisse reditum. Post duos vero annos, marasma eum extinctum esse, mihi fuit relatum.

Epicrisis.

Binos, quoad omnes propemodum circumstantias, similes casus, olim in praxi mea observavi. Ante viginti annos generosus camerae con filia-

Elliarius octuagenarius mihi aperuit, se ultra decem fere annos, urinam per intervalla, sanguineo colore tinctam grumis interdum prodeuntibus ex ipsa urethra reddidisse, citra ullum tamen incommodum sive sanitatis offendit. Nullam potuit mali hujus causam assignare, nisi quod per multos annos, vinum quod in vinea sua rubrum, sive Rosacer fuit natum, in frequentissimo & quotidiano fere usu habuerit. Monui ut abstinaret ab hoc, sed respuebat hoc consilium, eo quod jam per viginti annos, hoc vino fuerit usus. Secuta vero postea est crebrior cruxis missio, quam lenta excepit febris cum marasma. Ante aliquot lustra in foemina septuaginta & aliquot annorum vegeta etiam constitutionis similem urinæ colorem observavi per certa tamen intervalla apparentem. Colorēm urinæ bruno-nigricantem in senili aetate quā maxime familiarem cruditatibus accidis, sanguini permixtis, dum facile omnia alimenta in eorum ventriculo coacescunt, tribuendum esse existimo, quæ humorum acida acrimonia plurimorum senilium morborum matrix ad vasorum sanguineorum in renibus referanda orificia etiam multum conferre videtur.

OBSERVATIO VII.

Iscburia Hebræus 60. annorum ab aliquot cruentio, jam annis doloribus ex calculo valde potionē excruciat, tandem ingentis magnitudinis unum cum cruenta excrevit urinaria, postea immani dolore in regione pubis corripitur, urina penitus suppressa, alvoque ita obstruita, ut nec flatus nec quicquam excrementi inde prodiret, quæ per quatuor dies symptomata persistierunt, tormentis ita aductis, ut nec quiquam somni capere, neque in uno loco quiete consistere potuerit. Ad urinam eliciendam catheter sed sine effectu fuit applicatus, quum vix aliquot guttula urinæ profluxerint: hinc non sine ratione judicavimus, uretheres

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

ubi vesicam ingrediuntur a grumis sanguinis esse obstructos, quare pubis regioni vesicam speciebus emollientibus in lacte coctis repletam applicari iustius: ingente in quoque infusi herbae veronicae, urticæ mortuæ & radicis glycyrrhizæ quantitatem quotidie bibere debuit; præterea clysteres oleosi emollientes in anum injecti plures, & nil levaminis inde fuit consecutus, auctus potius ab urina suppressa fuit dolor in abdomen & lumbis cum extremorum refrigeratione mortique vicinus in continuo sopore jacebat æger: quando paululum se recolligebat de summis querebatur anxietatibus quæ respirationem demere videbantur. Dedi ad alvum, quæ erat strictissima, laxandam sequentem mixturam: recipe manna electæ uncias duas, solve leni calore in aquæ florū acaciae uncis sex, adde olei amygdalarum dulcium unciam semis, nitri purificati grana 12. essentiae corticum aurantiorum drachmam semis, quadrabus vicibus assumta, atque intra quatuor horas repetita: habuit inde octo sedes, quibus copiosa materia stercorea rejecta & simul tacta urinæ profluxit copia, ut aliquot repleverit matulas, quæ vero primum prodidit instar loturæ carnium erat. Horum remedium efficacia ex orci pene faucibus eruptus miser, qui postea adhibitis idoneis stomachicis, roborantibus, bono vita regimine accedente, pristinam valetudinem recuperavit.

Epicrisis.

Extra dubium est a sanguinis grumis obstructumuisse introitum uretheris in vesicam, qui transversim fit per ejus membranas; id vero mirum est, per alterum vacuum, urinam in vesicam non descendisse, quod a ipsamodica vesicæ constructione factum credibile est, quia etiam vicinum intestinum rectum per

F

con.

consensum arctissime fuit occlusum. Per quam notabile etiam est singularis effectus decocti mannat in hoc casu, quod una cum clysteribus & cataplasmatibus emollientibus, spasmus harum partium relaxato, urinæ liberum iter & fluxum conciliaverit. Neque semel sed iterum a nobis observatum est, quæ alvum blanda virtute solvendi valent, in morbis vesicæ commodum etiam præflare solatium.

Plures observationes inveniri possunt in *Consult. Med. Sect. 3. cas. 78. 80.*

C A P U T VII.

De hæmorrhagia cerebri.

Theses & Observations Pathologicæ.

§. I.

Quid in telligatur per hemor rhag. cerebri. **H**æmorrhagiæ cerebri appellatio ne, nos fortem & pernitiale il lam apoplexiæ sanguineam comprehendimus, quæ ab effusione crux in cerebro ex ruptis ibi, citra violentiam externam, vasculis, oritur, & subito functiones animales & vitales quoque pef sumdat atque extinguit.

§. II.

Hanc de. Hæmorrhagiæ cerebri existere remonstrat yera, ejusdemque proximam causam defunctio rum se ciones monstrant sectiones anatomicae in defunctis institutæ. His enim in comperto est, sanguinem modo inter cranium & duram matrem, modo inter hanc & piæ, frequentius hanc inter & cerebrum, frequentissime in hujus anfractus & ventriculorum medullum, quandoque in basin ipsius, interdum minori, interdum etiam satis magna copia, effundi. His quoque constat: ipsa sanguifera vasa per cerebri membranas & corticem discurrentia, sanguine nunc liquido, nunc concreto turgida & veluti aneurismatica nunc et-

iam erupta conspici. Possunt hanc in rem legi historiae apoplecticorum difectorum a clarissimo Wepffero consignatae.

S. III.

Pars igitur primario affecta est cerebrum, quod ad concipiendam sanguinis ejusque stagnationem & inde oriundam hæmorrhagiam admodum dispositum. Etenim insignis sanguinis quantitas, & minimum, teste *Malpighio*, tertia pars, illius qui ex ventriculo cordis sinistro in universum corpus ejicitur, eo per quatuor capaces satis arterias adducitur. Dein arteriosa hæc sanguinem advehentia vasa tortuosum admodum ubique, & maxime in pia matre, servant tractum. Tum, quod maximum, ipse hec arteriæ, postquam subierunt cranium, deposita exteriori tendinea, potissimum motus systaltici instrumento, tunica, tenuiores longe sunt, quam in reliquo corpore, & quasi venas referunt. Ne dicam, adeo demum gracilescere hæc vasa, ut sanguinis per ipsarum angustias in venulas socias transitus, sensus plane subterfugiat. Quæ omnia faciunt utique, ut sanguis hec tardius circumeat, facile etiam subsistat, aditu in venas expedito facile inter cludatur, novique accessu cumulatus continuo, alveos canalium admodum dilatet & ad consequitura plura mala ansam præbeat,

§. IV.

In primis præsente jam ejusmodi dispositione, facilis postea in rupturam & effluxum est transitus, tum videlicet, *Ruptio fit in ubi accesserint causæ, quæ sanguinem pia ma- majori copia & cum impetu ad caput congerunt, ejusdem in ipso stagnatio- nem invitant ac liberum per venas re cursum valide tufflaminant. Sic enim demum fit, ut vasa non modo crux turgeant, sed & ab a ppulso jugiter novo nimium farcta, dehiscant, rumpantur & sanguinem effundant. Id quod ma- xime in pia meningis necnon corticat- lis*

His cerebri substantiæ vasculis, æque ac iis, quæ choroides plexus constituant, contingere, cadaverum sectione constat.

§. V.

Functiones animalium Per effusum in cerebro cruentem non modo subtilissimi liquidi, quod motum vitale robur & sensum præstat partibus, sed in le- & creetio & distributio per nervos impen- duntur & totus circularis sanguinis per cerebrum motus turbatur & inter- tinguuntur; ubi animales & que ac vitales functiones elangescunt & tandem penitus extinguntur. Quæ omnia sic omnino contingere, testatum faciunt pa- themata illa truculenta, quibus haec hæmorrhagia stipatur, & e quibus, ceu diagnosticis signis, etiam cognoscenda. Nimis qui eam incurruunt in terram concidunt subito, omni mentis vi ac cogitatione, sensu quoque ac motu privantur omni, cuncta membra sunt languida & flaccida, lingua obmutescit, palpebre suspensa & os hians comparent, deglutitio sublata, & alvus, & vesica retinenda excrementa haud raro sponte dimittunt. Atque haec omnia laetam cerebri functionem & elangescens inde muscularum robur produnt luculenter.

§. VI.

Hæmorrhagia cerebri effectus atque symptomata. Difficili autem & intercepto sanguinis per capitis interiora commeatui tribuenda reliqua quæ observantur phænomena. Quod scilicet genæ rubicundo admodum, & florido colore suffundantur, facies tumeat, vasa per faciem & maxime tempora discurrentia, turgeant, erupta in ore, naribus ac auribus sanguinem interdum, maxime post mortem, fundant, quin accidente putredine, caput in miram distendatur magnitudinem: quod a sanguinis per carotides internas aditu de-negato, & ea propter in externas facti impetu, merito derivandum. Quod oculi distendantur, promineant, rigidi &

quasi vitrei compareant ac lacrimas uberius fundant, id lymphæ a sanguine stagnante copiosius secedenti in acceptis ferendum. Quod cor valide pulset, arteriarum quoque pulsus in principio magnus, postea languidus ac rarus sit, quod spiritus sit difficilis cum stertore, & rhoncho, id sanguinis pulmones obruentis moli, eorumdemque ea propter intercepto æquali reciproco motu, aerem rite nec expellenti, nec admittenti imputandum. Quod demum vomitus & convulsiones cum dentium stridore variæ accedant, non aliunde quam a sanguine in duræ matris vasis hærente eandemque ad spasmodum soliciante, deducendum.

§. VII.

Jam sicuti omnis omnino hæmor- *Signa-*
rhagia supponit ac præviā habet san- *antece-*
guinis, in illa ubi succedit parte, nimia *dentia*
ad rupturam usque congestionem: ita
quod eadem in hac, quæ in cerebro sit
effusione, præsto sit, est utique certum.
Evineant enim id omnes, quæ morbum
hunc antecedunt ac prænunciant. pas-
siones, quas inter præcipuæ, capitis cum
vertigine temulentia, ejusdemque præ-
cipue in occipite, dolor pressorius &
gravatius, fornicationis sensus in artu-
bus, visus modo per caligines, modo
coruscationes, turbatio, oculorum hu-
miditas & intumescencia, aurium su-
furrus atque tinnitus, memorie &
ingenii aliqualis hebetudo, somnus pro-
fundus, incubo & insomniis stipatus,
venarum jugularium turgescencia ac
faciei præter consuetudinem rubore
suffusio.

§. VIII.

Quemadmodum porro ad inducendā *Ingressus*
sanguinis in certa parte congestionem, *difficul-*
per spasmodum in aliis partibus eo susci-*tas.*
tatus appulus, tum etiam partis con-
gestione admittens quædam debili-
tas, concurrunt; ita, quin eadem haec ad-
gignenda eam, quæ in cerebri vasis
colligitur congestionem, conferant,
neutiquam dubitandum. Huc enim re-

dit omnis vis & efficacia illarum causarum, quas ad ingignendum hunc morbum, ceu antecedentes & procastaréticas conferre, ratio docet, experientia confirmat.

§. IX.

Plethora-
ci maxi-
me &
ubi san-
guinis
solennes
excre-
siones
deficiunt
hunc ma-
to obno-
xii sunt.

Ut de sanguinis plenitudine primum dicamus, propter eam omnino accidit, quod hæmorrhagia hæc frequentissime incidat in æstatem virilem, & juxta Hippocr. aph. 57. sect. 6. ab anno quadragesimo usque ad sexagesimum, ubi confecto corporis augmento, succi in vasis plus justo non modo accumulantur, sed & densiores sunt. Hinc porro sit, quod quitemperamenti sic dicti sunt sanguinei, necnon obesi, cum iis, qui lautam, otiosam & sedentariam vitam sectantur somnoque indulgent, perniali hæmorrhagiæ huic admodum sint obnoxii. Idem accidere iis, qui propter suppressas, aut imminutas spontaneas hæmorrhagias, necnon omittas diu sue tas antea artificiales subtractiones, nimiam sanguinis copiam colligunt & coacervant, uberiori testantur medicorum observata. De neglecta sanguinis missione testes sunt Acta Medic. Uralislav. 1702. de narium hæmorrhagia suppressa, Hildanus Cent. 3. Obs. 11. de hæmorrhoidibus retentis Hippocrates, Amatus & Zactus Lusitan., & qui primo loco ponendus fuisset, Lancisius, de subit. mortib. de mensibus & lochiis cohibitis cum Fontano Acta Nat. Curios. passim; de vicaria etiam mensium per os, & nares vacuatione Hildanus Cent. 3. Obs. 12.

§. X.

Spasmi
in remo-
tis par-
tibus
multum
ad gene-
sis bu-
jus he-
morrhagie con-
ferunt.

Tanto vero magis tantopere certius hæc sanguinis redundantia ad inferendum quod diximus damnum fit efficax, si accesserit altera illa causa, spasmus nempe in aliis externis remotisque a capite corporis partibus. Hujus enim tam infesta est operatio, ut non tantum sanguinis progressui in ea, quam detinet parte, fibras stringendo & vasa coarctando, obicem ponat, verum etiam

eundem urget, ut aliorum cum impe-
tu ruat, ibi vasa opplet, diducat tan-
demque perrumpat. Spasmus au-
tem in hæmorrhagiis ferme omnibus,
atque etiam in hac, præsto esse, testatur
juncta magnitudini pulsus durities,
stricturam nervosarum in arteriis tuni-
carum prodens. Testatur quoque ante-
cedens extermorum refrigeratio, nec
non ille, quem quidam in artibus sen-
tiunt, formicationis sensus. Atque etiam
hanc ob causam fieri censendum est,
quod experientia teste, hanc hæmor-
rhagiam saepe incurvant, qui spasmis,
in abdomen maxime, aliquamdiu fue-
runt detenti, qui scilicet colicis passio-
nibus, præsertim spasmodicis, hypochō-
driaco malo, doloribus ex calculo ves-
cæ item cystidis felleæ necnon diutur-
na alvi strictura laborarunt.

§. XI.

Ex quo jam ulterius concludendum, *Affectus*
omnia quæ spasmus inducere apta, in *animi*
numerum caesarum hujus mali esse re-
ferenda. Conspicuus hoc nomine maxi-
me est animi affectuum effectus, ire in
primis ac terroris, quæ proxime in ner-
vosas partes agunt, eademque in ano-
malos spasticos motus adducendo, inq.
qualem quoque faciunt sanguinis cir-
cuitum, atque malum hoc sæpius ac-
cessunt; uti inter alios Hildanus, Schen-
ckius ac Forelius fidem faciunt. Idem
efficere valet venereum cestrum, quo
motuum æquilibrio sublatu, adeo in
quibusdam exagitatum fuisse sanguinem, ut ipso in actu occubuerint atten-
nati, ex Henrici ab Heers Observ. 18.
Bartholino, & nostra de morbis ex in-
tempesiva venere oriundis, disserta-
tione, constat uberioris. Neque tantum impensis
animi, verum etiam corporis
commotio, ad sanguinem versus caput
urgendum multum facit. Nos inter alia
novimus a mica panis asperge arterie
illapsa, vehementissimam concitatem
fuisse tussim, quam exceptit hæmorra-
gia in cerebro, lethali cum eventu.

§. XII.

§. XII.

Excre- Magna quoque ad inducendum hoc
sionet, malum vis est materiæ illi acri, corru-
que in pta & veneni tantum non naturam
partibus habenti, quæ a succorum vitalium con-
externis fiunt, re-nubio, salutari admodum consilio se-
tropulsa gregata, ad corporis ambitum propelli-
sepius tur, quando, vel sponte iterum recedit,
tau sam aut per injurias externas repellitur;
prebēt *bujus* quippe quæ nervosis internis membran-
atrici affi- nis illapla, spasticas atroces suscitat stri-
bus.

Eturas, per quas sanguis utique etiam agitur cum imperio ad caput, ibidemque congeritur. Sic ex ulcerum manantium & fonticulorum coaliuit id factum esse, auctor est Wepferus; ex coryza, pedum sudoris catarrhaliumque affectuum suppressione, necnon retrocedente scabie, *Ephemerides naturæ curiosorum*; ex arthritide & podagra emanente vid. *Med. System. rat. tom. 3. p. 189.* necnon Wepferus. Haud difficultem pernitiam effectum in internis nervosis partibus edunt adstringentia, præpostere, in primis in hæmorrhagiis nimis data, de quo nota bile exemplum a nobis observatum, & quod pluribus expositum in dissertatione Altorfii habita, de viro apoplexia ex inconsulta hemorrhoidum suppressione extincto, cuius auctor est Clarissimus Schultzius.

§. XIII.

Malum Merito præterea in numerum cau-
quando. sarum hujus mali venit ipse aer, cuius
que fit constitutionem insalubreæ & præter-
epidemi- naturalem, epidemicum prorsus fecisse
um a hunc morbum, *Lommius* potissimum,
subta- *Baglivus* & *Lancisius* affirmant. Ma-
& insa- xime omnium vero generationi ejusdem
lita ae- faveat frigus, quod fibras cutaneas
ris mu- stringendo vasaque in ambitu coar-
tatione stando, ad interiora ipsumque caput urget ac pellit humores. Unde *Hippo-*
crates jam *Sect. 3. aphor. 23.* hiemalibus morbis annumeravit apoplepticum. Et *Piso* notavit, quod, quando circa solsti-
tium hybernum boreas, corpora valde comprimens, & mercurium ea propter in barometro sursum urgens ventus,

Hoffm. System. T. IV. P. II.

repente insurgit, dispositos admodum infestare soleat attonitus morbus. Neque minus ad producendum hoc malum multum facit subita aeris mutatio. Nos certe crebrius observavimus, quod, si diuturnam aeris intemperiem frigi-
do-humidam, vento diutius ex occidea-
te & zephyro spirante, subito ventus frigidus valde ex borea excipit; aut etiam intemperiem aeris calidam & hu-
midam cito sequitur algida & constrin-
gens atmosphæra constitutio; facilis admodum in hunc morbum dispositis sit lapsus. Quo etiam fundamento nititur illa *Amati Lusitanus Cent. I. curat.* 36. obseruatio, qua admisso liberius corpori ex balneo fervido & stuantि frigido aere, apoplexiā accessisse memorat.

§. XIV.

Accedit causa, inter precipuas nume-
randas, vasorum scilicet & membrana-
rum cerebri imbecillitas, sive immiu-
ta potentia motrix systaltica. Sine hac
enim nec abundantia, nec appulsus san-
guinis, ad excludendum hoc malum
sufficiunt; at ubi adeat, membranae san-
guinem appulsum minus vegete pro-
trudunt, vasa eidem cedunt, lentes fit
circuitus, stagnatio, sarcitus, tandemque
ruptura. Est autem hæc debilitas quan-
doque nativa & a parentibus accepta,
qua fit, ut certis familiis, fatalis atque
funestus sit hic morbus, uti exemplis
Hoeferus, *Forelius*, atque *Sennerius* con-
firmarunt. Alia demum accedit; quod patet in senibus, in quibus, quia par-
tium omnium labascit robur, non mi-
rum est, id etiam contingere in capite,
ipsosque ea propter frequentius pati-
hos manes.

§. XV.

Inter causas, quæ vasa ac membra-
nas cerebri tono privant debito, poti-
fissima utique est ingluvies, intemperan-
tia atque ebrietas, ex cerevisiis lupula-
tis, vino, maxime sulphuris fumo infe-
cto, necnon vini spiritu. Horum enim

F 3 ea

ea indoles, ut sanguinem exagitent, expandant, eoque simul ipsa vasa, per que decurrit, distendant. Quod ubi accidit crebro, manet illa distensio, systatica vis infringitur, & ad concipiendam morbosam stagnationem sternit via. Unde merito hinc causam repetit *Henricus ab Heer*, quod septentrionalibus populis adeo frequens sit hic morbus, ac uti *Lancisius* observavit, nemo fere sobriae vitae addictus eodem corripitur. Nec dispar ratio eorum, quae capiti stuporem conciliant, opiatorum, absynthii, lupuli, nicotianæ, croci, carbonum vivorum, musli & cerevisie fermentantis vaporum, quibus dum succi & canales plus justo rarefunt ac distenduntur, impeditus utique fit progressus.

S. XVI.

Status cachecliticus & polyposae cerebri. Non minoris momenti ad funestam in cerebro hemorrhagiam proritandam facit habitus corporis cachecticus cum dolore gravativo capit is junctus, sub quo fibrillæ cerebri medullares & nervosæ fisside & nimis lubrice evadunt, systatica & oscillatoria sua virtute privatæ. Quæ cerebri dispositio, quod non modo ad hemiplexiam, sed & ad fortē & sanguineam apoplexiā multum conferat, nobis pluribus est comprehendit exemplis. Observavimus etiam asthmaticos, praesertim quando truculentum hoc malum a polyposis coagulis intra cordis ventriculos, vel vasa pulmonalia hærentibus fovetur. Observatum quoque frequentius est, non modo grumosas, sed & polyposas matas, sinibus cerebri, praesertim longitudinali, ac venis jugularibus internis in hærentes, lethalem sanguinis in cerebro effusionem produxisse.

S. XVII.

Apoplexia jan guinea diphtheria. Dein hic qui a sanguinis effluxu in cerebro oritur attonitus morbus, probe discernendus ab illo, qui sit a seri ibidem secessu, & quem consequitur hemiplexia & paralysis totius lateris, ac

vita quidem servatur, sed admodum miseris. Hæc enim fit, quando quidem sanguis nimia copia cum impetu congeritur ad caput, non tamen vasa per rumpit, sed propter diurnam tantum stagnationem serum per poros secedit, ac descendens vel ad cerebri basin, vel ad spinalis medullæ alterutrum latus, eidemque incumbens, liquidi subtilioris activi tam secretionem, quam influxum in nervos, intercipit, eoque partes in laterè alterutro sensu privat ac motu. Ut prætereamus conspicuum illam differentiam, quæ affectus intersoporosos & hunc quem delineavimus intercedit, dum illi sensim non simul ac semel accedunt, neque sensus & motus abolitionem, sed tantum sub somnolentia obnubilationem junctam habent.

S. XVIII.

Quod cæterum Hippocrates de apo-plexia Sect. 2. aph. 32. consignavit pro-
gnosticon, id utique veritati respondet
egregie: vehementiorem, scilicet qualis
est quæ a sanguine effuso, plane non,
debiliorem autem, sive quam sanguis
stagnans & serum secedens gignunt,
difficulter solvi. Nisi enim post venæ
sectionem & congrua adhibita auxilia
intra 24. horas sequatur levamen, &
symptomata remittant, spes salutis de-
collavit, & ex observatione Aurelianii,
tertius dies longissimus moriendi ter-
minus. Isque funestus eventus me-
tuendus tanto certius, si senes invaserit
plethoraicos morbus, ubi jam vires fra-
stæ & cerebrum debile; si inebriatio-
nem summat, gravemque animi affe-
ctum iram & terorem excipit; aut et-
iam si alii antea perpresso morbo super-
venit. Mortem autem instare conclu-
dendum, si stertor magis magisque in-
gravescit cum respirationis difficultate;
si cor palpitat vehementius arteria-
rum que pulsatio admodum magna, du-
ra simul atque ina qualis; si, ubi paulisper
ad se reddit attonitus, aliena tamen
est mens: si convulsivi motus unius la-
te.

teris ipsiusque pectoris accedunt, frigida
dus præfert in superioribus sudor hæ-
ret guttatum, ipsa exspiratio frigida
est, & urina, & alvi stercore sponte
elabuntur.

Theses Therapeuticæ cum
cautelis.

§. I.

Quum adeo præceps & periculosem
curatio sit hoc malum, cito utique ac tempesti-
quomodo ve succurrēdum, ubi adhuc salutis spes,
instituē-
dū. ac æger in loco temperato & lucido ita
collocandus, ut cervice non nimis de-
clivis ac supinus, neque etiam plane e-
rectus cubet, pedesque inprimis, vel
plumis, vel integumenis, a frigore de-
fendendi ac fovendi. Ipsa autem cura-
tio respondeat causis. Inter quas quia
præcipua antecedens ipsum effluxum
sanguinis redundantis in cerebri vasis
congestio eminens, cum immunita mor-
trice vasorum ibi & membranarum
potentia, eo quam maxime medicatio
dirigenda; tum ut sanguinis motus &
impetus a capite divertatur; tum etiam
ut partibus ibi a robore defectis illud
reddatur, ad redigendum iterum in
motum, qui subsistit, sanguinem.

§. II.

*Principi- locem.
tene- venae
sæcio.* Ad exsequendum primum, ab omni
ævo ceu efficax & stimatum, & ab ipsa
natura comprobatum remedium est in
sanguinis missione, mox in principio
mali, sine mora instituta. Huic merito
primas in medicatione detulit cum Ny-
manno Dodoneus obſ. med. c.8. exercit.
pract. p.385. memorabili exemplo ve-
tulae 72. annorum, per eam ab apople-
xia liberata, confirmat. Quin ipsam
naturam hanc monstrare viam, ex Lan-
cisi obſervatione patet, qua lenem fere
septuagenariū apoplexiā prodromis af-
fectum, effusissima narium, ad 12. libras
hemorrhagia, sanatum esse memorat.

§. III.

Quo vero pacto sanguis sit subtra- In com-
hendus? non omnes eodem modo defi- modis
niunt. Nonnulli, ac inter hos potissi- locis.

mum *Catherwood*, in libello Anglice e-
ditio, arteriotomiam omnibus aliis fa-
guinem mittendis modis anteponen-
dam esse rationibus & exemplis docet.
Cui sententiæ calculum adjecterunt Ger-
mani quidam Medici, inter quos etiam
Loevv ab *Erlsfeld* in *Med. pract.* Nec
improbandum videtur consilium, ac
dolendum modo, nostris in oris, ob Chi-
rurgorum ineptitudinem ac remedii
novitatem, illud adhibere non esse in-
tegrum. Plurimi vena sectionem sua-
dunt; sed quo in loco secunda sit vena,
iterum in diversum abeunt. Alii venas
in brachio, alii in fronte, naribus, nec
non sub lingua incidere iubent. *Morga-
gni* venarum occipitalium incisionem
eximie collaudat *Advers. amat.* 6. p. 108
quia hæ venæ intracranium cum utro-
que laterali sinus communicant, eaque
propter instituta ipsarum sectione, lan-
guis, quem in sinus conjecturæ erant,
avertitur, atque hinc reliqui sanguinis,
qui per eosdem sinus progreditur, copia
minuitur aliquantum, motus autem nō
sine emolumento augetur. Quia vero
harum venarum trunci profundius sit
& nonnunquam in plures minoresque
ramos divisi reperiuntur, cucurbitulas,
& crebras altasq; incisiones anterferen-
das putar. Quo quidem modo jam *Za-
cutus Lusitanus* *Med. Princ. hist. l. 1. hist.*
33. bis apoplecticos se sanasse refert. Ab
exercitatissimis ramen & numero plu-
rimis medicis *Severino*, *Lanciso*, *Freindio*,
a nobis in *Medicat. ration. System.*
tom. 3. venarum jugularium incisio lau-
datur, quia cerebro valde vicina, &
quam optime spatium libertatemque
fluendi facit sanguini cerebro impacto-
ibique copiosius congesto.

§. IV.

In sanguinis missione tenenda hæc - *Cautele*
Instituatur quam potest fieri cito, priu- circa
squam ad atoniam usque dilatatae arte- *sanguis mis-*
riole & a sanguine effuso cerebrum *sionem*
inundatum. Foramen infligatur satis tenenda.

ampum, ut sanguis citiori & liberaliori flumine efficeretur, quia latus effluxus juvat nihil. Adornetur in loco parti affectæ proximo, brachio scilicet vel jugularibus. Quantitas sanguinis emitendi, ex vasorum plenitudine, pulsus viriumque habitudine determinetur, semper tamen sit larga. Si corpus plethoricum, temperamentum sanguineum, morbus a sanguinis evacuatione impedita ortus, iteretur sanguinis subtractio, quin repetatur, quom *Dionis* perhibeat, septies demum incisam venam profuisse. Sed primū celebretur in pede, postea in brachio, seu collo, ne si fecus sit, dato in parte superiore extu, ex inferioribus & corporis ambitu ad caput major invitetur affluxus.

§. V.

*Clysteria
in hoc
malo u-
sus.*

Præter venæ sectionem, ad divertendum sanguinis a capite affluxum, præstans virtus eorum, quæ alvum irritant fortius, non tamen drasticorum illorum catharticorum, quæ veneni quippiam recidunt, sed quæ indolis innoxiae, nervestantum intestinorum tunicas exstiplant effeaciter, & ad motum sollicitant, qualia sunt salia, gemmæ scilicet, Sed license & ammoniacum. Hæc indenda paulo liberaliori dosi clysmatibus, ac præterea addenda species, quibus flatus discutiendi & roborandi virtus inest, cuius indolis ruta, salvia, majorana, fatureja, thymus, serpillum, flores lavendulæ, liliorum convallium, chamomillæ Romanæ, item semina carvi & anethi, unacum oleis expressis, rutaceo, chamæglino ac lauzano. Et sic confecta enemata non nimia copia, sed crebro, injicienda, ne iterum elabantur, & quidem ministerio syringæ, quo eo altius penetrant ac pervadant.

§. VI.

*Exter-
norum
excitan-
tium.*

Quæ vero nervosas robore exutas partes roborant & ad motum exstiplant, eoque humoris subsistentis discussonem promovent, exterius partim

partim interius admovenda. Exterius præstans virtus volatiliū urinosorum mixtorum cum cephalicis; inter quæ palma fert in liquida forma salis ammoniaci cum calce viva paratus spiritus, ruta & majorana, vel lavendula oleo imprægnatus in secca forma sal volatile salis ammoniaci sic cum, iisdem oleis irroratum. Quæ vel naribus ad odorem admota, vel pluma ad interiora narium admissa, vel etiam per calamum scriptorium infusflata, excitant efficaciter. Eundem in finem locis exquisitoris sensus, maximeque pedum plantis, ad moveri solent ea, quæ doloris quendam sensum ibi excitant, sive que universum nervosarum partium systema ad contractionem sollicitant. Quo nomine notæ sunt frictiones asperiores cū pannis aut excutia institutæ, necnon urticationes; nota quoque vesicatoria, ipsaque eauteria actualia, quorum novum & a *Lancisso* approbatum adhibendi modum, evulgavit *Dominicus Mistichelli* in tractatu Itala lingua de apoplexia edito.

§. VII.

Interius autem si deglutiendo facultas supereft, aut redditæ, neutiquam *Cautif-
fanda* spirituosa, aut volatilia; quippe me in-
pe quæ sanguinem, jam tum & stu-
tem, magis commovent ac rarefa-
ciunt, eaque propter a *PitKarnio* de
circul. sang. merito rejiciuntur. Sed tuosa
propinanda ea, quæ analepticam, ex-
citantem, & simul discutientem vir-
tutem possident, inter quæ spectata
virtus diaphoreticorum fixiorum, cum
cinnabari, succino & nitro, quæ in
pulveris forma cum aquis congruis,
vel melius adhuc in potionem re-
dacta porrigi possunt. Nobis qui-
dem frequentioris, & probati usus
mixtura hæc: recipe aquæ liliorum
convallium cum vino, aceti destillati
ana uncias duas, spiritus cornu cervi
succinati drachmam, antimonii dia-
phoretici, cinnabaris, lapidum cancro-
rum ana drachmam semis, syrupi corti-
cum aurantiorm drachmas duas. M.
Cui nonnunquam, ad levem quen-
dama

dam stimulum nerveis stomachi fibrillis cum omnibus reliquis conscientibus inferendum, tantillum tartari emetici adjicere solemus, ne tamen vomitum moveat.

§. VIII.

Ad arcēdum hoc malum utilissima vena quinque-Halis. Sed quia hæc cerebri haemorrhagia non tantum oppido periculosa, verum etiam, licet curata fuerit, facile repetit; haud postrema medentis cura eo utique dirigenda, quo ejusdem tam accellum, quam recursum, arceat. Jam recte utique cum Martiano & Ballonio, sensit Casp. Hofmannus, lib. 3. instit. med. apoplecticos, quotquot sint, esse plethoricos. Ideo, ut sanguinis redundantia minuantur, danda est opera quam maxime. Hunc autem in finem nunquam non utilis sanguinis missio, maxime illa, qua circa aequinoctiale institui solet tempus, quo solennes fere esse solent sanguinis & humorum commotiones, naturaque conatus ad eliminandum id, quod est in corpore superfluum. Saluti ea propter etiam est, vel ipsius Hippocratis testimonio, haemorrhoidum fluxus, maxime iis, qui eundem antea jam experti. Sed eundem sine damno provocare & promovere, est utique artis. Nos ad obtinendum hoc, prater frictiones in ano & admisso fotus, maxime proficuum censemus hirudinum applicationem. Quibus utiliter adjungitur usus elixirii balsamici, ex aloë correcta, croco, myrra & succino, cum menstruo lixivo aquoso, non spirituolo parati, nec non pilularum balsamicarum circumspete datarum. Quæ tamen haemorrhoides movent, minime adhibenda, si nulla ad fluxum adest dispositio, sed tum demum, quando emanere, aut parcus fluere incipit, alias, praesente plethora, plus nocent.

§. IX.

Alvus solvenda blandioribus. Dein ad vindicandum ab incurso hujus mali corpus, maximum utique est præsidium in debito alvi secessu. Etenim generalis fere canon est praticus, neminem facile capit is morbos

incurrere, cui officium rite facit alvus. Interim tamen alvua hæc excretio neutiquam proritanda validioribus drasticis, quæ nerveas intestinorum tunicas impetuosis aggrediendo, spasmos suscitant in iis, & inæqualem sanguinis circuitum inducent. Blandioribus potius & naturæ amicis hoc expediendum. Inter quæ commendabilia maxime rhababarina cum salinis abstergentibus, nec non pilulae polychrestæ ac clysteres.

§. X.

Quæ præterea a quibusdam commendantur aquæ & ballama sic dicta apoplectica, tam interne usurpanda, quam exterius temporibus, naribus ac nucha inungenda, ad curationem. *Cause mercantum etiæ balsamicæ aquæ apoplecticas.* que ac præservationem hujus mali, nostra quidem sententia, in iis, quibus metus haemorrhagiae cerebri, plethorica, sanguineis, virilis ætatis personis, sunt potius per quam nociva. De quo grave est testimonium Dodonæ Stirp. hist. lib. 6. ita habens: ubi humorum copia adest, præserit sanguini permixtorum, non tutus hujus (fillatitii lavendulæ liquoris) usus est, sicuti neque compositionis, quæ ex fillatitio vieno, in quo hujusmodi herba, flores, seminave & aromata macerata sunt, conficitur, quam plerique temere & indifferenter exhibent. Nam calidorum hujusmodi caput implentum usus, & morbus intenditur, & æger in periculum inducitur. Tertia longe insula theiformia cum aqua, ex herbis cæhalicis, melissa maxime, betonica, salvia, cum cardamomo minori condita, que frequentius sorbillata, tanguntis motum æqualem servant, atque ipsi etiam cerebro nervisque conducunt.

§. XI.

Nulla vero ab omnibus erit expedita incolomitas, nisi simul accellerit exactum in vita victuque moderationem. Potissimum autem ad præservationem momentum fert quies cum abstinentia, quo Celsus magnos morbos curari prohibet. Quare vitanda ciborum repletio immodica, ceterum

que varietas; vitanda vina dulcia potentia, omniaque inebriantia, valida corporis exercitia, maxime post cibum. Neque is, qui malum hoc metait, post coenam statim eat cubitum; neque etiam capite nimis declivi cubet. Si aer ita comparatus, ut genesi hujus mali sit accommodus, corpus ei non committendum, sed pedes maxime a frigore defendendi, quandoque etiam pediluvio tepido immittendi, & in conclavi temperate calido manendum. Modus subinde instituendus est placidus, animus liber servandus atque tranquillus, somnus nec nimis longus, nec nimis brevis sit. Verbo vitentur omnia, quæ supra in causarum proctarticularum numerum relata leguntur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Balnei
calidi
Caroli.
narum
ufus val-
de suspe-
ctus.

comes illustrissimus, fere quinquagenarius, sanguine succique plenus, aliquot ante annos affectus fuerat aliquoties paralysia, leviore tamen, cum loquendi difficultate. Inde petuit vicinas ditiones suæ Carolinas, iisdemque usus est tam interius, quam exterius. Sed quum inconsulto id fecisset medico, neque sanguinis missione, neque alvi purgatione, corpus prius rite præparasset, accidit, quum in balneum nimis adhuc calens descendenter, ut subito sensuum tam internorum, quam externorum usu privaretur omni, sequuta mox respiratio valde citata, cum convulsivo quodam pectus attollente motu, arteriæ pulsarunt valide cum quadam duritie, & facies intense robuit. Secta fuit vena, admotum quoque naribus sternutatorum, quo vehementior pectoris concussio cum summo stertore inducta. Latus sinistrum totum omnis motus ac sensus fuit expers, manus tamen in eo convulsa perpetuo agitata. Mens plane non sibi constitit & intra quinque horas exceptit mors. Post quam ingens

sanguinis ac seri sanguinolenti copia, per viginti quatuor & longius horas, e naribus manavit.

Epicrisis.

Si ullus thermalium aquarum ad balneum usus circumspetionem poscit ac prudentiam, certe est Carolinarum. Harum enim ea indoles, ut terreo calcareo, nec non martiali quo polent principio, corporis superficiem constringant valide, & sanguinem ac humores ad interiora agant. Atque hinc est, quod œdematosos, pedum tumores abigant cito, ac ubi corpus spasmiss obnoxium est, simulque vasa sanguine turgent, graves passiones, cordis palpitationem vehementem, capitum dolorem acutum, cum virium dejectione & artuum debilitate inducere, quin febrem continuam æque ac intermittentem accendere valent. Ea vero propter etiam non mirandum, quod in illustrissima hæc persona, sanguine redundant & præsente jam in capite ad humorum stagnationem dispositione, usu inconsulto, sanguis cum imperu fuerit congestus ad caput, ac tam in ipsius interioribus, quam exterioribus vasa rupta, lethali cum evenitu. Id enim luculent er arguit sanguinolentum illud largum post mortem narium profluvium, quod factam in cerebro hæmorrhagiam semper prodit. Quod autem sternutatorio admotu increvit spiritus cum stertore difficultas, id utique monet medentes, ut in apoplexia sanguinea parcum eorum, que sternutamenta movent, & circumspetum, sedato prius sanguinis ad caput imperu, habeant usum, ne sanguis majori cum vehementia ad locum, cui stimulus impressus, ruat mortemque acceleret.

OBSERVATIO II.

Fœmina generosa, quinquagesimum Ex pur-
ætatis annum agens, constitutionis gante
sanguineæ & texturæ admodum tene- acriori
ræ ac mollis, copiosum semper exper- recedivus
ta fuerat sanguinis per menses fluxum. lethalis.

Sed

Sed quum is quadragesimo nono anno ob etatis rationem retineretur, ipsa de anxietate & angustia præcordiorum, inflatione in latere abdominis sinistro, gravitate & flacciditate artuum, vertiginoso capitum ac gravativo dolore, cum somno inquieto & interrupto, graviter cœpit conqueri, licet vultum rubicundum admodum exhiberet. Accidente tandem hystere, adeo exacerbata fuerunt hæc omnia, ut medici auxilium implorare cogeretur, qui ad discutiendos flatus salia dedit volatilia oleosa, itemque carminativas essentias, ac præterea porrexit purgantem pulverem, ex resinæ jalappæ scrupulo dimidio ac tartari vitriolati granis sex. Quo quum sexies non sine acerbis torminibus fuisse purgata, insequenti nocte insultu correpta est apoplectico, pulsu tamen & respiratione adhuc integræ. Secta fuit vena protinus, & injectus clyster acris; quibus ad se quidem rediit attonita, sed superfuit aphonia magna capitis debilitas. Hæc ut tolleret & recidivam arceret morbi artifex, obtulit denuo purgantem cum aqua litorum convallium pulvrem, ex resinæ jalappæ granis 12. & vitriolati tartari granis 10. Quo assumto, elapsa vix hora, rediit apoplexia, & miseram brevi tempore tradidit morti.

Epicrisis.

Inclinant utique in sanguineam apoplexiæ sanguineæ foeminae desinente mensium fluxu, eaque propter venæ sectione opus habent quam maxime, ne accidentibus aliis causis, in actum erumpat dispositio. Ad quod si quicquam aliud efficax est certe usus purgantium validiorum ac tormina inducentium. Que inter merito numeranda funestis multis effectibus infamata jalappæ resina in pulvere data; quippe que deglutita in stomacho facile coit, ac plenis nervæ intestinorum tunicae adhærescens, spasmos ciet ac oppido dolorosas tensiones, quibus utique sanguis urgetur

ad superiora, ibidemque effectus edit exitiales. Quo magis patet, graviter peccasse medicantem, qui accidente post oblatum hoc purgans apoplexia leviore, hac remittente, idem obtulit iterum in tanta copia, eoque recidivam induxit graviorem simul atque lethalem. Ac licet haud adeo incongrua videri possit noxios humores ad inferiora deducendi intentio, clementioribus tamen laxantibus, vel etiam clysteribus id fuisse perficiendum, non iis, quæ intestinis spasmos, ex torminibus cognoscendos, inducunt, eoque sanguinem ad caput urgendo, ut ibi perrumpat & lethum inferat, faciunt.

OBSERVATIO III.

Theologus celeberrimi nominis, Apoplexiæ le-
quinqüagesimum nondum ingressas
annum, floridæ & sanguineæ consti-
tutionis ac vividi ingenii, canus sem-
per ac vegetus, ob peculiares quo-
dam ejus famæ ac existimationis infe-
stos casus, in impensam animi per-
turbationem cum anxiø dolore &
mœrore conjectus, & valde inquietus
sub parco etiam somno, ad levan-
dum animum & suppressandam me-
lancholiæ, poculis vini, quæ alias
etiam amabant, paulo largius se sub-
inde invitabat. Procedente inde tem-
pore ciborum amittebat appetentiam,
& vacillante digestione perpetuis fe-
re vexabatur ructibus sine ullo ex al-
vo constipata prodeunte flatu; laba-
scere incipiebant vires, ingenti quo-
que præcordiorum dolore & angustia
preamebatur, mœlis simul mentem
fatigantibus cogitationibus, repente-
ne & inopinato cum omnium sen-
suum amissione cecidit in terram,
pulsu tamen & respiratione manente
salva; collectis vero intra bihorium,
post remedia idonea data, paululum
viribus, ad seredit, sed inde de ge-
nuum imbecillitate, de torpore &
languore dextri lateris, nec non de
debilitate memoriarum anxiæ instituebat
que-

querelas. Proprio soasu petit Carolinas, non modo ut affectum de- pulsaret hypochondriacum, sed itinere & conversatione mœstabundas animo excuteret afflictiones. Quum ego jam præsens essem, enixe meum etiam quæavit consilium: suasi ut moderatius biberet temperationem illum fontem vulgo *Muhlen-Brunnen*, quo per viginti dies insig- ni cum euphoria utebatur. In re- ditu vero quum celebrem pertransi- ret urbem, invitatus ab amicis, lautisque conviviis exceptus nimium indulxit genio & vini potui. Sub nocturno frigido cælo in patriam reversus, de spirandi angustia & anxietatibus conquestus sumsis dia- phoreticos quosdam pulveres, a quorum usu purpura rubra in uni- verso corpore comparere cœpit, conquerenti simul de immani capi- tis dolore medicus in consilium vo- catus venæ sectionem in pede com- mendavit. Explorans meam de hoc remedio sententiam, prorsus eam dissuasi ob metum recurvus purpu- ræ ad interiora. Medico nihilo mi- nus magnum periculum ex neglectu venæ sectionis prædicente, admisit eam, quæ in pede satis largiter ce- lebrabatur. Non ita multo post præcordialis antietas majora sumsis incrementa sub extremorum refrigera- tione, & purpura disparente improviso vehemens insultus seque- batur apoplecticus cum omnium sensuum amissione, cum stertore, pulsu valido & inæquali, facie existente tumida & rubicunda. Quo gravi affectu intra octo horas Vir magna doctrinæ & ingenii in me- liorem vitam transferebatur.

Epicrisis.

Plura in hac historia sunt me- moratu digna, quæ in usum patho-

logico-therapeuticum animadver- possunt; ac primum, quod in ho- mine sanguinei temperamenti, quando mœrori diuturno & gravi adjungitur prava diæta ratio, in- que primis immoderatior vini usus, sistema nervorum ita infirmari pos- sit, ut pathemata formaliter hy- pochondriaca progignantur, quæ non facile alias in ejusmodi tem- peramentum incident. Notandum quoque est, quod ob diurnas mentis fatigations & labores cum mœrore diutius infestante conjunc- tios, tam imbecille reddi possit cerebrum nervorumque sistema, ut ad insultus apoplecticos evadat dis- positum. Insuper nostro in ægro primus insultus fuit levissimus, a solo impetuofiori sanguine ex imo ventre ad caput per spastmos obo- tutus, qui venæ sectione, stagnanter in vasis cerebri sanguinem resolven- te & divertente, brevi potuisset submoveri. Quia vero nullus affec- tus facilius recurrat, quam apople- ticus, præsertim si non accurata & exquisita vivendi ratione, idoneisque remediis avertatur; factum hinc est, ut post usum Carolina- rum, quæ magnum quidem hypo- chondriacorum præsidium sunt, minus vero morbis capitis favent, non observata accuratori diæta, gravior dein insultus subsecutus fuerit, & quidem in nostro ægro lethalis, dubio procul, quod a lar- ga venæ sectione purpuracea mate- ria ad interiora violentia majori conversa, spastmos suscitavit, qui- bus sanguis impetuofius adactus ad caput, tandem intus vasa disrup- erit. Cæterum de apoplexiæ aliis causis, speciebus, & observationi- bus huc pertinentibus, in Parte 3. de mortis ex atonia ortis, fusi- egimus.

SECTIO II.
DE
DOLORIBUS ET SPASMIS
VARI GENERIS INTERNIS ET EXTERNIS
NEC NON
ARTHRITICIS ET RHEUMATICIS.

C A P U T I.

De Dolor Cephalico.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Dolor cephalicus est valde molestus in membranis capitis nervosis a variis causis distractis suscitata sensatio, quæ pro differenti gradu & loco varia & gravia saepe post se trahit symptomata.

§. II.

Sedes dolorum. Dolor diversa in capite occupat loca, cuius rei nulla alia subest ratio, quam quod diversis intra & extra cranium nervosis membranis illud instrutum sit. Extra cranium occurrit tenuis sed satis valida & exquisita sensationis membrana, quæ immediate id cingit, & a carotide externa plures accipit in anteriori, media & posteriori parte arteriolas; ramulos vero nervorum e vertebris colli & pari septimo cerebri. Cohæret autem pericranium cum musculis crani vici-nis ac per futuras cum duræ matris exteriori lamina: in qua membra-na frequentiorem certe doloris cephalici sedem reponimus; quod inter alia, idonea ad leniendum gravem dolorem externe applicata re-

media, sub forma emplasti vel epithematis, item ex fonte chirurgico, scarificationes, setacea, cauteria inusta & vesicatoria, clare satis atque perspicue demonstrant. *in cuta.*
Neque tamen excludere hic volumus ipsam quæ caput tegit cutem, præsertim interiore ejus partem vicinam pericranio, a qua etiam separari potest, & quam plura sanguifera percurrent vasa, tunc præcipue doloris sedem constituentem, ubi is magis solet esse obtusus, gravatus & pressorius, cum in pericranio magis sit acutus.

§. III.

Neque immunis a doloribus est *in duræ matris.* interior, quæ cerebrum cingit membrana, sic dicta dura mater, quæ ex fibris valde tendinosis & nervosis contexta atque ex duplice lamina confusa est, & a quinto & septimo nervorum pari ramos accipit; arteriolis vero tribus donata: prima oritur a carotide interna, quæ ad anteriorem duræ matris partem abit, secunda, a carotide externa, quæ per foramen proprium intrat cranium & ad medianam partem vergit, tertia, a vertebralis internæ ramo externo, quæ per foramen jugularis internæ ingreditur cranium & ad posteriorem duræ matris partem spectat. Rarior quidem ibi dolorum sedes,

sed

94 *Sec̄tio II. Cap. I. De dolore cephalico.*

sed multo periculosior: nam si sanguis in ejus vasis diu stagnat, vel copia aut acrimonia eorum vim motricem valde lœdit, quam facile graviorem morbum capit; atque in acutis phrenitidem vel convolutionem, præsertim si dolor sit pulsatorius; in chronicis morbis paralysin, hemiplexiam, nec non affectus soporosos post se trahit.

§. IV.

Reliquæ tenues illæ membranæ, membra quæ cerebrum immediate involvæ sedem vunt, utpote pia mater atque arachnoides, quæ posterior tamen potius externa pia matris membrana videtur, cellulosum interstitium efformans per quod vasa repunt, nostra quidem sententia minime molestæ sensationis sedem constitutere videntur, eo quod careant fibris tensilibus nervosis elasticis, atque etiam nervulorum ramulis. Sed tamen ibi non conspicendi. Denique membrana valde exilis & sensilis, quæ ex tunica pituitaria nascitur, & sinus ossis frontis investit, non raro præbet acutissimi doloris domicilium.

§. V.

Discrimen. Ingens doloris in capite, ratione loci quem occupat, item ratione vehementiæ ac diurnitatis discrimen est, quo inde etiam diversa ab auctoribus ipsi imposita sunt nomina. Nam si levior est, & modo partem capitis afficit, dicitur cephalgia; si diuturnior & gravior, ac totum caput occupat, cephalæ nomen accipit, quam Galenus ita optime describit: *pr. 3. tr. 2. cap. 35. cephalæa est dolor totius capitis diutinus & greque solubilis, qui a parva occasione vehementes habet exacerbationes, adeo, ut neque strepitum, neque vocem violentam, neque luminis splendorem, neque motum tolerare possit patiens, sed tranquillitatem & obscurum cubiculum querat, idque ob doloris vehementiam; quippe alii se malleo percuti arbit-*

trantur, alii caput contundi distendunt, ac paucis ad oculorum radices dolor extenditur: quo in dolore totam capitis membranam vehementer affectam esse non dubitamus.

§. VI.

Sæpius fit, ut unum tantum *Inter bellum* *latus dolor obsideat, altero salvo & niam.* circumscripto fixus hæret, ita ut vix magnitudine grossum vel imperiale *& clavis* æquat, mulieribus & quidem hysteriæ familiaris; qui clavi nomine *cum* insignitur. Qandoque dolor frontem & loca supercilia acutissimus obdet: alius solum synciput, alius occiput, alius virticem prope suturam, alius tempora magis occupat. Neque una eademque solet esse sensatio: nam alius acutus, pungitivus, lancinans dolor est, alius contusivus, gravativus & pressorius, alius rursus constrictorius, quidam astuosus & inflammas, alius frigidus est qualis in mulieribus potissimum verticem ferire solet, ut quasi se glaciem gelidam in ipso gestare conquerantur.

§. VII.

Causa generalis. In genere omnium doloris cephalici causam, a liberiori & æquabili sanguinis per vasa sanguifera, quibus cutis capitis, pericranium, ipsaque dura mater instructa sunt, progressivo & circulari motu impedito, tanquam a fonte derivamus. Nullus certe medicorum exactius, & secundum leges mechanicas, genesis doloris hujus demonstravit, ipso Hippocrate, qui lib. de flatibus §. 13. ita rem perbellè exprimit: *sanguinis, inquit, transitus in capite magna angustia coarctatus, cuius abundantia ac conclusio dolorem excitat. Sanguis enim ipsa natura calidus existens, vi coactus, per angustam viam transire celerime non potest, cum multa impedi-*

men-

mento sint obstacula & oppilationes; quapropter etiam pulsus circa tempora. Qui sane locus, Hippocrati non penitus incognitum fuisse sanguinis progressivum motum ex arteriis in venas, satis abundeque declarat: obstacula enim, quæ liberiorem transitum denegant vocat oppilationes, quæ in valis revehentibus, quia carent impulsu, unde tardior & lentior motus, consistunt. Id quod etiam dissectiones ex gravi cephalæ mortuorum confirmare videntur: nam teste BONETO, WEPFERO, PECHLINO aliisque, sinus cerebri, jugulares etiam internæ & externæ venæ, sanguine mucoso crasso, imo pseudopolypis subinde infarctæ fuerunt repertæ: quod etiam nos in malo epileptico demortuis aliquoties observavimus. Si enim major sanguinis copia ad caput fertur, quam ipsæ venæ eadem celeritate reducere possunt, vasa arteriosa, & inter hæc maxime minima & capillaria, a congesto sanguine valde distenduntur & ipsæ membranæ insigniter tenduntur; quæ ratione tristis illa sensatio excitatur.

§. VIII.

Notandum vero hoc loco est, quod pro conditione, intemperie vel vitio sanguinis, si vel nimia copia peccat, vel nimis spissus & glutinosus, vel sero valde acri refertus est, alia etiam atque alia inde doloris species enascuntur. Nam quando is impetuose & nimia copia in membranas irruit, quod præcipue de plethorici & ubi consueta per nares fluxio sopprimitur, nec non de adolescentibus valet, dolor totum caput occupare solet; quod tunc calet, tumet, dolet, rubet, vasa turgescunt, fortiter pulsant, præsertim circa jugulum & tempora, nares aridæ & siccæ sunt, fauces ardor & sitis occupat. Talem dolorem veteres a causa calida scitari dixerunt.

§. IX.

Ubi sanguis in vasis capitales collectus multo scaret & mucido sero, vel ex obstructa aut suppressa, quod sanguis accedit, coryza aut gravedine, dolor in capite oboritur, tunc magis gravatus, obtusus, pressorius, maxime in antica parte atque in fronte esse solet, quandoque etiam caput instar ponderis grave est, ut vix in altum possit elevari. Non raro evenit, ut in ipsis capitibus, in vertice præsertim, tumores quibus digitus imprimi possunt exsurgent, pulsus interea languido, facieque livida existente. Quod inde a longo jam tempore CELSUS notavit, lib. 4. cap. 2. ita differens: proter hæc invenitur genus doloris, quod potest longum esse, ubi humor cutim inflat, eaque intumescit & prementi digito cedit. Veteres hujusmodi dolorem a causa frigida deduxerunt.

§. X.

Deterior doloris & magis pervicacis species est, qui accedit lue venerea valde affectis, cum materia serofusa, acris, caustica firmius pericranio insidet & interdum ipsum cranium cariosum reddens difficillime remediis cedit atque sanescit. Ejusdem generis esse solet is dolor, qui a materia salino-caustice indolis ad habitum corporis propulsa & postea retrocedente nascitur; ut id in arthritide, podagra, scabie, erysipelate capitis, gutta rosacea laborantibus, saepius in praxi observavimus. In variolis & morbillis, antequam præcans materia naturæ robore ad extiriam cutem propellitur, vel, quod pejus, si repellitur, atrox saepè cum febre aut delirio, vel in infantibus cum epilepsia, dolor caput torquet; quo casu, ubi materia exigua caustica dolorem efficit, præternaturalis & vehemens membranarum potius striatura, quam earundem distensio, quæ a copia seri & sanguinis magis fit, locum habet.

§. XI.

Sympo-
mat a do-
loris atu-
rissimi.

§. XI.
Sæpius in capite dolor est acutissimus, sere intolerabilis, fixus & diutius affligens, qualis totius corporis & animi vires pessundat, somnum tollit, concoctionem impedit, naufragium & ciborum fastidium parit, & alios saepe gravissimos capitum & nervorum morbos, ut sunt vertigo, oculorum caligo & suffusio, cæcitas, aurium tinnitus, convulsio, epilepsia, post se trahit, atque etiam reliquas nervosas corporis partes in consensem trahendo, vomitum, alvi strictram, extremorum refrigerationem faciemque moribundo similem efficit. Id quod a veteribus quoque animadversum videmus. CELSUS enim lib. 4. cap. 2. scribit: *cephaleæ notæ sunt: horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, vocis suppressio, corporis refrigeratio, animæ defectio.*

A quibus
causis
producen-
tur.

Ad genesis doloris cephalici quod attinet, consideratione etiam digna est nativa vel a parentibus tracta nervosarum capitum partium imbecillitas; pars enim quo debilior, id est vi tonica & elastica sua naturali valde privata, eo facilius & promptius humorum alienum admittit, recipit ac retinet, atque inde stagnatio, partiumque nervosarum afflictio contingit. Novimus saepius cephalalgiam hereditariam, a parentibus debili capitum constitutione præditis acceptam; vidimus etiam a diurno animi incertore, a præpostera Venere, a nimis lucubrationibus & mentis fatigacionibus, item a nimis crebra sanguinis missione, vel effrenibus hemorrhagiis caput ita debilitatum fuisse, ut graves inde dolores, nec non alii, qui vehementer caput infestant morbi, exorti fuerint.

§. XIII.

Causæ re-
motæ quo-
vocantur remotæ, excludi debet fri-
gus, quod uti omnibus nervosis par-
tibus, si jam dolore premuntur infe-

stum est, & liberam transpirationem per cutim impedit: ita maxime nocet, si capiti denudato admittitur, vel si id non satis contra nocturnum frigus fuerit munitum, vel etiam, si a longo sermone vel motu corporis nimio, aut a sole, aut ab ira, vel ab ingestis largius potibus spirituosis & inebriantibus incalescens pluvioso celo, nocturno præsertim, repente exposuitur.

§. XIV.

Memorandum id quoque est, cephalalgiam saepius tantummodo esse symptoma, quod morbo demum accedit. Ita frequentius febris contnuis, intermittentibus quoque, & inter has maxime quartanæ jungitur: atque vix quicquam in praxi crebrius occurrit, quam quod mensibus inordinate prodeuntibus vel imminentibus, caput doleat gravissime; spallæ videlicet dum ex imo ventre strictræ, in caput suum effectum exerunt. Digestio vitio & affectu sic dicto hypochondriaco laborantibus frequenter associatur: nam si prima regio vitiosorum humorum colluvie scatet; & inde oborientes spasmi ac flatus, humores ad caput plus justo urgent; nimia eorum congestio, vasorum distensiones, a quibus tunicarum nervosarum lœsio fit, parit. Constat etiam hernierianæ causam, a *it. hemi-*
stomachi *vitio* frequentius oriri, dum *crania.* hoc non bene coquente, multæ generantur cruditates, quæ cum succo ciborum chyloso permixtæ, per thoracicum ductum ad cor adductæ, ac protinus ad caput delatæ, antequam per congrua corporis emunctoria expurgatae fuerint, dolores periodicos efficiunt; qui absoluta digestione ut plurimum invadunt.

§. XV.

Observamus porro ætatem puerilis valde doloribus esse obnoxiam, *etas*, tum quod in hac ætate minus exacta *quare* servatur diæta & ventriculus cibis dulcibus, fructibus horæis, placentis ac laeticiis oneratur; tum quod etiam *cephalat.* *gie ob-*
noxia? *ver.*

Interdum remittit dolor. vermes, quibus gignendis pueri peropportuni sunt, causam hujus mali præbent, dum putres & corrupti humores ad caput cum chylo delati, membranis motricibus elaticis tonum & robur naturale auferunt. Sciendum

futuræ arthritidis vel podagræ indicium præbeant.

Indicationes Curatoriae.

quoque est, non semper & continenter dolorem hunc cruciare, sed dilucida sua ac definita interdum habere intervalla, ut magno ægrorum solatio subinde remittat, & ad notabile etiam tempus ægros deserat, qui certis tamen postea horis, diebus, imo mensibus & annis revertitur: certo tunc indicio, causam magis in remotis partibus, maxime omnium in ventriculo ac viseeribus imi ventris hærere; quorum vitio sanguinis liber progressus per universum corpus, maxime per caput, ubi impeditur, dolor excitatatur: quod in primis in viris, qui fluxi hæmorrhoidali sunt vel fuerunt obnoxii, vel malo hypochondriaco affecti, observavimus.

§. XVI.

Prognos. sis. Neque semper sine periculo cephalgia est: nam si causa doloris magis intra cranium inque membranis cerebri consistit, sique dolor vehemens & assiduus cum febre excruciat & somnum pene omnem adimit, phrenitatem non raro prænunciat; si vero subito in hypochondriacis vel in melanocholiis pronis, præsertim graviori animi affectu præcedente oritur, & somnum atque appetitiam aufert, ac cum auditus difficultate valorumque interna pulsatione jungitur, hæc vero cuncta sine febre fiunt, furorem prælagit. Ubi vero subitum & percutum in capite dolorem aurium tintinnus, difficilis incessus, genuum imbecillitas, & impeditus tardusque sermo sequitur, signum est futuri morbi attoniti vel etiam hemiplexiæ; qui tamen magis in opposito latere quam in affecto excruciat, dum hoc percipiendo dolori non amplius par est. Neque prætermittendum esse censeo, quod in adolescentibus & junioribus, frequentiores cephalgiae,

Indications quas uero. Quod attinet ad curationem hujus mali, cum varia ejus sint cause, probe ex debent discerni, quia eisdem removendis, omnis medendi ratio superstructa esse debet. In genere tamen omnes scopi hunc morbum curandi, sequentibus absolvuntur indicationibus. Primo sanguis & humores impetuose ad caput congesti si fuerint, partim ad loca ignobiliora derivandi, partim idoneis remedii discutiendi sunt. Secundo strictræ membranarum capitum spastica, quarum causa plerumque est acris caustica materia, relaxandæ sunt, ut liberius fluida, quorum cursus per has impeditus fuit, nunc progredi possint. Tertio causa materialis vitiofa, peccans intemperie, temperanda & per convenientia emunctoria placide subducenda. Tandem ad avertendas recidivas, capiti & toti nervorum systemati idoneis remedii præsertim accurato diæta & vita regimine robur conciliandum.

§. II.

Si causa doloris est nimius ex inferioribus locis ad caput per spasmos apertus & irruens sanguis, non facile presentius auxilium quam in ejus missione positum erit, qua in locis non procul a parte affecta, melioris derivationis causa instituenda est; videlicet sub lingua aut in fronte, vel venæ jugularis externæ incisione, aut hirudinum pone aures applicatione; hac tamen adhibita observatione, ut si corpus nimis turget sanguine, primo vena circa pedum talos pertundatur, postea sequente vel secundo die vena circa caput aperiri potest. Consultum quoque judicamus, ante sanguinis detractionem, alvum sordibus deplere, quod commode & insigni cū levamine clysteribus fieri potest domesticis, vel etiam per infusum mannatum & rhabar-

*Quando
vene se-
ntro con-
ferat.*

barinum, adjecto sale quodam aperitivo, ut tremore tartari, vel sale Sedlizensi.

§. III.

*Quibus organis sedan-
dus.* Ad compescendum vero nimium sanguinis abundantis & ebullientis organum, mixturam blande diapnoicam & temperantem, ex aqua florum tiliae, litorum convallium, sambuci, cerasorum nigrorum, antimonio diaphoretico, nitro purificato, cornu cervi usq; cinnabari & syruopo papaveris albi compositam, dare expedit. Externe vero epithema discussiens & temperans fronti & capiti cum linteo duplicato est applicandum, cujus formula haec esse potest: Recipe aceti rosacei, rutacei ana unciam & dimidiam, spiritus rosarum drachmas duas in quo camphoræ grana sex soluta, nitri purificati scrupulos duos, olei ligni Rhodii guttas quindecim: vel sequens emulsiō cum fructu usurpari poterit. Recipe nucleorum Persicorum, amygdalarum amararum ana unciam dimidiā, feminis papaveris albi drachmas duas, aquæ rosarum, florum sambuci, cerasorum nigrorum dimidiā, camphoræ in oleo amygdalarum dulcium solutæ grana quinque. M. D.

§. IV.

*Quidfa-
ciendum
si a sero
viscido
dolor
oritur.* Alia vero medendi ratione opus est, si a seri viscidī & vitiōsi intra vel extra craniī membranarū vasa stagnantis copia, dolor cum torpore & gravitate sepe valde diurnus innascitur, ubi nec sanguinis missione, nec leniora laxantia quicquam efficaciter præstare possunt, sed tum dare convenit paulo valentiora, quæ crassos glutinosos humores dissolvendi & simul per alvum expellendi facultate pollent. Id quod utrumque egregie præstant, quæ sequuntur pilulæ: Recipe gummi ammoniaci depurati, sagapeni, myrræ elestæ, aloes rosatæ, extracti hellebori nigri, resine jalapæ, mercurii dulcis, cinnabaris præparatae ana drachmam dimidiā, extracti croci, pulveris castorei, salis

succini ana grana 15.M.F. Pil. ex scrupulo numero 12. quorum sex vesperi, & sex postero die mane sumi possunt; quo tempore etiam ab omni cibo abstinentum & tenuia tantum jusculæ ægro præbenda sunt: tribus vero diebus exactis, idem repeti potest remedium. Vacuata sic sufficienter vitiōsi seri copia, medicina utendum est tonica roborante & simul diuretica; quo fine ego multoties mixturam, quæ ex tintoræ antimoniī acris partibus quatuor, essentiæ succini & spiritus bezoardici Bussi, vel tartari & liquoris nostri anodynī mineralis, singulorum partibus duabus erat composita, summo cum fructu expertus sum; cuius usus, dosin bis vel ter de die sumendo, per septimanam & ultra continuari potest. Nam quæ fibras torpidas roborando earum vim motricem elasticam excitant, simulque urinæ fluxum promovent, ea in hac cephalalgia specie, quæ ab extravasato sero intra cutim & cranium, vel etiam in ipso cerebro oritur, valde proficia observavimus. Præter hæc autem cum CELSO, laborem & exercitationem usque ad sudorem, vehementem frictionem, & cibos ac potionēs quæ urinam movent, in tali doloris genere commendamus.

§. V.

Si his in usum vocatis dolor non discutitur, confugiendum etiam ad externa, inter quæ vesicatoria virtutis sunt expertissimæ, quia pernitioso stagnanti humori exitum concedunt. Nos in usu habemus emplastrum meliloti, cuius uncia cum drachma cantharidum misceatur, adjectis granis aliquot camphoræ. Hoc magnitudine thaleri nuchæ applicari, & postea renovando illud, per longum tempus continuari potest; quod sine ullo incommodo insignem serosi humoris copiam fundit. In malo graviori autem & ubi a sero sub cute capitis stagnante, tumor visu, nec non ex dolore tactu cognoscitur, B. WEPFERUS toti raso capiti emplastrum ves-

*Adhiben-
da exter-
na priori-
bus in
caſsum
adhibe-
tis.*

vissicitorum instar cucuphae impo-
suit, cuius effectus hic fuit, ut sine
oboris vesicis magnam seri vissidi
subtraxerit copiam: quod remedii ge-
nus jam tum ab ipso RIVERIO, vi-
de ejus *observat.* in pertinaci capitisi
dolore, summo cum fructu usurpa-
tum fuisse animadvertisimus,

§. VI.

In dolore *fixo* *quid* *confert?* Interdum fit, ut præter consuetu-
dinem intensus dolor, certum dun-
taxat locum occupet, a materia fi-
xius & paulo profundius membranis
inhærente, oriundus; quo casu medi-
cus Gallus cum prudentia doctus & in
observatione curiosos CHESNEAU,
vide ejus *observationes*, miraculo-
sum plane herbæ ranunculi pratenlis
impositæ vesicantem effectum, non
satis prædicare potest: de cuius her-
bæ specie scribit, quod foliis anemo-
næ assimuletur, & masticata linguam
mordeat quam maxime; hujus folia
in mortario marmoreo contusa, &
simil emplastro perforato apposito,
parti applicare jubet. Videtur hæc
herba autem haud dissimilem cum
moxa possidere effectum, quæ etiam
in ejusmodi dolore a medicorum
peritissimis magnopere æstimatur.
Ego rebus sic stantibus, felici aliquoties
cum successu, rasæ prius
quam occupavit dolor parti, siccum
sal volatile salis ammoniaci, cum
equali parte pulveris sinapi mixtum
imponi jussi, eo quod paulo fortio-
rem discussionem, tam profunde
inhærens vitiosus humor requirat.

§. VII.

Quid in *gravati-*
vo? Ubi vero dolor, a suppressa coryza,
sive a muco, intra narium concame-
rationes & sinus, detento oritur, ex-
pedit crebro, sal quod vocatur Angli-
canum, & nihil aliud est, quam sal
volatile siccum salis ammoniaci, cum
oleo cephalico, ut lavendulae vel ma-
joranæ exaltatum, naribus admove-
re, vel etiam errhinum pulvrem le-
niter sternutationem moventem, qui
ex herba majorane, betonicae, ma-
ro vero, floribus benzoës & pulvere

caryophyllorum concinnatur, ad in-
teriora narium admittere.

§. VIII.

Quod si vero causa chronicæ & *Quomodo*
immanis doloris, in valde corrupti
seri & sanguinis massa, ut sit in lue
Gallica & scorbutica, fundamen-
tu suum habet, tunc utique ne-
cessarium est, congruis & specificis
remedii hisce morbis sanandis ac-
commodatis causam morbi aggredi;
quo faciunt quam maxime lignorum
decosta cum antimonio crudo, si
prius humores corrupti per alvum
probe, per ejusmodi quas jam supra
dedimus pilulas, exclusi fuerint.
Multum etiam tunc ex diæticis
confert abstinentia sive inedia per
unum vel alterum diem, nec non
labor & exercitatio corporis ad su-
dorem usque. Utile quoque est, in
pertinaci tali morbo, ab impuro
qui nascitur sero, per medicinam,
fudorem provocare: cui scopo egre-
gie sequens pulvis satisfacit. Recipe
cinnabaris nativæ præparatæ, cerusse
antimonii sive bezoardici mineralis,
salis volatilis viperarum vel cornu
cervi, nitri purificati, singulorum
grana 10. camphoræ granum dimi-
diuum, pro dosi, defuper bibendo
decoctum sanguinem purificans.

§. IX.

Hemicrania & præsentint periodi-
ca, causam latenter ut plurimum *Quid in*
prima in regione habet, quando venia pro-
triculus cum annexo duodeno, vitio *hemicra-*
na humorum colluvie refertus est,
quam lenioribus tunc emericis eva-
cuare proficit: alvum quoque ducere,
& per inferiora fordes expurgare,
noxiunque humorem a capite deriva-
re, interdum valde est necessarium;
id quod optime, per pilulas polychre-
tas balsamicas, fieri potest. Postea
elixiria stomachica, tonum ventri-
culi & intestinorum tororantia, sunt
subjungenda. Si vero ab inordinate
mensium vel haemorrhoidum fluxu,
causa doloris nascitur, remedii que
salutares excretiones in jultum & con-

venientem ordinem redigunt, prudenter est utendum.

Cautela & observationes clinicae.

§. I.

Quemodo & quando dolor leniens datur. Absoluta sic doloris cephalici cura, quasdam necessarias adhuc cautelas & observationes ad eam spestantes subjecere haud erit inutile. Quandocunque dirus & acutus dolor, praesertim qui consistit in syncipite & sinibus frontalibus, tanta vi pollet, ut vires mirum in modum frangendo, vita discrimen minetur, ablatio causæ morbi minime erit prius expectanda, sed ægro potius primo omnium levamen quoddam afferendum est; eo quod viribus amissis, medius frustra semper laboret. Quin imo ipsa doloris acerbitas sœpe tanta est, ut graviora symptomata, vigiliam assiduum, animi deliquia, febrem, inflammationem mentisque alienationem accersere possit. Erunt ergo tum remedia interna, tum externa, ad dolorem levandum primario dirigenda. Ego vero ex internis, primas utique partes massa pilularum Wildegansii, quando cum cinnabari nativa miscetur, nec non pilulis Starckii deferre soleo. Prius vero semper ante usum anodynorum enemate venter subducendus est. Inter externa nec tutius, nec virtute praestantius invenimus remedium, quam linimentum spissius ex sequentibus ingredientibus, sub tali forma paratum. Sumitur nempe olei nucis moschatae expressi uncia dimidia, resina styracis, resina corticis thymiamatis æquali pondere drachma, extracti croci, balsami Peruviani, utriusque drachma dimidia, olei ligni Rhodii gutta 12. M. linimentum fiat spissius, quod corio inductum, magnitudine imperialis, temporibus applicetur. Sedato doloris impetu per interne & externe adhibita anodyna,

lene catharticum propinare juvat; postea ad alia, causam morbi penitus pro ejus conditione & natura per congrua remedia removendi, medicus confugere debet. Quando dolor acutissimus vixque tolerabilis, cavernis narium, sinibusque ossis capitidis diutius infixus haeret, qui ab exigua sanguinis vel humoris extravasati quantitate, sub membrana hos sinus tegente, producitur, sedare non modo, per jam dicta remedia, doloris atrociam convenit, sed & laborandum est, ut sanguinis appulsus, sub quo dolor augetur, minuatur, quod commodissime more Ægyptiacorum medicorum scarificatione facta in naribus, fieri potest, vel compendiosiori modo, si straminis paulo durioris portio valide & subito naribus intrudatur, ut sanguinis inde sequatur profluvium.

§. II.

Si vero sub membrana pericranii *Vel sub membrana peri-* extravasatus, mordax & acris humor inclusus, os incipit cariosum reddere, tum omnibus aliis in cassum applicatis ad incisionem accedendum est, quæ uti in paronychia ex simili fere causa orta, ita hic mirabile ferme adfert auxilium. Si vero jam caries ad diploem ipsamque lamellam inferiorem cranii penetraverit, unicum auxilium in trepanatione provide erit reponendum.

§. III.

Porro in genere sciendum est, in *Cursu* omni, a quacunque etiam causa proficiscatur, dolore cephalico, initium *enematio-* curationis ab injectione enematis, *incipitu-* item a venæ sectione, si plethora *da.* non exigit, faciendum esse, ita tamen ut alvia apertio huic præcedat. Postea de aliorum congruorum remediorum tam internorum quam externorum usu erit decernendum. Sæpius plethora soluta, ad meliorem derivationem causæ peccantis a parte affecta, frontis venam aperire expedit. Et tunc Clarissimi HEURNII monitum, quod *notis in aph. 68. HIPPOCRATIS, Sect. 5. insinuat, dignum utique obser-*

Si dolor ab hu-
more ex-
travasa-
to, vel in
sinibus
frontis
habet.

observatione est. Suadet nempe, ante sectionem, ut vinculum collo injiciatur, quo intumescat hec vena, que oblique erit secunda, cavendo diligenter ne lœdatur tunica pericranii.

§. IV.

Arterio-tomia. Arteriotomiam in temporibus celebrandam, præsentaneam & pene mirandam, ceteris omnibus inaniter adhibitis, sèpius opem ferre & lenimen, probatissimorum medicorum fide constat. Neque ego, quanquam nunquam hoc remedio usus sum, detrahere illi quicquam volo. Ita vero de hoc exultimo, quod si sanguis ex ramo venæ jugularis externo aperto extrahatur, longe melius retardatum circularem sanguinis motum in capite restitui, humoremque subsistentem vel extravasatum, a quo pendet dolor, felicius dimoveri & excludi posse; dum videlicet sanguis arteriosus, majori ut antea celeritate in spatiū venæ ab extractione sanguinis evacuatū fertur. Si vero, ex consilio & deliberatione medicorum, temporalis vena pertundi debet, tunc optime hæc operatio juxta autem prope articulationem mandibulae, ubi periculo vacat, celebranda erit.

§. V.

Pediluvia. In omni dolore, ubi vires non ferunt sanguinis detractionem, neque ejus satis est, pediluvia, quæ nunquam non in hoc affectu utilia, modo sint temperatoria, ad divertendum sanguinis & humorum motum ad partes infernas, cum fructu adhiberi possunt; neque pedum frictiones pauclo asperiores cum pannis sunt improbandæ; nec rubefacientia, ut taleoli raphani rusticani cum sale mixti pedibus imponendi, usu suo desituuntur.

§. VI.

Cautela circa epithemata. Circa epithemata actu frigida tendum hoc est, quod cum summa circumspetione applicanda sint. Prostant enim exempla nobis etiam cognita eorum, qui in febribus præfertim exanthematicis, variolis, morbillis, purpura, ubi natura per extre-

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

mam cutim peccantem materiam sub specie halitum non sine fructu excludere nititur, per crebrius in dolore capitis applicata frigidiora epithemata, in coecitatem ad dies vitæ durantem, in epiphoras quoque ac suffusiones oculorum sunt præcipitati. Neque etiam semper confert in hoc dolore profligando, pluribus & variis topicis uti, quorum applicatio interdum plus periculi habet, plus etiam prudentiæ a medico desiderat, quam internorum usus. Neque omnia, omnibus æque salutariter convenient: nam quæ alius ferre potest, ea alteri incommodant.

§. VII.

In ipso paroxysmo ad atrocem dolorum mulcendum, non una sed pluribus vicibus, insignem efficaciam a liquore nostro anodynō minerali, aliquot guttulis ejus, saccharo in pulverem redacto instillatis & in os sumitis, experti sumus. Extra paroxysmum ad roborandum caput, vel etiam ut illud a recursu mali vindicetur, balzamo nostro analleptico quod vitale audit, si vel exterius temporibus aut vertici applicetur, aut naribus moderate hauriatur, vel ejus aliquot guttule saecharo instillatæ cum infuso Theiformi sumantur, peculiares plane, non sine ratione & experientia, virtutes & laudes tribuimus.

§. VIII.

Quandocunque nimium ebulliens & variis de caulis in motum concitatum actus sanguis, doloris originem præbet, neutquam purgantia vel evacuantia, sed potius refrigerantia & temperantia locum inveniunt: quo ego nomine plurimum solius aquæ frigidæ potui atque nitrosis tribuere soleo. Et certe in hac re non est de nihilo, eximum nostri HIPPOCRATIS monitum, qui libr. de ratione victus in morb. acutis, sic scribit: Anmadverttere oportet in iis quibus caput, vel ob exercitationes vel cursus, vel iter, venationem, vel alium quendam intempestivum laborem dolet; horum

quidem nullos purgaveris. Vult enim præclarus senex, ubi ex calore vel sanguinis fervore oboriatur dolor, purgantibus uti nos non debere.

§. IX.

Cephalæ hypochondriacorū. Sæpe fit, ut melancholia hypochondriaca cephalæ conjungatur cum digestione depravata, macie corporis, timore & vultus colore vitiat: quo in casu venarum sectio, balnea aquæ dulcis, conveniens motus corporis, aquarum medicarum prudens usus, juscule medicata præsertim quæ sunt cum succo cichorei, serum lactis caprini chalybeatum, nec non cichoreatum ceteris omnibus palmam facile dubiam reddunt.

Methodus Præservatoria.

Uti in omnibus capitis affectibus, ita etiam in dolore ejus hanc vivendi rationem suadet MERCURIALIS Consultat. Tom. I. pag. 104. Consult. 107, cuius integrum textum methodi præservatoriaæ loco hic inserere minime tñderet. Aërem, enim inquit, in clementem & infuctum quantum fieri potest aut vites aut integumentis & cubiculis arceas, somno moderate utaris, nec unquam nisi dualibus post cibum horis: capite semper elevato dormias: corpus & animum ita exercere oportet ne alterum ab altero labore vel otio vinclatur. Neve cure nimis, nimisque cogitationes & studia calorem nativum beberent. Alvum præ ceteris lubricam, nisi ita sit, quantum fieri potest serves; si quidem nihil est quod perinde caput afficiat & subinde vertiginosis affectibus occasionem præbeat, ac fæces in intestinis diu retente. Jam vero repletiones & crapulae, quas interdum istarum plagarum habitatores, etiam si peregrini sint, committere coguntur maxime omnium tibi initiaæ sint: & idcirco eas ac vinorum generosorum assiduus potus fugias necesse est. Cibi omnes crassi, pingues, flatulentii, cujusmodi legumina & olera, pisces ac fercula multis aromatibus conferta,

qualibus gens germana uti solet, nisi a te vitentur, ne mala tua in dies au- geantur metuendum est.

ENARRATIONES
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Studiosus viginti & aliquot anno- rum gracilis & tenerioris habitus, a studiorum intemperantia & nimis lucubrationibus, dispositionem sibi contraxit hypochondriacam, cum digestione ciborum vitiata, alvi striatura, spasmis, flatulentis, subinde etiam capitidis dolore junctam. Invitatus ab amicis in convivium, magna & insolita vini Rhenani sed sulphuris fumo valde infecti copia se replevit, & ebrius factus. Ex hoc tempore gravi & continuo capitis dolore correptus fuit, qui tamen sinistrum maxime latus occupabat, ejusque antem cum primis partem, frontem, oculum, aurem & dentes ejusdem lateris vehementer interdum stringebat ac obtundebat. Sub notabili vero tempestatis mutatione vel sub profundi oris paulo mentis meditatione adeo increcibat, ut vires, somnum, appetitiamque prorsus fere adimeret. Suaserunt medici crebras venæ sectio- nes, alvus saepius polychrestis pilulis subducta, & cephalica tam interne quam externe, neque minus stomachica adhibita, sed citra optatum successum. Ego potius, cum consilium a me peteret, dissuasi ulteriore sanguinis missione & medica- mentorum frequentem usum. Pedilu- via vero & pedum frictiones cum parnis asperis, neque minus caput crebrius perfricandum commendavi, atque ut illud & pedes in æquabili & temperato calore ac transpiratione contineret, manequi quotidianie in lecto infusum Theiforme ex herba melissæ, salvia, veronica & semine foeniculi assumere, blandum sudorem exspectando, auctor fui. Pro potu ordi-

ordinario, loco cerevisiae, decoctum ordinavi ex speciebus temperatis. Deinceps balsamo nostro liquido vitali sepe inunctæ, ubi dolor nimis urgebat, nares, nucha, tempora. Quorum remediorum ope insigne levamen æger expertus est.

Epicrisis.

Dici vix potest, quam inimicum nervosis capitis partibus sit vinum sulphuratum. Et sicut vinam præsertim potens & generosum, inque specie vina dulcia ad capitis morbos: ita multo magis quodvis infesto sulphuris vapore refertum vel adulteratum disponit. Sulphuris enim particulæ dum altius se in insinuant membranarum poris in stricturas eas adidunt. Vimum vero rarefaciendo sanguinem nimiam fibrarum nervosarum & vasorum efficit expansionem & distractiōnem: unde dolor oritur. Quod si vero semel & iterum solidis nervosis partibus inducta fuerit ingens infirmitas & earum vis motrix elastica naturalis læsa, affectiones quæ inde prodeunt præternaturales, ex facili causa, in iisdem partibus recurrunt. Deinceps observari quoque velim, in nulla corporis parte nervosas & sensu preditas membranas facilius. Iædi quam in capite, eo quod liberioris aeris accessui sunt exposita. Quantam autem vim subitæ aeris & tempestatum mutationes, præsertim quæ ab uno extremo ad alterum vergunt, immutando & lædendo nervosarum partium tono & elatere habeant; id dolores, spasmi, convulsiones & aliae partium nervosarum præternaturales affectiones, quæ inde ingravescunt, ostendunt luculentissime. Liquor nostro balsamicus ex sinceris non adulteratis & temperatis oleis cephalicis confessus, infirmitati nervosarum partium, exterius præsertim si applicetur, mirifice opitulatur; nisi corpus admodum plethoricum sit, & natura proflus a suaveolentibus abhorreat.

OBSERVATIO II.

Persona quædam splendida annum jam ætatis quadragessimum & tertium agens, validæ a natura constitutio-
nis, a prima statim adolescentia lar-
giori vini potuji assueta, cui etiam in
hunc usque diem nimium indulget,
sub tempestate valde ventosa, humi-
da & frigida, per aliquot septimanas
venationibus incumbens, non modo
defluxione acri, falsa, dolorifica,
& ardente in utroque oculo, sed &
gravi & pertinaci cephalalgia cum cu-
tis capitis tumore juncta corripitur.
In consilium & ego quoque accitus,
fontem Selteranum vino intermis-
candum & vesicatorium nostra methodo
præparatum nuchæ applicandum sua-
fi; acidulæ quoque ægranæ cum de-
centi regimine fuerunt usurpatæ: &
dolor inde valde mitescebat. Balsa-
mo vero vitæ cum inungeretur caput,
materia ichorosa, qualis ex ulceri-
bus prodit, copiose effluxit: cucu-
pha quoque ex speciebus balsami-
cis & cephalicis temperatis ad ro-
borandum caput gestata fuit. Qua-
ratione atrox ille dolor penitus su-
blatus est.

Epicrisis.

In genere hoc attendi velim, eos
qui pocula amant & fere quotidie se
immergunt vino, ex transpiratione,
qua difflari debent partes nimis calidæ
& sulphureæ, per auram frigidorem
admissam cohibita, graves in capitis
morbos & dolores frequentius incur-
rere, quia in nullo corporis loco im-
mediate & proxime magis quam in
capite, præsertim si illud non satis
tegumentis munitum sit, tonus va-
forum & tunicarum nervearum a ven-
to frigido penetrante læditur. Ves-
icatoria rite & paulo diutius applicata,
ubi materia in partibus capitis exter-
nis vitiola relideret, eximiam solent
opem etiam in acribus salis & calidi-
oculorum defluxionibus præstare. Ce-
terum in ejusmodi morbis, qui a di-

scrasis calida & sulphurea sanguinis, qualis ab exsuperante vini potu & cuticulari perspiratione prohibita nascitur, aquae diluentia, acidulae, immo aqua simplex loco potus ordinarii magno & efficaci sunt praesidio.

OBSERVATIO III.

In manis cephalalgia cum auditus difficultate & tinnitus, ex neglegente venae sectione sanguinis missione et hydroposia curata.

Juvenis spongiosi habitus & sanguinæ complexio, a longo hinc tempore marium haemorrhagiis obnoxius, ob paulo validiora corporis exercitia nimiumque veneris usum & potum largiore, frequentiores & largiores eas passus est: ad quas minuendas & compescendas ter singulis annis admissit in pede venæ sectionem. Postea vero eam consueto tempore semel omisit vel potius neglexit. Hinc immani corripitur cephalalgia cum auditus difficultate & tinnitus, caput totum rubore intumescit. Venæ sectio instituitur in pede & multum sanguinis extrahitur. Mitigatur inde quidem dolor; neque tamen sedem suam penitus relinquere voluit, donec stramine paulo duriori naribus intruso largius sanguinis ex iis fistilicidium fuerit procuratum. Inde dolores mitigati fuerunt mirum in modum. Sed cum a supra memoratis causis ex facili dolores recurrerent, nec sola venæ sectio iis abigendis sufficeret; & quietam vitam & hydroposiam nec non serum lactis acidulatum frequenter bibendum commendavi, intercalato quandoque pulverum nitroso-rum usu. Quibus ex toto integrum valetudinem consecutus est.

Epicrisis.

A sola plethora in junioribus nares crebrius fundere sanguinem, siue hoc non accidit, capitis ægritudines inque primis cephalalgias sequi, per crebram experientiam certissimum est. Quos morbos si natura non sponte per marium haemorrhagiis solvit, Medicus id arte præstare debet, evacuando sanguinem ex venis non procul a capite diffisis, incisione vena-

rum jugularium externarum vel quo sub lingua positæ sunt: meliori vero adhuc successu per scarificationem in naribus vel apertione in vena idoneo instrumento factam, non neglecta tamen sed probe observata hac cautela, quod videlicet, si nimia adit sanguinis exundantia consultius sit, in diffiso loco a parte affecta sanguinis missionem prius instituere, & postea non procul à morbo parte; quia dato exitu sanguis ex partibus inferioribus spasmo subinde affectis saepius cum impetu in lœsam partem ruit, non sine gravioris mali metu. In tali cephalalgia specie topica volatilia & suaveolentia calidiora fugienda esse censemus, sed præstat epithematibus paulo frigidioribus sanguinem ebullientem reprimere, quod tamen etiam adhibita prudentia fieri debet, præmissa videlicet venæ sectione, pediluvii, & alvi segnis per clysteres decenti subductione.

OBSERVATIO IV.

Rheumatisa cephalalgia in Sacerdotio hypochondria co, Cervoliniis curata.

Vir quinquagenarius facerdotali munere fungens studiis & meditacionibus nimium indulgens; ex prava inde sequuta digestione & ventriculi infirmitate, crebrius catarrhofis defluxionibus, odontalgiis & cephalalgiis obnoxius fit: quæ tamen pathemata, cum plane abstineret a prandio, sumta tantum cena multum deereverunt. Postea vero dolores à capite usq; ad colli & thoracis dextrum latus valde molesti exorrecti sunt, diutius perseverantes. Quibus removendis varia a variis præscripta sunt remediorum genera, atque inter hæc internæ essentiæ, & elixiria cephalica, pulveres cinnabarini, fonticulus quoque nucha & brachio dextro inustus, celebrata venæ sectio, externe affectæ partes oleis penetrantibus inunctæ: sed sine levamine. Scripsit ad me historiam, adjiciens, quod nares tenacem albicantem mucum sed exili in copia fundant, & sensum se pon-

ponderosi saxi in sinistra capit is parte percipere: caput vix sine dolore inclinari vel verti posse: ita ut linguæ etiam usus valde difficilis sit; colli quoque glandulas comparere tumidas. Addidit quod ante biennium febris tertiana ipsum corripuerit, quæ postquam materia largiter e pectori excreta fuit, levamen quoddam attulit. Mentionem quoque fecit doloris circa ventriculi regionem atque inflationis in hypochondriis. De di consilium ut thermas Carolinas adiret & secundum præscriptum a me regimen per mensem, & ultra iis uteretur: injunxi demum accuratum vitæ institutum cum motu corporis sufficiente & animi quiete; suasorque fui, ut præmissis frictionibus in nucha & cervice cucurbitulas cum scarificatione apponendas curaret. Et inde eum melius se habuisse cognovi.

Epicrisis.

Non simplex cephalalgia hic affectus sed potius rheumatismus, qui totum caput & vicinas partes occupat, meretur appellari: eo quod humor vitiatus non unam partem occupet, sed per porosam substantiam serpendo, in vicinas nerveas partes, eas lacinando, & vellicando delabatur. Causam sine omni dubio discrasia seri scorbutica, ex depravata ventriculi digestione & hypochondriorum vitio nata subministravit. Originem primam vero dedit nimia studiorum cum profundis mentis meditationibus intemperies, juncta cum lucubrationibus: quæ quantam vim, ventriculum & intestina infirmandi & totum corpus morbidum reddendi habeant, experientia satis apertum ac manifestum est. In tali statu morbi particularia ut ita loquar remedia seu symptomatis dicata nihil proficiunt, sed si talus & sanitas speranda est, non ab aliis nisi ab iis, quæ vitiis fluidorum & solidorum amovendis sufficiunt, cuius generis sunt fontes medicati calidi vel frigidi cum regimine diætetico usurpati, peti debent.

OBSERVATIO V.

Fœmina nobilioris generis septuaginta jam septem annos transgressa sanguinis plena, contumaci a quinquagesimo circiter anno, quo menstrualis fluxus valedixit, hemicephalæ affigebatur. Ex quo tempore, multa licet atque varia ad sedandos & abigendos hos dolores continuo adhibuerit remedia & frequentiores in brachio pariter ac pede venæ sectiones instituerit: nullum tam ex his percepit levamentum. Donec tandem sanguis ex narium venulis ad uncias circiter 6. ope pennulae intrasse, in eo nimis latere ubi dolor consistebat, fuerit evocatus. Neque ullum aliud preter aquam frigidam simplicem in usum est vocatum, ita ut non modo externe in duplikato linteo capiti sepius admota, sed etiam interne ad tres quotidie mensuras triduum sumta fuerit. Et sic diu exoptatum, quæ Dei erat gratia, passionis valde dolorificæ perfensit levamen. Qua de re simplici hac potionem semper loco cerevisiæ est uia, hausto tantum inter prandendum uno exi-guo vini cyatho.

Epicrisis.

Aquam simplicem frigidam puram, tam interno, tam externo usu, in multis & gravibus affectibus valde conducibile, & efficacissimum remedium præbere, per paucis quidem cognitum & credibile videtur. Nihilo minus & experientiæ & rationis & auctoritatis quoque, multorum veterum Medicorum suffragio id ipsum est probatissimum. Egimus ex instituto in peculiari dissertatione de salubritate potus frigidis, paulo prolixius: ubi evidentibus argumentis tam aquæ quam frigoris quaque in ea contenti eximias in morbis debellandis vires abunde demonstravimus: nam magna inest vis frigoris elasticam fibrarum, & vasorum corporis nostri vim firmandi, roborandi, & virtutem expansivam interni liquidi cali-

Hem.
crania
sanguini
nervis eva-
cuatio
nem
ribus
aqua
frigidis
curatae

di coercendi, quo vis vasorum a nimia expansione valde debilitata ad statum redeat naturalem, & sanguinis ac fluidorum motus liber & æquabilis restituatur. Et sicut potus sufficiens aquæ simplicis & frigidæ, firmando tonum solidorum, humores fluxiles reddendo, & salinas sulphureas partes diluendo ac evehendo, multorum affectuum causam præscindit; ita externe frigore suo etiam succurrerit iis morbis, qui a nimio vasorum infarctu, & expansione originem suam ducunt. Nihilo minus quotidianus aquæ potus non omnibus naturis convenit, sed ejus præscriptum prudentiam medentis requirit.

OBSERVATIO VI.

Dolor. Vir erat Hebreus circiter quadragefixus in narius strictioris corporis habitus, qui vertice ab iracundia & superingesto cibo concapiebat traxerat dolorem in vertice capitis fixus, spatiū occupans magnitudine xum, spatiū occupans magnitudine imperialis, sensus hujus doloris quidem cibo r. non adeo erat acutus, vibratorijs, langua fr. cinatorius aut pulsatorius, ut alias in gida su. cephalalgia esse solet, sed magis pressorijs & gravativis sub cranio; neque erat perpetuus, sed subinde maxime circa vespérā & noctem ingravescens. Nihilo minus tamen adeo graviter inde luebat, ut appetitus concideret, somnus abesset, vires mirifice deficerent, pulsus inordinatus, modo celer, modo ratus & languidus micaret, ipse quoque animus abjectus esset, & sub patoxysmo quandoque plane turbaretur. Pugnatum fuerat adversus hunc dolorem tum a me tum ab aliis strenue & efficacissimis aliis remediis. Sed licet quandoque inde remittere per aliquot dies videretur, levi tamen accidente occasione ex ira aut aliis extensis injuriis iterum vehementia recrudesceret priori similis. Exactis inter haec duobus circiter mensibus in consilium simul vocatus est civitatis hujus medicus natione Gallus, ingeniosa curandi tentamina subinde non infeliciter adornans. Is purgato prius per

aquam Sed licensem corpore, dedit consilium, ut æger mane & post meridiem biberet dimidiā aquæ fontanæ frigidæ mensuram in lecto. Inde primum quidem factum refrigerium & symptomata visa exacerbata, sed elapsa hora pulsuum magnitudo increvit, & sudor erupit largissimus cum doloris levamine. Hinc per septem dies potum continuare præcepit, tam felici successu, ut successive dolor evanesceret omnis. Ac licet elapsis aliquot hebdomadibus, post iram dolor hic repeteret, eodem tamen remedio per triduum usurpato iterum feliciter est discussus, & æger sanus jam est ac vegetus.

Epicerisis.

Sedem hujus atrocis doloris in eo loco ubi conjunctio est suturarum, coronariæ nempe & sagittalis, qui in infantibus fontanellæ nomine venit, reponendam esse judico: nam ibi est pericranii cum dura matre arcta conexio; & proinde etiam dolor qui externe in illo loco extitit, in consensum trahendo duram cerebri membranam majorem symptomatum exacerbationem, virium prostrationem, animique turbationem neque minus pulsuum inordinationem efficit. Causam ego mali esse bilem vitiosam ab ira commotam in flexura duodeni stagnantem & corruptam credidi, cuius vis ebulliens & acrimonia mire a frigidæ potu coeretur, & reprimitur. Siquidem ego saepius in praxi mea, ex vehementi ira mox ante cibum sumtum, gravem cephalæam animadvertis, quam aliis nihil proficiens, feliciter a feri lactis aciduli potu quotidie ad mensuram sumti a me discussam memini. Secuta inde fuerunt sepe sex alvi de die dejectiones, & sic expurgata biliosorum humorum sentina, desiderata convalescentia secuta est.

OB-

OBSERVATIO VII.

*Cephalæa ex quartana chinæ proficiat, Carolinæ vissima cephalæa, discussa minem, vires atterendo succedit: dolor erat continuus & valde gravativus qui maxime incrementa sumvit peractis quatuor vel quinque horis a digestione, conjuncti simul erant dolor, tumor, imbecillitas mauuum cum insigni corporis debilitate. Postquam in cassum multa fuerant usurpata, venit ad me auxilium meum rogitans. In similibus casibus essentiæ nostræ tonice usum paulo protractiore subinde convenientissimum expertus sum: quoniam præter vim roboranem, serum vitiosum, tum per vias urinarias, tum per insensibilem transpirationem eliciendi efficaciam possidet insig-
nem. Sed suasi thermarum Carolinarum usum, corpore prius, per salia detersiva, aperientia, interpositis nostris pilulis balsamicis probe preparato: & sanatio succedit auspicato.*

Epicrisis.

Quartanæ familiarissimum esse cephalicum dolorem symptomæ satis constat. Causam hujus rei inde deducendam esse arbitror, quod in hac febre quam maxime humor corruptus, tenacis, fixioris acidæ potissimum indolis duodenæ & valvulis tenuum inhærens, simili charactere præterlabenter chylum inficiat, qui postea ad minima & capillaria membranarum capitum vasa delatus, liberori fluidorum motui obicem ponens eorum dilensionem dolorificam causari potest. Id vero non modo in capitib, sed & aliarum nervosarum partium minimis vasculis evenit. Quamdiu motus febrilis durat, tam diu vasorum obstructio & humorum stagnatio neu-

tiqnam incrementum capit, propter celeriorem sanguinis per solidas partes trajectiōnem. Quandoquaque vero motus febriles corpori salutares supprimuntur, non mirum est, maiores fieri infarctus & obstructiones vasculorum, indeque dolores artuum, capitis, tumoresque cedematosos sequi, qui non meliori, & tuiore ratione, quam laudatis jam tempeslive adhibitis remedii possunt expugnari. Ejusmodi in casibus, ubi neque locus neque tempus vel occasio est utendi a, quis mineralibus, curam haud infeliciter cum decoctis blande diaphoreticis lignosis & pulveribus ex cinnabari, sale volatili, cornu cervi, veletiam regulo antimonii medicinali & sale absinthii compositis, non omissis ex manna & rhabarbaro per infusionem paratis laxantibus, bono cum DEO peregi. Atque insignis quoque & expertæ virtutis, usum essentiæ nostræ roborantis, cuius mentio supra §.4. p. 197. fit, reperi.

OBSERVATIO VIII.

Fœmina teneroris, & sanguineo-cholericae constitutionis annum qua jam trigesimum complevit, vita nimirum quietæ, & inordinate diæta indulgens, minus ordinatas nec sufficientes per annum & ultra habuit menstruales purgationes. Exinde de dolore in capite tensivo, gravativo, lancinante diu conqueritur, qui primum totum occupavit caput, nunc vero ad sinistrum latus declinat, ubi bregma, tempora, mandibulam, dentes, aurem, labia ejusdem lateris pungitivo & urente dolore infestat, ad brachium interdum pertingens, frequens intercurrit horripilatio cum pulu inæquali, duro & celeri. Ab hisce incommodis sequentibus liberata est. Primo singulis diebus pediluvia convenientia fuerunt ordinata: dein venælectio in pede post menses inordinate & parcus fluentes: tum quotidie infusum loco Thee mane

*Cepha-
lalgia
rheuma-
tica ex
menstru-
anoma.
ita.*

copiose haustum, quod ex verbena, melissa, summitatibus millefolii, semine scenici, cubebis, floribus chamomillæ vulgaris constabat. Pilula nostræ balsamicæ cum extracti croci & mercurii dulcis portione remixta, alternis diebus circa lecti ingressum, parciori dosi assumta fuerunt. Tandem externe balsamum nostrum vitæ sine ambra cum spiritus vini camphorati æqualibus partibus mixtum locis affectis dolentibus inunctum fuit: iuncto accuratori vita regimine, motu corporis & ut frigida atque acida vitaret, necnon digestioni vacillanti cum cibis sumendoelixirio nostro stomachico, quod in notis ad Poterium describitur, succurseret. Et ita per DEI gratiam ad valitudinem exoptatam pervenit.

Epicrisis.

Quando in gravi capitidis dolore etiam vicinæ nervosæ partes in consortium trahuntur, cephalalgia rheumatica oritur, quæ a sero acri vellicante, ob interceptum per venas obstructas sanguinis circuitum, secundente ac extra vasa posito, & per poros & loculos ad membranas deflato originem suam sumit. Et tales rheumaticæ affectiones ab impuro sero frequentissime in sexu sequiori, ob lunaris tributi minus rectum statum eveniunt. Neque melior accertior iis medendi ratio suppetit, ac si medicus operam & studium in ordinem redigendo uterinam excretiōnem per convenientia remedia adhibet. Nihilominus tamen semper, si talis casus occurrit, ventriculi simul ejusque digestions habenda est ratio, ut bene temperatus chylus ad sanguinis & humorum massam accedat, qui ejus intemperatam crasin sensim paulatimque, successu temporis corrigerem valeat. Quod vero dolor sèpius unum tantum capitidis & vicinarum partium latus petat, ex anatomicis repetenda erit ratio: quan-

doquidem constat, sicut cerebrum in duo hemisphæria divisum; ita etiam in dextro, & sinistro latere distinctos ramos arteriarum, venarum, nervorumque extare & communicationem inter se habere, ut licet lœsio fiat & circulatio non recte procedat quoad vasa in uno latere, salvus tamen & integer motus sanguinis circularis in altero hemisphærio persistat.

OBSERVATIO IX.

Nobilis adolescens qui vix ætatis annum decimum octavum attigit, ex citati alias & prompti in studia ingenui, postquam sanguinis e naribus filicidium cui frequentius obnoxius fuit, nescio ex qua causa, præter rhagia quod crebro venationibus sub cœlo pressa, frigidiori interfuerat, emanserit, insignem in capite aliquot jam menses torporem & obtusum ac gravatum dolorem, qui ad oculorum radices pertingit, persensit. Periit omnis animi & corporis vigor, ciborum appetentia, placidusque somnus. Facies erat pallida cum extremorum frigore & lassitudine. Opem a me & ipse & mater ejus efflagitarunt quam sollicitate. Celebrata in pede fuit venæ sectione, & quia aliquid hypochondriaci subesse judicavi, præscripsi curam fontis Selterani cum debito regimine: sed effectu plane frustraneo. Postea infusum Theiforme ex temperatis herbis cephalicis mane hauriendum ordinavi: reiterandam quoque jussi venæ sectionem & tertio die post, cucurbitulas cum scarificatione nuchæ apponendas: errhinus quoque pulvis naribus frequentius admotus. Et non ita multo post cessavit dolor, rediit appetitus & quietus somnus, omniumque actionum vigor, ac pristinæ valitudini redditus fuit. Stillare quoque rursus sanguis, sed non largo flumine, coepit e naribus.

Epi.

Epicrisis.

Causam hujus gravis doloris, & symptomatum quæ eum subsequebantur, a sufflaminata narium hæmorrhagia deducendam esse, extra dubium positum est. Vasa vero cerebri retento sanguine plusquam par est fuisse infarcta, testatum faciunt symptomata in nervosis primarum viarium partibus, non secus ac in hypochondriacis contingit, suscitata, idque tantum propter passionem, & consensum nervorum: siquidem ante accessionem hujus doloris, ab eiusmodi pathematibus plane liber fuit, quæ sedato dolore etiam conquiererunt, ut adeo clate patet, quanta sit capitum cum ventriculo & aliis nervosis corporis partibus consensio. Deinceps illud notari velim, in capitibz morbis, qui a redundantia sanguinis ortum ducunt, ejus missio nem semper observari meliorem in loco capiti propinquiori ac in distitis partibus. Pulveres errhinos & cephalicos naribus suscepitos, vellicando & irritando in cerebri quoque membranas agitationem quandam dum efficiunt, a molesto humorum infarctu eas liberandi vim, & potentiam exercere posse, haud videtur improba bile.

OBSERVATIO X.

Cephæ leæ, ex gonorœ, vba vi rulenta decocto sudori fero cu zata.

Juvenis vegetæ & robustæ constitutionis, annorum 20. & aliquot, virulenta gonorrhœa binis vicibus affectus, sed nefcio qua methodo curatus. Aliquot menses post, ulcerosæ & prouidentes pustulæ hinc inde in cute efflorescebant: quarum tamen major copia in dextra quam in sinistra capitibz, & reliqui corporis parte conspiciebatur, qua in regione etiam tumor testiculi durus & valde molestus constiebat. Præter languorem universi corporis, immaniter eum dolores in capite praesertim nocturno tempore torquebant; adeo, ut non modo somnum tollerent, sed appe-

titum etiam & vires imminuerent. Ad sublevandum hoc malum & chirurgorum, & Medicorum opera usus: sed nihil omnia, neque mercurialis quam adhibuerant salivatio, profecerunt: Ultra anni dimidium atroci hoc malo afflitus & valde extenuatus me quoque in auxilium vocavit. Expurgatis prius lenissimis remedis aliquoties primis viis, decoctum cuius vires in purificando sanguine multoties expertus sum, tum ad sudorem eliciendum, tum ad corrugendam intemperiem, pro potu ordinario usurpandum, & quidem sequentem in modum imperavi: Saraparilla uncii 4. & antimonii crudi unciæ, salis gemmæ, & salis tartari cujusque drachma m adjeci, & cum mensuris quinque aquæ simplicis puræ decoctio facta est in vesica stanno obducta, cui alambicus imponebatur. Decenti sic admoto igne, cum propemodum dimidia pars destillata esset liquoris forti odore nares ferientis, destiti ab ulteriori coctione, & destillatum affudi residuo in vesica; facta filtratione, quod filtrum subiit servari pro usu, eo quo sequitur modo. Dimidia ejus pars cum æquali portione decocti scorzonerae, & passularum miscebatur pro potu ordinario; quod remanebat in duas partes divisum fuit, quarum una mane, altera hora quinta pomeridiana calide fuit hausta, sudorem cum debito regimine in lecto expectando. Interpolatus quoque huic decocto interdum fuit usus tincture antimonii acris cum spiritu tartari & liquoris nostri anodynæ mineralis tercia parte permixti. Qua cura per integras sex septimanæ usus est. Sed testium dolorifico tumori simul duxi per idonea resolventia, & discussientia topica propiciendum: inter qua emplastrum dia chyton, emplastro Vigonis cum mercurio permixtum, decima parte florum sulphuris, necnon balsami sulphuris antimoniat notabili portione adjecta, caput lafmate super imposito, quod ex radice enulæ, altheæ, iridis nostratis, cum cumere asinino, floribus sambuci, semini cymini, carvi, cum aqua florula

sam.

sambuci, & vino coctis constabat, laudabile levamentum attulerunt, tumore ad dimidium & ultra discessit. Quibus remedii per DEI gratiam id confecuti sumus, ut ab omnibus incommodis liber, sanitati fuerit restitutus desideratissimæ.

Epicrisis.

Et gonorrhœa virulenta, & Gallica lues, ex eorum sunt morborum numero, qui nisi radicitus idonea & satis efficaci cura extirpentur, ob relietas, vel in glandularum tubulosa substantia, vel etiam, ut nonnullorum fert sententia, in membranis quæ pinguedinem cingunt, altius impactas particolas, ex facili reviviscant, dum ex latibulis suis excusæ & denuo cum lymphæ & sanguinis massa connuptæ, pernitali sua vi, instar seminii vel fermenti sese multiplicant, omnis generis fluida, inquinando. Cura horum affectuum, quæ per salivationem a mercurialibus excitata, quasi specificum passim commendatur remedium, si manis & chronicus capitis dolor fuerit junctus, non semper expectationi respondet; & proinde WILLISIUS de anima brutorum cap. 2. tali in casu eam rejicere, multis exemplis quæ recenset infelicitis successus adductus, non veretur. Addo etiam illud, quod chirurgi quibus vulgo ea committitur, empirice ut plurimum, poshabita & individui, & aliarum circumstantiarum ratione, hanc curam tractare soleant. Ceterum sudorifera, quæ antimonium crudum, ingreditur, decocta, si decenti modo & artis lege preparata adhibentur, in hujusmodi veneris affectibus maxime recrudecentibus, laudabilem opem subinde præditisse, compluribus exemplis edo. Et sumus: neque etiam, sine convenienti horum usu, testium tumorem curatu non tam, facilem, tolis externis etiam alias valde efficacibus sanari, posse identem nobis, perspectum compertum que est. De usu vero & viribus su præ laudataq; tinturæ antimoniæ acris cum

alii permixtae illud insinuandum esse duxi, quod morbis & præsertim capitis doloribus a collie vie ferosa ortis magnas vires medendi possideat, eo quod vitiosum serum cum per cutis meatus per renes insigniter educat. Illud enim notatu dignum est, quod cachecticis gravativi dolores noctu maxime infestantes & per longum tempus durantes admodum sint familiares, atque ægritudines quæ ex vitiata & impura lympha proveniunt ut plurimum insequi soleant; unde cum WILLISIO loco citato p. 202. non semel annotavimus, plures post variolas, morbillos, imo purpuram, cephalalgia quotidiana fuisse obnoxios, ubi & sanguinem depurantia, quæ seri vitiosi copiam per renes efficaciter educunt, optimam locant operam: nam serum in cachecticis corporibus in cerebri sinuositatibus imo ventriculis stagnans, dolorem illum pondensis instar gravem excitare valde est credibile.

Præter huc usque recensitos casus, notatu dignos adhuc suppeditant consultationes nostræ medicinales sect. I. cas. I. & 2.

C. A. P. U. T. II.

De Dolore cardialgico spasmodico, & flatulento.

Theses Pathologicae.

S. I.

In ter graves & acerbos, qui misere genus humanum torquent, & corpus æque ac animum moleste afficiunt dolores, is qui cardialgia nomine venit, non postremum sibi vindicat locum. Neque vero cordis, ut vulgi fert opinio & germanice Hertzens Angst dicitur, dolor est, sed ipsius stomachi, seu partis nervosæ & exquisitæ sensationis, & præcipue ejus orificiorum, acutus, circa scrobiculum cordis consistens, cum ingenti anxietate, spirandi angustia, viriumque prostratione, inquietudine,

dine, nisi vomendi, extremarum partium tremore & frigore, levi animi defectione junctus, a Spasmo vel inflatione ortus, totum sepe nervorum systema in consensum trahens.

§. II.

*Quomo-
do di-
gnosca-
tur a
spuria.* Neque vero omnis stomachi dolor, qualis subinde, a crudorum ingestorum copia & longiori eorum in ventriculo mora, pressorius & anxius incidit, cardialgia nominanda, quia non est acutus neque orificia ventriculi tunc valde dolent, neque jactatio corporis at virium profratio, quæ propria fere & formalia hujus morbi sunt signa, sentiuntur: nisi cardialgiæ hanc spuriæ vocare velimus. Est vero pro magnitudine causa dolor vel vehementior vel initior, & hinc vel gravioribus vel levioribus stipatus symptomatibus.

§. III.

Sedes. Acerbi hujus doloris sedes, ex communi medicorum tam veterum quam recentiorum sententia, sinistrum tantum stomachi habetur orificium, quod jam olim HIPPOCRATES & GALENUS cardiam vocarunt, unde etiam hic dolor cardialgiæ nomen mutuatur. Nos vero potius dextrum, quod pylorus nominatur, orificium, imo totum, ratione tunicae qua instructus est valde sensibilis nervoso-fibroso, stomachum adfici, vel ex eo elucefcere arbitramur, quia circa cordis scrobiculum, sub mucronata cartilagine ad latus dextrum, ubi constans pylori sedes est, hic atrox incipit & consistit semper dolor, & inde ad sinistrum, quod in dorso non procul a spinali medulla situm est & dia phragma circa vertebram thoracis undecimam vel duodecimam penetrat, se extendit. In iis enim qui cardialgia defunguntur dextrum potius quam sinistrum orificium in sectione affectum fuit inventum, adeo ut in quorundam pyloro, ulcera, abscessus, tumores, corruptiones sphacelosæ, quæ simul

duodenum ipsumque ventriculi fundum affecerunt, annotatae fuerint.

§. IV.

Cum autem nunquam tristis & anxia in anima excitetur sensatio, nisi a causa violenta partes nervosæ & fibrosæ, vehementi distensione continui dis solutionem minante, vel valida con strictione, sive spastica stricture super modum afficiantur: ita etiam observamus, cardialgiæ aliam esse flatulentam, aliam spasmodicam, adeo ut in illa, ab incarceratis flatibus, totus stomachus violenter distendatur atque distractatur; in hac vero in arctius potius spatium crispetur, coarctetur atque contrahatur.

§. V.

Non parum quoque refert discrimina & signa nosse, quibus cardialgia flatulenta a spasmodica distinguuntur; in illa major spirandi juncta est difficultas atque angustia, eo, quod ventriculus inflatus, liberum diaphragmatis descendens, qualis ad faciliorem spiritum tradendum summe necessarius est, intercipiat: deinde tumor frequentius ad sensum sat manifestus, instar ovi in scrobiculo cordis ad dextrum latus inclinans, ob servetur, dum pylorus inflato ventriculo semper attollitur; præter hæc ru stum adhuc frequentia, quibus ex ore prodeuntibus, dolor non nihil levavi incipit: denique post cibum, præsertim qui inflat, assutum dolor ordinario ingra vescere soleat. Ubi vero pertinaci spastico tota ventriculi substantia affligitur; tunc major circa præcordia anxietas, major virium defectio, corporis jactatio atque extremonrum frigus percipitur.

§. VI.

Si ad veneni naturam accedens hu mor causa est, longe vehementiora & ex quæ plurimum habent periculi juncta sunt

Sunt symptomata. Ita subinde in capite dolor, vertigo, scotomia, agrypnia, mentis interdum emotio & convulsio: in cavitate thoracis, pectoris oppressio, cordis tremor & syncope, pulsus exiguus, debilis, interdum durus & inaequalis intermittens quoque: in abdomine, ventris tormina, alvi constipatio, urinæ suppressio: in partibus externis, refrigeratio, tremor, horror, sudor frigidus, facies livida, contracta, sordida & flavescentis coloris in conspectum prodeunt.

§. VII.

*P. thea
matum
ex ner-
vorum
commu-
nicatio-
ne c. vñ.
triculo
explica-
sio.*

Tam atrocia in universo corpore, a ventriculo male affecto, suboriri posse pathemata, is non mirabitur qui ex anatomicis didicit, par nervorum octavum, quod ad præcipuas nervosas corporis partes internas fertur, & iis vigorēm, robur, motum & sensum largitur, valde notabiles & insignes duos ramos ad ventriculi sinistrum orificium spargere: atque internos per arcum minorem ad pylorum: externos vero ad fundum ventriculi ferri: & hinc consensionis, quam hæc nobilis pars cum systemate nervosarum partium ait, ratio ducitur quam aptissime. Neque enim ulla alia, in universo corpore pars est, quæ similem cum præstantioribus ejusdem partibus alat habeat que consensionem ac mutuam communicationem, præter stomachum; uti id fuisse in Medicina ration. System. Tom. 3. Sect. I. cap. 5. a nobis est expositum. Inter alia hujus rei luculenta testimonia, observationes hinc inde in medicorum, qui casus ad medicinam forensem spectantes ediderunt scriptis, repertæ id exhibent: quibus constat, a forti percussione cum manu vel instrumento duro circa cordis scrobiculum facta, gravissima protinus symptomata ut quis statim in terram gelidus concidat, epilepsia, mo morte repentina corripatur, insequi.

§. VIII.

Cum duplex sit cardialgæ non secus ac colicæ species: altera nimurum flatulenta, quæ ab incarceratis fit flatibus, totam ventriculi cavitatem fortiter distendentibus, qualis vocari solet, germanice Ober-Colic, Hertz-Colic: altera fit cardialgia spasmodica convulsiva, vulgo heftiger Magen-Krampff, sequitur nunc ut inquiramus, quare ratione flatus, cum liberum alias habeant per aperta orificia transitum, firmiter in cavitate ventriculi includi & detineri possint. Hujus quidem phænomeni ratio vix a medicis est tacta. Nos ejusmodi vehementem inflationem, quæ in spasmus cedit in ventriculum, etiam effectum spasmī esse, affirmare nihil dubitamus; qui tamen non totam ventriculi nervoso-membranaceam substantiam, sed tantum ejus orificia subtilioris sensationis infestat: unde iis valde coarctatis & clausis, non mirum est, vapores ex indigesta maxime crudorum ingestorum mole, mediante calore, cum non inveniant exitum, totum ventriculum mire distendendo ac distractendo, atrocem cum summa anxietate & spirandi angustia dolorem excitare.

§. IX.

Sunt vero in primis flatulente car-
dialgæ obnoxii hypochondriaci, quo-
rum stomachus copiosa colluvie bilio-
sa & acida scatet; ex quo fit, ut a
pastu aliquot horas, fortes circa præ-
cordia tensiones, inflationes, graveles
que dolores cum difficulti spiratione
experiantur, qui postea, ructibus ut
plurimum acidis prodeuntibus, non
nihil remittunt, vel vomitu super-
veniente acido pituitoso insigniter le-
vantur, & demum pausatim rede-
unte calore ad ventriculum & ex-
tremas partes, quæ algescabant, fol-
vuntur. Vidimus tale quoque vitium
sæpius in iis, qui post morbum pau-
lo diuturniorem, magoam sibi yen-
tri-

triculi infirmitatem contraxerunt, quando paulo avidius cibos, præfertim incongruos, ut sunt pingues, acidi & fermentescibiles, fructus quoque horæ,ingerunt, accedente simul corporis & quam maxime pedum vel regionis lumbaris refrigeratione, subortum & crebrius per intervalla reversum.

S. X.

*Intervallū
infantes
lactētes* Vidimus quoque ejusmodi ventriculi, cum dolore & respiratione difficiili, inflationem, in infantibus lactentibus, a lacte in ventriculo coagulato & ibi stagnante acidoque facto, ubi tota præcordialis regio, sub costis spuriis, mire flatibus distenta & turgida, visui pariter ac tactui se offerebat. Velgo id vitium dicitur *das Hertz Gespann*. In mentem nobis etiam incidit exemplum cuiusdam juvenis, qui, a nimia recentis & mollioris casei comedione, & desuper Rhenano non adeo spirituoso sed acidulo vino hausto, in flatulentam & gravem cardialgiam incidebat: quam medicus colicum dolorem, qui tamen longe inferiore in sedem habet, neque cum tanta spirandi angustia jungitur, reputabat. Neque hoc loco discrimen illud inter dolorem colicum, qui sub ventriculo in ea parte colic, quæ immediate ipsi subternitur, & inter stomachalem colicam, si ita loqui licet, præterire debemus; quia non semel sed aliquoties, hac in re deceptos fuisse medicos, animadvertisimus. Ut itaque circumstantias loci dolentis, antecedentes causas, notas quoque quæ cardialgæ propriæ sunt, item faustos remediorum successus, probe semper circumspectus medicus observet, non sine ratione monendum ducimus; nam unico discutiente applicato cylitere, colicum sub ventriculo consistentem dolorem sublatum meminimus.

*A mēsi-
bus vel
hemor-
rhoid.*

*Suppres-
sionē.* Utut vero plerumque flatulenti & tensivi ventriculi doloris causa, vitio Hoffm. System. T. IV. P. II.

S. XI.

sus humor, qui intra duodenī cavitatem paulo diutius retentus, flatus ventriculi orificia spasmo constringentes excitat: scimus tamen occurrere exempla mali flatulenti, ubi nullam materiam vitiosam in ventriculi vel duodenī cavitate animadvertisimus. Quod vel eo dijudicare potuimus, quia tales anxie & flatulentæ cardialgæ, fœminis præfertim junioribus, resistante membrum fluxu, imo per primos menses gravidis, familiarissimæ observantur, & ructibus dolore que circa cordis scrobiculum & dorsum se manifestant, atque exacte circa membrum tempus revertuntur. Simile quid aliquando in viris, hemorrhoidibus suppressis qui laborarunt, evenisse notavimus.

S. XII.

Quamvis vero non adeo facile sit, *Causa
efficiens* hujus rei invenire causam, nos tamen quandocunque consideramus, a sanguine intra intestini coli vel recti membranarum vasa stagnante, spasmodicum dolorem in iis partibus effici; nullam aliam pariter hic subesse causam judicamus, quam quod facta palindrome, sanguis ad regionem ventriculi & præcordiale delatus, atque vasa ventriculi infarciens, ejus potissimum orificia spasticis stricturis pariter afficere & infestare possit. Et confirmamur in hac sententia, cum inter frequentes observationes in comperto sit, in iis qui asthmate stomachali flatulento spasmodico, sèpius lethali, & ut plurimum hydrope post se trahente, laborarent, post mortem infarcta & obstruta viscera sanguinea, præsertim hepatis, vel etiam polypolas concretiones in cordis ventriculo repertas fuisse, quibus dum obex ponitur sanguinis liberò circulo, facile ejus impetus ad præcordia fertur, qui sic causam tam anxi doloris, quem perpetuo ructus concepit, solent, subministrat.

S. XIII.

Cum vero & sine singulari vel plane H nulla

Cardial. nulla inflatione, ille acerbissimus & angustus ventriculi dolor, vulgo *Magen-Krampf*, non tantum orificiorum, sed etiam totius substantiam, ob tunicae nervosam, spasmodorum vehementia affligat, ejus etiam causas paulo exactius investigare oportet. Jam vero nil propemodum in praxi frequentius occurrit, quam quod mox a vehementi iracundia, circa pectora & cordis scrobiculum, & magis versus dextram partem, compressior & constrictivus dolor cum anxietate & angustia pectoris, nausea, ciborum fastidio, oris amaritie oboriat. Hujus ergo mali causam non difficulter is reperiet, qui considerat talem esse irae vehementioris vim atque indolem, ut maxime suum perniciatilem effectum in praecordiis exerat, per quæ, ut bene explicat FERNELIUS l.4. de febr. c.10. regio circa ventriculum, diaphragma, jecoris cavum & in eo ductus biliarii detenti, pancreas, in specie ventriculus, ejusque superius orificium, & quæ sub costis nothis, anteriora versus & sternum inflectuntur, intelligitur, spasticis constrictiōibus ea exercendo. Dein quoque ab ira valde commoveri biliosum succum, & systole canarium, qui bilem vehunt, intensiori reddita, eam copiosius in duodenum effundi constat: ubi postea diuturniori mora, corrosiva fit & corruptitur, & diarrhoeæ, cholerae, vomitionis, atque etiam doloris cardialgici causam omnino subministrat, quia acrimonia sua, & pylorum & fundum ventriculi afficit. A terrore quoque paulo graviori cito induci posse cardialgiam multoties experientia docet: & mœrem etiam sensim sensimq; humores corruptendo ad graves diuturnaque cardialgias disponere PLATERI Obs. 2. testimonium exhibet.

S. XIV.

Sympto-
mata li-
quando
est.

Affectio ventriculi spasmodica est frequenter symptomatica. Non pauca nobis sunt cognita exempla ubi calcu-

lus in principio, vel quod pejus, in medio ureterum hærens, prater alia gravia accidentia, etiam vehementem cum intolerabili anxietate junctam cardialgiam excitavit. Simile etiam quid observavimus a calculis biliaris, si canalem cysticum vel cholodochum pertransant, vel fixorem in iis sedem habeant. Qua de re in sequenti Capite fusius agere nobis constitutum est. Luctuenter vero etiam hinc appetet, quomodo per consensum a solo motus virtute, pars corporis nostri sensu prædicta, absque materiali ibi existente causa graviter affici queat.

S. XV.

Longe vero atrocior & plenior periculi species cardialgia est, quæ ab hausto veneno urentis & causticæ indolis inducitur. Vulgatissimum atque innumeris funestis exemplis infamatum illud arsenicum, & ei similia, non alia ratione perimit, quam quod subtili & penetrante veneni acumine, altius in intima fibrarum nervarum ventriculi se insinuant, easque discindendo ac arrodendo, ad immanes spasticas stirpes adigunt atque exstirpant: quæ postea universum nervosarum partium genus in consensu trahendo, non modo ea symptomata, quæ cardialgia sunt essentialia, sed & insuper sæviora & funesta, ut inflammationem sphacelosâ, delirium, convulsiones, inducunt.

S. XVI.

Emetica ex stibii regulina substantia petita, si paulo fortiori dosi imprudenter offeruntur, non nisi cardialgica inducunt symptomata; quin aliis etiam intus concurrentibus caulis, & ubi praecordia jam spasmo affecta sunt, lethalem, non secus ac venena, quod multis, proh dolor! constat exemplis, operationem exsequuntur. Id quod etiam de acrioribus & validioribus purgantibus, quæ subtili, caustico, & vesicante principio agunt, quorum imprudenti usu multi

multi pereunt, intelligendum esse existimamus.

§. XVII.

in febribus exātematis episodis. Ipsum pestilentiae virus, truculentam suam vim, primo omnium, in ventriculum spasmodis atque inflammat onibus exercere, & graves cardialgicas passiones, saepe syncopticas inducere, in proposito est. Petechias, febribus purpuratis & malignis, si cardialgia succedit, quod maxime in morbi vigore fit, lethale signum esse solet. Pessimum quoque est, si cardialgia doloribus arthriticis, podagrericis, quod evenit maxime, retrocedente materia ad interiora, item quando foecunditas & partium exteriorum exulceratioibus supervenit, quod frequentius accidere solet. Nam materia illa activa caustica indolis, ubi a nexu, & implexu humorum sequistrata, & ad cutis extima propulsata, reagit sua vestigia, atque nervosis tenerioris & firmioris texturæ ventriculi & intestinorum tunicis se altius insinuat, non secus ac venenum agere solet, si que diutius persistit, cardialgicas anxietates inducendo, hominem exanimat atque non raro interficit.

§. XVIII.

in dysenteria epidemica eis. Dysenteria epidemicæ & malignæ, quando ea incaute comprimitur, insauito & periculofo sane omne cardialgia supervenit; dum caustica acris materia, ex intestinalibus inferioribus ad superiora & ventriculum retrogrado motu & impetu delata, principes has partes graviter infestat, subinde lethalia accedere symptomata consuescit.

§. XIX.

a vermis in. Periculi quoque plena a vermis in-nescitur cardialgia, quando videlicet, ut bene meminit TRALLIANUS, ex partibus inferioribus sursum ad ventriculum ascendunt, ejusque orificiis firmiter inhærescant. Memorabile est

quod proponit HERCULES SAXONIÆ in prælect. pract. P. II. cap. 7. scribens: ante tres annos ego vocatus ad puerum undecim annorum, vermis referum, cui pilulas exhibui. Mane cum reverteretur erat mortuus. Curavi ventriculum aperiri, inventi irigintæ tres vermes dodrantodes vivos, ori ventriculi adeo tenaciter inherentes, ut vix avelli potuerint. Similia exempla legi possunt apud HENRICUM ab HEER, & LANCISIUM tr. de mort. subitan. nec non apud RIVERIUM L. 9. cap. 10. Repentinae ejusmodi mortis causam non aliam fuisse, quam syncopen invincibilem, a validiori cordis seu potius vasorum ipsi vicinorum constrictione derivandam, veri est simillimum. Ex quo intelligitur, quinta sit ad vitam servandam stomachi seu nobilioris partis præstantia, ut igitur HELMONTIUS hac causa fuerit adductus, animæ sentientis ibi sedem collocare.

§. XX.

Sunt vero adhuc aliae, atrocis stomachalis spasmi abditæ causæ. Nam ubi dolor indesinens est, & per multos trahit menses, ut carne ac omnes demum vires consumat, labem ac vitium in partibus solidis lubesse recte concluditur: quod etiam sectionibus post mortem institutis evictum habemus. Ita in tali chronicò visio, RIVERIUS, vid. cent. I. obs. 90. scirrum, totum pancreas pylori ac duodenii principium ambientem, invenit. JACOBUS HOLLERİUS, de morbis internis p. 153. de quodam narrat, qui febre, cardialgia, vomitu, torminibus ventris, dejectionibus pici similibus din vexatus, tandem obierit. In cuius secto corpore inventum ulcus pustularum in ambitu, quod tunicas omnes ventriculi, qua parte in pylorus est aditus, exedit.

§. XXI.

Alia adhuc dirum hunc affectum generandi ratio ac via per metastasis est. Ira binis exemplis nobis constat, parotidum tumores in sexu muliebri non pulsati.

adeo exiguos, externis quidem applicatis evanuisse, sed brevi post cardialgiā cum angustia spirandi infuscata fuisse. Observatum quoque a nobis est, & hemicraniam, & cardialgiā inter se alternasse, ita ut cardialgia sublata hemicrania fuerit secuta, & postea, hac ipsa discussa, cardialgia redierit.

§. XXII.

*Morti
decur-
sus.*

Ceterum dolor ventriculi cardialgicus ex iis est morbis, qui, nisi diutius persistant, non facile nocent nisi accedit inflammatio: quare non sine periculo est, si aliis morbis præfertim febribus acutis & malignis superveniat. Perire enim HIPPOCRATES prodidit Sect. 4. aphor. 65. in febribus circa ventriculum fortis astus & cordis morsus seu dolor malum est. Porro etiam hic adfectus inter eos referendus est, qui certis & ordinatis temporum intervallis, quandoque etiam inordinatis reddit, & vel breviori, vel longiori tempore affigit, ac alio tempore mitior, alio vehementior est. Et uti ordinario fere cum frigore in dorso, horripilatione cutis, non raro etiam oscitatione & pandiculatione ejus accessio est, atque in vigore extremæ, inferiores maxime partes inalgescunt, adeo ut etiam calidum satis vehemens ad motum vix percipiatur: ita hic dolor, non nisi calore redeunte in partibus extremis, calidoque tandem sudore ob oriente per totum corpus, solvit atque discutitur. Et uti sub frigore pulsus coarctatus & exiguus est, ita major & mollior sub declinatio- ne fit: quod etiam evanescentis mali certissimum est signum.

G U R A T I O.

§. I.

*Andreas
yones
quatuor*

Quemadmodum sagax & peritus Medicus, nec certa ad morbum tollenda remedia commendare, nec una eademque semper via ac methodo in curando procedere debet & potest; sed opus habet, ut ad varii generis causas, agrotantis naturam, & alias atque alias circumstantias, morbos antecedentes

& symptomata respiciat: ita etiam in hoc gravi & periculo morbo sanando, idem fieri debere omnino necesse est. Nihilominus tamen generales has medeodi indicationes, pro scopo, per medicamenta succurrenti, tenere debet, quæ haec sint: primo, ut materia vitiosa vel mole vel acrimonio peccans, circa stomachum hærens temperetur, corrigatur ac demulceatur, blandeque per discutientia vel commoda evacuantia removeatur: secundo, atroces dolores, qui vires mirum quantum depriment; ne inflammatio succedat, sopiantur: tertio, si symptomatica est, morbi primarii ratio habeatur, & quarto, ut tonus & robur ventriculi, & intestinorum a dolorum, & spasmodorum violencia labefactatorum, idoneis remedii restituatur, & confirmetur.

§. II.

Quia saepius acidi pontici humores *commu-* *accumulati ac congesti in stomachi re-* *dantur abfor-* *bente* *gione, bile m in duodeno diuturna mo-* *ra porraceam, æruginosam, & valde corrosivam reddunt, & arrodendo tu-* *nicas nerveas, præbent doloris cardial-* *gici causam, idque non raro in hypo-* *chondriacis, necnon a nimia vinorum acidorum ingurgitatione, & fructuum horeorum fermentatione evenit: solis utique absorbentibus, necnon acrimoniis demulcentibus non adeo difficulter curam expediri posse experientia conforme est. Quo nomine pulveres qui lapides cancerorum, cornu cervi philosophice præparatum, conchas vel matrem perlarum, crystallum montanum vel melius glaciem Mariæ præparatam recipient, commendamus, præfertim si cum aqua carminativa leniter spirituosa exhibentur. Pertinet hoc quoque ad infringendam & mulcendam acrimoniam ex rafra cornu cervi gelatinosa decocta probe saturata, decoctum aenæ excorticata, cum amygdalis dulcibus subactum & syrupo paverie albi edulcoratum.*

§. III.

§. III.

nitroso Ubi vero bilis valde acris sulphurea & calida, ab ira commota, causam hujus mali subministrat, consultum est, ejusmodi jam laudatis pulveribus aliquot grana admiscere nitri purificati pro dosi, atque in decocto eos exhibere. *Issantia* Opus vero interdum est correctam billem leniter per alvum evacuare. Experientia etiam crebriori didicimus, in hoc atroci adfectu, si a bile nimis calida ebulliente & caustica obortus fuerit, *aqua frigida*. solam aquam puram & frigidam, per vices, usque ad mensuram dimidiat vel ultra haustam, recto bene corpore & imposito stomachali regioni calido fomento, insigniter profuisse, ac subsequeto sudore per universum corpus, dolorem summo cum levamine discussum: eoque remedio acrimoniam biliam non modo dilutam & temperatam sed & nimium aestum depresso, ac deinde ipsum robur, quod ingenti calore & dolore dejectum erat, quadammodo restitutum fuisse. Vidi mus quoque, cardialgiam cum cholérica passione junctam hoc unico remedio summo cum levamine conquievisse. Pertinet hoc quoque insignissimus seri lactis, item emulsionum usus.

§. IV.

Possessionem Non rarum nec insolens quoque est, post tertianam, anxium circa praecordia dolorem, cum insigni virium languore, ciborum fastidio oris siccitate, & animi leviuscula defectione, lentoque calore interdum observari; quæ cuncta mala a bile acri & vitiosa, copiosius in duodeno, si virtus ejus motrix peristaltica sub morbo valde fracta fuerit, coacervata diutiusque stagnante produci; exinde demum intelleximus, dum leni emetico, verbi gratia, uno vel altero grano tartari emeticum, cum sufficiente quantitate aquæ dato, effusa magna faburra, conquievisse protinus hæc omnia mala vidimus. Referri huc optima ra-

Hoffm. Syll. T. IV. P. II.

tione HIPPOCRATIS Aph. 17. Sect. 4 metetur, qui, non febricitanti, ubi cibi fastidium, cordis dolos, vertigo tenebrosa & oris amaritudo, purgatione per superiora opus esse, significat.

§. V.

Sique cardialgia biliosa, quod saepius fit, vomitio jungitur, liquorem anodynum nostrum mineralem cum aqua frigida fontana, vel aqua florum chamoillæ, millefolii, acacia, tiliae, sambuci, liliorum convallium, primula veris, cum præsentaneo levamine exhibuimus. Sub hoc statu magnopere cendum est, ne medicus calidas essentias stomachales vel carminativas porrigit, neque crebriori calidorum infusorum usu agrum maceret, quippe hæc omnia dolorem magis augent, quam minuant.

§. VI.

Ubi vero intensus, pressorius, & gravativus stomachalem regionem diutius infestat dolor, isque a cruditatibus acido viscidis, firmiter ventriculi aut duodeni tunicis inhæfescentibus oritur, quod frequentissime in iis, qui ex morbo jam convaluerunt, ac qui etiam ab aliis causis infirmum habent ventriculum, evenit, tunc utique alia curandi opus est ratione. Nam sub tali casu, medicamenta digestiva, & que salino oleoso & aromatico incidente ac roborente principio agunt, necessaria sunt: quo nomine probatae & expertæ virtutis ea, quæ sequuntur, proponere & laudare volui-
Qui ex crudita-
tibus oritur dolor as liter tractan-
dus.
mus, ac primo pulverem qui ita habet: rec. radicis ari, pimpinellæ, zingiberis, galangæ, flavedinis corticum aurantiorum, leminis cymini, macis, singulorum drachmam, sacchari Canariensis ad pondus omnium. M. f. Pulvis, qui convenienti dosi leniter cum vino optimo decoqui & propinari potest. Dein sequens se commendabit mixtura: rec. essentiazedoaria, carminativa Wedelii, spiritus de tribus ana drachmas duas, balsami

nostris vitæ guttas 15. Interdum vero opus est, ut ante horum usum, colluvies vitiotorum humorum, si nimia est, blande per superiora educatur, præsertim si ad vomitum appareat dispositio. Verum tunc non facile ultra radicem ipecacuanha ascendere licet: cum hæc non tam valide nervosas tunicas commoveat atque aggrediatur, nec post operationem, dispositionem ad vomitum relinquat, sicut ea quæ ex sibio parantur consuecant.

§. VII.

*aliter
qui ex
venena.*

Ab hausto veneno caustico, item a nimis drasticō purgante & vomitorio, si quis in hoc malum, quod vitæ sèpius præsens minatur periculum, conjectus fuerit, tunc vix efficacius auxilium, ac in usu lactis recentis, item in oleofosis, oleo amygdalarum dulcium, olivarum, sufficiente quantitate haustis, addita simul dosi theriacæ veteris expectandum erit. Præstat vero in principio tantum lac solum, sive melius ejus cremorem sine theriaca dare, ne vomitus & secessus, quo sèpius optime venenum & corrosiva materia simul expellitur, nimis cito sistatur.

Cautele

§. I.

*Quomo-
do tra-
standa
symp-
matica.* Quando cardialgia ceu symptoma, aliis morbis ut acutis vel etiam exanthemeticis supervenit, quod rarius fit sine periculo exitialis inflammationis, tum pulveres bezoardici, cum aliquot granis nitri, & quarta parte vel dimidio grano camphoræ, ob vim blande diapnoicam & discutientem, non carent usu eximio. Sed consulo ob aufpicatum & meliorem successum, ut cum emulsione, quæ ex amygdalis dulcibus, seminibus 4, frigidis, & semine cardui Mariæ, cum aquis florum præsertim sambuci concisa est, pulveres dicti propincentur. Sique materia a superficie corporis retrorsum, veneni propemodum indo-

lem referens, rursus ad extimani cutim releganda censeatur; liquorem nostrum anodynū mineralē, cum quarta parte spiritus Bussii vel tartari mixtum & per vices pro re nata datum, adhibito simul conveniente & placido regimine diaphoretico, sèpe numero convenientissimum & proficuum invenimus.

§. II.

Quando a mensibus subsistentibus, & *ri:* represso inde sanguinis impetu ad præcordia, mali origo est, tunc utique *mensū defectū,* *Laudā;* sectio in pede celebrata, modo non fiat in paroxysmo, sed eo remittente, nec sub extremorum frigore, præsens & efficax auxilium praefat. Postea reliqua curatio, cum blande anodynī & discutientibus externe adhibitis, erit confiēndā. Nos in omni dolore cardialgico, *tur ex chamo-* *milla parata* ceu peculiaris virtutis remedium, flores chamomillæ vulgaris & quæ ex iis parantur, plurimum commendamus; cuius generis aquæ florum chamomillæ, oleum destillatum delicatissimum verum, non oleo terebinthinæ adulteratum, in elæosaceharum redatum, item Essentia bene saturata cum Spiritu florum chamomillæ non adeo spirituolo & eleosaccharo ejusdem olei adornata, ad motus spasticos sopiendos, longe efficacissima. Spectat huc quoque extractum, quod aliis convenientibus, intra pilulas recipi potest. Vulgatissimum, sed revera valde probatum domesticum est decoctum chamomillæ florum, cum cerevisia vel juseculo avenæ excorticata, vulgo Haber-Grätz, addito præsertim oleo amygdalarum dulcium, calide per vices haustum.

§. III.

Deinde in omni dolore cardialgico, *clysteres* a no infundere demulcentes & *rumi u-* *sus.* emollientes, nunquam non proficuum. Quales ex floribus chamomille, ex oleo horum cocto & destillato, item seminibus 4, carmina vis parati, si ex lacte

coquantur sunt omnium optimi. Sed opus est, ut bis vel ter quandoque injiciantur, nam blando suo tempore demulcere, nec non rigidas fibras laxante ac emolliente facultate, ut in omnibus ferre gravioribus doloribus, ita etiam in hoc, insigne levamen afferunt.

S. IV.

Externo, In praecordiali & gravi dolore quoque nunquam non exterius epigastri & regioni applicata idonea remedia, magnæ observantur utilitatis; & inter plura alia summam, & mirabilem efficaciam eorum, quæ sequuntur, sèpius expertis sumus. Inter quæ primum est linimentum, ita componendum: Recipe theriacæ, olei nucis expressi utriusq; unciam, castorei, croci, balsami Peruviani ana drachmam, olei de cedro, caryophyllorum ana guttas 20, camphoræ drachmam dimidiad. Alterum sunt species quæ sequuntur. Rec. herbz menthae, florum chamomillæ vulguris, Romanæ, sambuci, singulorum mani pulum, baccarum lauri, juniperi urriasque unciam dimidiad, seminis cymini, carvi, caryophyllorum, nucis moschatae, ana drachmas duas C.C. D. S. Species quæ facculo possint includi & calide parti adfectæ applicari. Calor enim egregiam vim levandi & discutiendi possidet.

S. V.

S. aver- Si vermes causam fabministrant, tunc utique longe alia curationis est in-
mibus: gredienda via. Minime vero, si hospitiū eorum est in ventriculo, fortiora anthelmintica, præsertim quæ acri, valida arrodente facultate, operationem suam exsequuntur, ut mercurialia, vitriolum, Veneris, vel Martis, purgantia aloetica, vel etiam salia alias non iniuria porrigenda; eo, quod hæc malum sèpius exasperent: sed potius lac tepidum, cum oleo amygdalarum dulcium sufficienti quantitate offerendum. Quæ demulcendo, escam pariter animalculis his, ne arrodant tunicas, prebendo aptis-

sima sunt: maxime omnium vero, eam quoque ob rationem, quia, si tepide lac in magna copia hauriatur, ventriculi inversione facta, ingrati isti hospites per superi ora ejiciuntur.

§. VL

Hypochondriaco-spasmodicæ passio. Hypo-
ni obnoxii, crebro recurrentibus hisce chon-
driacis
anxiis doloribus, per longum tempus Caroli.
premuntur. Quo in casu, omnibus aliis ne con-
inaniter adhibitis, aquas thermales, ferunt-
præsertim Carolinas aliquoties usurpa-
tas utilissimas observavi. Sed harum us-
sus interdum reiterari debet. Hæmor-
rhoidalem fluxum inde securum, maxi-
mo cum levamine, non semel experti-
sumus. Ceterum elixir balsamicum no-
strum quod viscerale audit, item quod in notis ad Poterium descripsimus, cum
essentia castorei remixtum, necnon pul-
veres temperati leniter nitrosi, antispasmodici, venæ sectiones æquinoctiales, in chronicis istiusmodi doloribus,
magno sunt præsidio.

S. VII.

Salia-
vittata. Qui cardialgicis passionibus sunt ob-
noxii in & extra accessionem a medi-
camenit, quæ salinæ sunt naturæ, pro-
vide sibi cavere debent: quo pertinet
usus fontis Sedlicensis, quem plus noxæ
quam emolumenti attulisse observa-
tum a me est.

S. VIII.

Ad recursum perniciosi hujus mali
impediendum, plura occurunt notatu-
digna. Primo non facile, qui ad hoc ma-
lum sunt dispositi, purgantia præsertim
acioria admittere debent; quia hæc na-
tura sua, stomacho ejusque partibus in-
fensa, ingentem, si crebrios usurpan-
tor, infirmitatem relinquent: qua nihil
ad recidivas contrahendas pejus est.
Præter hæc, mouum humorum ad pri-
mam regionem ex aliis partibus alli-
ciunt. Videndum tamen nihilo minus,

ut alvus semper maneat libera atque apera, quod multo tutius sit, quando per alimenta id præstare allaboramus. Deinde contra frigus quam maxime & cordialis & dorsalis regio, ubi ventriculus cum orificio situm suum occupat, sufficientium integumentorum ope, munienda erit. Quam nocivum enim partibus nervosis, & morbis qui in eam debilitate consistunt, frigus sit, dici non satis potest. Vix autem eo perduci homines possunt, ut veritati huic fidem faciant, eamque intelligent. Denique, viatum quod concernit, ab omnibus excessiva qualitate & intemperie præditis, nimis salitis, fumo induratis, pipe-re, allio, aceto conditis, raphano rusticano & huic similibus abstinere oportet. Vicissim majorem in modum commendamus iura gallinarum, ac carnis vitulinae, & ut sibi a pingui carne temperent, in primis quando potio frigida superingeritur, vel externo frigore stomachalis regio tangitur, suademos.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Cardia-
gia spasi
modica
ex animi
affec-
tus &
frigore,
sepius
recur-
sens.*

Fœmina honesta aliquot supra quin-
quaginta annos nata, habitus corporis
modica, spongiosi, succi & sanguinis pleni, vita
ex animi sedentariae addicta, decennio abhinc flu-
xum uterinum non amplius passa, vene
fectionem binis vel ternis quotannis
vicibus celebrans, vegeta atque conti-
nua sanitatem utens; sex ante annos gra-
vi, & diurno animi mœrore ob-
luctuosos familiam ferientes casus affici-
tur. Ab hoc tempore valetudo vacillare
& molestissimus per quinque jam an-
nos crebro redeuntibus paroxysmis in-
festare cœpit morbus, a levi statim fri-
gore dorso admisso vel ab animi com-
motione aut terrore originem mutuas.
Morbi vero incessus hunc servare ples-
rumque suevit modum. Præcedit nimi-
rum oscitatio, sequente narium, aurium
necnon faciei frigore. Stringuntur dein

fauces, tum gelu dorsum, manus ac
pedes occupat, postea scorbuticus cor-
dis pressorio, fixo & ardente dolore
affligitur, qui extenditur ad ipsum
dorsum ubi ventriculi orificium si-
strum situm est, *imperialis* tantummo-
do spatium implens. Adeo præterea
summa anxietas, inquietudine jun-
cta; pulsus contractus, frequens &
debilis micat. In lecto consistere ne-
quit sed exsurgere debet. Ad alvum,
& urinam reddendam neque minus ad
vomendum stimulum quidem persen-
tit, neutrī tamen subsequentibus.
Inter omnia autem, quæ ægram ac
riter infestarunt symptomata, ani-
madverti meretur illud, quod fri-
gus quo dorsum corripitur adeo in-
tensum sit, ut nulla, nec a calidissimo
admoto lapide calor percipiatur
sensatio, quin sub brevi tem-
poris delapsu illud frigidum remo-
veatur. Sed ad alvum firmiter clau-
sam subducendam, clysteres emol-
lientes, & oleosi injecti sine effe-
ctu redierunt: neque flatibus per
inferiora, neque ructibus per supe-
riora exitus ullus, sive raro illud
contigerit, fuit concessus. Tandem
elapsis aliquot horis partes superiores
primo, dein inferiores sensim incale-
scere ac madescere incipiunt: donec
ultimo largus sudor prolicitur, & pa-
roxysmus, quatuor vel sex inter-
dum horas persistans hoc ipso solvi-
tur. Sub decursu paroxysmi omnia
fere remedia, cum primis sub frigore,
ægra valde aversatur: conclave au-
tem calidum, tegulas calidas, &
linteamina calefacta extremis præ-
fertim partibus admota ferre quam
optime potest. Calore corpori redi-
to pocula aliquot infusi Coffee
cum liquore nostro minerali anody-
no, quarta balsami vita, vel di-
midia elixirii stomachalis parte re-
mixta assumit, quod unicum fere
medicamentum naturæ ægrotantis
conducibile reperi. Finito morbi
impetu virium remanet defectus,
& urina quæ modo in paroxysmo,

aqua

aquaæ instar limpida comparebat, rubicunda crassum deponens sedimentum prodit.

Epicrisis.

Affectus hic cardialgiae chronicæ spasmodica nomen jure meretur. Neque enim ventriculi inflatio ab incongruis ingestis oriunda, siquidem ægra accuratiorem servare diætam conluevit, dici poterit: sed nervosum maxime genus affici atque compati & ortus & morbi progressus aperte loquuntur. Notatu enim dignum est, mox rem affectui originem dodisse, ac frigus demum & animi affectus eum excitasse. Animadvertis quoque, morbum hunc paroxysmi febrilis penitus typum æquare, a lumbari regione, ubi magnus mesenterii plexus situm obtinet, initium sumere, ac nervosas corporis partes contrahendo, sanguinemque & humores ad cor & vasa majora repellendo tragœdiam ludere. Accedit quod acceperim ab honestissima foemina, ægritudinem esse hæreditariam, quæ matrem, matrisque fororem corripuerit, easque longo tempore excruciauerit. Ceterum consului, ut frigus omni modo vitaret, atque sedulo caveret, ne illud dorsum tentare possit, calidis idcirco pannis tegendum; ab animi quoque commotione nec non alimentis refrigerantibus quantum fieri possit abstineret. Quandoquidem & pulverem nostrum præcipitatem non bene ferre potest; elixirio autem stomachali cum liquore anodynō remixto, saepius uititur, nec non infusum Coffee ter per septimanam bono cum fructu usurpat. Suas denique ut corpus motu decenti saepius exerceret, quia tum malum rarius affligere observavi.

OBSERVATIO II.

Cardialgia ex comestione carnis vervecinae & frigore.

Mulier parvæ sed obesa staturæ atque plethorica, quadragesimum jam annum supergressa, cognatum invisendi gratia cum marito in propin-

quam civitatem iter fecit. Præter alias edulia carnem vervecinam pinguem assatam larga manu assumit, cerevisiam triticeam, qua neutiquam alias fuerat usa, superbibendo. Vesperi sub aura intense frigidâ domum reverfa, conqueri de anxietatibus & veherenti dolore circa præcordia cœpit, concomitante faciei & extermorum frigore, nocteque inquieta. Dolor non perficit in præcordiali regione, sed per totum abdomen flatibus mireurgens se extendit: alvus simul erat adstrictissima. Symptoma non modo nocte affligeant, sed die etiam sequente insitebant. Opponebantur huic malo varia ex domesticorum apparatu petita: panni quoque & tegulae calidæ in usum extrinsecus tractæ: sed successus fefellit. Accersitus ego, ægram inveni angustiis circa pectus valde molestam, ut spiritum ægreducere potuerit, abdomine mire turgido, animique leviusculis defectiobibus intercedentibus. Adstantes catarrhum suffocativum trepide metuebant. Ego singulis horis, duo pocula brodii tenuis ex carne gallinarum, una cum cochlearie olei amygdalarum dulcium, additis decem liquoris nostri anodynī mineralis & quinque balsami vita guttulis præbete jussi: post enema, ex speciebus carminativis, oleis expressis, adjuncto stimulo salino paratum anno injiciendū præcepī. Præstabilem reliquerunt esse etum, & flatus ac ruetus æw & æw non sine levamine successerunt. Tegulas valde calefactas removi, utpote qui non modo molestiam, sed & doloris augmentum, ipsa id ægrotante asseverante, creabant: ast linimentum, quo inungeretur locus affectus, ex axungia humana, oleo destillato carvi & aliquot granis camphoræ substitui. Ad levandam, qua premebatur, fuit, infusum Theiforme ordinavi. Præterea vini calidi medicati ex infusione absinthii, cornicicum aurantiorum & macis parati poculum aliquando porrexim.

Eo

Postero die potiunculam mannatam, ex mannae unciis duabus, tremoris tartari drachma, essentię corticum aurantiorum guttis 20. & olei amygdalini dulcis aliquot cochlearibus paratam propinandam curavi: eujus operatio duas post horas clystere secunda. Quibus id consecuti sumus, ut ingens vitiosorum humorum colluvies, tam per superiora quam per inferiora, fuerit educta. Sudor denique per totum corpus erupit, & symptomatum vehementia DEO adjuvante sensim discussa. Ad recursum vero morbi præscindendum, ventriculi digestiōnem pilulis nostris balsamicis atque elixirio carminativo adjuvimus.

Episris.

Nihil ad ingenerandum ventriculi & intestinorum dolores ac flatulentias reperitur valentius, ac caro pinguis vervecina, superingerendo frigidum inusitatum potum, corporisque spongiosum excessive frigidæ auræ committendo. Erit autem enarratus affectus cardialgico-colicus recte dicendus, eo quod coagulum pingue in duodeno subsistens, ventriculum & intestina flatibus mire distenderit, atqua a transpiratione prohibita serum acre redditum, tunicas earum vellicando & irritando, ad spasticas stricturas magis sollicitaverit. Quæ cum in corpus plethoricum venæ sectioni minus assuetum, sed eam maxime abhorrens, inciderint, tam atrocia malo se sociasse symptomata nemo mirabitur. Ceterum ut coagulum in duodeno dissolueretur atque saluberrima transpiratio restitueretur, potus utique calidus erat præbendus: sicut ad discutiendos flatus vinum absinthites non in cassum fuit adhibitum. Hoc quoque instar cautelæ tenendum reputo, quod in abdominis doloribus qui ab inflationibus oriuntur, extreme calida partibus affectis applicare non temperet consultum; ut autem extremæ partes blando atque temperato calore foveantur ego quidem auctor sum. In priori enim casu, fla-

tus qui ab aere rarefacto & intestinis inclusiō nascuntur, a calore externo, ut experimentis physicis edocemur, majorem elasticam & expansivam vim acquirunt. Deinceps annotationem meretur, vitiosam materiam flatu in intestinorum canali excitantem nunquam felicius ac etiā tutius quam lenioribus convenientibus lantibus, & clystere una vel altera hora post injecto eliminari posse; si quidem hac ratione primæ viæ non modo potentius a sordium inquinamento liberantur, sed flatus quoque versus inferiora ducuntur.

QBSEVATI O III.

Quinquagenarius illustris, tempore Cardial-
ramenti sanguinei & animi excitati, ^{gia flati-}
ab anno & quod excurrit crebrioribus tulenta
itinēribus, arduis in officio Regis la- ^{ex incō-}
boribus animique fatigationibus con- ^{gruorum}
tinuo detentus, sex ante menses febre- ^{ciborum}
corripitur continua biliosa. Qua cu- ^{nimia}
rata, per aliquot vero hebdomas ^{ingurgi-}
revertente, iterumque depulsa sanus ^{satione.}
egit atque incolmis. At vero iter
denuo in Regia causa suscepit, fame
atque vigiliis vexatus domum rever-
titur. Esuriens inter cibos reliquos ha-
leiem salitam, cucumeres aceto ma-
ceratos, nec non fabas coctas libera-
lius ingessit, melones quoque cum
faccharo avidius assumit, hausto in-
super vino acidolis Tonsteinensis
diluto; vesperi cerevisiæ triticeæ vul-
go Breyhan sat largam copiam, taba-
ci tumo fauces aridas stimulante, in-
gurgitavit. Sic lectum ingressus, an-
xietates circa praecordia persentit, ad-
est spirandi angustia, inquietudo, vi-
rium defectio, cum sudore anxiō fri-
gido corpus totum perluite, adque
vomendum stimulus perpetuus. Haui-
sit infusum Thee paulo calidius; atque
ingentem crudorum ciborum copiam
vomuit, persistentibus nihil minus
vix tolerabilibus anxietatisibus. Alvus
tenaciter adstricta nihil flatuum emit-
tens, ad mingendum quoque stimu-
lus,

Ius, urina tamen nulla effluente. Partes externas frigus obsidebat, atque pulsus exploratu durus & contractus erat. Vocatus in consilium, liquoris anodynī mineralis 125. guttas cum balsami vitæ guttulis 50. in aqua frigida vīni dimidia parte remixta propinnavi. Sacculum deinde avena igne torrefactam repletum regioni epigastricæ applicare atque in lectum concedere ægrotantem jubeo. Elapsa vix quarta horæ parte per superiora pariter ac inferiora flatus ac ructus in maximum ægri solatium processerunt. Factus quietus, summis aliquot infusis Thee poculis, calor in partibus extremis rediit: anxietas detum evanuit, corpus sudore maduit, ac placido somno inducto, ab omni dolore & morbo liber evalit. Post hæc clysterem carminativum applicandum curavi, a quo ingentem sordium copiam depositus. Altero die ægrum accessi & faciem flavo colore tintam inveni, urinamque bruni iterici coloris deprehendi, parca quantitate emissam. Continuavi usum liquoris nostri anodynī mineralis, sed longe parciori dosi, pulverisque præcipitantis, aliquot olei chamomillæ guttulis adjectis. Quibus sanitati in integrum restitutus, mox rursus iter officii causa suscepit.

Epicrisis.

Cardialgia huic atrocissimæ flatulente ansam suppedavit nervosarum partium imbecillitas ab animi & corporis defatigationibus, nec non a morbo præcedente contrafacta. Hinc balsamum nostrum vitæ blanda naturæque amicabili gaudet anathymiasi ad roborandum, & ad spasmum relaxandum liquorēm nostrum anodynum, successu haud frustraneo porrexus; eo majori quidem dosi, quo morbi vehementia potentiorem requisivit resistentiam: semper enim proportio inter vires medicamentorum atque obstantes morbi seu potius causæ morbificæ debet intercedere.

OBSERVATIO IV.

Princeps Serenissimus in quadrag. Cardialgiæ spasmodica ex hæ. sanguineam per sedis venas expertus erat excretionem. Instante fluxu sanguinis corporis frigidiori aeri justo sectione curata & posterò die, inquietudine, virium languore, æstu, cum pulsu celeri, nec non anxietate cardialgica premicepit. Jungenbantur animi levis defæctio, sitis inextinguibilis, abdominis tortuosa, alvusque dura & retinens. Clyster applicatus a flatibus statim & sine effectu repellitur. Observuntur blande diaphoretica, nitro, castorei momento nec non cinabari permixta, cum aquarum analepticarum vehiculo, sed nihil inde levaminis persensit. Secta in pede fuit vena, sed cum ultra quinque uncias sanguinis non extraheretur, parum inde auxiliū consecutus, quin potius symptomata incrementa ceperunt. Nos sanguinis abundantiam manifeste cernentes, ad secundam venæ sectionem transeundam nulli dubitavimus: qua libra pene sanguinis e secta in pede vena fuit emissa. Adeo vero hoc auxilio adjutus fuit, ut mox circa præcordia dolor, ardor, anxietas remitterent, noxque quietior esset. Tandemque exhibitis analepticis dia-phoreticis, enemate emolliente, atque interne infuso mannato, ex toto cum sanitate Serenissimus Princeps in gratiam rediit.

Epicrisis.

Sanguinem in vasorum intestini re-eti & coli membranis stagnantem, spasticis stricturis, & facta hinc ad ventriculum translatione orificii ejus vasa infarcentem, cardialgicum excitare posse dolorem, enarrata hac morbi historia, quantum ego quidem memini, sufficenter edoceamur. Præterea ex curatione a nobis instituta elu-

elucet, in corpore plethorico venæ sectionem vel binis vicibus cum emolumento posse adhiberi. Postremo id quoque elici poterit salutare porisma: cavendum esse quam maxime iis, qui ejusmodi criticis obnoxii sunt hæmorrhagiis salutem portendentibus, ne circa vel in ipsa excretione talia admittant, quæ turbare eam vel plane fistere valent; inter quæ, animi fortior commotio, terror præsertim, neque minus frigus externum, primas omnia ducunt.

OBSERVATIO V.

Cardialis spastica modica in plethora sub æstuoso coelo proficente, vena seccatione ter instituta curara.

Serenissima stirpe prognatus Juvenis vigesimum & sextum agens annum, carnosus & sanguine abundans, ex hæreditate a Serenissimo Parente in eum translata, jam tum hypochondriacis pathematibus ut & quandoque melancholia fuit affectus; a quibus mea opera, per Dei gratiam, binos ante menses immunis degebat. Suasi ut Carolinas adiret, antequam autem iter fusciperet, quod hoc anno adhuc erat prætermissum, ut venam secari pateretur. Neglecto a medico ordinario quod omni diligentia inculcavaram monito, veloci cursu sub sole fervente iter suum perficiens appulit thermas. Egit noctem inquietam, atque ex parte summa circa præcordiale regionem anxietate ad vomitum inclinante, extremorum frigore, internorum æstu, molesta corporis iactatione torquetur. Accitus ego tum temporis præsens, plethoram solvendam præcipio. Instituta venæ seccatio, sed chirurgo exiguum nimis aperturam faciente, sanguinis vix uncia paulatim profluxit: & Principe novam incisionem admittere noluit. Hinc symptomatis exacerbatis, non in lecto consistere potuit, sed noctem plane insomnem egit. Altero mane, iterandæ venæ sectionis necessitate multis argumentis demonstrata, eo perventum est, ut aperiri quidam venam sed non ultra quinque

uncias educi permetteret. Verum nec tum symptomata conqueverunt, ut remittere vita fuerint. Dedi interea sanguinis impetuolum motum compescientia: quo nomine liquorem meum anodynum, pulvarem præcipitatem nitrosum, nec non emulsionem ex seminibus 4. frigidis celebrem deprehendi. Quum vero ex toto tessere malum nollet, pulsus eadem celeritate agitaret, atque nox inquieta persisteret, multa opera impetravi, ut tertium, quarto videlicet ab invasione die, venam secari concederet. Detractis 8. circiter unciis, præcordiorum anxietas, inquietudo, ac febrilis calor confestim deseruerunt immanibus tot doloribus maceratum Principem, non sine insigni ejus & assistentium exultatione. Atque appetitu, somno, viriumque augmento redeuntibus, integre sanitati divinae bonitatis adjutorio fuit restitutus.

Epicrisis.

Circa hunc casum animadvertere quam maxime licet, sanguine nimium abundantibus vehementem & diuturniorem motum subito & præprimis sub cœlo æstuoso suscepimus valde pernitiosum atque infensum esse; siquidem sanguis copiosus intensa agitatione fortiter commotus valde turgescit, vasaque distendens hinc inde stagnat atque subficit, graves suscitans spasticas stricturas pariter ac impetuosas ad partes congestiones. Similiter fieri observamus, quando corpora plethorica in balneum nimis calidum mittuntur, vel sudorifera fortiora cum regimine calido obtruduntur: nisi enim symptomatis in gravescientibus mature solvatur plethora, graves & periculi haud expertes scenam ludent, ægritudines. Porro ex hac morbi historia docemur, quod immanes cardialgicæ passiones a folio sanguine intra membranas ventriculi flagnante, sine ulla vitiosorum humorum in ejus cavitate stabulante copia, excitari possint, atque unicum

ēum auxilium in sufficiēti sanguinis detractione repositum sit : qua neglecta vel insuper habita , nec præsentissimæ alias virtutis ad vincendum tamē morbum remedia quicquam perficere posse , recte colligitur .

OBSERVATIO VI.

Cardialgia spasmodica ex plethora & hemorrhoidibus non rite fluentibus.

Duobus abhinc annis ex Anglia hic casus ad nos fuit missus & consilium meum requisitum . Illustrissima fœmina , triginta annorum , sanguinæ complexionis , ante decem jam annos graviflma laboravit hemicrania , qua usū thermarum Epsloniensium fuit liberata . Postea maritata , in ipso puerperio idem malum rediit , atque identidem ope acidularum post aliquot tempus sublatum fuit . Verum non ita multo post , intolerabilis intestinorum invasisit dolor , per decem dies in inferiori eorum parte confusus cum tumore , qui etiam alvi de-positionem valde difficilem reddebat . Ubi vero hæmorrhoides fluere cœperunt , sublevatus quidem dolor , sed inferior tumor alvi obstructionem efficiens remansit , atque etiam semper pressione thoracis , quæ sit in fœminis per ligacula , increvit , qui tamen applicatione allii cum lacte levatas quodammodo fuit . Ab eo tempore labem contraxit ventriculus , ita ut a cibo minus salubri vel etiam copiosius ingestu , anxia compresio & constrictio circa præcordia fuerit secuta : quæ in puerperio secundo atrocior reddita , licet carminativis & anodynis exhibitis quodammodo remiserit , tamen ex toto vinci non potuit . Hanc medicus quidam expugnanda vomitorio promisit : sed tantum absuit ut inde diminuta fuerit , quin potius incrementa majora ceperit . Neque viena medicata , neque laxantia , quæ in usum subjunxit , quicquam profererunt . Optimum tamen levamen vinum Hungaricum , in quo cinamomum & cariophilli cum saccharo leniter coquebantur , ad duo pocula loco

Thee haustum , præstigit . Inde vero facies valde rubicundo pruriēte tædii pleno colore perfusa fuit , qui sub graviditate multum remisit . In ipso vero subsequentे puerperio tam atrox spasmodus ventriculum & præcordiorum regionem per septem fere hebdomades indesinenter affixit , ut vires inde mirum in modum fuerint profligatae , omnique fere ingesta vomitu rejecta : pari modo a vino Gallico Frontignan vel Hispanico quodammodo fævus hic dolor fuit sedatus . Interea spasmodus primarum viarum semper continuat , adeo ut ab omni cibo , sive in cœna , sive in prandio sumto , augeatur : ita ut interdū caput & pectus constringendo , & abdomen comprimendo , afficiat . In scrobiculo cordis , circa dexteri lateris costas spurias , dolor semper magnitudine ovi gallinacei percipitur , qui interdum remittit , sed sub ejus accessione , quam ira facile porrigit , dorsum occupat & intensum languorem , externarum quoque partium tremorem inducit . Ceterum , hæmorrhoidum internarum tumor , cum alvi obstipatione , continuus & fere indivulsus mali hujus fuit comes . Cerevisiam assumens , ardorem semper cum dolore percipit , qui tamen sumta magnesia dosi mitescit ; quare decocto ex mastiche & cinamomo parato , pro quotidiano utitur potu .

Resolutio .

Meum de hoc affectu ejusque causa & medendi ratione tale fuit judicium . Originem videlicet & causam tomœphalici tum cardialgici atque hæmorrhoidalis tumoris & doloris , a nuda sanguinis spissi & impuri redundantia , vas a sanguinea membranarum capitis , ventriculi & intestini recti , præsertim cum ibi non invenerit exitum , supra modum distendente & distracthente , in persona laetus absque dubio & nimis quiete vivente , ducendam ac derivandam esse putavi . De sanguinis missione nulla

nulla fuit mentio facta, quæ tamen summe fuisset proficia, perinde ac hirudinum ad venas sedis applicatio. Tempore gravitationis semper melius se habuit, quia supervacaneus sanguis in nutrimentum foetus absuntus est. Puerperium exactum, converso rursus per spasmos, hystericos puerperis solennes impurioris sanguinis motu ac impetu ad consuetas imbecilliores nervoslas partes, exacerbatio mali fuit secuta. Nihil omnino ad hanc causam removendam & eradicandam, neque emetica, laxantia, neque potus etiam spirituosi, licet levamen quoddam palliativum præstiterint, conferre potuerunt. Consilium dedi, ut ter minimum quotannis venæ sectio in pede administretur: dein, ut bis in anno curam cum aquis mineralibus institueret, utpote quæ etiam inter initia hemicranicum dolorem sustulerunt felicissime. Ejusmodi enim aquarum subtilium & spirituosalium ope, spissi & impuri humores corriguntur, diluti & fluxiles evadunt, excretiones salutares promoventur & partibus nervosis robur adjicitur, præsertim, si cura debito diæta moderamine, motuque corporis decenti secundetur. Id quod nos etiam omni diligentia inculcamus.

OBSERVATIO VII.

Cardialis *gia spaf* Tribus circiter abhinc annis, *Comodica* Gliarius & Nobilis ex Livonia ad me *Carolinis* valetudinarium suum statum prescripsi, consilium meum efflagitans. Conquestus nempe est de immani dolore pressorio & spasmo circa præcordia, quo jam per aliquot annos correptus fuit: initium sumens cum extremerum frigore, ab hypochondrio sinistro ad cordis scrobiculum, sternum, pectus, dorsum, imo ad brachia se extendens, cum spirandi angustia, inquietudine, virium omoium dejectione atque anxietate afflixit, quandoque mitiori gradu & haud diu

insistens. Admotis fomentis calidis, injectis clysteribus, exhibitisque internis diaphoresis moventibus remedii, sensim redeunte ad partes externas calore, vis mali imminuta quidem vel sopita fuit; attamen ex animi perturbatione aut frigore hiemali ad cutim penetrante, vel incongruo assumto potu ac cibo, promte & facile recruduit. Originem & causam hujus perquam molesti affectus in tempestivis & immodicis venationibus, sub cœlo rigido & frigido suscepit, nec non liberalioribus vini portionibus adscripsit. Nonnulli ex Medicis a defectu hæmorrhoidalis fluxus mali causam accersentes, quem nunquam tamen expertus est, venam pertundi bis vel ter quotannis suaserunt: sed citra omnem salutarem successum. Exquisivit meam de usu Carolinarum sententiam. Ego consilium omnibus modis approbavi, eo, quod plures viderim simili affectu laborantes, qui non nisi interno horum fontium, externo vero Tœplicen-sium usu, ab atroci malo liberari potuerant. Adjeci illud, quod si stagnatio sanguinis in intestinis crassioribus exitum per venas sedis moliens causam præbeat mali, vix ullum præter has dari neque mihi cognitum esse medium, quo, si modo natura ad hæmorrhoidalem fluxum inclinet, rectius & facilius promoveri possit. Scripti quoque post aquarum thermalium potum, balneum Tœplicense in ejusmodi partium nervosarum affectionibus longe utilissimum me observasse. Mira enim est ejusmodi aquarum subtilium in infirmis nervosis partibus roborandis, in spastis constrictis relaxandis, atque in sanguinis & fluidorum motu versus superficiem corporis determinando, efficacia. Auscultavit Generosus & illustris patiens meo consilio: & antequam adiret thermas, suum ad me direxit iter. Ubi præscripto salutari regimine & idoneis atque necessariis medicamentis ipsum instructum dimisi. Quantu-

tum levaminis ab hac cura expertus fuerit, revertens dilaudare non satis potuit. Quum postea breviori tempore ac minori gradu accessio facta esset; altero anno, vernali tempore ipse rursus cum uxore petiit has thermas: & utriusque, tam externus quam internus horum fontium usus prosperrimo successu se probavit. Nam, quum per sex annos in sterili pervixerint conjugio, uxor gravida reddita pulchrum & benevolentem filium perperit. Ex medicamentis quo^e ipsi suppeditavi atque postea transmisⁱ, elixirii visceralis cum liquore anodyno permixti, nec non pilularum balsamicarum polychrestarum, item pulveris præcipitantis nitrosi cum aliquot guttulis olei macis vel chamomillæ veri conspersi usum & virtutes, non sine singulari commodo arque emolumento expertus est.

Epicrisis.

Eiusmodi affectus chronicus & inverterati, non tam fluidarum, quam potius solidarum & nervosarum partium, quo^e motu & elatere præditæ sunt, nimirum plerumque coarctationi debentur; quo^e in habitum & consuetudinem degeneraverit, omnia remediorum genera, quo^e humoribus corrigendis unice dicata sunt pene eludit. Hinc neque venæ sectiones, neque laxantia, purgantia, anodyna, diaphoretica, neque etiam diuretica, tali in casu usui sunt, ut potius malum sèpius adaugeant. Præcipuum vero auxilium in ejusmodi remedio, quod totam sanguinis massam omnisque partes solidas moderate, & blande afficit, cuius generis fontes & balnea, est reponendum.

*Cardial.**gia, ex**frigore**& intem-**perancia,**Caroli**recurrens**balno**curata.*

OBSERVATIO VIII.

Vir trigesima annorum, generosa stirpe ortus, robustæ alias naturæ & structuræ corporis; pectus & præcordia vix unquam commodis tegumentis defendit a frigore, sed linteis & levibus vestibus munitum libero aeri

omni fere tempore exposuit. Praterea & ingluvie & poculis deditus, frequentius ad ebrietatem vinis varii generis se immergit. His de causis acerbissimos sèpe dolores, distensionem, lancinationem cum inappetentia, vomitu, anxietate circa stomachi regionem est expertus. Enixe & anxie remedium a me petiit & quæsivit. Misí identidem multa ad demulcendum dolorem interna & externa alias apta, sed speratus effectus non sequebatur, quia plane omnia diætatica respuebat præcepta. Tandem consilium dedi, ut thermas Carolinas & Tœplieenses adiret, iisque cum regimine debito uteretur: & inde etiam levamen, cum ipse ibidem essem, inveniebat præsentaneum. Sed exiguo post curam tempore, inter initia autumni, venationibus deditus, frequentius pedes & femora in stagna & piscinas dimisit. Inde valde refrigeratus; post varios cibos vinum in copia ingessit. Recurrit paroxysmus valde acerbus, qui etiam nundinis Lipsiensibus, me tum præsente, tam graviter eum affligebat, ut omnem fere respirationem tolleret & partibus extremis sudore frigido perfusis, crebroque recurrentibus animi deliquiis, morti videretur proximus. Fomenti calida externa & apta remedia interna allevamenti parum attulerunt. Suasi ut in balneum sive potius semi-cupium ex aqua & lacte paratum descendenter, & per horam imo amplius in eodem moraretur. Quo facto, postea in lecto liquorem anodynūmineralē cum dimidia parte spiritus Bussi remixtum ex aqua florum chamomillæ vulgaris propinavi. Tum sudore prorumpente id consecutus est, ut dolorum vehementia remiserit, alvus per aliquot dies clausa, jam soluta, & calor ad exteriora fuerit reversus.

Epicrisis.

Quam infestum sit frigus partibus nervosis, in primisque regioni stomachali & præcordiali, vix credibile est;

est; & plures suo damno id subinde experiuntur. Inde non semel sed saepius asthma spasmodicum, affectum spasmodico-hypochondriacum & dispositionem ad fluxum haemorrhoidalem, sed minus rite succedentem, vidi excitatam. Id quod facile si ex medicis concipere possant, quibus multa experientia cognitum perspetuumque est, quantam confessionem & confortium inter se partes corporis universi nervosæ alant, adeo, ut una lala ad reliquas facile idem vitium transeat. Deinceps id quoque debet animadverri, quod vita aulicæ additæ, Serenissima & splendidæ personæ, præ aliis omnibus, ventriculi & maxime cardialgicis passionibus expositæ sint; quia vita illud genus, quod ejusmodi personis est familiarissimum, cum exactam vitæ & diætationem respuant ac perpetuo fere saluberrima medicorum hoc in genere præcepta insuper habeant, ejusmodi morbis invehendis, materiam, originem & causam subministrat uberrimam. Possem multa recensere exempla illustrium imo Serenissimarum personarum, quæ fervidiore æstate glaciato potu, ita ventriculi & primarum viarum tonum atque inde bona digestionis opus destruxerunt, ut per omne pene vitæ tempus multa incommoda, quæ vix ulla medicina poterant colli, circa præcordia persistæ fuerint.

OBSERVATIO IX.

Cardialgia, ex iracundia, ab assumto vomitorio funesta.

Vir in vigore ætatis constitutus, nec tenerioris natura habitus, sed satis validi, in iram vero valde proclivis, occasione data, binis mox vicibus gravissima animi incandescens adeo turbatus, ut frigore & horrore extrema partes tacentur; immanni mox corripiebatur circa præcordia anxi dolore cum ardore & mortu in sacerbiculo cordis, nausea & vomendi cupiditate juncto, totamque noctem transiugebat insomnem. Hisce sympto-

matis intra viginti quatuor horas maceratus, flagitabat a medico vomitorium & quidem instantissime. Iste pulverem, qui tria grana tartari emeticci continebat, porrexit. Inde paucam quidem & mucosam viridescentis coloris materiam, sed summo labore & anxietate evomuit. Poscebatur aliam dosin, quæ ipsi etiam concessa, sed protinus omnia in dererius conversa. Associabantur continuo ructus convulsionis quippam præ se ferentes, sed nihil amplius rejecit. Præbui vocatus liquorem anodynum mineralem, & videbatur symptomatum atrocia mitescere & remittere per noctem. Sed ipse patiens impatiensissimus, altero mane, ob alvum firmiter clausam, a flatibus hanc tragœdiam fuisse ortam reputans, petiit a medico priori salis Epsoniensis unciam, quo ad alvum aperiendam alias frequentius fuerat usus; dedit, sed protinus priora symptomata multo atrociora revertebantur, & viribus omnibus collapsis intra tertium ab emetico diem e vita discessit.

Epicrisis.

Affectus iræ si vehementior fuerit, quam infestus sit universo generi nervoso maximeque stomacho, eum non modo spastica strictura dum afficit, sed & bilem in duodenum magna in copia effundit, gravissima atque haud infrequenter funesta, præsertim si non oxyus appropriata medicina malorum formes præscindatur, quæ inde sequuntur pathemata satis abundeque testantur. Et sicut tali in casu, lenissimo emetico, quod ex uncis duabus vel tribus olei amygdalarum dulcium, mellis uncia dimidia, & libra aquæ tepidæ paratur, ad spasmodum relaxandum & vitiosam bilem vomitu exturbandam, remedium vix datur præsentius; ita vita nihil infensius nec perniciens, præterquam emeticum vehemens e minerali regno petitus excogitari potest, præcipue, si primo statim post iram tempore porrigitur. Plures novi hac ratione

tione mortuos, non aliter ac si verum venenum arsenicale assumissent. Hac de re etiam peculiarem dissertationem: *de emetico post iram veneno*, ad præcavenda gravissima hinc inde illata damna, conscribere permotus sui. Lethalis enim & cum convulsionibus juncta ventriculi inflammatio, nisi inter initia statim congruis remedii occuratur, insequi consuescit. Postremo ex hac morbi & mortis historia hoc eliciendum duxi, quod, ubi ventriculus spastice afficitur, medicamina salina majori dosi & sine sufficiente diluentium quantitate data, ad augendum potius quam minuendum dolorem & spasmum, stimulando nerveas fibras, sive apta atque disposita. Hinc in omni cardialgicarum affectionum specie, salini generis medicamenta semper dissuadere solitus sum.

OBSERVATIO X.

Cardialis ab atonia & inflatione ventriculi, usi pilularum de styrace chronicis facta.

Illustrissimus vir tenerioris & pauculo sensibilioris naturæ, quinquagesimum ætatis agens annum, a longo inde tempore, cardialgica & fere quotidiana, tempore præsertim autumnali & hyemali, ex stomachi inflatione, corripiebatur passione, quæ inde suam trahebat originem: Ipse ob exsuperans prima in regione acidum, avidissime cibos justo majori quantitate in prandio præcipue cepit. Sed alvus semper pigra existens, nuncquam recte respondit ingestis. Præter hæc, æstivo tempore fructibus horæis, fragis, ceralis, malis Persicis, præter omnem modum, autumno vero uvis, & hieme dulcibus se replevit, corpusque tegumentis idoneis minori diligentia a frigore defendit: omni posthabita diæta ratione, & ex toto dictis medicorum spretis atque contemptis. Post sumum cibum ad dextrum scrobiculi cordis latus tumor gallinaceum ovum æquans se prodidit: mox sequebantur spirandi angustia cum facie rubicunda & anxiis

Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

stomachi compressionibus, nec non extremorum frigore, ut in lectum concedere teneretur. Admotis ventriculo & extremis partibus fomentis præcalidis, ructibus præcedentibus vomitu rejecit mucidam tantummodo materiam: post aliquot horas, verso calore madido in superficiem corporis, a doloribus fuit liberatus. Ceterum Illustrissimus hic Vir interdum autumno catarrhosis deflexionibus cum gravi tussi & inquiete affiebat. Medici tum ad præstandum lenimen, dosin pilularum de styrace cum refracta aleophanginarum dosi, repetitis vicibus porrigeabant. Hinc mitiora quidem redditæ symptomata; sed postea morbus præcordialis cum inflatione cardialgica, longe majora sumit incrementa, adeo, ut quandoque per integrum septimanam graviter in lecto decumbere cogeretur. Opem vero tunc temporis atque levamen saepius insigne fuit expertus a leni emeticco, dum ab uno tantum tartari emeticci grano soluto & cum potu diluente sumto, magna saburæ & materiæ pituitosæ copia vomitu fuit rejecta: quæ obscuri bruni coloris cum esset, metum & suspicionem incusit sanguinis corrupti; cui etiam sententia medici ordinarii suffragabantur. Sed ego postea accersitus cum rem penitus inquirerem, Illustr. Virum saepius usum fuisse potu succolade reperi. Judicavi inde hunc insolitum colorem accersendum: & obfirmavit me experimentum a me factum, ubi materia incocta & carbonibus injecta, nullum fœtidum odorem diffundebat.

Epicrisis.

Ex præfata morbi historia id saltim in usum suum medicæ artis tirones depromere possunt, quod in tali cardialgiæ, quæ ab atonia & inflatione oritur specie, doloris levandi causa, minime quæ opium ingrediuntur, ut sunt pilulæ de styrace, in usum ducenta, præsertim quando causam morbi vitiosæ & copiosæ ex prava digestione provenientes cruditates

subministrant. Nam ut ut hęc ipsa cum aliis corrigentibus permixta, in morbis ubi spasmorum atrocia urget circumspete data, locum invenire possint; tamen ubi robur ipsius ventriculi & primarum viarum deficit, & cruditatum ingens est proventus, nūnquam, nisi augere velimus mala, præbenda sunt. Eiusmodi potius in casibus, quæ leniter provocant vomitus, educendo faburrām vitiosorum humorum, utilitatem afferunt desideratissimam; quibus denique tonica & temperate balsamica interne & externe substitui possunt. Ceterum illustrissimus vir omnia remediorum genera aspernabatur, præter lapides cancrorum quibus cum aqua fontana quotidie fere vesperi utebatur, nec non aquam analipticam spirituosam ex corticibus citri, aurantiorum, pomorum chinæ, eum vino Hispanico destillatam & julepo rosarum dulcificatam, quam non nūnquam assumebat.

Plura qui de hac adfectione desiderat exempla, adeat *Consult. Medic. Sect. I cas. 7.9.10.*

C A P U T III.

De Doloribus & Spasmis præcordiorum a calculo felleo ortis, & de ejus generatione.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

*calculi
fellei se-
viter fa-
tis affi-
gunt.*

SÆvissimæ quidem sunt passiones, cæque dolorificæ, quæ, universum nervosarum partium systema vel maxime impetentes, totam motuum vitalium œconomiam pervertendo, a calculis in viis & canalibus urinariis suscitantur: sed non minoris levitiae, nec minoris periculi sunt illæ affectiones, quæ a calculosis concretis intra canales biliosos contentis proficiscuntur. Ut vero interdum ægre admodum in ductibus qui consistunt urinariis calculi, ita longe difficiliori ratione biliosi dignoscuntur & dijudicantur, adeo,

ut demum post sectionem atrocium variorum symptomatum, quibus per longum tempus afflicti fuerunt ægri, incognitæ causæ in sensus incurvant. Hinc quam frequentius, quam medicamenta communiter existimant, graves, pertinaces & vix explicabiles ab ejusmodi calculis foveantur dolores & spasmi, qui præsertim præcordia infestant; et re utique fore duximus, hanc in praxi medica utilissimam materiam speciali capite includere.

§. II.

Primo annotare licet, quod in nullo animantium genere crebrius ac in humano corpore folliculus felleus calculus refertus observetur, & quod his ipsi ratione figuræ, coloris, magnitudinis, consistentiæ, numeri mirifice inter se differant. Vix enim ulla in rerum natura reperitur figura, vix ullus color, qui non in calculis cystidis felleæ conspicuator. Alii ovalem & rotundam, alii exacte cubicam, quidam triangularem, sexangularem, octaedram, pyramidalem etiam recipiunt figuram: sunt, qui fabas, phæseolos, lentes, pisa, castaneas, tribulos aquaticos, nucem moschatam referunt. Mirum etiam in modum ratione coloris variare solent; sunt, qui cretacei, gypsei, ex albo-cinerei, plumbei coloris observantur, frequenter flavescētes vel ex flavo rubicundi, bruno-nigricantes, nigri, viridescentes etiam interpersis maculis deprehenduntur; alii pluribus coloribus variegati; quidam exterius crusta creacea & gypsea obducti, interius nucleus habent ex bruno-rubicundum.

§. III.

Ingens etiam est differentia biliosorum calculorum ratione consistentiæ. *Item co-*
sistentia. Quidam sunt friabiliores & molliores & tales sunt plerumque albi, cineritii & flavescentes valdeque leves; alii sunt magis compacti, solidi & graviores, & tales sunt quam maxime qui saturatiorem colorem habent ex flavo rubicundum nigricantem, & hi sèpè lèvigati & politi observantur. Licit vero

vero ordinario plurimi lapides cystici aquæ injecti supernatent, tamen solidiores & compactiores, quales sunt maxime lœvigati & obscurioris coloris, submergi & fundum petere non semel observavimus. Deinde etiam sapius vidimus, eos, qui leviores aquæ supernatant, si paulo diutius in ea detinentur, descendisse, forsitan quod in ipsis poris successive particulae aqueæ se se insinuaverint. Neque hoc prætermittendum esse ducimus, quod lapidum, qui supernatant, fragmenta & minores portiones in fundum cedant, non secus ac in putnac, qui grandioris molis supernatant, in pulverem vero redactus descendit.

§. IV.

Magnitudine & numerus. Mirum etiam variat cysticorum calculorum magnitudo & numerus. Nam certa auctorum probatissimum fide & observatione constat, totam vesiculam a calculo ingentis magnitudinis, qui aliquot uncias penderat, valde fuisse expansam & totam ejus cavitatem impletam: qui interdum in defunctis numero trigesinta, quinquaginta, octoginta, imo trecentos, quorum alii sunt majoris, alii minoris, alii mediae magnitudinis, inveniri experientia docet.

§. V.

In ductibus biliosis, qui in immediate bus bilio, ex hepate vel intra vel extra ejus paranchyma proveniunt, concrementa etiam solida ex bile producta, in anatomib; rariis offenduntur. In ductibus biliosis, qui in immediate bus bilio, ex hepate vel intra vel extra ejus paranchyma proveniunt, concrementa etiam solida ex bile producta, in anatomib; rariis offenduntur. bovinis. frequentius, in humano vero corpore paullo rarius offendit, ipsa loquitur experientia. Dubio procul ob eam rationem, quia bilis hepatica longe liquidior, dilutior quoque est ac cystica, quæ crassioris consistentia & saturatioris etiam coloris, nec non amaricantioris saporis observatur: deinde; quia in ductibus hepaticis, ex quibus continuo in satis notabili quantitate ad duodenum biliosus fertur humor, non tam diurnam, que requiritur ad fluidi dissipationem & solidefiantis materiae concretionem, nece-

re potest moram. Si tamen, ut auctores testes sunt, ibi offenduntur, longe friabilioris & mollieris sunt consistentiae, asperiores quoque, tubulosi ac flavescentes.

§. VI.

Experimenta, quæ cum calculis Recens felleis ad eorum elementa & ingredi- sentur experientia paullo curatus per vestiganda monta & discernenda, instituimus, hoc cum cal- loco recensere operæ pretium videtur. culis Primo observavimus, quod omnes illi, humanis felleis qui saturatioris & obscurioris coloris facta. pauloque solidioris textura, sufficien- ter exsiccati, vel in massa, vel in pulvere, candelæ ardenti admoti mox instar resina lucidissimam concipientflammam, & toti, exigua saltim re- licta materia nigra & cineritia fere insipida, comburantur: illos vero, qui albi & cineritii coloris, gypsea & cretacea materiæ erant, flammarum respire, vel leviter saltim eam su- scipere & instar ceræ in lamina ferrea ignita fluere vidimus. Deinceps anno- tavimus, eos lapides cysticos, qui solidioris fuerunt texturæ & saturatio- ris coloris, nec a spiritu vini rectifica- tissimo, nec ab aqua, accidente etiam leni coctione, dissolvi potuisse. Alio vero tempore a nobis animadversum est, lapides cysticos, qui ingentis fueru[m] magnitudinis & mollieris sub- stantiae, totam fere cystidis implentes cavitatem, ultra dimidium in aqua calida fuisse solatos.

§. VII.

Non indignum porro observatione cum cœlum est, quod qui in hepate ejusque ductibus in bove reperiuntur & eximuntur calculi saturate flavescentes & friabi- les, difficulter admodum, vel exiguam saltem concipient flammarum, in nigrum vero cum fumo, qui crinum initia combustum refert odorem, redigantur carbonem. Spiritus vini hisce affusus & leniori calore digestus, brevi tempore flavo colore tingitur & saporem valde amaricantem exhibet. In aqua calida horum calculorum frag- menta injecta parumper dissolvun-

tur, sed saltim levis, flava cum amaricante sapore extrahit tinctura.

§. VIII.

Recens bilis ex vesicula bovis ^{sumpita tribus uncis æquans, tam}
_{bovis.} amaricante prædicta est sapore, ut una guttula unciam aquæ amarore imbure possit. Hujus uncia in vase stanneo leni evaporatione in extractum resini-forme redacta, drachmam vix unam largitur, cuius portio flammæ admota lucidissime ardet, dimidio præter-propter in cineres abeunte. In spiritu vini rectificatissimo ægre solvit, optime vero in aqua atque etiam spiritu vini aquoso: color est flavus & sapor valde amaricans. Quod si inspissata bili bovinæ liquidiori tenuissima argillacea & gypsea materia intime permiscetur, per exsiccationem exhibit massam paulo duriorem, quæ flammæ admota æque ac calculus cysticus ardet.

§. IX.

^{Soliana} His ita constitutis & accurate per penis plane appetet, salia nec alcalia, nec acida, neque neutra vel tartarea, ut communis fert opinio, ad generationem & concretionem biliosorum calculorum concurrens; sed eos ex sulphurea paulo mucidiori biliis portione, intermixta plus minus teneriori glutinosa vel tophacea materia calore successive inspissata in durum quoddam concrescere mixtum, & variam figuram, variumque, pro differenti partium mixtum constituentium positu & situ, recipere colorem. Nam salibus tantummodo haud proprium esse sub variis coalescere & concrescere formis & figuris, id inter alia variæ & elegantissime sepius figurati lapides ex sola aqua calcarea in cryptis & specubus subterraneis, ut sunt Baumanniana, Scharzfeldiana, guttatum stillante producti, luculenter demonstrant.

§. X.

^{Genesias} Genuinam autem tam diversæ configurationis & coloris in progignendis calculis cysticis rationem ac modum

expedita concipere atque invenire, non tam explicatu promptum est ac facile, sed tamen possibile videtur. Evidem, si consideramus longe crassiorem & saturatiorem, quin etiam amaricantiorum esse, quæ in cystide detinetur, bilem, ac eam, quæ immediate ex ductibus hepaticis ad duodenii cavum defertur, utpote quæ longe tenuior, liquidior minusque amaricans est: sique simul attendimus bilem, ex qua in ejus folliculo efformantur calculi, ex hepate etiam per minimos ductus, qui recte cystico-hepatici nominantur & in tunicam cellulosa cystidis finiuntur, in ejus cavitate identidem liquidam & dilutam fieri; non aliam possumus durioris consistentia reperire causam, quam quod in homine ob situm vesiculae fellæ erectum biliolus humor non continuo flumine promanet, sed tum demum prorumpat, quando a ventriculo cibis referito ipsa premitur: hinc fit ut vacuo sub longiori inappetentia ventriculo diutius ibi moram nectere & stagnare debeat, atque interea liquidior ejus pars tum per ipsos etiam poros ejus tunicarum, quæ microscopio inspectæ oculis non aliter se objiciunt ac pannus Indicus vulgo *Nessel-Tuch*, foras propellatur, crassiori quæ facile in coagulum abiare potest, remanente parte.

§. XI.

Prout vero bilis pro diversa indole ^{Figura} & constitutione seri excrementitii, & color quod materiam præbet, in tanta va-^{ris} rietate corporum infirmorum, non unius ejusdemque est mixtionis ac crasseos, sed plus minus partibus terrestribus, tophaceis & in coagulum abundantibus, item sulphureis magis vel minus exaltatis, referta, binc variæ inde resultant figure & colores. In cache-eticis enim sepius calculi gypsei albicantes invēti sunt, quin immo in ipsis iste-
ro chronicò laborantibus, copiosa cretacea & gypsea, qua dubio procul du-
ctibus hepaticis infedit, per alvū deje-
cta materia, morbū sublatū fuisse binis
obser-

observavimus exemplis. Ita etiam cōmemorant M. N. C. Decur. 2. anno 7. obs. 145. materiam tophaceam in pueru atrophia laborante cum alvi dejectione copiose fuisse educatam, quæ instar lateris modo rufo, modo fusco, modo atro prædicta fuit colore.

§. XII.

Cause procataractice. Ad generationem calculatorum biliorum complures utique causas concurrere certissimum est. Has inter præcipuæ sunt ætas inclinans: rarius enim in hominibus ætatis florentis, frequentius vero in senibus decrepitis sexaginta, septuaginta, octoginta annorum cystidem pluribus & durioribus etiam calculis referat fuisse, permultis observationibus confirmamur. Qui desiderant vitam & parum corpus exercent, præ iis qui mobile semper vita genus colunt, ad ejusmodi calculosas concretiones magis idoneos esse videmus. Sic quoque in foeminas crebrius quam in viris reperiuntur. Quarum rerum hæc in promtu sunt causæ. Progressus sanguinis per venas meseraicas, per portæ venam & hepar, ut secundum naturam & consuetudinem semper paulo tardior & difficilior est quam in aliis visceribus: ita in iis, qui vitam collunt sedentariam, cuius generis præcipue sunt ætate confecti & sequior sexus, longe segnior & difficilior redditur; unde ob impeditorem sanguinis per hepar progressum sit, ut partes aquæ & fluidæ in vasa secedant lymphatica, remanente & sanguinis & biliosi humoris, qui ex eo separatur, crassiori substantia.

§. XIII.

Spiritus. Porro ad horum calculatorum frequentiorem proventum immoderatum spiritus vini, item cerevisie crassioris usum plurimum conferre, non modo auctoritate & fide Cl. SYLVII constat, qui prax. medic. lib. 1. p. 302. testatur, se ex hujus aliorumque potuum generosiorum abusu aliquoties icterum & huic succedentem ascitem ut plurimum lethalem observasse, he-

Hoffm. System. T. IV. P. II.

pate scirrho multisque calculis & tophis obfesso subinde reperto; sed & ipsa sana ratio id evincit: nam spirituosa inque primis spiritus vini, & chylum & lympham & sanguinem ad coagulum quam facile disponunt. In laboribus enim chymicis ad crystallisationis negotium promovendum spiritum vini mixturæ affusum magnam vim habere, compertissimum est: præterea, potibus vinolis & spirituosis corpora nimis incalescent, & dissipato liquido sanguinis & humorum incrassatur massa.

§. XIV.

Deinceps foeminas post quinquagesi. *In semi-nis quin-
guagena-
riis san-
guinis.* annum, cessante mensium flu- xu, calculis non modo urinariis, sed & biliaris atque inde gravibus abortis *gutis* symptomatibus tentari, identidem *spissæ*. experientia doceatur; cuius vix alia subest ratio, quam quod succrescente majori sanguinis in vasis copia, hic difficultius moveatur, & hinc inde subsistens sedentibus partibus tenerioribus spissior reddatur. Nec rarius vidi- mus, ejusmodi foeminas inexplicabilibus in epigastrica regione doloribus expositas fuisse, ita, ut morti vicinæ ob vehementes angustias & anxietates visæ fuerint, superveniente intenso subinde extremonum frigore, dictorumque symptomatum singulis diebus circa medianam noctem recursu, quibus accessit dolor in hypochondrio dextro ad totum abdomen interdum sese extendens, cum foedo ad flavum accidente, faciem totumque corpus deturpante colore; quæ tamen pathema exclusis per alvum vel sua spon- te vel artis beneficio excrementis ar- gillaceis prossus quieverunt.

§. XV.

Sunt vero variæ & valde acerbi ge- *Enarratio pa-
thema-
rum.* neres, quæ calculos ductibus biliaris inhærentes comitari & insequuntur pathemata, ut etiam collective sumta & considerata, eorum præsentiam arguant. Ordinaria fere sunt: non vagus, sed in una eademque sede, hypochondrio netape dextro

circa regionem hepatis defixus & constans, premens, gravatus vel etiam acutus cum foedo plerumque faciei colore, interdum ad epigastricam regionem & cordis scrobiculum sese extendens dolor, cuius certis intervallis tanta sit exacerbatio, ut tormenta ac cruciatus totam abdominis cavitatem occupent, juncta plerumque appetentia, nausea, conatu ad vomendum, circa praecordia anxietate, dolore cardialgico, animi defectio, alvo duriori & adstrictiori: quibus tandem dira & contumax optimis haud auscultans remedis accedit iusteritia. Quidam afflictorum continuo ventris tormentibus exagitantur & vitam per multos annos miserrime trahunt; plurima pars hydrope perit. In quibusdam gravatus, obtusus, profundus satisque contumax cum sensu ponderis dolor persistit, idque plerumque sit, quando mollioribus & minoribus calculis folliculus felleus valde distenditur.

§. XVI.

Dolor acutus in quid in dicet. Intensior vero & acutior si persistit & universum systema partium nervosarum in consensem trahendo vehementes spasticas stricturas, non modo circa partes vicinas, sed etiam remotas, brachii nempe & artuum distensiones, convulsiones epilepticas, neque minus cum pulsu duro & celeri febrem efficit; indicium est, calculum & mole & alperitate insignem firmiter ductibus biliaris inhaerere: ex quibus causis tandem fit, ut brevi mortem accersat.

§. XVII.

Calculi per alvū secus. Inter hæc vero omnia, quæ jam monuimus, signa, nihil datur certius vehementes a calculo felleo prognatas dijudicandi passiones, ac si ipsi cum excrementis per alvum secedunt; & tum non secus ac in calculis renalibus, quando hi ex ureteribus in vesicam fuerunt delati, omnes simul & semel dolores cum reliquis gravibus afflictionibus cessant atque expirant, iætero saltim excepto qui

non simul, sed sensim tandem evanescit, eo, quod bilis sanguini & lymphæ intime immixta non tam facile & expedite rursus e totius corporis sphæra discuti possit. Calculi autem hi, qui per alvum deturbantur, non unius ejusdemque coloris, magnitudinis & numeri observantur, atque etiam pro differenti horum ratione, sedem quam occupare solent, subindican: Nam si sunt molliores, dilatioris, vel etiam topheaci & gypsei coloris, e ductibus hepaticis, quibus inhæserunt profectos esse haud levi argumento est: si vero minores, si asperi, si duriores, angulares & coloris paulo saturatoris, folliculi fellei hospites fuisse & per angustum illum canalem cum acerbissimis symptomatis iter suum confecisse, haud obscure colligitur.

§. XIX.

Ceterum testantur observationes *Nullo se-
eaque non rare, post mortem vesi-
culam fellis multis lapidibus refertam
inventam fuisse, ubi & corpus a foedo
flavo colore immune & ab aliis etiam
gravibus passionibus liberum extitit.
Cujus rei causam sine ulla dubitatio-
ne inde derivamus, quod calculi tam
illi qui vesiculam felleam, quam
etiam qui renum substantiam ob-
sident, si quiete jacent, nullas valde
sensibiles procreant molestias atque
incommoda: quandocunque vero ita
vel ratione sedis vel ratione molis &
figuræ sunt comparati, ut nervosas
exquisitæ sensationis membranas vel
ductus violenter lancingent aut disten-
dant, protinus tota œconomia aëlio-
num vitalium & animalium in uni-
verso corpore perturbatur. Idque non
tantum fit, quando calculi per du-
ctum cysticum ad cholodochum iter
suum conficiunt, sed & quando ipsa vesicula fellea, quæ membranis
nerveis sensitilibus ob dextri interco-
stalis nervi interspersas ramificatio-
nes, gaudet, a nimium quoque bilis
coagulo vehementer & supra modum
distenditur, tunc non secus ac in ve-*

sica urinaria, si ingentis molis quandoque ad sex vel octo uncias accedens, quale exemplum nuper habuimus, ibi hospitatur calculus, symptomatum acerborum caterva corpus obruitur. Legimus enim apud autores spectatae fidei, felleam vesicam tam grandem a copioso intus harente solida materia fuisse deprehensam, ut naturalem magnitudinem vel triplum superaverit.

§. XX.

Dolores ex calculo felleo periodici. Dantur etiam dolores & spasmi cum consuetis symptomatis juncti ex calculis felleis oborti, certis periodis invadentes & repetentes. Ita notabilis est casus, quem B. PETER-MANNUS in dissert. de scrutinio icteri ex calculo vesiculae sellis recenset, ubi quidam ictero annuatim periodico cum doloribus afflicitus est, qui vero post evacuationem lapilli baccæ lauri similis cessavit: altero anno cum idem morbus rursus invaderet, exhibitis convenientibus remediis rejecti sunt per alvum plus quam sexaginta calculi flavescentes, quorum alii rotundi & lavi, alii angulosi & asperi, alii moliores, alii duriores fuere, magnitudine partim phaeolos & pīa, partim quoque lentes referentes.

Methodus medendi generalis cum cautelis.

§. I.

Perseptis sic omnibus & singulis quæ ad historiam hujus affectus tum quoad causas, & prognosin, tum quoad eum dignoscendum faciunt, pertinentibus circumstantiis: sequitur nunc, ut etiam solliciti sumus de accommodatis ad eum tollendum vel mitigandum saltim, vel ad eorum generationem præcavendam præsidii. Quemadmodum vero duplex semper morbis medendi via est; altera, quæ in paroxysmo, altera quæ extra eum locum invenit, dum

in illo medici consilium magis ad symptomatum, spasmorum & dolorum ingravescentium mitigationem & allevamentum: extra paroxysmum vero ad removendas caufas directum esse debet; ita etiam hanc in præsentis affectu locum obtinere existimamus.

§. II.

Nihil itaque antiquius esse debet medico, ac ut seva illa, quæ a spasti-
cis nervosarum partium stricturis cir-
ca præcordia & etiam partes vicinas
excitantur, quodammodo leniantur
lymptomata; cui scopo obtinendo,
quæ anodyna, demulcente & fibras
nimis strictas relaxante virtute gau-
dent, egregie serviant. Hujus gene-
ris sunt ex pinguis interne sumendis
oleum amygdalarum tam dulcium,
quam amararum, recens sperma cei-
externe vero pinguedo cati sylvestris,
castorei &c. Ex demulcentibus lac,
serum lactis dulce, emulsiones ex se-
minibus quatuor frigidis, infusa vel
decocta ex radice altheæ, herba pa-
rietaria, floribus malvæ, papaveris
rhœados, sambuci, quibus addi potest
syrupus de althea Fernelii. Ex anody-
nis spiritus nitri dulcis rite præparatus,
liquor anodynus mineralis, extra-
ctum croci, papaveris rhœados. Ex
antispasmodicis pulvis ex lapidibus
cancerorum, cinnabari & nitro para-
tus, cui tantillum extracti croci adjici
potest, pulvis antepilepticus Mar-
chionis, pulvis lumbricorum ter-
restrium, pulvis antepilepticus niger &
qui ex ratura unguilæ alcis, crani hu-
mani, nec non lèpore ex utero secto
& exccato parari solet, præsertim
quando ex iis cum aquis florum blan-
da anodyna virtute gaudentibus con-
cinnantur mixturæ.

§. III.

Externe epithemata & facculi ex *Externis.*
emollientibus & carminativis specie-
bus parati, vel etiam vesicæ decoctis
florum emollientium & paregorico-
rum repletæ partibusque affectis ap-
plicatae, plane singulare dolorum &

spasmorum lenimen afferre solent. Expedit quoque ad dolores sopiendos clysmata ex lenientibus parata anno cerebri infundere, nec non alvum per blandum laxans, quale est, quod ex manna, rhabarbaro, agarico recenter trochiscato, tremore tartari & id genus aliis confici solet, leniter ducere.

§. IV.

Extra paroxysmum vero quietentibus spasmis & doloribus ad causam mali funditus evelendarum, ad obturatos meatus felleos aperiendos & ad calculos, si ipsis firmiter inhærescant, quantum fieri potest, extra corpus propellendos, utique alia medendi via est ineunda. Ea enim, quæ strenua sua virtute jam dictos effectus praesstant, in usum vocanda, cujus generis sunt infusa & decocta ex aperientibus, resolventibus, discentibus & excretionem promoventibus, vel ex aqua sola vel vino permixta parata v.g. radice rub. tinctor. graminis, asparagi, petroselini, pimpinellæ, aristochiæ, curcumæ, cichorei, glycyrrizæ; additis postea rhabarbaro, trochiscis de agarico, tartaro tartaria, terra foliata tartari vel sale polychresto & syrupo de althea Ferneili. Quæ decocta, si convenienti dosi & longo satis tempore in usum ducuntur, in hisce affectibus debellandis magna vi gaudere, experientia & multis observationibus evicti sumus. Clariss. SYLVIUS in prax. med. lib. I. cap. 45. & ex eo Celeberrimi nominis Itali medici LANCISIUS, item BIANCHI inter medicamenta calculos bilioflos specifica quadam vi dissolventia, decoctum radicis graminis, graminisque succum mirifice laudant atque commendant, hac potissimum ducti ratione, quod boves & oves mente Maji, quo gramine viridi vescentur, sensim ab omni cruxtra lapidosa liberentur, quæ tempore hymali, ubi feno nutruntur, in eorum folliculo fellis concrescere suevit.

§. V.

Preter hæc radix parens brave haud

ita diu ex Brasilia in Europam translatæ ad drachmas duas in lib. una aquæ leniter decocta, potum admodum salutarem in omni calculo etiam in asthmate humido præbet, si tertia ejus partibus singulis horis cum pauxillo sacchari tepide bibitur. hac enim ratione icterum felleum cum torminibus & ingenti dolore stipatum intra 24. horas discussum in l' Acad. Royales des Sciences Anno 1710. p. 76. legimus.

§. VI.

Nonnulli etiam millepedes vivos pulvorem infundendos & siccatus in pulvrem terunt & hos ipsos cum salibus dum. neutrīs, ut sunt terra foliata tartari, sal polychrestum, tartarus vitriolatus & tartarisatus, solutio oculorum cancri, parca & refracta dosi ad obstructos hepatis meatus expediendos & ab omni biliosa amurca liberandos maximis faciunt. AVICENNÆ vero cura, uti in ictero chronico, a veteribus medicis magni semper habita est, ita etiam eam in iis, quæ in meatus biliariorum obstructione & bilis ad concoctionem ciborum necessarii præpedito affluxu, consistunt vitiis, locum habere posse haud dubitandum est. Vetustissimus vero hic auctor lumbricos siccatus cum vino albo & saccharo ad saporis gratiam sumtos plurimum laudat, vel etiam horam pulverem cum syrupo de byzantiis in pilularē redigit formam & cerebri vesperi propinat, postridie superbibendo serum caprillum, ex lacte a capris, herbis prius aperientibus, fœniculo, apio, petroselino, rufco, lupulo, eupatorio, asparago, nutritis desumto, relicta ejus caseosa substantia paratum. Ceterum externis quoque leniendis gravioribus symptomatibus occurtere e recriit. Faciunt hoc plurimum epithemata hypochondrio dextro applicata, quæ ex floribus chamomilla vulgaris & Romanæ, herba scordii, absinthii & cardui-benedicti, aqua florum sambuci & vino rubro præparantur, si frequentius die renovata admoveantur.

§. VII.

Exira pa-
roxytum
causa
morbis
evelen-
da.

aperien-
tibus.

decocto
radicis
graminis.

Raddi
parcire
brava-

Pulvero
millepe-
dum.

Cura
Avicenni-
ne.

S. VII.

Ultima spes in aquis medicatis. Hæc vero omnia quando inaniter, & incassum longo tempore usurpatam fuerunt, ultimo tandem spes est sanitatem recuperandi in aquis medicatis naturalibus tam thermalibus quam etiam sic dictis acidulis; inter quas celebrioris famæ & effectus sunt thermæ Carolinæ, Aquisgranenses, acidulæ Egranae, Pyrmontanae, quibus certe magna, & efficax virtus inest rebelles chronicas, que ab obturatis & crasso humore sarcitis visceribus præsertim hepate proveniunt, persanandi passiones, si corpore prius probe præparato, soluta nempe plethora, vel cacochymia attemperata, debito regimine tum interne tum externe adhibentur.

Cura præservatoria.

Præservatio libro sanguinis per viscera obtinatur. Cum in superioribus dilucide sati ostensum sit, quam gravia, & sèpius funesta calculos felleos, præsertim si exitum per angustos & valde sensiles canales nerveos moliuntur, excitent symptomata circumspecti nunc erit medi ci, ut ubi in corpore ad eos progignendos dispositionem invenerit, id omnibus modis impeditat. Quod nostra quidem sententia vix rectius, & meliori successu fieri poterit, ac si diligenter ad progressum, & cursum sanguinis per melementerum, per viscera abdominis in primisque per hepar attendat, an liberille ac integer, an vero difficilis, & præpeditus sit; quandoquidem ex hoc, tanquam ex fonte sicut plurimi hepatis morbi, ita etiam calculosæ concretiones in hoc viscere proveniunt. Nam quo spissior est sanguis, & serum muluis glutinosis partibus refertum, eo bilis ad coagulationem magis prompta arque proclivis est: & quia graves illæ chronicæ passiones, cachexia, hydrops, icterus, asthma hydropicum ex retardato sanguinis per hepatis viscus progressu identidem nascuntur, non mirum est

in corporibus que ejusmodi morbis defunguntur, paßim id testantibus observationibus, concreta calculosa in folliculo felleo vel etiam ductibus biliaris inventa fuisse.

Quicunque itaque ex Medicis hos morbos prudenter avertere vult, ^{Quæ huc} ^{faciat.} ejusmodi remedia præscribere, & in usum ducere debet, que in genere morbis, qui ex virtio hepatis nascuntur præcavendis dicata sunt, cujusmodi sunt fontes medicati & minerales, item potus diluentes, ut ferum lactis cum convenienti regimine, sufficienti motu, & exercitatione corporis usurpati, necnon medicamenta qua tenaces viscidos humores dissolvant, & acidum, quod fere omnis coagulationis principium est, destruant, uti sunt decocta ex radicibus quinque aperientibus, præsertim si cum sale polycristo, terra foliata tartari, nitro acuanturn, item elixir temperatum viscerale cum æquali parte essentiæ rhabarbari saturatæ permixtum, cuius frequentem usum in ejusmodi morbis hepatis præcavendis non modo tutissimum sed & efficacissimum semper comprehendimus. Præterea tempestive instituta sanguinis missio, potus sufficiens, temperatus & modicus vietus, parcior cerevisia crassæ, vini, spiritus vini ac calidorum medicamentorum ac purgantium usus, sicuti nunquam non a molestis, & chronicis passionibus, ita etiam a præfatis hepatis morbis corpus egregie vindicant.

ENARRATIONES
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Vir generosus sexagesimum, & ^{Coleui} sextum jam supergressus annum, ^{fallei} sanguine, & succis plenus, laetæ, ^{in plor} & virosæ diæta assuetus, jam ferre per decem annos dolores modo ^{Venæ} ex calculo, modo podagricos est ^{fest. em} experitus. Ante aliquot annos immu- ^{persu} ^{nes}

nes dolores accesserunt circa vesicæ regionem cum ingenti gravitatis ibi sensu, qui suscepit corporis motu augebatur. Aderat simul titillatio circa pubem & perineum, & veluti stillicidium sequebatur urinæ, ut vix potuerit inhiberi: stimulus quoque ad alvum deponendam persentiebatur, atque urina prodibat alba, turbida, cui sedimentum mucosum inerat; interea dolores nephritici & podagrici conquiscebant. Eger immensis fractus doloribus & viribus sensim privatus ac emaciatus tandem supremum diem obiit. Dissecto post mortem corpore, lapis in vesica 8. uncias pendens inveniebatur, & pelvis renis sinistri, lapidem firmæ instar marmoris consistentiæ drachmas 6. ponde-
re habentem involvit; in cystide vero fellis plus quam 70. minoris vel majoris magnitudinis calculi deprehendebantur, quorum nonnulli tam pulchre laevigati, politi, variegatique erant coloris, ut jaspidum instar annulis aureis a curiosis includerentur.

Epicrisis . .

Retulerunt mihi de hujus egri statu, quod aversatione quadam naturali nunquam venæctionis remedium passus neque etiam inclinante ætate, sanguinis excretionem natura molita fuerit, quam tamen in juventute per nares frequentius fuit expertus. Relatum quoque accepi, quod pater ejus podagrīcī & nephriticis doloribus sa- pius fuerit tentatus. Quibus circumstantiis probe animadversis, haud sine ratione colligi poteris, nimiam sanguinis & succorum exsuperantium, in corpore, per nativitatem hæreditario quasi jure imbecillitatem ad calculum trahente, præfertim sub quieto reddito vitæ generè & intemperantiori vini usu, adeo numerosæ calculorum concretioni, non modo qui in vesica & rebus, sed & fellea cystide delituerant, primam originem & causam subministrasse. Sententia, in hac ego confir-
more exemplo celeberrimi nominis Ar-

chiatri, qui cum per totum vitæ cursum abstineret ab omni sanguinis mis-
sione, per plures annos calculosa ne-
phritis laboravit, cui tandem accessit
icteria; ad quam tollendam dum pre-
scriberentur mixturæ vi aperiante &
laxante pollentes, septem per annum
calculos exclusit. Ex quibus deum id
in usum præservatorium ad dictos
morbos avertendos colligere licet,
quod venæctio in statu pléthorico ne-
glecta, ad procreandos dictos aditum,
patefacta cere possit morbos, tempestive
autem admissa, corpus ab iis vindicari
queat. Discere etiam id ex commemo-
rata morbi historia licet, plures in fel-
lea cystide calculos sine incommodo &
dolore consistere posse, modo non affe-
ctent exitum per angustos canales, quo-
rum nimia, & violenta distensio tot
gravissimorum & pene lethalium sym-
ptomatum vera & genuina causa uni-
ce evadere potest.

OBSERVATIO II.

Primarius hujus urbis civis, sexage-
simum jam quintum agens annum, Calculi
icteri & tumore hydropico laborabat.
ia hy-
dropico
& icte-
rico,
vomiti
rejecti.
His plura remediorum genera frustra opponabantur. Tandem medicus hu-
jus loci infusum corticis mediæ sambuci
ex vino, paulo largiori porrexit dosi:
inde factum, ut a medicamento &
vomitiones & alvi dejectiones strenue
concitarentur, & quod valde erat nota-
bile, per ipsum vomitum successive
numero viginti lapides ex flavo viridis
coloris, diversæ magnitudinis, valde la-
tæ superficie, figuræ tam quinquangu-
laris quam angulosæ, drachmam vel
unam & dimidiā pondérantes, quo-
rum ego adhuc aliquot in rarithecio
meo recondo, rejecti fuerunt; idque si-
ne præcedentibus lateris dextri tormi-
nibus. Cessavit inde quidem icterus
sed remansit tumor hydropicus, qui
etiam augmentum sumens, laboran-
tem e vita sustulit.

Epicrisis.

Id maxime præfato in casu mæmorabile atque consideratione dignum videtur, quod sine atroci dolore præcedente, ex tam angusto nervo canali, qualis est cysticus, tot numero lapides tam insignis magnitudinis & figura potuerint propelli. Ego itaque in hanc deveni meditationem vel potius conjecturam, quod in ipsis duodenii flexura ejusmodi lapides a bile crassiori & terrestriori successive concrescere & progigni potuerint. Nam quod in ipsis intestinis, præsertim ubi in flexuram abeunt, varia formæ & magnitudinis calculi ex præterlabentibus humoribus apponi & compingi possint, id non pauca a fide dignis auctoribus memoria exempla restatum faciunt. Neque prætereunda hanc in rem est animadversione dignissima observatio, quam Cel. LUC. SCHROECKIUS. M. N. C. Dec. I. ann. 9. inferuit, ita se habens: mulier annorum septuaginta quinque de ventris turribus, flatibus, ac aliis pathematisibus hypochondriacis saepius conquerens, respiratione subinde, ad suffocationis metum subsequentibus animi deliquis suppressa, ita ut de vita ejus actum esse adstantes judicarent, subito in colo obtusos persentiebat dolores, sensim adeo incrementales, ac intestinum rectum lancinantes, ut præ atrociate doloris disrupturam ani pertimesceret, donec tandem calculum valido conatu, divaricatis cruribus stando deponeret, ponderando unciam cum draconis duabus, color erat castalinus eleganter levigatus & potius ex cinereo flavescens variegatus, ex lamellis aliorum calculorum more sensim concrescentibus constans: interna substantia meros ostendebat circulos striis intersectos; indicio haud obscuro, cum facies intestinale esse indurata. Periunet hoc quoque similis observatio FERNELII quam lib. 6. t. 9. de partium morb. & symptom. prodidit, calculos in intestinico coli, cæci valvulis fuisse repertos

referens. In equis grandes lapides libram & ultra pondere æquantes, instar marmoris duros & politos, in flexuris intestini colti inferioris, Altenburgi & nuper in pago Herrn-Gosser-stadt fuisse repertos, & mihi monstratos testari plena fide possum. Ceterum de calculis in intestinis progenitis SYLVATICUS Cent. 3. Consult: 7. it. ZACUT. LUSITANUS li. 3. prax. admirand. obs. 133. haud parum luculentum testimonium exhibent. Nihilo minus non plane etiam incredibile est, in ductibus biliaris hepatis minimos felleos calculos primum posse hærere, sensim a præterlabente bile augmentum capere, & successiva horum ductuum ingenti dilatatione facta ibi diutius subsistere, donec per valida medicamenta fortiore sylloge ductum intendentia expurgentur: atque in hanc sententiam ob eam rationem deduci quispiam poterit, quod statim a rectione lapidum per vomitum isteritia sublata fuerit.

OBSERVATIO III.

Ante aliquot lustra artifex ensifaber per integrum ante obitum biennium de intolerabilibus & fixis mortibus, doloribus, ardoribus circa præcordia in dextro hypochondrio, quasi ignitos in corpore aletet carbones, conquestus est, qui rotum sape abdomen acerbissimis tormentis occupabant, cum foedo faciei colore, animique deliquio intercurrente. Post mortem ejus vesica biliaria tota erat calculis repleta: nam ultra sexaginta sex grana, partim pisa, partim globulos referentia, bilis coagulata & lapidescentis continebat. Circumiacentes vero partes, præsertim intestinum colon, necnon pars duodenii cum pyloro, item ventriculi fundus foedo flavo colore tinctæ conspiciabantur, earum tunica exteriori corroso,

Epicrisis.

Sævi dolores & tormenta, quæ circa hepatis regionem in detro hypochondrio fixam sedem habent, non tam a calculo quā potius ipsa bile, per poros, cum non liberum habeat exitum, transudante, & partes circumiacentes arrodēte. Legi meretur de hac re STALPARTIUS van deer WIEL cent. 2. obs. 47. qui in avertis infantum cadaveribus, ventris doloribus, nausea, vomitu, febre ac convulsionibus necnon cardialgia correptorum ventriculum non intrinsecus sed & extrinsecus bilis flavo colore infectum se reperiisse, fidem facit.

OBSERVATIO IV.

Sevissimi dolo resin by poc hon drio de xtro ab amuvecilia. Aliquot abhinc annis requirebat a me consilium honesta femina quadriginta, & aliquot annorum, quæ a multo inde tempore pathematibus hystericis cum suffocatione junctis erat obnoxia, quandoque etiam incidebat in icterum recidivantem modo longiori modo breviori tempore perseverantem, sub lauto vietu, otio quoque maximam vitæ partem transigebat: vacuationes mensium, & haemorrhoidum quibus subiecta erat, parcus & non statim tempore procedebant, corpusque ingravescere subito, & ex improviso coepit. Intolerabilem in dextro latere & sub costis spuriis persentiebat dolorem cum nausea, vomendi conatu, vehementi praecordiorum anxietate, spirandique ad suffocationem difficultate: circa scrobiculum cordis persistebat dolor vehementis pressorius, quietiam ad umbilicalem usque se extendebat regionem. Alitus erat obstructa, urina suppressa, pulsus cum ictu celer, & noctu levi delirio corripiebatur, summaque aderat corporis jactatio, inquietudo cum extremerum frigore: quæ cuncta, per biduum mala, & tormenta persistebant.

Supposito clystere feces instar albi græci secedebant. Datis pulveribus anodino antispasmodicis, & infuso florum chamomillæ vulgaris, partibus calidis oleo amygdalarum dulcium alteratis, & fetu emolliente in vesica suilla loco affecto apposito, remissio symptomatum sensim sensimque facta, secesserunt fæces naturali colore tinctæ, & abdominis quoque dolorifica distensio atque inflatio, leni oberto sudore interjectis aliquot diebus fuit discussa. Sedato morbi impetu per vices potio, quæ constabat ex rhabarbaro, radicibus quinque aperientibus, radice curcumæ, summitatibus centaurii minoris, agarico trochiscato, terra foliata tartari, semine foeniculi, tartaro tartarisato, & nitro purificato ex aqua summum millefolii, & vino propinata. Ita sensim magna copia crassarum biliosarum fecum fuit educta, & grisea optata virium cum tolerantia. Quasi situm a me fuit, quænam ad recidivam tam immanis dolorifici affectus præcavendum essent utilia remedia; & num instantे vere acidularum potus conveniens sit. In responso ego causam atrocis hujus doloris, & insequentiū symptomatum non quidem a lapide solido & compacto, sed amurca biliosa ductum cholodochum obdurante, & bilis ad duodenum progressum retardante reponendam esse judicavi, eam obrationem, quia mihi similes in praxi casus obtigerunt, ut ipsis calculis per se dem rejectis mox omnia gravia conqueriverunt symptomata. Ego vero potum acidularum Egranarum, præsestitum si calidæ bibantur, summe proficuum judicavi.

Epicrisis.

Male affectum in hac nobilissima agra jecur esse ibique sedem ponendam hujus subitæ, & dolorificæ affectionis, ex hisce causis judicandum censui: quia non semel sed aliquoties icterum perpessa; dein quod sub

paroxysmo alvi scybalia rejecta fuerint: tum, quod sub otiosa vita, & lauti-
ori victu, præsertim ubi vacuationes per hæmorrhoides, & menses non ri-
te succedunt, quam facile obstructio-
nes in hepatis vasis, que calculorum ge-
nerationi velificantur, fieri possunt. Et
ut ut non semper mitescente malo cal-
culi sub forma ejiciantur duri, & solidi,
succederit tamen, quod materia bilio-
sa tenax, ad concrescendum valde a-
pta, similem in obturandis ductibus ef-
fectum ac calculus verus, quando exi-
tum per angustos canales molitur pro-
ducere valet; quæ si ad cavitatem inten-
siorum delata cum reliqua vitiosorum
faburra rejiciatur, dolor conqui-
scit. Quod vero hæc affectio morbosa
comitem non habuerit icteritiam, inde
deducendum puto, quod obstructio illius
ductus non diu perseveraverit. Tandem etiam, & illud monendum
existimo, quod calculi fellei, si minoris
fuerint molis cum fecibus insensibiliter
sepius projiciantur.

OBSERVATIO V.

Dolor fixus in regione hepatis exercita materia ruphae, sedatus Aliquot ante annos, contumaci icteri-
tia, Vir amplissimus annorum 50, te-
nerioris corporis, & melancholici sic
dicti temperamenti, laborabat. Dolor
fixus erat circa jecoris regionem lanci-
natorius & pressorius. Quotiescumque
quippiam ore, sive alimentum, sive me-
dicamentum assumebat, summa circa
præcordia in sequente anxietate, vomiti-
tu mox omnia rejiciebat. Totum cor-
pus flavo feedo colore tinctum conspi-
ciebatur, facesque gryfei coloris prodi-
bant. Ego in consilium accitus, tum
ad componendum, tum ad sedandum
dolorem, & spasmodum, tum ad roboran-
dum ventriculum efficacia alias reme-
dia præscripsi, sed nihil opis tulerant.
Ex omnibus tamen arcanum dupli-
catum, minori sed repetita dosi, item li-
quorem nostrum anodynūm, ex aqua
cerasorum nigrorum exhibitum, citra-

offensam ferre poterat. Extrinsecus je-
coris regioni epitema ex vino rubro, in
quo torquebantur, herba absinthii, flo-
res sambuci, & chamomillæ vulgaris,
ac Romanæ, crebro imponebatur. In-
terdum emulsiæ ex feminis 4. frigi-
dis, amygdalis dulcibus & amaris, se-
mine papaveris albi cum aquis florum
confecta, per intervalla frequentius fuit
propinata. Ita sensim mitescebant do-
lores atque symptomata, urina instar
crassæ cerevisiæ rubra prodibat & al-
vus sponte aperiebatur, ac quod valde
nota bile erat, fæces secedebant albæ,
tophaceam, & calcaream minus solubi-
lem substantiam referentes, cujusmodi
dejectiones cum difficultate per septi-
manæ fere spatiū continuabant.
Quod naturæ beneficium, leni laxante
ex rhabarbaro, manna, & cremore tar-
tari secundavimus, subjunctis postea
medicamentis temperate balsamicis.
Ita intra mensis spatiū cura fuit feliciter
absoluta.

Epicrisis.

Nobilissimus hic tenerioris & me-
lancholicae constitutionis vir, in officio
valde laborioso, quod sedentariam vi-
tam atque ingentes mentis contentio-
nes & fatigaciones exposcebat, erat
constitutus; & quum multo jam tem-
pore ventriculi imbecillitate, & ex hac
proveniente lenta febre laborasset,
ceteris nihil proficiens, tandem a
me leni emetico hæc fuit evicta, quo
ingens vitiosæ & corruptæ bilis copia
educta. Non mirum proinde est cum
incidisse in taletum hepatis morbum. Il-
lad vero in hoc casu explicatu difficile
admodum videretur, unde copiosa illa
gypsea materia alvo exclusa prognata
fuerit, ubi sedem habuerit, & unde
ejus color albicans subortus?
Si conjectura rationali tamen lo-
cus est, crediderim in ductibus he-
paticis tam in principio hæsisse
productam ex bile terrestribus fixio-
nibus

ribus particulis referta, pinguioribus vero oleosis destituta; quæ postea ad ductum cholodochum delata, cum obstruendo memorata concitatavit sym-
promata; quandoquidem ego hac intentitate sum, multum biliosum humor-rem, ratione materiæ & ingredientium ex quibus componitur, pro corporum dispositione & maxime statu valetudinario variare, adeo ut varii generis impuritates ipsis saepius immisceantur: & ab hac causa omni procul dubio etiam, tanta ratione magnitudinis, colo-ris & consistentiæ in calculis diversi-
tas, & tam valde differens biliosi hu-
moris actio & operatio nervosis parti-
bus plus minus infesta ducenda & de-
rivanda venit. Postremo illud hoc loco inferendum putavi, epithemata ex ro-
borantibus & leniter discutientibus pa-
rata, extrinsecus regioni hepatis in i-
tero pertinaci & aliis hepatis vitiis ap-
plicata robur & tonum huic visceri conciliando egregiam opem ac leva-
men conferre: quod crebriori experien-
tia confirmatus scribo.

Jussi ego primum, decoctum radicis: curcumæ cum sale tartari & aqua pa-
ratum valde saturatum, cum cerevisia potui dari. Dein potionem laxantem ex manna unciiis duabus, tremoris tar-
tari drachma & dimidia, nitri purifica-
ti granis 12, olei amygdalarum dulcium uncia una semis paratam, mane per vi-
ces hauriendam præcepi, qua octo se-
dibus magna viscidorum & biliosorum humorum colluvies est educta. Tum regioni dolenti vesica suilla, olei calidi-
plena, ad demulcendam doloris saevi-
tiæ fuit admota. Post aliquot dies do-
lores sensim mitescabant & ægra cum sanitate in gratiam rediit. Hoc paroxysmo, mirioribus tamen symptomati-
bus stipato, aliquoties postea per annum cum affligeretur, non præstantius unquam ac in dictis remedii auxilium invenit. In terea retulit mihi ægra, quod inter excrementa saepius duri globuli pisorum instar in paroxysmo & extra eum prodirent. Ceterum Hal-
bestardium se contulit, ibique, ut in-
tellexi, valetudinaria perpetua degit.

OBSERVATIO VI.

Epicrisis.

*Acutis-
fimus
cires
hepar
dolor ex-
calculo
felleo.*

Uxor Judæi quinquagesimum, & quintum ætatis agens annum, macilen-
ta & imbecillioris naturæ, animique diurno mœrore ob calamitates do-
mesticas saepius perpeccas valde mace-
rata, colicis pariter ac cardialgicis do-
loribus saepius obnoxia, derepente a purgante assumto, in acutum & vix to-
lerabilem hepatis regioni firmius insi-
stentem incidit dolorem, intercurrenti-
bus intestinorum cum alvo ad stricta doloribus, qui per intervalla remitte-
bant & quiescebant. Accedebat septi-
mo die icterus, foedo colore totum cor-
pus perfundens. Quibus sympto-
matibus per mensem fere jactata, adeo pri-
vabatur viribus, ut morti propinquia vi-
deretur. Nil proficientibus euporistis,
& quæ ab aliis præscripta erant medi-
cis, petitus etiam a me fuit auxilium.

Fœminæ cachecticæ quam facile in-
morbos hepatis, icterum flavum & ni-
grum incident: neque mirum est huic visceri calculos ingenerari, præsertim quando non amplius tributum lunare perolvunt & mœrore afficiuntur. Ex curcumæ petendi auxilium in hoc affec-
tu permotus fui, ob historiam, quæ le-
gitur in Clave Pharmaceutica B. mei Parentis & sic audit. Cum Clariss. Do-
minus Christianus Gueinzius, meritis-
simus olim Gymnasti noster Rector p.m.
aliquando acutissimis dextri hypochondriæ doloribus usque etiam ad medico-
rum desperationem de restitutione in sa-
nitatis plenum torqueretur. Medicis re-
liquis consultantibus ultro citroque de
remedio aliquo appropriato huic affectui adhibendo, tandem D. D. BENEDI-
CTUS OHEMIUS medicus sine pa-

ri s̄ixas in p. m. semi drachmam radicis curcumae in haustu cerevisiae calide butyracea propinavit, a cuius usu elapsio biborio dolores dicti non solum remiserunt, sed & per secessum ipso salvo lapilli aliquot subluteo colore splendentes in pelvem substratæ excreti fuerunt; quos quidam medivorum ex intestinis, ego autem ex sellis folliculo secessisse iudicavi. Elapsis duodecim & circiter annis post eadem perpeccus symptomata, sed defuncto tunc laudato D. OHEMIO p.m. & nullis excretis lapillis, in quos causam mortis refero, hujus iter adiit. Potionem mannatam cum oleo amygdalarum dulcium s̄epius conducibilem ad calculos etiam renales, si ureteribus firmius inhæscunt, in vesicam promovendos deprehendi; qua non modo fæces intestinorum, sed & flatus, qui symptomata augent & iter calculorum præcludunt, bonis cum ægri rebus educuntur.

C A P. IV

De dolore & spastico iliaco.

S. I.

Evolu-
zio no-
minum **I**nter graves generis nervosi morbos, qui mentem permolesta sensatione & corpus periculosis pathematis excruciant, referendi omnino sunt sævi intestinorum dolores, inter quorum numerum primas fere tenet, qui in ileo valde teneræ & sensilis texture consistit & vulgo passio dicitur iliaca. HIPPOCRATES dolorem ilei, quia causa ibi residet, vocat: Græci chordapson sive morbum chordium appellant; quia intestinum ægrotans ad chordæ similitudinem tēditur. Dicitur Latinis volvulus, quia intestina ex parte invicem convoluta apparent in defunctionis. CORN. CELSUS tenuoris intestini morbum vocat.

S. II.

* Est dolor intestinorum tenuium acutissimus facile in inflammationem transiens, sub quo peristalticus eorum motus secundum naturam ad inferiora vergens violenter invertitur, atque in intestinis contenta atque assumta vomitu rejiciuntur & extorquentur, ac nihil, neque flatus per alvum fortiter clausam, descendere potest, gravia post se trahens, & s̄æpe funesta symptomata.

S. III.

Progressus hujus morbi una cum symptomatibus ita adornatur. *Morbi* *proces-* *sus.* Præcedunt alvi obstrunctiones, mox acuti & proceſſus. sævisitni prodeunt dolores, cum inflatione, distensione, duroque ad tactum tumore regionis umbilicalis. Alvis profus est constipata & constricta, adeo ut neque flatus nec excrements per eam transmittantur; postea superius erumpunt flatus & primum biliosa ac pituitosa materia, antecedente nausea, cræbro vomitu protruditur, spiritus est difficilis & quicquid cibi vel potionis assumitur, tametsi id intro descendat, paulo tamen post, quia transire inferius nequit, iterum vomitu redditur, fæces subrubrae, non absimiles stercoribus, cum foedo s̄æpe halitu ejiciuntur. Summa sequitur virium prostratio, calor preternaturalis, pulsus durus & contractus cum immoda sita, urina rubra est & difficulter redditur. Cum ad extrema ventum est, accedit singultus, delirium itemque nervorum distensio, sudore frigido perfunditur corpus, & atroces convulsiones ac lypothymiaæ vitæ s̄apius finem afferrunt. Ipse HIPPOCRATES lib. 3. de morbo ita exprimit volvuli generationem: resiccatur intestinum & præ inflammationis caliditate obturatur, ut neque flatus neque cibi pertranscant, sed venter durus sit, & quandoque vomant primum mucosa, dein biliosa, postremum sterlus.

S. IV.

§. IV.

*Anato-
me ilio-
rum.* Per dissectionem hoc morbo defunctorum, ileum inter se convolutum, & in una & altera parte, ubi mali sedes, inflatum ac sphacelosa putredine corruptum appetet, & supra inflammationem ilei pars magna ab hac labe libera, flatibus adeo turget, ut ipsum colon amplitudine interdum superet.

§. V.

*Ratio
formal-
lis.* Ratio formalis hujus mali consistit in inverso plane tunicarum intestinalium nervo-mu scolarum motu peristaltico, a fortiori coarctatione, angustia, & clausura in intestino ileo facta, qua nihil ad inferiora transmittitur.

§. VI.

*Causam
præbet
hernia.* Plerumque hujus miseræ ac dolorifica passionis causam præbet hernia scrotalis vel inguinalis, quando intestini ilei portio intra processus peritonei eo impellitur, ubi illi in viris ad scrotū abeunt, in feminis vero uteri ligamenta rotunda penetrant. Jam vero notum ex anatomicis est, hos processus, dum musculos abdominis perforant & transeunt, certis quafrangulis aut gradibus hanc facere penetrationem, ita ut, cum unū musculum perforarunt, intra eum & sequentem aliquantulum progrediantur, antequam alterum pro ulteriori itinere transeant: sapienti naturæ consilio, ut eo minus promte aliquid ad scrotum vel inguinalem regionem extra abdominis cavitatem prorumpat. Si vero cum violentia id fiat, ut eo ilei pars dilabatur, annulique nimium dilatentur; facile contingit, accedentibus præser-tim alijs caulis, ut pristinum locum repetere nequeat: atque sic firmius ibi in-hærescat & incarcerata sit, omnemque contentorum transitum plane impe-diat.

§. VII.

In feminis res est majoris periculi

cum processus ibi sint angustiores, & difficilis prolapsa intestini portio re-ponatur, & licet in nonnullarum ingui-nie tam exiguis tumor ut vix fabam que-quiet, protrudatur, tamen sævissimam hanc passionem invehere potest. In her-niis scrotalibus minus est periculi quo major intestinorum est prolapsus. Vi-dimus non semel sed sæpius vel tertiam intestinorum partem miro, & magno tumore in scrotum descendisse, sine ul-lo succedente passionis iliaca periculo, quia transitus contentorum commo-diis & facilius tunc fieri potest.

§. VIII.

Præter hernias, occasione huic sævo malo producendo dat frequentius intestini ilei mutuus ingressus sive in-tus suscep-tio, qua per sectionem mor-tuorum venit in conspectum. Et ut nonnulli auctores hanc plane negare & pro impossibili habere velint, contrarium tamen restant experientia & ob-servationes: inter quas attentione plane digna est Cel. PEYERI in tr. de glandulis intestinalibus relata de se-ctione fæminæ volvulo extinctæ, quæ ita habet: patescere ab domine ileum a-licubi plane constrictum atque veluti in-jecto laqueo strangulatum vidimus; ni-mirum portio ejus quatuor digitos trans-versos longa, plurimum vero contracta ac angustata intra proximæ portionis su-perioris cavitatem prorsus abscondita latebat. Simile quid a Cl. SYLVIO in praxi Med.li. 1.c. 15. descriptum est. Et talis ingressus in puella simili morbo extincta idem PEYERUS tribus di-finctis locis, præsentibus nobilissimis Medicis Hardero & Brunnero, ostendit.

§. IX.

Genesis hujus phænomeni, licet prima fronte paulo difficilior videatur; non tamen omnem conceptum genere, transcendit: nam si una portio ilei vehementer constringitur, fit ut in vicinam flatu distentam cum impe-tu intrudatur. Talis ingressus nou modo maximi doloris, sed & in-flammationis esse causa potest, quæ compres-sis, & constrictis valsis ilei una

una cum mesenterii portione exoriri debet. Dein etiam sphacelatae ejusmodi partes in sectione reperiuntur: & notabilis est casus quem LAZARUS RIVERIUS Cent.3. Obs.26. prodidit; ubi in dissecto cadavere ileum in fine suo tribus complicationibus convolutum, & quasi compactum in unam massam deprehendit, que tota sic convoluta portio gangraena erat affecta, una cum mesenterii proxima parte, reliqua intestina erant amplissima & flatibus mire distenta.

§. X.

*& que
ad id
confon-
vante.*

Ad funestum talem intestinorum ingressum qui caussam ileo præbet, plura alia implicita mala conferre possunt: & testantur diversorum Auctorum observationes, a lumbricis in ileo detentis, & dissectis cadaveribus repertis, si morsi dolores efficiant, iliacam passionem fuisse productam. HENRICUS ab HEER obs.24. p.214. puellam secuit ab epilepsia iliolum factam vermesque evomentem, in cuius ilei, circa finem, quinque complicationes vermium invenit, aliae infernae sursum repetebant, aliae supra deorsum complicabantur. Et in M.N.C. Decur.2. ann.5. obs.19. de feminis triginta annorum refertur, quod ileo correpta cum face liquida evomuerit 16. lumbricos teretes robustissimos, & animam sub frigido sudore efflaverit. In medio intestini ilei membranæ cuculli ad instar extensa videbantur, & foramen grossi magnitudine tenuissima membranula exterius tectum. Utrumque vero intestinum unius digiti longitudine, duodenum autem duorum digitorum transversorum latitudine nigrum, & gangraena corruptum visebatur. Eandem morbi causam etiam confirmare, & adstruere videtur LOMMIUS lib.2. obs. Medic. dum ait: *si ad extrema ventum est, subinde lumbrici evomuntur.*

§. XI.

Neque inter causas antecedentes, que ileum excitare possunt, atque non modo stricturem, & coartationem ipsi intestinis inferunt, eaque ad inversam peristalticā motionem irritant, excluenda sunt venena, item purgantia acriora nec non emetica, præsertim si jam labe, & vitio quodam intestina laboraverint. Ita CÆLIUS AURELIANUS, qui præter Hippocratem optime de acuto hoc tormento quod Græci ileon appellant scripsit, inter causas, venenum potum aut cibo datum nec non fungos comedentes refert. Et ALPINUS de method. pag. 313, de Guilandino memorat, quod e colica dolore a devoratis catapotiis, & hiera ad semi unciam, in ileon, quo extinctus est, inciderit. Neque nos tali in casu largiore pilularum que aloen recipiunt, usum probare possumus, utpote que post operationem non modo intestina exsiccant, sed & uberiorem sanguinis ad illa affluxum procurant, ut hinc etiam, secundum nostram observationem intestinorum in hac vel illa parte coartationes, que liberum exrementorum transitum inhibent & ad dolores colicos disponunt, efficiant.

§. XII.

Neque ex numero causarum passionis iliaceæ obturationes intestinorum præsertim tenuijum omittendæ veniunt, quas alimenta sicca, constringentia, vel humido non satis diluta excitare consuescant; inter quæ testantibus observationibus a Medicis passim notatis, frequens panis sicci, & bis cocti, spirarum, castanearumque esus, pira & poma maxime cydoniata, fructus immaturi & acerbi, in magna copia si devorentur, magnum momentum conseruent, præsertim si vita sedentaria, moeror animi, qui omne robur, & tonum ventriculo, & intestinorum canali subtrahit, vel parcus pótus, accesserint.

*Inter
causas
venena
tis.*

*Necon
que in-
testina
obtur-
vans.*

§. XIII.

*ane inter-
fina
erossa
differ-
dant.* Præterea intestina crasta a scybalis diutius retentis obstructa & obturata acerbam hanc passionem, dum nihil, quod ore assumitur, transmitunt, in generare possunt, præsertim quando ex pudore aut loci defectu, vel alia ex causa stimulus ad alvum deponendam re primitur & cohicitur. Accumulatur hinc maxima excrementorum copia, que postmodum tunicas intestinales tam violenter distendunt, ut vis earum elastica, fistulistica & expultrix plane casset atque deficiat. Hæc dum cogito, in mentem mihi venit ante aliquot annos a celebri quodam Archiatro Regio ad me facta relatio, quod nimirum Celsissimus Princeps, ex nimia cohibitione & retentione fecam, iliacus factus fuerit; in cuius post mortem dissesto corpore intestinum colon scybalis totum repletum & disruptum in una parte inventum est, atque tanta scybalorum moles deducta, quæ pondere circiter viginti libras æquavit. Neque attentione indignum est, quod HENRICUS ab HEER in obs. pag. 54. narrat, se præsente, dum ileo demortui abdomen dissecaretur, sponte intestina crepusse cunctorumque adstantium vestes insigniter commaculasse, cum impetu erumpentibus, & explosis scybalis.

§. XIV.

*ira quo-
que* Ex ceteris vero omnibus causis antecedentibus, affectus iræ, præsertim si vehementior fuerit, ad iliacam passionem producendam, & quidem facilius in iis, qui vitio quodam intestinorum laborant, aut herniosi sunt, magnam habet potentiam. Neque deficit ratio: nam ea est natura ac indeoles hujus affectus, ut nervosas maxime partes spastice convellendo operationem suam exserat, inque partibus etiam imbecillioribus, ad quas merito extra abdomen prolapsa intestini portio pertinet, quam facile, ob copiosorem sanguinis

affluxum, stagnationem & stasin, ex qua demum oritur inflammatio, producat.

§. XV.

*An ster-
cora in
vomi
queant?* Quæstio nunc occurrit curiosa actionis momenti: an nimirum, ut communis ferit sententia & veterum etiam medicorum assertio est, in nostro morbo, præsertim quæ ab incarcerateda hernia, vel a mutuo intestini ilei ingressu fit, stercora per os evomi possint? Dubitandi non levis ratio in eo posita est, quod primo per coli valvulam, qua ilei ingressus in cæcum, & colon munitus est, fæces non possint relabi & regurgitare: dein, quod nulla ratione concipi possit, quomodo per constrictam & firmiter inclusam in hernia tenuem ilei partem stercora penetrare queant. Ego quidem non in totum rejicere volo testimonium medicorum probatissimæ alias fidæi, sed tantummodo id, quod ipse in aliquot vidi & observavi subiectis hic adducere volo: videlicet rejectam quidem vomitu fuisse materiam, quæ colore subrufo, & externa specie liquidas alvinas fæces referebat: quandocunque vero ipsa rejecta & collecta materia naribus fuit excepta, nullus plane fetor vel gravis odor se prodidit, ut potius assumtarum rerum odorem habuerit, præterea & ipsa quasi ebuliens cum spuma apparuerit. Nihilo minus ego haud negaverim, quando nec ab incarcerateda hernia, nec a convolutione intestinorum, sed a sola spastica ilei stricture dolor ortus, intestina vero crassa, rectum & colon, validissima simul spastica stricture laboraverint, posse hac ratione fæces valde liquidas, & ut alii observarunt, clysteres per coli valvulam ad superiora penetrare. Ceterum hanc de stercoribus vomitu in hoc malo rejectis observationem ulteriori & accuratori medicorum animadversioni atque examini commendatam velim.

§. XVI.

S. XVI.

Prognosia. Quod attinet ad ipsam prognosin, spes salutis superest, quamdiu non adest inflammatio & elypteres in alvum recipiuntur, & redundunt, dolores quoque locum mutant, neque dolor & vomitus assidus est, sed per intervalla urgent, atque malum ab obstrictis intestinis a contentis fæcibus, enatum fuerit. Major adhuc spes est, si medicamentum ore sumtum laxans alvum perrumpens dejectionis initium facit. Si vero inflammatio jam præsens, quæ ex febre, vehementia torminum, urinæ suppressione, pulsu duro, & celeri, siti inexhausta, jaestatione corporis & summa virium prostratione atque extremorum frigore, dijudicatur, parum spei superest. Repentina vero & omnimoda doloris cessatio, summus virium lapsus cum pulsu debili, animi dejectio, fæctor oris, inflammationem abiisse in sphacelum certo denunciant. Quod restat, id sciendum est, quod grave hoc malum, si inter initia, ad avertendam inflammationem, & dolorem sopiendum congrua apponatur remedia ad duas vel tres hebdomades, antequam prorsus conquiescat, possit produci.

C U R A T I O.

S. I.

Tempus atten- Si ullo in morbo temporis momenta attendere & observare juvat, profecto dendum: in morbo iliaco sanando id necessarium esse existimo: nam is ipse tantè est vehementia, ut intra tres quandoque dies satis validum hominem, nisi cito opere succurratur, enecare possit. Quando vero quævis momenta temporis præcipiti gradu aufugunt, subinde juvandi occasionem secum arripiunt: & valet hic egregium illud HIPPOCRATIS monitum practicum, quod lib. 1. de morb. medicinam qui faciunt, graviter inculcat, his verbis; *Si unquam aliquis in ullo morbo utilitatem attulit, eam ju-*

I. Sæ tempore attulisse necesse est. Quo circa, si ullo in affectu certe in hoc diro, præcipiti & periculi plenissimo, medicus peritus statim accersendus est, cui nihil prius, nihil posterius curæ cordique sit, quam ut saevissimo dolori, qui inflammationis & mortis etiam causam præbet sufficientem, per convenientia tam interna quam externa remedia sublevando perspiciat.

§. I I.

Metho- Qui in veterum medicorum Græcorum lectione paulum versatus est, is facile deprehendet, eos sollicite & accurate admodum partium nervosarum affectus inque primis dolores, tum quod ad eorum historiam, tum ad curationem pertinet, descripsisse; non ex alia sine dubio causa, quam quod ob regionum præcalidarum, vitæ, & virtutis intemperati rationem ejusmodi morbi sæpius occurrant & opem medici requirant. Videbimus itaque quomodo & qua methodo HIPPOCRATES hujus mali curationem instruxerit & adornaverit. Describit hanc ipsum lib. 3. de morb. §. 15. Jubet hoc in affectu alvi apertione tentandam per glandem satis longam ex melle paratam, quæ anteriore parte felle taurino oblinatur, & bis ac ter submittatur; quo combusata, ut inquit, stercora circa rectum intestinum contenta educantur. Post hæc clysterem adhibendum docet. Et ulterius addit: *si minus haec opem serant, sole fabrili in ventrem indito flatus immittantur, a quo & ventre & intestini contractionem distendere oportet: dein extracto folle, clysterem applicandum, qui non ex calefactoriis, sed ex his quæ stercora dissolvunt ac colliquant parandus est, iudicet; postea obturata per spongiam sede in aquam calidam laborans confideat, continens clysteris infusum;* & addit: *si hoc infusum suscepit, & rursum dimiserit sanus evaderet.* Anecditus quæ venerandus tenet alibi scribit: *Supernum ventriculum quam citissime pur-*

gato, ac sanguinem de capite ac cubitis detrahito, ut superne alvus calefcere definat, & partes supra septum, transversum frigescit, excepto corde. Infernas autem calefacito, homine in solio aqua calida collocato, ac semper olio illito.

§. III.

CÆLIUS AURELIANUS preclarus non minus Medicinæ scriptor l.3. locut. passion. c. 17. in ilei tormento, quæ sequuntur remedia proponit agq; commendat. Per clysterem nimirum oleum calidum purum, vel aquam cum æquali parte olei dulcis & cum hybisco, per quem altheæ radicem intelligit, coctam donec aqua fuerit consumpta, ut olei pinguior natura mucilagine radieis temperetur, ano infundendam esse proponit. Vesicam quoque calidam ex oleo semiplenam, item mediocrem vaporationem pro mitigando dolore parti morbosæ applicandam juber. Præterea si hæc nihil perficiant, folliculo artis erariae inmitendum, inquit, ventum per podicum, quo distantia ventris atque intestinorum replicatis folliculis fiat: & tunc statim adhibendum clysterem probat. Detracto supradicto folliculo, podicem cum spongia deobstruendum præcipit. Ceterum hoc affectu laborantem foventum esse loco mediocriter calido atque lucido, adhibita requie cum silentio, & abstinentia cibi usque ad triduum, potum quoque parcum dandum imperat; cavendumque esse monet, ne externa & cataplasmata apponantur, quæ gravitate & pondera dolorem inferant. Nos vero curandi hanc veterum methodum non possumus improbare, sed potius laudamus, modo convenienti tempore, & ordine suscipiatur. Directa enim quam maxime est ad alvi secessum procurandum & ad strictroram intestini crassi spasticam, quæ huic obicem ponit, removendam, pariter etiam ad inflammationem in locis superioribus, a qua summum imminet vita periculum, abarcendam,

Nos ante omnia ad primam mali causam & originem in curatione administra stranda respiciendum ducimus.

§. IV.

Igitur, quando causam mali incarcera-
ta hernia præbet, quod ut pluri-
mum sit, prima & præcipua cura esse
debet, ut prius emollita intestini pro-
lapsi portio, si non sponte retrocesse-
rit, in suum locum reponatur. Quod
ut facilius ac promptius contingat, pri-
mo clysteres applicentur singulis biho-
riis, ut flatibus abdomen depleatur:
dein pinguis & oleosis pars affecta e-
rit emollienda; quo fine vesica suilla
axugia humana vel canina semiplena,
parti affectæ applicari & totum quo-
que abdomen omento ex animante ut
vitulo defumto, vel si non fuerit ad
manus, linteo mundo oleo raparum vel
lini calido immerso tegi potest. Postea
supinus æger locari debet, ventre & ab-
domine paulo eminentiori, capite vero
decliviori: & sic cruribus diductis, chi-
rurgus manu oleo amygdalarum inun-
da, intestinum scroto prolapsum,
mollis contactu & intropulsione sensim
digatorum adminicculo facta, in abdo-
men reponere tenter, ita tamen, ne
intestinum complicetur, vel ullo modo
lædatur: nisi enim tempestive reposatio
hernia fiat, sive sit in inguine, sive in
scroto, sive cruralis hernia fuerit,
quam facile inflammatio in sphacelum
definiens supervenire potest; quando
videlicet sanguis, ob coarctati & oc-
clusi ac quasi a tendinibus abdominis
strangulati ilei portionem, per vala
sanguinea compressa regredi nequit, is
restagnat atque in sphacelosam putre-
dinem abit.

§. V.

Præcedenti non posterior in hoc af-
fectu esse debet indicatio, ut atro-
ces, & intolerabiles dolores conve-
nienti medicina sopiti conquiescant.

Nam

Dolores
sedati-
di.

Nam ea est doloris vehementissimi vis
ac potentia, ut lege confortii, quod
partes nervosae inter se habent, gravia
illa symptomata, vomitus, singultus,
anxietae, affida vigilia, febris,
delirium, virium exsolutio, inquietudines,
neque minus stractura totius
canalis intestinalis usque ad inferiora
ipsumque anum, tremor quoque extre-
marum partium atq; urinæ difficultas
inde pendeant: quæ cuncta sedato do-
lore mitescere & placari solent. Ego
itaque in ejusmodi præcipiti casu cum
singulare fructu, & non sine summo
levamine nullo non tempore aquam
menthe leniter spirituosa, quæ etiam
in se leni vi anodyna gaudet, co-
chleatim singulis horis cum 10. vel
15. liquoris anodynæ mineralis, duo-
bus vel tribus laudani opati juxta
Helmontii methodum parati liquidi,
guttulis remitti porrigerem soleo. Ex-
teriorus quoque ad singultum, & vo-
mitum compescendum epigastricæ re-
gioni emplastrum ex theriacæ vete-
ris, & olei nucis moschatae expressi
æquali portione, additis oleo men-
thæ, & camphora concinnatum,
suasi imponendum. Sedato vomitu
vel etiam singultu, feliciori cum fru-
ctu & successu clementer laxantia,
ex manna, cremore tartari, amygdalarum
dulcium oleo retineri, &
operationem suam exserere possunt;
videlicet quando ex diutius retentis
excrementis in intestinalorum flexuris,
malum oritur.

*Inflam-
matio a-
vertenda
venæ se-
ctione.*

§. VI.

Neque inter medendi indicationes
neglectui haberi debet, quod inflam-
matio omnibus modis sit avertenda,
quia hæc tandem in sphacelum abit
& mortem infert: siquidem testanti-
bus id passim observationibus, nullus
facile iliacus absq; sphacelatione inte-
stinali perit, sive illa fuerit ex hernia,
sive convolutione, & mutuo intesti-
norum ingressu subnata. Ad hanc ve-
ro declinandam, præter clysteres &
externa emollientia, interneque data
anodyna, quæ dolores, spasmodorum

non modo, sed & in sequentis in-
flammationis febres egregie sedant
& demulcent, venæ fechtio magnam
vim habet; quam ipse etiam HIP-
POCRATES ad febrem sedandam,
& impedientiam *loco cit.* commen-
dat. Et CÆLIUS AURELIAN.
quoque *loco cit.* phlebotomiam ad
dolorem levandum magni facit.
Uterque auctor in cubitu eam in-
stituendam esse monet. Nos in pe-
de, in sexu præsertim sequiori,
eam utiliter celebravimus. Est vero
sanguinis missio eo magis utilis ac
necessaria, immo reiteranda, quo
major sanguinis abundantia in va-
sis deprehenditur.

§. VII.

Deinceps ad æstum febrilem, & in-
flammationem reprimendam, sicut
nunquam non nitrum depuratum om-
nia remediorum genera exsuperat, ita
etiam in hoc morbo locum invenit
commodissimum, si pro dosi 6. vel 8.
grana cum pulvere Marchionis per-
mixta, addita interdum quarta, pro
dosi, camphora grani parte, in decen-
ti vehiculo per intervalla porrigitur.
Tum quoque quam utiliter pulvis ni-
trosus antispasmodicus in emulsione
ex amygdalis dulcibus & amaris, se-
mineque papaveris albi, & aquis pa-
regoricis composita, potest exhiberi.
Exterior ad arcendam inflammatio-
nem partes dolentes, linimento,
quod ex uncia axungiae humanae, &
camphora drachma constat, debent
inungi.

§. VIII.

Postremo, si malum omnibus jam
laudatis, & expertæ virtutis remediis
resistat, nec ullo cedere modo velit,
ultimum neque contempnendum auxi-
lium in usu argenti vivi repositum est;
quo etiam ipse ego, ut in sequentibus
docebit observatio, bis feliciter usus
sum. Neque etiam ullum facile repe-
riri hoc ipso præsentius & efficacius
quando mutua intestini ilei ingre-
sus adfuerit, licebit remedium. Plures
quidem novi, qui in exhibendo hoc re-

medio valde sunt timidi, sed citra metus rationem: modo opportuno, & convenienti tempore id fiat. Sic enim RHODIUS *Observat. Medic. cent. 2. observ. 80.* testatur hydrargyri uncias 5. cum melle rosaceo solutivo haustis deploratum iliacum sanasse. Libram dimidiam mercurii vivi impune sumtam, ilico alvum exonerasse, memorat HENRICUS ab HEER in *Observat. Medicinal. p. 56.* qui plures morti vicinos hujus praesidio restituit. Quid? quod integrum ejus libram ZACUT. LUSITANUS *Pr. adm. lib. 2. observ. 35.* evidam Duci strenuissimo optimo cum eventu prescripsit. Ut taceam ejusdem libras aliquot in aqua sumtas, pluribus in iliaca passione periclitantibus, annotante PARÆO *Oper. Chirurg. lib. 20. cap. 38.* vitam servasse.

CAUTELÆ.

§. I.

MEmori sane, circa hunc affectum, mente tenendum existimo, quod purgantia validiora alterius va- vum ducendi causa exhibere maximo- pere sit insecurum; dolorum enim pariter ac spasmorum augmentum, nec non symptomatum omnium exacerbationem nunquam non inferunt. Neque clysteres etiam ex valde calidis & carminativis concinnatos in usum trahere conducibile est; multo minus interne effentiæ carminativæ stomachales vel vina medicata porrigena: quippe haec omnia ejus sunt naturæ, ut in colica quidem flatulenta, & quæ a causa frigida, ut cum veteribus loquar, oritur, levamen afferre possint; minime autem ubi morbus est acutus, & omnia in vehementi motu ac impetu constituta sunt.

§. II.

In defec- Ubi vero vires deficere incipiunt, & *et uirili-* animi deliquia imminent, temperata *anale-* analeptica omnino possunt usui, & *ptica.*

praesidio esse, quæ videlicet ex aqua cerasorum nigrorum, melissa Turcicæ, lilio convallium, menthae, cinnamomi sine vino paratae sunt; vel ipsum vinum generosum cochleatim porrigi debet.

§. III.

Si status plethoricus adest, vena se- *Ubi pla-*
tio statim instituenda, imo si opus *thora*
est reiteranda. Et plurimum quoque *vene se-*
attendenda erit docta & circumspic- *atio.*
ta observatio Clas. PASCOLII qui
Tom. 2. Oper. pag. 199. ita eleganter & prudenter scribit: *Si ad sit febris,* *si viscerum inflammationis indicia ta-*
met si imminentis, vena statim sol-
venda, in partibus potius infernis *quam supernis.* *Hinc hirudines inter-*
stino præcipue recto admotas, mirum *in modum profusse ad ileum sedan-*
dum hactenus pene semper observavi-
mus; quum sanguis, qui ex vasibus ha-
morrhoidalibus profluit, partem affe-
ciam proxime oneret.

§. IV.

Quando usus argenti vivi internus *Mercu-*
utilis ac necessarius judicatur, ipsum *rius vi-*
prius probe depurandum, lavandum, *vus rice-*
& per corium trajiciendum est; dein *depurā-*
non facile ultra libram vel dimidiam *dus.*
offerri decet, quod optime fit cum *juscule pingui;* tum, post ejus potum *in latus dextrum aliquandiu æger de-*
in latus dextrum aliquandiu æger de-
cumbere, ut eo citius ventriculi ori-
ficio dextro egrediatur, & insuper, *ficio*
si vires id permittant, corpus ambula-
tione velvectione movere debet, *de*
ut eo melius ad inferiora descendere *mo*
possit. Cavendum vero, ne inflam-
matione jamiam præsente, & viribus *de*
dejectis, hoc medicamento quis uta-
tur, ne vulgus & adstantes, si pereat *mo*
æger, ab hoc remedio, quod ab omni-
bus fere suspectum habetur, periisse *de*
sibi vane persuadeant.

§. V.

Magna vero salutis & convalescen- *Clysteres*
tiæ in miserando hoc malo spes in *profunt.*
clysteribus est posita, modo illi con-
venienti tempore & quantitate ap-
plicantur. Hi enim, si vehementi spa-
mo

mo constricta sunt intestina crassa , fi-
bras eorum crebriori injectione rela-
xatas & flaccidas reddendo , inver-
sionem peristaltici motus inhibent .
Et præstat tantummodo aquam cali-
dam cum syrupo dialtheæ *Fernelli*
permixtam non semel sed aliquoties ,
& si vires patiuntur , una die singulis
bihoris , & quidem primo statim die,
ano infundere , ut stercora etiam li-
quidiora fiant .

§. VI.

*Cel' Au-
sel circa
Topica
monitū.* Quoad prudentem topicorum usum ,
per placet mihi CÆLIL AURELIA-
NI supra jamjam citatum a nobis
monitum : qui a gravibus cataplasma-
tibus abstinentium esse docet , ne pondere & asperitate passio & dolores
increfiant . Sæpe enim tanta est ven-
tris infatio & distensio , ut nec ta-
ctum cum manu paulo validiorem
ferre æger possit .

§. VII.

*Alvofir-
miter
clausa
fatuus
confort.* Quandocunque alvus ob spasticas
stricturnas ita clausa est , ut nec sypho-
nem , multo minus follem admittere
aut recipere possit , tunc præstat forum
temperate tamen calidum applicare &
blandam ac successivam puri olei te-
pefacti injectionem subtili syphone
tentare , quo tunicae intestini recti
valde coarctati & spastmo constricti
iac ratione emollitæ , eo facilius po-
stea , majorem quantitatem humido-
rum per clystma in se recipere queant .

§. VIII.

*In decli-
natione
morbī
salanea.* Declinante & remittente morbo ,
lavacra , quæ etiam si vires ferunt pro-
circumstantiarum ratione primis mor-
bi diebus adhiberi possunt , conve-
nientissima sunt . Faciunt ad passio-
nis solutionem & ad morbosas reli-
quias fibris relaxatis facilius expellen-
das ; siquidem iis frequenter admodu-
lum & optimo consilio *Methodici* in
morborum declinatione utebantur ,
quemadmodum ex CÆLIO AURE-
LIANO videri licet .

§. IX.

*In dolorū
sævitia ,
opijata.* Ad mitigandam dolorum sævitiam ,
que fere præcipuum tot gravium sym-

ptomatum & motus inversi peritalti-
ci causam præber , minime est metuen-
dus opiatorum usus , modo fiat statim
in principio si vires adhuc integræ , si
plethora præsens soluta , & nullum
sphacelationis subfuerit indicium . De
quorum insigni usu egregia B. WE-
DELII obseratio , quam in M.N.
C. Dec. I. an. 2. obseruat. 238. commu-
nicat , legi meretur .

§. X.

*Si her-
nia re-
poni ne-
quit, ia-
ciso.* Si causa iliaci mali est hernia crura-
lis , atque ob non sperandam intestini
repositionem sphaceli & mortis peri-
culum imminet , ultimum auxilium
& spes salutis in incisione est , quæ , si
dextre a perito chirурgo , adiuncte do-
cto medico , administretur , sine omni
metu est & ex orci faucibus ægrotan-
tem eripere potest . Talem sectionem
non ita pridem in urbe celebri ; in illu-
stri femina ex iliaco affectu in summo
vitæ periculo versante , felicissime &
salutifere summa chirurgi dexteritatâ
celebratam esse intelleximus . Sed
in ejusmodi casibus , ut operatio ma-
ture , & in tempore suscipiatur , ac
antequam indicia præsentem sphace-
lum denuncient , valde necessarium
est .

§. XI.

Plurimum etiam scire refert , mai-
lum iliacum ex eorum esse numero , prefe-
renda . Novi aliquot ,
qui secunda & tertia vice recurrente
affectu demum extinti fuere , sed hi
quod bene notandum hernia labora-
runt . Ut itaque corpus a periculi
plenissima recidiva vindicetur , opus
est , ut follicula nunquam non hernia
habeatur ratio : quæ hæc est , ut be-
neficio subligaculi intus retineatur , vel
si id fieri non expedit , omni modo
& cura a frigore defendatur , & in-
ter cibos , qui inflant , ut sunt fructus
horæ , pisa , olerum separumque spe-
cies , rapæ , maxime omnium vero
quæ adstringendi & siccandi facultate
prædictæ sunt , evitentur , quo alvus
libera & mollis servetur . Cumque ex
multiplici observatione mihi compre-

tum sit, nihil praeter iram & purgantia aciora herniosos in iliaca passionem vel ejus recidivam præcipitare posse, sedula utique opera danda est, ut hæc ceu perniciofa declinentur.

ENARRATIONES MORBORUM.

OBSERVATIO I.

Dolor & Spasmus illei in Hernia sepe recurrentis. Ante 30. annos, Vir spectatæ in hac urbe auctoritatis, cognatione mihi conjunctus sexagesimum jam annum supergressus, a 20. jam annis hernia laborabat scrotali, quæ temporis progressu ita increvit, ut tercia minimum intestinorum pars, extra abdomen in scroto detineretur: si eret staret, insignis capititis magnitudinem præ se ferebat tumor, qui tamen in supino situ, relabentibus intro intestinis, minuebatur. Periculi quidem honoratissimus vir ab enormi hoc malo nihil passus est, præterquam, quod quinque vel sex ante obitum annos, tarde & parum cum succederet alvus, valde copiosos & molestos vomitus, aliquot horas perseverantes sustinere debuerit: quibus ingens copia humorum vitiosorum in intestinis collecta dejiciebatur, qui vomitus singulis sere novem vel decem diebus recurrebant, quos futuros tumor grandior & dolor pressorius in scroto indicabat. Excretione hac exanlata salvus & vegetus persistit, appetitu bono gaudens.

Epicrisis.

De hac affectus historia, hoc nostrum esto judicium, quod tantæ molis tumor intestinalis in scroto, extra periculum mali iliaci sit, quia fæces & flatus non possunt ita intercipi, ac id in hernia inguinali, crurali, vel scrotali, ubi exigua tantum intestini portio prolapsa, incarcerata & quasi strangulata a tendinibus abdominis hæret, acutissimis doloribus comitantibus, contingit. Dein nihil dubii est, quin an tam enormi intestinorum prolapsu,

non relaxatio tendinum & annularum, sed potius disruptio locum habeat: alias enim tam subito in situ supino, tota intestinorum moles intra abdomen recedere non potuisset. Tum in præfata observatione hoc insignis momenti phænomenon non erit prætereundum, quod videlicet, præcedente dolore tensivo in scroto, omnia propemodum, quæ ante tres vel quatuor dies assumta erant, quod ex colore, odore & consistentia liquefcebatur, æger evomuerit, intus remanentibus, quæ in prandio tres vel quatuor ante iusultum horas comedera. Id nostra quidem sententia ita factum esse judicamus: inversio videlicet motus peristaltici in intestino ileo, in scroto quod detinebatur, incepit, sed non per totum ventriculum penetravit, fundo ejus tantummodo affecto, minime autem arcu majori sive sacco, qui in latere sinistro est locatus.

OBSERVATIO II.

Honestus hujus urbis civis, satis *Spasmus illei ex getæ & robustæ constitutionis, anno mustiæ 30. & aliquot, ex hernia per multos annos sine offensa vel molestia in her-laboravit: neque subligaculo intus eam detinuit. Autumno ingentem quantitatatem musti babit, atque nocte, in somno frigefacto abdomen, dum evigilat, tumorem valde auctum, & dolorificum persentit, qui nolebat, ut antea, intra abdomen subire. Dolores succedebant acerbissimi per integrum diem durantes, qui non in scroto tantum partem affectam, sed abdomen, & totum corpus occupabant, eum insigni anxietate & conatu ad vomitum juncti. Anxie a me petiit auxilium, misi peritum chirurgum, ut patientem inviseret & relationem mihi faceret. Ego itaque suasi, ut tumorem inungeret axungia omenti vitulini recenti, & desuper fomentum calidum continuo applicaret,*

caret, quod ex lacte cocto cum floribus malva, verbasci, chamomilla, croco, semine anethi & cymini constabat, & blande ac modeste repositionem manu tentaret. Interne per intervalla solam aquam mentha cum aliquot grana extracti croci & julepo rofarum propinavi. Peracta repositione simul & semel, & omnes dolores & cuncta permolesta symptomata cessarunt & conquievantur.

Epicrisis :

Ex hoc jam clarissime apparet quam caute & provide se herniosi circa dextrum rerum non naturalium usum gerere & custodire debeant, cum levis etiam error funesti affectus causam & originem subministrare possit. Deinceps & hoc notari licet, quod solus acerbus dolor, qui partim nimia ilei intra scrotum detenti dilatatione, partim etiam ejus intra annulos tendinum strictura & arctatione fit, tam gravium symptomatum, quæ iliacum malum formant, & quæ saepe numero lethalia evadunt, vera & genuina causa censenda sit.

OBSERVATIO III.

Dolor & spasmos. Honesta fœmina, uxor gravissimi in urbe consnlis, cognatione mihi propria ex pinqua, annorum 40. in sterili vivens uvis co menses, in her nios a, ram, in regione inguinali longo abhinc mercurio tempore correpta; in vinea ex uvis ni mium comeditis, & sub celo frigido ac humido refrigerata, persentit mox tumorem duriorum, gravesque & acutos in eo dolores, qui noctu ingravecebant. In confilium accersitus cum jam per biduum nihil per alvum se dejecisse affirmaret; prima statim cura fuit, ut alvus per clystieres iterata vice intus aperiretur, & tam per externa quam interna remedia dolorum levamen as feretur. Secesserunt quidem excre-

menta sed non adeo sufficienti copia: perseverarunt tamen dolores, qui abdomen occupabant & somnum pariter ac appetitum tollebant: nec quicquam fomentis, cataplasmatibus balneisque proficiuntibus, tumore duro, & dolorifico permanente. Nil igitur aliud agendum duxi, quam ut inflammationi verendæ perquam exitiosæ occurrem: quapropter venam in pede secandam curavi. Interne vero pulvrem Marchionis leniter nitrosum ex aqua appropriata mentha videlicet & cerasorum nigrorum parva & reiterata dosi obtuli. Aestus quidem non adeo intensus erat, ruftationes tamen singultosæ & ad vomendum conamina permanerunt. Tertio ab invasione die copiose infestabant, precedente anxietate, vomitiones, & quidem materia, tam subrufo colore quam spumescientia, liquidas, quæ alvo dejiciuntur, fæces referentes, conquerente etiam fœmina de malo odore. Eiusmodi vomitus per tres sere continuabant dies; quibus ingens corruptorum humorum illuvies fuit protrusa. Ego re paulo curatius pensirata, materiam stercoram non habendam esse, ut adstantes volebant, judicavi, ob nimiam ejectorum quantitatem, quæ in intestinis crassioribus non poterat colligi, cum liquidorum defecitus, ob incarceratedam ilei portionem prorsus esset interceptus. Cum vero & alvi confitatio, & ventris tortima & vomitiones & vigilæ assidue, vires in dies magis deicerent, & prætentaneum levamen usque eo usurpata remedia non adserrent, veni in hanc cogitationem, anne argentum vivum intro haustum possit in hoc casu opportunum habere locum? Ego, cum mendendi hæ ratio plane extraordinaria & plurimis suspecta sit, nolui solus hoc experimentum facere: ideoque petii, ut medicus, quem obcandorem semper estimavi, adveniretur. Ille cum meas perciperet rationes, idem sentiit, assenserens, quod sine o-

mni periculo id fieri & forsan desideratissimo cum successu possit. Mane itaque, dato prius pingui juscule libram dimidiā rite depurgati argenti vivi uno haustu sumendam porrexiimus, de super bibendum brodium carnis cum aliquot uncis olei amygdalarum dulcium. Promte ægra assumfis. Post horam, leniorem per conclave deambulationem suasimus. A medicamento sumto omnis prorsus desistebat vomendi conatus, & horas quinque post, in lecto, præter opinionem, alvus solvebatur. Linteis inspectis apparebat mucida grysei coloris materia multis argenti vivi globulis intermixis, qui diligenter collecti, unciam præter propter æquabant. Ex quo factum est, ut afflictionum omnium fere, quibus ante angebatur, facta fuerit remissio. Alvum semel sponte dejectam postea clysteribus demulcentibus & emollientibus, paucostimulo saline addito, eluere & crassa intestina purgare constituimus: interne quoque laxans rhabararinum & mannatum cum cremore tartari ex vino dedimus. Ita insignis copia progressu temporis materia excrementitiae, permixta nunquam non portione argenti vivi, fecerit, idque ultra duas fere hebdomades. Ex quo per DEI gratiam evenit, ut periculo ægrotans foemina meliusculè semper habens ex orci quasi fauibus hoc remedio erepta fuerit. Ultimo vero loco id non prætereundum esse censeo, quod, collectis licet viribus somnoque ac appetitu redeunte, tremorem in artibus, atque vacillationem & impotentiam in pedibus ultramensis adhuc spatium percepit: quæ permolestæ affectiones, dextro nihilominus balneorum usu prorsus deum sublatæ & discussæ fuerunt.

Epicrisis.

Ex hujus morbi & curationis progressu, id demum in usum practicum depromere licet, quod passio ilaca acutia alias periculi atque exitii, oppor-

tune datis medicamentis, quæ inflammationem arcent, & dolores mitigan, in affectum quasi chronicum minoris periculi possit converti. Deinceps non contemnendum in hoc atrocimalo, sed potius incomparabilem usum & efficaciam argenti vivi esse, ex hac curatione intelligi & ediscipotest, licet modus operandi non adeo explicatu facilis sit. Ego tamen ita rem concipio: argentum vivum, intro haustum, dum fundum ventriculi petit, pondere suo resistit ejus subversioni, sive inversæ ejus motioni peristalticæ, ut potius meo quidem judicio, eam ad inferiora, facta in contrarium compressione, rursus dirigat atque convertat: & hinc etiam ratio reddi poterit, quare globuli plumbi paulo majoris molis intus deglutiti, ad curandum hunc difficillimum affectum commendentur; de cuius remedii salutari usu quamvis multa mihi relatæ fuerint, nunquam tamen me experimentum fecisse ingenue fateor. Tandem hoc addendum esse existimavi, quod dejectiones illæ spumascentes liquidæ & biliolæ, quarum materia partim per continuum humoris biliosi & lymphatici per glandulas in intestina secreti affluxum, in ileo, progressu temporis colligitur, non modo a vulgo, sed etiam a medicis pro veris stercoribus habeatur; licet in totum negare nolim, per vehementiorem intestini coli spasmodum quippiam ex eo putridi liquaminis ad tenuia descendere & ibi contenta inquinare possit.

OBSERVATIO IV.

Infans puer, unius anni, lac ad-
huc ex mammis fugens, ex terrore
nutricis, continuo ejulatu ac clamore noctem insomnem degebatur, abs-
que dubio ventris tormentibus, quæ rovenus
parca alvus & viridescentes atque coagulatae fæces denunciabant, per rotulæ dies & noctes imo ultra excru-
Taffio
ilaca
in in-
fante
ex ter-
roris &
dato au-
minis
cia.

citatus. Medicus ordinarius, cum ex clysterum applicatione & usu pulveris laxantis nullum conspiceret levamen, duo auri fulminantis grana cum pulvere absorbente permixta præbere decrevit. Inde vero nihil secutum levaminis, ut potius sub majori alvi clausura, vomitus & quidem viridescentes infecuti fuerint; quibus demum convulsiones epilepticae ungebantur & mors. Concessa a parentibus ad perpetuum meum, abdominis apertione, cui etiam medicus ordinarius interfuit, ostendimus in medio ileo, mutuum ad articulum digiti, intestini ingressum. Supra quem tenuia intestina ileon, jejunum, imo ventriculus, in quo subviridescens putridus humor inventus, flatibus valde erant turgida.

Epicrisis.

Graves & ut plurimum funestæ, quæ per animi affectus inque primis terrorem, a nutribus in infantes derivantur, sunt afflictiones. Horum enim ea est indoles, ut pernicialem vim, maxime in intestina tamquam partes valde nervosas exerant, quarum tonum & motum penitus subvertendo & pene infringendo, ventris tormenta, alvi constipationem, convulsiones & epilepsiam quam facile accersunt. Quibus infantum morbis ordinario fere dejectiones virides conjunguntur, non aliam ob rationem, quam quod retenuta excrementa acidam corrosivam ob moram induant naturam, ut bilis permixta inde viridem colorem, non secus ac fieri solet, quando spiritus nitri cum bile miscetur, contrahant. Ut vero aurum fulminans vel mercurialis prosapiaz medicamentum, ab admixtis salibus valde corrodentem & virulentam indolem acquirit, ita summopere cavendum est, ne infantibus tenerioribus, præfertim si acrum humorum copia obfessa sunt intestina, ejusmodi medicamenta porrigitur. Illa involutio,

quæ in conspectum venit ilei intestini, ab atrocibus torminibus, & spasticis intestinorum contortionibus abique omni fuit dubio oborta.

OBSERVATIO V.

Honoratior fœmina, quadraginta & aliquot annorum, animi in affectus valde proni, corporis gracilioris, vitam sine motu amans quietam, venæctionem ab aliis quot annis, circa tempora æquinoctialis consuetam, vere præteriti anni intermisit, purgans vero insulm, quo post sanguinis missionem circa hæc etiam tempora subinde fuerat us, per tres dies usurpavit. Interea vehementiori commovetur ira affectu, quam inappetentia, virium languor, ac artuum tremor sequebatur; alvus quamvis esset obstructa, nihilominus ad eam exonerandam erga sapientis sollicitabatur. Mox acerbas in regione hypogastrica dolores, & tormina, cum præcordiorum angustia & crebra flatum per os eructatione, persentiebat. Ego accessus, ad alvum referandam, clysterem ordinavi emollientem, cuius tantum levis portio fuit admissa. Interne ad flatum discutiendos, liquorem meum mineralem anodynum cum essentia corticum aurantiorum bene præparata æquali miscui pondere, & per intervalla præbui. Externe linteum aqua Reginæ Hungariæ & balsamo nostro vita ebrium abdomini applicari jubebam. Sedatis doloribus ægra quievit & cenavit; clausa vero permanit alvus. Sequenti ego die rursus vocatus sum, & tum dolores patiebatur prioribus longe acutiores & sæviora tormenta, cum ingenti abdominalis inflatione, umbilici retractione, extremorum frigore & continuo ad vomendum conatu. Tum mihi aperiebat, quod ex laborioso partu, ante multos jam annos, in inguine sinistro contraxerit tumorem, qui sine singulari sa-

Dolore
& spasti-
fœmina
ilei in
fœmina
plethora
æqua &
hernio.
Ira ex
temen-
tia.

sitatis incommodo modo prodiret modo regrediretur; nunc vero longe major & valde durus sine regressu persisteret. Et quoniam nobilissima patiens omnia, quæ ore assumserat, vomitu reddebat, iliacum malum imminere non sine ratione judicavi. Prima itaque & princeps, cum statum animadverterem plethoricum, fuit initio, inflammationem, qua nihil sane in hoc affectu est perniciosius, avertire. Ad aliquot igitur uncias sanguinem e venâ pedis detrahi jussi. Dein ad alvum ante omnia referandam medendi consilium direxi: sed quoniam ob firmam clausuram, clysterem non admitteret, decrevi ut successive leni syphunculo aliquot uncias olei raparum & chamomillæ cocti immitterentur, quo postea intestino recto relaxato, eo facilius clysteres infundi possint; quod etiam consecuti sumus, & duo applicati fuerunt, sed nihil educabant. Igitur quum præfatae afflictiones, vomitus, singultus, inquietudo, vigilia, anxietas cum extremorum frigore persisterent; visum mihi fuit, singulis bioriis, clysterem ex sola ptifana, oleo olivarum & syrupo dialtheæ FERNELII infundere & ad potum aquam fontanam puram frigidam, aqua mentha correctam, cuius libræ salis ablynthii drachmam unam & succi citri unciam semis adjeci, commendare: abdomine cum limento ex axungia humana, camphora, spermate ceri, & oleo hyoscyami, quod constabat, calide inuncto. Post sex clysteres injectos, flatus secesserunt copiosi: quibus continuatis, in balneum aquæ dulcis ægram dimitti jubebam. Paulo post egressa, alvum intra horam ter deponebat. Continuatum fuit balneum, & interne infusum mannatum cum aqua foenculi, addito cremore tartari & nitro antimoniat propinatum: ita ingens mucidæ, crassæ & liquidæ biliosæ materiæ copia alvo fuit educta. Sequebatur hinc statim singulorum pathematum remissio, largusque sudor

cum virium, & pulsus augmento; quem promovere, exhibita mixtura sudorifera, ex tinctura antimonii, liquore anodynō minerali & spiritu tartari composita, studui. Sic per molesta hæc affectio, Divinæ benignitatis adjutorio, feliciter fuit depulsa.

Epicrisis.

Ex præfata historia id animadvertere licet, herniam, quanquam per longum tempus sine valetudinis incommodo geri possit, nunquam tam tam tutam, sed formidandam esse. Hoc in casu ad iliaci morbi genesin, plethoricus status, assumptum purgans & demum superveniens gravis iræ affectus symbolum suum contulerunt: utpote quæ omnia nervæ intestinorum substantiæ sunt insensissima, naturalem & placidum fibram intestinalium versus inferiora tendentem motum pervertendo, & invertendo: quod ex flatuum & excrementorum pertinaci intra intestina retentione & inde pullulantibus ceteris symptomatibus judicandum est. Sanguinis missio, quam tantopere ceu summum hujus effectus medium veteres, ut HIPPOCRATES, CORNELIUS CELSUS & CÆLIUS AURELIANUS, laudarunt, in hoc casu summe proficia ac necelsaria fuit. Quoniam vero ob spasmum vehementem, intra intestina crassa consistentem, superiora summo cum dolore inflantur, rationi utique consentaneum est, hanc strictroram tollere: quod omnium optime fieri potest, per oleosa humida in magna copia injecta, ut strictæ inde fibræ flaccidæ & relaxatae evadant. Placuit mihi præ ceteris cura, quam CELSUS Lib. 4. cap. 13. his verbis proponit. *Si dolor non quiescit, etiam in alvum, ex parte inferiore, tres aut quatuor cynthos calidi olei dare convenit.* Et balnei usum HIPPOCRATES ad feli- cem

cem curam mirifice commendat . Cura ab soluta primarium quod huic foeminae consilium dedi , fuit , ut exquisitam semper habeat vita & virtus rationem , atque ab omni animi affectu se temperet : multiplici enim experientia edoctus sum , his neglectis , malum quam promte recidivare ; id quod præter HIPPOCRATEM ipse CELSUS loco citato notavit : facile , inquit , id malum redire consuevit , & cum frigus subit , sive aliqua jactatio , nisi bene jam confirmatis intestinis , revertitur .

OBSERVATIO VI.

Iliaco
pazzo ex
ingluvie
& sumto
valido
purgan-
te. Berolini cum olim agerem , vit in Regis servitiis constitutus , quadraginta & ultra annorum , gracilioris corporis habitus & naturæ cholericæ , ingenti semper gaudebat appetitu & variis generis edulii ventrem quotidie infarciebat , nec jejunii patiens , venum liberalius quoque hauriebat ; alvus ordinario pigra erat & obstructa ; vomitus subinde pituitosi liquaminis matutino præsertim tempore experiebatur . Posteaquam in solennitate quadam , supra modum , placentas , carnes assatas , acetaria , condita mala cydonia devorasset , & alvus per aliquot dies clausa nihil egestisset , male habuit . Venter enim durus , reniens , rugitibus & borborygmis hinc inde discurrentibus turgidus erat , atque continua ad vomendum aderat proclivitas . Opera medicastri usus pilulas ad alvum aperiendam sumfit purgantes ; sed sine successu . Augebantur potius anxietates circa præcordia cum continua nausea . Rursus ab eodem sumfit pulverem purgantem , qui tamen nullam movebat sedem , sed decumbens omnia quæ assumserat ore rejiciebat . Suppositoria & clystères omni effectu carebant . Uxor vehementer & anxie a me petiit consilium . Ego accedens ægrum per decem dies nihil per alvum emisisse deprehendi , Venter contactu erat durus ,

inflatus , & magna inquietudo atque anxietas , vigilia quoque affligebant . Bono vero cum DEO hac methodo miser patiens est sanatus . Primum ad vomitionem componendam prescripti mixturam Riverianam , quæ componitur , ex aquæ communis libra , succi citri uncia & salis absinthii drachma , quam per vices assumbit . Dein ægrum chirurgo commisi , cui injanxi , ut clystères ex decocto emolliente , in quo sufficiens saponis Veneti quantitas soluta , singulis horis anno infundaret , & postea in balneum ex herbis emollientibus & semine lini paratum ægrum dimitteret . Ventri quoque applicare linimentum ex oleis expressis , atque interne , cum juscule , oleum amygdalarum dulcium , addito pauillo vini , præbere iussi : quæ cura alternis vicibus aliquoties fuit repetita , adeo felici cum successu , sit brevi temporis progressu ingens copia facium congregatarum durissimarum & pituitæ glutinosæ , quibus postea successerunt liquidiores , multis sedibus intra duos dies fuerit educta ; quam excretionem , semel aperta alvo , serilactis potu per vices sumto , in cuius mensura tremoris tartari uncia dimidia & manna eleætæ uncia tres solutæ erant , promovendam decrevi : & ita per DEI gratiam a gravi malo æger fuit liberatus .

Epicrisis .

A sola diutina faciem alvinarum retentione , iliacum morbum subnasci posse , præsenti edocemur historia ; ex qua animadvertere etiam licet , tali in casu purgantibus præsertim validioribus intro summis nihil esse perniciiosius , utpote quæ frustra plane dantur , cum summo potius detrimento : nam dum fortiter stimulando intestina , materiam immobilem & facies aridas per inferiora movere & deturbare nequeunt , invertendo potius peristalticum intestinalem motum , malum reddunt deterius , atque anxietates & vomitus augent . Balnea vero temperata , dura externe , & cly-

clysteres interne, fibras tensas emolliunt, faeces dissolvunt & colliquant, non omissis internis congruis laxantibus, convenientissimum praebent auxilium; quia ipsam causam & originem mali expugnandi efficaciam satis præstabilem possident.

OBSERVATIO VII.

Tasso iliaca ex vermis funesta. Puer septem annorum spongiosioris habitus & coloris albidioris, dulcibus & fructibus horæs nimium usus, carnes ac panem supra modum appetens, qui aliquot ante menses unum vel alterum alvo dimiserat lumbricum, in termina ventris, alvi obstruktionem & inquietudinem insidebat. Erulstra applicati clysteres, & data fuerunt carminativa atque laxantia; augebantur potius cruciatus, assidui accedebant vomitus, & interdum per horam semi-mortuus in syncope miser infans jacebat. Fœdos ex ore halitus & faeces reddidit: subsequebantur singultus & epilepsia, tandem mors.

Epicrisis.

Minime dubitandum est, affectum hunc fuisse iliacum, a lumbricis vel in intestino vel ventriculo residentibus subortum. Ut vero hi arro-dendo & lacinando tunicas teneriorum intestinorum nerveas, graves in universo nervorum systemate concitant passiones: ita etiam motum intestinorum peristalticum penitus subvertendi utique sufficienti vi facultate pollent. Verique omnino simillimum est, lumbricos in ventriculo existentes hujus mali exitialis causam fuisse. Incidit mihi in confirmationem hujus rei historia, quam ex relatione BEATI MEIBOMII habeo: Helmstadii studiosus, ante aliquot annos, supra umbilicum ferro vulneratus, continuo vomere coepit primum cibos, diu materiam steroris instar; sub finem secundi diei mortuus est. Vulnerata quidem intestina arbitrabatur Medicus,

sed lectio facta plane ostendebat, ventriculum antrorsum & retrosum esse laetum, tam late penetrante vulnere. Ex quo discimus, laetum ventriculo, salvis intestinis, totum posse intestinorum canalem inverti; nihil juvantibus suppositoriis & clysteribus. Alias in tali affectu, aqua cum mercurio vivo puro decocta, addita vini quarta parte, remedium nescio præstantius: hac enim & necantur vermes & alvus solvit, sed tempestive, antequam ventriculi & intestinorum tunicae sint laceratae, debet exhiberi.

CAPUT V.

De intestinorum doloribus, atque in specie, de colica flatulenta & spasmatica.

Theses Pathologicae.

§. I.

In ter graves generis nervosi afflictiones, non immerito referri debent vehementes dolores, qui intestina seu partes valde nervosas & sensiles motuque propulsorio præditas obsident, atque per consensum alias etiam nervosi generis partes, in locis remotioribus consistentes, afficiendo, pernitosas subinde afflictiones pariunt.

§. II.

Quemadmodum tenuia & crassa intestina, ratione texturæ, capacitatis, functionis & situs differunt: ita etiam dolores, prout in iis sedem suam figunt, ratione vehementiarum periculi & aliorum accendentium effectuum differunt.

§. III.

Observamus longe acerbiores & acutiores oboriri dolores in tenuioribus quam in crassis: id quod luculenter validiora purgantia & venena causticæ indolis testatum faciunt,

ciunt, cum termina supra & infra umbilicum atque in medio etiam hujus compareant sevissima. Et hanc ob causam ab HIPPOCRATE in genere omnes intestinorum dolores, iliaci denominantur; nulla facta in monumentis suis doloris colici mentione: quum nostro tempore omnes fere qui intestina obsident dolores, colici dicantur atque habeantur.

§. IV.

Rectius itaque iliaci censendi erunt illi, qui medium graviter affligunt ventrem, sive spasmodice illum constringendo, sive vehementer inflando; quum contra colici illi obtineant, qui in hypochondrio dextro & sinistro haerent, & pressione ac distensione ingentes creant molestias. HOLLERIUS de morb. intern. cap. 39. ita coli dolorem descriptis: *insistit in certo loco instar infixi pali;* subinde tamen vagus ad inguina, sinistrum & utrumque renem, sursum aliquando revolvitur, & locum mutat, ut sunt flexus intestini coli, quod relicto recto in sinistrum inguen divertit. Ascendit inde ad sinistrum renem ubi angustius est, quo angustia & simul ibi occurrentis flexura, causa est, ut bac in parte dolor sit intensior. Hinc ad splenem laxius intenditur, subitque hepar, atque aliquando in cystide fellis haeret; postremo in dextrum ileon descendit, ubi definit in cæcum.

§. V.

Nos omnem intestinorum tractum pro subiecto & sede dolorum agnoscimus, ita tamen, ut una ejus parte graviter affecta, totus nervosus canalis a fauibus ad podicem trahatur in consensum, sive rectius præternaturales motiones imo inversiones & lasciones motus peristaltici, reliquis omnibus communacentur, adeo ut si vehementior causa fuerit, etiam totum universi corporis systema nervosum gravius simul afficiatur.

*Quinam
dicantur
iliaci?
qui colici?*

§. VI.

Affectiones & symptomata acerbiora, quæ intestini jejuni, ilei, coli, vel recti, ut apparet in hemorroidibus cœcis, dolores comitantur vel subsequuntur, a spastico partium nervosarum quam maxime oriuntur & sunt sequentia: horror, tremor partium externarum, sudor frigidus, vitium omnium prostratio, inquietudo, corporis jactatio, summa anxietas & interna angustia, singultus, vomitus, alvus constipata, tenesmus, urinæ suppressio, spasmodus vesicæ, febris, pulsus contractus, spirandi difficultas, quandoque delirium & convulsiones epilepticæ.

§. VII.

Sicut ratio formalis sive proxima causa omnis doloris est nimis vehementis tunicarum & partium nervosarum distensio, distractio atque expansio, vel earundem validior & spasmodica constrictio & coartatio: ita etiam ab iisdem causis intestinorum proficitur dolor. Vel enim a flatibus retentis & occlusis, supra modum certi intestinorum tractus distenduntur & divelluntur, ut quasi continui solutionem moliantur; vel ab humore mordaci caustico intra intestina vel etiam in eorum substantia membranacea contento, spasmodica constrictione crispantur, coartantur, cum valde molesta & sensibili passione: quae de cœla etiam in scholis medicis distinctio inter dolorem intestinorum, sive colicam flatulentam & spasmodicam, adhuc viget & locum obtinet.

§. VIII.

In dolore tenuum flatulento, *Distin-*
cio colicæ
cespoxu-
tenta.
& tanta saepius flatuum vis est, ut cutem ita distendat, ut dolor ipso tactu exacerbetur: neque exempla deficiunt, a vehementia flatuum herniam umbilicalem fuisse subortam. Dolores sunt acuti, alvus valde

de constipata, summa angustia, si-
que simul ventriculus inflatur, re-
spiratio valde difficilis evadit, &
eructationes cum levi levamine sub-
sequuntur; accedunt cardialgicæ
passiones & inanes vomendi cona-
tus.

*a colica
spasmo-
dica.*

In colica sic dicta spasmodica &
convulsiva, ventris arctior fit com-
pressio & umbilici introrsum retrac-
cio, alvus est constipatissima, ut
neque fatus transmittat, neque cly-
sterem facile recipiat. Adest simul
ingens in lumbis dolor, ipsumque
peritoneum muscularique abdominis
violenter contrahuntur: extremo-
rum adest refrigeratio, tremor,
horror, pulsus durus & contractus,
summa anxietas & quam facile
animi deliquium supervenit.

§. X.

*discrimen
interflatu-
& colicæ
flatulen-
sam.* Nos hoc loco monendum duci-
mus, insignem esse differentiam in-
ter flatulentiam intestinorum, &
dolorem intestinorum flatulentum.
Nam hic a sola atonia, motu &
robore intestinorum labefactato, in
senibus potissimum & qui cibis in-
flantibus frigidis nimium utuntur,
item in corporibus a prægresso
morbo labefactatis nascitur. Illa
vero nunquam sine labore intestinorum
est, neque tam facile tollitur, &
graviora habet accidentia, cum hic
per ructus, per fatus & alvi solu-
tionem facile terminetur.

§. XI.

*inter do-
lorem ne-
phriti-
cum &
confundendum
causal
colicum.* Illud quoque monitum non est
prætereundum, dolorem nephriti-
cum & qui a calculo renalifit, non
cum & confundendum esse cum eo cuius
causa in ipsis intestinis residet: de
qua confusione jam olim a GALE-
NO & ejus asseclis instituta fuit
querela. Utut vero ratione sympto-
matum & effectuum multum inter
se convenient; in eo tamen est dif-
ferentia posita, quod dolor, si est
a calculo, in lumbis fixior, perti-
nacior & acutior sit quam in colica

spastmodica; in hac alvus longe con-
stipatior & fortius occlusa ac in do-
lore nephritico: dein quod, alvo
per enema soluta, remissio doloris
colici fiat, quod non contingit in
nephritide calculosa: ad urinam
quoque emittendam major in cal-
culo adest stimulus, eaque tenuis,
in paroxysmo aquosa & subinde
arenosa appetet. Et postremo, do-
lor secundum ureterum tractum suc-
cessive protenditur: id quod in intes-
tinorum non observatur doloribus.
Longe vero facilius est in iis
qui semel vel bis dolore ex calculo
laborarunt, notas ejus characteri-
sticas discernere.

§. XII.

*Causa
efficiens
in alia
parte ac
dolente
habet.* In theoria vero dolorum intes-
tinorum id maxime attendendum ve-
nit, quod horum causa, a qua oriun-
tur, longe aliam sedem fixam ha-
beat, quam ubi eorum exacerbatio
percipitur. Ita nonquam fit inflatio
intestini, nisi in alia parte vel tra-
etu, cujusdam intestini strictura spa-
stica, angustia vel etiam obstruc-
tio ab excrementis aut alio humore te-
naci præcedat vel conjuncta sit: si-
quidem fatus in intestinorum cana-
le, propter calorem & humorem
aqueum semper præsentem, nun-
quam desunt, sed nullam creant
molestiam, quia liberum habent spa-
tium & aequaliter se expandere pos-
sunt; simul ac vero obice posito,
non possunt transmitti, & interci-
piuntur, sed in certo loco coacer-
vantur, occluduntur & quasi incar-
cerantur, tunc magna vi expansiva
agunt in intestinorum tunicas, eas
supra modum distendendo & di-
strahendo.

§. XIII.

Quandocunque in tenuioris intes-
tini quadam parte, sicut in hernia
scrotali, vel etiam a vermis aut
fæcibus induratis evenit, spasmus,
occlusio vel nimia coartatio produ-
citur, vel etiam quando in princi-
pio coli in dextro latere excremen-
torum

*Quid
fiat, si
tenuis
spasmo
afficien-
tur.*

torum copia stagnat, nec loco moveatur, ingens & acerbe dolorifica abdominis inflatio, supra, infra umbilicum & in medio ejus, oritur.

§. XIV.

si rectum inferior colic tractus vehementem patitur spasmodum, mire inflatur coli magna flexura in sinistro hypochondrio versus splenem, una cum illo, qui infra ventriculum tractus protenditur & juxta hepar positus est. Quando autem, quod frequentius in malo sic dicto hypochondriaco & hysterico occurrit, principium jejuni, vel finis duodeni spastice afficitur, ob vicinum & supra illud recurrentem ramum superiorem mesentericum & intercostalem, ingens in lumbis oritur dolor, ipsumque duodenum & ventriculus flatibus mire implentur, dia phragmatis quoque liber motus impeditur; unde ingens illa præcordiorum anxietas, spirandique angustia, & ructus cum impetu, frequenter & fere sine fine, erumpunt. Non semel ego sed aliquoties observavi in colica spastmodica inferiorem coli partem funis instar contortam & convolutam, tenuem vero intestinum ad crassitatem brachii expansum fuisse reportum.

§. XV.

Colice subiectu. Intestinorum dolores adeo frequentes sunt, ut nulla ætas, nullus sexus, nullus corporis habitus & nullum temperamentum ab iis sit immune. Infectant autem quam maxime infantes, foeminas, atque etiam senes, & quicunque anterioris, debilioris, & sensibilioris sunt naturæ.

§. XVI.

Causa & colice flatulenta. Acerbæ & tormentosæ hæc intestino generatio rum affectiones diversi generis agnoscent causas, & pro harum differenti natura, genio & vehementia, variant symptomata, variat etiam & inten ditur subinde periculum. Frequentissimam vero alvi scybalia retenta & indurata, in intestinis crassis, inter dum in tenuioribus hærentia, cau Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

sam præbent. Atque multum hoc cruditatum acido-viscidarum copia, cibi sicceti, aridi, adstringentes, diuturnior somnus & vitæ genus motus ac laboris expers contribuant. Et quandocunque sub pigra & obstructa alvo, cibi dulces, fermentescibiles, carnes pingues præsertim vervecinæ, cum potu frigido, vel refrigerationes pedum atque abdominis accedunt, inflatio abdominis intenditur & dolor acerbior fit. Atque in eo colicæ potissimum flatulentæ, & quæ veteribus a causa frigida producita dicitur, ratio & genius versatur: cuius generatio & crebra invasio imbecillitatem & atoniam intestinorum eorumque toni ac roboris deflectionem indicat atque supponit; hinc obesis, phlegmaticis, senibus & debilibus admodum familiaris est, præsertim si frigus improvide ad pedes, dorsum & ventrem admittatur.

§. XVII.

Alia colicæ species est biliosa, quæ *bilio* secundum veteres, a causa calida subnascitur, atque ab humore bilioso, acri, corrupto, in intestinis tenuibus præsertim duodeno copiosius collecto & stagnante ortum suum trahit, a gravi frequentius ira, præsertim in corporibus calidæ & siccæ constitutio nis, sub æstate servida & æstate juvenili, vel virili, aut ab assumptis potibus nimis spirituosis & calidis proficiuntur, majorique tormentorum, post frigidum sumtum potum vel transpirationem prohibitam, se se prodit saevitia. Symptomata quæ hanc insequuntur potissima sunt vox rauca, cardialgia, continuum ciborum fastidium, vomitus materiae biliosæ porraceæ, singultus, intemperies æstuosa & febriculosa, inquietudo, sitis intensa, os amari cans, urina pauca & rufa, cui quandoque alvi dejectio biliosa & crebra succedit.

§. XVIII.

Datur quoque valde atrox & tor

in infan-
tibus la-
bilibus. minosus intestinorum dolor in infantibus, a lacte stagnante per miscelam bilis valde corrupto & corrosivo redito, unde fæces plerumque sedent virides, paucæ & coagulatæ & ab arrosione tunicarum intestinalium subinde convulsiones epilepticae lethiferae tragœdiæ ludunt.

§. XIX.

in pueris. Pueris valde familiaris & frequens est colica, quæ fit a vermis si convoluti in intestino ileo hærent, cui sèpe febris continua & syncope, ventrissque lancinatio ac si terebra perforatur, jungitur. Qualia exempla, apud ZACUT. LUSITANUM Prax. admir. Lib. 2. obs. 33. & HILDANUM cent. 1. obser. 57. legi atque conferri posunt.

§. XX.

in puer-
peris. Neque puerperæ ab immanibus abdominis doloribus immunes degunt, præfertim quando lochiorum fluxus deficit, & post partum abdomen non decenter ligatur, vel partium ventris accedit refrigeratio.

§. XXI.

Hypochon-
driacos
sepe ve-
xat. Frequentissimum etiam hypochondriacorum symptoma est atrox colicus dolor, isque maxime occupat latera, vel in dextro hypochondrio infra sub osse ilei, ubi principium coli flatibus & stercoibus infarctum est, vel sub hepate in flexura quam colon facit flatibus vel scybalis distenta, maxime omnium vero in sinistro hypochondrio sub diaphragmate & liene, ob maximam coli flexuram, tensivus consilfit, cum alvi obstipatione, urinæ difficultate, anxietate, angustia, interna inquietudine, viriumque dejectione junctus. Nam, quia in sic dicto hypochondriaco morbo valde lassus & vitiatus est intestinorum peristalticus motus, nec slatus, nec stercora versus inferiora rite moventur & descendunt; hinc in flexuris maxime intestinorum, ubi diminuta est vix motrix contractilis & elastica, illa morantur, stagnant, & graves ac

dolorificas ejusmodi distensiones par- riunt.

§. XXII.

Alia adhuc ratio & natura est eo. Colicæ spasmæ dica a sero acri intratu- nicas hærente, sero videlicet impuro & acri. Et talis in corporibus scorbuticis ac purpura scorbutica vel scabie infectis, in arthriticis quoque & podagrīcīs sèpe numero observatur; quando vitiosa materia, deficiente naturæ labore, retinetur, nec ad extremas partes transmittitur, vel etiam ab iisdem, ob varias externas causas, intra corpus per metastasis transponitur. Et hæc species colicæ spasmodis maxime se exerens, ad spasmodico-convulsivam spectat & lava conjuncta habet symptomata, difficilis etiam est curationis, ac inflammationem minatur, neque facile conquiescit, nisi relegata materia ad extimas partes fuerit.

§. XXIII.

Neque prætereunda erit gravior & identidem spasmodico-convulsiva *a sanc-*
guine. colica, a nonnullis sanguinea vocari solita, a sanguine nimium intra intestinorum, coll præfertim tunicas congesto, stagnante & sensiles nervas tunicas valde distendente. Et hæc fieri solet in foeminis a mensium fluxu suppresso: tunc hysterica vocatur, vel etiam a consueto hemorrhoidum fluxu deficiente, vel violenter cohibito aut suppresso: tunc recte dici solet hemorrhoidalis. Quæ sicut sèpius in praxi occurrit, ita etiam ejus causa medicis ut plurimum incognita est. Hac sapissime homines boni, robusti & sanguinei, habitus eufarci, qui laetus & liberius, submeri præfertim potu, degunt, otiosam colentes vitam, afficiuntur. Cujus colicæ sanguineæ multa exempla & observationes Doctissimus CAROLUS PISO in egregio tractatu de morbis e colluvie serosa oriundis: vide Section. 4. cap. 2. posteritati reliquit.

§. XXIV.

§. XXIV.

Colica saturni- Immanis quoque est illa colicæ spasmodicæ species, quæ a fumis saturninis, ore haustis & cum saliva deglutitis ortum suum dicit, atque iis qui mineras Saturni igne tractant & calcinant, vel plumbum ab argento in docimasticis furnis separant, ut in Hercinia sit, familiarissima est, vulgo dicitur *die Hütten-Ratze*. Dolor est in intestinis intolerabilis, alvus constipatisima, nec clysteribus neque laxantibus facile cedit, umbilici fit introrsum retractio, summa adeat inquietudo & artuum tractio, nausea & assiduus ad vomendum conatus, in paresin vel veram paralysin vel asthma spasmodicum quam facile terminatur, ac diu & misere sepius ægrotantes torquet. Ejusdem generis dolori, figuli qui vasa sigillina vitro ex plumbo obducunt, vulgo glasiren, obnoxii sunt. Testantur quoque observationes practicæ, quod medicamenta quæ Saturnus ingreditur, ut tinctura antiphthisica Garmani vel magisterium Saturni, quibus Medicastri in gonorrhœa supprimenda frequentius uti solent, invincibilem alvi stricturem cum immannibus tormentis stipatam relinquant. Quam gravia & periculosa valetudinis damna atque incommoda, a vinis acidis lythargyrio immisso dulcificatis, ante aliquot annos in Suevia oborta fuerint, id exquisite & docte in Dissertatione, Præside Clas. ZELLE-RO habita, de noxa vini lithargyrio mangonisati, est deductum. Inde enim non modo dolores stomachi, abdominalis, sinistri hypochondrii cum forti alvi stricture, item colica convulsiva, sed & asthma convulsivum oborta fuere.

§. XXV.

*Colica endemica-
Spasmo-
tisca* Restat adhuc alia colicæ species, quæ rectius endemica vocari potest, quia certis regionibus familiaris admodum est: ita Moraviæ, Austriae, atque Hungariae incolæ atrocissimo colico dolore spasmodico, & convul-

sivo creberrime divexantur. Cujus rei nulla mihi alia suppetit ratio ac causa, quam vinorum in hisce regionibus valde spirituorum largior potus & abusus, præsertim si corporis accedat refrigeratio; ex quo fit, ut sanguis nimium ebulliens, & in concitatorem motum adactus, si neque per naturalem, neque per artificiale evacuationem invenerit exitum, in intestina incumbat & ibi accumulatus dira symptomata inferat. Cæterum hæc quoque jure referri ad colicam sanguineam & spasmodicam meretur.

§. XXVI.

Dantur etiam atroces colici dolores, qui alios morbos prægressos excipiunt: ita extant passim observationes, & nota mili quoque sunt exempla, ubi ex diarrœa ab adstringentibus cito suppressa, item post dylentriam, ab incauta diæta, & alimentis inflantibus & fermentescibilibus copiose admissis, graves & exitiales ventris dolores successerunt. A cydoniato largiori manu in diarrœa exhibito, sævissimos ventris dolores atque torsiones, ad stercoris usque vomitiones lethales vidit FERNE-LIUS lib.6. Pathol. cap.10. quod idem a fortioribus purgantibus haud raro observavimus. Neque iis qui in artis exercitio frequentius versantur, obscurum esse poterit, post intermitentes, tertianam, quartanam, perperam curatas, prava præsertim diæta accidente, sævissima subinde in abdomen secuta fuisse tormenta: testante illud BINNINGERO cent.3. obser. 34. cent. 4. obser. 41. item libr. 4. obser. 8. & 9. quibus submovendis non tam facilis conceditur locus; si quidem in modo memoratis morbis ingentem labem & vitium jam contraxit intestinorum canalis, ejusque functio, quæ maxima ex parte, a convenienti, ordinata & successiva constrictione & dilatatione, sive peristaltica motione dependet, adeo laesa ac labefactata est, ut dein multo faciliter vitiisorum humorum colluvies-

*Colica
ex mor-
bis pre-
gressis.*

ibi consistere, & causam ejusmodi & aliorum pravorum affectuum possit subministrare.

§. XXVII.

Symptomatica. Porro colica spasmodica, frequens *ac calculo*, imo assiduum fere aliorum affectuum & dolorum esse solet symptoma: sic nihil frequentius contingit, quam quod dolori, ex calculo renum per ureteres descendente & ad vesicam iter faciente, gravis saepius abdominis cruciatus, cardialgia, nausea & vomitio adjungatur: idque maxime fit ob consensum harum partium, quam nervus intercostalis hinc communis praestat. Qua de causa nonnulli medicorum colicum dolorem cum calculoso saepe confundere, nec rite discernere solent: cuius jam supra facta mentio. Observamus quoque in praxi, a dentitione infantum dolorifica, convulsivam colicam cum alvi forti adstringione, quam demum epilepsia sequitur, subortam; idque tantum ob mirificum illum nervosarum partium cum aliis consensum.

§. XXVIII.

A biliario calculo, in cystide fellea *a calculo* detento, ejus ductum lancingante, ventris dolorem subortum, praeter alia, defunctorum dissectiones testatum fecerunt. Ita in colicorum caderibus vesicam felleam lapidibus refertam **BALLONIUS** lib. 2. epidem. pag. 253. item M. N. C. ann. 4. & 7. obseru. 220. fidem faciunt. Et **HORSTIUS** libr. 4. obseru. 47. colicam gravissimam, 233- calculorum mediocris magnitudinis e folliculo fellis refectione sedata meminuit. Quo loco non possum non peculiarem doloris colici causam insinuare, quam **Clar. NICOL. TULPIUS** disertis verbis in observat. lib. 2. cap. 37. prodidit, ita habentibus: *Colicus dolor saepissime fit a bile flava, innatante huic intestino, que saepius ab anatomicis cum animadvertisatur, verisimile est eam transfudare paulatim per tunicas folliculi fellis, huic intestino*

quam aliis vicinioris. Qua propter male sibi consulunt illi, qui praenitio studio validius comprimunt jejunum: exprimit quippe prona hec flexi corporis incurvatio bilem.

§. XXIX.

Neque absolum sed verisimile potius videtur, ab acri humore tunicas *ab erosio-* *ne inta.* *intestinales externe arrodentes, dolorum externa.* res in toto intestinorum volumine concitari posse. Quam sententiam clariorem faciunt observationes, quibus per sectionem defunctorum constat, ex abscessu mesenteriirupto, purulentam materiam intestinis inhaescentem ante mortem sanguinos dolores & tormenta produxisse. Quales **WILLISIUS**, **BENIVENIUS**, & **WARTHONUS** scriptis suis passim insinuantur.

§. XXX.

Præter dolores autem intestinorum, qui acutioris sunt indolis & vel *colica chronica.* in salutem vel in mortem brevi terminantur, dantur etiam chronicæ qui sunt generis, & diutius insistunt, ac per multas hebdomades imo per anni aliquando spatiū excruciant, licet per intervalla suas habeant remissiones & exacerbationes. Horum post mortem demum fuit inventa causa, quæ in eo constitit, quod in quadam parte intestinum fortiter angustatum, constrictum, scirrhosum vel callosum fuerit deprehensum: quare in totum motus intestinorum æqualis destruitur. Ita **KERCKRINGERIUS** Spicileg. Anatom. Observat. 50. in puerο tormentis intestinorum qui obierat, cuncta flatu distensa, pylorum vero adeo exiguo foramine pervium vidit, ut flatum vix transmitteret; duodeni vero atque recti parietes subsidentes, conglutinatos & quasi filo constrictos, ut nullus flatus ea perrumpere potuerit, invenit. Scirrum coli **HOLLERIUS** de morb. inter Libr. 1. cap. 41. & **RHODIUS** centur. 2. observat. 76. describuit. A callo quo-

quoque in intestinis colicam produc-
tam BENIVENIUS consperxit :
vid. Lib. 5. de addit. cap. 30. & 34. In-
testinorum vero coalitum post dysen-
teriam RHODIUS cent. 2. observ. 77.
item 82. annotavit ; de qua re BAR-
THOLINUS centur. 6. obser. 38. &
obser. 2. it. M.N.C. ann. 1672. conferri
possunt. Angustati quoque intestini
& cartilagine obducti meminit BAL-
LONIUS epidem. Lib. 1. p. 58. Præter-
ea de angustia intestinorum , perdocta
dissertatio Clarij. WALTHERI Lip-
sienium Prof. lectu dignissima est. Sæ-
pius quoque in sectionibus cadaverum
colica spasmodica demortuorum implica-
tio omenti observatur , manife-
sto documento , vigore etiam in hoc
motum quandam spasticum . Ab he-
pate male affecto abdominis dolores
chronicos obortos non raro vidimus .
ita ut illud albicans induratum fuerit
inventum , & cystis fellea calcalis re-
pelta . Quandocunque enim liberior
sanguinis per hepar transitus impedi-
tur , a biliosis sordibus non bene depu-
ratur , & impetus quoque ejus ad in-
testina ruit ; ubi ob copiam & nimiam
distensionem vasorum tardius progre-
diens , stagnationes dolorificas in in-
testinorum membranis efficit .

§. XXXI.

*Anatome colica de-
functorum.* Ceterum , qui subito ex acuto inte-
stinorum dolore pereunt , in iis ple-
rumque intestina inflammata & sphacelosa reperiuntur . Ita SPIGELIUS in libr. de Semiteriana , in dissectis
hac febre extinctorum cadaveribus , qui ante immuni dolore quasi colico
fuerant excruciat , intestina inflam-
mata & erysipelatosa detexit : & ad-
jicit , his in casibus phlebotomiam
omittere & purgationem , ut vulgus
solet , substituere nefas esse . Sphacelatum quoque intestinum rectum , ab
hemorrhoidibus cœcis male curatis ,
nos vidimus .

§. XXXII.

*Quando dolores
salutariter sol-
lent.* Salutariter vero sæpe numero ho-
rum dolorum solvi solet atrocias , per-
venerunt . sudorem copiose obortum , veletiam

Hoffm. System. T. IV. P. II.

per hemorrhagiam narum , aut ha-
morrhoidum fluxum supervenientem ,
item per expulsionem purpuræ ad ex-
tinmas partes , aut per arthritidem &
podagram succendentem , vel macula-
rum scorbuticarum proventum . Cre-
bra enim & per quam notatu digna-
hinc inde reperiuntur exempla , ubi ex
arthritide repulsa factæ fuerunt perti-
naces colicæ , qua redeunte ubi illæ
cessarunt . Sic colicæ sæpius biliosæ
diarrhæa superveniente solvuntur , qua
putrida & nigra materia evacuatur .
Spectat hoc quoque insignis locus apud
HIPPOCRATEM libr. de hum. §. II.
cui intestinum in dextra parte dolebat
& articulare morbo corruptus , quietior
erat . Neque parum salutis promitti-
tur , si dolores locum atque sedem
mutaverint .

§. XXXIII.

Minus salutariter , colicæ iaprimis Quando
spasmodicæ & convulsivæ , viribus minus
plane dejectis & dissipatis , ac sudore , saluta-
colliquativo suberto , vel in veram rite
paralysin vel in notham sive parelin , termi-
vel in manuum & pedum stuporem natur-
terminantur ; vel etiam si atrocior
dolor urget , epilepsia , convulsiones ,
vel aliæ graves capitatis affectiones , ut
lethargus , carus , apoplexia finem
vitæ faciunt . Multum vero periculi
alit colica sive convulsiva sive biliosa ,
quæ cum actuali invadit horrore &
atrocis affligit : nam designat inflam-
mationem , quam , si non succurra-
mus , sphacelus excipit .

CURATIO CUM METHODO
MEDENDI.

§. I.

Sicut ex antecedentibus plenius Medendi
perspicere ac animadvertere licet , methodo-
caulas dirum hunc affectum exci-
tantates mirum variare : ita nunc
differentia causa-
identidem colligi poterit , medendi duis , pro
methodum , pro differentia causa-
rum quæ intestinorum dolores fo-
vent , longe aliam atque aliam esse
instituendam .

§. II.

Quid a- Quando itaque consueto hæmorrhoidum vel mensium fluxu suppresso, *gen-* in corporibus præsertim fanguine *gen-* abundantibus, immanis abdomen in- *critico* festat dolor, cum gravi æstu ac pulsū *suppresso* citatiore junctus, venæ sectio in pede *dolor.* instituta, clysmata emollientia, pul- veres antispasmodici leniter nitrosi & cinnabarinī momento castorei remix- ti, nec non liquor nostræ anodynus mineralis, additis essentia castorei & spiritu salis ammoniaci vinosi, ne- que minus pediluvia, dolorum sævi- tiam mirifice mitigando, omne cu- rationis in ipso paroxysmo absolvunt punctum. Extra vero illud tempus, & præservationis gratia laboran- dum est, ut mensium in fœminis & hæmorrhoidum in viris solennis re- stituatur fluxio; quo maxime om- nium faciunt conveniens acidularum, thermarum, balneorumque vernali cum primis tempore suscep- tus usus, præter hunc, pediluvia, motus & exercitatio corporis débito modo in- stituta, diæta commoda, pilulae bal- famicæ, atque infusa theiformia ex herbis partim carminativis, par- tim uterinis composita erunt adhi- benda.

§. III.

Stabile Quando dolor intestinorum a co- *copiosa* pia bilis efferae & causticæ suam mu- *caustica.* tuatur causam & originem, eadem prope præcedente §. memorata reme- dia proficiunt. Palmam vero inter alia, pulvis nitrosus, una vel altera gutta olei millefolii veri destillati commixtus, ex aqua florum chamo- millæ vulgaris unciis 3. vel 4. propi- natus, quæ gratior adhuc & virtute præstantior redditur, adjectione sy- rupi papaveris albi & spiritus nitri dulcis rite præparati, jore sibi vindicat: sicut autem hæc aqua, in omni abdominis dolore vehiculum reme- diorum præber convehientissimum; ita multo felicius operationem suam exerit, si ejus destillatio cum cerevi- sia triticea instituatur. Præstat quo-

que in hac colicæ specie medica men- ta in vehiculo subfrigido quam calido exhibere, & abstinere a decoctis & infusis calidioribus pariter a regimi- ne sudorifero & balneis calidis: eo quod hac ratione biliosus ferocior redi- dit humor, & partes nervosas inti- mius penetrat. Hinc observationi- bus practicis edocemur, hujusmodi in casu, solum aqua frigidæ potum, quo ipse GALENUS in colica biliosa usus est, oprime profuisse atque ma- lum depulisse. Majorem autem hoc monitum attentionem meretur, si ex ira suscitata fuerit terminosa affectio.

§. IV.

Si a fla- Si fixus & tensivus in dextro vel si- *tibus vel* nistro hypochondrio vel infra ventri- *excre-* culum hæserit dolor, certum indi- *mentis* cium est, flatus vel excrementsa coli *incar-* flexoris incarcerata hanc scenam lu- *dare.* Tunc præcipuum curationis in eo possum est momentum, ut enemata emolliendi, discutiendi & roborandi virtute prædicta injiciantur; non omissis externis linimentis car- minativis & emollientibus, parti do- lenti applicandis. Aperta sic alvo, flatibusque discussis atque propulsis, pilulae nostræ balsamicæ ad Becheri exemplar compositæ, interposito sale digestivo, vel decocto manna- to, cremore vel terra foliata tarta- ri, & uno vel altero cochleare oleo amygdalarum dulcium permix- to, porrigi debent.

§. V.

Si a spa- Ubi rectum & intestini coli portio, *ticæ re-* in sinistro præsertim latere, fortiori *ti &* spastica stricturna afficitur, ita ut al- *coli stric-* vus nec flatui nec excrementsis exi- *turn* concedat, neque clyster commo- *di* dano immitti queat; tunc totum abdomen oleis calidis & pinguibus fo- vendum est; v.g. oleo chamoillæ, anethi, ruta, coctis, pinguedine taxi, canis, vulpis, castorei, hu- *mana,* quæ etiam per clysterem ad spasticam illam stricturnam relaxan- *dam* anno infundi possunt: quo facto, *in*

infusum mannatum, quod supra memoravimus, erit offerendum.

§. VI.

*In colica flatulenta ex atonia & imbecillitate ventriculi & intestinorum, a cibis crudis male digestis & inflantibus, enata, carminativa & paulo calidiora admittit, quorum censem subeunt aquæ carminativæ spirituosa, ex semine cymini & carvi, corticibus aurantiorum, floribus chamomillæ vulgaris & Romanæ ac cardamomo cum vino destillatæ, essentia carminativa B. Wedelii, essentia corticum aurantiorum probe saturata, spiritu salis ammoniaci exaltrata, liquor anodynus mineralis cum balsamo nostro liquido, quod vitæ audit, permixtus, vel sequens liquor carminativus: Recipe spiritus nitri dulcis vel liquoris nostræ anodynæ mineralis, essentiæ corticum aurantiorum, tincturæ tartari ana drachmas 3. spiritus salis ammoniaci drachmam, olei carvi destillati; cymini, de cedro, chamomillæ vulgari destillati, singulorum guttas 6. M. D. Dosis constituunt guttae 30. ad 50. Haustus insuper vini sic dicti *Hippocratici* ex speciebus aromaticis, v. g. corticibus aurantiorum, citri, macere, caryophyllis, cardamomo & saccharo parati, fenibus prælertim & ubi ex refrigeratione abdominis & externarum partium malum traxit originem, insigne & præsentaneum solet levamen præbere. Perutile quoque est, abdominis regionem tegulis & marmoribus calidis, item sacculis avena, sale communi, tostis, semine carvi, milii, baccis lauri atque juniperi repletis, subinde fovere.*

§. VII.

*quid, si
a mate-
ria retro-
pulsa,
esta.* Dolores abdominis, ubi a retro-pulsa materia exanthematica, vel excretione critica, scabie, purpura, podagra, arthritide, rheumatismo, erysipelate proficiuntur, nihil aliud agere prudens & rebus suis satagens medicus debet, quam ut leniter dia-phoresin promovere studeat; id quod

ego nonnunquam, essentia scordii probe saturata cum spiritu florum sambuci non intense rectificato extracta, liquori anodynæ nostro ad dimidiam partem admixta, si ad guttas triginta vel quadraginta in infuso calido bis de die propinatur, felicissime perfici: circa lecti vero introitum pulverem meum bezoardicum, pauxillo nitri & cinnabaris mixtum, adjecta suci recentis portione in idoneo vehiculo obtuli; non prætermisis emollientibus & demolcentibus clysteribus, atque corporis in blanda diaphoresi constitutione.

§. VIII.

Quando ex vermis intestinorum *Si a ver-*
mibus. dolor in junioribus oboritur, ad dolorem sopiendum primo decoctum ex emollientibus & paregoricis, floribus videlicet sambuci, chamomillæ vulgaris, meliloti, verbasci, semine foeni graci, anethi, anisi, croco, & lacte paratum, vel vesicæ suilla inclusum, vel linteis exceptum abdomini applicari potest. Dein clysteres ex iisdem speciebus in usum frequentiorem ducendi sunt, qui etiam ex lacte recenter multo parandi. Interne vero tinctura rhabarbari & tanaceti, que herba vere specificum est anthelminticum, alvis sollicitanda, & quandoque aquæ cum mercurio vivo coctæ usus est interpolandus. Non raro contingit, ut hac ratione vermium glomera, que intestina obfessorant & angustarant, ejiciantur, sedatis & placatis mox omnibus symptomatis & gravissimis abdominalis tormentis.

§. IX.

Neque prætereundus est acerrimus *Si ab ha-*
ille & prope intolerabilis dolor, qui morboi-
dibus
cœcicis. intestini recti tunicae nerveæ exquisitissimæ sensationis subinde insidet & universi fere corporis partes in consensu trahit, a sanguine hæmorrhoidalí minima vascula obsidente ortum ducens, cœcarum hæmorrhoidum nomine notus: is enim peculia,

re curationis genus expostulat. Venam tunc ego non in pede, sed in brachio secari præcipio, ad meliorum sanguinis a partibus inferioribus ad superiores derivationem. Exterius vero duo remedia expertissimæ virtutis deprehendi, quorum alterum est linimentum, quod ex drachmis tribus spermatis ceti, olei hyoscyami drachma, camphoræ granis 6. & croci granis 10. constat, quo calide intungi tumores debent; alterum est epithema, quod ex aqua calcis vivæ, cum aqua roscarum & florum sambuci temperata, saturni faccharo & spiritu vini camphorato compositum, linteis tepide applicandum.

§. X.

Colica sa- In immani illa colica sic dicta satur-
turnina vere convulsivo-spasmodica, que metallurgos afflictum & immanner excruciare solet, non inveni-
auratio tur præstantius præservativum, quam mane sumtum juscum pingue: in ipsa vero cura clysteres mere oleosi item oleum amygdalarum dulcium in copia haustum, cum vel sine decocto mannato, omne exhauriunt punctum. Ad paresin vero sanandam balnea aquæ dulcis, & post eorum usum, inunctio spinæ dorsi & abdominis cum linimento, quod habet axungiam humanam, oleum nucisæ expressum, hyoscyami, crocum & oleum rorismarini, vix datur præsentius & certius auxilium.

Cautela & observationes clinicae.

§. I.

In colica In spasmodico & convulsivo in-
spasmo- testinorum & abdominis dolore,
dia pur- ubi alvus firmissime est clausa, ca-
gantia ne pejus & angue acris purgantia,
puranda & ex iisdem quoque parata clys-
mata sunt vitanda. Novimus, hac ratione inflammationem & mortem suisse productam.

§. II.

Ad alvum longo temporis inter. *Clysteres* vallo clausam, si excrementis & *plus una* scybalis induratis referta sunt inter-*vico injic-* stina, referandam, non sufficit una clysteris injectio, sed duos vel tres intra horæ sèpius spatium injicere oportet.

§. III.

Aliquando accidit, ut induratum *Recto du-* & compactum excrementum inte-*ris feci-* stinum rectum occupans, flatuum *bus ob-* ac scybalorum exitum penitus im-*secco, fo-* pediat. Tunc fotibus emollientibus *tus con-* feruntur. *Fotibus* fowenda anus, & suppositoriis pin-*guibus* & salinis stimulanda alvus, nec non uncia aliquot olei lini vel raparum cum decocto emolliente, in quo prius sufficiens saponis *Vene-* neti portio soluta, ut durities scy-*balorum* emolliatur, per syphonem immittendæ.

§. IV.

Solus tabaci fumus per accom-*Fumus* modatam syringam immissus, ad *tabaci* aperiendam alvum, omnia fere *quid* alia remediorum genera, testantibus id observationibus, fausto suo effectu superare creditur, utut ego certa de singulari ejus efficacia pro-*mettere* nequeam. Id vero scio, quod experimentum hoc in equis ad alvum valide adstrictam aperien-*dam* maximè sit virtutis. Novi etiam homines quosdam plebejos a-*troci* intestinorum dolore vexatos, fumi tabacini sola deglutitione, ab omnibus cruciatibus in instanti suis-*fe* liberatos.

§. V.

In omni graviori intestinorum dolore, antequam alvus fuerit so-*luta*, calidiora carminativa & su-*dorifera*, balnea quoque nocentissi-*ma* sunt. Nam, dum materiam biliosam vel corrosivam invehunt sanguini nec ad partes exteriores præcipitant, anxieties augentur, & paralyses, contracturæ, febres hecticæ imo convulsiones epilepticae haud raro inducuntur.

§. VI.

§. VI.

*Opiata
in Seni-
bus ex-
ulens.*

In senibus & imbecillis corporibus, si infestantur dolore abdominis opiate magis adhuc narcotica penitus exulent item quando acerbiores dolores diutius perseverantes vires admodum fregerunt. Quod etiam tenendum erit, si ex summa debilitate, nimiis sudoribus corpora perfunduntur: paralysin enim tam veram quam spuriam inde suscitata fuisse, vel etiam sphacelum internarum partium inde productum fuisse meminimus.

§. VII.

*Ubipro-
fins*

Nihilominus in hypochondriacis & hysterica passione detentis, vel ubi simul affligit ferina tussis, cum gravibus abdominis doloribus & erosionibus, pilulae balsamicæ nostræ, vel aloephangiæ extracto panchymagogo *Croelliæ* acuatæ, uno vel altero grano laudani opati rite parati vel theriacæ cœlestis adjecto, interpositis pulveribus nitroso-falinis & absorbentibus, insigne dolorum & spasmodorum levamentum afferunt. Ita pilulas purgantes cum refracta dosi laudani opati mixtas, multi celebres medici, nominatim RIVERIUS, POTERIUS, CRANIUS, HOLLERIUS & FORESTUS mirifice in abdominis doloribus deprædictant. Neque deficit ratio urytote remittente dolore & spasio, purgantis operatio longe promptior & felicior factum alvinarum dejectio sequitur.

§. VIII.

*Colica
periodi-
ca quo-
modo
tractan-
da.*

Si atrox intestinorum dolor, certo temporis spatio recurrat: quod plures mensibus Martio, & Octobri contingit, flante & sanguiente maxime Borea vento, probabile est ejus causam sanguinem intra intestinorum tunicas congestum esse, quia sub tali tempestate ob regurgitanti sanguinem, ejus in fedis venis sit accumulatio. Qua de causa venæ sectio in pede, ad hæmorrhoidum flu-

xum, si natura ejus fuerit assueta, promovendum, præservationis gratia, commodissime instituitur. Sin vero quis critica hujus sanguinis excretionis fuerit expers, consultius ego semper deprehendi, brachii venam secare, quo sanguis a partibus inferioribus deriveatur ad superiores, cum, si non invenit exitum per hæmorrhoides, major, per crebras sectiones in pede administratas ad partes inferiores fiat impetus atque affluxus.

§. IX.

Hypochondriaci, & hæmorrhoidarii flatulentis ac ventriculi & intestino- rum doloribus perpetuo fere exercentur. Si itaque malum in veteratum neque domesticis, neque e pharmacia petitis obtemperare vult remediis; ego sane nec præsentius nec efficacius, nisi in thermarum *Carolinarum*, vel aquarum mineralium temperatarum ut *Selteranarum*, imo *Embsenium*, convenienti interno & *Tæplicensum* exterioro per balnea usu, unquam deprehendi auxilium; præprimis, si decente & fat frequenti motu & exercitio corporis secundetur, diæta quoque selectæ habeatur ratio.

§. X.

Puerperis intestinorum & lumborum dolores sunt familiarissimi, præfertim si lochia non debito modo, quantitate ac tempore procedunt, ex quibus postea doloribus febres exanthematicæ, quæ si ingravescunt puerperam tollere consilicunt, oriuntur. Qua de re circumspetus eo animam advertere debet medicus, ut convenienti methodo horum dolorum fævitiam componat; quod optime fit, sanguinis lochialis promotione, qui si medicaminibus morem gerere recuset, venæ sectio in pede tutissime celebratur, post quam statim sæpe numero prodeunt lochia, & dolores penitus sopiaunt: quod crebra me docuit experientia.

M.

Methodus Praeservatoria.

Qui intestinorum & imi ventris doloribus frequenter recurrentibus instantur; quod ego haud raro, in arthriticis, nephriticis, item hypochondriacis & haemorrhoidariis animadversi: iis ante omnia exquisita diæta & accurato vitæ regimine superveniendum est. Id quod in eo maxima ex parte consistit, ut primum sedulo & omni studio, quascunque occasiones ad nocentissimas animi perturbationes, ut terrorem, iram & tristitiam, fuggiant: nihil enim reperitur, quod generi nervoso adeo infensum, & morbos in eo desidentes tam confestim refuscitare magis idoneum est, quam vehementior animi commotio. Deinde frigus Boreale, cuius ea est natura ac conditione, ut nervosi generis morbos revocandi & exacerbandi maximam vim habeat, omni modo vitetur, & regio lumbaris, praecordialis & pedes quoque ab eo diligentius defendantur. Tum prospiciendum est, ne legumina & inter haec maxime pisa, fabæ, brasifæ, caro pinguis vervecina, & frigidus præcipue huic superingestus potus, admittantur. Denique, ut corpus non diu otiosum maneat, sed frequentius exerceatur. Optime enim TRALLIANUS & etiam rectissime lib. 10. in hisce morbis motus commendat remedium, ita perhibens: motus quicunque, & omnis exercitatio insigniter iis conferunt, qui diutius tali morbo laborarunt & frequentius eo corripiuntur, si pedibus, si per equum, si etiam navigio mouere corpus velint, item palæstra, & totius corporis perficitio, locisque mutatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia extenuant disicutiuntque & totum corpus excrementis liberum reddunt, universum habitum corroborantia, ut in posterum affectæ partes frigidum humorem colligere nequeant, imo ne aliunde influentem promte in se recipiant. Postremo parciorem

potum spirituosorum & præsertim aquæ vitæ stomachalis carminativæ omnibus suadeo, utpote qui plus noxx & incommodi quam fructus, a copiosiori harum rerum usu resultasse, crebro observavi: vulgaris quippe & damnandus error est, ad meliorem ciborum dissolutionem & digestionem potus hosce conferre; quem tamen hæc ipsa a latice salivali potissimum dependent, neque ciborum solutionem ullo modo spirituosa prorsus attingat; sed potius e contrario, partes chylosas in intestinis præcipitando, incrassando, & poros obstruendo, materiam ad ruëtus & slatus subministrent.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

O B S E R V A T I O I .

Fœmina nobilioris conditionis erat, quæ quinquagesimum & ultra jam annum attigerat, statura mediocris sanguine & succis plena. Per duos jam annos menstrualis filebat purgatio: ceterum sana & vegeta. Vehementi afficitur ira, & elapsis aliquot horis, ob infortonium quod ipsi nuntiatur, summo & panico terrore atque tremore animus & corpus percelluntur. Nox erat inquieta. Sequenti confestim die regionem lumbarem, & ingens frigoris sensus, & dolor tensivus tam acerbus corripit, ut in erecta statura corpus ægeritatem retinere potuerit. Brevi post, horrorem & refrigerationem præsertim partium externalium percipit; quam ventris dolores & tormenta insequebantur, cum ingenti præcordiorum anxietate. Periuasio fuit, spinam dorsi passam esse subluxationem. Unde spinæ facta fuit distractio; sed dolores magis ingravescebant. Die tertio, postquam noctem inquietam transigerat, cardialgicæ accedebant anxietates cum summa spirandi angustia junctæ, innansque urgebant ad vomendum conatus. Pulsus erat celer & durus, pendes

Colica-
Spasmo-
dio cō-
vulsva
ex ira &
Super
veniēt,
terrore.

des frigidis, alvus obstipata, & ad urinam stimulos, sed ejus parcius fluxus, & dolor lancinans in dorso. In consilium ego vocatus quæsivi, quia mater ejus per plures annos obnoxia erat renum calculo, an nunquam laboraverit hoc affectu? Negavit id ipsum. Porro interrogavi, an sanguinismissionem neglexisset? Respondit annum esse elapsum. Aperuit mihi cauam morbi supra tactam. Consultum ante omnia visum fuit, alvum injectis clysteribus solvere, qui parum tamen utilitatis attulerunt. Postea venam pedis secari jussi. Eduximus sanguinem cum virium constantia & euphoria ad 9. uncias: atque ingens mox dolorum & symptomatum, cardialgiae praesertim & vomitionis sequebatur mitigatio; sed dolor circa hypochondrium dextrum lancinatus cum abdominis inflatione permanxit, neque alvus flatum vel sternoris quicquam transmisit. Clysteribus carminativis & emollientibus, ac fomentis ejusdem indolis abdomini applicatis insistere placuit. Interna vero nihil aliud dedimus, quam oleum amygdalarum dulcium in juculo avenaceo ex quo flores chamomillæ vulgaris decocti, item pulvrem marchionis & bezoardicum, adjecto nitro, cinnabari & gutta olei chamomillæ veri, it. liquorem anodynū nostrum, cui essentia castorei quarta pars admiscebatur; potum paulo frigidorem melius tulit quam calidum. Alvus paruit clysteribus: sed permanserunt dicta symptomata. Memorabile fuit, quod alternatim abdomen mirifice fuerit inflatum cum tensivo dolore, adeo ut tactum manus ferre nequiverit. Alio tempore summa fuit umbilici retractio cum spastmodica ventris strictura. Urina difficultas permanxit: dolor vero in dorso & hypochondrio dextro, ubi prima lumbaris vertebra est, incipiebat. Hæc symptomata & meum & cognatorum animum tenuerant dubium atque suspensum, num mor-

bus ex calculo renali provenerit, an colica convulsiva hysterica sit? quæ tamen nunquam fuit correpta. Die quæ erat ab invasione septima, mixturam præscripti sequentem in modum. Rec. tinturæ antimonii acris, liquoris anodynæ mineralis, utriusque unciam dimidiā, spiritus tartari drachmas duas, essentia anodynæ gr. 12. M. Singulis tribus horis sumsit triginta guttas cum aqua florum chamomillæ vulgaris, flor. sambuci & cerasorum nigrorum. Et inde obortus ingens per totum corpus sudor, durans per totam noctem, ut lintea madefacta nimis mutare conveniens visum fuerit: ægra ceterum insignissimum levamen percipiente. Pullus a naturali vix deflectere coepit. Appetitus rediit & somnus; non tamen cedebat dolor in dorso. Urina secedebat naturalis coloris, sed sine ulla arena vel crasso sedimento. Pilule datæ polychrestæ, interposito sale digestivo: & alvus etiam respondit; ubi multa foetida & putrida egesta fuerunt. Et ita sensim collectis viribus, adstante Divina benedictione, ægra cum atroci hoc morbo rediit in gratiam.

Epicrisis.

Hic affectus rectissime colicæ convulsivæ titulum meretur, quæ a bile per iram copiosius in intestinum duodenum, cuius situs ad dorsum reflectitur, quod primam causam ipsius morbi sustentabat, effusa ortum duxit. Unde cardialgiae anxieties, vomitiones & angustia sequabantur. Quia vero a vehementia terroris, mox iram subsequentis, sanguis ab exterioribus ad interiora maxime ad mesenterium ipsaque intestina fuit repressus & compulsus, flatulenta illa & spastmodica intestinorum affectio est secura. Fixus ille in dorso dolor, nostra tententia, ramo

mesenterico nervi intercostalis majoris, qui ut notum ex anatomis est, una cum ramo mesenterico arterioso ipsum duodenum supergreditur, ab hujus inflatione & copia sanguinis, distento & compresso debetur. Neque vero hic gravior dolor & spasmus tantum, in intestinorum volumine sedem habuit, sed & peritoneum, ipsius abdominis musculos & lineam albam, ob plexum mesentericum & intercostales nervos partibus his communes, in consensum traxit: a qua causa retractionem umbilici & abdominis ducendam esse arbitratur. Sanguinis missionem in tali statu plethorico, ubi tanta est spasmodorum juncta atrocia, ad arcendam inflammationem, quæ, nisi sanguine vel sponte vel arte evacuato, propte sequitur, perutilem imo necessariam judicavi: suadente id ipsum HIPPOCRATE in coac. Sect. 3. ubi inquit, dolores in lumbis sanguinis fluxionem inducunt, & spine distortionem ac spirandi difficultatem sanguinis fluxio solvit. Prater alia & hoc videtur notatum dignum, quod hic dolor typum febrilem servaverit, horrore incœperit, & sudore septimo die sublatus fuerit, ut adeo recte dolor intestinorum spasmodicus acutæ indolis nuncupari queat.

OBSERVATIO II.

Colica Triennium est, & quod excurrexit, cum *Spasmo* vir honestæ conditionis, mediocris stadiæ turæ & strictioris corporis habitus, *chronica*, & que sedentaria, & lucubrationibus *herniam* addictissimus, doloribus in dorso & *produncens*, *Ca-* abdomen cum inappetentia & virium *rolinis* collapsu torqueretur. Quorum causam *& Tapl.* medicus in molimina hæmorrhoidalia *curata*, rejiciens, ad hunc fluxum movendum varia præscribebat remedia; sed nihil sanguinis, multum autem tenacis & albida materiæ, per alvum, alternis vici- bus secedebat. Iter cum susciperet Berolinum, exquisitos & pungitivos in dextro hypochondrio sub inguine, alvo

simul valde adstricta, patiebatur dolores, quos protuberans tandem tumor exceptit, qui procedente tempore ex inguine in ipsum scrotum descendebat, multum agre molestiarum facessens. Consuluit celebrem in eadem urbe medicum, qui pilulis suis & aliis adhibitis medicaminibus, id quidem effecit, ut semel sanguis per annum cum ægri quodam levamine erumperet. At vero fluxus hic, quum per annum restitasset, nullo medicamento revocari potuit: sed dolores truculenti, quamvis per venam pedis sanguis eductus fuerit, reperebant, & immaniter abdomen cruciabant; ingravescentes quando e lecto surgebat & leniter obambulabat, vel auræ frigidiori se exponebat. Acutus in regione umbilici constitit dolor, & permolesta, quasi ingentis globi ibi hærentis & prementis sensatio, quem tam graviter sæpe torquebat, ut æger corpus in erecto situ vix servare sed incurvare debuerit, lamentabili sa- pius voce doloris exprimens sævitiam; nam tum prolapsum intestinum cum dolore lancinatorio, & ardente valde distendebatur, atque in hypochondriis, dorso, & femoribus tam dolorificæ rosiones, & stricturæ urgebant, ut rigidum & contractum corpus æger plane e loco dimovere non potuerit. Alvus firmiter erat occclusa, ut nec flatibus exitum concederet, nec clysterem intromitteret. Accessio doloris, ab hora octava matutina fuit, qui ad meridiem duravit, vomituque desivit; atque ingenti vi- rium languore, abdominis ad tactum incremente dolore, nausea, ciborum inappetentia, sudore nocturno, tussi sicca, præcordiorum anxietate, marcore, urinæ suppressione comitus ægrum mire maceravit. Misit ad me historiam morbi. Suasi, ad levandum malum, pulveris antispasmodici usum, qui ex lapidibus cancerorum, nitro, cinnabari & castoreo erat compositus, item liquorem anodynū cum refra- Etæ dosi spiritus bezoardici *Buffi* re-

mixtum, nec non elixir viscerale inter cibos assumendum: balneum etiam aquæ dulcis & hirudinum ad anum applicationem, atque ut, loco cerevisiæ, aquam Selteranam cum pauxillo vini vel ptisanam biberet, & alvum clystere oleoso & emolliente apertam servaret, ordinavi. Proximo autem vere, meo ex consilio, thermas Carolinas adiui; & absoluta cum iis cura balneo Tœplicensi, optimo & sperato cum successu ac levamine, usus est.

Epicrisis.

Dolores intestinorum spasmodici & flatulentí, si chronici sunt, plerumque originem suam sanguini intra tunicas intestinales nimium congesto & stagnanti, ob impeditiorem per mesenterium & hepar circuitum, sub vita ad otium & quietem composita, debent. Neq; hi corpus facile deserunt, nisi natura sp̄ote sanguinē per sedis venas emitat, sū videlicet naturalis quædā ad hunc fluxum adsit dispositio; qua deficiente nil perniciosius est, ac sanguinem commoventibus, aloeticis præsertim, & pilulis balsamicis, cujuscunque etiam fuerint generis vel Auctoris, ad hunc fluxum naturam cogere velle. Tantum enim abest, ut symptomata inde remittant, quin potius a commoto & ebulliente inter tunicas nerveas stagnante sanguine, spasmi & dolores exacerbentur, cum tanta saepius vehementia, ut etiam nervus mesentericus magnus intercostalis & omnes partes ad quas illeramos suos dispergit, peritoneum quoque & musculi abdominis cum intestinis in consensum rapiantur: atqui exinde herniam inguinalem, & postea scrotalem fuisse subsecutam aliquoties notavi; quemadmodum similem effectum a validissime operantibus draſticiis & emeticis enatum vidi. Tunc vero semper deterior fit ægrotantium ejusmodi conditio: nam ubi labem notabilem vel vitium quoddam intestinum

vel tantum pars ejus contraxit, sicut in hernijs contingit, colica non modo affectos, sed hypochondriacos quoque gravissime luere perpetuum fere est; excrementa quippe in ejusmodi tumore intestinali quam facile congeruntur & fistuntur, atque ita totum motus peristaltici adeo necessarium negotium perturbatur. Per remedia diætetica & accuratum vitæ regimē, moderationem animi affectuum, sanguinis decentem per venas evacuationem, aquarum mineralium, quæ temperie gaudent tam externum quam internum usum, melius & citius, quam per multa medicamina nervina, calefacentia & purgantia ad desideratam sanitatem ægrotantes pervenient: sicut ego quoque in ejusmodi morbis abstinentiam ab omni cerevisia, & potum quo priorem & simpliciorem eo præstantiorem commendō.

OBSERVATIO III.

Quadragesima abhinc circiter annis, *Colica biliosa iliaca in ang. pota, ex frigore, & pithamate Eccl. cura rasa.* cum officio Physici Mindæ fungerer, vir honoratior annorum 40. cholericæ & in iram valde proclivis naturæ, ingenii vero acuti & vividi, cibos infumatos & salitos in delitiis habebat, & liberaliter quoque vino, & spiritu vini utebatur. Hyeme, sub aura valde algida, ex itinere domum reversus, de dolore lumbari, acerbis ventris tormentibus, alvo dura & consticta, quæ trium clysterum injectionem elufit, conquerebatur. Adderat calor præternaturalis, summa fatis, & vigilia. Admissis clysteribus primo emollientibus, deinde carminativis, item sumto decocto mannatō cum oleo amygdalarum dulcium, & mixtura ex aqua menthae, spiritu nitri dulcis, syrupo papaveri albi, & pulvere præcipitante nitroso propinata, malum tuit depulsum. At vero elaplo vix durarum hebdomadum spatio in eundem morbum ægrotans incidit, qui profligatus, etiam tertia vice repetit, tam ve-

hementi gradu, ut ego, & Medici adstantes sumnum timeremus virtutis discrimen. Nam atrox dolor assidue affligebat, cum intenso calore, siti inexhausta, animi defectione, ingestorum & medicamentorum per superiora refectione, præter aquæ simplicis frigidæ potum cui quippiam calidi panis injetum, quem retinebat: alvus nullis clysteribus vinci poterat: iliacum morbum ante oculos conspiciebamus: neq; ab ullo medicamento tam externo quam interno quicquam levaminis recipiebatur. Æger vero, quia per quinq; cotinus dies, assiduis vigiliis & jactatione corporis detinebatur, in extremum virium lapsum conjectus erat. Igitur, ad somnum conciliandum, sequens excoxitavi epithema, Rec. florum rosarum, lumbuci, lavendulae ana pugillos tres, seminis papaveris albi, hyoscyami, aethi, nucistæ, nucleorum Persicorum, singularum drachmam unam semis, croci drachmam; quæ species concisæ & contusa, postquam in lacte ebullierant, applicatae toti capiti fuerunt. Hujus tam felix erat operatio, ut per totam noctem placide miser ægrotans dormiret; a quo tempore omnia priora symptomata, conatus vomendi, dolor vehementis, inquietudo & anxietas conqueverunt, alvus quoque admoto suppositorio respondit. Datis postea convenientibus & temperatis stomachum & intestina roborantibus integre restitutus fuit. Ad preçavendam vero tam atrocis morbi vim & recursionem, consilium dedi, ut, quia non assuetus erat venæ sectioni, eam bis vel ter quotannis administeret; dein ut duriorem vietum & largiorem vini, adhuc magis vero, spiritus vini potum evitaret. Mixtura quam ad stomachum roburandum præscripsi, ex effentiæ carminativa Wedelii uncia dimidia, effentiæ eascarillæ drachma dimidia, spiritus oleosi Sylviæ, guttis 60. constabat; quam ante & post cibum sumitum, per annum usurpavit. Pro potu aquam firmam commendavi, cui panis calidus recenter ex furno extractus injiciebatur.

Ita a recurso hujus mali plenarie fuit vindicatus.

Epicrisis.

Ex hac morbi historia, & curatione, paulo pensiculatius considerata, evidenter appetat, primo, sub omni graviori dolore in parte quadam nervosa, suscitato, universum nervorum systema in consensu rapi & atrocia in variis partibus induci posse pathemata. Dein quoque ingens illa capitum membranarum cum ventriculo & intestinis consensio, ex ea evincitur; cum capite, seu parti a dolore valde remoto exteriori tantum applicatum sedativum remedium, in dissitis partibus graviter factis, vim suam & efficaciam exseruerit. Sicut vero omnes affectus nervosi, generis, ita etiam intestinorum & ventriculi dolores, facile ex neglecto vita regimine, inque primis per affectus animi immoderatos, per frigus & ventum Borealem exterioribus improvide admissum, necnon cibum & potum minus convenientem, recidivant: id quod, facilli me, in cholericæ & ad iram propclivis temperamenti corporibus evenit; quibus aquæ frigidæ potus vino multo est convenientior: docente id ipsum GALENO lib. 10. method. cap. 7. De cuius etiam salutari usu AMAT. LUSITANUS testatur, se atrocem intestinorum dolorem, aquæ frigidæ exhibitione, subito & incantamenti instar sustulisse.

OBSERVATIO IV.

Colite sanguinem ex dieta laeta vino. vene- sed. & aque potu surata. fenz.

Anno circiter supra millesimum sextum, nee ex centesimum, octogesimo quinto, cum dieta laeta vino. Halberstadtii Provincialis medici nomine degerem, ad monasterium Hammerslebiense, cui medicus alias ordinarius præterat, ob plures religiosos ibi graviter laborantes, fui vocatus. Of-

fendi ibi numero plures , qui per longum tempus atrocibus ventris tormentibus cum alvo pigerrima & contracta conflictabantur, de frigore quoq; sufflere , horas primo mane in templo frequentando,decebant,contraxerant: quidam ex iis herniam inguinalem & scrotalē sibi contraxerant: alii quilibet erant,paralytic & stupore manuum affecti.Erant homines repleti, eufarci, sanguineæ complexionis, qui venæctionem in anno vix semel admettebant, lauteque viventes mero non parum indulgebant. A distis vero malis liberi permanerunt,qui tenuiori victu & cerevisia simpliciori se sustentabant. Igitur cum ex nimia sanguinis abundantia ejusque stagnatione inter intestina morbum prognatum judicarem, consilium dedi, ut imposterum sanguinis missionem frequentius celebrarent, & prisamanum cum vini portione remixa biberent: das medicamentis magis refrigerantibus & leniter carminativis, spiritu nitri dulcis præfertim, & ipso nitro cum lapidibus cancriorum & croco permixto, quam valde de calidis, quibus antea erant usi. Suas quoque fui, ut vere approximante acidulas Pyrmontanas vel Egranas regimine cum convenienti biberent. Ad paralysin vero tollendam, post balneum aquæ dulcis,linimento ex aqua Anhaltina, spiritu & sale volatili lumborum terrestrium , oleo nucistæ expresso, camphora & castoreo parato, partes affectas ut probe inungerent suasi & edixi. Neque exiguum inde levamen consecuti sunt.

Epicrisis.

Sicut colica vulgo & in scholis medicis in biliosam & pituitosam distinguuntur: ita etiam sanguineam, in plethoricas præsertim, ab iis rebus, quæ sanguinem nimium in vasis accumulant, excitari posse experientia non crebrior docet. Nam ex mensuri, in foeminae, in viris, hæmorrhoidum suppressione fluxu, acerbos abdominis dolores

gravibus symptomatibus stipatos obo- riri, nostro tempore non novum est: licet veteribus hec morbi species videatur incognita . Evidem apud HIPPOCRATEM lib.3. de morbis hæmatitis ilei nomen occurrit: sed si pensiculate, quem describit morbum consideramus, longe alius est quam iliacus , cuius signa in eodem loco proponit: adeo ut nihil fere cum hoc habeat commune. Nam illeos, quo nomine omnes dolores ventris complectitur, vera historia lib.3. S.13. cumulate & perfecte traditur. Rectius, optimus HIPPOCRATIS interpres FOESIUS in *œconomia* sua,ac non sine ratione, suspetum esse hunc locum,& defectum atque mendum subesse judicat. Neque etiam in regionibus calidioribus, in quibus venerandus Senex egit, tam frequenter ex plethora vel fluxu hæmorrhoidalib; oboriuntur ægritudines,quam in nostris meridionalibus & temperatioribus. Solent vero hujusmodi dolores esse & longiores & atrociores, maxime quando cacoehymia concurrit: hinc fit, ut, debilitato valde genere nervoso,in paralysin, epilepsiam vel astios morbos nervorum & capitis terminantur, præsertim, si non rite, per calidiora videlicet interna & externa, anodyna immoderate sumta, traotentur. In regionibus præcalidis in Italia & præsertim Romæ, item in Hungaria, superiori Austria , Moravia,ob abusum vini generosi, sanguineæ & biliosæ colicæ frequentiores sunt. Neque ibi datur ad eas tollendas, præter usum refrigerantium & præsertim aquæ frigidæ, præsidium facile convenientius & efficacius. Et ob hanc rationem non modo AMATUS, sed & ZACUTUS, LUSITANI hist.295. pag.351. colicam a bile factam, aquæ frigidæ potu, & Lib.2.obs.25 prax.adm.nive curatam meminerunt. Conf. hac de re M. N.C. cent. 5.p.193.194. cent. 10.p.273. item Decur.2. An.8. obs.13. & anno 10. obs. 139. Vidi quoque in paralysi ab eadem causa exorta, balnea paulo frigidiora, plus efficacæ quam calida præstissime .

OB.

OBSERVATIO V.

Colica. Anni prope modum sex elapsi sunt, sanguis quum Beat. D.D. NABOTH me Linnae, ex p̄fīa degentem, ad fœminam mercato-mensibus ris primarii viduam, quæ gravissimis tetrore & suppresione abdominis doloribus, ex mensibus per s̄t. aqua, vehementem terrorem suppressis torquiebatur, duceret. Delibetatione incurata, vicem habita, primo sanguinem e vena emittendum, dein clysteres emollientes & oleosos cum stimulo salino injiciendos curavimus, & mixturas carminativas ac sedatives, quarum princeps ingrediens spiritus nitri dulcis fuit, propinavimus: sed sine effectu. Ipse asseverabat, le modo in hac ipsa egrotante, valde sanguinea, quæ ante dimidium anni eodem morbo fuerat correpta, miro cum effectu & dolorum levamine, solo aquæ frigida usum fuisse potu. Nolui prius in ejus descendere sententiam, quum inflammationem verecerer: sed ipse cum assertis & promissis suis insisteret, nolui morosius repugnare: & res etiam felicius, ac putaram, successit. Hic itaque aquæ frigida simplicis potum ad II. cyathos de die per vices sumendum, recto prius probe corpore & pedibus, curavit. Subsecuto largo sudore, postea placido somno, omnes dolores abdominis conqueverunt. Afirmavit quoque, quod linea aqua frigida madefacta, felicissimo sapientius cum effectu, in tali casu applicasset.

Epicrisis.

Quod in aqua frigida summa lateat medicina, ego multa experientia, qui ipse: de aqua medicina universali, dissertationem scripsi, edocitus fui. Sed ut omnia magnæ efficacia remedia, quæ a medicis sagioribus heroica audiunt, exquisitum judicium ac prudential, omniumque causarum considera-

rationem desiderant; ita id ipsum de aqua frigide interno & externo usu, maxime valere existimo. Nam imprudenter & intempestive data, præsertim ubi metus inflammationis est, non potest non summum periculum, imo necem afferre. Nihilominus ad calidam acrem materiam temperandam, nimium sanguinis ebullientis astum reprimendum ad vires ab immodico fervore collaplas restituendas, ad roborandum partium tonū & systolen cordis & vasorum augendam remedium efficacissimum utique præbet. Vidi ab ejus potu in cholera passione miraculosos plane effectus. Neque indignus animadversione est locus apud LUDOV. SEPTALIUM, quem lib. 7. animadvers. p. 248. insinuat, & hoc integer adduci mereatur. Contingit, scribit, aliquando ut colici dolores adeo vehementes sint, ut omnem medicamentorum operam eludent, ac quocunque auxilio adhibito potius augentur. In quo casu erit ad contraria transfundum. Quum enim colici dolores majori ex parte, a materia frigida fiant aut a flatibus distendentibus; fit aliquando, ut aut ratione vigiliarum, dolorum, aut mororis ob contumaciam aut invalescent nimium, aut intestina, accedentibus etiam calidis, & foris appositis remedii, aut phlogosi quadam tententur, aut etiam vera inflammatione incipient affici, aut multa præexistens bilis ibidem transfundatur. Unde ad contraria erit transfundum & insigniter refrigerandum. Quod mihi præterito anno contigit, in nobili quodam Hispano, qui cum colicis doloribus per aliquot dies acerrime fuisset conflictatus, ut jamjam mors esset præ foribus, nulli persentirentur arteriarum pulsus, sudores essent resolutorii, nulla denique supereret spes salutis, ne quidem apud Medicos etiam præstantissimos: accersitus & ego, cum sitim inextinguibilem, lingue scabritiem, nigorem atque duritatem; pertactis autem hypochondriis, & ventre infe-

feriori, calorem illum in partibus astutam adesse observasse, Hispano aquam multam nive etiam refrigeratam, bibendum exhibui, cum natura abstemius esset. Et multa aquæ potator in somnum prolapsus est, & quatuor horarum spatio cum dormisset, dolore quadam inferioris ventris, a primo maxime, ut ipse referbat, diverso, excitatus a somno, mirabilis flava copiam evacuavit & a doloribus liber evasit. Unde collegi, medicos, qui illius curationem suscepserant, in causa morbi illius longe deceptos fuissent, cum calidis remediis curationem insituisserent, a frigida materia morbum factum judicantes. Neque in colica flatulenta, a causa calida, frigida exterius applicata penitus improbadâ veniunt; qua in re auctoritate eximiorum medicorum CRATONIS, item VALESCI de TARANTA niti licet, qui linteaua aqua frigida madefacta & ventri imposita in colicis doloribus sedandis magni faciunt. Cui experientia, adstipulantem quoque habemus rationem: nam fatus qui valide & mirifice tunicas & parietes intestinorum distendunt, nihil aliud sunt ac aer calore rarefactus elatere ejus valde aducto; frigida igitur, ut experimentis mechanicis compertum est, cum aerem nimis rarefactum condensent, atque in angustius spatium cogant, necnon fibris nimis relaxatis tonicam vim reddant, ut calefacto corpore sanguis majori velocitate propellatur, efficiunt.

OBSERVATIO VI.

Colica convulsiæ, ex gonorrhœa, adstringens, supprensæ. Juvenis 22. annorum studiis operam navans, gracilioris corporis structuræ, ex impura Venere, gonorrhœam sibi contraxit; ad quam curandam Chirurgi opera usus est. Hic primum fortiter corpus purgabat, dein adstringentia, tincturam sulphuris vitrioli, antiphthisicam Grammani & pulveres ex magisterio Saturni, terra sigillata, succino & osse sepiæ compositos, ad sistendum fluxum copiose adhibuit. A quorum usu per septimanam continuato hæc mala

Hoffm. Syst: T. IV. P. II.

insecuta: atroces cruciatus in abdomine, quod durum tenum & renitens erat, oborti, alvo prorsus obstipata; aderat inappetentia, inquietudo, & tremore ac tractionibus artus, femora, pedes torquebantur. Enixe meum exposcebat auxilium. Neque infeliciter succedit curatio, quæ clysteribus emollientibus & oleosis crebrius injectis, infuso mannato, ex sero lactis, quod stimulo salino erat armatum, & pinguioribus jusculis, blandisque internis carminativis, & balneo aquæ dulcis, intra novem dies absolvebatur.

Epicrisis.

Quantam notam improvide data adstringentia, ventriculo & intestinis ceu partibus valde nervosis, & membranosis inferant, tonum & motum eorum plane turbando & invertendo, dici vix potest. Atque innumeris exemplis, quam pernitiales ea, in alvi, sanguinis, seminis fluxu fistendo, effectus exerant, confirmare & illustrare possemus. Ex horum vero numero pejoris adhuc nota sunt, quæ ex Saturno depromuntur. Hæc uti exterius nonarent sua laude & virtute: ita interius usurpata, fibras nervæ intestinales constringendo, veri veneni naturam & vim habent; adeo ut ipsa, ceu per se quidem non damnosa, tamen quoad usum internum damnanda, e re publica medica, jure meritoque exterminari debant. Memoratus morbus recte dici potest colica convulsiva, quæ ab HIPPOCRATE lib. de victu acutor. §. 6t. cholera siccæ nomine venit; qui hunc in modum ejus naturam & curationem perite & optime exponit: [n] cholera siccæ venier inflatus est & strepitus insunt. Dolor laterum ac lumborum: secundit autem nihil deorsum, sed alvus adstricta est. Talem observato, ut ne vobis mant, sed alvus subeat. Infusum itaque calidum ac pinguisimum quam citissime per clysterem immittito, & oleo illi-

tum in aquam plurimam calidam paulatim affundens, & si calefacienti ipsi alvus subuerit, morbus solutus est, a cibis vero abstineat: si que non remiserit dolor, asinum lac bibendum dato, donec purgatus fuerit.

OBSERVATIO VII.

*Colica
Balneis
ta ox ira
super cerevisia ebruis, rixando in diversorio
ingesta cum fui similibus, domum brumali
tempore revertitur, & carnem suillam
pinguiorem cum magna panis copia
ingerit. Alvi fluxus cum torminibus
inlequebatur; sed cum sub celo frigido
alvum deponeret, fistebatur. Unde do-
lores saevissimi totum occupabant ab-
domen, lumbos, hypochondria: atque
alvus erat valde obstipata, artus frigidii
tremiscabant, summa aderat anxietas,
& inquietudo, internaque præcordio-
rum angustia & constrictio: demum
spasmus & dolor genua infestabat ea-
que constringebat. Curatus fuit juscum
lo avenaceo, in quo flores chamomilae & sambuci cocti, quod cum salis
Ebsoniensis & nitri dosi atque oleo a-
mygdalarum dulcium per vices sumbit,
non omittis clysteribus oleosis & emol-
lientibus, atque internis carminativis
& anodynis. Postea crebro balnei aque
dulcis usu, ad convulsivas artuum
tractiones leniendas, sanatus est.*

Epicrisis.

Ad subitam atrocis hujus ventris
doloris generationem, varie, sed valide
concurrebant causæ: ebrietas, affectus
iræ, & post hanc ingesta pinguium &
viscidorum ciborum copia, frigus, & ab
hoc alvi fluxus suppressio. Non mirum
hinc est, ex flatibus intra intestinorum
cavitate excitatis a spasticis tunica-
rum intestinalium contractionibus, in-

tus retentis & incarceratis, tam atrocis
dolores, & gravissimas nervosarum
partium afflictiones fuisse productas.
Et quia obstructio alvi proxima causa
horum malorum fuit, eam rursus aperi-
ri expediebat. Quod vero non promi-
scue per purgantia & fortiter stimulan-
tia, quæ dolores & spasmos potius ex-
citant, fieri debet, sed per salia oleosis
& demulcentibus mixta, quo nomine
sal Ebsoniensis laudamus, quod ad unciam
in aqua solutum & exhibitum,
præmissis clysteribus, ad flatus & ex-
crementa provocanda, præ omnibus
aliis laudem & commendationum pro-
meretur. Balneis aquæ dulcis ex emol-
lientibus & roborantibus paratis, ad
robur partibus externis conciliandum,
quod a vehementi dolore, & spastico
plane laeditur, & destruitur, in fine
ejusmodi morborum nil est convenien-
tius, nil efficacius; cum veteres, inter
quos HIPPOCRATES, CÆL. AU-
RELIANUS, TRALLIANUS,
ARETÆUS, usum eorum mirifice
tollant atque commendent.

OBSERVATIO VIII.

Serenissimus S. R. J. Princeps ante
aliquot annos per Archiatrum adver-
sam suam valetudinem, salutare consi-
lijum suppeditandi causa, ad me per-
scribere jussit. Is cum in florente astate
constitutus, boni & sanguinei corporis
habitus, ingenii valde vividi & alacris,
narium hæmorrhagia in juventute
valde obnoxius esset; per integrum
fere annum sevis doloribus, & atrocis
intestinorum tormentis fuit affe-
ctus: quo factum est, ut in ingentem
virium lapsum atque in corporis tabe-
scentiam conjectus fuerit. Ad fluxum
hæmorrhoidalem quedam adfuit suspi-
cio; qui tamen non rite, & ex voto
procedebat. Ad hunc promovendum
& dolores mitigandos varia usurpata
fuere remedia, & haec quoque pilula-
rum polychrestarum, & ad exemplar
*Colica
sanguineæ:
ebri-
ca, al-
ternans
cum ar-
thriti-
de, Ca-
rolinis
curata.*

Becherianarum paratarum frequens usus intercessit: qui parum tamen proficit. Quæsitum itaque ex me fuit: utrum thermæ Carolinæ convenienti regimine usurpatæ, tuto & exoptato cum fructu possint adhiberi? Ego responsum dedi, quod tam ad arthritidem, quam ad dolores ventris spasmodicos, nec tutius, nec præstantius, harum thermarum usu, cognitum mihi sit atque per speculum auxilium: quod multis exemplis confirmare valerem. Huic consilio multi, & medici quoque, ob anceps remedium & verendum periculum, sese opponebant, dubio procul ex hac causa, quod nullam prorsus de hisce salutiferis fontibus, ratione ingredientium, & virium, habuerint notitiam & experientiam. Serenissimus Princeps autem, pro eo quo pollebat judicii acumine, ut pote omni haec tenus destitutus fuerat auxilio, fententiam meam amplèxus, iter suscepit, per hanc civitatem transiens: & fatigatus ex itinere hic advenit, sed in uno pede tumore erysipelaceo ingenti correptus, qui sano vel triplo grandior erat. Altero die intolerabiles abdomen invadabant dolores, tanta cum ferocia, ut clamores & lamentationes exprimerent, & omnem somnum adimerent. Ad quos sopiendos & ego & aliis loci hujus medicus accersebamur, sed prater clystères emollientes, & carminativos atque linimentum externum, pulvrem ex antimonio diaphoretico, nitro, sale absinthii, & lapidibus cancerorum paratum pervices dedimus, sanguinem quoque e. pedis vena emitendum curavimus; sed parum inde levaminis persensit. Per tres & ultra dies dolorum persistit at rocia. Tandem consultum duximus, præmisso fotu-, hirudines quinque a. no applicare, quæ sanguinis aliquot uncias extrahebant: quo facto insignis dolorum remissio, & sensim plenaria sanitatis restitutio. Diyino sub adjutorio est secura. Data instructione de usu harum aquarum decenti, adiit Carolinas & per 4. sere hebdomades iis interne usus est: balneum quippe inter-

I dixi; pediluvium vero pro discussione tumoris in dies adhibuit. Quæ cura ex voto successit: & ad nos sanus & incolumis Serenissimus est reversus, non sine insigni comitatus gaudio & applausu. Immunis a truculento affectu tam colico quam podagrico, per integrum mansit annum. Altero anno & iter & curam hanc repetiit, majorique virium augmento reddit, integra etiam num, ut mihi relatum est, valetudine gaudens.

Epicrisis.

Quin arthriticus & colicus spasmodicus dolor nimiam sanguinis abundantiam, ejusque impeditiorem per mesenterium & viscera abdominis transitum, pro vera causa agnoscat, nihil dubitandum est. Minus recte, sed perperam horum malorum, per promotionem fluxus hæmorrhoidalis tentata fuit depulsio. Per multis ego exemplis compertum habeo, quod si natura non inclinet ad hunc fluxum, & meatus ad egerendum sanguinem non satis sint dispositi, ejusmodi calida gummoso-resinosa, & aloetica, urgendo sanguinem ad intestina, colon & rectum, detrimentum potius quam emolumentum afferre. Jam vero ipsa dictitat sana ratio, quod longer tutior & certior hisce malis mendendi sit via, si per viscera abdominis inque primis hepar, liber sanguinis motus & circuitus promoteatur: quod omnino per convenientem aquarum mineralium & maxime Carolinarum usum præstari & confici potest; cum multa mihi hisce sanatorum morborum obvia sint auspicatissimi successus exempla. De cetero singularis & plane admirabilis, in sedandis ejusmodi doloribus, ex admotione hirudinum effetti meretur animadversionem. Et inde luculentem intelligimus, sanguinis missionem, que sit in partibus a loco affecto remotis, non tanti esse momenti & usus, ac illam, quæ in locis propinquioribus instituitur; quamvis non

negaverim, tali etiam in casu, si corpora sanguine nimium exundant, ante hirudinum applicationem, venæ sectionem sæpe numero utilissimam observari.

OBSERVATIO IX.

*Tutus methodus eu-
gandi solitam ex mor-
bis pre-
gressis
ortam.*

Post crebriores ex calculo renali do-
lores, post alvi fluxus atque intermit-
tentes pérperam curatas, sæpe numero
ego in praxi intestinorum tonum, &
motum naturalem labefactatum & de-
structum notavi. Nam ab eo tempore,
& alvus non rire respondit, & flatulen-
tiis, borborygmis & assiduis eructatio-
nibus, concurrente præsertim sedenta-
ria vita, per longum temporis spatium
decumbentes affecti fuerunt. Ad quas
molestias & incommoda avertenda &
tollenda, sequenti modo haud in-
feliciter sæpe numero usus sum. Pilulas
mæ compositionis leniter laxantes
balsamicas, bis in septimana ad grana
35. vel 20. mane sumendas ordinavi, u-
bi præcedente die circa lecti introitum,
salis aperitivi dosis, quod e.g. ex tartaro
vitriolato, nitro, sale Ebsoniensi, terra
foliata tartari concinnari potest, præ-
missa fuit. Dein ad labefactatum in-
testinalem tonum & labem restituendū, essentiam carminativam B. We-
delis, quæ ob spiritum nitri, ejus com-
positionem ingredientem, singulari flatu-
tus discutiendi facultate pollet, quando
cum dimidio essentiae calcarillæ, item
una parte spiritus de tribus misceatur,
ego non satis dilaudare possum: cuius
medicamenti conveniens pro circum-
stantiarum ratione dosis, bis de die,
mane scilicet, & finita post prandium
concoctione, in idoneo exhiberi potest
vehiculo. Sed opera danda est, ut eibi
fermentescibiles inflantes, pingues &
qui difficultioris sunt concoctionis, at-
que ante omnia frigus evitentur. Præ-
terea & id quoque complures in praxi
mea annotavi, quod dolores colici, &
flatulenti, cum borborygmis & rustationibus,
interna angustia atque gra-

vitatis circa præcordia sensu, a sola sphincteris ani valida constrictione &
angustia producti, hæc vero a copiösiori
sanguinis vel seri affluxu ad ejus venas
internas vel externas hæmorrhoidales
suborta fuerit: ex quo fit, ut nec flatus,
nec excrements liberum habeant exi-
tum, sed retenta resiliant, & versus su-
periora ferantur, plurimum molestiae
& incommodi procreando. Tali in
casu, quando fortior fit ad excernendam
alvum nisus, is plane inanis est:
exprimit quippe mucum instar albumini-
ni oyi & quandoque prolapsum recti
efficit; immo vidi herniam inguinalem
inde productam, si que hæc, vel scrota-
lis jam præsens fuerit, eam longe gran-
diorem factam. Arque hic tenendum,
quod suppositoria, præsertim stimulan-
tia, & acriorem dolorem, & majorem
affluxum excitando, malum exasper-
tent, quin potius clysteres emollientes
& interne pulveres absorbentes ni-
trolos, item infusummannatum cum
cremore tartari, & interdum si ple-
thora urget, venæ sectionem, commo-
diffimum invenisse locum testari pos-
sum.

Epicrisis.

Ad tonum & motum intestinorum
labefactatum, qui obstructionis, fla-
tuum, dolorum & multorum aliorum
incommodorum causa ac fons est, re-
parandum & confirmandum, ego non
modo remediis internis, sed etiam cly-
steribus accommodatis & idoneis usus
sum felicissime. Et tales sunt, qui ex
speciebus, quæ non tam evacuante sed
& roborante efficacia pollent, parantur;
cujusmodi sunt herba salviæ, ruta,
flores chamomillaæ Romanæ, baccæ
lauri, juniperi, semen anethi, carvi,
myrrha, quæ leni facta ebullitione,
in vini Gallici & aquæ communis æ-
quali portione, extrahantur, & injiciantur. Quandoque portionem bal-
sami nostri liquidi vitæ, clysteribus
carminativis adjiciendam curavi.
Sed necessarium est, ut ante horum
usum, alvus aperta, & flatibus
libera sit. Præterea, & hoc loco id

monere consultum duxo, quod, ubi rumor in extremitate intestini recti, flatuum & incommodorum in imo ventre, obstructionis quoque alvinæ causa sit, pilulæ purgantes, item quæ aloen recipiunt & motum sanguinis ad intestina crassa dirigunt, nisi malum exacerbare & revocare velimus, plane non; vel cautissime exhibenda sint.

OBSERVATIO X.

*Curatio
colica,
ex mor-
bis exā-
sideratio
medicis
schematicis
et
verroce-
tibus,
vel non
expulsis.*

Placet in genere quasdam adhuc insinuare observationes practicas non exigui momenti, quarum attentior consideratio medicis junioribus haud parum utilitatis & adjumenti, in sanandis intestinorum dolorificis affectionibus afferet. Nam saepius annotavi, familiarissimo nostro ævo qui sceminas præcipue corripit morbo, purpuræ videlicet, intestinorum dolorem saepius adjungi, idque maxime evenire, quando in cauta victus ratione, vel importuna medicina, materia vitiosa non satis ad habitum corporis protrudit, sed intus retinetur, aut a superficie corporis retrocedit: qua ad intestinorum tunicas delata, subito tormina, aliaque gravia accidentia incident. Neque vero tam facilis labor est, peccantem humorem ad extimam rursus cutem prolicere, sed moderationis, temporis & patientiae beneficio opus est. Lenissima vero & qualis est procuranda diaphoresis, per crebrios datos pulveres diapnoicos cum tantillo nitri & cinnabaris: liquor etiam anodynus mineralis paucioribus liquoris *Buffii* guttulis animatus, ad foras excludendam pessimam indolis materiam, plurimum valet. Uti vero in hoc morbo potus cerevisia nunquam non noxious, ita plus detrimenti, si retrocedens materia interiores nerveas partes obsidet, certo afferit. Commodum itaque, ex demulcentibus & acrimoniam temperantibus placideque diaphoreticis speciebus decoctum cum aqua paratum, per totum morbi decur-

sum offerendum. At vero cum ex frequenti observatione compertum habeam, dolorem colicum in iis qui purpuræ scorbuticæ sunt obnoxii saepius repetere & gravibus accidentibus egrotates torquere, sine ullo in extimis partibus apparente exanthemate; ego quidem ad avertēda hæc mala non efficacius medium, præter usum acidularum temperatarum cum tertia lactis vaccini, vel quod ego protulerim, asinini parte facta miscela, verno tempore suscepimus, reperiire potui.

Deinceps frequentius id in praxi mea observavi, quod dolores intestinorum paulo acriores, ubi in extrema ætate constitutis adoriantur, & paulo diutius insistunt, vitalibus viribus valde attritis lethalem plerumque exitum post se relinquunt. Cujus eventus ratio, mihi hæc videtur, quod senes ordinario, ob virium languorem & dyscrasiam humorum intemperatam & scorbuticam, ex levi etiam partis externa laßione, in sphacelum sint proclives. Quod multo magis evenire puto, quando a dolore & spasmo intestina, velut partes texturæ prorsus nervosa & fibrosa, paulo acrius infestantur. Ex quo intelligitur, quam caute & provide, circa res diæticas infirmi senes se gerere debeant, ne quicquam admittant, quod dolores & spasmos in intestinis excitare aptum sit.

Neque dum in hac materia versamur, que non minoris in praxi momenti est, hanc observationem præterire possum ac de beo, quod biliosa colica, ea præprimis quæ ex gravi progignitur ira, tertianæ sive continuæ sive intermittenti superveniens, magni non expersit periculi, utpote quæ perperam per purgantia, emetica aut sudorifera, vel nimium calorem externum tractata, quam facile in intestinorum tenuium inflammationem lethalem, præeun- tibus anxietatibus & convulsionibus, transeat, & die paroxysmi mortem plerumque accersat. Ex quo discere tyrones possunt, quam provide & caute tractare debeant tertiana alias benigna

detentos, tam gravi symptomate incidente. Ego in demulcentibus & temperantibus potionibus ac lenioribus laxantibus, cuius generis sunt serum lactis bene depuratum, decoctum avenaceum, ex floribus chamomille vulgaris, emulsiō amygdalarum dulcium, papaveris & seminum q. frigidorum majorum cum prisana preparata, pulvis *Marchionis*, vel ex lapidibus cancriorum, nitro & rhabarbaro confectus, atque clysteres emollientes, optimum & praesentaneum auxilium deprehendi.

Exempla adhuc legantur in Consult. Medic. sect. 3. eas. 13. 21.

C A P. VI.

De acuto dolore & spasmo ex calculo renali.

Theses Pathologicæ.

§. I.

Dolor, qui ex calculo renali firmius Dolor ex calculo renali difficulter, ut omnium quidem passionum, quæ genus humanum misere torquent, est acerbissima: ita sapient fit, ut is, si gnoicitur quis prima præsertim vice ex hoc laboret, difficiliter ab aliis, quæ circa regionem lumbarem consistunt dolorificis affectionibus discernatur.

§. II.

Non omnis dolor luit, ut, si quis circa regionem lumbarem doleat, statim ex calculo renum se bos est ex dolore existimetur, cum tamen ibi cōplures valde sensibilis indolis, & dolori obnoxiae sint partes, ut musculi lumborum externi & interni, ligamenta vertebrarum lumbarum nervea, plexus nervorum superior mesentericus, ramus arteriæ mesentericæ superioris, & circa vicinia, flexuosus intestini duodeni finis, neque minus sigmoidea coli flexura; quæ singulæ, quando a vitioso ibi stagnante, sive sanguineo, sive seroso

impuro humore, vel nimis distenduntur, vel comprimuntur, dolorem satis gravem exhibent. Fit etiam quandoque, ut a rheumatismo has partes occupante tantus ex surgat dolor, ut quasi lumbis per medium sectis incurvatus incedere debeat æger, nec surgere queat. Quod iidem fieri solet, si a casu, vel a magna oneris levatione, vertebræ cum nervis tantillum a propria sede recedunt. Neque tam raro evenit, ut a sola sanguinis copia, circa plexum mesentericum, & circa arterias emulgentes stagnante, in plethorice vel hemorrhoidariis, vel a neglecta consueta venæctione, ingens circa lumbos oboriat dolor, qui vulgo pro calculoso, sed perperam habetur: dum vel solius venæctionis in pede beneficio, vel pulvere nitroso discutiente subito sæpe desinit.

§. III

Id vero frequentius contingit, ut do. *Quomo-* lor colicus cum nephritico calculoso *do di-* confundatur: nam, quando flexura colicæ *secreta* cirea lumbos quæ jacet, vel flatibus ni- *dus a* mium distenditur, vel spasmodice con- stringitur, non modo atrox in regione *calcula-* lumbari fit dolor, sed & ipse ad præcordia transit, nausea ac vomendi conatum efficit, urinæ fluxum impedit, al- vum constringit, imo totum abdomen cruciatibus torquet, non secus ac a cal- culo fieri solet. Sed tamen, quia hic dolor spasmodicus, non astidius, non fi- zus, sed magis vagus est, ac clysteribus emollientibus alvo infusis magnopere levatur; hinc peritus utique medicus, hunc a calculoso, non adeo difficulter distinguere potest; cum hic magis pre- fessorius sit, quod germanice exprimunt: *Es drücke sie, als ein Klotz*, atque vires non tam intense destruant, per intervalla etiam remittat, ut ægrotantes sepius surgere & ambulare possint; quod in acerbo intestinalorum dolore non accidit. Deinceps vomitus & nausea, a calculo si dolor est, jejuno ventriculo magis urget, ac in uretra imo ipsa glande titillatio & sensus punctarius percipitur, u- *rina*

ritus fabulo referta, testiculi quoque re-
tractio ac femoris stupor & contractio
eiusdem lateris fit, quod in dolore inte-
stinorum vix observatur.

§. IV.

Calculus. Notabile est, quod calculi etiam pre-
nonnisi a se de sua sedis
dimotus atrociiter de sine ullo doloris incommodo, per a-
ffinitate liquot annos quieti delitescere possint;
simil ac vero e sede sua dimoventur, &
in angustos nerveos musculosos canales
ureteres dictos descendunt, perque hos
in vesicam exitum moluntur, mox gra-
vissima invadunt symptomata: adeo,
ut hi ipsi canales veram & fixam dolo-
rum ex calculo sedem ac domicilium
constituant, qui tamen pro differente
calculi magnitudine, asperitate, ac figura,
tunicas nerveas plus minus disten-
dente & lancingante, vel intensiores vel
leviores evadunt. Quandoque tam crudi-
deles sunt, ut praeter extremon hor-
rorem & refrigerationem, nausea,
vomitum, spastica m prae cordiorum
constrictionem, difficilem urinæ mi-
litum, alvi stricturam, spirandique an-
gustiam, stuporem cruris, retractionem
testiculi ad os pubis, inquietudinem, in-
gentem virium lapsum, syncopen, con-
vulsiones etiam epilepticas concident,
vel plane fatalem ischuriā inducant.
Vidimus aliquando ægrotantes con-
questos fuisse, se non aliud sensum per-
cipere, ac si quis cultro acuto vulnus
profundum, secundum longitudinem
spinae, versus vesicam continuo inflige-
ret, ubi in defunctis, ureteres instar far-
cimini a copia urinæ, cuius in ves-
icam influxum calculus circa introitum
ureteris in vesicam hærens intercepto-
extensi & turgidi comparuerunt.

§. V.

In ureter. Res est experientia confirmata, quod
re sepe interdum longo tempore lapis in ure-
singulari ere, sine singulari dolore sine mixtus
dolore interceptione hærente & conquiescere
possit, ubi tamen mox subito & ex im-

proviso dolor revertitur acerbus, cum
ciborum subsequentे fastidio, nausea,
vomitu & urinæ interceptione; forsitan
quod ab incommmodo motu situm suum
mutaverit lapis, & sic asperitate sua,
tunica nerveæ fibras magis offendat.
Neque etiam semper iisdem sympto-
matibus hic affectus stipitur: nam, ut
ERASMUS de suo calculo loquitur in
Epist. ad Perckmeyerum: subinde se no-
vat, ut plane credatur aliud esse malum
quod maximam partem inde pendet,
quod alia symptomata sint ab initio, a-
lia in progressu, interdum quiescat, in-
terdum se moveat, & locum mutet.

§. VI.

Atqui etiam illud attentionem exci-
tare debet, quod calculi sinistrum re-
tamen, præ dextro, frequentius obsideant; præ
quo fit, ut dolores ex renali calculo lo-
ge crebriores in sinistro, quam in dex-
tro latere obseruentur: id quod confir-
mat CAROL. PISO in *tr. de morbis ex*
serosa colluv. oriund. c. 2. dum scribit: ex
centum calculosa nephritis laboranti-
bus eleginta, & amplius renem simi-
strum dolent. Neque hujus eventus ra-
tio, adeo in obscuro posita est; in rene
exim dextro, quia hepatis amplo viscer-
e tegitur & majori præ altero calore
sovetur, promptior multo atque expedi-
tor evadit sanguinis: per hujus renis
vasa progressio, feri itidem urinosis se-
paratio: hinc non tam facile sanguinis
& urinæ fieri in hoc possunt stagnatio-
nes, ac in sinistro, qui coli flexura obse-
sus, ob frequentem flatuum restagna-
tionem magis premitur: ex quo fit, ut
liberior sanguinis per vasa compressa
interceptus cursus, difficiliorem laticis
urinosis per tubulos transcolationem,
atque promptiore ibi stagnationem &
materiæ tartarez secessionem & con-
cretionem reddat atque efficiat.

§. VII.

Notabile idque experientia pariter
suffultum est, quod calculus diutius in

renum parenchymate vel pelvi delitescens, pluribus modis ac causis, e loco suo dimoveri atque in ureteris principium propelli possit: & inter has, primas sere tenent, fortior animi per iram conturbatio, corporis subita & vehementes per vectaram sive equitationem commotio, inque primis penetrans, quod venti e plaga septentrionali praebent, frigus improvide lumbis admisum, item diureticorum, cuius generis sunt terebinthinacea, juniperina, cetera, quibus subinde sed perperam medie ad præservationem a calculo uti solent, liberalior usus. Non semel quoque, sed iterum iterumque observavimus, quod dolores colicæ flatulentæ, item spasmi hypochondriacis, hysterics, hemorrhoidariis familiares, nucleos calculosos papillulis renalibus inherentes protrudendo, occasionem ad crudeles istos dolores subministraverint.

§. VIII.

Causæ remotaæ calculi renalitatis

Quod attinet ad causas remotas & sive dictas naturales, quæ ad gignendos in renibus calculos & inde provenientes dolores symbolum suum conferunt: temperamentum sic dictum sanguineū, inter has non ultimum tenet locum. Nam corpora mollioris & spongiosioris texturæ, fœminini præsertim sexus & quæ cupiosum alunt in venis sanguinem, diæta lauta & vinoſa utuntur, otioque & vitæ sedentariæ indulgent, nec non placentis, lacte, caseo delectantur, post quinquagesimum maxime annum, tributo lunari cessante, doloribus ex calculo fiunt obnoxia; a quibus plerumque libera & immunita, fluxu mensium rite se habente, persistunt. Ex Viris ii, qui in adolescentia hæmorrhagiis nati, capitibus doloribus frequentibus subjecti fuerunt, item qui hæmorrhoidalii fluxui sunt assueti hoc cessante vel imminato, calculosis & podagricis affectionibus, sub provectione atque, subinde tentantur. Senilem vero ætatem frequentius & calculo renum & vesicæ infestari experientia docemur, quia humores fiunt crassiores & cibi in ventriculo acescent, alvus fit pigror & otium

quoque calculorum generationi multum patrocinatur. Quo fortasse respi- ciens ERASMUS de suo malo ipse ita jocatur. *Illud mirum videri potest, cum fœmina sterile sciant atate, me senectus fecit fœcundiorum: nam in dies crebrius parturio.*

§. IX.

Accedit etiam hoc, quod vix ullus affectus tam crebro ex parentibus in liberis transmigrare observetur, quam calculus & podagra, quippe quæ cum illo, ratione dispositionis solidorum & fluidorum plurimum affinitatis habet, quia uterque adfectus non modo hominibus sanguine plenis, & qui vulgo dicuntur sanguinei, est infestus, sed ambo etiam in quadam nativa debilitate & atonia solidorum, videlicet in nephriticis, renum, in podagricis ligamentorum quæ articulos vincunt, fundati sunt. Crebrius quoque animadvertisimus morbos rheumaticos, arthriticos, podagricos quam facile transmigrare in nephriticos & hos rursus per metastasis in illos transformari & transponi, adeo ut etiam, si a dolore ex podagra quis diu immunis fuerit, in calculosam nephritis facile incidat, & vice versa. Neque raro contingit, utrumque affectum conjunctim & uno tempore atrociter dolore hominem torquere.

§. X.

Quod attinet ad generationem calculorum in renibus, hanc tali modo concipere licet: quando, a nimis vehementi sanguinis appulso, ejusque regressu per venas difficiliori, vasa renum sanguinea nimium distenduntur & infaciuntur, fit tandem, ut minima arteriolarum, ubi in papillulas & syphunculos urinosos abeunt, aperiantur ac disrumpantur, & ita a stagnante & extravasato sero sanguineo, primum parvi abscessus atque ulcuscula generentur, quæ successive majora fiunt; in quibus, quando serum urinosum multis tartareis limosis partibus refertum subsistit,

par-

particulæ gravioreæ & acuminatæ sedunt ac invicem concrescunt, ita quidem, ut materia primo crassior ac rudior fabulosa, dein etiam grana compactiora gignantur, quæ urinæ copiosius secreta beneficio facile eluntur, & sœpius non sine dolore foras propelluntur: ubi igitur tale crassum ac grave fabulum, in urina subsidet, haud dubium calculosæ nephritidis indicium præbet. Quando vero hi acini, vel nuclei calculosi, substantiæ renum ulcerosæ insidentes, successiva accretione majores & ducriores facti, alluvione feri urinosi tartareis partibus referti, vel aliis ex causis ad pelvem & principium ureterum feruntur, majores utique cruciatus, & atrocior symptomatum concursus omnino metuendi sunt, si videlicet, per angustos hos exquisitoris sensus meatus, iter suum versus vesicam confidere debent; ad quam si fuerint delapsi, protinus omnimoda symptomatum, cum ingenti decumbentis gaudio & virium restitutione, fit sublatio.

§. XI.

Quod calculi autem in ipso renum parenchymate ex ichorofo vel sanguineo purulento quodam stagnante humore generentur; id inter alia vel hæc evincunt, quod in nephriticis sœpe quippiam purulentum vel sanguineum, ut olim a CELSO jam notatum, cum urina secedat, calculosis etiam mixtio cruenta familiaris sit, & renes post mortem valde magni flaccidi, atque exulcerati inveniantur: quid quod curatio id ipsum testetur, quæ omnium optimæ, per abstergentia, vulneraria, consolidantia, leniter constringentia perficitur. Neque vero ego inficias iverim, citra præviā substançia renalis lassionem, in pelvi vel majoribus renum syphunculis, ex urina stagnante, materiam etiam tartaream sive arenulas aggeri & concrescere sensim paulatimque in insignis molis lapillos posse. Prout

que de
monstra-
tur.

vero materia illa, sive sit ichoroſa, sive tartarea, ratione coloris, craseos & consistentiæ differt & accretio major vel minor est; varii generis etiam lapilli concrescunt: alii quippe sunt prope faxei, dura constantes substantia; alii friabiles & male compacti, alii pallidi cinerei rubri ac Sanderachini; alii majores, minores, plus minus angulosi & asperi deprehenduntur.

§. XII.

Omnis morbos nephriticos, ut sunt renum infarctus, inflammatio-
nes, exulcerationes, dolores ex cal-
culo, difficultius in senioribus sanari
experientia confirmat; quæ etiam
HIPPOCRATIS testimonio, quod
aphor. 6. Sect. 6. extat, ulterius stabili-
litas. Nam sicut lassiones & exul-
cerationes internarum partium, pro-
pter humorum intemperiem & ex-
crementorum abundantiam, quæ in
provectioni ætate increscit; ita etiam
quæ renibus & vesicæ inhære-
scunt, propter urinæ ingentem acri-
moniam, difficultime ad sanationem
perducuntur.

§. XIII.

Si quando dolor atrox per plures dies & noctes non remittit, sed affi-
duis torquet, & vires valde atterit ac pre-
nullis vult medicamentis expertissime giant.
alias virtutis cedere, omnimoda
quoque urinæ accedit suppressio, cum
extremorum frigore & convulsione
tendinum, mortem in propinquuo esse,
indicio est. Maxime vero omnium,
dolor ex calculo, iis, exitum atque
periculum minatur, qui antea diuturno animi moerore macerati, vires
amiserunt: nam major virium mox
sequitur dejectio, partiumque internarum sphacelatio. Neque res boni
omnis est, quando lapis, longo tem-
pore ureteri continuo inhærescit; pe-
rit enim ciborum inappetentia ac
digestio, nautea vero & firmiter ca-
natus ad vomendum, anxietasque
diutius persistens, tandemque len-
tus hecticus calor, virium & carnis
sub-

substantiam penitus consumens, mortem accelerat.

§. XIV.

Tabes renalis per rimis. Post mortem mirae sepe magnitudinis valde compactus & ramis majoribus instructus calculus in rebus, qui toti per exulcerationem consumti & membrana duriore testi comparuerunt, repertus fuit, cum de dolore per vitam nunquam quis fuerit conquestus: & tali malo affecti tabe moriuntur, quæ renalis vocatur.
it. inflammatio superveniens. Quidam vero ex calculi doloribus brevi tempore succumbunt, & morbo acuto pereunt, dum acutissimum dolorem, ventriculi vel intestinorum, tandem inflammatio subsequitur: quidam ob totalem urinæ suppressionem, in hydropem pectoris, lethargum vel convulsiones incident.

C U R A T I O.

§. I.

Indicationes curatorie. Momentum profecto omne curationis positum esse, videtur, tum in facili & ab omni molestia immunit calciorum exclusione, tum in impedienda sabuli excrementitii generatione tanquam occasionis & objecti saevissimi doloris & aliorum symptomatum. Longe enim alia medendi via ac ratio est in ejus accessione; alia extra eam, quæ præservatoria est.

§. II.

In paroxysmo dolor & spasmo sedandus. In ipso paroxysmo, ubi symptomatum ingens est exacerbatio, & atroci dolore tota oœconomia functionum vitalium turbatur, primo omnium eo respiciendum est, ut dolorum vehementia idoneis remedii mitigetur, atque spasticæ stricturæ, quæ non modo partes vicinas, sed totum subinde nervosarum partium systema, lege consensionis afficiunt, idoneis remedii componantur ac solvantur; idque maxime eam ob causam, quia sub tanto spasmorum, qui meatus urinarios constringunt, im-

petu, calculi iter per ureterem in vesicam ægerrime perficitur. Inter probatae vero & spectatae virtutis remedia, quæ huic intentioni satisfaciunt, non possum. non liquorem meum anodynū mineralē, ob efficacem & securum usum, dilaudare; quippe qui parciori sed repetita dosi sumtus, spasmos circa primas vias sedando, molestam illam sensationem, naufragiam ac vomitionem egregie tollit. Qui hujus autem medicamenti copia caret, huic spiritum nitri, rite, methodo nostra, quam præscripsimus, in Observ. physico chym. præparatum, plurimum commendamus; hic enim nullo amplius acre imbutus, blanda sulphurea exhalatione, & flatus discutit, & spasticas stricturas relaxat. Commodissime vero hi spiritus cum aquis sedativis, ut sunt, cerasorum nigrorum, florū acaciæ, sambuci, papaveris rhœados, tiliæ, primula veris, liliorum convallium, ulmariae, & præcipue omnium florū chamomillæ & summittatum millefolii, adjecto syrupo papaveris rhœados vel albi: vel etiam in brodio carnis, cum aliquot cochlearibus olei amygdalini recentis & purissimi, sine tostione prævia parati, exhiberi possunt. Spectant hoc quoque emulsiones, ex amygdalī dulcibus, feminib[us] 4. frigidis, papaveris, milii solis, semine dauci, cum jam dictis aquis præparatae, & syrapi papaveris albi sufficienti quantitate edulcoratae. Quando vero leniora hæc, dolori mitigando non sufficiunt, ad paulo validiora transeundum, & quidem opiate, per aliorum additionem valde correcta & secura reddita, cuius generis sunt: massa pilularum Wildegansii, Starckii, laudanum liquidum Sydenhamii, & cœlestis theriaca; item. trochisci de Alkekengi; qui ob virtutis præstantiam & ingredientia dolori multe aptissima, laude omnino dignissimi sunt.

§. III.

Laudan-
sur ex
nitro.

§. III.
Præter hæc dicta, nitrosa, &c inter hæc nitrum tantum purificatum & crystallisatum, vel artificiale ex spiritu nitri & sale tartari compositum, vel nitrum antimoniacum, in compescendis præcalidis gravibus & acutis doloribus cum sanguinis & humorum exacerbationibus junctis, certe omnibus aliis remediis generibus, virtute ac seculo uso, superiora sunt, atque in morbis nephriticis laudem insignem promerentur. Quam optime vero cum cancerorum lapidibus, cum cinnabari, vel pulvere Marchionis & aliquot granis trochisorum alkekengi vel massa pilularum Wildegansii miscentur, & cum emulsione vel sero lactis dulci propinantur.

§. IV.

clysteres. *Enim vero, ubi dolorum & spasmodorum vehementia fere intolerabilis est, sola interna huic sedando non sufficiunt, sed externis etiam occurtere oportet.* Inter omnia autem desideratissimi effectus clysteres sunt, ex emollientibus floribus, præsertim malvas hortensis, sambuci, papaveris rhœados, millefolii, chamomilæ vulgaris, & verbasci, cum sero lactis decoctis, addito syrupo dialtheæ Fernelii, nitro & sale Ebsoniente confecti. Quando inferior recti & coli pars constrictissima est, ut flatus transmitti nequeant, sed ad superiora vergentes, anxietates augent, enemata ex oleis & pinguedinibus, ano injecta, mirabilem attulisse opem, non una sed pluribus vicibus a nobis est observatum. Alvo aperta, flatibusque sic exitu parato, stomachi vomibunda inversiones, cum anxiis præcordiorum intensionibus, protinus remittunt.

§. V.

nec non
balnea
magne
efficacie
sunt.

Deinceps, in mitigandis hisce doloribus, veterum inque primis HIPPOCRATIS methodum, ut antiquissimam, ita optimam maximique habendam esse censemus, dum lib. 5.

de intern. affection. hæc tradit: cum dolor in renibus presserit, multa calida lavato, & tepefactoria, qua parte maxime dolet, adhibeto. Idem remedium TRALLIANUS libr. 9. cap. 4. his verbis valde commendat, ornamum optimum est balneum, ut quod non solum mitiget, sed & curare posse: nam colicos frequenter solummodo lenit, & nephriticos vero utraque ratione juvat, ut tantur vero ægri loci inunctione, chammelo, in balneo & diutius morentur, non semel tantum in die sed bis vel ter lavare expedit. Et profecto, balnea & infessus ex aqua dulci, præsertim pluviali temperate calida, in sistendis acerbissimis tormentis, vix habent soi similia, si modo cœbrius repetantur. Atquillimenta, ex axungia humana, cati sylvestris, canis, it. linæ castorei, unguento dialtheæ parata, vel etiam vesicam, decocto florum emollientium antea recensitorum, ex lacte, repletam, ac parti intense dolenti applicatam, singularem plane exercere virtutem & efficaciam, multiplici uso confirmatum habemus.

§. VI.

Quandocunque, legitimum hotum usum notabilis spasmorum sequitur remissio, pulsus sedator & mollitor evadit, calor madidus ac æquabilis totum corpus occupat, & flatus probe ex ano descendunt; protrusio calcii idoneis remediis, sub debita tamen adhibita cautione, tentanda venit. Vidimus ad obtinendum hunc scopum varia præsentissimi sulle effectus, atque inter hæc largissime assumptum infusum herba veronicae & petroselini, vel ex seminibus dauci, selleri, foeniculi, baccis alkekengi, radice glycyrrhizæ, summitatibus millefolii, paratum, eximum attulisse levamen, cum primis si potus quodammodo spirituosos, ut malvaticum juniperinum, horum usum excepterit. Mirabilem quoque, in edendo ex viarum angustiis calculo, deco-

decocti antinephritici *Foresti* largiorum potum, adjuncto corporis motu, efficaciam subinde præstissime, a nobis observatum est. Sed interdum paulo fortioribus pellentibus opus est, quæ inter eminent ac tutissima sunt mater perlarum, vel cochlearum aut testæ ovorum usæ cum succo citri in convenienti vehiculo exhibitæ.

Methodus Præservatoria.

§. I.

Præservatio in progressu morbi diffisilis. Præservatio pernicialis hujus malii, uti in principio quidem facillima, ita in progressu, si ex renum magno vitio & exulceratione, calculorum prognata fuerit ubertas, dolorumque crebrior recursus, multis sane difficultatibus implicita ac circumsepta est. Nam quia, complures, ut supra exposuimus, ex sanguine vel præter naturam exsuperante, vel multorum incongruorum viscidorum ac acidorum alimentorum assumptione crudiori ac spissiore reddito, quam facile in hoc malum incident; certe sanguinis decenti missione, motu & exercitatione corporis sufficiente, nec non potionibus diluentibus, aquis medicatis præsertim *Selteranis*, item fero lactis dulci & acidulo, ad arendum molestissimum hunc & extiatalem morbum, nihil facile præstabilius ac efficacius reperire licet.

§. II.

Quando traumatis conseruantur. Ubi vero continuus fit calculorum partus, opus est, ut ea in usum ducantur, quæ virtute traumatica leniter consolidante & adstringente gaudent; quare a multis retro temporibus est observatum, imo plebeis & domesticis constat experimentis, decoctorum vel etiam infusorum, ex herbis vulnerariis, & aqua vel cerevisia paratorum, ac cum butyro insulso, vel cum melle mixtorum longiori usu, quosdam penitus a malo hoc calculoso fuisse

liberatos: cujus generis præcipue sunt, equisetum, virga aurea, hedera terrestris, fragaria, marrubium album, veronica, parietaria, milletolum cum summitatibus, malva, cortex radicis acacia, lycopodium, bacca juniperi tostæ, fraga exsiccata, acini & fructus cynosbati tosti; ex quibus speciebus, cum melle Prussico albo, quod identidem consolidante & balsamica sua virtute renum morbis admodum amicum, electuarium paratum & mane ad cochleare dimidium usurpatum, superbibendo infusum Thee, ingens solamen iis, qui per multos annos nephritide calculosa laborarunt, atculisse, observatum est.

§. III.

Alia jam, præservandi a calculo, *Quando alcalina.* via ac ratio suppetit, per alcalina, quæ acidum & glutinosum, tanquam præcipuum calculosæ concretionis fundamentum, domant atque destruunt; & hinc est, quod cancrorum lapides, mater perlarum, testæ ovorum, conchæ & cochlearum simpliciter paratæ, vel etiam usæ, lapis lyncis & judaicus, nec non pulvis famigeratissimus *Volkhammeri*, qui ex lapidibus pretiosis calcinatis concinnatus creditur, vel simplex tantum oleum tartari per deliquium, liquor cinerum clavellatorum, vel nitri fixi, tinctura tartari, antimonii acris, frequentius in usum ducta, calculorum generationem egregie impediant, & ab atrociori dolorum concursu corpus vindicent.

§. IV.

Sunt quoque adhuc plura, non minoris ad præservandum efficaciam *demulcentia.* præsidia, quorum legitimus usus calculosis admodum observatur proficuus. Et haec sunt quæ oleosis, pinguisculis ac temperatis & quodammodo anodynis, demulcentibus particulis, spiculorum salinorum unionem, quæ ad concretionem solidescientem est necessaria, impediunt; quan-

quantum enim pinguia, exigua etiam dosi admixta, crystallisationis negotium impedian, ex chymicis per quam notum est. Ad hanc classem merito referre possumus, fructus & semina quæ blando & dulci oleo gaudent, ut sunt, semina 4. frigida majora, millii solis, saxifragæ, papaveris albi, cardui maria, amygdalæ dulces & amaræ; nuclei cerasorum & malorum Persicorum, quæ vel in pulverem cum saccharo vel in emulsionem redacta, frequentiusve usurpata, non satis ab iis, qui huic adfici obnoxii frequenter sunt, dilaudari possunt. Neque vero, inter optima & specifica ad renum vitia corrigenda præsidia, radix glycyrrhize, silentio prætereunda est, ejus pulvis vel infusum in demulcendis & temperandis acribus salium particulis, in detergendis mucositatibus, magnæ efficacia est. Atque etiam ex compluribus aliis millefolium ejusque summitates in renum vitis specificam plane & mirabilem edunt efficaciam, quando ejus infusum vel decoctum per longum satis tempus quotidie usurpatur. Vidimus hoc modo aliquot ab omni calculosa affectione, cui diutius obnoxii erant, prorsus liberatos: nam hæc herba multiplici ratione proficia est, & præter virtutem consolidantem & demulcentem, ob oleum vere anodynnum quod exakte cum oleo florum chamomillæ ratione coloris & virtutis convenit, dolores & spasmos secandi efficacia pollet.

§. V.

*Alio: ha-
benda
ratio.* Ante omnia vero, sicut in cunctis morbis chronicis, ita etiam in calculo præcavendo, ventriculi & ejus digestionis, nec non alvinæ excretionis, ut hæc singula se recte habeant, ratio habenda est. Placuit mihi hac in re insignis plane locus ZETII, quem cap. 16. pag. 177. prodidit, ita se habens: præservat a calculo moderatus cibus bone confectionis; nam cruditates non solun-

exasperant morbum, sed etiamignunt; inde abstineant agri, a satiate, a cœna, saxe vomant & absintium assidue bibant, ac per certum tempus per ventrem se purgent. Cibos sumant, e quibus neque satiates neque cruditates eveniunt. Urimam etiam cipientibus utantur, posnacam in dies edentes valde percoctam, fœniculum, pulegium, calaminthen; ex marinis Strombos, locustas, gammaros; per plures autem dies radicis eryngii decoctum bibant, similiter dictamni. Oportet aquam per omnem vitam esse purissimam & percolatam, vinum tenue album, urinam ciens; exercitationibus utendum modicis & frictionibus in balneo, ex nitro assato, ac fœce vini usta & pumice. In quo genere TRALLIanus quoque audiendus, qui l. c. hanc diatæ rationem præscribit: probe faciunt, qui bibunt aquam & evitant omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres, sed & crassi succi cibos, ut similaginem, ova dura, placentas & quæ ex lacte parantur, ipsum lac & caseum, item vina admodum nigra & austera. Ad hæc cavendum, ne agri culcitris indormiant ex anserum plumis confectis, hæ siquidem renes valde calefaciunt. Præterea, ne multum stent, magis vero studendum, ut vel moveantur vel confideant. Et paulo ante: bibere oportet, ante omnem cibum, aquam tepidam: nihil renes enim a recreamento magis vacuos temperatosque reddit, ut non amplius calculos procreare possint; nam temporis spatio igneus eorum calor a tempore aquæ extinguitur. Exinde dubio omni procul prodiit secretum illud eximium ZECHII relatum in suis Consultation. nempe haustus aquæ calidæ ad libram unam circiter, statim ante prandium. Et CAROL. PISO, multis ante Zecchium annis, hoc idem aquæ calidæ remedium comprobavit, dicens, quod post primum excretum calculum, nunquam in posterum

sterum alii geniti fuerint, si quis usum hunc aquæ calidæ multo tempore continuaverit.

Cautela & observationes practicæ.

§. I.

Respicie. At vero, cum ad persanandum dum ad corpus ægocin*us*, ac protelandum hoc malum, potissimum medici momentum in eo sit repositum, ut pro differenti corporum constitutione, ratione ætatis, tempore, læsionis functionum, nec non sensibilitatis aliarumque causarum, alia atque alia medicamenta, debito tempore, & convenienti ordine adhibeat; e re utique duxi, quasdam cautions & observationes, in praxi utiles atque necessarias, hoc loco subnoscere. Primo omnium, attente & penititate considerare oportet: remedia, quæ præservationis vel curationis gratia in usum veniunt, non æque omnibus convenire, neque semper eundem effectum ac levamen præstare, ob differentem valde & mutabilem corporis, ratione fluidorum dispositiōnem, & solidarum plane peculiarem texturam & inde pendentem sensationem, quæ Græcis idiosyncrasia vocatur; quare interdum variari debent medicamenta, siquidem successu temporis, etiam ipsa natura iis assuefere solet, ut effectu laudato, quem ante ediderunt, nunc carere observentur.

§. II.

Sæpe natura spasmorum calculum præstudiis. Observatum quoque sèpius est, ex improviso, naturam nullis remediis coactam, sed sibi relictam, se ad calcum protrudendum accingere & feliciter id præstare. Simile quid subinde in partu animadvertisimus, cum non ante facile remedia proficiant aliquid, quam in subsidium venerit natura: qua de causa sit, ut empyrii sèpe suis inanibus remediis gloriam reportent. Solers itaque

& in sanandis morbis occupatus medicus, id probe attendat, quod natura sèpè sola, nulla remediorum ope adjuta, a violentis spasmis, doloribus & motibus remittat & conquiescat; (id quod tamen non intellectui imaginario vitali adscribendum est; cum causæ ac rationes physiæ subsint,) siquidem magna prudentiæ medicæ pars in eo consistit, ut temporis illud momentum, quo natura se ad agendum & corpus a morbo liberandum armat, sedulo æstimetur. Hinc consilium quandoque est, ubi ad tempus frustra adhibita fuere medicamenta, subsistere ac ferias agere, ut quies quasi naturæ concilietur, quia ipsa sèpius sua sponte & prater omnium opinionem, plus præstat, quam medicus cogendo & stimulando.

§. III.

Quemadmodum diuretica & urinam pellentia, eaque paulo acriora & vehementiora, ut sunt terebinthacea, juniperina, succinata, aliacea, porracea, & ex petroselino parata, neque ad præservacionem in plethorics, neque in paroxysmo nephriticō, sive is simplex tantum sit, sive simul calculosus, unquam proficiunt, sed malum deterius redundat atque symptomata exasperant: ita prudens eorum usus non plane damnandus & interdicendus est. Quare in plebeis, robustioribus, humidioris & segnioris naturæ corporibus, præsertim ubi præservandi fine exhibentur, non modo tonum vasorum renalium roborando, sed & copiam feri impuri tartarei, per renes, ejiciendo, commodam collocare operam possunt.

§. IV.

Ubi tempestiva, modica ac æqualis motio sive vestio, naturæ in calculis pellendis admodum idonea, & congruorum pellentium usum diluentia, præsertim quæ mole operantur, ut acidulæ, thermæ, lactis serum, egregie secundat, ut celeriter sèpe.

sæpe calculi, e sede sua, quam occuparunt fixam, dimoveantur: ita etiam observatum fuit, intempestivam vescionem vel equitationem, plurimis damnum attulisse, quia e sede sua non incommoda calculum expulsum, in transversum egerunt, ut nunc acutis suis angulis membranæ sensili nerveæ magis fuerit allus; subsequeute inde majori spasmorum saevitia, imo lethali quandoque ischuria.

§. V.

Tempestiva & sufficiente venæ sectione non modo ad præservandum a calculo, non facile superius ac efficacius reperitur præsidium, præsertim, ubi corporis natura ad excernendam nimiam sanguinis quantitatem est disposita; sed ejusdem quoque remedii utilitas, non raro in ipso paroxysmo sese commendat, nimirum, ubi plethora cum pulsu celeri, magno æstu ac intensa siti associata est. Doloris enim vehementioris ea indoles ac vis est, ut, spasmis liberiorem sanguinis circuitum per venas maxime impedientibus, cum impetu ad alia incongrua loca copiosum sanguinem adducendo, epilepsiam, convulsiones, lethargum, delirium, apoplexiā sanguineam, mictum cruentum, febres inflammatorias & hujus generis alia, de quibus nobis exempla sunt nota ac obvia, concitet; quæ singula prudenti sanguinis missione averti possunt.

§. VI.

In scorbuticis calculosis, diluentia ac demulcentia danda. Quando nephritis calculosa incidit in corpus scorbuticum, sive impuris excrementitiis humoribus refertum, & nostro tempore, purpuræ grastanti chronicæ obnoxium; sub ipso paroxysmo, concurrente simul impuritate scorbutica, varia & terroris plena se immissent symptomata, quæ insigne, in præscribendis medicamentis, medici prudentiam requirunt ac desiderant. Neque enim facile alia, nisi diluentia, ac demulcentia, ut serum lactis acidulum, vel dulce,

præbenda sunt; ab omni cerevisia & vini potu abstinentem; serum lactis vero calide, vel temperate frigidum sumtum, cum temperatis diaphoreticis, tali in casu maximi usus fuisse observavimus.

§. VII.

Balnea, utut quandoque præsentis. *Plethora-*
si levaminis & magnæ necessitatis
et a bal-
neis ab-
sint; abstinentem tamen ab iis pe-
nitus, in plethoricis nimis repletis &
pinguis corporibus, ubi simul spi-
randi angustia ac difficultas adest.
Ante itaque horum ulum, solvenda
plethora, alvus laxanda, & dolo-
rum vehementia compescenda.

§. VIII.

Non raro jungitur affectioni calcu-
losæ colica ex hemorrhoidum vitio
convulsiva; prudentis hinc medici
est, hæc omnia probe discernere, &
caute in prognosi & curatione proce-
dere: maxime omnium vero, ratio
est habenda atrocis intestinorum do-
loris, ut vel venæ sectione, vel hi-
rudinum applicatione, vel alvi,
per clysteres commodos, apertione,
ei succurrat. Sæpe fit, ut, quando
calculus uno & maximo item fertur
per ureteres, intolerabilis per dorsum
& totius abdominis regionem, cum
magna virium jactura oboriatur do-
lor, qui tamen protinus uno quasi
momento conquiet, quando vide-
licet celeri itinere calculus in vesi-
cam delabitur.

§. IX.

Ubi diutius torquet dolor & virium In veritate
adest prostratio, ætas quoque senilis prostrati-
vel animi mœror præcessit, pulsuum-
que observatur debilitas; opata in-
star veneni esse fugienda, inter que
pessima massa pilularum de cynoglos-
ta, & ratione, & experientia multi-
plici confirmatum habemus. Præ-
stat tunc potius naturam analepticis
leniter spirituosis aquis, ut sunt, aqua
menthe, melisse, liliorum conval-
lium, cinnamomi sine vino, addito
uno vel altero grano ambre & extra-
cti croci, modico quoque vini usu,
erit.

erigere , nec non exterius , nimis debilitatum tonum intestinorum , limentis spirituosis balsamicis , quantum fieri potest , restituere .

§. X.

Inter aquas mineralibus & quidem thermalibus , nullæ sunt , quæ , ob calcaream qua pollut terram , potenter , resolvunt & exturbant , quam ipsæ sunt . Caroline ; cum quibus tamen provide agendum . Vidimus , post harum usum internum , intra mensis spatium , quingentos & ultra calculos , leves , qui lentis & ciceris magnitudinem æquabant , successice fuisse excretos . Sed postea blande consolidantibus & temperate balsamicis opus est , ut cava-
tes renum calculis exclusis exhaustæ , in se coeant & carne repleteant : omnium vero securissimum , & usui tam præservatorio quam curatorio , aptissimum esse fontem Selteranum , qui præter subtiliorem aquam , sal alcali-
num in sinu suo fovet , neque minus in vitiis & læsionibus vesicæ reliquis omnibus remediis superior est , innu-
merabili experientia evictum habemus & scribimus . Dein quoque , ubi magna scorbutica humoribus inhæret impuritas , atque simul adest partium exulceratio , dictum fontem cum late , debito modo miscere , & suffi-
cienti satis temporis spatio adhibere , consultissimum est .

ENARRATIONES
MORBORUM.

OBSERVATIO I.

*Vertigo cum ne-
phritis calculosa ex pla-
thora .* Vir generosus in dignitate Consilia-
rii Cameræ constitutus , quinquage-
narius , complexionis admodum ro-
bustæ , quindecim jam ante annos a
tertiana febre , insignem sibi contra-
xit ventriculi imbecillitatem , cum fla-
tentia abdominis & crebrioribus ru-
tibus conjunctam . Ante X. annos
vertigo caput crebrius corripuit , quæ
superveniente e naribus hæmorrhagia

mox cessavit . Posteaquam vero circa æquinoctia venæ sectionem admittere coepit , immunis prorsus ab hoc affe-
ctu permanisset , nisi venæ sectio fuerit omissa , ubi brevi post insultum quandam de novo est expertus . Sexen-
nium elapsum est , ex quo graviores sœpe numero a calculo renis sinistri passos est dolores ; postquam nempe vitam magis sedentariam coluit . Ma-
jor doloris atrocia in regione inguinali sentitur , calculo circa introitum ve-
sicæ persistente , & tunc pauca cum ar-
dore prodit urina : acerbior in lecto
dolor est , mitior , si ambulare potest
atque etiam sub motu & largiori insu-
fi Thee potu ; ita calculi descensum in
vesicam cum insigni levamine sœpius
procuravit . A clysteribus & linimen-
tis anodynis , item ab oleo amygdala-
rum dulcium inter sumto , insigne per-
cipit levamen . Si dolor urget , facies
flava evadit , corpus sudore frigido
perfunditur , adeo nausea , vomitus &
præcordialis anxietas . Debet sedulo
sibi cavere a cibis qui inflant atque et-
iam a frigore boreali : ab his enim pa-
roxytmus facile resuscitatur . Extra ac-
cessionem urina multum semper sabu-
li continet . Colica etiam flatulenta
sœpius ipsum affligebat . Consilium
quod a me expetiit , dedi , ut mutaret
potum , qui erat domestica crassioris
substantiæ cerevisia : & nostram Læbe-
junensem diuretica & antinephritica
virtute celebratissimam biberet . Dein
suasi , ut singulo mane infusum sum-
mitatum millefolii cum radice glyzir-
rhyzæ largius paulo sumeret , & ter
in mense pilulas meas balsamicas ma-
ne usurparet , sumpta prius preceden-
ti die circa somniis , salis mei ape-
ritivi drachma . Essentiæ quoque cat-
minativæ B. Wedelij cum liquore ano-
dino mixta usum interpolandum , ad
flatuum discussionem ordinavi . Qua
methodo per aliquot jam annos a do-
lore ex calculo prorsus liberatus est :
neque a flatibus & ructibus tam mole-
sta , ut antea , sentit incommoda .

Epicrisis.

Et vertiginem & nephritidem calculosam in hoc ægro, tum a nimia sanguinis & humorum exundantia, tum a pravo primarum viarum statu originem suam accepisse, extra omnem dubitationem collocatum est, ubi concurrens vita sedentaria & potus cerevisiae crassioris & minus diureticæ, ac flatuura in primis viis, præfertim quæ hypochondrium sinistrum occupant, copia, ad calculorum ortum & generationem, in sinistro præserium rene plurimum contulit. De cerevisia Lobejunensi, quæ ex aqua valde levi & subtili, scaturiente ex petroso tractu, coquitur, insuper valde tenuis, minus spirituosa & alba est, ac cito per urinam decedit, hoc memoratu dignum est, quod & a calculo & a podagra omnes fere immunes sint, qui ordinario eam bibunt. Maximum profecto & curationis & præservationis a calculo momentum, in quotidiano congruo potu positum est: hinc qui dispositionem, sive hæreditariam, sive adscititiam ad calculum habent, cerevisias inebriantes & crassiores omni studio vitare debent: laudantur vero cerevisæ tenues, albæ, valde diureticæ, & quæ non flatu ingenerant. Ubi non salubris haberi potest cerevisia, ego decoctum, radicis eryngii, graminis, asparagi, chinæ, scenicali, eichorei, glycyrrhizæ, addito pauxillo nitri ad potum, non sine insigni subsequenti successu commendare solitus sum. Neque omne vinum calculosis utile est: Mosellanum ad præservationem, quia citius per alvum & urinam redditur, omnium est optimum. Ubi autem calculi partus ex labe renum inveteravit, vinum mulsum bonæ notæ vel recens Hungaricum moderata dosi sumtum est valde proficuum.

OBSERVATIO II.

Vir in 50. ætatis anno constitutus lautæ semper ac vinosæ diætæ assuetus, sanguinis ac succi plenus, ceterum satis sanus, inopinato in ipso itinere, per aliquot milliaria curru quo vehebatur succussus, dolore in regione lumbari valde acerbo afficitur; domum reversus dolor incrementat, & ad umbilici regionem se protendit. Accedit tussis vehemens, alvus constipata, & urina guttatim cum ardore exit. Remittunt per intervalla dolores. Nihil ad sopiendum dolorem, & quod ad facilem calculi exclusionem pertinet ex remedii diæteticis & pharmaceuticis fuit omnissum: sed citra præsentaneum effectum. Ex consilio amici sumis infusum Thee, cum aliquot olei amygdalarum dulcium unciis, ad menfuram & ultra. Inde excitatus est vomitus, & cum magno nisu multa ejecit aquæ & pituitosa: non ita multo post, dolores & alia symptomata quieverunt, & altero die insignis magnitudinis calculus cum urina excretus est. Petiti a me ad recidivam præcavendam remedium. Suasi venæ sectionem ter in quovis anno celebrandam & infusum herbae veronicæ, summitatum millefolii & radicis glycyrrhizæ multa in quantitate sumendum. Et nunquam abhinc rursus a calculo molestias persensit.

Epicrisis.

Non semel, sed saepius, a motu paulo fortiori per currum vel per equitationem, calculum protrusum derepente acerbissimas passiones produxisse novimus. Evenit hoc, quando in pelvi concretus calculus latitat, salvo renum parenchymate. Annotavi quoque aliquoties, & a motu corporis validiori & fortiori in vomitum nisu, lapidem ex angustiis meatuum, insperato in vesicam elicitem fuisse, præsentatio mox sequente levamento &

symptomatum mitigatione. Venæ sectionem, ubi sanguis abundat, ego ad præservandum & calculum arcendum, maximi semper feci & facio: nam sicut hæmorrhoidum fluxus, testante id Hippocrate vetustissimo medicinæ parente, ab hoc malo præservat: ita ubi hic fluxus deficit, vicariam venæ sectionem præstare operam posse, & sanæ rationi & experientiæ consentaneum est.

OBSERVATIO III.

Dolor nephriticus notus, venæ sectiones, etiæ sublatus. Vir qui vix quadragesimum annum attigit, sanguineæ constitutionis, texturæ mediocris & macilentioris, nullo unquam morbo nedum calculo correptus fuit, comedationibus & poculis sæpius interfuit; drepente in vehementem circa regionem lumbarem incidit dolorem, cum horrore & refrigeratione extermorum. Succedit vehemens æstus cum pulsu celeri & magna siti: alvus est dura & flatibus distenta. Quidam morbum pro subluxatione vertebrarum dorsi, ad quam tamen defuit occasio, existimarent; alii habebant pro febre ardente. Sed quum conatus adesset ad vomitum, & urina pauca cum ardo-re proflueret, circa vias urinarias vitium subesse judicavi. Dedi, præmissis clysteribus & fomentis externis, liquorem anodynum, decoctum hordei cum amygdalis dulcibus in emulsionem redactum; cui portio nitri ad æstum restinguendum adjecta fuit. Sed levamenti inde nihil sequebatur. Quum vero sitis, æstus & dolor urgerent, die, quæ erat quarta, ad arcendam quam verebar inflammationem, venæ sectionem in pede suasi; & sanguine ad aliquot uncias educto, non ita multo post magna remissio omnium dictorum symptomatum sequebatur. Continuavimus cum ante dictis remedii, alvus clyster aperta, urina liberalius profluit, dolores sopiti, sudor occupabat totum corpus, & septimo ab invasio-

ne die, per urinam, arenacea tantummodo grana, splendida & acuminata, nullus vero calculus prodibant.

Epicrisis.

Dolores ex lumbis aciores quando repente invadunt, febrilem interdum typum servant: quo sæpe factum est, ut morbus pro febre ardente habitus fuerit; quod maxime sit in sanguine repletis, quando plexus nervi mesenterici vel a flatibus in duodeno vel colo stagnantibus, vel potius ab adjacente arteria meseraica superiore sanguine valde distenta fortiter premitur, & demum ipsi renes & ureteres nervosi per consensum sive secundario compatiuntur. Rectius vero secundum meam sententiam hic morbus, dolor nephriticus notus vocari potest, ut videmus in Riverii observat. 58. centur. 2. Frustra tunc sola antinephritica opponuntur, quæ nisi per venæ sectionem, sanguinis in locis affectis congestio tollatur, omni propemodum effectu carent. Misso sanguine clysteres carminativos alcum subducentes, & quæ nimiam sanguinis ebullitionem ledant, præstanteam opem tulisse observavi: quin imo in dolore valde acuto a calculo, venæ sectionem ad arcendam inflammationem in corpore sanguine pleno salutarem, & feliciorem semper medicamentorum operationem animadvertis, quo ex TRALLIANO lib.9. insignis locus respicit: *Si sanguinis copiam subesse aut inflammationem una cum calculi obstructione suspicieris, venæ omnino sectionem prius adhibeto: ita nempe haud delinques, si medicamentum offeras; laxatione enim facta, & meatibus rarefactis multo magis auxilia quæ adhibentur propriam vim ostendunt. Quæ sententia observatione 15. centur. 2. a RIVERIO notata magis adhuc confirmatur: vidua dolore nephriticæ vehementissimo vexabatur, qui a rene sinistro ad pubem usque, secundum longitudinem ureteris exporrigerabatur,*

sum

cursus urinæ acrimoniae. Quod frequenti
misericordia: huic neque clysteres cum
aqua benedicta neque cum terebin-
thina; neque cum laudano, neque
vomitus ingens, qui sponte veniebat;
neque semicupum; neque laudanum
assumum quicquam prosuere, dolore
clamoso per biduum perseverante.
Tandem aperta fuit vena malleoli,
Quod statim sanguine missa dolor in-
gens quievit, superflite tamen dolo-
re obtusiori.

OBSERVATIO IV.

Nephritis
calculosar-
is heredi-
taria.

Fœmina annos quæ habebat qua-
draginta a parentibus calculosis nata,
ante viginti jam annos, bis minimum
in anno tormento hoc cum consuetis
symptomatis comitato, excrucia-
ta fuit. Singulis noviluniis allii quædā
frustula cum spiritu vini ad præser-
vationem sumunt. Venæ sectione rarius
usa, ac jam modo per annum & ultra
eam omiserat. Per sex menses per-
molestus in lumbo sinistro continuo
afflitus dolor, qui protensus ad infe-
riora, ejusdem pedis in eodem latere
movendi potentiam & contracturam
induxit. Perpetuus in urina emitten-
da est ardor. Afflito latere incum-
bere ægerrime potest: nam increvit
semper dolor & fit acerbior. Abdo-
men flatibus turget, appetitus lan-
guet, liquida plus justo appetit, pe-
des semper frigidi, ut ab admotis
valde calidis integumentis vix incal-
escant. Menses quidem tempus suum
adhuc servant; sed quando imminent,
atrox dolor & spasmus totum abdo-
men pervadit. Quæsitus a me fuit,
anne hoc malum tolli penitus possit,
& an thermæ Carolinæ proficu-
sint?

Epicrisis.

Plura sunt in hoc casu, quæ & ob-
servationem & censuram merentur.
Primo uti omnes ægritudines, quæ a
parentibus ad liberos transmittuntur:
ita etiam nephritides calculosæ diffi-
cillime evelli & eradicari possunt, &

mox in adolescentiæ vel juventutis
annis sese sistunt, atque accuratissi-
mam vitæ rationem expostulant:
nam calculosam hæreditariam dispo-
sitionem, ut eleganter dicit ARE-
TÆUS lib. 2. cap. 3. secundam, ster-
ilem nemo reddere potest: facilius
enim est uterum a pariendo prohibere;
quæ si non observatur, & morbus per
multos jam annos inveteravit, nulla
convalescentiæ spes superest: ob
hanc potissimum rationem, quia af-
fectuum hæreditariorum ratio in so-
lidarum partium nativa labe & vitio
posita est: quod in actum deductum
crescentibus annis majorem vim ac-
quirit. Quam perniciosus sit, in tali
affectione hæreditaria, pellentium ut
allii & aliorum præmaturus usus, ex-
primi vix potest: nam causticis ejus-
modi rebus plus adhuc renum substan-
tia læditur; quam ob rem non mirum
est, in valde miserum ægram no-
stram statum fuisse conjectam, cum
procul omnini dubio in rene sinistro in-
signis ulcerosa jam præfens fuit cor-
ruptio: ubi ab aquarum mineralium
& præsertim Carolinarum potu, qui
si proficere debet, largissimus sit ne-
cessus est, lubens abstineo, ne subsi-
stentes aquæ solidæ partis corruptio-
nen magis augeant. Ego sub talis sta-
tu ad mitigandos dolores balnea aque
dulcis commendare soleo; si que acer-
biores sunt, trochiseos de alkekengi,
qui moderationi, ad scrupulum, dosi,
præfens solamen afferunt. Extra pa-
roxytmum decocta & infusa ex mitio-
ribus traumaticis, omnium conve-
nientissima sunt: inter quæ radix
altheæ, eryngii, herba hederæ terre-
stris, veronicae, virge aureæ, urti-
ce mortuæ, summitates millefolii,
baccæ alkekengi, cortex radicis aca-
cie, semen dauci, sceniculi, item
baccæ juniperi toste, si ex iis paretur
infusum, & adjecto melle Prussico al-
bo dulcificetur, longo & prestabili
usu & efficacia sese admodum com-
mendant. Huc pertinet etiam deco-
ctum antinephriticum *Foresti*, quod

ob insignem aptorum ingredientium virtutem non laude sua defraudandum est ; pariter syrpus dialtheæ Fernelii : atque decoctum herbæ equiseti ex cerevisia alba , adjecto bu-tyro insulso & melle , plebejum & domesticum quidem , sed non spernendum remedium . Plus enim semper efficacæ & securitatis a temperatioribus istiusmodi Galenicis & simplicibus , quam a pretiosis exoticis , ut sunt acmella , pareira brava & id genus alia , & activioris indolis chymicis sperari potest . Nam , ut ingenue fatear , utriusque quo simplicior , eo gravior & salubrior ; ita etiam idem de medicamentis valere existimo . Ego quoque in tam inveterato malo , non sine insigni fructu , medicamentum leniter alvum subducens , ex manna atque rhabarbaro , per infusionem paratum , vel rhabarbarum cum terebinthina in pilulas redactum commendare & usurpare soleo : nam qui calculos & non integros habens renes , ii:quam maxime sibi provide-re debent , ut intestinalis excretio pro-be respondeat .

OBSERVATIO V.

Dolor
sphæriticus
ens cum
numero
calculi
borum
excretio,
me.

Illustrissimus Comes , sex supra quadraginta annos natus , sanguineæ & robustæ constitutionis , a primis annis integra valetudine gavisus , in deliciis semper habuit venationes : ex quo factum , ut interdum imum usque ventrem in piscinas & aquas stagnantes se demiserit . A longo inde tempore pedes habuit valde frigidos , ut servidis pannis vix ad calorem naturalem reduci potuerint . Per decem annos usque eo hæmorrhoidallem excretionem passus est , singulis ut plurimum mensibus , quæ vero per duos aut tres quandoque restituerunt . Imi ventris doloribus , quos spasmi & flatus excitant , nunquam fere obnoxius fuit : inopinato autem acerbissimi dolores lumbum sinistrum , ubi ren situm obtinet , inva-

dunt , qui interdum ita asperati sunt , ut summus hic vir nec ambulare , nec se erigere , potuerit ; atqui statu-nem suam nonnunquam deleruerunt , & imum ventrem occuparunt , juncto simul vomitu & ciborum fastidio . Duobus abhinc annis , longinquò iti-nere peracto , tringita duos calculos cum acutissimis doloribus stipatos , per urinam una vice excrevit ; quo-rum minimi magnitudinem feminis cannabis æquabat . Et ita immanes isti dolores simul & semel exspirarunt . Interea dolores circa lumbos in fini-stro latere insistebant sèpius , quan-doque comite summo cruciatu , qui excretis calculis , cum multa pituita remissior factus . Hoc non obstante fluxus hæmorrhoidalis omni bimestri spatio permanxit . Sub equitatione quiequam etiam cruris mixtu reddidit . Missus est ad Carolinas , a qua-rum potu per 22. dies sub debito regi-mine continuato , per vices , decem , viginti & ultra ducenti , cum urina , albi & cinericeti coloris calculi emisi sunt ; cujus sedimentum erat valde tenax & viscidum , igni injectum odorem foetidum volatilem & urino-sum spargens . Peracta cura , consilium dedi , ut balneum Tooplicense per quatuordecim dies in usum duce-ret ; & optime inde se habuit . Petuit a me , ut præservationis gratia curam instruerem , quæ sequens fuit . Ordinavi infusum , ex speciebus leniter traumaticis , quarum in superioribus facta fuit mentio , mane loco Thee sumendum . Dein , ter minimum quotannis , præmisso pediluvio , ve-nam pedis secundam suasi . Tum pro potu ordinario , decoctum ex radici-bus scorzonera , graminis , chinæ , cortice ligni lassafras , semine foeniculi , & passulis præscripti . Posthæc , usum pulveris antinephritici bis vel ter in septimana , cum emulsione amygdali-na sumendi , commendavi , ex hac for-mula . Recipe lapidum cancrorum un-ciam semis , cochlearum ustiarum , semi-nis lycopodii , arcani duplicati , nitri de-purati .

purati ana drachmam, olei macis guttas 6. M. f. Pulv. D. Demum, quarumcunque pilularum, quas aloes ingreditur, quarum insignem antea quantitatem s̄p̄ius devoravit, item purgantium usum, studio & non sine fundata ratione, splendidō huic viro, non secus ac aliis, qui renum vitio laborant, pr̄s̄ertim si sanguine corpora superabundant, penitus interdixi, & clysteres injiciendos esse pr̄cepi. Quorum remediorum diutius continuato usu, & studiose simul servata accurata vicitus ratione, sumimus hic vir tortura & tyrannide tam immanium dolorum a tam frequenti calculorum partu provenientium, liberatus, jam sanus & incolumis, per Summi Numinis gratiam dedit.

Epicrīfīs.

In hac morbi enarratione & ejus curatione, plura occurunt practica momenta paulo curatius observanda. Primo, quod & fluxus hæmorrhoidalis & calculus simul in uno subjecto obvenire & incidere possint. Quod quibusdam paradoxon videri potest, qui sanguinis per venas sedis profluum, pro certissimo, adversus calclum & podagrum, pr̄sidio ac pr̄servativo agnoscunt. Verum aliquot mihi obvia fuerunt exempla, eorum, (inque primis celeberrimi medici B. Dolai recordor) qui nephritici & podagrī, fluxui hæmorrhoidalī, his alternatim graviter infestantibus, obnoxii fuerunt. In pr̄senti casu considerationem meretur, quod refrigeratio, pedibus a longo tempore a descensu in stagnantes aquas inducta, sanguinis motum versus abdomen nimium urgendo, in corpore pr̄s̄ertim plethorico stagnationibus cum in renibus tum in intestinorum volumine, a quibus hi dicti morbi propullarunt, ansam pr̄buerit. Secundo, tam copiosa calculorum per unam vicem exclusio, parenchyma renis sinistri, a copiosiori sanguinis congelatione, plane vitiatum, labe-factatum & destrūctum arguit; quan-

doquidem sine vasculorum urinariorum ruptura & extravasatione humoris, tam larga accretio lapillorum fieri nequit: sed notandum, quod hi calculi minus compacti, valde friabiles & tophacei fuerint, qui longe facilis & citius ex muco quodam viscido terreo generari possunt, ac duri & compacti. Tertio, mirabilis plane thermarum Carolinarum is est effectus, ut mirifice, sale suo alcalino, fordes viscidas resolvant, eluant, exulceratas partes mundent & canaliculos muco obstructos aperiant; quo postea roborantia & traumatica co meliorem & auspiciatorem operacionem exerere queant.

OBSERVATIO VI.

Incidit in memoriam casus quoad *Nephritis* abusum anodynorum memorabilis, *calcule-*
sa cum
qui in principatu Halberstadiensi, podagra,
olim mihi obtigit. Erat vir vene-
rebus religiosus, dignitate Abbatis in Seno,
ornatus, 70. & ultra annorum, ex massa
sanguineo cholericæ complexionis, pitulari
staturæ macilenterioris, ingenii præ-
de cyno-
cellentis, calculi & podagræ dololo-
glossa.
ribus jam diu vexatus. Hic ipse
suus sibi erat medicus. Prædicabat
mihi s̄p̄ius tum balneorum aquæ
dulcis, tum, si nimium urgerent &
calculo dolores, pilularum de cyno-
glossa insignes ad dolorem spon-
dum virtutes. Ad excludendum ve-
ro calculum, oleum amygdalarum
dulcum cum succo citri, item suc-
cum citri cum matre perlarum, se
usurpare affirmabat. Extra paro-
xyllum liberalis infusi Thee erat
potator. Per plures annos hisce præ-
sidiis non sine felici successu se usum
fuisse memorabat. Sed ob quo-
dam fortunæ infestos sibi obtingen-
tes casus, & inde consecutum animi
mœrem, vires cum appetitu non
parum languescere, & corpus cum
facie lurida marcescere cœperunt.
Post aliquod tempus, calculus con-
sueto more renem sinistrum adorie-

batur, & diutius paulo ac ante dolor lumbis & ureteribus inhærens persistebat. Ipse pro more sumebat pilulas de Cynoglossa ad 10. grana, usum earum aliquoties repetendo. Sed in ingentem conjectus virium prostrationem meum consilium requisivit. Ego accedens, ipsum offendit omnibus viribus dejectum, cum pulsu valde debili & formicante, qui proximam mortem significare solet. Analeptica probatissimæ virtutis externe & interne in usum ducebam, sine tamen effectu. Dolorem quippe nullum amplius percipiebat, soporque cum extremonum frigore eum opprimebat; ita ut secunda post accessionem meam die placide obiret.

Epicrisis.

Quæ colorum sponiant atrociam remedia, quæ inter palmam opiate tenent, minime e præxi medica exterminanda esse, ego quidem persuasus sum. Atqui idem nobiscum sentire tenentur ii, qui medicos opio utentes impostoræ publice accusare non dubitarunt, cum nihilominus in præxi sua pilulas de cynoglossa, quæ, præter opium, semen hyoscyami habent, ad fistendas enormes hæmorrhagias frequentem in usum ducant & plurimi faciant. Ego, antequam liquoris anodyni mineralis præstantia, quæ vitrioli sulphuri debetur, in componendis & sedandis enormibus hæmorrhagiis & doloribus, mihi innovuit, non infeliciter opiatis rite correctis me usum fuisse, assevero. Sed uti omnia magnæ activitatis remedia, ita etiam hæc, judicium & circumspectionem medici, qui omnes circumstantias probe pensitare & ad rationem subducere didicit, desiderant. Ubi enim ætas juvenilis, satis adhuc adest virium, pulsus magnus, & dolorum ac spasmodorum immanitas virium & motuum vitalium destructionem minatur, divinam certe præstant opem: sed ubi præ dolorum atrocia & a morbo præcedente, vel ex microre, jam attritæ vi-

res fuerint, in atate præsertim senili; ipsa sana, qualem omnibus medicis præticis appreciamur, ratio dictitat, ejusmodi remedia summe exitialia esse. Neque diffitendum, medicis senioris præceptis destitutos, saepè numero ingens damnum & periculum miseris ægrotantibus inferre: id quod probe animadverxit CAROL. PISO l. c. lib. 4. cap. 2. inquiens: *incredibile est dicta, quot nimium credulos intemperante vel laudani nostro aeo celeberrimi vel pilularum de cynoglossa usu, Themifones & circumforantes mittant in orcum.*

OBSERVATIO VII.

Vir sexaginta & quatuor annorum, *Rheumatica renum & ureterū affatio-* ante duos annos, tumore cum dolore, pedis pollicem satis acerbe obidente corripiebatur, qui venæ sectione admissa atque diapnoicis internis discutiebatur. Post novem dies cruciatus hi lumbos acriter invadebant, cum magna mingendi difficultate, & ingenti circa inguinalem regionem pressorio & astuante dolore, qui invalescens omnem urinæ profluxum plane impediebat. Ad quod symptoma tollendum, nec balneum aquæ dulcis, nec fomenta externa, neque medicamina interna antinephritica cum anodynis refracte juncta, quicquam profuerunt. Ilia quando manus fortiter comprimebantur, urina effuebat sed parcior, multum topaceæ albae & tenacis materiae continens. Alvus erat obstructa, & sub frequenti desideri cupiditate nihil reddebat. Aquam Selteranam, quæ ad manus erat, post aquæ dulcis balneum, in lecto per duos dies largiter bibendam suasi. Postea tres manuæ unciae cum drachma & dimidia cremoris tartari, atque granis sex trochisorum alhandal, in iofuso ex aqua fuerunt exhibitæ; cuius tam felix erat operatio, ut non modo ingens excrementorum copia per ali-
quot

quot sedes dejecta, sed & largior urinæ fluxus, non sine insigni levamine, fecutus fuerit.

Epicrisis.

Rheumaticam renum & viarum urinariarum affectionem, si quis prædictam passionem denominare velit, mea quidem sententia non errabit: nam sæpius observavi, subito eos, qui arthriticis & rheumaticis fluxionibus obnoxii sunt, dolore in lumbis & mingendi difficultate corripi, cum serum impurum tophacea & tartarea materia refertum, ad renale cribrum copiosius fertur, & in uretere, præfertim ubi introitus est in vesicam, collectum ac stagnans, gravem dysuriam parit: quia propter dolorem, alvi excretio supprimitur, ab intestino recto excrementis farto, magis adhuc vesicam comprimente, & dolor & mingendi impotentia augmentur. Sub ejusmodi morbi circumstantiis, utique non convenientius auxilium, præter balnea, aquas medicatas & laxantia, inveniri licet. Ego profecto, si a tali causa ischuria proficiuntur, mirabilem eorum, quæ alvū efficaciter aperiunt, sæpius opem expertus sum: nam expedita alvo, & expurgatis sordibus, uberior est urinæ ad vesicam aditus, & lege confessionis, quam nervosæ partes inter se alunt, ipsa etiam vesica cum ureteribus simili afficitur, & ad contractionem atque urinæ expulsionem sollicitatur. Neque temni hanc in rem debet monitum CELSI lib.4.cap.13.in renum affectibus aportet solvere alvum, si aliter ea non respondeat.

OBSERVATIO VIII.

Monita quædam, circa annos 15-16, antinephriticorum usum.

Cum maximum curationis & mendendi methodi momentum in convenienti ratione temporis & ordinis, antinephriticorum usu repositorum sit; non abs re, sed operæ premium mihi visum est, generalia quædam eximiæ in praxi usus, ex longa experientia miliuenata monita propone-

re atque subjungere. Primo omnium, plurimum scite refert temporis rationem: num recens sit malum; num per plures jam annos quis eo laboraverit; an valde inveteratum? item qualis sit renum status & conditio? num saltim flaccidi & a tono & robore naturali dejecti; an eorum substantia corrupta exulerata; & seri vel urinæ aut etiam sanguinis extravasatio adsit? Facilius curatu est morbus inter initia, præfertim quando a nimia sanguinis ad hoc viscus in plethorice fit congestio, vel etiam quando rheumatismo renes afficiuntur. Tunc omnia, quæ urinam pellendi facultate possint, & quæ acrimoniam salinam causticam conjunctam habent, vel fanguinem nimium commovent, perniciössima sunt: sed potius sanguinis missio, per sectionem venæ, hemorrhoidum apertione, atque subiectus diluentium, seri lactis, & aquarum medicatarum temperatarum, item nitrosorum pulverum usus, omne absolvere curationis punctum possunt. Ubi vero jam malum radices egit in renibus, siue late affecti, vel corundem vascula disrupta, ut latex urinosus subsistens tartaream gravem materiam dimittat, & calculorum frequenter jam fuit exclusio: tunc abstinentiam utique est a fortioribus acrioribus & sanguinis massam valde commoventibus diureticis. Nihilominus, quæ urinæ fluxum inter alimenta & medicamenta placide promovent, & majorem materię tartaream in magnæ molis calculos accretionem impediunt, egregio usui sunt; qualia sunt, præter serum lactis dulce & acidulum, præter lac asinum purum vel cum fonte Sette-rano mixtum, pariter ac acidulas; juscule ex radicibus quinque aperientibus parata, infusum baccarum juniperi & acinorum cynosbati tostorum, ex medicamentis arcanum tartari, tinctura tartari, liquor nitri fixi, & id genus alia. Prolunt tunc etiam ad ulteriorē corruptionem renis arcendā.

temperatoria traumatica supra recentita, in infuso vel decocto exhibita.

Si vero malum jam inveteraverit, substantia renum valde corrupta & exulcerata, ætas quoque senilis fuerit; abstinere præstat ab omnibus salinis, & potissimum acribus diureticis, item nitrosis refrigerantibus, sanguinis missionibus, fortiori corporis motione, equitatione: sed infusa traumatica, cum syrupo dialtheæ Fernelii eduleorata, mel Prussicum cum rob. juniperi mixtum, item mel cum pulvere radicis pimpinellæ, si ad illius libram, uncia hujus adjiciatur, malvaticum juniperinum, moderatus vini Hungarici, Canariensis potus, eleosacchara terebinthina Veneta, balsami de Mecha, de Capaiva, quando videlicet sacchari unciae horum drachma admiscetur, item balnea temperata ex aqua dulci, omnium tutissima & convenientissima sunt. Malum enim est incurabile & usque ad mortem comitatur; hinc non nisi mitigantia & vires reficiantia desiderat.

Cum vero nihil utilius nihil salutarius nephriticis & calculosis unquam, præservandi in primis scopo, apprehensum fuerit, alvo libera atque aperita, & primis viis a fôrdibus & excrementis probe expurgatis; præcipua omnino medici intentio esse debet, ut, si natura hac in re deficiat, comedis & idoneis alvinam excretionem promovere studeat remediis. Sed ego hoc in genere, nec tutius, neque convenientius aut efficacius fecio & reperi laxans, ipsorhabbaro electo & optimæ notæ, quod in pulverem cum absorbente & abstergente sale, vel in pilulas cum terebinthina Veneta redactum, & circa lecki introitura usupatum, leniter & citra virium jacturam, roborando potius tenuum viscerum & ventriculi tonum, fôrdes altero die egregie subducit.

Postremo, hanc, circa antinephriticorum & urinam carentium usum, cautelam omnibus medentibus com-

mendatam volo, ut neque nimium urinæ fluxum promoveant, neque etiam eum tardiore & parciorem reddant: utrumque siquidem noxiū; nam si a sanguine, quod fluidum, tenue & albidum est, in nimia quantitate segregatur, remanet crassius: quod obstrunctiones efficit & facile coit; si vero illud in coagulum redactum non abstergitur & educitur, successive in majorem molem accrescit.

Coronidis loco ad illustranda & confirmanda hæc a me suppeditata non inutilia monita, egregium & observatione dignum locum, ex CASPARO HOFFMANO, huic tractatione annexere haud dubitavi: siquidem lib.z. medicam officinal. cap. 102. p. 483. ita perite scribit: *in curatione calculi semper bene distinguere opus est remedia: nam ita pauciores habemus calculos.* Qui enim perpetuo utuntur propriis dictis diureticis, præcipue non purgatis primis viis, ad locum affectum materiam calculos an adducendo, malum faciunt pejus: tandem melius illi faciunt, qui præservacionis gratia singulis anni quadrantibus evacuant primas sic dictas vias, deinde lacte amygdalino per aliquot dies utuntur. Pro curatione autem ante omnia leniter purgandum; postea utendum domesticis & impropriis dictis frigidis, quæ tonum reddunt renibus. Nam in quovis corpore adeat quidem materia calculi, quæ tamen non ita statim coit & concrescit, nisi tonus & vigor rerum expulsivus vitietur; unde altero rene habente, alter calculus esse solet. Et hanc ob causam CEL-SUS lib. 4. cap. 2. p. 207. renes ubi affecti sunt, & diu male habent, abstinerre etiam ab omnibus falsis, acribus, acidis, & liberaliter bibere & mollier solvere alvum jubet.

C A P. VII.

De gravi spasmus & dolore vesicæ & adjacentium partium.

Theses Pathologicæ.

§. I.

Definitio **V**esica, ceu pars corporis nervosofusculosa, frequenter & ex facilior obnoxia est spasmus, per quem, intensorem & præternaturalem corporis vesicæ, neenon sphincteris constrictiōnem, sive stricturam, coarctationem & fibra- rum crispaturam intelligimus, & ex quo postea, ceu fonte, plures aliae morbosæ affectiones & symptomata pululant ac deducuntur.

§. II.

Processus **morbis**, qui ex diuin'hærens calculus sepius excitat, cum assiduo mingendi stimulo & diffi- cillimo ac dolorifico mihi, non nisi spasmus ceu causam arguit. Propter spasticam enim stricturam, quæ non modo vesicæ tunicam musculo-nerveam, sed & ejus sphincterem ipsamque urethram vehementer afficit, dolorosum urinæ fit stillicidium, & tantus nixus in pube, ut urina vix cohiberi posse videatur, quæ tamen, ut primum illare coepit, mox iterum penitus retinetur. Accedit dolor in toto coli tractu, qui gravissimus sepe glandem domit at occupat, ut annotante HILDANO lib. 3. de lithotom. ves. & BAGLIVO Opp. pag. 343. ingens hic doloris, pruritus & continuæ irritationis in glande penis & virgæ extremitate, in adultis & que ac pueris obvius sensus, merito inter pathognomica calculi signa referendus sit. Jungitur quoque crebrior desideri stimulus, sive tenesmus, ob arctam recti cum vesica connexionem, nervorumque communionem. Prodit sub hac dysuria urina plerumque alba & turbida, cum sedimento mucoso, eo quod ipse

spasmus fibrarum muscularium, fortis strictura & compressione, ex interiori mucosa vesicæ tunica copiosius lympham exprimit mucidam, glutinosam, quæ immixta urinæ, sedimentum illud, quod fundum petit, mucidum suppeditat. Sæpe vero tenuis aquosa minus colorata, sub ejusmodi gravi dolore, & spasmus urina emittitur, qui spasmus mutua consensione & communicatione etiam ad tubulos renum urinarios penetrat, ut nonnisi tenuë & aquosum ex sanguine per emulgentes adducto transmittant. Præterea æger sub mictu sepe gravissimos patitur dolores, crura bina transversim complicat, coxas comprimit, caput ad terram inclinat, manuque altera, interdum etiam ambabus, ventrem juxta pubis regionem quantum potest coarctat, & sub ejusmodi dolorifica mictione, tremuli interdum & quasi convulsivi totius corporis motus, ut probe observavit VIEUSSEN in *Nevrologia* pag. 203. concitantur. Nam vesicæ nervuli acerrime a quacunque etiam causa vellicati & spasmus affecti, eundem tremulum & convulsivum motum per nervos intercostales nervis spinalibus communicant, & sic ceteris omnibus partibus inferunt. Observamus etiam sub stranguria & vehementi dysuria, alvum obserari, & status cum facibus retineri, quæ conquiescente dolore, promte iterum sedunt.

§. III

Constat quoque observatione, hæc *Quinti* omnia recensita symptomata, & adhuc ^{dem &} acerbiora, non tantum a calculo vesicæ, ^{sæpi} verom etiam a sanguinis stasi, & sta- ^{sanguine} gnatione intra vesicæ vasa sanguifera, quam sepius sequitur gravis inflamma- ^{neatis} fieri. Vulgaris enim error est, quo hæc pathemata tantum vel calculo ve- ^{sicæ} vel urinæ acrimonie adscribuntur, cum tamen observations & dissectio- ^{nibus} cadaverum abunde doceant, ægros non modo isdem symptomatis, quæ calculus in vesica hærens profert, sed

& majoribus fuisse affectos cruciatibus nullo plane post mortem invento calculi vestigio. Nam quemadmodum a mensium vel hemorrhoidum fluxu sufflaminato, sanguis regurgitans ad vasa ventriculi & intestinorum, & intra eorum tunicas sensibiles stagnans, distractione & compressione vehementia tormenta, anxietates, dolores, convulsiones ac spasmos concitat; ita etiam, quando vel ex virtute & emanatione fluxus hemorrhoidalis, vel aliis ex causis, sanguis ad vesicæ corpus magna copia delatus ibi stagnat, non mirum est, quod in hac sensibili parte, spasmos & quæ ab iis proficiuntur symptomata producat.

§. IV.

Sepe ves- Simili modo a suppresso hemorrhoi-
dice spa- dali fluxu nonnunquam fit mictus cru-
smus & tentus, quo cohibito, dolor, spasmos &
inflam- inflammatio vesicam infestant, cujus-
matio a modi atrox spasmos, qui demum fune-
suppres- so hor- stam progignit inflammationem, in-
so ha- morbo- terdum quoque a mensium plenario
dum vel defectu, & earum post quinquagesimum
mensum annum emanatione in foeminis pletho-
ritis ortum dicit. Nam qui morbis ve-
sicæ moriuntur, inflammatione, &
sphacelo, ob sanguinis in vasis pertina-
cem & fixiorem statim, vasa minima ni-
mium distendentem, pereunt, ita ple-
rumque, ut hæc inflammatio non mo-
do vesicam, sed & rectum intestinum
afficiat, ubi simul hemorrhoidalia
vasa sanguine nigro infarcta, cum penis
livore, & vena cervicis sanguine ad mo-
dum distentæ & varicosæ comparent,
fidem faciente BONETO pag. 673. ob-
serv. 22. & pag. 664.

§. V.

Causæ Est vero unica funesta ejusmodi in-
*proxima*flammationis causa, eaque principalis,
est spa- validus vesicæ spasmos, qui, quo vali-
mus. dior est, eo vehementius sanguinis sta-
tin & incarcerationem in vasis auget,
& resolutionem ejus ac discussionem

impedit, ut tandem vel in abscessum & ulcus traueat, & thorticum fiat ma-
lium, vel in sphacelum brevi tempore periente concedat. Et profecto ve-
hemens ille vesica spasmos, qui prese-
nte inflammatione augetur, causa est
plurimorum gravium illorum symptom-
atum, inflammationem vesicæ sti-
pantium, quæ inter teste ÆTIO & O-
RIBASIO, referendi potissimum con-
tinua febris, magnus astus, dolor, ardor
ac tumor infra perineum & supra pe-
nitinem atque pubem, urinæ & gerrima
& cum magno conatu & dolorifico e-
julatu guttatum facta emissio, frequens
desideri stimulus, quibus demum ac-
cedunt bilis vomitus, dolor capitis, si-
tis, difficilis anhelitus, facie cum oculis
ruhor, lingua ardens cum nigrarie, im-
modica vigilia, delirium, inquietudo,
extremorum frigus, ipsaque mors. Di-
gnus memoratu est de funesta morbo-
rum vesicæ eventu HIPPOCRATIS.
locus lib. prænotion. pag. 464. ita habens:
Vesicæ duræ & dolentes penitus quidem
horrendæ & perniciose sunt, perniciose
simæ vero quæ cum febri continua fiunt.
Etenim dolores (qui utique spasmorum
effectus sunt) ab ipsis vesicis ad occiden-
dum sufficiunt, & alvi non egerunt hoc
tempore, nisi durum quoddam, & hoc
coactæ. Solvit autem urina purulenta
micta, quæ albam ac levem subsiden-
tiæ habet. Si vero neque ab urina quic-
quam remiserit dolor, neque vesica mol-
liatur, & febris continua fuerit, in pri-
mis circuitibus morbi ægrum moriturum
esse, timor est.

§. VI.

Sunt certe hæc vesicæ inflammatio-
nenem quæ comitantur, in que variis cor-
poris partibus conspicuntur, sympto-
mata gravissima; omnia tamen paulo
curati considerata, vix aliam causam
quam vehementem spasmum, qui in
vesica, ceu parte affecta, incipit, & per
universum nervosarum partium genus
inde propagatur, agnoscentur. Nam
quando fortissima stricturna, & crispa-
tura.

tura fibras vicinarum partium, intestini videlicet recti & sphincteris ani prehendit: vel assiduum desideri calcar, vel adeo impensa adest ani constrictio, ut nec flatus, nec faeces transmittat, neque etiam clysterem admittat. Quumque solenniter validior spasmodus partem, cui diutius infedit, debilitet, demum & in ea relaxationem relinquat, sit, ut ani etiam procidentia, praesertim in senibus & infantibus, consequatur. Quantocumque vesicæ gravior spasmodus ad superiora porrigitur, & quidem ad intestina, borborygmos & tortinae cau-satur, & ubi ad ventriculum pergit, inappetentia, mala digestio & vomitus sunt: de quo consensu vesicæ cum ventriculo præclara sunt quæ habet CEL-SUS lib. 7. cap. 27. pag. 486. non ignoramus, inquiens, ortu vesicæ ulcere, sape affici stomachum, cui cum vesicæ quoddam consoritum est, ex quo eo fit, ut neque retineatur cibus, neque si quis contenus est, concoquatur, neque corpus alatur. Idem porro spasmodus vesicæ sub inflammatione, quum musculum diaphragmatis, & nervos tunicasque nervosas pulmonum ac bronchiorum afficit, ægram & difficilem cum anxietate præcordiorum relinquit spirationem: ad cordis vero musculos & tunicas arteriarum musculo-nerveas delatus, duriores, contractos & celeriores efficit pulsus mixtus, cum febre continua & siti inexhausta, quæ itidem spastice stiratur mollium, & glandulosarum in lingua & faucibus partium debetur. Majoris vero periculi est, si ad membranas cerebri & nervorum principia pertingit; tunc enim assidua vigilæ, mentis alienatio, convulsiones, extre-morum frigus ac horror, inæqualis & intermittens pulsus, mortem significant imminentem.

Inter causas remoras scorbusticum,
Quamvis vero gravia & saepius lethalia symptomata sint, quæ ex inflammatoria sanguinis, sive sinceri & puri, sive impuri, fluxi in vesicæ vasculis sub-

orientur: nibilominus tamen mitiora minusque functione sunt illa vesicæ vitia, quæ a sero salso, impuro, corrupto vesicæ tunicis firmius inhærente easque lancinante subnascuntur, cujus generis sunt illi dolores cum valde difficiili & guttam succedente mixtu. Passim eiusmodi pathematum in observatis medicorum sit mentio, in primis tamen memoratu dignus DRAWIT-ZIUS, qui jam ante seculum omnium fere optime, germanico idiomate *de scorbutico integrum* scripsit tractatum, in quo pag. 350. & seqq. plures assert observations & casus ærorum, qui de doloribus saxis sub urinæ emissione conquisti, quorum causa non vesicæ labes ulla aut calculus fuit, sed humor tantum imparus scorbuticus, e quibus memorabilis maxime, quem consignavit de lanione, qui quum nunquam antea ex calculo laborasset, subito atroces in pedibus persensit dolores, qui hinc depulsi, urethram invaserunt, cum intenso ardore & difficultate guttam vix mingendi, applicatis tamen discutientibus cessarunt quidem, sed ad pedes redierunt, consequente ee-rundem tumore.

S. VIII.

Neque minus multoties observavimus in senibus, vesicæ vitia, maxime que dysuriam, tum ob vitam sedentariam, tum ob dyscrasiam humorum scorbuticam, quæ in hac ætate fere perpetua est, in primis tamen quod cessantibus rheumaticis, arthriticis & podagrīca doloribus, difficilis accedere soleat mixtus, qui repetentibus pristinis doloribus, sponte discedit iterum. Cerebrioris quoque observationis est, scorbuticos, quibus purpura chronica nostro jam tempore admodum solennis, hac, ob refrigerationem corporis, vel alias causas, ut venæ sectionem cerebri insitutam, retrocedente, vel initus remanente, experiri ingentem min-

*Materia
arthri-
tica &
poda
grica.*

gen.

gendi difficultatem cum precordiorum anxietate, inquietudine, vigilia & interno astu, quæ, expulsa rursus ad superficiem corporis purpura, disparent iterum ac evanescunt.

§. IX.

apure ex renibus in vesicam delaben te. Sed alia adhuc ratione spasmus & dolor vesicæ introducitur, ex renum vide-licet virtio. Interdum enim ex his pul-ruenta & viscida materia, interdum calculi per ureteres in vesicam dela-buntur. In utroque casu, nisi peregrinus hospes tempestive foras ejiciatur, varia fontica mala & in his vehementissimum spasmodum cire valet. Quodsi enim te-nacior & acrior materia est, parietibus vesicæ, in primis circa collum adha-ret, & stranguriam, dysuriam, tenesmū, inflammationemque excitat, vel mem-branas vesicæ claudestine ac lente ma-gis erodit, atque ita hanc exulceratam reddit. Si vero aliarum causarum ac-cessione in calculum tandem illa trans-formata fuerit, vel is jam factus in re-nibus ad vesicam migravit, aspredine-sua vel pondere hanc continuo lacefit, eademque mala, quæ modo recensui-mus, producit: in posteriori autem casu fundus quoque vesicæ & latera, præser-tim ubi calculus fuerit grandior, exul-cerantur.

§. X.

agone- sibæ. Interdum vesicæ collum irritant, tendunt ac spasio affligunt, diverse ab sis quas haec tenus enarravi causæ, e. g. quando gonorrhœa, sive benigna sive maligna fuerit, diutius in hospitio suo, hoc est in glandulis binis prostatis col-lo vesicæ appositis, commoratur; mora hic venereis inquinamentis corruptus humor deterior redditus, ulceræ nunc leviora nunc graviora. & inflammatio-nes in parte affecta parere, & si horum quoque vitiorum curatio perverse per-agatur, simili labe alias saepe partes in primis proxime adjacentes afficere, subinde observatur. Mingitur tunc uri-

na purpuracea, & vesicæ scabies, i. mo & exulceratio præsertim circa cervicem frequentius accedit. Atque hinc est, quod gonorrhœa virulenta laborantes urinam sepius turbidam, & quæ mul-tum viscidæ & saniosi ponit sedimenti, reddant.

§. XI.

Causarum, unde gravior vesicæ spa-smus proficiunt nonnumquam solet, cen-sum quoque subire videntur, inflam-matio intestini recti vel ejusdem ulcus, eadem coli vitia, partium omnium in-teriorum abdominis abscessus, ex qui-bus ruptis, pus in abdominis cavitatem effusum, versus vesicam tandem pro-gressitur, corruptio in primis omenti longius protensi, sanguis quacunque de caula in abdomen effusus, aqua in hy-drope ad vesicam libere ruens, inflam-matio & ulcus uteri maxime ejusdem cervicis, & id genus alia; quorum om-nium exempla passim apud BONE-TUM & alios occurunt.

§. XII.

Devolvimus nunc ad causas exter-nas, a quibus vesicæ spasmodus provenire possit. Pertinent vero huc contusiones, & ictus graviores in pubis, & perinæ regionibus, sectio calculi imprudenter instituta, in qua vel a cultri ineptiori administratione, vel a calculi, præser-tim majoris & asperoris extractione, vulneris a sectione facti curatio pver-se instituta, catheter ad explorandum calculum vel in urinæ suppressione vel alia de causa incuriosius intrulus, sphincter præsertim vesicæ artius constri-cto, aut a tumore, caruncula, scirrhœ vel alio vitio via præclusa: fistulæ in ano exiectio, in qua ani sphincter artius cum vesicæ collo connexus incaute ni-mis vulneratus, aut ejusdem volnus negligenter habitum fuit. In foeminis huic referri debet partus difficilis, in quo vesicam & hujus in primis collum ita saepe premi afficique, ut inde ulcus, & fistula proveniant, MEAURICEAU aph.

apb. 285. confirmat. Cæterum hic nota-
ri meretur singularis cantharidum ma-
lignitas, qua vesicæ infestæ sunt. Eas e-
nim sive intra corpus assuntas, sive ex-
terne tantum modo applicatas, spasmum,
inflammationem & ulcera interdum ciere satis observationibus con-
stat, quarum exempla exhibentur in
M.N.C. Dec. 1. An. 2. obs. 105. An. 8. obs.
88. Potum denique frigidæ post sectio-
nem calculi, vehementem spasmum
concitare, aut lethali gangrenæ, aut fi-
stuloso ulceri occasionem præbere, ex
observationibus practicis constat.

§. XIII.

Cur spasmus vesicæ per intervalla in-
festet. Hisce quoad causas, quæ spasmum
vesicæ carent, expositis; ratio porro red-
denda peculiari istius phænomeni, cur
symptomata, ut difficilis & dolorifica
mictio, & quæ ipsi juncta sunt mala,
causa materiali, ut calculo vel dyscrasia
scorbutica, perpetuo presente, per in-
tervalla tantum infestent & tantopere
affligant? Ita vero hoc explicandum vi-
detur: omnes atroces in parte nervosa
sensibili dolores, paulo diutius obha-
rentes, inducunt demum & relinquunt
in ea, quam tenuerunt, sede debilitatem
& atoniam, qua præsente, dolores qui-
dem non amplius percipiuntur, sed pro-
ppter ipsam haec imbecillitatem, ibi de-
novo successive succrescentes in corpo-
re impuri humores colliguntur, stagnan-
t & substant, novaque sic ad re-
fuscitandos paroxysmos gignitur &
coacervatur materia. Debilitas enim,
teste CELSO, omnibus morbis oppor-
tuna, ideoque instar universalis patho-
logici canonis tenendum; languidas a
progressa morbi violentia partes, quam
facile recipere morbificum humorem,
qui sensim congestus, vel sponte, vel a
levi causa exagitatus, novum adducit
insultum; & hinc merito periodicorum
affectuum origo repetenda.

§. XIV.

Plures observavimus, calculum in

vesica existentem, per certa tantum in-
 tervalla multa incommoda, ut min-
 do is ex-
 gendi crebrum & difficilem conatum, *Quomo-*
*cum ardore & dolore, ventris tormenti-*ci tetra-*

bus, extremonrum frigore & virium lan-
 guore excitasse, idque maxime ventis
 ex borea flantibus, vel si instantes cibi
 aut cerevisiæ minus dæfecatae sumtæ,
 aut insolita animi commotio præcessit,
 aut corporis partes extremæ nimium
 refrigerate, vel etiam sanguinis consue-
 ta missio diutius omessa, hanc procul
 dubio ob rationem, quod hæc omnia e-
 ius naturæ ac indolis sunt, ut partim
 excretiones salutares supprimendo,
 partim etiam copiam humoris impuri
 augendo, eum ad vesicam tanquam
 partem debiliorem propellendo, mo-
 vendis & revocandis novis insultibus
 occasionem præbeant. Crebrioris quo-
 que observationis est, colicas flatulen-
 tas junctas esse vesicæ vicio, præsertim
 ardenti & dolorificæ mictioni, & omnia
 alimenta, quæ inflant, hoc quoque
 exacerbare, & carminativa contra, sive
 flatus discutientia, optimo esse præsidio.*

§. XV.

Ad vesicæ morbos, qui spastico stip-
 ti sunt, referri etiam merito debet cru-
 enta mictio, quæ tamen non omnis, ut
 vulgi medicorum fert opinio, ex reni-
 bus & vasis emulgentibus fit, sed sèpius
 proxime & immediate ex vesicæ vasis
 sanguiferis, præsertim ramis vena haemorrhoidalis externæ perruptis, succe-
 dit. Cognoscitur sanguinolentus ejus-
 modi ex vesicæ vasis mictus, quando
 difficultas mingendi conjuncta, ardor
 cum tenesmo circa anum, spasmus cir-
 ca glandem & dolor pungitivus a glande
 ad perineum afflit, cum rigida pen-
 is tensione, necnon ubi simili adfunt
 borborygmi & statuleiarum in abdomi-
 ne, inappetentia, fuctus quoque fre-
 quentes junguntur; item si mictio cru-
 enta & stipantia ipsam symptomata
 post sanguinis missione in pede, post
 hirudinum applicationem circa annum
 remittunt & cessant. Et quamvis ejus-
 mī
 Diane
 eruntur.

modi species mictionis cruentæ ex vesica non adeo familiaris sit & frequens, annotata tamen nonnunquam fuit, & prostat observatio. HOECHSTETERI, *Decur. I. schol. in cas. 2. M.N.C. Decad. I. ann. 8. obs. 23.* Mingitur interdum sanguis sincerus una cum urina, vel loco hujus urina bruni coloris, instar coffee, ut vidimus in sene octogenario, quotiescumque equo vectus fuerat: frigescere urina sedimentum ponebat densum, rubicundum. Gravissima vero quoque incidere solent ex sanguine intra vesicam concreto, symptomata, quæ recenset LOMMIUS in *obseruat. p. 195.*, crebro enim anima deficit, ægra fit spiratio, & pulsus obscurus, parvus & frequens, oritur multa nausea, animi anxietas & frigidus sudor, hinc totus homo fit imbecillus & pallidus & extremis partibus refrigescit, quæ quidem omnia vehementi spasmatice strictræ, quæ per totum systema nervorum propagatur, recte adscribenda. Fiunt tamen etiam a sanguine in vesica condensato maximè cruciatus & adores vehementes, in ima pube & circa virgam, qui referente *obser. jam citata M.N.C.* in momento quasi evanuerunt postquam æger magnos, & oblongos sanguinis grumos, instar hepatis lucis piscis, mingendo rejecerat. Sed de curatione hujus mictionis cruentæ, quæ nascitur ex vesica affecta, recte judicat LOMMIUS *I.c.* quod tardius curetur, quam illa, quæ a superioribus locis proficiuntur.

§. XVI.

a sero impuro scorbutico. Neque etiam prætereundum, quod vesicæ spasmus, qui stranguriam & dysuriā parit, ab urina etiam, præsertim in senibus, scorbuticis & cacoehymicis, valde salsa, acribus, tartareis salino-sulphureis, & limosis excrementitis partibus referta, nascatur. Tam salsa enim quandoque deprehenditur urina, ut linguam arrodat, & ex urethra filans vicinas partes excoriat, quæ utique diutius in vesica stagnans, vellicando

fibras nerveas, sphincterem claudit, urethram angustat, & lancinatione & arrosoione tunicarum ingentes dolores vesicae parit. Si vero in urina cum dolore ex sebaceous creta moleculæ furfuraceæ & exilia a copiosa filamenta apparent atque subständent, veteres effectum vesicæ scabiem appellantur, quia mucidam & villosum tunicam arrosam argunt.

§. XVII.

Diximus superius, quod quidem calculus in vesica contentus occasionem thoracis & vita sedentariæ aduersitatis, & dolorificos cum dysuria juncos spasmos, via ad intervalla infestantes; monendum tamen & illud est, quod spasmus in vesicæ, etiam aliis ex causis proficientes, ad ipsius calculi in vesica generationem & concretionem primatum originem, & fundamentum frequentius suppeditant. Contingit hoc quam maxime in senibus plethoricis, vita sedentaria aduersitatis, & qui ob perspirationem languidorem urinam ordinario valde tintet & scoriis tartareis limosis saturatam mingunt. Nam ob spasmum dysuria fit, & liquor urinosus dum paulo distius retinetur, mora deponit tenacem glutinosam materiam, quæ salibus tartareis involuta, utique principium ad successivam concretionem calculos fuggerit, nisi congruis medicamentis opportune subducatur, & urine sublati spasmus, liber paretur exitus.

§. XVIII.

Inter morbos vesicæ utique vehementer spasmodus vesicæ, quæ morbo vesicæ quantitate dolore thalismati suppressio juncta est. De qua in *Prognosticis* & in coacis præsag. ita scriptat HIPPOCRATES: vesicæ duræ ac dolorentes omnino male, pessima fere cum febre continua: nam qui dolor inde est, necando homini satis esse potest, atque ita alvo non multum dejiciunt.

§. XIX.

§. XIX.

*Quando
minor,
vario-
sermit-
natur.* Mitis inflammatio est, si dolor atque durities est moderata, sine acuta febre. Varios vero exitus habere solet, aliquando critice, erysipelate in cute oborto solvit, & sensim hac ratione discutitur: vel in suppurationem vergit; & tunc urina est purulenta, quæ album habet & leve sedimentum: quod si pure ita erumpente, urina in copia profundatur, tum mor subsidet, vesica remollescit, febris imminuitur atque excrementorum exitus patet. Pessimum est, quando in sphacelum lethiferum mutatur.

CURATIO.

§. I.

*Plethora
sol-
venda.* Vidimus quot & quam gravia mala atque incommoda, ex dolorifico vesicæ, urethre & vicinarum nervosarum partium spasmo, eaque secundum variæ indolis causas oboriantur. Nunc breviter etiam strictimque explicandum erit, qua opportuna via ac methodo hisce malis per convenientia remedia succurrendum sit. Quod si igitur ex nimia sanguinis copia vegetæ naturæ senibus præsertim, qui vitam diu sine sufficienti corporis motu egerunt, hic morbus vel ingruit vel saltim verendus est; omnino maxima præsidii & auxilii spes in tempestiva, & sufficienti sanguinis missione, erit reponenda. Idque eo magis quando ex sublidente mensium vel hemorrhoidum fluxu, aut omissa & diutius assueta vene sectione vel scarificatione, mali causa suborta creditur: nam monente iam HIPPOCRATE aph. 36. sect. 6. in urinæ difficultate seare oportet internas.

§. II.

*Dilu-
tibus
tempe-
ratis u-
tendum.* Ubi seri impuri, scorbuticis, acrioribus, salinis partibus turgidi, copia pectant, & ab ejus colluvie & decubitu in

vesicam & partes pelvi inclusas irruentes; aut a scorbutica purpura, quæ nostro tempore frequentior subest, malum suum duxit originem; tunc vigili cura allaborandum est, ut ab istis heterogeneis impuris partibus referta sanguinis & humorum massa depuretur, & nimia seri copia per congrua emunctoria educatur. Cui scopo obtinendo, diluentia temperata, satis larga quantitate & longiori tempore usurpata, cujus generis sunt acidulæ temperatores, quæ puriori & leviori aqua ac tenero sale alcalino imbutæ sunt, qualem prærogativam, præ reliquis omnibus aquæ Spadane, & Selterana sibi vindicant, quippe quæ convenientissimæ sunt & apprime pectoris, renum & vesicæ vitiis, ubi labem ac vitium hæc partes receperant, specifica quadam virtute opitulantur, egregie satisfacere possunt. Longe maiorem vero utilitatem in purpura scorbutica præstant ac scenerantur, quando, per miscelam cum lacte præsertim alfinino, horum fontium usus suscipitur.

§. III.

Sicuti vero diæta tam in præservando quam in curando malo primæ sunt *partes*, adeo, ut, qui leges medicorum *paren-* *dietæ* *partem* *dum.* aspernantur atque rejiciunt & arbitrio suo vivunt, nunquam a calamitosis ejustmodi malis liberari vel saltim levamen recipere possint: ita in tam diuturno morbo, ubi nervosæ & valde sensibiles partes affectæ sunt, maxime id necessarium est, eo quod levem in victa errorem, nervosæ statim partes lucre debent. Sedulo itaque monendi ægrotantes, ut a cibis sallis, a cibis, acidis, item vegetabilibus, quæ inflant, quæ adstringunt, neenon ab omnium cerevisiarum & vini acidi austeri potu prorsus abstineant: moderatus vero dulcium, in primis Hungarici, usus, non modo non nocet, sed egregie prodest. Meretur hic allegari locus ex AETIO Serm: 11. c. 22. de scabiosa vesica; a mordacibus igitur & que humores acres ac saliores reddunt, abstinentium. Ex-

libenda autem vina dulcia, lac, & gallina, aut hædorum, aut agnellarum jucunda. Et quamvis motus & exercitatio corporis, ad avertendos ejusmodi morbos, dum & nimiq; sanguinis multitudini resistit, & liberum per vasa humorum transitum conservat, magnam vim habeat; tamen, si dolore & spasmus affectæ partes nervosæ imi ventris, quies magis quam motus salutaris evadit, qui tunc maxime nocet, præsertim ea motus species, sub qua sanguis magis ad inferiora pellitur, ut nimia vocis elevatio & longior ac intensior oratio, superiorumque partium agitatio, gestatio & oneris sublevatio.

§. IV.

In paroxysmo spasmodus mulcendus,

Porro, ubi passio spastica cum ingenti cruciatu & mingendi difficultate urget, nihil præstantius, clysteribus emollientibus oleosis, balneis atque se micu piis esse, crebriori deprehendi experientia; & idem quoque passim observata medicorum confirmant, mereturque hanc in rem legi elegans obserratio DRAWITZII in libro de scorbutico malo pag. 153. Sunt quoque in paroxysmo ex usu vapores, ex floribus emollientibus & anodynis, ut sunt flores chamomillæ vulgaris, meliloti, sambuci, malvæ, verbasci, millefolii, in lacte decoctis, debito modo admissi ad partem affectam, quippe qui leniendo & mulcendo, spasmos & dolores egregie complacent. Interne vero liquor anodynus noster mineralis, sive solus, sive cum carminativis mixtus, necnon pulveres antispasmodici, ex pulvere Marchionis, specifico cephalico Michaelis, nitro purificato, addito pauxillo croci & castorei, cum emulsione seminum quatuor frigidorum majorum propinati, reliquis certe omnibus palmarum præcipiunt. Et eadem hæc remedia, etiam si inflammatio imminet & febris adest, locum habere possunt, modo dosis nitri adaugeatur.

§. V.

Si ab acri re trocedente ad interiora, vesica mor temate;

Quando denique ex rheumatica quædam partium externalium fluxione retrocedente ad interiora, vesica morbum patitur, vidimus fonticulos brachiis inustos fructum non pœnitendum ita decopræstissime. Quo in casu decoctum demulcēs ac leniter diaphoresin ciens, ex radice scorzonera, salsaparille, chinæ, rasura cornu cervi, radice glycyrrhize, graminis, cichorei, ac semine foeniculi concinnatum, necnon liquor noster anodynus mineralis cum spiritu bezoardo *Buffi* permixtus, nunquam frustra adhibentur.

§. VI.

Si mielus cruentus in vesica ortus, spasticæ vesicæ affectioni jungitur, vel cruentus, exulceratio supervenit, externe discutiendi & roborandi fine aquam vulnerarium, l'eau d'arguebusade, vulgo di Etam, pubi & perineo, haud frustraneo sepe effectu, applicari iussi, vel fuscillos ex mentha, melissa, foliis myrthi, lauri, floribus rosarum, chamomillæ vulgaris & Romanæ in vino rubro decoctis crebrius externe vesicæ regioni apponi curavi. Interne vero, ne sanguinis grumi in vesica forte relieti cum muco tartareo ibi hærente coire & calculum producere queant, commodissime abstergentia & traumatica leniora, que inter eminent virga aurea, alchymilla, summitates hyperici, millefolii, radix caryophyllatæ, altheæ, glycyrrhize, ficus cetera, sub infuso vel decocti forma, cum primis si hæc ipsa, melle Prussico, vel syrupo e dialthea Fernelii probe edulcorentur, in usum vocari possunt: sicuti non minus decoctum Foresti, item sperma ceti, sanguinis grumis in vesica hærentibus resolvendis remedia aptissima præbent.

§. VII.

Abscessus a perita, & sensu-

Quando inflammatio in abscessum, qui ex symptomatum exacerbatione, & sen-

& sensu quasi ponderis in perinæ & pubis re gione dijudicatur, abiit; ut ille mature aperiatur, & pus e vesica derivetur necesse est: diutina enim mora acrius semper hoc redditum, vicinas partes arrodit, similique modo afficit atque exedit, fistulas aliaque pessima symptomata introducit. Ad quod gravius malum avertendum, injectio latetis tepidi, cum speciebus emollientibus cocti, tentanda est; ac si parum illa proficiat, ultima spes in operatione chirurgica est reponenda, quæ per cultrum in eo perinæ loco, ubi sectio calculi, cum magno quem vocant apparatu, peragi solet, instituitur. Quam in rem annotationem merentur bina, quæ ex RIOLANO desumit exempla BONETUS in sepoler. Lib. 3. p. 634. seqq. In foemini res aliter cedit, neque iis hoc auxilio opus est, eo quod orificium vesicae amplius possident, & liberior ad ipsam accessus patet. Ulcere autem aperto ac probe expurgato, eadem quæ modo memorata sunt in §. præced. remedia, erunt proficia.

Cautelæ.

S. I.

*Sanguinis de-
trac-
tio-
na-
re-
sis
institu-
enda.*

Quando multitudo sanguinis, sui depletionem exigit, consultius est, per venas superiores primo, ob revulsionem sufficientem, ejus copiam detrahere: altero vel tertio die, derivationis gratia aperiendæ sedis venæ, si tumescant & promineant, vel si id commode non fieri potest, in malleolo vel poplite sectione potest institui. Sub habitu corporis spongiosori sanguine ac succi pleno, in sexu præsertim lequiore, ad revocandos versus exteriora sanguinem & humores, cucurbitulae partibus superioribus & inferioribus applicatae plurimum utilitatis afferre possunt.

S. II.

*Sed monendum hoc loco est, quod
ca pro fit
quando
eiusmodi sanguinis detractiones ubi
Hoffm. Syst. T. IV. P. II.*

plethora urget, in principio, ad inflationem vel arcendam, vel ubi jam adfuerit, ad eam discutiendam, aut maiorem impediendam multum valeant & prosint; ubi vero non satis est virium quando noceant: quia virium robur detrahunt, cujus tamen præsentia ad expugnandum & solvendum morbum impedio est necessaria.

S. III.

*Purgati-
a fu-
gienda.*

In omnibus vesicæ doloribus & spasmodis, a quacunque etiam causa proficiuntur, validiora purgantia nunquam exhibere convenient, neque in principio, neque in progressu: metuendum enim est, ne exagitari humores ad partes afflictas magis impellantur & præcipitantur. Remittente vero dolore & spastmo, atque morbo inclinante, alvum solvere, & intestina a stercoreis folidibus, quæ per dolores & spasmos plerumque retinentur, liberare, utile omnino, imo necessarium subinde est. Sed benignoribus semper præstantius erit; cujus generis sunt mannata, rhabarbarina, lypurus rosarum solutivus, cum sero lactis vel lacte asinino propinata.

S. IV.

*Clyste-
rum a-
sus pro-
ficiens.*

Ad spasmodorum ferociam mitigan- dam præter externa linimenta & fo- menta, clysteres ex lenientibus & emollientibus conflati, sunt injiciendi, eo quod blando suo calore ac tempore rigidas spastmo afflictas vicinarum partium fibras molliendo & relaxando, insigne dolorum solatium atque allevamentum afferant, sed exigua quantitate, ne comprimantur inde vesicæ pa- rietes, applicandi erunt.

S. V.

*In ex-
ulcera-
tione
vesice
caroline
noce-
ntis.*

Ubi ingens vesicam, & ei connexas partes corripuit exulceratio, quæ ex copioso vilcidæ materia sedimento, &

O lenta

lenta quadam vires, & carnem depa-
lente febre appetet, ab interno & lar-
giori Carolinarum usu abstinentum ef-
fe, ex damno, quod inde emersit, maxi-
mo didici: ob stagnantem enim aquam
& corruptio & febris intenditur.

§. VI.

*Injectionibus anodynis, ad tempe-
randam humorum acrimoniam, neque
minus ad efferatos dolores sopiaendos,
commodus utique locus concedendus.
Parari illæ possunt ex albumine ovo-
ri no. 4. conquassato, & in aquam redacto,
addendo lactis foemini uncias duas,
butyri recentissimi drachmam: vel etiâ
emulsio artificialis ex semine cucurbitæ
papaveris albi, aqua florum sambuci, ro-
larum, & cerasorum nigrorum concin-
nari in talem usum & finem potest.*

§. VII.

*Atria
vitanda* Ab omnibus diureticis, acrioribus in
spastica hac affectione maximopere ab-
stinentum: nam ubi viae urinariae exul-
cerationem passæ sunt, ab adhibito eo-
rum usu dolores & spasmos exacerbari,
atque longe crudeliores reddi, nullum
est dubium.

§. VIII.

*Anody-
na;* Ubi dolores sunt vehementissimi, at-
que exinde gravia metuenda sunt sym-
ptomata, anodyna, quæ valide dolorum
sevitiam compescunt, ne vires nimium
frangantur, & febris cum urinæ diffi-
cilitate augeatur, vel amentia provoce-
tur, usui possunt esse. Et vidi a trochi-
scis de alkengi ad drachmam dimi-
diā pro dosi sumitis, ægrotantes insi-
gniter sublevatos. Cavendum tamen
maximopere ab eorum usu est, ubi ab
ætate senili, ab affectu animi, micerore
præsertim, viriū adeſt prostratio.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

O B S E R V A T I O I .

Vir circiter quadragenarius, causa-
rum patronus, per aliquot jam anno-
rum spatium, immanes plane ac intole-
rabiles dolorum juxta pectinem & pu-
bem, cum summa urinæ difficultate &
quandoque suppressione, vigilia, virium
defectione, extremon frigore, & tre-
more, per intervalla passus est crucia-
tus, ut sœpius ad desperationem ada-
ctus, viræ sibi finem propter atrocissi-
ma tormenta, gladio procurandi satius
duxerit. Tormenta hæc per aliquot heb-
domades assidue affligeabant, postea re-
mittebant, quamvis non prorsus cessa-
rent, ita tamen ut officio suo quadan-
tenus fungi potuerit; dein post unam
vel alteram, eodem insultu reverteban-
tur. Urina pauca & turbida effluiebat,
viscidum deponens sedimentum. Cum
que per aliquot annos hoc malo affec-
tus esset, viribus tandem consumptis, in
quadragesimo ætatis suæ anno obiit: om-
nes per totam civitatem in auxilium
vocaverat medicos: quorum alii cau-
sam tam immanis cruciatus in vesice
calculum, alii in ejus ulcus rejiciebant.
Sed aliud longe partis affectæ post mor-
tem docuit scrutinium; vesica quippe
integra, omni vacans inflammatione,
fuit inventa, nec vestigium sabuli aut
calculi in ea repertum. Ipsa vero vesice
membranacea substantia preter na-
turam valde crassa & densa erat, copio-
sis amplis ac distentis sanguiferis vasis,
quorum nonnulla calami scriptorii ca-
pacitatem equabant, obsita, & sanguine
crasso & atro repleta.

Epicrisis.

Dolor & spasmus partium nervosa-
rum atque membranacearum, ab hu-
more vitioso, vel intra cavitatem, vel
in ipsa textura & compage tunicarum
nerveo-fibrosarum hærente progigni-
tur. Posterior causa, quamquam minus
a medicis usque eo fere cognita, atque
in eorum scriptis tacta sit, frequentissi-
ma

ma tamen: testante id inter alia, cardialgia, dolore ilei & coli spastico, a sanguine intra tunicas ventriculi & intestinorum nervea stagnante subortis. Simili ratione, in vesica, quæ ex meritis tunicis & membranis nerveo-musculosis, subtilis sensationis constat, a sanguine intra vasa nimis congesto & nerveas partes divellente ac distrahente, vehementem suboriri posse spasmodum, non modo vero est simillimum, sed & sectio in praesenti casu instituta, id luculentter apertum reddidit. Neque mirandum est, quod calamitosi hi interdum cruciatus inducias egerint & ad tempus quieverint, hoc videlicet contigit, quando ex variis causis sanguinis ad vesicam appulsus quodammodo diminutus & retardatus fuit. Medicamenta, quæ ad dolores levandos, ad acrimoniæ humorum obtundendam, ad exulcerationem mitigandam, ad urinæ fluxum provocandum fuerunt exhibita, supervacanea & nullius usus fuisse, jam quisque sagacioris ingenii, & judicii medicus ex facili intelliget.

OBSERVATIO II.

Vir generosus, militum prefectus, & ultra annorum, podagricis doloribus subinde vexabatur, & complures ante annos, fluentes habebat hemorrhoides, dacyrica quæ tamen per magnum temporis spatium siluerunt. Autumno dolere incipiunt pedes cum spasticis tractionibus: sed is minime hæc curans, iter aliquot milliarium, sub celi temperie valde humida & frigida suscipit. Dolores quidem evanelcebant, sed postea incidit in mingendi difficultatem cum ardore & dolore circa pubem & radicem penis, virium dejectione & conatu ad vomendum, alvo obstipata, horrore artuum & astu intercurrente intensori junctam. Ego in consilium accitus, venæsectiōnem in pede, quum per integrum sere annum eam neglexisset, sua f. Interne polveres diaphoreticos, nitroso-cinnabarinos, item liquorem anodynū cum spiritu Bassii remixtum, ad trans-

spirationem placidam promovendam exhibui. Exterius regioni dolentil linimentum applicari iussi, ex aqua Anhaltina, camphora, croco, oleo nucis & expreso & pauxillo opii compositum; nec non, ad alcum aperiendam, clysteres emollientes, ex floribus anodyna quadā virtute imbutis, injiciendos curavi. Et intra septem dies, morbo per copiosiore sudorem soluto, sanitati fuit restitutus.

Epicerisis.

Hanc urinæ, cum stranguria & febricula, difficultatem, ab humore seroso acre, qui pedum digitos obsidebat, retro-pulso, subortam dijudicavi, & rheumatismum erysipelaceum vesicæ substantiam occupantem pro causa agnovi. Ea que propter ejusmodi remedia cum intrinsecus tum externe usurpanda duxi, discutiendi quæ possent facultate, & quæ cum insigni alias fructu in erysipelite affectis tutissima & convenientissima deprehendi. Ex quo, præzeos medicæ fundamentis initiati discere possunt, quantum intersit, ad expediam & felicem sanationem morbi conficiendam, veram ejus causam investigare, & statim inter initia, ad eam amovendam congrua & idonea remedia in usum ad vocare.

OBSERVATIO III.

Theologus magni nominis hujus loci sexagesimum etatis annum supergressus, sanguineæ constitutionis, vitæ sedentariæ, lucubrationibus & mentis fatigationibus nimium deditus, doloribus subinde gravativis & pressoriis circa os sacrum & regionem pubis corripiebatur, atque tum maxime, quando sermonem sacrum alta voce diutius paulo protraheret: qui, corpore quiescente & sanguine misso, quodammodo remittebant. Purpura scorbutica saepius eum afflixit, tandem in gravem primi per intervalla dysuriam incidit, cum horrore & febricula alternante, & ingenti circa pubem dolore. Demum su-

O. a.

per-

*Spasmus
vesice,
amato-
ria scor-
busa
purpu-
racea
retro-
eunte.*

perveniebat parens manus dextra, quæ quamdiu perstiterit, remissior fuit dysuria; illa vero evanescere, atrocior vesicæ spasmus & dolor cum assiduo urinam mittendi stimulo illico repeatabat. Duravit hoc malum per aliquot septimanas. Varii generis tentata a medicis remedia. Missus aliquoties intra morbi decursum, e pedis vena, sanguis: sed circa fructum. Tanta enim doloris & spasmi in pube & pectine fecuta est atrocia, ut appetitiam ciborum, somnum & vires penitus deiceret, atque urina pauca & cum summa difficultate efflueret, purulenta quipiam materiæ continens. Inducias quandoque dolores agere videbantur: sed mox redierunt. Tandem vesicæ inflammatione, ex parte exulceratione, febreque acuta purpuracea supervenientibus, vitam cum morte, non sine summo totius civitatis luctu commutavit.

Epicrisis.

Quando in hac gravis morbi historia enarrata phænomena & circumstantias probe rationi subjicitur, & paulo attentius consideramus, abunde constare arbitror, causam funesti hujus mali neque in vesicæ calculo, neque in humore acri intra cavitatem vesicæ detento, sed in decubitu sanguinis serosi scorbutici intra membranas ejus delitescentis esse querendam & constituendam: quem postea inflamatio cum febre acuta & purpuracea exilioa infecuta est. Mea quidem sententia nullum dubium superest, quin a purpura retrocedente, ob incertius paulo, intra morbi hujus decursum subinde admissum frigus, & crebrius celebratam venæ sectionem, quæ difflationem humoris. morbifici per extimam cutim valde moratur, vis morbi multum increverit. Placet vero hoc loco similem quandam notari dignam observationem, M.N.C. insinuatam, adjicere, quæ abunde docet, a sero impuriori intra vesicæ tunicas sta-

gnante lethales fieri posse vesicæ inflammations. Ita enim legimus, *Dec. 2. ann. 7. obs. 143.* quendam sanguineo-cholericæ constitutionis a juventute stranguria afflictum, incremento atque commissisque in diæta erroribus, frequenti ac dolorifico paucæ, & pallidae urinæ, singulis fere vel vix dimidiæ horæ quadrantibus cruciatum fuisse mihi, una cum tenesmo. Quod malum posteaquam ultra annum frustra omnibus datis durasset, octo ante obitum hebdomadibus accessisse in urina reddenda impedimentum, brevi tamen iterum cessans, intumuisse, doluisse pedes, ac erupisse passim in dorso, & pedibus pustulas, cum ardore, subsequentे spontanea ruptura, exulceratione, tandemque leniori quasi gangræna. Mature quidem topitis hæc fuisse abacta, in regione pubis autem intensissimum dolorem subsecutum tam incredibilem, ut æger ejularet, mens alienaretur, paralyssi latutus sinistrum afficeretur, tandemque motibus convulsivis ipsa mors accederet. Exemta post mortem vesica, interius totam nigricantem conspectam fuisse, spachelatam, sine ulla tam fabulo quam calculo.

OBSERVATIO IV.

Honesta foemina, in urbe vicina degens, quæ annum superavit quadragesimum, mediocris staturæ, & sanguineæ ut vocant complexionis, menstruorum fluxum ordinatum persentit, venæ sectionem etiam aliquoties admisit; aliquot abhinc menses, supra vires aliquoties facta oculorum elevatione, insignem gravatum instar ponderis circa regionem pubis & os sacrum perceptit dolorem, quo præsente menstruus etiam fluxus parcior. Demum ex terrore accidente, spasmus ad inguina acutissimus redditus est, ita ut, ægra id ipsum fatente, longe superaret dolores, quos.

quos foeminae in partu etiam laborioso sustinere debent, cum summa urinam emitendi difficultate, & continuo mejandi & desideri desiderio stipatus. Excepta urina crassum semper depositus sedimentum, fibrosis quibusdam moleculis in ea natantibus. Ciborum perit appetentia, atque somnus, ob urgenter urinæ stimulum, difficilis & interpolatus. Auxilium a me petiit. Ego sanguinem ut in brachio mitteret, & loco cerevisæ decoctum ex speciebus emollientibus, & leniter carminativis biberet, auctor fui. Interdixi autem vinum Rhenanum, & ut in quiete corpus servaret suasi:liquorem quoque anodynum nostrum cum croci essentia mixtum, ad usum internum commendavi: neque minus infusum Theiforme, quod herbam veronicæ, virgæ aureæ, flores malvae, summitates millefolii, radicem altheæ, eryngii, glycyrrhizæ, nucifam & semen foeniculi habebat, mane hauriendum præcepi. Dedi quoque consilium, ut vesicæ regioni frequenter epithema, quod ex vino rubro cum floribus lavendulæ, chamo-mille Romane, sambuci atque rosarum rubrarum decocto, parabatur, applicaret. Hæc quidem usurpavit ægra, & quamvis nondum ex toto malum fuerit depulsum, levamentum tamen eam exinde recepisse mihi rescriptum est.

Epicrisis.

Affectus, qui ex læsa vesicæ substantia oriuntur, præsertim si per aliquod jam duraverint tempus, curatu non tam faciles sunt, ac esse forsan putantur. Possunt tamen opportunis adhibitis remediis mitigari, ut per plures annos trahere adhuc vitam, licet cum molestia, possint hoc vitio laborantes: cum alias incauta vietus ratione, vel importuna per medicamina tractacione, lethalem facile eventum fortiantur. Per quam enim ardua, & difficilis res est, vasa vesicæ sanguinea, a fortiori im-

petu & appulsi sanguinis in eadem nimium relaxata, ad pristinum tonum reducere, & motus naturæ aliquoties eo directos avertere. Ex hac porro morbi historia illud in usum convertere possumus, quod a sola causa externa, videlicet corporum gravium sublevatione & gestatione, in sanguine abundantibus, impetuosa ad partes inferiores in abdomine contentas, quæ quo nobiliores, & sensibiliores, eo gravius luunt, sanguinis enasci queat congestio; quæ certe multorum, nisi cito operetur, funestorum symptomatum fons atque origo evadit. Neque ulla modo mirandum est, congestionem illam in nostro casu vehementiores turbas excitasse, quū terror supervenerit, cuius ea indoles ac facultas est, ut universam humorum massam, motu vitæ plane contrario atque infensissimo, ab exterioribus ad interiora cogat atque repellat.

OBSERVATIO V.

Vir annorum 37. sanguineo-choleri. Urinæ temperamenti, habitus corporis macilenteris, prima statim in juventute, pressio sup. ex go. morbi. +
Veneri atque Baccho hostias assidue litanaverat, lauto insuper usus vitæ & vivitus genere: sanus alias atque robustus, nisi quod aliquoties gonorrhœam dignam factis mercedem deportaverit, quæ semper brevi fuit sanata. Ante aliquot annos, improviso quodam horrore & frigore cum alternante estu corripitur, ac inde in totalem incidit urinæ suppressionem. Medicus calculum vesicæ subesse ratus, sua sit balneum, & tincturam ex cantharidibus præbuit, ac applicato catheterre restitutus urinæ fluxus. Exactis tribus mensibus, idem malum reversum est, idque aliquoties. Postea alterius medici consilio usus est, qui ordinavit emulsiones refrigerantes & antispasmodicas, quibus uberior & liberior redditus urinæ cursus. Anno ab hinc prior morbus denuo cum horro-

re, frigore, alterante astu, & totali urinæ suppressione repetit. Meam vero opem non modo ob præsens malum, sed etiam ob impotentiam, qua laborabat, poposcit. Ego infusum Theiforme, pulverem antispasmodicum, & mixtum ex tinctura tartari, liquore a nodyno & balsamo Peruviano commendavi: quibus naturalis urinæ fluxus restitutus. Postea urina non penitus quidem suppressa, sed filii tenuissimi instar, prævio semper horrore per certa intervalla prodiit. Semen quando vult ejaculari, ad orificium urethræ subsistit, postea sensim exfillat & industum madefacit. Notabile adhuc, quod urina subsistat prius, dein cum impetu prorumpat, præcedente sonitu, als Wenn eine Rübe zerbrochen würde. Sanatus fuit, diuturno per aliquot menses fontis Selterani usu, pro potu ordinario. Et ad alvum laxandam, quæ sæpius erat stricta, pulvis magnesiæ cum arcano duplikato & nitro mixtus conduxit.

sic collum, ejaculatio semenis non modo impeditur, sed & urina tenuis quasi filum proicitur, & quandoque ejus fluxus penitus intercipitur; quod si vero, ob molem tandem prorumpit, orificium urethræ cum vi aperitur: unde talis sonitus, qualis in casu enarratur, emergit. Ego pro potu ordinario fontem Selteranum suasi, cuius eximias virtutem ac facultatem in renum, & vesicas morbis, ad leniendos dolores & spasmos, uring fluxum promovendum, canales obstructos aperiendos, atque mucum viscidum detergendum non satis dilaudare possum. Et quoniam in gonorrhœa in veterata, & in morbis vesicæ & urethræ ex hac prodeuntibus, per aliquot exempla, mirabile thermarum Carolinarum potum, & earum aquæ salutiferæ in membrum injectionem crebriorem, deprehendisse, non dubitavi ejus usum & fructum de meliori commendare.

OBSERVATIO VI.

Epicrisis.

A gonorrhœa venerea perperam & nimis cito curata, ego in praxi mea, morbos vesicæ & vicinarum partium post longum sæpius tempus demum successisse, multoties observavi. Et ratio ex anatomicis quam facile petenda est. Notum enim est glandulas prostatas, quæ plerumque sedem gonorrhœæ constituant, collo vesicæ, adeoque ejus sphincteri & urethræ principio esse annexas. Quod si itaque hec glandulae vel nimium relaxatae, & tumefactæ, aut scirrhose, compriment vesicæ collum, vel acrem exsudantes humorem sphincterem & urethram spasmo ac dolore afficiunt, midum difficilem & ad tempus penitus suppressum, imo interdum cum dolore & spasio consequi, minime mirandum est. Et tale vitium quoque in presenti casu, dictis partibus inhärere, symptomata satis perspicuum reddunt: nam propter compressum ve-

Quondam in Principatu Halbersta-
dieni me consulebat magna dignitatis
vir quinquagenarius, sanguineq; com-
plexionis ac venæctionis osor, ob in-
sanos & immanes fere spasmos & do-
lores, quibus, præsertim Borea flante, in puer-
pube, perinæ & radice penis torqueba-
tur. Juncta simul aderat uringe difficul-
tas, stranguria alvique pigrities, cum
horrore extremorum, atque vigilia.
Remittebant sæpius hi dolores ad
tempus, post revertebantur majori vel
minori impetu. Quum morbi hujus
pertinacis & infesti primam investiga-
rem originem, accepi, Dn. egrotantem
aliquoties in juventute laborasse go-
norrhœa; que quidem a chirurgis cura-
ta, sed ab eo statim tempore, difficulta-
tem in urina emittenda, cum sensu
constrictionis circa has partes ipsum
percepisse. Ipse jam a multo tempore,
propter continuas in officio occupatio-
nes, vita sedentaria nimium indulge-
bat:

bat : nihilominus data occasione , qua crebro utebatur , vinum liberaliter bibt , a victu quoque duro & infumatis carnibus , quibus assuetus erat , non abstinuit . Ad levandos dolores , se nihil melius & efficacius inter omnis generis remedia deprehendisse referebat , ac juscula , in quibus herbæ emollientes , ut parietaria , malva cum floribus atque althea decoctæ erant ; quæ etiam cum aqua calida infusa , & cum syrupo dialtheæ Fernelii edulcorata , insigne allevamentum tulerunt . Ego , morbo & ejus causis probe in examen vocatis , eum vix esse sanabilem , propter magnam læsionem in vesica & ejus collo , edixi . At quia urina lendum viscidum ac arenosum deponebat sedimentum , vel jam rudimenta calculi præsentia , vel futura , ipsi præsagium feci . Ut itaque morbi ferociam leniret , & a gravioribus vesicæ morbis se præmuniret , interdixi cibos falsos & infumatos , omneque cerevisia & vini genus ; ac ut fontem *Wildungensem* , quem jam olim usurparat , pro potu ordinario biberet , balneis frequenter uteretur ex aqua dulci , decocta memorata ex emollientibus continua ret ; ad roborandum vero imbecillum ventriculum , qui perpetuus fere continuorum dolorum comes est , vini Hungarici optimi & recentioris haustulum intra cibos sumeret , ac intra mensis spatium , pilulis ex pulvere rhabarbari , extracto rhabarbari & therebinthina Veneta parati , alvum ter minimum subduceret , auctor fui sua forque . Quibus monitis , vir summe prudens quum obtemperaret , ad sexagesimum & tertium annum , nunquam tamen ab omnibus doloribus prorsus immunis , vitam protractit .

Epicrisis .

Gonorrhœa ex impura venere contracta , quo familiarior juvenili ætati est , eo minus recte ejus sanatio suscipitur ; quia affecti non periti &

circumspecti medici consilio , sed chirurgorum ope uti confuescunt , qui fluxum plerumque adstringentibus nimis cito compescunt ; ex quo fit , ut vel statim in graviora incurant mala , vel dispositio quedam prava in locis affectis relinquatur : quædemum in proiectiori ætate , concurrentibus aliis erroribus lese exerit , atque variis pathemaribus ac vitiis præsertim circa vesicam manifestat . Nam , post quinquagesimum annum , lentior ac difficilior incipit fieri sanguinis in partibus inferioribus & extremitis , ut sunt , quæ in pelvi jacent , per venas recursus & reditus ; præsertim in sanguineis , qui vitam sine motu & exercitatione , atque in occupationibus agere debent . Quando itaque sanguis non exitum habet , neque per sedis venas , neque per artificiali evanescere ; in vesica & vicinis partibus imbecillioribus facile subsistit , & nimium ibi collectus , propter vehementem tunicarum nervarum distractionem & divulsionem , graviores excitat spasmos ac crispaturas sphincteris ac urethræ ; qui difficultatem medendi relinquunt . Urina autem miscitur turbida & viscosa , non aliam ob rationem , quam , quod a stagnante intra vesicæ substantiam sanguine , humor instar albuminis ovi viscidus magno nisu exprimitur , simili ratione , ac fieri solet in hæmorrhoidibus quæ vulgo vocantur albæ ; qui mucus postea cum partibus tartaro - terreis urinæ paulo diutius in vesica detentæ commixtus , calculos quam facile in vesica procurat , & non raro ejusmodi affectibus quo laboravit noster patiens adjungitur , nisi congrua vitæ , diætæ , & medendi ratione id præpediatur . Quod vero favente Borea spasmæ & dolores partium internarum ingrauefcere soleant , ventis vero ex contraria plaga flantibus mitescant , id a nobis sèpius animadversum est : & quanta vis ac potestas sit ambientis atmosphæræ , quæ , a ventis , te-

stante Barometro , mirifice modulatur , partes corporis nostri maxime nervosas distendendo ac strictiores reddendo , inde luculenter demonstratur.

OBSERVATIO VII.

Spasmus vesice, in vita sedentaria ad diitio, su- matus. Clarissimi nominis vir , magnus literator , sexagenario major , sanguineo-melancholici temperamenti , qui continuis lucubrationibus , mentis laboribus & sedentaria vita maximam suæ vitæ partem peregit , ante tres annos mingendi difficultate , cum ponderis cujusdam pressorio sensu in regione inguinali corripitur . Urina non modo viscidum sedimentum , sed multa concrementa calculosa cinericei coloris depositus . Quæ symptomata , succedente tempore , semper propter dolorem & spasmum , ischuriā , dysuriam , urinæ incontinentiam , ani procidentiam & tenesim , vigiliam quoque , sequentes per annos increcentia , ita vires ejus paulatim attriverunt , ut sexagesimo sexto etatis anno extrellum spiritum redere debuerit .

Epicrisis.

Morbos , qui vesicam infestant , ut sunt calculi , exulcerationes , mictus cruentus , dysuria , stranguria , recte & perite satis , primus artis nostræ conditor Magnus Hippocrates inter ætatis senilis effectus retulit . Ad quorum generationem difficilior sanguinis regressus , tum per venas hemorrhoidales , tum per hypogastricas , sedentaria & motus expers vita , sanguinis intermissa detractio , & impuræ seri viscidæ tartarei , ob excretiones per cutim , & urinam , sub hac ætate labentes , cumulatio multum omnino conferre possunt . Sed hos morbos , si ingruunt , difficilioris saturationis , imo insanabiles esse , gravissimus idem Auctor pronunciat . Placet nobis hunc in finem ex M. N.C. Dec. 2. Ann. 6. similis argumenti

casum adducere , cui simul anatome eodem morbo defuncti annexa prostat . Fuit autem Matrona sexagenaria , per viginti annos vidua , sanguinei temperamenti , quæ a deambulationibus plane abstinent , sedentariam solitudinem quærens , ob inerorem lacrymis se fatigans , doloribus ad os sacrum , pariter ac colicis afficitur , aliquando & stranguria ; dein etiam pedum tumore : hinc magis motu corpus destruitur . Ingrave scente ad os sacrum malo calculos ad pisorum magnitudinem cum fabulo egerebat : tandem viribus fatigentibus , appetitu debilitato , cruciatibus strangurię gravioribus , & accedente tenesim , parum fabuli cum foetido & purulento muco excreto , placide animam exhalavit . Aperto corpore intus vesica rugosa & ad magnitudinem pomii contracta conspiciebatur , & non tantum ulcerata interior ejus tunica , sed vasa etiam nigra in ipsa prominentia se offerebant , urethra nimis ampla , ut manubrium cultri anatomici promte trajici posset , vesica fellis colore instar rob cerasorum cum calculis minutis nigerrimis conspectui se prodidit .

OBSERVATIO VIII.

Incidit in memoriam casus , quem ante quinquaginta propemodum annos , cum Mindæ Westphalorum ut Physicus Provincialis medicinam facerem , annotavi . Vir erat sexagenarius , qui , cum ob copiosi spiritus vici ingurgitationem , & vitium duriorem , vitamque otiosam , rheumaticis & nephriticis doloribus plures per annos obnoxius fuisset , tandem in febrem lentam cum mittu difficile quandoque purulento , dolore gravativo & ardore in lumbosinistro stipatam incidebat . Corpus macie erat consumptum , & vires in dies decrescebant . Tandem in

intolerabilem circa regionem pubis passus est cruciatum, cum totali ferre urinæ suppressione junctum. Ad quem sublevandum, neque externa, neque interna probata virtutis anomyna & discutientia remedia quicquam opis contulerunt. Ex quo factum, ut viribus pæne omnibus dejectis, exacto aliquot hebdomadum spatio diem supremum placide subiverit. Concessa a cognatis defuncti corporis sectione, renem finistrum ulcere penitus consumtum & exesum inveni, in pelvi autem insignem, aliquot unciarum, crassi, foetidi puris copiam conspexi, vesicæ tunicis valde laceris atque arrosis. Dexter ren satis erat magnus, cujus ureter instar pollicis distentus: ventriculum valde parvum & contractum, eo quod ultimis diebus nihil assumserat, deprehendi.

Epicrisis.

Ex dissectione hoc affectu defuncti cadaveris, id discere & animadverte-re licet, sævissimum vesicæ dolorem & spasmum cum urinæ suppressione, a causa externa, purulenta nempe materia, quæ ex erosa renum substantia in inferiorem vesicæ sedem descendit, nerveas membranas extrinsecus corrodendo, contingere posse. Lethalis vero ischuria ex eo secuta fuit, quod non modo collum & sphincter vesicæ ab acredine materia hujus purulentæ constrictus, sed etiam ab urinæ copia compressus fuerit: unde factum, ut usus catheteris immisso plane fuerit frustraneus. Atqui hic recordor sectionis nobilis aulici ante viginti fere annos institute, qui gladio vulneratus ex lethali ischuria, per decem fere dies durante, *Dælitii* quæ est civitas Misniensis, sub summis dolorum tormentis animam efflavit. Reperimus, abdomine aperto, in cavitate pelvis uncias aliquot sanguinis coagulati, qui paulatim sensimque ex vulnere non adeo insigni vasis sanguinei in omento stillavit in ipsam pelvis, & valde comprimendo vesicæ

collum, non modo vehementissimos dolores, sed etiam urinæ suppressio-nem insanabilem reliquit.

Notabiles adhuc extant casus in consult. medic. sect. 3. cas. 90. 94.

C A P U T VIII.

*De doloribus & spasmis exter-narum partium rheumaticis.
& arthriticis.*

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Veteres medicorum omnis gene-
ris dolores, qui vel externas
partes musculosas, vel ossium junc-turas & articulationes infestabant, ar-thritidis nomine comprehenderunt
atque sic in monumentis suis propo-suerunt, ignorato vocabulo rheuma-tismi. ARETÆUS lib. 2. cap. 12. de arthritide ita scripsit: *quibusdam in omnem corporis ambitum vagatur, & deinceps transitus quoque in dorsi tho-racisque musculos fit; incredibile est quam late malum serpat: vertebrae dor-si cervicisque dolent, & in summo sacri ossis dolor inhærescit, & paulo post cum renibus & vesica communicatur.* Su-periori vero seculo, Clarissimi Galliæ medici, quos inter primas omnino partes, CAROLUS PISO, RIVE-RIUS, BALLONIUS, CHESNEAU, tenent, dolores, qui medios artus & musculos cervicis, brachii alterutrius, thoracis antici & postici, humeros, scapulas, femora, manus, obsident atque affligunt, rheumati-cos vocarunt. Arthriticos autem di-xerunt eos, qui in articulis tantum & juncturnis ossium resident; ita tamen, ut pro diversitate partium affectarum differentes etiam denominations fa-stæ fuerint: si enim dolor in pedum articulis constitit podagra; in manib-
qui pro
diversi-
tate pa-
rata lo-
corum
dissessa
numina
recepit
rum.
chiragra; in cubitu onagra; in dentibus dentagra; in vertebris dor-si lumbago; in articulationibus ossis ilchii,

ischii, dolor ischiadicus audit. Verum nostro etiamnum tempore, incipientem & facilius traesentem arthritidem, chiragram, & podagram, rheumatismi nomine insignire consuecant.

§. II.

*Cum spe-
cialiter
hi affi-
ctus por-
ter exal-
tatur.*

Cum vero insignis ratione partium dolentium, causarum, symptomatum & methodi medendi inter rheumaticos & arthriticos dolores sit differentia, cum sufficienti & stabili ratione, medicorum & sagaciores & peritiores hos affectus specialiori tractationi & explicationi submittere haud dubitarunt. Neque est exigui in ipsa praxi medica momenti, arthritidis recentis & incipientis a vera radicata & inveterata differentia.

§. III.

*Differen-
tia rheu-
matismi,
ab arthri-
tide.*

In rheumatismo, musculi cum eorum membrana communi & tendinibus, ubi ossibus inferuntur, gravi dolore & spasmo hinc inde in artibus aliisque corporis regionibus afficiuntur; in arthrite vero ipsa ligamenta tendinoso-nervea, quibus invicem ossa conjunguntur & combinantur, quatenus illa periostio coherenter vehementius affiguntur. Sed uti in arthrite ac podagra incipiente dolor magis in superficie ligamentorum habet & urget: ita in inveterata, humor vitiosus, dolorum fomes, profundior est situs, & spatium magis inter cavitates articulorum occupat. Deinceps quoque in eo differentia arthritidis veræ & rheumatismi constituenda venit, quod illa saepius recurrit, homines misere exerceat, atque longiori tempore insistat, difficilioris quoque sit sanationis; rheumatismus vero quandoque semel vel bis tantum per omnem etatem adoriatur, neque tam diu inhærescat, facilis transeat, & sanationem promptiore admittat. Variat quoque saepè ipse dolor: nam in rheumatismo magis est tensivus, pressorius, gravatus cum frigore junctus, sine conspicuo tumore ac rubore; in arthrite vero lacinatus, divulsorius,

pungitivus & quasi rupturam minans cum insigni tumore & rubore percipitur.

§. IV.

Sicuti omnis per molestæ sensationis *Horum causa* est humor sive copia sive in-temperie peccans, intra vasa minima tunicarum & membranarum nervosarum stagnans atque congestus, qui violentia quadam eas distendit, vellicat, divellit, arrodit: ita etiam eandem causam in rheumaticis & arthriticis affectionibus locum habere extra omne dubium esse videtur.

§. V.

Attenta constat experientia, non modo ætate florentes, juniores, sanleviores, & sanguineo-ferosæ comple-
*a trans-
piratio-*
xionis, spongiosioris corporis habitus, ab improvide admisso frigore, vel vento Boreali impetuosis in partem irruente; sed etiam plethoricos sive feminas, sive viros vegetæ alias *vel omis-*
naturæ, omissa consueta venæ sectio-
sa vene-
ne vel scarificatione, post prohibita cum primis transpirationem, rheumaticos e.g. in cervice, scapulis, humero, dorso, sterno, thorace, dolores, vel levioris gradus arthritides experiri: cum natura debiles minus fibrosi & laxioris habitus, a parentibus arthriticis & podagricis geniti, & qui immoderato Veneris vel vini usu, comedationibus, mentis fatigationibus & vehementioribus animi commotionibus, tono & robore valde imbecilles redditи fuere, vera profundiori & magis pertinaci arthrite imprimisque podagra afficiantur atque excrucientur.

§. VI.

Qui graviori praesertim inveterata arthrite laborant, ii, conquiescente *nephritis al-*
ternae, quam facile in nephritidem calculos dilabuntur, & cessante hac, in arthritidem alternatim quasi recidunt: insuper quotidiana docemur experientia, arthriticos & maxime podagricos digestionis vitio plerunque laborare, & primas eorum vias-
vitio-
ructibus, flatibus, spasmis & illuvie-

vitiisorum humorum, sub alvo priore esse turgidas: quin imo observamus plurimos podagricos esse hæmorrhoidarios, sive insultus ac motus, quamvis inaniter & sine bono successu & exitu, hæmorrhoidales experiri, doloribus in osse sacro pertinacius insistentibus & quandoque venis circa sedem tumescentibus.

§. VII.

Differunt dolores tam rheumatici quam arthritici ratione causa-rum, &c. Quemadmodum non una eadem que humorum, qui dolores fovent atque ingenerant, indeoles atque contidio est: ita etiam & ipsi dolores ratione gradus, genii, & symptomatum rheumatici & arthriticci multum habent discriminis. Nam ubi sanguis tantum copia peccat & nondum multis impuris particulis est inquinatus, mitius solent affigere dolores: id quod in rheumatismo simplici, & incipiente arthrite plethoricorum occurrit. Longe vero gravior horum dolorum species est, quando a seri impuri & excrementitii colluvie foventur & sustentantur. Siquidem ego multoties observavi, uti in omnibus doloribus; ita etiam in iis, qui partes externas & nervosas graviter afficiunt, rarius solum sanguinem bene temperatum & purum peccare, sed sero excrementitio ut plurimum esse stipatum: ita tamen, ut vel nimis sit tenuis & serofus, exigua rubicunda consistente portione refertus, vel sero viscido glutinoso tenaci imbutus delinquat; ipsa etiam excrementitia & impura salia multum ratione acrimonie volatilis fixæ falsæ & tartareae in cruce differunt, quæ diversa hinc symptomata producunt: ut adeo pro dissidente inter se harum causarum natura & indole, rheumatismus non male a medicis exercitatis in sanguineum, in cacoehymicum, scorbuticum, fixum & vagum, distingui possit.

§. VIII.

Hinc e-vena mis-sus san-guis dif-fert. Ex quo fit, ut sanguis in diversi generis doloribus e vena emissus, & ratione coloris & consistentiae mul-

tum differat. Nam, quandoque in aquam calidam immisus multo tenaci muco ex fibris varie intertextis constante abundans conspicitur; interdum serum, quod supernat, mox instar glutinis vel corii concrevit, non secus ac in peripneumonia graviter affectis evenit; alio tempore serum valde tenue est, & sanguis cocinei coloris, quod fit sæpiissime in rheumatismo vel arthrite vaga, indicio non incerto, sal ad alcalinam volatilem naturam vergens ei admixtum esse. CAROLUS PISO *in lib. de morb. ex colluv. serof. oriund. Sect. 5. cap. 3. pag. 433.* in doloribus externi habitus mastam sanguinis tanta serofa colluvie scaturisse observavit, ut deposito in pelvi vigesima vix pars in fundo subsederit, quæ sanguinis colore & consistentiam retinuit, reliquo liquore supernatante penitus aqueo, sed obducto pellicula viscosa & alba. BALLONIUS *quoque libr. de rheumatismo*, aliquoties sanguinem, quem magna copia e brachio detraxit, impurum & in putridum serum resolutum vidit. Ego vero non semel sed multoties annotavi, quod in principio horum dolorum sanguis bona consistentia, longiori progressu, vel quando malum altius radices egit, admodum serofus, corruptus, & pellicula tenaci imbutus fuerit emissus. Nam sanguis abundans primam quidem caulam & originem hisce doloribus præbet, sed sub longiori morbi decursu, motu intestino calido per continuam agitationem in vitiolum serum convertitur: qua de causa ipse modo laudatus CAROLUS PISO, eruditissimus scriptor omnes arthritidis & rheumatismi species inter morbos a colluvie serofa ortos retulerit: id quod etiam urina copiose tenues, neque minus limosa & turbida, atque copiosi fœtidí sudores, qui hisce doloribus adjungi solent, commonstrare videntur.

§. IX.

*Ratio
generica,
ex Hippo-
cratis.*

Quæstio nunc haud exigui in theoria medica momenti solvenda incidit: quomodo & qua ratione seri vitiosi a sanguine, qui jugi per vasa & tubulos motu circumvolvit, separatio, stagnatio & decubitus in partibus exterioribus nervosis fieri possit. Ut ut vero veterum theoria, subsidiis physicas & anatomicis plane destituta in evolvendis morborum causis ac generatione imperfectissima sit, nihilominus HIPPOCRATES lib. de flabit. ratiocinio mere physico mecanico harum fluxionum dolorificarum causas & modum generationis pulchre exponere annis est; ubi §. 13. 15. 16. meminit: sanguinem ipsa natura calidum vi coactum, per angustam viam, celerrime, propter obstracula & oppillationes, transire non posse, & hinc tenuissimum per venas excludere, atque id ipsum tenuissimum liquidum, cum coacervetur, per alios meatus fluere, & ubi tandem in loco constiterit, fluxiones & dolores in partibus fieri.

§. X.

*Ex nostra
senten-
tia.*

Nos vero, ut genesin horum morborum ad paulo clariorēm conceptum redigamus, primo causas occasionales & antecedentes, deinceps modum, quo invadere hi dolores solent, spectare debemus. Jam autem per constantem & indubiam experientiam notissimum est, quod dolores artuum rheumatici incident frequentissime in ea corpora, quæ præcedente intensiori motu, labore & exercitatione aut balneo calido vel aere nimis fervido calefacta, inclemetiori frigido cœlo, aut vento boreali subito exposta fuerunt; ubi non ita multo post, cum prævia quadam horripilatione & laetitudine, dolor gravatus presorius & contractorius, hinc inde in partibus v. g. in cervice, scapulis, humero, dorso, lumbis, genibus vel in eo latere, quod vehementia borealis venti profundius penetravit, interdum etiam in universo corpore obori-

tur: qui eo gravius affligit, quo corpus majori sanguinis copia turget. Ego insuper plus vice simplici observavi, permultos a largiori sanguinis per venam sectam missionem, vel fœminas post sanguinis menstrui copiosioris profusionem, vel post eandem ex abortu factam, quin etiam post nimias alvi a purgantibus acrioribus vel sponte a natura inductas dejectiones, penetranti frigidæ boreali vel humido-frigidæ nocturnæ auræ, ubi corpora paulo diutius commiserunt, in graves rheumaticas affectiones incidisse: idque non alia ex causa, quam quod frigoris in poros corporis penetrantis vehementia, tubuli minimi venosi, arteriosi, lymphatici, sanguinem revehentes, & ad substantiam partium pro nutritione adducentes, compressi, coarctati & occlusi fuerint: quo factum est, ut, cum serofus latex vasis suis amplius contineri & circulari non potuerit, instar fluvii sese alveo efferentis, in ipsam partium substantiam modo hic modo illic magis exundaverit, sive extra vasa & circulum positus fuerit. Omnis vero humor extravasatus, cum per ipsam moram a crasi blanda naturali deficiat & indolem plane alienam acquirat, partimque glutinosus tenax, partim acris salsus evadat; fit, ut a tensione, compressione, lancingatione, & vehementi strictura partium fibrosarum & nervearum molestissimi & acerrimi dolores sæpiissime cum frigoris glaciati sensu oboriantur: sed quandoque etiam accedit, ut serum extravasatum, non secus ac albumen ovi fieri solet, in tenui & corruptum liquamen, quod amplius a calore fortiori non admittit coagulum, facessat, & ex uno loco præsertim superiori ad inferiores per porosam partium substantiam & habitum carnosum transeat; nihil enim frequentius in praxi occurrit, quam quod rheumatismus locum suum mutet, & ex capite in cervicem, in scapulas, humeros ac pectus, præsertim in etate minoribus transeat,

in adultioribus vero in dorsum, coxen-
dicam regionem & femora descendat.

§. XI.

*Rheuma-
tismus
& arthri-
tis ver-
nalis &
autum-
nali tem-
pore af-
figuntur.*

Constanti insuper experientia con-
firmatum habemus, rheumaticas & aque-
as arthriticas affectiones frequentissi-
me circa vernum tempus & mense
Octobris, sub insignibus aeris &
tempestatum ex calido in frigidum &
ex frigido in calidum mutationibus,
ventisque repente ex contraria plaga-
se invicem excipientibus, corpora-
tam sanguine quam sero impuro ple-
na impetere atque lacefere, & qui-
dem cum febriculosa quadam com-
motione sequentem in modum: Præ-
cedit spontanea lassitudo & gravitas
artuum cum extremarum partium
refrigescentia, horripilatione & quo-
dam rigoris sensu; subsequitur an-
xius internus aestus præsertim circa
præcordia, concitator & strictror
pulsus, inquietudo, sitis, inappeten-
tia, alvi obstrutio, quandoque spi-
randi angustia: dolor postea gravis
acutus vel gravatus, tensivus, has
vel illas partes occupat, qui noctu
exacerbatur, non secus ac in febri-
bus catarrhalibus fieri afolet: & utut
febrilis hæc commotio alias gravius,
alias mitiori gradu affligat & facilius
transeat, nihilominus dolor in affe-
ctis partibus adhuc relinquitur, eas-
que laceffendo diutius sœpe persever-
rat. Cum vero omnis febrilis com-
motio ejus sit genii & indolis, ut par-
tes exteriores & nervosas spasmo affi-
ciat, & tenuissimas vasorum radices
& apices coarctando & comprimen-
do, sanguinem & humores in vasis
majoribus & interioribus accumulet,
atque in corde & arteriis celeriore
fystole efficiat; fieri aliter vix po-
test, quin cum magno impetu san-
guis in laterales arteriarum ramos,
qui sanguinem coloris coccinei non
vehunt, intrusus, tandem serosam sui
extra vasa portionem dimittat, &
inde dolorum origo fit. Sed monen-
dum hoc loco est, quod dolorifica hæ-
partium sensuum spasticæ strictræ

*Eorum
proces-
sus.*

non tam a sero tenui in eas irruente,
qua pars maxime diffatur, sed po-
tius a viscidiорibus ejus partibus, spi-
culisque & aculeis salino-acribus reli-
atis & intime earum poris se insinuan-
tibus proficiscantur. Hinc etiam fit,
ut non tam promite & facile, ob ma-
teriam vitiosam partibus altius im-
paciam, hi affectus medicaminibus
cedant.

§. XII.

Ex dictis itaque luculenter consta-
re potest, impeditum sanguinis cir-
culum & regressum per minima vasa,
proximam & evidentem causam ad
generationem ejusmodi rheumatico-
rum dolorum constituere: id quod
clarius eluiscere & demonstrari po-
test exinde, quod, ut ego ipse ali-
quoties observavi, a paulo strictriori
ligatura, post sectam venam, ob in-
fictum paulo gravius vulnus in pedi-
bus intra 24. horas relicta, dolor ip-
sos pedum & maxime pollicis articu-
los non secus ac in podagra fieri solet,
per multos dies cum molestia durans
invaserit. Idem non ita pridem con-
tingebat celebri medico, qui in ipsa
sura certas forte ob causas venam per-
tundendam curavit, ubi fortiori lig-
atura ob profundorem venæ situm
opus fuit; sed factum exinde est, ut
altero mane, atrox dolor cum tu-
more non modo suram, sed ipsos
quoque pedum articulos infestaver-
it, cuius per interna & externa
remedia discussionem, ne deterius
succresceret malum, magna cura &
sollicitudine moliri & procurare de-
buimus. Videamus etiam ex dictis
propinquâ admodum cognatione
rheumatismum cum morbo articu-
lari conjunctum esse, huncque sa-
pius ita mentiri, ut a quibusdam
arthritidis universalis & vagæ no-
mine insigniatur: nam & hæc quan-
doque repente in plures irruit arti-
culos, & spine vertebras & munitu-
ras ossium gravibus excrucias do-
loribus. Neque ignorantia in praxi
est, quod rheumatismus fixus ac
*Causa
proxima
impedi-
tus cir-
ulus -*
*Quod
exempli
illustra-
tur.*

vagus in iis, qui saepius ac iterum eundem patiuntur, praesertim si aliunde debilitatem contraxerunt, in veram tandem arthritidem transformetur. Et quia hemicrania pleuritis & hepatitis spuria, de quibus supra actum, item odontalgia species rheumatismi sunt, certum ac nihil dubii est, quin etiam earum generatio sub iisdem causis atque eodem modo procedat.

§. XIII.

Rheumatismus Ceterum illud crebra animadversio ne compertum est, nulli ætati, nulli invadit, sexui rheumatismum parcere: quos alioquin ab arthritide fere immunes

HIPPOCRATES Sect. 6. aphor. 29. § 30. pronunciat. Maxime vero omnium videmus, eos, quibus in juventute haemorrhagia narium frequentiores fuere, & dein cessarunt, rheumaticis esse obnoxios doloribus: quod itidem ab Hippocrate lib. 2. prophet, notatum est, ubi nos docet, quod in his, quibus circa articulos tumores & dolores sunt, viscera plerumque magna subsint, quibus in pueritia & juventute sanguis & naribus fluere desierit: ac proinde interrogandum esse admonet, de sanguinis eruptione, factane in juventute fuerit; item an pruriginosæ, veluti ab urtica punctura vel in pectore vel in dorso subsint, utpote quæ impuritatem seri abunde arguant. Sed quod Hippocrates de haemorrhagiis narium innuit, id intelligendum quoque esse arbitror de omnibus aliis sanguinis salutaribus excretionibus.

Nihil enim magis in praxi occurrit: quam quod foeminae praesertim sanguineæ complexionis, post quinquagesimum annum prorsus cessante sanguinis fluxu, nisi tempestive vene sektionibus occurratur, vagis & gravibus hinc inde in partes irruentibus dolorum tormentis afficiantur. Neque amplius incognitum esse potest in arte exercitatis, haemorrhoidalem fluxum consuetum, si debito modo & tempore procedit, a doloribus & rheumaticis, & arthriticis viros immunes praestare posse; quibus sub ejus-

dem fluxus defectu vel suppressione tandem obnoxii sunt. Neque tamen mihi ignota sunt exempla, ubi in debilitatis & cacheticis, praesente hoc fluxu nec dolores arthritici nec nephriticci desierint.

§. XIV.

Denique quod ad generationem horum dolorum pertinet, non praetermittendum esse arbitror, eos qui corpus valide movent & exercent, qui parcius vivunt, & aquam portant, liberos plane ab ejusmodi afflictionibus permanere: cum contra qui vitam agunt otiosam, vinis & spirituosis potibus & comedationibus nimis delectantur, ac Veneri intemperate, & nondum matura ætate nimium dediti sunt, gravioribus rheumaticis & arthriticis doloribus crebri exerceantur.

§. XV.

Neque hoc loco omittendum est, quod ab aliis praecedentibus & diu inhærentibus morbis febribus maxime intermittentibus, praesertim si male tractatae fuerint, insignis ad hos affectus dispositio arcessatur. Ita *BALLONIUS* lib. de rheumatismi plurimos vidit, qui, quartana chronicâ laborante, sub finem morbi, in graves artuum imo totius corporis dolores inciderunt. Novimus etiam doloribus ventris & colicis diu affigentibus artuum dolores vagos certis periodis infestantes satis acerbos successisse.

§. XVI.

Datur etiam rheumatismus scorbuticus, in quo universa lymphæ & serni massa impuris excrementitiis salino-sulphureis acribus particulis, quæ subinde per exanthemata maculas & purpuram sese manifestant, infecta est, atque ex prava dura salsa diaeta, vita otiosa & sedentaria, familiaris aeris-gravidi & vappidi usura, diuturnaque tristitia, originem suam dicit, & exinde incolis regionum maritimorum solennis & frequentissimus esse solet.

Qui ab his affectibus liberis?

qui iis obnoxii?

Causa ad eos disponentes.

Rheumatismus scorbuticus.

§. XVII.

§. XVII.

Venereus. Gravior vero est rheumatismus Venereus, qui horrendis dolorum tormentis, noctu præsertim intensioribus, certis nervosis partibus pertinaciter inhærescens, eos qui ex impuro coitu, virulento & putrido miasmate universam lymphæ & sanguinis massam contaminarunt, misere ex. cruciat. Quæ omnes commemoratæ huc usque cause eo collineare videntur, ut serum sanguinis adaugeant, intemperatum ac impurum reddant, robur ac vires partibus solidis subtrahant, excretiones salutares immuendo, ut postea ejusmodi seri stagnationes, fluxiones ac acerbæ & dolorificæ passiones inde resulant.

§. XVIII.

Solvuntur bi-
morbis per su-
deorem &c.

Atqui ex hisce jam clarissim patet ratio, quare hi affectus salutariter copiosis urinis & sponte sudoribus obortis, nec non hæmorrhagicis excretionibus solvantur, vel cur a variis cutis efflorescentiis multum levannis ægrotantes accipiant; quorsum pertinet aphorismus Hippocratis 74. Sect. 4. quibus spes est ad articulos futurum abscessum, eos liberat urna multa, crassa & alba prodiens, qualis in laboriosis febribus quarto die quibusdam exire incipit. Si vero sanguis e paribus profluxerit, brevis admodum sit solutio. Per laboriosas vero febres nonnulli rectius rheumaticas intelligunt, quæ cum sensu doloris & lassitudinis in toto corpore accident. Annotatum quoque a nobis sèpius est artuum dolores, ulceribus sponte subortis in pedibus conquevisse, qui, postquam arte consolidata fuerunt, mox resuscitati sunt. Novimus pariter, immanes artuum dolores, oborta psoa vel scabie lepræ albæ nataram habente, penitus sublatos. Nam sicut metastasis materiae vitiosæ a partibus interioribus ad exteriore saluberrima est, ita contra, quæ ab extensis ad interiora & ipsa viscera vergit, est perniciossima.

§. XIX.

Affectus rheumatici, & incipientes podagrī quam diu in externis partibus versantur, neque perversa tractatione humor vitiosus introrsum ad nobiliores partes repellitur, qmā vacant pericolo, nec facile hominem e medio tollunt. Quemadmodum vero in primis annis, atque in adolescentia ejusmodi molestæ ac catarrhoſæ fluxiones in capite, & rheumaticæ in partibus musculosis cum crebrioribus narium hæmorrhagiis insignem naturæ imbecillitatem live tonum & robur solidorum dejectum desigant. Ita plures chronicas in juvenili & viroli exato, ratione causæ & genii cum hisce affectibus correspondentes ægritudines præfigunt, præsertim quando ex parentibus morbosis & hypochondriacis prognati fuerunt.

CURATIO.

§. I.

Ex hisce omnibus, quæ jam in medium a nobis prolatæ fuere, satis abunde intelligi posse arbitror, totum curationis caput & methodum mendendi rationalem in eo consistere, ut probe & pensiculate individui laborantis naturam, differentes causas, num incipiens sit, & a sanguinis copia & nimia mole, num a coluvie impuri seri provenerit, & jam malum radices egerit? consideremus, & secundum has circumstantias & differentias indicationes therapeuticas primum formemus, apta dein & convenientia remedia in usum proponamus.

§. II.

Quandocunque igitur corpus evidenter est plethoricum, & rheumatismus universalis omnes propemodum corporis artus cum febriculosa quadam motione graviter impedit atque infestat, adeoque secundum veterum scholas sanguineus est, omnino in venæ sectione, & quidem statim in prin-

Arque
si rito
traditum.
tur, pe-
riculo
uscane.

Indica-
tiones
thera-
peuticae.

Vene se-
tim in
princi-
pio cele-
branda.

principio administrata , celerrimum & præsentissimum est reponendum præsidium . Id quod jam olim medicorum peritiores agnoverunt : qua de re insignis locus extat apud ALEXAN. TRALLIANUM qui lib. 11. ita scribit : si humorem , qui in articulos confluxerit , sanguineum esse suspicemur , ubi quidem nihil prohibet , vacuationem qua per venæ sectionem adhibetur tentato : hac enim ratione multos novi aut in totum morbo liberatos , aut raro fluxionibus correptos ; eo , quod non neglexerint , sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curavint , non solum vacuandi , sed etiam preservationis causa id facientes . Id quod etiam nos confirmamus : nam plures novimus , sanguine ac succis plenos , qui a causa externa transpirationem universalem sufflaminante in immanes totius corporis dolores cum stupore & immobilitate partium repente conjecti , unice fere matura sanguinis missione eaque intrepide & tuto , urgente necessitate , circa quartum diem repetita prorsus convaluerunt . Novimus etiam homines sanguineo-cholerica vel melancholicæ constitutionis , consistentes atatus , in dolores chiragricos & podagricos mitior naturæ prolapsos , venæ sectione circa æquinoctia , vel interdum etiam circa solstitium æstivum admissa , ab iisdem & præservatis & immunes redditos fuisse .

§. III.

Hinc in Galia etiam valde estimatur. Et quia rheumatismus sanguineus in nulla regione familiarior ac in Gallia est , ob sanguineam incolarum complexione & victum copiosum sanguinem ingenerantem ; non mirum est , præstantissimos Galliæ medicos , qui primum & optime de rheumatismo quicquam solidi & effectu dignum literis prodiderunt , hoc remedii genus maximopere æstimare ac collaudare . Ita BALLONIUS lib. de rheumatism. inquit : laudamus impendio phlebotomiam in hoc morbo , quam salutare remedium esse te-

stamur . Pariter ac CAROL. PISO l.c. plurimum momenti tam in curatione , quam in præservatione rheumatismi , in repetita sanguinis missione situm esse affirmat ; multaque notatu perquam digna in eam rem exempla subjungit . RIVERIUS Cent. 3. obs. 42. & Cent. 4. obs. 42. septem vicibus in juvene , atque in alio totidem insituta venæ sectione , adhibitis paucis aliis remediis , contumacem rheumatismum feliciter abactum observavit . Maxime omnium vero spectandus LEONH. BOTALLUS primus ille venæ sectionis in Gallia auctor , qui libr. de curat. per sanguin. mission. c. 12. pluribus & rationibus & exemplis confirmat , quantum utilitatis & levaminis præsentissimi in doloribus rheumaticis etiam repetita venæ sectio attulerit . Ex Anglis SIDENHAMUS in Oper. p. 170. curationem non aliunde ac a phlebotomia petendam esse asseverat , eamque aliquot dierum spatio repetendam . Lectu quoque dignissima est observatio , quæ in M. N. C. Dec. 2. ann. 9. obs. 120. p. 290. extat , de rheumatismo universali , sola venæ sectione reiterata felicissime & brevi tempore curata . Multo vero magis hoc auxilii genere opus erit tam ad sanandum , quam ad avertendum hoc malum in foemini mensium defectu vel plenaria emansione laborantibus , vel in viris quando consueta hæmorrhoidum fluxio fuerit suppressa .

§. IV.

Præter sanguinis missionem in affectione rheumatica & arthritica calida incipiente & cum febrili æstuatione phoreticæ juncta , temperatoria diaphoretica cum nitrosis moderate mixta , medio-cri sed saepius repetita & continuata per tempus dosi oblata , ad æstum , fervorem & orgasmum sanguinis temperandum , atque etiam ad humoris vitiosi lenem & successivam discussiōnem æqualiter per universum corpus promovendam , præsentissima levanamen conferre & ratione & experien-

rientia suffulti asseveramus: quo in genere ceteris omnibus palmam præripiant, pulvres ex lapidibus cancerorum, unicornu fossili, cornu cervi sine igne vel uslo, antimonio diaphoretico vel ejus cerusa, succino, conchis præparatis, cinnabari, adjecta sufficiente quantitate nitri purificati vel melius artificialis confecti, qui cum aquis diaconoicis, & leni anodynæ virtute conspicuis, ut sunt aquæ floræ sambuci, acaciae, ulmariae, tiliae, cerasorum nigrorum, cardui benedicti, mariae, scabiosæ, propinandi sunt: neque inutile, sed valde commodum erit, ad febriles volaticos æstus melius compescendos, succi citri quippiam, vel ad gratum syrupum acetositatis citri in convenienti quantitate adficere & hæc singula in mixtrum redigere. Pro potu ordinario serum laetis cum succo citri vel cremore tartari acidulatum, aut tamarindatum, vel aquam decoctam cum rasura cornu cervi, radice scorzonerae, cichorei, glycyrrhizæ, graminis, semine foeniculi, commendamus.

§. V.

*Quando cum venae sectio-
ne caute-
mercan-
dum?*

Quandocunque vero rheumaticæ ejusmodi afflictiones non tam sanguinis puri & consistentis copiam, sed seroli impuri plenitudinem & colluvie, in corporibus præsertim debilioribus seroæ & phlegmaticæ constitutionis pro causa agnoscent, tunc omnino cautiissime, præsertim in ipsa curatione cum sanguinis missionibus agendum est. Reete hinc GALENUS lib. 6. aph. 47. scribit: *illis, qui plenitudinis pa-
fionibus subiectiuntur, per venæ sectio-
nem succurrendum esse, qui vero corru-
ptos succos in corpore sovent purgatio-
nem exhibendum, seque hac ratione
non modo plurimos servasse sanos, qui
longo ante tempore singulis annis
morbis caperentur, sed & podagram
& morbum articularem adhuc incipi-
tentem ex tali evacuatione mûltis
jam annis fieri prohibuisse.* Qui vero
jam saepius cum hisce fluxionibus con-
flictati sunt, plus noxæ quam auxiliū

Hoffm. System. T. IV. P. II.

ex sanguinis detractione sunt consecuti, prælertim, si corpore sint imbecillo & frigido ac in ætate senili constituti.

§. VI.

Ex quibus jam liquido constare potest, quod veterum medicorum peri-
tores, differentiam dolorum maxi-
me arthriticorum secundum causas in
curando probe observandam esse ani-
madverterint. Nam alia ratio est
curandi rheumatismum vel etiam ar-
thritidem incipientem eumque uni-
versalem in corpore plethorico, qui a
sanguinis præternaturali redundantia
ob transpirationem interceptam pro-
ficiuntur; alia medendi ratio est, ubi
atrox dolor certæ tantummodo parti
pertinaciter inhæscit, cum ingenti
frigoris sensu stipatus & a vehementia
hujus imprudenter admitti in corpori-
bus seroſioribus excitatus: alia meden-
di via ineunda, quando status pletho-
ricus longiori sub morbi decursu vel
improvida medicatione in statum ca-
chepticum vel cacochymicum degener-
avit, & parum sanguinis boni &
consistentis, permultum vero liqua-
minis seroſi & excrementitii in vasis
continetur: quibus in casibus ea,
quam maxime remediorum genera
indicantur, quæ seri vitiosi illuviem
blande sed sufficienter tamen per con-
grua emundatoria, per alvum videli-
cet, per subcutaneum cribrum & per
urinas evehunt.

§. VII.

Quod ad usum evacuantium attinet, (1) Bi-
nullo modo hic vi agendum, sed pau-
latim & successive bilioso & viscidæ
seroſe fôrdes per mitiora & tempera-
tiora medicamina educendæ. Cui sco-
po obtinendo, ex nostra quidem expe-
rientialia, egregie satisfaciunt, infusa ex
aqua dimidia vini parte remixa, cum
radice cichorii, pimpinella, polypodiis,
rhabarbaro, foliis sennæ sine stipitibus,
herba cardui benedicti, summitatibus
centaurii minoris, agarico, corticibus
aurantiorum, citri, cortice ligni sassa-
fras, passulis minoribus & tartaro tar-
tarifato leniter decoquenda. Utile

P. quo.

*(1) Bi-
lioſe
fôrdes
per bla-
da la
xanias
educa-
de.*

quoque est rhabarbarum mansum ad scrupulos duos vel drachmam cum uvis pinguibus vel Corinthiacis: nam nostra certe experientia rhabarbarum in substantia sumtum abundantius multo & duplo plus quam si in decocto & infuso detur, educit, quippe simul tonum intestinorum & viscerum insigniter roborat. Bis autem minimum vel ter in hebdomade ejusmodi evacuans exhibere convenient, ut fordes ex primis viis a prava digestione relictæ evocentur, quæ alias ad morbum fovendum & sustinendum, ejusque vim augendam permultum conferunt. Atqui hujus generis alternantibus & evacuantibus, in doloribus periodice, sive certis horis irruere atque infestare solitis, nunquam carere nos posse multoties edoctus sum.

§. VIII.

(2) Visionem seruum permissioris diaphoretica evocandum. Primis viis sic probe evacuatis, vi-
tiosi seri molem, per decocta liberio-
rem transpirationem quæ expedit
& leniter sudorem movent, educere
& utilissimum & necessarium est:
qualia ex radicibus & lignis, ut radi-
ce chinæ, sarsaparillæ, cichorei,
glycyrrhizæ, scorzonerae, ligno &
cortice sassafras, ligno santali citrino,
guajaci, ficubus & passulis minoribus
parari possunt. Si malum quodam-
modo radices egerit & inveteraverit,
antimonium crudum cum dupla por-
tione pulveris bezoardici & diaphoretici
supra descripti, convenienti dosi
& tempore exhibitum opem non sper-
nendam prestitisse a me plures obser-
vatum est. Ceterum liquor, qui diure-
tica diaphoretica & simul tonica effi-
cacia insigniter sece commendat, ex
tinctura tartari, antimonii acris, cum
liquore anodynō minerali & spiritu
tartari decenti proportione permixto
componendus, accommodatissimum
remedium est, & præsentissimo cum
fructu usurpatur.

§. IX.

Rheumatismus corporis Quandocunque rheumatismus sive
fixus sive vagus scorbutico corpori in-

siderit, & evidentibus se signis ac sym-
ptomatis prodit, curationi paulo *scorbus*
longius insistendum erit. Neque enim *scorbus*
tam promte & facile tota lymphæ &
seri malsa intemperata, corrupta & sa-
dinis excrementitiis partibus deturpa-
ta, in nativam & pristinam dulcedinem
& consistentiam reduci poterit. Con-
veniunt tunc maxime diluentia de-
mulcentia, paulo majori copia & lon-
giori tempore exhibita: inter quæ, fe-
rum lactis dulce mannatum, vel aci-
dulum tamarindinatum, aut purum
cum succis herbarum antiscorbutica-
rum permixtum, item aquæ minera-
les temperatores: *Selteranae*, *Wild-
dungenenses*, *Tannsteinenses*, vel in
robustioribus, *Pyrmontanae*, *Egra-
nae* cum dimidia lactis asinini vel vac-
cini parte maritatæ, & sub conve-
nienti diætetico regimine usurpatæ,
omne fere curationis exoptatae pun-
ctum complent.

§. X.

Si rheumatismus ex luis venereæ *Si ex lue*
reliquis in sanguinis massa contentis, *Gallica*
ut non raro evenit, originem suam
deco-
ducit, duriori cuneo opus est, utpote, *Baligni*,
nisi decocta lignorum sudorifera, per
canticum
antimonii crudi vel etiam mercurii
mercur.
dulcis additionem armata & nobis-
lilitata, prudentem in usum vocen-
tatur, raro speratus & salutaris effe-
ctus obtinetur.

§. XI.

Quod attinet ad ipsa topica, quæ
ad humoris certam partem obsidentis
placidam & successivam discussionem
quidpiam conferre valent, magna
etiam cautione in iis eligendis & exhiben-
tibus opus est, ne plus detrimenti
quam emolumenti afferant. Si rheu-
matismus est sanguineus, præstat pe-
nitus ab iis abstinere, & tantum
moderato & æquali lecti & tegumen-
torum calore partes dolore affecta fo-
vendæ sunt: siquidem tali modo lon-
ge felicius blanda materia quæ in vitio
est diffusio & exhalatio promovetur,
ac si variis externis eam adjuvare ve-
limus. Si vero spissus, immobilis &
fri-

*Topicis
rū usus
sit causa
sus.*

*Quando
omittenda?*

*Quando
admit-
tendus?*

*Quando
admit-
tendus?*

frigidus humor paulo altius & pertinacius, cum frigoris sensu ac strictura pororum, partibus insidet; tunc omnino frictiones cum pannis asperis & calidis instituta, e sedibus suis fixis humorem tenacem potentissime evocant. Post frictiones cucurbitæ cum vel sine scarificatione applicandæ; ubi tamen animadverti illud debet, quod cucurbitæ cum scarificatione dolentibus ejusmodi partibus appositi, cum profundiori etiam vulnusculorum inflictione, parum admodum sanguinis eliciant: luculento satis documento, vasorum sanguineorum ramulos a spastica strictura ita coarctatos & compressos esse, ut sanguinis circularem motum respuant; atque adeo non tam a sanguine nimium ibi congesto, quam ab humore viscido & acri stagnante, hos dolorum faces accendi veri sit simillimum.

§. XII.

Quando optime proficit? Ubi igitur altius infidet humor, & immanes artibus dolores inducit, tunc omnino externis praesidiis ex toto carere vix possurauis. Liceret vero plura hunc in finem magnis ab auctoribus hinc inde celebrari soleant laudibus: ego tamen in nullo majorem juvandi efficaciam deprehendi ac in nostræ inventionis nervino linimento, sequenti modo confiando: rec. aquæ Anhaltinæ uncias duas, balsami Peruviani drachmas duas, theriacæ veteris drachmam. Infunde & per digestionem extrahe: colaturæ adde essentiæ croci, castorei, nucisæ ana drachmas duas, camphoræ drachmam. M. f. linimentum, quo dolentes artus saepius inungi debent. Si vero a diutius partem affligente dolore rigiditas, immobilitas cum stupore remanet; quæ affectio parens nomine venit, linimentum quod habet axungiam humanam, cuius duæ unciae cum balsami Peruviani & oleo caryophyllorum drachmis duabus perficeantur, mirabilem plane præstabilem efficaciam, per crebriorem usum a nobis animadversum est.

§. XIII.

Balneorum quoque tam naturalium quam artificialium caute administratorum usus est insigneissimus. At vero neutquam in principio aut in statu morbi, sed in declinatione potius, tum ad reliquias morbi ex intimis sedis suæ penetralibus moderato sudore eliciendas, tum ad membra per spasticas dolorificas tractiones & agitationes imbecillia redditæ roboranda & rigida emollienda, usurpari debent. Inter alia vero balneum ex fonte Lauchstadiensi in Misnia, qui tenerum Martis crocum alit, atque natura admodum subtilis ac levis est, paratum, innumeris exemplis hoc fine & scopo adhibitum, opem desideratissimam tulisse ego religiose possum asseverare: qua de re dissertationem nostram de hoc fonte germanico & latino idiomate conscriptam ad legendum atque conferendum commendabo.

Cautiones & observationes clinicae.

§. I.

Quantumvis sanguinis missio etiam paulo largior, in externarum partium doloribus, qui a sanguinis spissioris abundantia & salutaribus excretionibus impeditis proficiscuntur, maxime quando in principio administratur, divinum plane sit remedium: sed tamen, si dolor diutius perseverans, digestionem atque laudabilem chylificationem ipsaque vires destruxerit, ut serosa magis quam sanguinea plenitudo corpori sit infensa, ipsumque corpus annis jam confectum fuerit, provide certe cum ea mercandum est. Idem tenendum est, quando ipso in paroxysmo cum febrili commotione affligente, metastases materiae vitiosæ ad externos artus natura molitus; quo tempore, non aliter ac in erysipelate, negotium naturæ salutare turbare & subvertere minime convenient.

§. II.

*Præse-
vative
elebra-
da.*

Non semel ego sed aliquoties obser-
vavi, venæ sectionem rite ante æqui-
noctia institutam corpora strictioris
habitus, sanguineo-melancholici &
sanguineo-cholerici temperamenti a
catharralibus defluxionibus, item
rheumaticis & arthriticis passionibus,
quibus crebro obnoxia fuerunt, egre-
gie præservasse, adeo, ut ad avertendos
hosce affectus, præsertim si suffi-
ciens corporis motio ac labor, absti-
nentia a potibus spirituosis, a diæta
lauta & carnea, accelererit, non faci-
le excellentius detur remedium.

§. III.

*Cura la-
ctea quā-
do no-
cessat?*

Dixæta & cura lactea, utut in dolo-
ribus artuum vagis & ubi acrimonia
subtilis & biliosa peccat, suo quidem
usu & fructu non destituatur: nihilom-
minus tamen, ubi vasorum, vel a
sanguine consistente, vel a nimis se-
roso adeo plenitudo, & ventriculus
cum intestinorum tractu atonia labo-
rant, ne inde viscerum infarctus emer-
gat & ad cachexiam via pandatur,
abstinere ab ea cautius erit.

§. IV.

*Si a sup-
pressis
hemor-
rhoidi-
bus, he-
romo-
vende.*

Quando sufflaminatus hæmorrhoidum fluxus ejusmodi dolorum eau-
fam præbet, consultissimum est op-
portune eum procurare. Cavendum
tunc, ne venæ sectio in partibus
superioribus instituatur, quam in
pedibus celebrare expedit. Postea
vero, quæ moderate hunc fluxum
moveare & cire valent, ad quo-
rum classem referendæ pilulae *Avi-
cenna*, *Betherianæ*, nostræ & his
similes, interpositis pulveribus tem-
perantibus & nitrosis, qui æstum
internum ad suppressandum flu-
xum multum conferentem infrin-
gunt, subjungenda sunt; quæ si
non proficiunt, & tormenta ac vo-
mitiones dolorum externorum co-
mites evadunt, ad applicationem
hirudinum, mirabilis nonnunquam
efficaciam remedium, omnino con-
fugiendum erit.

§. V.

Caveant sibi porro studiosissime o-
ra & *spirituo-*
sa fu-
gienda.

mnes, qui catharrosis rheumaticis &
arthriticis passionibus tentari & affli-
gi solent, & quorum natura ad mo-
tiones spasticas, pariter ac sanguinis
& humorum congestiones parata &
disposita est, ab omnibus fortioribus,
calidioribus, diureticis, sudoriferis,
acrioribusque purgantibus, nec non
ab omnibus spirituosis balsamicis sic
dictis, quæ sanguinem in orgaismum
conceit, medicamentis, item a poti-
bus spirituosis & generosis, post quo-
rum usum urina valde tintæ & rubra
apparet: caveant quoque sibi, quan-
tum fieri potest, a potu cerevisiæ, nisi
ea sit medicinalis, qualis est quæ non
caput gravat, bene per urinam se-
dit & digestionem adjuvat: sed pro
potu vel puram aquam fontanam vel
mineralem temperatam, aut deco-
ctum gratum nullum pariens fasti-
dium ubi eligant. Idque eo majo-
ri sedulitate iis observandum com-
mendamus, qui purpuram scorbu-
ticam nostri ævi quasi endemium
& familiarissimum morbum, vita-
libus succis immixtam & immer-
sam fovent atque recondunt.

§. VI.

Quando dolor & atrox & pertinax *Quando*
inferiores corporis partes ut ossa *acti-
vitas*
ischii & coccygis diutius obsidet, *rac-
chia-*
& individua agrotantia paulo sunt usur-*mica*
robustioris ac firmioris texturæ, *panda?*
medicamina potentioris efficaciæ &
virtutis chymica, ut mercurius dul-
cis, præcipitatus solaris bene præ-
paratus, regulus antimonii medici-
nalis, quæ etiam decoctis sudorife-
ris addi possunt, ad crassum & len-
tum tartareum & vellicantem hu-
morem e sedibus suis intimis di-
movendum, auxilium utique polli-
centur spectatissimum.

§. VII.

Quando dolores immaniter ur-*Quando*
gent, quod in sensibilioribus fieri *anody-*
folet, ita ut vires, appetentiam, *na?*
omnemque somnum adimant, &

neque sanguinis detractiones, neque nitrosa & temperantia, neque liquor noster anodynus iis mitigandis sufficiant, non inconsultum est, a lenioribus, videlicet emulsione semenis papaveris albi & ejus syrupo, ad fortiora paulo anodyna transfire, atque ad massam pilular. *Wildegansii*, vel pilulas *Starekii* aut de styrace, imo ad unum vel alterum laudani opiat granum, addendo croci extracti pauxillum confugere: cum alias opiate non temere in ejusmodi affectibus usurpanda sint, utpote quæ, ut crebrius observatum, tam contumaces ejusmodi affectus reddunt, ut postea omnia alia remedia etiam efficacissima spernant, efferatiusque inhærendo & medicis & ægrotantibus plurimum negotii faceant.

§. VIII.

Vesicato-
ria & cu-
urbitæ
usurpan-
de?

In rheumatismo scapularum incipiente, nihil est præstantius vesicatorio intra scapulas positio. Si vero in plethorica accidit, quod saepius observavi in fœminis post cessationem circa annum quinquagesimum mensum fluxum, cucurbitæ cuen scarificatione partibus inferioribus singulis mensibus appositæ, juvamentum attulerunt insignissimum.

§. IX.

Animus
ab omni-
bus affec-
tibus li-
berfit.

Quemadmodum illa corpora, quæ ad anomalas solidorum & fluidorum motiones, & ad horum translationes sive congestiones a natura disposita sunt, & vulgo sensibilioris indolis vocantur, mobilissimi sunt animi, & ab ejus affectibus, qui præcipuum hisce morbis causam ac fundamentum subministrant, facilime offenduntur: ita servata animi quietis & tranquillitas, sufficiens etiam corporis motus, & abstinentia ab iis rebus, quæ multis modis animum turbare atque disponere ad affectus possunt, in iis morbis commendatissima esse debet.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

C A S U S I.

Fœmina quinquaginta & aliquot annorum, post plenarium menstrum cessationem, ante biennium per uterum &que ac per alvum enormes quandoque sanguinis experta est profusiones: quibus medicus satis opportune venarum sectione & medicamentis orgasmum sanguinis temperantibus antispasmodicis leniterque diaphoreticis subvenit, infusum insuper ex millefolii comis, quæ herba maxime sanguinis nianis effusionibus compescendis dicata, subjungens. Quibus adhibitis, satis diu hæmorrhagiae tam uterinæ quam alvinæ disparuerunt: procedente vero tempore dolores valde gravativos circa regionem lumbarem & pungentes traetoris circa ossa coxendicis ægra experiebatur. Ad hos mitigandos, licet præter venæ incisionem & leniter laxantia, temperata diaphoretica & nitrosa usurpata fuerint, nullum tam men levamentum attulerunt; sed persistierunt dolores, fixum quasi locum occupassent. Postea mox ad scapula & pectus, mox ad genua, relata priori lumbari & ossis ischii sede vagabantur; quam tamen exspirante superiorum partium cruciatu denuo repetebant. Calculorum quoque interdum excretiones cum urina non sine molestia successerunt; calculosis & rheumaticis coloribus crebrius alternantibus: qui tamen acerbiores semper ab animi affectibus & tempore statum varietate reddit, ægram ita excruciarunt, ut cum viribus penitus omnibus caro quoque consumetur, præsertim quum jam per annum & ultra cum hisce malis conflari debuerit. Notabile vero quam maxime id fuit, quod, quum ægra ad constantem & graviorem dolorem, qui lumbarem & ischiadicam regio-

nem indesinenter infestabat, aliquo modo leniendum, situm dorsi curvum sibi selegisset, inferiorum dorsi vertebrarum ligamenta adeo fuerint relaxata, ut e situ suo quodammodo protrusa prominuerint, & sine dolore erecta incedere vix potuerit. Interea ad dolores tam rheumaticos quam nephriticos sedandos, & sanguinis missiones & anodyna cum dia-phoreticis mixta, & antinephritica temperatoria, ast singula irrito plane effectu, praescripta fuerunt. Petuit ergo a me salutare quoddam, adversus pertinacem hunc duplicatum affectionem, consilium.

Resolutio cum Consilio.

Ex hac morbi descripti historia, plura notatu digna ad usum tam pathologicum, quam therapeuticum accommodanda elici possunt. Primo quidem, quod mensium totalem suppressionem, quæ ordinario circa quinquagesimum annum contingit, in foeminis plethoricas virtæ sedentariae additæ, & quæ sensibilioris animi atque tenerioris etiam corporis sunt texturæ, graves saepius hemorrhagiae per uterum vel etiam per venas hemorrhoidales sequantur: ubi summa cura atque cautione in applicatione remediorum opus est, ne forte adhibitis fortioribus stypticis & opiatis plane sistantur, neque etiam modum excedant, & sic corpus valde debilitantes alijs ex debilitate oriundis morbis ansam porrigant. Secundo, in nostra ægrotante, effusiones sanguinis per hemorrhoides, quæ haud infelicitate saepius mensibus deficientibus succedunt, humorum stagnationes in alijs locis & quidem maxime circa regionem lumbarem & ischiadicam, cum per vicinas alvi venas vitiatus fuerit exitus, exceperunt. Ab ejusmodi vero sanguinis & humorum stagnatione circa majora vasa, & progressu in circulum eunte impedito, seruit secessio, quod tartareis salibus

& rudioribus terreis particulis onustum in tubulosa renum substantia facile concrescit in calculum, atque etiam ad ligamenta tendinosa & glandulosa, quæ ossa coxendicis cingunt atque ligant, delatum, graves atque diuturnos cum impotentia motus efficit dolores. Eadem quoque seri a sanguine in inferiori corporis regione stagnante copiosior secessio, luxationis vertebrarum lumbarium omniprocul dubio fuit causa; ad quam plurimum utique situs incurvatus, qui doloribus in hisce partibus leniens quodammodo interficit, contulit: laxatis enim a seri exundantia ligamentis, facilis est ossium e sede sua protrusio. Tertio attendi etiam in nostro cau meretur, conversio motuum sanguinis & dolorum e regione lumbari & ischiadica ad partes superiores scapulam, pectus, manus, quandoque etiam genua, quæ ut plurimum aeris & cæli intemperiem & variationem vel gravem animi affectionem iram præsertim & terorem pro causa agnoscit: quorum utique ea est natura, ut partibus præcipue membranaceis firmiter constrictis motum humorum invertant, & ad alia loca transponant. Methodum autem huic malo medendi quod attinet, eam ita instruendam esse arbitrati sumus. Primo omnium sanguinis missionem instituendam curavimus: quippe hæc dolores semper leviores efficit, ac priora mala ex sanguinis congestione in affectibus spasmodicis ad nobiliores partes prodeuntia impedit. Dein infusum Theiforme ex chamomilla vulgaris floribus, summitatibus millefolii & semine scenicali compositum, somno peracto satis larga copia mane in lecto hauriendum præscripsi: cuius utique virtus in omnibus affectibus chronicis & spasticis, non satis deprædicanda, eo quod humoribus fluxilitatem foenerando, & acrimoniam hostilem, quæ spasmodorum genitrix est, temperando, liberiorem sanguinis circulum, & ab eo dependentes utilissimas for-

sordium excretiones egregie promovet. Tum pro potu ordinario, ob eandem fere efficaciam, decoctum ex radice scorzonerae, chinæ, sarsaparilla & rasura ligni sassafras, atque abstinientiam ab omni cervisia veli aliorum potulentorum generare, quæ sanis & integris quidem corporibus non adeo facile nocent, ast valetudinariis & imbecillis nunquam proficia observantur, impense commendavi. Demum, pulveres leniter diaphoreticos absorbentes, & qui spasmis resistunt, humorumque acrimoniae temperandas idonei sunt, quorum censum subeunt, qui ex cerussa antimonii sive materia perlata Crugneri, lapidibus cancrorum, cinnabari, adjectis, nitro, pauxillo extracti castorei, vel etiam, nisi alvus obstricta obster, theriacæ coelestis aut sulphuris nostri antimonii fixati, conficiuntur, præscripsi: qui vel sub lecti introitum, vel etiam mane, exhibito regimine blande diaphoretico, ex aquis antispaßmodicis verb. grat. florum acaciae, tiliæ, primulae veris, cerasorum nigrorum porrigi possunt. Injunxi denique hæc medicamina non per saltum sed per gradus & procedente tempore virtutem suam exserere; quare usum eorum diutius protrahendum esse edixi. Et quoniā alvina excretionis semper habenda ratio, clysteribus pariter ac alimentis lenientibus ex passulis & pomis Portorffianis eam expedire convenit. Subluxationi unguento ex axungia humana & oleo lavendulae occurrentum esse statui. Hoc itaque consilio quum per hebdomadum aliquot spatium agrotar uteretur, & aquas Selteranas postea quoque usurparet, adspirante Divino favore, cum sanitate in gratiam rediit.

C A S U S II.

Insignis hujus urbis artifex, in Rheuma^{re} pictoria clarus 39. annorum, vitis, vi-
ta sedentaria valde addictus, & Ve-
neri plus justo deditus, ante bien-
nium die sereno mensis Septembris
per friv-
iter facit Lipsiam, quum caput co-
ryza tentaretur. Noctu dum som-
num capiebat, ex improviso aperta
fenestra, frigidior ventus dextrum
capitis latus non satis tectum impe-
tit: postero die circa aurem ejusdem
lateris persentit dolorem valde acutum & austuantem, ita ut quasi igni-
tus clavus aurem transfodere videtur.
Is porro ex aure dextra ad si-
nistram etiam se protendebat, &
plenarium non modo auditus, sed
etiam gustus & odoris sensum adime-
bat; quo acerbo dolore accedente
per duas & ultra septimanas ita ex-
cruciatus fuit, ut ob assidas vigilias
in lecto decumbens infania prope-
modum correptus fuerit. Accersitus
medicus in chirurgica arte exerci-
tatisimus, caufam insolentioris hu-
jus affectus, abscessum intra cranium
& cutem, vel intra cranium & cere-
brum reputans, trepanationem pro-
ponebat, quam patiens autem re-
spuebat. Ex nostro igitur consilio
abrasum fuit totius capitinis capillitiū,
& applicatum emplastrum leni-
ter diaphoreticum & vesicatorium
cum refracta cantharidum admixta-
rum dosi. Quo effectum est, ut ex
aure dextra, ichorosa multa sensim
paulatimque effluxerit materia, per
aliquot dierum intervalla persistens.
Unde in hac aure auditus quidem
restitutus est, quod postea etiam in
sinistra contigit; nihilominus am-
observabat, quod intra hoc tempus
dolor ad dextrum humerum, ex eo
in ejusdem lateris regionem, ischii,
postea in ipsum genu & tandem in
pollicem pedis descendenter, ut sine
baculo vix incedere potuerit; licet
nunquam antea podagra fuerit ve-

satus. Nihil autem amplius ex medicamentorum classe ei, prater infusum theiforme ex speciebus lenem diaphoresin promoventibus, nec non pulveres diaphoreticos cum pauxillo nitri & cinnabari nobilitatos, praescriptimus: quibus per Dei gratiam intra dies octo perfectae sanitati fuit redditus.

Epicrisis.

Peculiarem fluxionum dolorificarum sive rheumatum speciem praeditus casus exhibet, atque clarus monstrat, quomodo humor serofus in capite, ex coryza, ob accessum inclemotoris & penetrantioris frigidæ auræ, spissior, immobilisque redditus & extra vasa constitutus, hostili subtilique per moram acrimonia imbutus, ex partibus superioribus successive ad inferiores ejusdem lateris per porosam membranarum nervosarum musculis communium substantiam descendere, in articulatione partium ad tempus decumbere, graviter affligere & ad extremos usque pedes iter & progressum suum absolvare possit. Et quoniam tale quid a medicis etiam antiquissimis observatum fuit, non mirandum est, eos credidisse, quod omnes defluxiones serofus ex capite tanquam fonte proveniant originemque suam trahant, & inde in subiacentes partes deriventur. Commodo etiam hic casus ad rheumatismum aurium sive otalgiam referri potest, qui ut saepius observavi, abscessu salutariter solvit. Demum, emplastri diaphoretico-vesicatorii operatio animadversionem quandam meretur, quod videlicet hujus efficacia morbidus humor fixiorem sedem occupans, e loco suo in aliud demigrare debuerit: id quod facilius in capite, quam in aliis partibus muscularis & pinguibus, ad quas vix ac ne vix quidem ejus energia pertingere potest, si ejusmodi dolorificis fluxionibus affliguntur, effici & præstari potest.

C A S U S III.

Judeus habitus corporis spongiosus in quadragesimo aetatis anno constitutus, temperamenti mere sanguinei, affectibus animi parum deditus, temperate semper vixit, & binis annuatim vicibus circa æquinoctia sanguinem e brachii vena detrahi curavit. Sex jam præterlapsi erant anni, quibus vere semper & autumno podagra laborabat, quæ pedum pollices dolore, ardore & intumescentia exagitans, vix ultra decem dies duravit, & nullis in usum vocatis medicaminibus, sponte evanuit. Ab haemorrhoidal fluxu plane fuit immunis. Mense Augusto, alvi fluxu maxima ex parte cruento cum doloribus lanchinoriis circa hypochondria subito corripitur. Adjungebatur tenesmus, ut æger vicies sellam petere debuerit, saepius non nisi muco-albo deposito. Decem hic fluxus dies continuavit, sub quibus sinceri quidem sanguinis circiter mensuram dejectit. Licet vero valde debilitatus fuerit, vires tamen non ita multo post recuperavit. Ceterum dolor podagricus in principio Septembribus invadere solitus jam penitus siluit: acutus vero dolorificus sensus oculos ita afflixit, ut lacrymas stillare debuerint. Hie quidem intra aliquot dies cessavit, sed ad dextrum ossis ischii latus delatus ad os quoque sacrum & coccygis protensus fuit: qui per mensis fere spatium durans, circa proximum æquinoctium ita invaluit, ut tolerari prorsus, noctu præfertim, nequiverit, atque omnem somnum ademerit. Accessit vero hujus doloris vehementia per paroxysmos, & quidem circa horam tertiam pomeridianam cum frigore, subsequentे postea pulsu celeri & æstu corporis. In principio hujus affectus ante 5. hebdomades venæ instituta fuit sectio, sanguinis valde crassi & nigri sex uncii emissis: sed incassum. Accersor im-

consilium: ubi ægrum vehementi dolore & languore excruciatum inveni, ut pote qui nihil ex alimentis expetit, nec dormire potuit, de nocturno æstu conquerens. Porrex i itaque pulverem præcipitatem nitrosum unum cum liquore anodynō minerali: & inde altero die meliuscule se habere cœpit, mitigata doloris quodammodo lœvitia. Febricula tamen rursus accessit circa tempus consuetum. Sequentे mane quum pulsus validius adhuc micaret, venam pertundi jubeo; quæ secta in pede fuit. Et quoniam sanguis cum impetu profiliaret, decem minimum unciae cum viarium constantia emissæ fuerunt. Hac autem evacuatione id consecuti sumus, ut simul & semel omnis dolor ex osse sacro & ischii, qui etiam ad genua se extenderat, evanuerit: quin imo æstu febrili penitus cessante, nocte in sequente placida quiete gavisus est, & abhinc vires amissas rursus colligere cœpit.

Episrisis.

Plura notatu digna porismata practica præfato ex casu eruere non sine fructu possumus. Primo videlicet, quod fluxus, qui a medicis habitus est dysentericus, hæmorrhoidalis potius censendus sit: in dysenteria enim non sic simul & semel feri & sanguinis copia deponitur, neque etiam sine acerbissimo dolore & torminibus abdominis, quibus patiens noster caruit, id contingit, sed dolor magis hypochondriacam regionem ferit, intra quam, ut notum est ex anatomicis, intestinum colon situm obtinet: atque hoc per spasmum affecto, sanguinis liber per vasa ejus sanguifera circuitus impeditus, & hinc per minima vasorum hæmorrhoidalium oscula in anum effusus est. Dein etiam notandum est, dysenteriam non adeo cito evanescere, quæ nunquam sine febre affligit: tenetus vero, ut ego non semel observavi, non modo dysentericos, sed hæmorrhoidibus cœcis quoque laborantes vexare solet. Interea a-

nimadversione dignum est, ægrum, qui nunquam alias fluxus hæmorrhoidalis vestigia expertus est, jam modo insigni cum impetu & quidem satis largiter eum passum fuisse. Quod autem quieverit inde dolor consuetus podagricus, id sine dubio ob naturæ imminentum robur factum fuisse judico, ut pote sub quo serum vitiosum ad partes externas cum energia protrudi non potuit. Relicta interim arthritica materia primo oculos invasit, & dein ad ligamenta & membranas ossis ischii, coccygis & sacri delata est. Ibi vero propter vehementes spasmos liberiorem sanguinis circuitum ac progressum quum impediverit, ingens ejus circa has partes stagnatio hoc modo inducta fuit. Quapropter non sine sufficienti ratione, largiore venæ sectionem in pede instituendam suā, videlicet ad stagnantem sanguinem a loco affecto derivandum, & ejus circulum æquabilem restituendum. Id quod etiam felicissime successit.

C A S U S IV.

Vir generofus gracilioris & sanguineæ constitutionis annum ducens trigesimum, aliquot ante lustra, gravatum circa os sacrum perfentiebat dolorem, qui vero mox sanguinis ex venis sedis profluxu sedatus fuit. Intra anni spatium, sanguinea hac excretione propter crebras animum valde exagitandi occasionses cohibita, & neglecto omni remediorum uso, atrox dolor junctus simul cum tufi valida brachium similestrom tam molesto cum sensu lancinabat, quasi acutis cultris earo distinguebatur. Exactis aliquot mensibus dextro quoque brachio eundem doloris insultum & impetum experiebatur, etiam omnem salutiferum tot adhibitorum remediorum, venæ sectionis, purgantium, sudoriferorum, vesicatoriorum, cucurbitularum effectum. Nalla pressens erat contractura, quia brachiorum motus sartus tenuis remansit, sed talete modo percigiebat sensationem, ac si im-

gens ex plumbō pondus ipsi inhæceret, cum adeo ingēti manuum infirmitate, ut nihil quod grave erat apprehendere vel retinere potuerit. Per intervalla etiā spasmus manus occupabat perquā moleste atque atrociter, ut somnum ægre capere potuerit. Hos sat acerbos dolores postea exceptit gravior aurium & fere intolerabilis dolor, qui sensim cum cephalalgia lancinante, valde acuta & vehementi, vires, & appetitiam ciborum enervante ipsam corporis carnem consumebat. Hęc symptoma, non quidem continuo infestabant, sed per intervalla, imo certis periodis præsertim pro atmosphæræ dispositione revertebantur. & exasperabantur. Expetit a me consilium. Suasi, ut rite prius præparato per venæ sectionem in pede & per nodulum laxantem corpore, thermas Carolinas adiret, iisque cum convenienti, regimine uteretur. Quarum cura absoluta, ut in usum externum thermas Tæplenses, ad imbecillum partium robur confirmandum & restituendum duceret, auctor fui. Cui confilio cum motrem gereret æger, ex voto sanitas succedit: nam ab eo tempore hæmorrhoidalis fluxus reversus, corpusque ab hujusmodi doloribus diu immune perficit.

Epicrisis.

Quandocunque consuetus hæmorrhoidum fluxus inordinatus fit, vel plane supprimitur, multa non modo valitudinis sequuntur incommoda, sed maxime omnium ad morbos ex corrupto, & vitiioso sero qui originem trahunt, corpus disponitur: in quorum classem dolores externalium partium sive dolorificas rheumaticas & artuum passiones merito referre debemus, ut pote quæ ab humore seroso excrementitio hinc inde in partibus sensibilioribus & nerveis stagnante, & secedente oboriuntur. Sanguis enim quando per vasa mese- raica & viscera abdominis inque primis per lienem & hepar non jugi & peren-

ni motu ac cursu libere fertur, sed re- stagnat atque moram necit, intestina & calida agitatione, in liquamen putridum corruptum satiscit; quod deinde sanguini permixtum, & ad debiliora loca trans latum, dolores & ulcerosas sepe fluxiones efficit. Ex eodem fundamento ac fonte purpuræ scorbuticæ, quæ intus retenta causam sæpiissime graviorum in artibus dolorum præbet, genesis derivanda venit: eo, quod confluens & salutares sanguinis in feminis per uterum, in viris per hæmorrhoides vacuationes cohibitas & compressas hos ipsos presso pede insecurtos fuisse, multoties a nobis observatum est.

C. A. S. U. S. V.

Ante aliquot annos, generosus vir in sexagesimo & sexto ætatis anno constitutus, post febrem quartanam, quæ per dimidium anni eum exercuerat, vagis doloribus hinc inde in artibus & partibus externis quam maxime circa lecti introitum exacerbatis vexabatur. Cum aliquando mense Mayo, matutino frigori caput paulo incantius exponeret, dirus & lancians cervicem ipsasque scapulas dolor invadebat, qui per intervalla adeo efferatus erat, ut nec caput ullo modo flestere potuerit. Nunquam integrerrimus vir admisit sanguinis missione, neque per venarum sectionem neque per scarificationem; quum tamen esset sanguinis & succis plenus, appetitu integro & pulsu magno gauderet. Suasi venæ incisionem; quam, licet natura non respueret, omnibus qua fieri potuit rationibus detrectabat. Cum vero gravioribus assidue torqueretur doloribus, nullum que a præsidii exhibitis persentiret levamen, tandem ad instantiam meam chirurgus accitus, & celebrata venæ sectione, cruoris octo minimum unciae detractæ fuerunt. Ab eo mox tempore insigne dolorum allevamentum percepit, & quod notabile erat, post

post sextam venam noctu copiosum
semper profudit sudorem præter mo-
dum & consuetudinem: quo dolor non
modo penitus abactus, sed & omnes
corporis vires pristinum incrementum
recepérunt.

quam ageret abhinc decennium.

Epicrisis.

Similem fere historiam apud LE-
ONH. BOTALLUM lib. cit. cap. 12.
p. 201. legere licet, quam ad verbum
huc recensere nobis e re visum est:
Dominum de Varenes, inquit, *a Regis cubiculo*, annos ut minimum quinque & septuaginta natum, dolor affidus & latus ad cervicem & humerum a multis mensibus derinebat, quem medici frequenti medicamentorum purgantium usu & calefacientibus litibus curare studuerunt: a quibus ille cum parum aut nihil levaretur, nos consuluit, qui salutarem diximus futuram sanguinis missionem. Ille contra objicit inconsuetudinem mittendi sanguinis, senilem etatem, inchoantem hie- mem, morbum fieri a frigidis humoribus & flatibus: quæ omnia, testantibus aliis medicis, tale auxilium debor- tabantur, quare non posset intrepide acquescere nostræ sententia. Diebus aliquot post, morbi perseverantia, & incremento impulsus, ad nos rediit, sic animo affectius ut polliceretur se post hac nulla in re a nostris consiliis recessurum. Mitti sanguinem jussimus, ex brachio affectæ partis, ad uncias decem: post aliquot dies parem modum ex adverso cum maxima utilitate, tandem iterum ex altero, & sic liberatus est. Non tam interea contempsumus purgantium & lituum calefacientium, & discutientium usum. Ab eo tempore dictus patiens familiarissime & cum maxima utilitate pedum, quibus vix poterat in- sistere, visus & totius corporis, primis & ter in anno, postea quinque & sexies meo consilio sibi sanguinem mittit, firmius incedens nunc,

Rheuma
chroni-
cum su-
periora,
pecus
maxime
cum fe-
bre af-
fligens,

Dum hæc scribimus, transmissa nobis est ab Excellentissimorum historia, quæ accuratam morbi rheumatici generationem, progressum & medelam quoque complectitur. Circa cujus ulteriorem curam, quum meum consilium requiri- retur, id ipsum hoc loco recen- sare non inconsultum mihi visum est. Dominus de H. LXVIII. an- nos natus fibra forti atque elasticó vasorum robore natura instructus, olim itinerum incommodis & aeris variis injuriis adsuetus, jam sedentario vita generi, in publici, quod obit, muneri gratiam addictus. Ante hos viginti annos apoplexiæ impetum expertus est, cruro ex raninis sponte larga copia erumpente solutum. Inde aliquoties arthritidem persensit, quindecim posterioribus annis non amplius observatam. Versus autumnum superioris anni irrepere sensim ven- triculi flatuosæ pressiones, thoracis constrictiones, brachiorum, maxime circa cubitum, tensivi dolores. Hæc omnia usque adeo tandem invaluere, ut misso licet sub fine Septembri e brachii dextri vena media sanguine (qui tenax erat, & præpingui muco abundans, seroque destitutus) die 26. Octobris novum apoplexiæ metum inferrent. Complicari ea die cum febre continua cœpit malum, hac fere ratione, quavis vespéra, modo le- vius, modo gravius affligens. Post repe- titā aliquoties oscitationē & perceptū brachii ut plurimum sinistri gravati- vum dolorem ingruit spasmus dolori- fuscus cubitum utrumque, præcipue si- nistrum infestans, mox pectoris mu- sculos in consensu trahens, præcordia stringens, suspiciosem respira- nem producens, sudorem universalem exprimens, manibus interea algenti- bus.

bus. Remittit & intenditur per vices talis impetus, donec tandem elapsis aliquot horis cesseret pedetentim, lassitudine, torpore, & rheumatici doloris sensu relictis. Hic talis totum thoracem ambiens asthmate stipatus rheumatismus, ubi in summo vigore constitutus erat, durum, citatum, febrilem pulsum, aliquoties oculorum hebetudinem, tinnitum, vertiginem, suspectumque soporem comites habebat. Aliquando distentum flatu hypochondrium sinistrum indoluit, siccus nucha, scapulae, dorsum. Quandoque in ipso somno ægrum nostrum obruens spasmus, loquaciam præpediendo, siderationem comminatus est. Febris socia, in lentam & marasmoden abire visa, sub tertii dierum septenarii finem acquevit, postquam duplex comparuit solutionis modus. Præterquam enim quod lotium primo febrile & biliosum, a quarta febris die turbulentum, fabulosum, pure quasi & subcruento tabo remixtum vicesima die in naturale mutatum est; copiose etiam, & per totam corporis superficiem diffusa miliare postulæ rubræ comparuere. Rheuma interim spasmus socium silente febre continuavit, ita tamen ut sensim mitescens, post quadragesimum diem penitus tandem visum fuerit se recepisse. At vero post repetitas per vices intentationes, die morbi octogesimo quarto novus malorum impetus subita mortis metum omnibus incussit, urgente inter suumas praecordiorum angustias extremorum frigore, marcore, stertore, faciei livore, extrusoque cum tussi aliqua spumoso ex aspera arteria & florido eruore ad drachmam fere unam vel alteram. Quod si hemorrhoidum ulla ante adnotassimus molimina, sanguinis illam per os effusionem, cum medicis solas hemorrhoidales venas in deliciis habentibus, pro fluxu hemorrhoidum anomalo habituri fuissentus. Vifus autem potius e glandulis per inferiorem fistulæ spiralis membranam disseminatis & spasmorum vi dilata-

tis, aut etiam miliaribus ibi quoque haerentibus pustulis disruptis extravasato cruor. Angebamur tunc imminentis vel asthmatis convulsivi, vel apoplexia, vel denique, fluente iterum tabida & siccruenta urina, lentæ consumtionis metu. Saltim suspicio erat morbum in consuetudinem abitum virium collectioni obfutram. Sed & hac vice post sectam altera ab impetu illo die venam (qua sanguis non adeo tenax e brachio educebatur) ita paulatim Divino auxilio adjutus est æger noster, ut nonnisi rheumatis illius chronicis ruderâ supersint. Poscunt tamen & hæc quotidie se manifestantia maturum adulteræ experientiae consilium, ne tertium ferociens malum omni auxilio majus experiamur. Inter remedia, quibus obsecutum fuisse visum est rheuma cum asthmate complicatum, eminent oleum amygdalarum dulcium, sub emulsionis forma largiori copia propinatum, chamomillæ cohobatum decoctum, frictio, ablutio externa frigida calida & frequens. Nec sine omni effectu in usum vocata: liquor mineralis anodyn. D. Hoffmanni, specificum cephalicum, pulveres solares, lumbricorum succus, pulvis antispasmodicus, & quæ demulcendo malo apta credidimus. Quibus tamen certa & fida magis desiderantes, reficere avemus, quæ cum de morbi, tum de curæ instituenda ratione Excellentissimo Hoffmanno videantur. Interque alia preoptamus, ut si forte præparata Viri Practicotati ex balsamo Peruviano, ex amaricantibus extractis sub forma elixirii visceralis, aut genuinus liquor mineralis, tanquam nervis & visceribus amica pharmaca, facere in rem nostram videantur, eorum apparatus simul nobis concedatur.

Epicrisis cum consilio.

Accuratus paulo descripta hęc morbi historia, quanta valetudinis incommoda genus vitę valde mobile & laboriosum subito in quietum mutatum adferat, luculenter satis demonstrat. Vidi saepissime splendidas personas, venerationibus cum celerrima equitatione conjunctis, vulgo *Par force Jagdten*, quotidie fere assuetas, si eas ob urgentes quasdam causas omiserint, in graves diutinas passiones, quae a stagnationibus intra viscera abdominis, & exinde subortis valde interperatis in puris, & corruptis humoribus, originem suam traxerunt, delapsos fuisse: cuiusmodi fuerunt flatulentæ & spasmodicae intestinorum constrictiones, cum pigratio, angustia praecordiorum ac pectoris, dolore & artuum lassitudine, spirandi difficultate, febreque ienta consociata. Non mirum hinc est, idem expertum fuisse præsentem generosum ægrum, in quo, ob inclinatam etatem, impuriores adhuc redditum humores, fibrosum ac nervosum mobile, & sensibile systema ad spasticas stirpes, atque febres commotiones sollicitarunt; unde ex nimis hinc ortis ad partes sanguinis congestiibus, in capite insultus apoplectici, in pectore infarctus asthmatici, in artibus dolores vagi tensivi, producti fuerunt. Quam difficulter vero, quando vitium tum solidorum tum fluidorum in habitum quasi degeneravit, ejusmodi chronicę affectiones, quæ accuratum vitę regimē & assiduum remediiorum valde salutarium per plures fere annos expostulant usum, sanescant, iis, qui in aris opere diutius versati sunt quam optimè cognitum perspectumque est. Et quoniam ex intermissione motus laboris, & exercitationis corporis, quæ alias optimum est sanguinis depuratorium, & juxta Hippocratem nervosum, & musculosarum partium cibus

ac nutrimentum, præcipua horum pathematum causa fuit subnata, utique secundum nostram experientiam, & sententiam, tum ad ejusmodi chronicum affectionem mitigandum, tum ad pejora mala avertenda, motus, modo commode hic fieri possit, v.g. per vectionem, vel equitationem, omnibus modis fraudendus est. Præterea in talibus casibus ab omnis generis cerevisia abstinentem, potanda decocta ex speciebus demulcentibus parata, vel fontes temperati, ut *Selterani*, aut serum lactis, & quoad cibos, ab omnibus acidis, salmis, viscosis, acribus est abstrahendum: inter remedia vero solum elixirium temperatum balsamicum, ex amaris temperatis cum mensu aquo paratum, saepius & diutius, moderata tamen dosi usurpatum, spiritualcentiam blandam fluidis & tonum solidis conciliando, omnibus aliis medicamentis longissime præferendum esse, experientia fida & crebriori edociti sumus. Denique iteratis vicibus, aut per scarifications aut venarum incisiones, sanguinis nimiam copiam demendo, promptior, & expeditior circulus promoveatur. Et hęc fuit mea de cura hujus mali sententia, quam ad Doctissimum Virum transcribere non dubitavi.

C A S U S VII.

Vir robustus, sanguine, & succis ^{Rheuma} plenus, annorum quadraginta, acer, scapulo scapularum dextrarum dolore conflictatus, sine præcedente sanguinis missione, fine primarum viarum per laxantia absterlione, a Medico pro sudore elicendo bezoardicam tinturam, æquali pondere cum spiritu cornu cervi succinato permixtata, largiori paulo dosi assumpta. Sed ne ullus quidem inde fadet, nec nocte nec mane securus, licet corpus probe stratis munitus, & involutum fuerit. Scapularum vero dolor postmodum non solum longe ar-

cerbior fuit redditus, sed etiam collum in consensum pertraxit, ut in nullum latus caput flectere æger puerit. Accedit præterea ingens capitum in latero dextro dolor, quem acris, & calida oculorum defluxio cum rubore diutina excepit. Administrata venæ sectione, & alvo per convenientia remedia successive depleta, usurpatis quoque infusis herbarum Theiformibus atque pediluviosis, hæc symptomata quadantenus quidem remiserunt: ab eo autem tempore defluxio serosa in palato cum continuo uvula delapsu per annum, & ultra permanxit. Cui tandem vitio amovento frequens Tabacifumus egregie inserviebat: licet diutius adhuc, tempestate præhumida regnante, in faucibus, & uvula nimia relaxatio observata fuerit.

Epicrisis.

Ex præsenticasu praxeos medicæ tyrones discere possunt, quantum detrimenti invehere possint medicamenta alias satis apta, & innocentia, quando non debito ordine, & tempore usurpantur. Nisi enim prius demta fuerit vasorum plenitudo per sanguinis detractionem, quæ motum circulatorium liberum, & transpirationem quoque auctiorem impedit: nisi etiam ante horum usum, cruditates copiosæ, & vitiosæ ex prima regione idoneis laxantibus eductæ fuerint, sudorifera positive sic dieta, quæ calida, & expansiva vi agentia, cum impetu quodam crudos, & rudes humores in angustias vasorum, & glandularum protrudunt atque accumulant, ut inde non tantum dolores in vicinas partes se propagent, sed & acres defluxiones, dum, ubi sanguis stagnat, serum sedicit, & deplouit, hinc oboriantur, nunquam qui cum ratione curam suscipere annititur, exhibere debet.

C. A S U S VIII.

Non ita pridem accessit ad me quidam hujus loci causarum patronus, trigesimum ætatis annum superans gracilioris quidem sed fibrosi corporis habitus, qui mihi aperuit, quod per quindecim & ultra annos singulis fere mensibus sanguinis fluxum per sedem expertus fuerit, ad quem disposita tota ejus familia, quæ in Thuringiæ oppido adhuc degit, ita ut non solum pater & mater continuo hunc fluxum passi fuerint, sed etiam in liberos imo ipsas feminas circa annum duodecimum, & decimum-quintum, mensibus licet rite fluentibus, idem iste redundaverit. Conquestus hic fuit, quod per quatuor fere menses, ex causis minus sibi cognitis, hemorrhoides cessaverint. Et ab eo tempore non modo insigni animi & corporis languore, sed etiam dolore tensivo & constrictivo in sterno, toto thorace, cum frigoris quodam sensu, atque respiratione præsertim post motum difficiliore alvoque pigriore correptus fuit: Quater ex incisa pedis vena, consilio celebris hujus urbis medici, sanguis largiter effusus: sed omnem citra salutarem effectum. Indicavit simul æger, postquam, a fortiori corporis motu ante aliquot septimanas suscepit, hemorrhoidalis fluxus, sed exigua in quantitate comparuisset, omnem dolorem & molestiam simul & semel conquievisse & sensum calidioris fluidi a thorace ad ipsam pelvem successive descendentes, sese animadvertisse; sed mox cessante fluxu superiore pristinum locum dolores repetuisse. Ipse quidem non sine ratione affectum hæmoptycum inde metuens, auxilium meum efflagitavit. Ego nihil aliud suasi, quam ut motu moderato primum, dein intensiori, corpus quotidie ad lenioris fædoris eruptionem usque exerceret & mane in lecto infusum Theiforme,

ex herba veronicae, cardui benedicti, radice glycyrrhize & aniso stellato bibetur, neque pedilavia ante lecti introitum negligeret: circa illud vero tempus, quo alias ipse haemorrhoides fluere solebant, pilularum Becherianarum aliquot doses, premisso pulvere digestivo nitroso sumeret. Quibus non juvantibus, optimum inter alia esse consilium, hirudines ani venis applicare, edixi.

Epicrisis.

Rariora certe sunt fluxus haemorrhoidalis exempla, liberos in prima aetate per dispositionem parentum hereditariam infestantis: qui utrū hoc in genere quasi naturalis, salutaris, & criticus habendus, ita omni cura & sollicitudine per paulo exquisitiorem vietus rationem conservandus, neque ullo modo impediendus, nisi mox difficiles & subitaneas morbosas afflictiones expectare velimus: inter quas sunt illæ præcipue, quæ a translatione sanguinis ex partibus inferioribus ad superiores facta pullulant, & rheumatici nomine veniunt. Sicuti vero effrenem illum, & incoercibilem sanguinis mittendi hodie epidemice quasi regnante methodum, in sanandis maxime chronicis affectibus valde improbamus: ita etiam ad solennes & criticas sanguinis evacuationes, per uterus vel per intestini recti venas provocandas, saepius repetitam venæ sectionem plus damni quam commodi tulisse, certa & multiplici experientia confirmatum habemus.

C A S U S IX.

Rheuma. Subit jam animum historia foeminae, *c. c.* *iratus,* ad trigeminum annum accendentis, *supervenientia sp.* *volat.* *ex ira &* *gravissima* complexionis, quæ brevi post ingentem anxietatem & circa praecordia angustiam, cum tremore artuum, appetitus dejectione & ciborum tædio persensit. Sumit hac de re

ab amico volatilem cornu cervi spiritum liberaliori dosi, & ad eliciendum sudorem corpus in lecto composuit. Incaluit inde quidem fortiter, sed nec udor nec sudor sequebatur. Ab eo tempore in artibus, cruribus, brachis, scapulis, gravativos pressorios dolores & in universo corpore languorem cum lento calore perpessa est: quibus symptomatibus nostra adeo fuit afflicta, ut caro penitus consumita, & hinc phthisi ita heclica ipsa laborare videatur. Lactis tandem caprini cum infuso veronicae diluti usus, diutius per septimanas aliquot continuato, infuso ex manna & cremore tartari interposito, atque etiam pulveribus leniter diaphoreticis ac nitrosis, cum acido citri & aquis temperantibus analepticis usurpati, prælinæ valetudini patiens fuit restituta.

Epicrisis.

Casus recensitus præclarum nobis documentum suppetit, quam pernitosum sit, materiam naturæ prorsus hostilem per minus convenientia loca, contra monitum Hippoc. aph. 1. Sect. 21 educere. Per vehementem animi exandescientiam, non modo totum systema nervosum & vasculosum vehementi preter naturam motu agitatur & concutitur, sed & insuper plane singulare modo ductus, qui in hepate consistunt, & ex eo prodeunt biliarii nervosissimæ, convulsivo quodam motu afficiuntur, ut biliovis omnis propemodum humor in duodenæ cavum effundatur, qui ibi ob hoc ipsum spasmo identidem per consensus affectum paulo diutius subsistens & retentus, graviorum que iræ affectum ordinario insequi solent pathematum causam materialem & somitem præbet. Ad hæc itaque avertenda prudens & peritus medicus iis uititur remedis, quæ motus effrenes nervosarum partium sedandi, biliosas excrementitias fortes contemperandi & leniter per alvum educendi facultate

te pollut. Nihil autem a vero medendi scopo magis alienum est, quam medicamento calido & volatili motus solidorum concitatores reddere, illuviemque corruptam bilosam ad sanguinis massam & ad interiora sensillum & nervosarum partium invitare atque adducere.

C A S U S X.

Rheuma ex eri Præsenti in opere dum occupatus *impur; copia*, occurrit mihi casus, dignus qui commemoretur: quare ipsum huic tractationi subnecere operæ pretium partes tenui minime duxi. Vir erat sexagenario major, firmiore & animo & corpore, atque quam elastico fibrarum robore instructus, externas qui raro per vitam adversa valetudine tentatus, biennio abhinc circumanatur, colicis quidem atque cardialgicis passionibus per vices afflignantibus, atramen convenienti remediorum usu statim mitigatis atque depulsis correptus est. Mensle Januario hujus anni vicinam urbem tendit, judiciales quasdam compositurus lites. Quom autem impetrata judicis sententia voto minus responderet, vehementer, & supra modum animo commotus est, corpus dein multis modo laboribus, & vigiliis fatigatum, inter discursum per plateas, frigoris vehementiæ improvide exposuit. Hinc statim ciborum periit appetentia, & alvus legnior redditus fuit, ita ut perpaucas feces anno protruerit, imo per aliquot dies officii sui oblita fuerit. Domum reversus patiens de langore universi corporis, doloribus abdominis ex uno hypochondrio in alterum divagantibus, nec non de anxiis, & cardialgicis præcordiorum stricturis circa scrobiculum cordis, cum pertinaci alvi clausura stipatis conqueri cœpit. Rebus sic stantibus, mihi in consilium vocato, primo omnium, strictiorem alvum per enema emolliens necnon

infusum mannatum cum oleo amygdalarum dulcium permixtum relaxare fecesque restitantes educere visum fuit. At vero pauca in quantitate dorissima scybala nigricantis & quasi adusti coloris secesserunt: doloribus morsibusque in abdomen persistentibus & per certa intervalla acius afflignantibus. Soasi dein, ut lactis serum cum cremore tartari acidularum atque manna nobilitatum, per aliquot hebdomades mane ad mensuram biberet. Postea quum sanguinem redundantem & ejus missionem negligenter adverterem, pedis venam pertundendam curavi: ubi emissæ aliquot sanguinis uncia, satis bene quoad cetera constituti, nisi quod permultum lentæ, & viscide pituitæ, atque calidæ immersus deponebat. Unde æger parum levantis persensit. Interim tamen alvus quinquies vel sexies de die fuit soluta, multumque pituitæ una cum durioribus excrementis eductum. Sed dolores cum cardialgici tum colici, licet aliquando mitigarentur, continuabant, dorsum, & lumbos sape repetentes. Quibus æger tandem ita enervatus fuit, ut assidue in lecto decumbere cogeretur. Ex medicamentis internis nihil intentatum vel omissum, quod ad discutiendos flatus, ad sedandas spasticas stricturas, ad acrimoniam temperandam & infringendam, atque æquabilem transpirationem conservandam commodum proficuumque visum fuit: & tamen parum adjumenti inde persensit æger, nisi quod observatum sit, dolores hos acerbiores magis ad artus & externas partes, interiori sede relictæ, conversos esse; quandoquidem mox scapulas, mox lumbos, mox pectus, mox præcordia invadebant, capite tamen ab iis libero relicto. Somnum interdum placidum capiebat, cibosque concoctu faciles ingerebat, alvus vero rarissime sponte libera fuit, & urina nunquam non parce profluxit. Interea

terea cum jam per duos & quod excurrit menses hoc malo conflictatus fuisset æger, non parum vires exhaustebantur. Percipiens vero pulsus adhuc valentem & plenum, pedis venam iterum secandam præcepit, e qua longe alia facie emanavit sanguis quam prior erat: nam vix sexta ejus pars rubicunda erat, quæ sero placentulæ instar innatabat, superius lento, viscidio muco obductus. Sed neque etiam inde adjumentum quoddam percipiebat ægrotans. His rebus ita constitutis, meum constantissime cum domesticis suis efflagitavit auxilium, rogans, morbum, ejus natum, totumque progressum paulo accuratori meditationi & acriori judicio subjecerem. Ad hanc itaque rem incumbens, ex inspecto sanguine judicabam, vitium non, ut ante a forte existimaveram, in solidis esse, ubi angustiam vel seirhostatem quandam in intestinis praesentem divinaram, sed seri excrementitii colluviem non tam partes internas quam externas adfligentem, horum dolorum causam & tomitem existere. Hanc itaque non commodius nisi per alvinam regionem educi posse credidi. Nolebam vero in corpore viribus valde fracto atque intestinis spastmis & torminibus jam extreme debilitatis acre quoddam purgans per superiora exhibere. Itaque cum in consiliis Riverianis me aliquoties legisse meminerim, aquam benedictam Rulandi ad aliquot uncias in enemate, optimo cum fructu ad serosam colluviem educcendam adhibitam fuisse, tentare & hoc auxiliū genus constitui. Et cum ad manus non esset aqua illa benedicta, tartari emeticī solutionem huic substitui, atque in talem formam redigi: Rec. tartari emeticī in aqua menthae soluti grana 8. vini Hispanici uncias sex M. Hanc mixturam cum clysteris emollientis domestici tribus partibus anno quum infundendam juberem, mox inde largissima viscidorum humorum secuta est excretio, magna secum liquidarum copia stipata, quam postea tres sedes exceperunt;

Hoffm. System. T. IV. P. II.

sed cum paucioribus excrementis: quo facto juseula quedam analeptica porrigerere jussi. Et bene se habuit æger. Sed tertio die post, cum intolerabilibus per 4. dies abdominis cruciatibus cum diarrhoea & tenesmo copulatis, corripetur, interne theriacæ veteris dosin, item oleum amygdalarum dulcium ter vel quater per diem cum sero lactis, vel infuso veronicæ exhibui, & exteriori abdomen inungendum linimento, ex theriaca in aqua Anhaltina soluta, cum balsamo Peruviano commixta, jussi. Atqui inde & alvi dejectiones & tormina ex voto conquieverunt ac remiserunt. His peractis mixturam dia-phoreticam, quæ ex liquore nostro minerali, syrupo croci saturato & quarta parte spiritus tartari composita erat, propinavi. Unde placido seculo sudore, vique dolorum mitigata sensim paulatimque ad se redire videtur ægrotans.

Epitaxis.

Chronicus hic gravis morbus, ad dolores rheumaticos ab excrementitii scribri copia originem suam trahentes, nervosaque partes internas & que ac externas infestantes, referri debet. Senes vero quam maxime ad ejusmodi morbos a sero vitiolo oriundos disposita a praeceps habent corpora, quia ob bilis lentorem & inertiam, vacillantemque intestinalium tonum alvus pigrior fit, atque adeo a fecibus retentis corruptæ fordes ad sanguinis massam feruntur, quæ ob languidorem perspirationem senili etati familiarem & communem magis magisque succrescent. Credibile igitur est, eodem modo hos dolores fuisse excitatos. Et quia per ipsius morbi paulo longiore decursum, in corpore omni motu & exercitatione vacante, ipse sanguis & humores boni atque laudabiles in corruptum serosum liquamen conversi sunt, vero est simillimum, contumaciam hujus affectus inde esse petendam. Denique notabilis hæc observatio non prætereun-

Q

da

da est, quod emetica & paulo fortiora infusa per clysterem, ad copiosas serofitantes e corporis latibulis elicendas & exturbandas, tutoe longe modo ac validiora purgantia ore assumenda adhiberi possint.

C A P. IX.

De rheumatismo odontalgico.

Theses Pathologicae.

§. I.

Definitio generica. **O** Dontalgia, sive dentium acutus, gravis & perquam molestus dolor nonnisi rheumatismi species est, a seri impurioris decubitu, ligamenta & tunicas nervo-glandulosas, quibus radices dentium in alveolis maxillarum arctius circumvestiuntur atque obfirmantur, valde lancinantis & arroden-tis subortus, qui varia molestaque post se trahit symptomata.

§. II.

Sep. ex rheuma- Nos non semel sed plures observavimus, artuum, scapularum, humerorum que dolores, in capitibus sæp numero transiisse latus, atque dentes pariter ac maxillas molestissime invaluisse. E contra, capitibus & dentium dolores, sede sua mutata, in humeros, brachia vel scapulas descendisse, identidem a nobis haud raro est animadversum. Quin, per experientiam obvium est, maxillam superiorem cum dentibus suis, dolore, & spalmo frequentius ac inferiorem affici.

Et vice versa.

§. III

Interdic- Alia porro sedes est odontalgici doloris, qui in ipsis dênis cavitate, videlicet in funiculo isto vesiculari, ex membra brana nervosa, vase arterioso, venoso & lymphatico composito residet, vide-licet si is ipse graviter, vel nimia, a se-ro stagnante, distensione, vel spastica constrictione afflictatur, præsertim ubi

dens est cariosus, ipsaque caries ad funiculum modo dictum pertingit: siquidem certa, & quotidiana experientia constat, cariosos dentes rheumaticis affectionibus maxime tentari, eo quod quam facile, ob imbecillitatem hujus partis humores ibi stagnant, atque subsistunt.

§. IV.

Quemadmodum in arthrite dolor, *Sympto-* rubor, tumor, & febricula præsens est; ita hæc omnia quoque in odontalgia fieri animadvertisimus. Jungitur insuper copiosa saliva ex ore profusio, quæ non aliam agnoscit causam, ac spasmus dolorificum, qui dum vasa lymphatica & venosa constringit, liberum sanguinis, & seri regressum impedit; quam ob rem a subsistente sanguine saliva illum latice in glandulosa faucium loca copiosius secedere equum est.

§. V.

Rheumatismus intemperati & subito mutati aeris plerumque soboles evadit; at qui non secus res in odontalgia cedit, quæ in corporibus dispositis, præsertim cacoehymicis quam facile oritur, si ea ex calida subito in frigidam auram secedunt, vel si vere, & autumno tempestas per vices austrina calida atque frigida est.

§. VI.

Uti foeminae præ sexu virili rheumatismis magis sunt obnoxiae: ita etiam odontalgiam frequentius experientur. Id quod maxime contingit, quando utero gerunt, vel defectu membrorum laborant, aut alimentis acidis, salmis & alvū adstringentibus, item dulcibus plus justo delectantur; quippe que etiam exteriorne denti carioco admissa desubito sequere dolorem proritant. Nihilominus, corbius si viros hic dolor apprehenderit, acerbius multo affligere solet.

§. VII.

§. VII.

Rarius rheuma- Experientia rursus constat, quod qui-
ticos & rheumatismo vel arthritide laborant,
rarius in- arthriti- rarius odontalgia corripiantur, sed den-
festat. tes integros habeant; cum contra dentium doloribus magis sint expostiti, qui
hujusmodi artuum & muscularum af-
fectionibus vacant.

§. VIII.

Facile reverti- Qui dentium doloribus semel ite-
rumque excruciantur, ii rursus ex facili-
& leviore causa in eundem incidentur,
non secus ac in arthriticis & podagricis
tentationibus id fieri assolet, propter
debilitatem quam dolores hujusmodi
pariunt atque relinquunt.

IX.

Malum quando- Acerbior dentium dolor in corpore
sensibili atque impuro gravia inducit
sum for. symptomata, vigiliam nempe, febrem,
appetitum prostratum, delirium, refri-
gerationem extreborum, imo convul-
siones, praesertim in infantibus, propter
systema nervosarum partium in con-
sortium sive motuum morbosorum
communicationem pertractum.

C U R A T I O .

§. I.

Indica- Quoniam odontalgicus dolor, ab il-
luvie plerumque serosa ortum suum
sortitur, utpote quæ a sanguine copio-
sius ad caput congesto & lentius in va-
lis procedente, separata, in ligamenta
tendineo-nervea depluit; potissimum
medendi huic molesto affectui in eo re-
conditum erit momentum, ut serum
scorbuticum impurum primum a capite
divertatur & derivetur; dein, ut cor-
rectum preparatum atque mobile redi-
tum, per congrua munatoria e cor-
poris sphæra eliminetur; demum parti
affectæ justum robur reconcilietur, &

hac ratione materiae peccantis decubi-
tus atque affluxus præpediatur.

§. II.

Primum quod concernit nostrum *Humor*
propositum scopum, huic clysterum in-
jectiones peccantem humorem diver-
tendi gratia, quam maxime opitula-
buntur. Ut plurimum enim sub gravio-
ribus quibuscumque dolorum tormen-
tis alvus pertinacius renititur, quam
per enema lenitivum & stimulans sali-
num emollire atque educere nihil est
conveniens: utpote, a cuius applica-
tione ingens statim dolorum levamen-
tum ægrotantes recepisse observavimus.
Præstat tamen ea ex domesticis u-
sitatis, quam ex variis purgantium at-
que emollientium speciebus curiosius
conflare. Dein quoque inter ea, quæ
hamorum impetum a partibus superio-
ribus ad inferiores invitant, pediluvia
egregiam operam collocant: quæ ex so-
la aqua pluviali vel fluviali cum fur-
furibus triticeis, adjecto sapone Vene-
to decocta præparari atque circa somni
tempus in usum vocari possunt: adhi-
bita tamen hac cautela, ut pedes diu-
tius atque paulo profundius in ea di-
mittantur, neque nimis calide, sed tepi-
de tantummodo admoveantur.

Pedilu-
vii.

§. III.

Huic prædictæ intentioni non minus
satisfaciunt, quæ leni stimulo alvum
clementer subducunt; interquæ, uti in
omnibus tam arthriticis quam rheu-
maticis, ita etiam in odontalgieis affe-
ctionibus, manna & ex cassia recenti
parata, utpote quæ simul acrimoniam
humorum contemperandi virtutem
possident, praesertim si in sero lactis dulci
vel lacte asinino, aut etiam in fonte
minerali v.g. acidulis Schvvalbacensi-
bus dissolvuntur, præcipuas sibi partes
vindicant.

Ope la-
xantū.

§. IV.

In corporibus atestate florentibus, &c.

Q. 2. quo-

Venae-
Glo-qui-
do ad-
bibenda quorum vasa nimio sanguine turgent, si vel ob transpirationem prohibitam, vel aliis demum ex causis, acerbis obo- riuntur dentium dolores, primæ & que ac secundæ indicationi therapeuticae omni ex parte satis facit venæ in pede instituta sectio; quæ utique tam ad humores ad superiora congestos, inferius invitandos, quam ad æquabilem eorum per omnis generis vasa circuitum restituendum, ut & materiam hostilem e corpore eliminandam præsidium atque auxilium pollicetur insignissimum, alii omnibus præferendum.

S. V.

Diaph-
peccans. Quod si materia peccans odontalgi- cos dolores efficiens, discutienda atque educenda est, egregie huc conferunt ipsa diaphoretica, blandiora tamen & sedativa simul virtute conspicua, e quo- rum numero electuarium ex rob. sam. buci, admixtis cornu cervi usq., antimo- nio diaphoretico & nitri aliquot grani- eum aqua florum fambuci propinatum, laudem certe meretur amplissimam, præsertim si repetatur, & regimen su- doriferum exactius paulo observetur.

S. VI.

Acidu-
rum
usus. Non raro evenit, ut horum dolorum saevitia a serosa foyeatur illuvie, quod fit in cacockymicis, scorbuticis, & catarrhosis phlegmaticis corporibus, ubi malum sepius quoque revertitur. Tunc autem ego ad molestissimum malum præscindendum non certius, tutius nec præsentius, quam in convenienti ther- marum vel acidularum usu inveni præ- sidium, præcipue si in subiectis teneriori- bus & biliosis cum lacte asinino per- miscentur.

S. VII.

Fac-
culi
speciebus
emolli-
sibus ve-
ples. Jam quod remedia externa concer- nit, facculi ex speciebus paregoricis e- mollientibus, videlicet ex floribus sam- buci, meliloti, chamomillæ vulgaris, baccis lauri, juniperi, semine carvi, milii

& sale tosto parati, qui si tepide appli- cantur, ex omni remediorum genere securissima sunt. A suffumigis quoq[ue] v.g. sumo luceini, resinæ syracis, benzoës, olibani, gummi elemi, per infundi- bulum vel linteorum ope dentibus af- fectis admisso, insigne dolorum leva- men secutum fuisse novimus. Interea tamen non omnes & que hanc medica- tionem ferre potuisse, & in quibusdam graves capitum dolores, hemicraniam, vertiginem, oculorum dolorem presso- rum sic excitatos fuisse observavimus.

§. VIII.

Quod si vero dolor acerbus maxime in carioso dente consistit, liquor anody- nus mineralis vel solus, vel cum balsa- mo nostro vitæ permixtus, ope gossypii dentibus inditus egregium præstare so- let levamen. In corporibus humidiori- bus una vel altera olei caryophyllorum gutta, item olei origani Cretici, necnon buxi distillati carioso denti instillata vel cum gossypio applicata, opem non contemnendam affert. Mixtura ex spi- ritu vini camphorato cum croco, casto- reo & opio permixta gingivis atque ex- cavatis dentibus admota, non secus ac ejusmodi linimentum in rheumatismo & arthritide exterius applicatum, in- signis perfæpe levaminis esse solet.

S. IX.

Cæterum, ut accuratum vivendi re- *Dicta*
gimen ad præservationem affectuum chronicorum, & etiam dolorum, utile semper ac proficuum est: ita illud ip- sum in nostro affectu non minorem ad- fert utilitatem. Dicta vero primario in eo consistit, ut æ gri ab omnibus falsis acribus induratis, & nimium aromati- tatis cibis, vino præsertim acido, & li- quoribus spirituosis, omnibusque al- vuum duram & adstrictam quæ reddunt abstineant, auram frigidorem, ven- tum præcipue ex Borea flantem quam sedulo vitent, caputque maxime ab eo arceant. Et sicut in omnibus rheumaticis affectionibus præcaven- dis nullum præstantius ipso suffi- cienti motu, & exercitatione cor- poris datur remedium: ita id ip- sum.

Bals-
vite,
externæ.

Ol.de-
stillata

Mixtus
ra ex
camph.
& opio
Ec.

Sum quoque in chronicis & s̄epe recidivantibus odontalgiis commendationem meretur.

Cautela, & observationes

§. I.

Cauteria Quando atrocior odontalgia a dente carie infecto atque excavato proficiuntur, si situs id permittat, cauterium ignitum ab exercitato chirурgo dextre applicatum, omnia decantatissima etiam remedia superat: siquidem funiculo illo nerveo, in quo doloris sedes est, exusto, & putredine, ignis ope, e dente sublata, dolorem non modo penitus expirasse, sed & sc̄etidam cariem prohibitam fuisse, pluries etiam in nobis ipsis observavimus. Quin hac ratione quoque dens servari potest, si modo ejus cavitati postea cera cum mastiche mixta, quo impediatur ciborum, & aeris frigidioris ingressus, intrudatur.

§. II.

Quae si non lo- cum in- veniuntur dens e- vellentur. Quod si vero dirum illum in dente dolorem excitans caries, cavitatem efformaverit minus idoneam, ut cauterium commode non admitti possit: externa tamen, atque interna quoque in usum vocata remedia nullius efficaciae sunt; nihil minus a diutius affigente dolore gravioris mali periculum imminet, vix datur certius remedium, ac dentis affecti, a circumspecto chirурgo, idonea encheires celebrata evulsio.

§. III.

Soluta rama- prius plethora. Sed tenendum circa hanc operationem, ne ipso in paroxysmo, ubi dolorum vehementia quam maxime urget, instituatur. Neque facile in plethorica, ubi capitis, temporum & genarum venæ tument, valaque arteriosa vehementius pulsant, nisi prius justa sanguinis extracta fuerit quantitas, dentis evulsionem tentare convenient. Testatur enim practicorum hinc inde recensitæ Hoffm. Syst. T. IV. P. II.

observationes, lethalem per s̄aepius hemorrhagiam, a dentibus præsertim molaribus improvide extractis excitatam fuisse.

§. IV.

Observationum fide constat, venarum sublingualium incisionem in graviori odontalgia eximiam tulisse opem. *Sectio ranina.* Nos etiam hoc medendi genus admittimus, sub hac adhibita tamen cautio, ut incisio venarum paulo subtilior sit, alvusque libera existat: quin imo pediluvia in usum, prius quam vena secetur ducenda statuimus. Si vero nimia sanguinis copia corpus turgeat, sanguinem e pedis vena detrahere expediet: ubi dolore adhuc persistente, postea forte raninas pertundere conducibile erit.

§. V.

Peculiare id habent remedia edontalgica externa, ut nunc juvamentum *Exter- na non perpe- tuo ju- vante.* afferant, nunc in eodem corpore nihil perefificant, & nullum adhuc constans & perpetuum contra dentium cruciatus reperiatur remedium. Securissimum itaque est, stagnantium & acrum humorum lenem & successivam procurare discussionem, & ab aeris frigidi in *Rime discur- tientia securi- sima.* iuria partem affectam quam sedulo defendere: id quod sacculi superius recenti, mitiora quoque diaphoretica omni ex parte præstant.

§. VI.

In corporibus cachecticis, quorum *Pur- gantia quibus condu- cant?* vasa ingenti vitiosi seri colluvie repleta sunt, & quæ artuum doloribus alias frequenter vexata fuerunt, blandiora evacuantia in cassum exhibentur. Sed duriori cuneo hic opus est, atque ad paupero validiora properandum. Inter plura alia autem, quæ huic scopo interviunt, pilulae ex gummi ammoniaco depurato, trochiscis alhandal, extracto fibrarum hellebori nigri, mercurio dulci, cinnabari præparato, croco & ca-

storeo composite eminent, & ob laudissimum successum, expectationi desideratae respondent.

§. VII.

Mixtura dolores Mixtura ex spiritu vini camphorato exempli ostentia croci, nucis, & spiritu cornu fedans, cervi volatili vino concinnata, ad guttas aliquot naribus excepta, admirandum plane in modum acutissimos etiam dentium dolores in momento sedataque proficit; cuiusmodi effectu liquore anodyno cum balsamo visa liquido nostro maritato identidem expectandus. At vero dolendum maximopere est, hanc dolorum exspirationem irodo ad tempus plerumque persistere. Ratio autem hujus phoenomeni in eo posita est, quod nervi, qui ad mandibulas, dentes atque nares tendunt, ex uno trunco pari videlicet quinto originem mutuentur.

§. VIII.

Dolores dentium si tanta ferocia in-
irritis, sicut ut cuncta remedium genera
opera penitus eludent, ego insigni cum fructu
corr. pro porrexii pilulas, ita a me excogitatas:
funt. Rec. massæ pilularum aloephanginæ
rum drachmam, de styrace drachmam
dimidiæ, extra diæ croci grana sex. M.
fl. a. Pil. No. LX. D. S. 6. bis 8. auf ein-
mahl.

E N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

C A S U S I.

Odon-
talgia, Serenissimus Princeps, firma &
ex vehe- robustæ quoad fibras & habitum corporis
meni, constitutionis, qui inculpata, & con-
subse- stanti valetudine quadragesimum jam
vis tem- annum superaverat, continuis venatio-
pefatis- nibus & vehementioribus corporis ex-
bus, se- agitationibus, sub inclemotori frigi-
pius re- petita, do & humido aere, sub solis intensiori
borata, æstu, sub ventis saeviter sepe regnan-

tibus, ita fatigavit vires, ut naturam ad permolecas defluxiones in capite, & circumiacentibus partibus frequentius lacefssiverit. Quæ non modo in capite, sed & in maxilla præcipue in dentibus acerrimum dolorem pariunt, atque per intervalla ex capite in subjacentia loca collum, humeros, scapulas delatae, atroci dolore musculosas ac nervosas has partes affligunt, principium vero asperæ arteriæ obsidentes permolestan cum raucedine tuissim inferunt. Ceterum sub quietiori jam corporis statu, & vita in instituto ingravescere hec symptomata videntur, quippe & ciborum appetentia minuitur, & alimenta minus probe digesta flatus & borborygmos cum alvo pigriori excitare solent. Ego in consilium arcessitus, primum atroci illi dentium dolori, qui valde urgebat, subveniendum esse duxi: quem in finem latus affectum linimento, ex una balsami nostri vita & duabus liquoris anodynæ partibus inungere jussi; quod etiam gossypii ope denti, qui cariosus fuit, admotum, levamen non mediocre attulit. Postea exquisitam vietus rationem imperavi: quæ in eo consistebat, ut omnem aerem in- clementem, ventos impetuuosos maxime, ac lolis æstum evitaret, & exercitationes corporis, equo vel curru ve- hendo, vel ambulando cum moderatione tamen, quia iis assuetus erat, non intermitteret; loco potus ordinarii decoctum temperatus ex radice chinæ cortice ligni sassafras, passulis, atque pauxillo cinnamomi paratum bibat, parcus vero vinis spirituosis utatur, vel saltem tenuia Mosellana & huic similia, aut valde diluta cum aqua hauriat. Præter rectam vivendi rationem, in qua constanter pergere debet, etiam hæc malo expugnando accommodata remedia ad usum proposui. Adeoque infusum Theiforme ex melissa, salvia, veronica, betonica, corticibus citri recentibus, cardamomo, justa dosi mixtis mane sumendum in lecto cum lenioris sudoris expectatione suasi. Ante prandium

dium elixirii nostri balsamici drach-
mam cum pauxillo vini & aquæ cape-
ret, atque ad alvum liberam servan-
dam bis in septimana passulas Corin-
thiacas rhabarbarinas ad unciam, an-
te lecti introitum sumeret, consului
ad tuſſim vero levandam, oleum amygdalarum dulcium sine igne paratum,
cum duabus partibus syrapi capillorū
veneris permixtum, in avenaceo juscu-
lo circa noctem usurparet auctor fui.
Præterea frictiones in capite & dolore
afflictis partibus mane & sero adhiben-
das, cum pannis succini fumo imbutis,
calidis, plurimum commendavi, at quan-
te omnia ut caput & partes superio-
res a frigore muniret, suasi. Cucupham
quoque in capite gestandam ex herbi
majoranæ, faturejæ, floribus spicæ, ro-
rismarini, chamomillæ Romanæ, suc-
cino, benzoe, styrace, cardamomo pra-
scripsi. Quibus remediis adjutus per
divinam gratiam, a molestis iſis rheu-
maticis doloribus impedimento ex vo-
to vivit Princeps Serenissimus.

Epicrisis.

Quemadmodum ad constantem tri-
endam sanitatem, & ad morbos a
corpore avertendas afflictiones, nil rec-
efficacius, nec securius conveniente &
sufficiente corporis motu, labore & ex-
ercitatione est: ita attenta etiam ob-
servatione animadvertisimus, non modo
ex intermissione corporis motu, sed etiam
ex nimis, vehementibus inopportuni-
nis & sub inclementi cœlo institutis ex-
ercitationibus viam ad morbos aper-
tissimam sterpi: videlicet quandounque
illæ subito omittuntur. Nam quo-
celerior sub ipso motionum impetu &
agitator fluidorum, & solidorum est
motus & progressus, eo tardior & im-
becillior postea evadit, quando prorsus
corporis exercitium negligitur. Hinc
presso pede sanguinis & humorum sta-
gnationes, decubitus, seri separations,
ejus extravasationes atque in subjectas
partes defluxiones, præfertim eas, qua-
eris in iuriis expositæ imbecilliores &

a naturali tono dejectæ fuerunt, alia que
permolesta accidentia insequuntur:
quemadmodum superius haud ignobile
exemplum satis luculenter demonstrat.
Ceterum, quoniam natura assiduis, &
quotidianis iisque validioribus exerci-
tationibus fuit adiuta, non penitus
casas intermittendas, sed sub modo &
moderatione continuandas esse censui.

C A S U S II.

Cum nuper ad aulam Serenissimi Principis vocarer, consultum me adiit
fœmina honesta ante 40. annos nata, Rheuma-
dentiū e collu-
sanguine & succis plena, quæ sub priori
conjugo & ante illud etiam in primis
juventutis annis, largiter semper san-
guinis menstrualis fluxum experta est;
atqui, dum singulis fere annis liberos
peperit, satis valens & salva permanxit.
In altero conjugio, quod plane fuit ste-
rile, per aliquot annorum spatium, tē-
pore potissimum vernali & autumnali,
permolestis & gravibus in capite deflu-
xionibus, coryza, gravedine, dentium
acerbo dolore, tumoribus fauciū,
uvulæque prolapsu misere admodum
fuit tentata: quæ symptomata duos,
quandoque tres menses continuarunt.
Tumor internus faucium non medio-
cris ita saepius compressit mandibulas,
ut os deducere, nisi quantum sufficeret
ad forbillarda juscula vel tenuiores ci-
bos capiendos, non potuerit. Multis
usa domesticis & pharmaceuticis re-
mediis: sed cunctis effectu plane fru-
straneo. Cum in pleniorē morbi sta-
tū ejusque causas inquirerem, cognovi
eam cum marito inferiorē domus
humili loco sitæ stationem inhabitare,
& in ipsa dormire, quæ cum minus a
ventibus perfari queat, aer inclusus
quam facile vappidus & humidus red-
reditur; deinceps in quieto semper vitæ
genere versata est: tertio in conjugio
sterili vixit, & mensē longe parciores
quam superioribus annis experta, sin-
gulo quoque vere & autumno venæ fe-
ctionem in brachio admittere consue-
vit. His perspectis & diligenter expen-

sis, vitiōsi seri potius illuviem in hoc corpore, quam sanguinis redundantiam peccare judicavi. Quare non tam ad sanguinis quantitatem detraherandam, quam ad seri intemperati & impuri nimiam copiam impediendam, immo e corpore exturbandam, & ad robur toti corpori, capiti in primis, conciliandum medicationis consilium direxi. Sua si igitur, ut mutaret conclave & dormitorium, atque in loco diffibili altiori vitam ageret: dein, ut intermedio tempore, quo libera erat ab hoc affectu, a copiosiori cibo, carnis bus elixis & pinguioribus jusculis, a cenna etiam abstineat, & corpus labore & motu moderationi exerceat, praecepi. Loco cerevisiae crassioris aquam coctā cum cinnamono, cortice l. saffafraſ , passulis, & quarta vini parte mixtam bibat; & ut singulis mensibus, bis vel ter pilulis meis balsamicis polychrestis, & totidem in septimana vicibus elixirio balsamico temperato utatur edixi. Deum balsamo nostro liquido caput inungendum, & aqua cum vino remixta, in qua aliquot guttulae balsami dicti instillatae, os frequentius colluendum commendavi.

Epicrisis.

In ejusmodi diuturnis crebrius recurrentibus rheumaticis affectibus profigandis, medicus qui consultatur, probe semper prius statum corporis, causas antecedentes & concurrentes investigare debet: siquidem ut plurimum sagax & circumspectus Philister, permolestas has diuturnas fluxiones seu rheumata, a tenuiore & excrementario sero ex atonia solidorum oriundo potius, quam a sanguinis boni redundantia dependere atque produci deprehendet. Et tunc pessimo consilio largiores sanguinis detractiones proponuntur, que naturam imbecilliorē reddit, & ad morbosas afflictiones disponunt. Ego in doloribus rheumaticis arthriticis ne-

que minus in catarrhosis defluxionibus singulari semper cum fructu dixtam, ut ita loquar, emaciantem commendavi & imperavi; quæ in detractione copiosi alimenti, abstinentia, ab omnibus quæ copiosum alunt nutrimentum tam cibis quam potibus, sufficiens motu & exercitatione corporis, tenuique ac levi potu consistit: interposito nonnunquam apto balsamico laxante & roborante. A quibus auxiliis, in ejusmodi abigendis, & avertendis morbis ampliorem me semper consecutum fuisse opem, ac ab aliis pharmaceuticis remedii omnibus, sancte adstruere, & affirmare possum.

C A S U S III.

Juvenis annorum 30: corpore carnoſo & boni habitus, sanguine abundans, hyemali tempore domi bene pastus & ex cibis nutrientibus saturatus, vini quoque non raro haustum interponens, sub libero vernali, ventoso & humido pletho-
cælo, non tecto fatis & munito corpore gore a-
riter per aliquot millaria facere debuit. Hinc domum reverso, ingens lassitudine corporis, caput molesta cum vertigine gravitas, dentes vero immanis admodum dolor irruerat atque invadebat, qui noctu acerbior erat. Quum per annum sanguinis missionem non passus fuerat, ex meo consilio venæ circa pedis malleolum facta incisio, & plus quam decem uncia extractæ; quæ vacuatio cum euphoria celebrata quadam horum pathematum remissione largita fuit, pulsu inde valentiori redito. Ipse sponte sua ante lecti ingressum, quum per syringam tabaci hauriret fumum, aquæ frigidæ fontanæ mensuram successu temporis epotavit, cubitumque petens corpus stratis probe texit atque circumvolvit. Hinc largissimus in toto corpore sub. ortus sudor per integrum nocte mana-

vit. Inde ex parte factus, omnis dolor a capite & dentibus, felicissime fuit abactus.

Epicrisis.

Quandoconque dolores gravativi & rheumatici artuum, capitum, a sanguinis $\pi\pi\pi$ sic dicti consistentis & rubicundi redundantia, quæ impeditorum humorum circuitus & secretionis atque excretionis immunitate parenst, potius quam a seri impuri copia & decubitu in eusarcis & bene pastis corporibus oboruntur; ipsa ratio sana medico-practica dilectat, ad liberiorem circuitum sanguini & humoribus conciliandum, sectionem venæ remedium esse aptissimum. Et tunc ordinario pulsus major, auctor & fortior post sanguinis vacuationem sequitur, qui certum modumque fallax, ex redundantie illo purpureo liquore morbum provenisse, indicium exhibet. Deinceps insignes aquæ puræ fontanæ frigidæ sudoriferas & discutientes virtutes, hic casus magis conspicuas atque illustriores reddit. Ego semper in hac heresi fui, aquam frigidam fontanam puram, terrestrioris calcareæ vel salinæ materiae expertem, incomparabilem multis in morbis præbere medicinam, tum ratione frigoris fibras attonitas firmantis & roborantis, tum respectu mineralis ætherei spiritus, quo nulla aqua destituta, viribus identidem amici; quin & ratione fluxilitatis ac tenuitatis, qua crassis humores mobiles, fluxiles, atque libero progreffu aptos reddere valet. Sed hoc remedium, quod utique magnæ utilitatis est, & recte heroicum dici potest, maxima eget cautione & circumspectione. Quam hisce capitibus includere non dubitamus: quorum primum est, ut imbecillo & tenui corpori, ubi motus languent & venæ sero turgent, non exhibeat: secundum, ut tantummodo corporibus sanguine, calore, & motu vegetiore adhuc plenis præbeat, quo in totius corporis ambitum actuari &

distribui possit: tertium, ut non uno haastu, sed successive ac per vices ingeratur: quibus addimus quartum, ut corpus post epotacionem vel motu ad sudorem usque exerceatur, vel in lecto calidis tegumentis probe soveatur.

C A S U S IV.

Fœmina triginta annorum, vietiū *Odon.*
crassiori salino indulgens & otiosa *talgitæ*
vitæ dedita, sanguine abundans, al*ex insōw*
vum patitur cerebri tensam atque *grua*
strictam, mensuusque defectum *dieta-*
experitur. Sanguis e vena missus appa*riuit glutinosus.* Autumno gravissimo corripitur dolore circa nucham, qui se se ad aures extendit, parotidem totamque dextram maxillam cum inflatione atque rubore occupans, in dente carioso ejusdem lateris gravissimum dolorem excitat. Pulsus erat febriculosus, arteriæ fortiter circa tempora pulsabant, somnus inquietus vel plane nullus, & perpetuo salivalis latex ore effluxit. Ut his medelam faceret, externe utebatur linimento, quod habebat oleum hyoscyami, carvi & parum camphoræ, a quo dolor minime mitigatus, sed potius exacerbatus fuit, inflammatione in facie aucta. Curata vero est sequentibus. Primum mixturae, ex liquoris anodynî oncia dimidia, camphoræ, laudani opati cydoniati utriusque granis tribus paratæ, quindecim guttas vel viginti, tribus de die vicibus sumbit. Secundo, loco porus ordinarii decocto hordei, scorzonerae & raloræ ligni sassafras, cum semine papaveris albî in emulsionem redacto fuit usa. Tertio nucha & capiti sequens applicatum fuit linimentum: Rec. aquæ Anhaltinæ, spiritus florum sambuci ana uneiam, spiritus salis ammoniaci drachmas duas, nitri artificialis, quod preparatur ex spiritu lapis ammoniaci & spiritu nitri, camphoræ

plioræ utriusque drachmam dimidiām , opii grana decem , olei nūcīstæ destillati guttulas quindecim . M. Quod exterius adhibitum, egregium plane tulit solatium . IV. Mitigato paulisper dolore , alvus vacuata fuit cum infuso , quod capiebat folia sennæ , rhabarbarum , agaricū , cremeum tartari , & pastolas minores , cum aqua & vino . Utut vero dolores ex parte remiserint , remansit tamen fixus in gingiva circa dentis sedem cruciatus , cum insigni inflatione & rubidine , qui ad aliquot menses durabat . Ex consilio itaque medici , & opera chirurgi extracto dente , materia ichorola & putrida in copia successive ex alveolo effluxit , cum plenaria doloris remissione . Foramen vero relictum usum adstringentis medicamentis fuit clausum .

Epicrisis .

Ex hac morbi relatione discendum est , quod odontalgia frequentius conjuncta sit cum phlegmone seu erysipelacea quadam defluxione ; quare etiam eodem modo ac via sanatio utriusque affectus instituenda . Et quemadmodum in erysipelaceis affectibus exterius applicata oleosa nunquam prospicit , ita etiam in hoc casu ea non bene ferre potuit aggredita , sed dolor potius discentientibus , temperatis & diaphoreticis auscultavit . In cacoehymicis corporibus , maxime , si humorum adsoiciatur abundantia , frequentissime gignitur & quidem circa autumnum odontalgia ; quo tempore etiam arthriticae affectiones familiarius occurunt . Rebus itaque tam eventum fortientibus , ad præservationem venæ sectio , decocta lignorum temperata , convenientia evacuantia , abstinentia a vino , cibisque salitis acrioribus , utilissimam , depurando totam sanguinis massam , locant operam . Porro , cum fistula facile generetur in maxilla , quando in ejus alveolis materia acris

putrida stagnat & exitum non invenit , quæ non modo ipsum dentem , sed osseam etiam maxillæ substantiam exedit , corrodit & ulcus difficulter sanabile , quod cognoscitur ex dolore , tumore & rubore , nec non putridæ materiæ post compressam gingivalem carnem effluxione , efficit ; ut mature ipse dens extrahatur , quo corrupta illa materia non solum habeat exitum , sed etiam medicamenta proxime ipsi ulceri applicari possint , maxime est necessarium .

C A S U S V .

Fœmina 30. annos nata , venarum sectioni diu adsueta , quotannis eam , quotiescumque uterum tulit , omisit , ob vanum & nullis rationibus innixum metum , ne hoc evacuationis genus periculum portendat . Sed semper fere affecta est gravi odontalgia , juncta cum tumore faciei seroso . Inter præludia vero hujus recurrentis affectus , ad frequentiam illius præscindendam , usus est essentia , quæ constabat ex terra catechu , sanguine draconis , pauxillo aluminis usli & spiritu vini ; quæ tam externe , quam interne sumta , mox acerbissimi capitis secuti sunt dolores , cum summa præcordiorum anxietate , insigni virium defectu animique deliquio conjuncti . His cessantibus symptomatibus tumor utramque maxillam occupavit , quem externa applicata cataplasma non sublevarunt , sed exacerbarunt , ita ut intensiori febre facta & intercurrentibus animi deliquiis abortum passa fuerit . Tandem emplastro manus Dei pertinax ille in scirrhosam duritiem abitus tumor fuit depulsus .

Epicrisis .

Gravidis familiarissimæ sunt propter plethoricum & cacoehymicum statum , & ob impeditiorem perspirationem , mensiumque defectum cede-

cedematosi vel etiam erysipelacei capitis & odontalgici affectus, qui matura venæ sectione, & eorum usu, quæ alvum clementer cum euphoria & per epicrasis movent, motuque insuper & vietu moderato præscindi feliciter possunt. Si quis itaque excretionem humoris vitiosi, si jam imminet, imprudenter velit impedire, quod sit adstringentibus; non potest aliter fieri, quin materia a sanguine jam segregata & corrupta in internas & nobiliores partes irruat, longe graviora symptoma inducendo. Notabile porro est, quod non secura semper sint cataplasma ex discutientibus etiam composita, quia saepius repellendi facultatem, dum videlicet humida non quisque ferre potest, nanciscuntur. Deinceps tumor serosus facile transit in scirrhosam duritiam, præsertim si nimiis spirituosis discutientibus fuerit tractatus, qualis diutius inhæret, & difficillime resolvitur, neque facile emollientibus ad suppurationem disponi potest. Egregiam vero virtutem non semel sed aliquoties tali in casu experti sumus, ab emplastro sic dicto Manus Dei, quod maximam partem ex gummatis compositum, atque in *Charas Pharmacopœa Regia* descriptum est.

C A S U S VI.

Dolor dentium periodicus, ex vini & dulciem intemperantia. Vir sanguineo-melancholicus vino adfuetus & dulcibus ultra modum delectatus, ex carioso dente dira saepius tormenta, præcipue autem tempore nocturno passus est. Dolor hic erat periodicus: incipiebat enim circa decimam horam, excrucians usque ad tertiam matutinam, nullo extrinsecus apparente tumore aut calore præternaturali. In cavitate dentis hærebat particula spongiosa exquisitissimo sensu prædita. Hujus foramini intrusa fuit essentia castorei, cui tantillum laudani opati

admixtum erat. Ita quidem doloris atrocia quievit, nec per biduum reversa est; sed tertio die recruduit, & eadem hora rediit: non autem eodem remedio, sed ex camphora indita remisit. Elapsis aliquot diebus, cum idem dolor recurreret, nec camphora, nec prædicta essentia ullum levamen afferebant; sed potius tunc ad oleum caryophyllorum confugiendum fuit, cujus una & altera guttula denti carioso immissa levamen attulit. Accidit vero, ut cum sequenti septimana malum eodem modo infestaret, neque unum ex hisce tribus, utut singula applicata fuerint, quidquam in allevando malo præstiterint. Saefi, ut interne electuarium superius reconsitum, cujus basin constituit robambuci, repetitis vicibus lumeret; externe vero balsamum nostrum vita naribus susciperet & denti essentiam castorei inderet: quo dolor etiam mitigatus fuit. Tandem dentis extractione facta, dolor nunquam rediit.

Epicrisis.

Hæc memoratu digna observatio luculenter docet, quam incerta & infida sint specifica sic dicta antodontalgica externa, idque hanc observationem, quod fibrarum & pororum in partibus solidis textura, & ab ea dependens debilitas non semper eadem maneat, sed brevi ab ipsis etiam medicamentis mutari possit: quo sit, ut idem remedium non eundem, sed alienum plane sape numero præstet effectum. Parum itaque auxilii cum expectandum sit ab externis, consultius semper procedimus, si curam ejusmodi affectuum congruis internis remedii adgrediamur & prosequamur, affectamque partem tantummodo in temperato calore & in exspiratione æquali & liberiori detinemus.

C A P U T X.

De dolore & spasmo otalgico.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Defini-
tio.

Circa dolorum & spasmodorum do-
ritinam dum versamur, ille
etiam, qui ad aures pertingit & non
minori laetitia ac ceteri affligit, non
reticendus erit: licet breviter, quic-
quid de hoc affectu commemorandum,
dicamus. Est vero otalgia gra-
vis dolor, in aurium cavitatem sive
meatu auditorio consistens, a sero
aci extravasato, & subsistente intra
membranam nerveam meatum audi-
torium cingentem exortus.

Genesis
& cau-
sa.

Pertinax hic aurium dolor, eos, qui
rheumatismis & catarrhalibus deflu-
xionibus sunt obnoxii, frequentius
adoritur, vel, si sudor consuetus sup-
primitur, aut caput sudore madidum
ventis frigidioribus desubito exponi-
tur, prognoscitur. Sæpe causa, in-
flammatio vel ulcus aurium est, ubi
insignis ardor, dolor tensivus, pul-
satilis, rubor, febris, imo delirium
junguntur: interdum a vermis
excitatur, & dolor vagus lancinans
atque rodens percipitur. Præclare
ARETÆUS lib. 2. cap. 3. de aurium
dolore sequentem in modum differit:
Acusticus porus difficillime saepe doloribus vexatur, ut etiam occipitium teneant & oculos atque buccarum musculos, & perseveratione quadam tardissima tempora & caput. Ali quando etiam humoris fluor per easdem cavernas fit, quem graci rheumatismum vocant, & ita jugis, ut saepe vulneret altiora atque corrumpat, & ossa carie inficiat.

Proces-
sus &
symp-
toma.

Otalgia tanta saepe vehementia
affligit, ut in provectionis atque adul-
tae ætatis hominibus delirium exci-

tet, cum summa inquietudine & an-
xietae coniunctum; quinimo epile-
psiam sic suisse introductam nos ob-
servavimus. Phlegmaticos autem
licet minori gradu infestet, horren-
dos tamen in cholericis, capitis dolo-
res cum quadam mentis alienatione,
vigiliis & inquietudine infert.

§. IV.

Ratio, cur aurium dolores tam
crudeliter lœdant, ut tolerari vix
possint, in eo potissimum posita vi-
detur, quod membrana aurem qua
investit, osse illo meatui firmiter
annectitur, adeoque magis tenditur,
nec non a dura matre originem sor-
titur, nervorumque irruptu dives
est. Quo magis autem membranæ
nerveæ tensæ atque expansæ sunt,
eo acutioribus doloribus eæ sunt ob-
noxiae: quemadmodum id liquido
apparet in periostio, intra quod &
subiectum os contentus saxe humor
horrenda symptomata producit, quod
in panaritio aliisque ossium vitiis
videre est.

§. V.

Sæpe otalgia symptomata febrium
acutarum evadit, ubi materiæ mor-
bis ad aurem per metastasis fit
translocatio; quemadmodum in mor-
bo Hungarico interdum evenit, ubi
surditas vel ingens saltim auditus dif-
ficultas exoritur. Quæ si in declina-
tione febris accidit, infallibile conva-
lescentiæ præbet signum, sed tunc
vitium in auris internæ membrana
& nervo acustico hæret. Quando
vero metastasis ad aurem externam
pertingit, tunc otalgia suboritur,
quæ, nisi cito succurramus, ob
doloris atrocitatem demere vitam po-
test. Qui ex lapsu vel casu in terram
otalgiæ patientur, ubi materiam
saniosam per aures reddidere, e me-
dio omnes sublati sunt, teste RIVE-
RIO obser. 18. p. 291. HIPPOCRATE-
S vero in coac. prænot. pag. 538. §.
58. de exitu hujus morbi lequentia
habet: *auris dolor perinax, cum febre
acuta & alio quodam signo aliquan-
tum*

tum maligno juvenes quidem septima die occidit. Et citius desirio correptos, si non multum pus effluxeris ex aere, aut sanguis e naribus, neque aliud quodam bonum signum compareat, Seniores autem tardius et minus tollit: nam et aures suppuratione præveniunt et minus delirant. Verum multi ex his recidivant, atque sic percunt. Monere autem hoc loco debeo, quod hoc decretum Hippocratis magis de dolore & tumore inflammatorio parotidum intelligendum sit.

Methodus medendi generalis.

Dolor
compo-
nendus.

In curatione hujus dira tyrannide aures excentis affectus, omni ratione eo annitendum est, ut dolorum illa vehementia, qua causam interdum gravissimis symptomatibus praebet, componatur vel saltim mitigetur. Id quod variis quidem modis tentari atque obtineri potest. Nos autem alis cunctis, pulveres nitrosos cinnabarinos, liquorem nostrum anodynum mineralem, nec non emulsiones semioum 4. frigidorum majorum præserimus. Quibus nihil proficiuntibus, ad opium rite correctum fugiendum est, quo nomine massam pilularum de styrace, Starcke, Wildegansii, laudanum liquidum Sydenhami, vel cydoniatum Helmontii commendamus.

§. II.

Externis. Externe emplastrum anodynum tempori lateris affecti nec non pore aures applicatum, quod ex mastiche, galbanio, croco, oleo nucis & expenso, castoreo, opio compositum est, desideratissimas fert suppetias. Dein etiam vapor ex lacte & speciebus fragrantibus atque emollientibus auri immixtus materiam peccantem non modo emendat, corrigit atque ad suppurationem disponit, sed & fibras nerveas nimis tensas relaxando dolorem solvit. Convenit quoque vesicam tuillam decocto cum lacte ex floribus

malvae, verbasci, sambuci, meliloti, chamomillæ vulgaris, nymphæ, papaveris rheados, semine lini & pauxillo croci repletam exterius adfesto lateri admovere. Fumus quoque nicotianæ cum fistula inversa auri immixtus, item millepedes in oleo olivarum vel amygdalarum amararum infusi, nec non oleum scorpionum ad dolorem, si ab inflammatione vel sero acri provenerit, compescendum, maxime valere creditur.

§. III.

Quemadmodum autem ubicanque humor stagnans atque subfistlit, is promovendus atque discutiendus est: ita etiam pulveres diaphoretici, leniter nitrosi, cinnabarinii, cum aquis diaconois atque analecticis propinati, opportunissimam in hoc affectu locabunt operam. Plethora si urget, vena secanda: atque alvus renitens clysteribus emollientibus vel internis laxantibus ex manna, cassia & rhabarbaro paratis, ad officium redigenda. Dignus certe est qui hac occasione commoretur locus apud modo laudatum ARETÆUM, ubi curationem hujus mali pulchre admodum proposuit. Utendum inquit, loc.cit. requies corporis atque abstinentia & silentio summo: etenim organo auditorio accepta voce aures necessario commoventur, & propterea majores dolores efficiunt. Locandi præterea agrotantes calido in leâlo, & si dolor coegerit, phlebotomandi, atque tertia die levi atque sartili cibo reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius admovenda vaporatio tepidi liquoris vel sacculi ex polline tenera confecti. Tum cataplasmata laxativa, & cum dolor initum sumserit, statim erunt admovenda sanguisuga quas biruidines appellant circa fines auriculæ, vel circa ejus posteriora curbita admota, searificando, adhibita spongiarum calidarum. Ipsam quoque cavernam involuta lancea per specillum oleo calido tintum, paulatim penetramus, atque illic lancea derelicta ferramentum detrahimus.

Cass.

Cautela & observationes.

§. I.

Quid ad gendum, causa externa, immissa v. g. dura sa extera in aurem provenit, cuius rei exempla apud HILDANUM pro rem illa stant, tunc in ipsa doloris saevitia neutiquam tentanda erit extractio cum forcipe vel alio instrumento eo, quod non modo frustra hoc tentamen suscipitur, sed & dolor mirum adaugit symptomatibus intolerabilis redditur. Sub doloris enim impetu nerveus auditorius meatus vehementiori spasmo constringitur, ut adeo, quacunque demum etiam leviori vi externa accidente, dolor exacerbetur, & meatu sic angustiore evadente, materia exitus eo magis prohibeatur. Rebus ita se habentibus, fatus supra dicti potius locum inventit applicatio, vel aliquot olei amygdalarum amararum in aurem instillatio; quippe quod praeter vim demulcentem, sedativa quoque facultate est instructum: qua ratione, dum membranæ tensæ emolliuntur & relaxantur, sola oborta sternutatio ne, corpusculum illapsum simul & semel sponte excusum suisse, novimus. Atqui, cum hoc apprime quadrant, quæ monumentis suis reliquit TRALLIANUS, non possumus, quin ejus de hac re sentientiam ad verbum recensemamus, quæ lib. 3. cap. 3. ita se habent: Si lapillus, aut faba, aut aliud quicquam in aurem incidat, specillum lana involutum in resinam terebinthinæ aut glutinosum aliquod intingo, ac ubi in auren̄ injeceris leniter protrahito, & sternutamentum excitans, os & nares obturato. Nam spiritus intentione, que ita fit, id quod intus impactum est, expellitur. Hoc autem continuo facito diligenter adhibito, ut quam primum eximatur. Sin autem neque sic exciderit, inflammatione oboriente, convulsiones saepe comitantur, ut etiam agri-

de vita periclitentur. Quare oleum quoque tepidum frequenter infundere oportet: sic enim locis inflammatione liberatis, id quod infidet, facile eximetur.

§. II.

Otalgia plerumque a causa interna solvitur & abscessu finitur, dum materia purulenta ichorosa, ex ipsis glandularum meatum auditorium externe obdidentium atque cerumen alias largientium poris & tenuibus canaliculis, stillat. Ad quas etiam in infantibus, praesertim qui spongiosioris corporis sunt habitus, tantus saepe humoris serosi fit affluxus, ut ingens foetidi & purulenti humoris copia quotidie exeat. Sub tali morbi statu humorum impetus per laxantia leniora, mannata, rhabarbarina, passulata, aliquoties repetita divertendus, vel per diluviorum, vesicatoriorum, aut cucurbitularum ope in provectionis praesertim ætatis hominibus, ad inferiora invitandus est. Haec ratione molestus hic aurium fluxus successive minuitur, & salvo auditus organo sanatio perficitur.

§. III.

Quando major jam puris copia post inflammationem praecedentem ex aere effuxit; tunc, praeter ea, quæ humorum impetum, a capite & aribus divertunt, quæ leniter exsiccant, putredinique resistunt, exterius admovenda sunt. Vtteres eo fine pastillos, ex aloë, croco, myrrha, sarcocolla, confecerunt, & aurium cavernis indiderunt, vel mulsum ex vino factum cum mali punicei cortice, nardo, amygdalis amaris, croco, myrrha, alumine, vel herbarum vulneriarum succis coctum, cavernæ aurium, si humor fortius effluerit, infuderunt. Qua de re evolvendus CÆL. AURELIANUS, lib. 2. cap. 3.

§. IV.

Cavendum vero est, ne diutino arium purulento fluxui, a quacunque etiam causa proveniat, externis val- Tamen non subi- dio-

dioribus exsiccantibus & fortioribus adstringentibus desubito obex ponatur. Exinde enim ingentem parotidum tumorem, cum summo dolore siveisque symptomatibus slipatum, profectum fuisse, nostra pariter & aliorum fide constat.

§. V.

*Parotidae in febre quomodo abigen-
de?* Quandocunque febris acutis supervenit atrox ille aurum dolor cum intumescientia parotidum; non praesentius auxilium, ac in cucurbitularum cum scarificatione in nucha appositione, & solius cataplasmatis emollientis, ex caricis pinguibus, croco, melle, succoceparum tostatarum & radice liliorum alborum parati tepido usu, me invenisse plena fide testor.

§. VI.

*Vermes vel eliciendi vel ene-
tandi.* Si dolor a vermis aurem ingressis ortum traxerit, lacte tepido auribus immisso thi eliciendi, vel oleo absinthii, nucleorum Persicorum aut amygdalarum amararum sunt enecdandi.

ENARRATIONES
MORBORUM.

CASUS I.

*Otalgia suffimi-
gis &
empla-
strobra-
chii tu-
mor ap-
plicatis
inducta.* Nobilissima Virgo quinquagesimum que jam complevit annum, activi ingenii, sanguineæ constitutionis, decem abhinc annos dolorificis partium externarum fluxionibus a sanguine nimium abundante, & ob ejus tardiorem progressum impuriore reddito subortis continuo fere fuit obnoxia. Me quum hac de re consuleret, ut ter minimum singulis annis nimiam redundantis sanguinis quantitatem e sesta vena detrahi curaret, auctor fui: unde melius etiam se habuit. Consueta vero hac sanguinis eductione æquinoctio autumnali intermissa, atque sudore nocturno usitato, ex improvida brachii dextri refrigeratione, cohibito, postero die ingenti dolore una cum tumore in ejusdem brachii cubitu tentata fuit;

qui adeo sensim increcebat, ut brachium neque flectere neque attollere potuerit. Ad hanc molestiam abigendam, amicarum suauis, frequenter ex gummatibus resinosis, succino, tacamahaca, usq; est suffimigio: quo remissior quidem dolor redditus, sed tumor mutata sede superiore humeri partem invasit, qui insignem in magnitudinem increcebat. Huic cum chirurgo emplastrum applicatur, evanuit ex parte quidem, sed in dextrum capit is latus irruens, in aure potissimum horrendum & acutum dolorem, ut vix ferendo illi pareret ægroti, introduxit. Totum dein caput insigniter tumefactum comparuit, auditus aderat summa difficultas, atque e naribus aliquot sanguinis guttae cum mucosis multis humoribus secesserunt. Consilium meum, cum per medicinæ candidatum qui mihi ad manus erat exquireret, consultum primo omnium duxi, ut aperiretur vena pedis sinistri, quo abundantii nimium sanguini quodammodo exitus detur; deinceps, ut infuso foliorum lennæ & rhabarbari cum decocto passularum minorum, fordes et primis viis blande educerentur. Quibus præmissis, tenuem vietum & pro potu decoctum, ex radice sarsaparilla, glycyrrhize & floribus papaveris rhœados sumendum imperavi; atque ad successivam transpirationem & uberiorem pravi humoris subsistentis promovendam difflationem, ut æquali lecti calore corpus foveret, & mixturam, ex aqua florum lambuci, cornu cervi usq;, antimonio diaphoretico & pauxillo nitri frequentius usurparet, laterique dolenti sacculum supra descriptum leniter calefactum applicaret, suasi. Et ita circa undecimum diem, largo sudore sponte erumpente, totum corpus fuit perfusum, evanescente penitus permolesto accidente. Cum vero auditus gravitas cum dolore pressorio remaneret, consilium dedi, ut panis cum semine foeniculi igne cocti, re-

center ex furno extracti & discissi vaporem meatui auditorio reiteratis vicibus admitteret. Quo pacto expurgata demum pilulis balsamicis & cephalicis nostris, sordium mole, pri-
stinae valetudini sensim sensimque Nobilissima patiens fuit restituta.

Epicrisis.

Ex hujus affectus generandi, pariter ac eum curandi modo, medicorum juniores plura ad praxin utilia momenta capere & depromere possunt. Primo, quod dolores ejusmodi rheumatici, a venæ sectione neglecta & sudore consueto salutari cohito, originem suam ducere possint. Dein, quod ad eos abigendos sufficiencia non satis sint secura remedia, dum tonum cutanearum fibrarum nimium augendo, pravorum humorum motum ad interiora convertunt, quum potius ejusmodi vitiōsi humores sensibilioribus corporis partibus & poris inhārescentes successive & placide commovendi, & ad liberiorem exhalationem incitandi sint. Et quod, tertio, in ejusmodi pertinacibus rheumatibus profligandis longe magis circumspete & efficaciter agat medicus, si non multis activioribus sudoriferis naturam lacestat, sed tempus expectando, blandis & temperatis ad diapnoen disponentibus remedii utatur: qua ratione contingit, ut natura sponte sēpe critice & salutariter morbum solvat.

C A S U S II.

Otalgia inmanis ex ingesta vini copia & sequente refixatione. Generosus senex sexagenario major, macilentioris staturæ sed floridæ faciei, olim cum inter Westphalos medicinam facerem, consultum me adiit, qui a convivio, in quo vinum liberalius potaverat, sub aura nocturna peregre domum reversus, altero mane de gravativo capitum dolore, sinistrum praelertim latus affigente conquerebatur. Huic mox dolor auris valde acutus successit, qui tam atrociter intra paucos dies invalesce-

bat, ut non modo omnem somnum adimeret, sed & tremorem partium universi corporis cum frigore excitaret, adeoque non frustraneus esset convulsionum metus. Intolerabilibus plane dolorum tormentis miserrime excruciatum senem inveni, qui non nisi a globo per sclopetum trajecto levamen optabat: tantæ insaniae & desperationi proximus erat. Exterius, dolente in parte nihil præternaturale conspicendum erat. Itaque alvus aliquoties a clysteribus ut aperiretur, curavi: atque interne non nisi pulveres antepilepticos, cum nitro, cinnabari & pauxillo laudani opati remixtos propinavi, vapore quoque decocti florū chamomillæ cum lacte auri frequentius admovendum præcepi: eo quod intra meatum auditorium confitere dolorem, conquerebatur. Tandem elapo die septimo, mitestente doloris saevitia, corpus madore perfusum, pulsus redditus sedatior & mollior, qui ante contractus & durus erat, urina quoque antea valde tenuis & aquosa, crassius nunc sedimentum depositus, & denique sponte aperto abscessu, ex aure successive duobus purulentæ materiæ cochlearibus effluentibus, omnia & singula gravia symptomata penitus remiserunt atque evanuerunt.

Epicrisis.

Mirari omnino subit, senem nostrum tam valenti & robusta natura adhuc gavisum fuisse, ut adeo gravem capitum affectum, qui totum nervosum systema afflitit, feliciter superare potuerit. Atqui in hoc genere hac ipsa curatio, quæ plus naturæ quam arti debetur, insigne autocratis naturæ exemplum præbet. Venæ sectionem, cui non adsuetus erat, nolui admittere, nec fortioribus, sed lenissimis tantum remedii atrocissimum morbum in sene pertractare æquum duxi. Et hæc viri magna auctoritate in principatu Mindensi pollutis e tam gravi morbo evasio, mihi tum temporis juveni medico, magnam supra

supra meritum meum famam & extimationem conciliavit.

C A S U S III.

Otalgia Generosa fœminæ, viduæ consilia-
diurna rii Aulicifilia, decem annorum puella,
miracru- tenerioris & mollioris naturæ, de lan-
delitate ludens, guore, inappetentia & doloribus ab-
effluxu dominis, pungitivo etiam circa hypo-
puris fo- chondria, querelas cum ejulatu insti-
luta. tuit maximas. Somnus erat exiguus, cum pavore plerumque comitatus. Præsentiam vermium horum pathematum causam eum judicavisse; que-
iis & enecandis & expellendis accom-
modata videbantur, a me fuerunt præ-
scripta: at vero in cassum adhibita. In
lecto detenta per mensem & ultra, perpetuas de hisce symptomatis movebat querimonias. Tandem facta dolorum ex imo ventre evanescentia, cephalalgia cum auditus difficultate graviter tentabatur. Accessit assida vigilia, adeo ut per quatuor & quod excurrerit hebdomadum spatium ne horam quidem capere somnum potuerit. Quotidie delirabat; nec quicquam ci-
bi vel potus astulit, auditu penitus amissio. Nihil ad vitam & vires conserandas præter intritum cerevisiæ cum pane cepit: quippe medicamina cuncta, omnia jucula atque alimen-
torum genera respuebat. Frequenter ægram invisebam: & quum urgeret consilium mæstissima mater, me nihil certi de morbo ejusque eventu edicere posse fastus sum, DEO, naturæ & temporis opus relinquerem cunctius dicens. Tandem præter omnem opinionem evenit, ut nocte multum purulentæ materiæ aure effluxisse deprebensum fuerit, majori quantitate sensim succedente. Ita ad miraculum intra diem & noctem rediit somnus, revertit auditus, ut adhuc gravis, & pedentim appetitus & vires revocatae sunt: verbo, DEI ac nature beneficio redditæ valetudini fuit nobilis puella, bona adhuc dum & prospera valetudine utens.

Hoffm. Syll. I. IV. P. II.

Epicrisis.

Et hoc quoque exemplum plane evincere & demonstrare potest, cau-
fas morborum adeo abstrusas sœpe es-
se, ut mentis acie medicus vix eas pe-
netrare possit. Videmus tamen ite-
rum ex enarrata historia, quomodo solus atrocior capitum dolor omnes fun-
ctiones animales & naturales pver-
tere, imo propemodum destruere valeat, atque a sola violenta nervosarum & fibrosarum partium agitatio-
ne, commotione & distractione pro-
xime proficiscatur. Hinc etiam fit, ut dolore sublati, tanquam causa ho-
rum acerborum symptomatum proxima-
ma, omnia ad pristinum & naturalem
statum redeant.

C A P U T XI.

De dolore podagrico & arthritico
vero & in veterato.

THESES PATHOLOGICÆ.

§. I.

Discrimen podagræ & arthritidis Differen-
recentis ab ea, quæ radicata & tia po-
in veterata est, insigne in prognosi & dgre
praxi medica habet momentum: incipien-
tis et rati-
nam illa est magistratoria, ætate dicata
florentes & sanguine ac succis plenos
ob vitium in rebus non naturalibus
commixtum corripit, & rheumatismi
simplicis species est; hæc vero magis
hæreditaria, corpora imbecilliora in-
vadit, atque in sanguine & sero corru-
pto radices agit, difficulter etiam tolli-
tur, & sepius ad mortem usque durat.

§. II.

Quum nemo ideam, historiam, Historia
ac progressum podagræ melius & podagri
rectius SYDENHAMO, qui ipse ex Syd.
fuit podagricus, delineaverit; pla-
cat hoc loco ex ipso auctore bre-
viter & concinne eam exponere:
podagra exentiæ Januario, aut in-
cipiente Februario drepente & mul-
ta sere pressions antecedente in-
gruit, nisi quod venericulis crudel-
R itate

tate, aut aepesia ad septimanas aliquot ager laboraverit; corporis interim intumescensia quasi ventosa ex graviate, que in dies augetur, donec tandem detinet paroxysmus, quem paucis diebus praedit torpor & quasi flattum descensus per femorum carnes cum affectione ~~angustiæ~~, tum etiam pridie paroxysmi, appetitus voracior, non tamen naturalis. Sanus lecto somnoque committitur; hora vero secunda post medium noctem excitatur a dolore pollicem pedis ut plurimum occupante, quandoque vero calcaneum, suram aut talum: hic dolor eum refert, qui ossium digitorum dislocationem comitatur, cum sensu quasi aquæ tantum non frigidae partis affecte membranis affusa. Mox sequitur vigor cum horrore & febricitatione aliquali. Dolor autem hic primo remissor gradatim intenditur (pari passu rigor & horror redundunt) idque in singulis horis, donec tandem sub noctem ad apicem pervenerit, se ad varietatem oscularum tarsi & metatarsi, quorum ligamenta obsidet, perbellè accommodans; nunc tensionem violentam, vel ligamentorum istorum dilacerationem, nunc morsum canis rodentis, quandoque pressuram & coartationem exprimens. Ad hoc, ita vivum exquisitumque habet sensum pars affecta, ut nec linteorum superincumbentium pondus, nec cubituli a fortiori ambulatione concussionem ferre valeat: hinc mille conamina, situs tum ipsius corporis, tum membra affecti mutatione assidua, doloris sedationem incassum exabit; quæ tamen non contingit ante horam secundam tertiamve matutinam (decurso scilicet nycthemeri spatio a primo appulso paroxysmi;) quo tempore æger post materiae peccantis modicam digestionem & difflationem aliqualem, subito a dolore respirat. Jam leni madore perfusus somno cedit, a quo evigilans, dolore multum imminuto, partem affectam su-

more recenter occupatam cernit. Intrata paucos dies alter pes eodem dolore torquetur, easdemque excitat tragedias, nonnunquam etiam ambos pedes in initio occupat: postquam utrumque pedem exercuerit, qui sequuntur paroxysmi, abnormes sunt, tum etiam quoad durationem; hoc tamen ubique servat, quod dolor noctu recrudescat, mane vero remittatur; atque ex serie horum paroxysmorum constat paroxysmus, qui dicitur podagra, diuturnior breviorve pro ægri ætate, &c. quod in vegetoribus, & iis, quos podagra rarius invicit, diebus saepe quatuordecim fit; in senioribus, atque iis, quos saepius afficit, duobus mensibus; si vero, qui aliquot annis podagræ fuerunt, non prius valedicunt, quam ætas adultior eam fugaverit.

§. III.

Ad quatuordecim primos dies urina coloratior est, qua post separacionem sedimentum rubrum, & quasi arenulis resertum deponit; nec æger nisi tertiam potulentorum quæ assumit partem per vesicam reddit; alvus item ad dictos fere primos dies constipata est. Appetitus prostratio, rigor totius corporis sub vesperam, partium etiam non affectarum gravitas & molesta sensatio integrum paroxysmum comitantur. Recedentem paroxysmum excipit pedis affecti pruritus vix ferendus, maxime inter digitos, unde decidunt furfures, & pedes ipsi quasi ab epoto veneno desquamantur.

§. IV.

Atque hoc modo se habet podagra regularis, cum vero vel indebita medicatione turbetur, vel diuturnior invaserit jam per annos aliquot, phænomena sunt multum diversa a jam descriptis. Jam manus, carpos, eubitos, genua, aliasque regiones occupat; quandoque digitos distorquens, motu paulatim privans, tandemque concretiones, circa articulorum ligamenta, tophaceas generans, cretam vel

*Symptoma
morbis
post annos ali-
quot in
fectionis.*

vel oculos canctorum æmulantes ; nonnunquam in cubitis tumorem sub-album ciet, fere ad ovi magnitudinem, qui sensim inflammatur ; nonnunquam femur occupans, sensum exhibet quasi ingentis ponderis appensi, sine dolore tamen notabili ; ad genu exinde petens, id acrius urget, artus jam habet æger fere undequaque contractos & impeditos, ita ut claudicet, & permoleste prorepatur.

§. V.

*Descrip.
ptio ar-
thritidis.
ex Aure-
lianico.*

Ex veteribus omnium optime historiam arthritidis descripsit CÆL. AURELIANUS lib. 5. cap. 2. morborum chronicorum hunc in modum : sequitur autem passione articulari tentatos torpor, atque formicatio eorum articulorum qui tanguntur, & difficilis flexio, atque rursum extensio : item gravedo & vacandi dulcedo, & ad parum motum vehemens labor, atque dormientibus sensus quidam resonantium articulorum, & cum de somno surrexerint, veluti saltu earundem partium afficiuntur : tum horror, vel rigor, atque tremor sine ulla manifesta ratione partium sequuntur. Dehinc cum passio se extollere cœperit, in podagricis dolor alterius pedis, aut utrisque cum punctionibus nascitur, incipiens a uestigio aut planta cavitate, vel sèpius a majore digito, attestante torpore, & gravedine, & difficili motu, cum horrore rigido, atque inæquali per membra, & aliquando plurimo servore, aliquando frigore, ut alii refrigerantia, alii calida desiderent agrotantes, & proprieatæ quidam alteram calidam, alteram frigidam podagram putaverint nuncupandam. Item initio, ut sèpe contingit, similis color patientium atque sanarum, videtur partium, attestante æqualitate, nullo emergente tumore. Dehinc inflatio partium fit cum rubore. Quapropter relevatio altiorum sèpe sequitur. Tum pejorative passione arthritica sufficitur passio, cum in unum omnium cogitur.

articulorum consensus, & facile ex articulo in articulum venit dolor, nec desinens priusquam cunctos invaserit nodos. Sæpe denique prioris articuli dolore declinante secundus invaditur, atque eodem similiter mitescente tertius sumit exordium, consentiente etiam vesica, atque spine majoribus nervis, quos ténoris appellant : & in stomacho etiam nausea vel vomitu jactantur agrotantes. Tunc articuli tumentes inflantur, ac deinde durescunt, & solidati saxeam faciunt qualitatem : tunc etiam nigriores efficiuntur, atque contorti, ut in obliquos partes digitii vertantur, aut reflexi supinentur, aut vicini adfixi incumbant, & aliquando humore purulento vel mucilento collecto, aut viscoso generent poros, quos non transitus dicere poterimus : dehinc etiam lapides sufficient, qui quidem articulos solvant, & cutem distendant, atque erumpentes promineant, & chirurgia detrahantur : aut exilientes cyathis, cum ferramento tollantur, quod nos laureolum dicere poterimus, & rursum renascantur. Tum membra dolentium partium, cessante nutrimento, tenuata langescunt, & arida efficiuntur. Erunt præterea agrotantes parvis ex causis mobiles atque iracundi, siquidem motum vel actum non sine quærela accipiunt.

§. VI.

Podagræ igitur rationem forma. *Ratio
lema, si rectius investigare velimus, formalis
consistit ea ipsa in vehementi spalmo,
quo membranæ ac ligamenta nerveo-
tendinosa, quibus ossa in sedibus suis
collocata retinentur & firmantur,
violenter lancinantur, divelluntur,
distrahuntur sèpe ad rupturae usque
vel pali infixi sensationem, a fero vi-
tioso acri-salto, per minimas arterio-
las & exiles glandulas ligamentorum
copiosius advecto suscitatus, cum fe-
brili motione & partis affecte inflam-
matione conjunctus.*

§. VII.

Sympto- In hoc affectu atrocem spasticum
mata dolorem fibrillarumque & membrana-
Spasmo rum nervearum strictroram excipiunt
aque indicant varia phænomena, &
quæ hoc dolore correptis contingunt
symptomata: videlicet invadente do-
lore pori cutis in pede angustantur,
influxus sanguinis & refluxus debitus
impeditur, ludor ac transpiratio nunc
cohibetur, nunc augetur, membrum
rigore ac rubore cōcutitur, venæ dispa-
rent, & valde sensibilis in parte affecta
distensio & distractio percipitur, cohco-
mitante ęstu, rubore & subsequente tu-
more. Spasmus autem hic non tantum
in afflita parte incipit & subsistit,
sed ulterius serpit, inque consensum
trahit alias eximioque sensu præditas
internas partes, quæ simili spasmo
affectæ varia producunt symptomata.
Unde non ignota potest esse ratio,
quare frequens olcitatio, flatuum
descensus per femoris carnes, horri-
pilatio per dorsum ac lumbos, febri-
culosus pulsus, præcordiorum anxie-
tas, animi defectio, somni inquietu-
do, torpor atque vermiculatio articu-
lorum, ciborum inappetentia,
nausea, in suris quasi convulsio,
vomitus ubi imminet paroxysmus vel
jam præsens est, ægros infestet, quæ
omnia ex spasmodica constrictione &
inde resultante sanguinis motione
non possunt non originem suam
repetere.

§. VIII.

Idem- Hojus argumenti veritas, nin-
titur, rum quod arthritici & podagrī do-
loris essentia in spastica fibrillarum
nervearum contractione versetur,
ulterius exinde clarius demonstrari
potest, quod, quandocunque mate-
ria serosa acris arrodentis indolis e
partibus dolentibus perversa medica-
tione aut alia fontica causa ad nobis
liores internas partes nervosas repel-
litur, atroces in iisdem dolores &
spasmi excitentur. Ita in praxi fre-
quentibus & fere quotidianis constat
observationibus, a materia poda-

grica retrocedente, si ea fertur in
cranii membranas, gravem cepha-
lalgiam, in membranas dentium
atrocem odontalgiam, in tunica
ventriculi ejus spasmum, singultum,
vomitus seu cardialgiam, in pul-
monum tunicas nerveas tussim
convulsivam & asthma spasmodi-
cum, in membranas costarum pleu-
ritidem spuriam, in tunicas intesti-
norum gravissima tormina & co-
licum dolorem, denique in viis urin-
ariis & vesica ilchuriam & spas-
mum excitari.

§. IX.

Exposita sic indole podagræ, quæ
in spasmo dolorifico, omnium fer-
me symptomatum parente consistit,
executendum ulterius remanet, quæ-
nam hujus effectus causa, atque in
quibusnam partibus genesis mali
existat? Medicorum recentiores fer-
me omnes in hac sententia viden-
tur convenire, podagram morbum
esse metastaticum salinum, a colle-
ctione salis fluidi acris stimulantis
intra membranas ac ligamenta articu-
lorum productum. Cuius generis
autem ac ingenii illud sal sit, dis-
sentire videntur. Alii acidum, alii *non est*
dum *sat aci-*
sal tenue corrosivum biliosum, alii *bilosus*,
austerum & stypticum principium
incusant. Nos purum & sibi reli-
ctum acidum in animantium cor-
poribus vix reperiri existimantes,
tartareum illud esse asserimus, ita
tamen, ut acidum quoad figuram
suam scindentem spiculatam, haud
secus ac in tartaro prædominetur.
Interim tamen non negamus, pro
diversitate morbi atque ægrotantium
natura ac temperamento, & pro
causarum antecedentium diversa in-
dole, majori volatili acreidine bi-
liosa, vel fixiori, serum, quod sa-
lium morbosorum est vehiculum,
esse imbutum; unde etiam arthritus
variat, & volatilis & fixus esfur-
git dolor, magis vel minus ardore
atque inflammatione infensus.

§. X.

Quæ sentientia habilitatur.

§. X.
Multa autem sunt, quæ peccantem materiam tartaream subinde peccare evincunt. Erenim experientia compertum est, ad calculum dispositos ut plurimum evadere podagricos, & hos e contrario calculo tentari; ita ut affectus hi invicem sororientur, & unus in alterum facile abeat. Serum autem in dictis morbis tartarea sal sedine imbutum esse, nemo qui gnarus rerum medicarum est, ibit inficias. Accedit, quod in consummata podagra vel ischiatide ligamenta juncturarum erosa a sabulo tartareo ibi subsistente reperta in sectionibus fuerint. Quin imo tophacea materia, quæ intra articulos in senum, qui acido abundant, podagra, copiose quandoque reperitur atque eximitur, manifestissime naturam tartarei salis, quod ex acido & copiosa terra conflatum est, demonstrat. Ita KERKRINGIUS in spicileg. anor. obs. 28. sub examine chymico ex ejusmodi tophis sive materia podagrifica, elicuit spiritum quendam inter spiritum tartari & salis ammoniaci quodammodo medium, hoc nimirum acidiorem, illo vero mitiorem: & oleum, oleo tartari foetido colore, foetore & consistentia in omnibus simile: nec non sal ex capite mortuo quod extraxit, ab eodem sale tartari parum abludens, nisi quod sapore quodam extraeo infestus, ingratam quandam pariebat nauseam.

§. XI.

Sic observatum quoque fuit ab auctoriis, podagricorum excrements, nimirum sputum, urinam, sudorem collecta, prævia evaporatione, præbuisse materiae candescentis concretæ in tartari consistentiam insignem copiam. Vid. PECHLINUM obs. 25. & KERCKRINGIUM l.c. Notavi ego in Viro generoso, qui subinde podagra divexari solet, sequentia: hic paroxysmum imminentem præsentire solet maxime ex colore annuli, quem digito gerit, ex mercurio mediante venere actutia confecti, qui

Hoffm. System. T. IV. P. II.

aliquot dies ante paroxysmum & per totum morbi cursum livorem ac nigredinem contrahit, qui sponte tandem definit, priusno redeunte colore sub declinationis tempus. Id quod curiosum phænomenon mea sententia effluviis salino-sulphureis per transpirationem prodeuntibus adscribendum venit. Taceo materiam in articulis podagricorum collectam, & quandoque vesicatoriorum vel aliorum remediorum usi effluentem, summe corrosivam, ipso sensu teste, naturam præ se ferre. Confirmare iater alia præsentiam tartarei fluidi salis in podagrīcīs videtur nimia potatio vinarum tartareo talismodi succo scatentium, quæ podagram generare solent frequentissime; item nimia ciborum appetentia & voracitas, maxime ante tempus invasionis, quæ sine dubio lymphæ acidæ abundanti in salivali & gastrico fluido debetur.

§. XII.

Congreditur autem tartareum *Sal tartareum cum mucilagine glandularum congestum*: hoc sal cum mucilaginofo ac pingui, quo articuli & juncturæ omnes gaudent, rore ac glutine, quod secundum naturam insipidum, ossa, juncturas, ac cartilaginiæ laevigare & obducere solet. Notabile enim est, sub membranoso ligamento, quo articuli firmari solent extare tunicam mere glandulosam ac vesiculosam, quæ etiam synoviæ sedes est, in quam terminantur maxime in homine multæ vasorum sanguiferorum ramifications, hæcque tunica, propter laxitatem suam minime intervit ossium conjunctioni, sed mucilaginem certam instar ovi albuminis, licet non semper adeo claram & limpidam secernit. Præterea in majoribus articulis existant quoque corpora glandulosa pinguedine obsita, quæ similem mucilaginem a copiosis sanguineis vasculis ibi secernunt ad lubricandas juncturas ipsasque ab incalescentia & attritione conservandas, uti

copiose pariter ac solide id deduxit celebris Anglus CLOPTON HAVERS, in *Osteologia*. De hoc ipso glutine articulorum jam dudum divus HIPPOCRATES in libr. de locis in homine, sequentia pronunciavit: *Humidum nativum articulorum ubi male valet, male habent articuli; ubi bene, & ipsi articuli.*

§. XIII.

Exinde exangulū, quod crucia- tuum causa mediata est. Quotiescumque itaque serum sal- sum excrementium in sanguine su- perabundans descendit per glandula- rum poros nimis laxatos ad ipsos arti- culos, non modo coagulum mucilagi- nis efficit, quod difficilius postea resolvitur, vel etiam, si in copia adfuerit, in gypsum corpus tandem convertitur, verum & intra subtilissimi sensus membranas incarceratum propter angustissimas vias, minus commode propellitur, nec evaporat, sed detestabilis cruciatus in parte affec- ta suscit: cuius saepius tanta est sensibilitas, ut omnia quantumvis le- niter admota tegumenta vel medica- menta officiosamque manum vel e longinquo reformidet. Attentione dignum est, nihil magis mucilaginem articulorum destruere atque coa- gulare, quam acidum tartareum sal- lenius v. g. acetum vini, vel vinum rubellum album, neque tantam mutationem atque coagulationem ipsi inducere aliud potens, ut oleum vi- trioli &c. sicuti id variis experimentis clarissime demonstravit Clopton Ha- vers l. c. p. 258. evidenti scilicet documen- to, vina tartarea aptissima esse ad procurandos paroxysmos arthriticos, ubi tonus glandularum debilitas est, & patiens aliquam ad hunc af- fectum dispositionem habet.

§. XIV.

Quemadmodum vero in senibus neque minus in hypochondriacis & gracili- calculosa nephritis laborantibus po- da serum sulphureum, reびlioso calida temperaturae virili, ubi arthritis & podagra magis cali-

da vaga, dum ex una parte in al- teram transit, serum biliosis acri- bus sulphureis imo alcalinis onu- stum est. Sic Acta Erud. An. 1698. referunt, Medicum Anglum Col- batch serum podagricum miscuisse cum syrupo violarum, & semper colorem cœruleum in viridem mu- tatum observasse.

§. XV.

Deinceps quoque illud animadver- sione dignum est, quod nullus paroxysmus podagricus sine motu febrili sit, quem præcedens lassitudo corpo- ris inquieta, horripilatio, refrigera- tio extreborum, oscitatio, alvi ob- stipatio, pulsus citior, sitis, vigi- lia & subsequens aestus, ejusque circa noctem exacerbatio, urinæ in princi- pio tenues & aquosæ, spasmo vero re- mittente, crassæ cum sedimento, ne- que minus solutio doloris & spasmorum per sudorem copiosorem satis evidenter arguunt: cuius motus fe- brilis beneficio fit, ut excrementia serosæ salinæ peregrino charactere imbutæ lordes, ex parte per varii ge- neris in corpore nostro organico con- stituta colatoria & emunctoria foras salutariter eliminantur atque excer- nantur. Hic motus quoque auctior febrilis solidorum & fluidorum, qui non actu electivo, multo minus morali & rationali sit, genuina causa est saevorum dolorum ac spasmorum in partibus extremis, qui paroxysmis in podagra nunquam non associantur, dum videlicet ad nervosas & valde sensibilis texturæ articulorum membra- nas & ligamenta, quibus complures exiguae glandulae inharent, & quæ minus congrua sunt salium excremen- titiorum emunctoria, cum impetu impurus serosus sanguis advehitur & congeritur; ubi postea ichorosus ille latex præter naturæ ordinem separa- tus, stagnans & subsistens ejusmodi atroces naturæ humanæ plane infen- sos spasmos & dolores concitat; qui quo vehementiores sunt, eo plus fe- brilem aestum incidunt, atque sym- pto-

Paroxys-
mus pa-
dagri-
cus, fe-
bre si-
patu-

geomata exacerbant. Siquidem id probe tenendum est, duplarem in paroxysmis ejusmodi arthriticis & podagricis observari febrem, essentiam & symptomaticam, illa ad natum catarrhalis, vel in sanguineis ad synochæ simplicis genium accedit, cum qua paroxysmus incipit & progreditur, noctuque habet suas exacerbationes: altera vero symptomatica doloris acerbioris siboles est, & inflammationem insequitur.

§. XVI.

Ratio cur Quod autem humor vitiosus non intra omnes articulos & quidem mediante tunica ligamentorum glandulosa, sed dumtaxat certis in partibus separetur, ut videmus in chiragra, gonagra, podagra & affectione ichiatrica; id potissimum tono & robori destructo horum ligamentorum, quæ articulos firmant, adscribendum est. Quod vero ad pedes frequentius feratur ac descendat, hæc subesse ratio videtur, quod pedes frigori humido, quod valde eorum naturalem tonum ludit, plus quam alia partes expositi sint; deinceps quod a calceorum pressione ac strictura copiosi tubuli arteriosi & venosi minimi, per quos liberum humor redire & circulari debet, valde comprimantur: accedit, quod lentior & tardior per partes a fonte caloris corde nempe remotas, ob situm etiam perpendicularem, lymphæ ac humorum sit circulatio. Superest adhuc una ratio & quidem præcipua, scilicet quando pedes dolor affigit, cogimur quiescere, ne deterius fiat malum; quies autem ulterius nocet, dum humores ob motum cessantem, ibi magis tenentur sublister, & ita imbecillitas augetur: sic edocemur familiariter exemplo, quando pedem diu in uno situ tenemus, vermiculationis sensum oboriri. Vocanda huic quoque est in auxilium nativa pedum imbecillitas a parentibus podagricis contracta, quæ partim in spirituافتیا humorum deficiente, & inde resultante partium solidarum maxi-

me extremarum debilitate, vel in ipsa prava textura & conformatio, & pororum dispositione consistit. Idem obtinet in aliis artubus, quos occupare solet dictus dolor arthriticus.

§. XVII.

Unde vero tanta seri excrementitii *Copiosns* ex parte salsi & tartarei, ex parte *Seri im-* etiam acris biliosi colluvies, in ar-*puri pro-* thritidis & podagræ subjectis corpo-*ventus,* ribus ingeneretur, quæ proinde & motuum febrilium podagricorum & *ex debi-* acerbissimorum dolorum veram & *litate..* materialem causam constituit, vix aliam quam naturæ ægrotantium debilitatem, & vitium in usu rerum non naturalium commissum reperire & inculare licet. Per naturæ debilitatem vero nihil aliud intelligimus, quam talèm, a nativitate, solidorum, quæ fluida continent, movent, imo motibus vitalibus secretoriis, excretoriis præsunt, non satis validam & robustam conformatio, & strictroram a parentibus potissimum acceptam: hinc natura debiles & morbos parentes, ut sunt hypochondriaci, hæmorrhoidarii, podagrii, calculosi, aliisque anomaliis motibus obnoxii, etiam liberos in hos morbos proclives generant. Nam quando ipsos podagricos, qui diutius hoc morbo affecti sunt, spectamus ac consideramus, plerique sunt habitus minus fibrosi, spongiosi, tenerioris, qui nervos & tendines habent exiguos, copiosis & valde exilibus vasis donati, qui sanguine multo seroso, qui e vena emisis in oculos incurrit, abundant, & hinc etiam in primis annis narium hæmorrhagiis, & in provectiore aetate hæmorrhoidum fluxui sunt obnoxii & assueti, animi quoque sunt inconstantioris, mobilioris, ad omnis generis passiones vitalibus motibus nocivas proclives; que cuncta satis totius naturæ microcosmæ imbecillitatem arguant atque demonstrant. Accedunt postea satis insignes diætae atque in regimine vita aberrationes & vitia, quæ ita sunt:

comparata, ut non modo partium solidarum tonum, robur ac vim syphiliticam motricem plus debilitent ac labefactent, sed etiam multos crudos, intemperatos, naturæ & succis vitalibus, qui blandi esse debent, plane alienos humores invehant, & ob imminutum salutarium excretionum negotium plus justo in corpore retineant & accumulent.

§. XVIII.

Ad quam conseruit Venus immode rasa. Ex iis vero, quæ nervosis & motricibus partibus vires & robur subducunt, primum merito locum Venus immoderata obtinet. Nam semen, uti delibatissimæ & spirituosa lymphæ in sanguine soboles est, ita si intemperantius exhauditur, non potest aliter fieri, quin & partes fluidæ subtilitatem & blandam spirituascen-
tiam, solidæ vero vigorem & elate-
rem amittant, atque adeo omnes
functiones corporis non exiguum in-
de capiant detrimentum. Et hinc
potest etiam secundum scita Hippo-
ratis, ratio repeti: quare pueri,
quare mulieres & eunuchi non facile
podagram patiantur? Hinc quoque
poetis Bacchi & Veneris filia nuncupata est; unde antiqui versus:

*E solvilumba venere, solvilumba boque
Baccho, creata est solvilumba chiragra.*

Et Latini Poetæ canticum:

*Ut Venus enervat vires, sic copia vini,
Et tentat gressus debilitatque pedes.*

Notabile autem hoc est, quod arthritici ex abusu Veneris sèpius unice suam originem petat, & quod omnes arthritici & podagrici, propter sal illud tenerum stimulans in lympha & sanguine contentum, ad Venerem præ aliis magis sint proclives, adeoque magis magisque enervando vires, malum contumacius reddant.

§. XIX.

*Wini pos-
zus lati-
gier.* Præterea spiritus, corporis nostri motores, non parum invertit, & nervis

debilitatem addit vini & maxime generosi vel etiam tartarei acidi largior potus, utpote partes vini sulphureæ nimis celeriter per venas rapiuntur ad caput, subeuntque poros nervorum, & spiritibus se se afficiant, quorum crastin ob cruditatem & heterogeneam indolem suam valde invertunt, ut manuere suo in regendis machinæ artibus defungi minus recte queant. Experientia multiplici deprehensum est, nihil plus ad tartaream illam, aut quomodo cumque appellare libet, materiam podagrericam & arthriticam generandam aptum esse quam vinum; quæ etiæ in corporibus quibusdam sequestretur, tamen in illis, quæ viscerum debilitate laborant, servator atque in sanguine accumulator.

§. XX.

Datur tamen vinorum magna di-
versitas. Quæ enim in arenosis terris
proveniunt, minus materia ejusmodi
tartareæ continent. Dixit WEPFE-
RUS Dec. I. An. 2. cap. 39. raros apud
Schaffhausenos esse podagricos & calcu-
losos, neque convulsivos motus frequē-
tes, & potissimum id fieri a vino rubello
salubri. Sic etiam memini Jenæ,
quamvis ab incolis ejus loci satis libe-
raliter bibantur vina vernacula, non
tamen multos esse podagricos. Contra
observatum fuit, quæ in terra pingui
argillosa & limosa proveniunt, ad fo-
vendam podagram esse paratissima;
cujus generis sunt Bohemica, Hunga-
rica, Austria, &c. Neque obstat, vina
magnam quantitatem tartari terre-
stris, qui sèpius vias urinarias magis
detergit, possidere, ut in podagra
progignenda minoris efficaciam sint
aliis, quæ talem quantitatem non cō-
pleteantur, sed forsitan subtiliori ac
penetrantiori acido, quod cum succis
vitalibus facillimam init copulam, in-
structa sunt. Sic vini Tockavensis lib.
4, destillatæ vix drachmam dimidiam;
totidem autem libræ Rhenani drach-
mas minimum 5. largiuntur. Multo
magis autem talia vina nocent, si ad
ebrietatem usque ingurgitantur, quo-
spiritus.

spirituum vigor naturalis magis extinguitur, & lympha tenuis inspissatur, ut deinde viscerum tono debilitato minus commode illa, quæ in vinis nociva atque perniciosa sunt, excludi queant,

§. XXI.

Affectus animi. Sicut affectuum intemperantia in excitandis, & fovendis morbis plurimum valet: ita id maxime in chronicis affectibus, inter quos podagra primas tenet, animadvertisimus, & quidem hanc potissimum ob rationem, quod diuturnior tristitia ac imique angor, intensior cura ac sollicitudo, profundior quoque, & haud interrupta meditatio, necessarias corporis vires suffurando & vitales humorum motus, neque minus secretorios & excretorios imminuendo, exsuperans pabulum atque materiam, impuritates videlicet varii generis salino-sulphureas, ad genesis hujus affectus subministrent. Ita vehementior quoque animi commotio, & ira ipsos arthriticos paroxysmos desubito s̄aþe cum febrili quodam motu excitat.

§. XXII.

Luxuria et desidia. Ulterius, luxuria, nimia voracitas, continuæ comedationes, cum vita sedentaria otiosa & desidia si conjunguntur, neque minus exercitorum intermissione & ex mobiliore vite genere quietum & motus expers, & podagræ & aliis pertinacioribus morbis ingenerandis mirifice velificantur. Nihil enim magis, præterquam nimia ingestorum copia cum desidia, magnum illud excretionum, sine quibus sanitas consistere nequit, negotium suppressendo, ad impurorum humorum redundantiam, a quibus deinceps dolores, febrilesque motiones proveniunt, corpori ingenerandam conferre, attenta consideratioue discimus.

§. XXIII.

Et quoniam sufficienti, per jugera

transpirationem facta, sordium valde activæ indolis aquolo-salinarum halituosarum expulsione, corpus ab innu-
meris morbos afflictionibus, nec non
a paroxysmis & recidivis immune redi-
ditur: ita etiam in rebelli isto podagri-
co affectu, qui in corporibus graciliori-
bus minus densi & obesi habitus, perspi-
rabilibus, paulo rarius sedem fixiorem
tenet, neque in hominibus opificibus,
& qui labore & motu corpus continuo
exercant, facile gignitur, id ipsum ob-
servamus. Quare etiam æstivo tempore
arthritici & podagrici paroxysmi filere
& conquiescere solent; cum, e contra-
rio, qui densi & pinguioris habitus sunt
literati & laboribus corporis & manuū
vacantes, crebrius & diutius hoc affectu
exerceantur, qui præsertim autumnali
humido & frigido aere, subita tempe-
statum mutatione ingruere, & tragœ-
diam ludere solet: quin imo sudoris
confueti intermissionem, notabilisque
transpirationis, quæ ex indubitis inspe-
ctis cognoscitur, atque excrementorum
inter pedis digitos defectionem, immi-
nentem designare paroxysmum s̄aþe a
nobis observatum est.

§. XXIV.

Inter antecedentes doloris podagrī causas, non exiguum locum fluxum sanguinis consuetorum, hæmorrhoidū, & mensium intermissione vel interceptio-
tueri videtur: siquidem & firma expe-
rientialia & unanimi veterum consensu,
& auctoritate confirmatum habemus,
fœminas, quamdiu menses rite fluunt,
& viros, in quibus consuetus hæmor-
rhoidum fluxus rite, ratione modi,
quantitatis & temporis se habet, a mo-
lestissimis hisce affectionibus immunes:
degere, imo hos fluxus doloribus illis
supervenientes, corpora ab iis præse-
vare, ex adverso vero, si solennes ha-
morrhagica vacuationes, vel ex vacil-
lante naturæ robore, aut ex perversa
diæta, vel importuna, & imprudenti
medicatione resistant, deficiunt, vel
supprimuntur, atroces dolorificas hæ-
morrhagias.

passiones generari, imo recrudescere & ingravescere observatione identidem firma & stabili constat: ut itaque ex hisce observatis clarissime elucescat, quantum ad depurandum sanguinem & ad morbos ex seri, vitiosi colluvie succrescentes impediendos, haec solennes licet præter naturam contingentes sanguinis excretiones valeant. Ex quibus tamen neutquam id consequitur, ut nonnullorum nostri avi medicorum & theoreticum & practicum dogma fert, tantum a fluxu haemorrhoidal, ejus defectu & frustaneis ad eum excitandum naturæ moliminibus, originem hujus truculenti affectus arcessendam esse, & totum curationis opus ad illum provocandum collineare debere: cum hujus hypotheseos patroni, plethoram pro causa proxima materiali potissimum habeant, ut ei inter remotas locum concedamus. Nos vero vitiosam seri dyscrasiam atque impuritatem potius ad excitandum hunc affectum maximum momentum afferre arbitramur, cum nota nobis sint exempla, sub ipso paroxysmo podagrico, calculoso & arthritico, haemorrhoides fluxisse: id quod inter alios, celeberrimi nominis medicus B. DOLÆUS, crebro per litteras apud nos conquestus est.

§. XXV.

Ratione morbi eventus, quoad prognostica haec observations rarius fallunt. Podagra non facile e medio tollit hominem, nisi humor vitiosus, ob magnam virium expultricium imbecillitatem, ad summum corporis corticem propelli nequeat, sed intus retineatur: vel ab errore medentis aut ægrotantis ad interiora repellatur, quod HIPPOCRATES *l. de affect.* affirmit: & tunc gravibus supervenientibus morbis, ut sunt lethargus, hemiplexia, apoplexia, asthma convulsivum, & suffocativus catarrhus, peripneumonia, hydrops, inflammatio ventriculi & intestinorum, Juniores podagræ extinguntur.

§. XXVI.

Quemadmodum, quibus congenitæ diu vivunt, & hæreditaria est arthritis & podagra,

& qui ex pravo vitæ genere primis in eam annis incident, rarius diu vivunt: ita iis, qui demum provectioni ætate atque in senectute, dolore corripuntur podagrico, longevitatem promittit; ^{Seniores contra longius.} dum arthriticis & podagricis paroxysmis re vera criticis, humores excretentibus, impuri, senectuti familiares, corporeque infensi, hac ratione expurgantur.

§. XXVII.

Podagra incipiens, præsertim si rheumatismi sanguinei species est, moderata & convenienti diæta congruisque remediis, sanguinis præsertim missionibus opportune institutis, facile præcveri & tolli potest: ubi vero jam multities & singulis fere annis paroxysmus recurrit, & quos affligit, in articulis topis habent, sicca alvo vexantur & senes sunt, *ii. testante HIPPOCRATE l. 2. prorhet.* nulla humana arte sanari possunt: hanc potissimum ob rationem, quia virium non tam in fluidis, sed in solidis, eorum tono, labore, textura & conformatio naturali destruncta, quod non facile tollitur, consistit. Hinc vetus dictum enatum: *solvere nodosam nescit medicina podagrum.* Optime vero HIPPOCRATES *l. c. ratiocinatur: juvenes nondum callos habentes curari possunt, si accurate vivant laborisque sint amantes, alvumque bonam & aper- tam habeant.*

Cura præservatoria:.

§. I.

Quamvis valde difficultis eorum morborum, qui congeniti sunt, quorum causa in labe tam fluidarum quam solidarum partium consistit, & quæ a prava vita & diæta ratione foventur, ac inhabitum quasi degenerarunt, sit curatio; attamen facilior longe, & expeditior est eos præservandi, præcavendi, & avertendi via ac methodus. Quam cum medicus omnino & recte cognoscere & prudenter applicare debeat; nobis eam hic exponere est propositum: ut poterit.

quæ potissimum in causis hujus morbi, remotioribus diuis, declinandis & removendis consistit.

§. II.

Fugient. Primo omnium, qui vult degere im-
muni a pertinaci tam podagrico quam articuli affectu, temperet sibi, quan-
tum possibile est, ab uso Veneris maxi-
me immoderatae, quam corporis lan-
guor & dolor subsequitur: subito nam-
que exhaustus subtiliores spiritus, caput
debilitat, mentem ac sensus iofirmat
atque convellit. Dein ebrietatem, co-
piosam vini potationem, & liquorum
inebriantium ingurgitationem omni-
cura & studio fugiat: quippe hoc pacto
multos ab arthritide liberatos novi-
mus. *TRINCAVELLIUS de ratione
cur. particul. hum. corp. affect. lib. 12. c. 17.*

tradit, se novisse medicum Venetiis, qui, cum non parum infestaretur a podagra & ad senium usque, & solum pri-
mum atque in quinquenium vinum interdixisset, liber tandem ab omnibus molestis ita evaserit, ut amplius usque ad ultimum senium imo ad mortem horum dolorum fieret expers. Id quod *CELSUS lib. 4. c. 24.* egregie confirmat, perhibens: quidam cum toto anno a vi-
no, mulso, Venere se temperassent, securi-
tatem totius vite consecuti sunt. Et *SOLENANDER S. V. cons. I.* refert, vi-
duam quandam Hispamicam, cum usum vini, quo tamen pro more gentis pau-
cissimo & dilutissimo usa fuerat, omis-
sisset, podagra amplius non fuisse ten-
tatam. Quin imo plures talis modi his-
toriae notissimæ sunt eorum, qui, vel in carcerem conjecti, vel ad paupertatem redacti, cum a vino abstinerint, ab ar-
thritide & podagra liberati sunt. Hinc præstat ad præscindendum gravissimum morbum, aquam puram & levem quam vinum bibere. Ex hydroporis enim ne-
mo facile est, qui hanc in morbum pro-
labitur: quorum exempla apud *BRUYERIUM de re cibaria l. 16. c. 13.* *SCHENCKIUM, HERM. von Heyden, de podagra, & PECHLINUM le-*
gi atque evolvi possunt.

§. III.

At vero quamvis nonnullis podagri-
cis vinum admodum sit infensum, ne-
gandum tamen non est, dari casus, ubi
ventriculi quedam & intestinorum im-
becillitas a frigido humore, ut cum ve-
teribus loquar, orta est, in quibus ad vi-
trum refectionem admitti illud debet,
maxime si diluatur cum aqua, & vetus
excoctum optimè notæ assumatur:
quod eo magis locum invenit, si in
consuetudinem abiit vini potatio, nec
ad ejus usum ægrotans protinus sen-
tit incommode: de qua re conferri
meretur *PECHLINUS obs. 37.*

IV.

Porro qui vitam a podagra liberam
ducere, vel ejus dolores lenire atque
mitigare intendunt, temperent sibi a
multo cibo tam in paroxysmo, quam
extra morbi accessum. Vere scribit
*HIPPONCRATES: præcipuum sanitatis
studium est, non satiari cibis, & impri-
grum esse ad laborem.* Sique profecto
quid est, quod vitam servare potest a
morbis diuturnis immunem, tempe-
rantia in vietū est; hac enim alacritas &
ingenio & corpori accedit. Consistit
autem hæc temperantia in eo, ut vel
bis de die parum cibi assumamus, nec
plenarie appetitum satiemus, & tamen
intermittamus: id quod podagrīcī mi-
rifice commendat *TACKIUS p. 97.*
item *SYDENHAMUS p. 579.* qui
prandium saltim commendat; humorib-
us digerendis cum lectus solum sit di-
catus. Præcipue autem in paroxysmis a
cibo abstinentū est. Nam ejus accessio,
iuso *HIPPONCRATE* teste, damno est:
*Eo enim tempore inquit, refluxi sunt hu-
mores ad centrum corporis, unde oppri-
mitur anxiam; evadit respiratio. Galic-
na regio ab impuris succis occurritur. Si
cibum tunc dederis in impuritatē ille
abit, ac distento hypochondrio opprimitur
pectus, unde anxia respiratio & calor cor-
dis major.*

§. V.

Facile hinc appetit ratio, quare ege-
ni raro sint podagrīci, magis autem o-
pulentī, voluptuosī, & qui per multas
horas mensis accumbunt, utriculi in-
dagrīci.

star

et ab abdomen distendentes. De opulento quodam Germano SCHENCKIUS apud Casp. de Reies Camp. elys. juc. qu. tradit, quod hic, cum orio, deliciis, luxu- que circumflueret, familiarem huic vita-^r podagrum arthritidemque adeo mi- serabilem contraxerit, ut nonnisi duobus suffultus adjutusque famulis promoveri loco potuisset: verum lapsis sensim rebus ad paupertatem redactus tantam, ut & opibus destitueretur & simulis, necnisi frugalis mensa ad vitā suppetaret; hoc fretus & poculatim ipse solus incesserit, & a podagra prorsus desertus fuerit. Non incommodē hinc PETRARCHA: Si a podagra, inquit, liberari cupis, aut pauper sis oportet, aut ut pauper vivas. Multos ab hac ægritudine liberasse traditur paupertas, vera defecatrix corporum: quodam vero su- galitas, quam voluntariam seu fictam O' imaginariam paupertatem dixerim. Vidisti aliquos perpetua vini abstinen- tia curatos: ita fit, dolore dolor, clavus clavo pellitur, ut antiquo dicitur pro- verbio. Specialiorem autem paulo die- tam podagricis commendat atque præ- scribit GALENUS lib. 6. de sanit. tuen- da, his quidem verbis: intemperantes in podagrum & alios diutinos morbos in- cidunt, a quibus tota vita se explicare nequeunt. Cavendum ab edulis ex pa- sta, ab acidis fructibus, cepis, allio, salsis, lardo, carne suilla. Cæterum Vinum Mosellanum aut Neccarinum aqua de- stillata dilutum bibendum. Alvus solli- citanda passulis, prunis Damascenis. A carnis quoque annosis & pinguibus abstinentur. Parari debet vestimentum pellibus agninis consutum.

§. VI.

*Cure & medita-
tiones fugien-
de.* Postremo, qui a cruciatibus podagri- cis & articularibus immunes degere cu- piunt, temperare sibi debent ab omni- bus gravioribus curis, animi laboribus, meditationibus & perturbationibus. Hæc enim elogio Sydenhami ad dissol- vendam spirituum, qui sunt digestione instrumenta, sysfasin, ac proinde ad po- dagrae incrementum multum faciunt. Resert PORPHYRIUS in vita Plotini

quendam Regulum, quum captus esset pedibus, sese ab omnibus curis abnegas- se, & a podagra fuisse liberatum. Tanti, inquiens, in hoc morbo vincendo, ani- mum quietum habere! Ceterum com- mendandus est podagricis labor ac mo- ^{Motus 1} ritus, qui firmitudinem & robur partibus insti- tuens, transpirationem promovet, cruditates dissipat, ad totius corporis habitus immutationem aptissimus, at- que optimum sanguinis depuratorium est, dum omnis generis excretiones promovendo, ab ejus naturali tempera- ta crasi sive temperie alienas, impuras salino-sulphureas partes per congrua e- munctoria separat. Elegantissime scri- bit HIPPOCRATES lib. prorhet. n. 162 curari podagricos posse juvenes, in qui- bus nondum sunt facti calli, qui labo- rem amant, qui vivunt accurate, & quorum alvus fluida est. Exercitium au- tem hoc non nimis sit vehemens, sed moderatum, quale est vectio in curru, ambulatio, scalariumq; repetita ascensio.

§. VII.

Celeberrimus, & maxime circum- spectus trium Imperatorum Archiatere ^{Cous- lium Crato.} JOH. CRATO conf. 14. tent. 1. hoc pro Crato. præservatione podagræ consilium sup- peditavit, dignum quod huic tractatio- ni inferamus: Primo monendi sunt po- dagrici, ne ullo modo corpus medicamen- tis affligant; sed recta viclus ratione & mediocri diligentia articulorum dolores vitari posse sibi persuadeant. Abstineant a vinis Moravicis, Austriacis, Hungari- cis, dulcibus & crassis: utantur cerevisia triticea. Ventriculi robur medicamentis purgantibus non debilitetur. Nostris pi- lulis uti possunt hora dimidia ante co- nam, que sit parcius, singulis septima- nis, dosin, que est scrupulus, capientes. Singulis diebus matutine de nostro sto- machali sumat. In lecto matutine sudet quotiescumque poterit: nam quo frequen- tius hoc fecerit, eo tutiorem se esse puta- bit. Mundare pedes oportet cum spongia intincta vino rubro, in quo sal sit deco- ctum. Topicis minus potius quam ni- um est faciendum. Aer frigidus & humidus vitandus est.

§. VIII.

§. VIII.

Quibus hī affe-
tūs hē-
chronic
funt, cu-
ratorē
diem
servan-
to.
Præservatoria hæc cura uti universa-
lis fere est, & ab omnibus ac singulis, qui
munes esse volunt, servanda: ita potissi-
mum quadrat, & necessaria admodum
est, in affectionibus tam arthriticis quam
podagrīcīs, quando a parentibus liberi
seminium quoddam multiplicativeum
ipsiis vitalibus humoribus altius insi-
nuatum, & quod inter pueritiae vel ado-
lescentiae annos jam tum sese exerere
incipit, acceperunt; quo in prima quasi
herba suffocetur. Atque etiam hæc ipsa
cura diætetica ad eos spectat, quos jam
per plures annos hoc malum & chronicum,
& quasi habituale factum exer-
cuit: eo fine & scopo, ut minimum do-
lores ac symptomata leviora & mitio-
ra inde reddantur, breviores quoque
fiant paroxysmi, & roborata sic quo-
dammodo natura deteriores & exitia-
les affectus, qui excipere nunquam non
solent podagram pertinacem & chronicam,
corporis vires valde infringentes arceantur.

*De Cura specialiori Podagricorum
Medica.*

§. I.

Podagra Optandum quidem serio, & vehe-
radicata menter esset, ut tam efficacia in rerum
non por- natura extarent remedia, que huic dif-
est ex- ficiillimo morbo, ubi longo tempore in
stirpari succis vitalibus & nervosis partibus ra-
dices egit, extirpando sufficerent: sed
quoniam talia nondum per experien-
tiā cognita atque comprobata sunt;
eo tantummodo laborandum est, ut
non modo diæta præscripta servetur,
sed & alijs remedij languenti corpori
succurratur, quo recursus hujus mali, si
non prossus tolli possit, pauciores ra-
men & breviores evadant, levioribusq;
symptomatis stipati incedant paro-
xyymi. Et cum ordinario fere periodico-
rum dolorum, sive febris potius rheu-
matico - podagrīcæ incursum fieri solcat

tempore vernali, item ante & post sol-
sticium hibernum, opus est, ut antea
congruis evacuationibus, alterantibus,
& massam sanguinis depurantibus, vi-
tiosos humores doloribus istis podagri-
cīs pabulum administrantes, quo post
eo felicius paroxysmus sustineri possit,
& corrigamus & eliminemus.

§. II.

Ad hunc scopum, ex voto obtinen-
duin, ego sanguinis missionem decenti
tempore & quidem ante equinoctium
vernū, ubi maiora sanguinis & seri sin-
gulari quodam interno ebullitionis qua-
si motu agitatur, & sic heterogeneæ par-
tes, quæ in eorum profundiori ac inti-
miori nexo testa & involuta heserunt,
extrorsum vertuntur, unde omnis ge-
neris febres exanthematicæ, catarrha-
les, rheumatico-arthritis originem
suam mutuantur, celebratam magni
admodum facere soleo: id quod optime
succedit, ubi corpora non adeo firma
fuerint, quæ bene appetunt, vita seden-
tarix indulgent, laetaque diæta utun-
tur. Longe vero magis necessaria est
venæscilio in iis, qui ob laxiorem mul-
titis exilibus vasculis donatum corporis
habitum multum sanguinis & seri in-
generant, & ad hæmorrhagicas excre-
tiones proclives sunt, præcipue si hæ re-
sistent vel parciores evadant. Et quo-
niam ante, & post solsticium brumale
mense Decemb. Jan. Febr. plerumq; in-
solescunt & ingravescunt podagrīci do-
lores, ego in fine Octob. si res postulaver-
it & plenitudo vasorum evidens fuerit
sanguinis missionē suadere solitus sum.

§. III.

Deinceps non possum non ego hoc
loco candide fateri, quod a cucurbita
eum scarificatione dorso pedis, singulis
trimestribus apposita, insignissimum al-
levamentum in pluribus, atque etiam
in me ipso, qui non immensus fui ab eju-
smodi insultibus podagrīcīs, licet obtu-
soribus, & non diu persistentibus, ex-
perg.

pertus fuerim. Rationem si quis hujus effectus exposcere velit, haec satisfacere posse videtur: quod in nulla fere corporis parte, difficilior sanguinis circulus ex arteriis in venas, quam in extremitate pede, ejus praesertim digitis procedat; nulla etiam pars sit, quæ tanta copia musculorum, tendinum, membranarum, & ligamentorum tendineo, nervorum, vasorum etiam sanguineorum instruta sit, ac extremitati ipsius pedis compages. Quando cunque itaque haec partes, ab ipsa nativitate, imbecillitatis quodam vitio laborant; non mirum est sanguinis circulum, siue itum a creditum in illis ipsis admodum esse segnem, tardum & impeditum, praesertim quando ille copiosior sero, excrementitiis salinis partibus referto scatet, & tempore paroxysmi, qui semper febrili motione fit & incipit, majori copia ad has partes appellitur; unde non possunt non humores stagnare, & vasa nimium distendendo eorumque nervosas membranas divellendo, dolores cum inflammacione licet leviori producere. Atqui hinc utilissimum omnino est, ut sanguinem superfluum & stagnantes per has partes valde ad circuitum difficulter & evita extrahamus; & sic ejus liberiorem progressum promoveamus.

§. IV.

Vomito. Quoniam paroxysmorum, & rheumatico-arthritis, & podagricorum evidens & materialis causa, in serie excrementii abundantia & colluvie consistit, atque huic ingenerandæ vitiata prima in regione alimentorum digestio & eruditum proventus multum velificatur, complures non minus periti ac erudit. Medicorum singulis mensibus vomitum excitandum commendarunt, ut ventriculi, & duodeni cavitas, & qui huc pertingant ex hepate & pancreate canales a sentina crudorum, & vitiosorum humorum expurgentur: vid. HILDANUS cent. 6. obs. 34. MERCATUS de morbis intern. l. 4. c. 18. RIVERIUS in Praxi. 6. SYLVIUS in Pr. pag. 153. Alii vero pro cura vernali vel autunali, ad primam regionem, & totum

corpus a sordibus probe expurgandum, infusa ex variis laxantibus, roborantibus & aperientibus concinnata usurpanda suadent.

§. V.

Ego, ut fideliter & candide pro more ^{Thermæ} ^{Caroline} medicam, non certius, non efficacius, ^{omnia} & magis genuinum in ejusmodi affecti remedibus & avertendis & minuendis, vel, si superat, medicina inopportuna turbatis motibus intro inversa vitiosa materia fuerit, in ordinem redigendis, quam in usu thermarum & quidem Carolinarum inveni remedium, quarum virtus, & energia, in calculo, podagra in veterata, & in hac, si fuerit ad interiora repressa, ad partes exteriores revocanda, heorrhoidum quoque fluxum, si causam & occasionem malo suggesterit, restituendum, incomparabilis est. Cujus veritatis permulta, imo millia exempla, adducere integrum esset, ut adeo, qui eam vel in dubium vocare, vel plane negare gestiunt, aut improbitatis, aut infidicis lese ipsos accusent. Nam haec aquæ in larga latitudine quantitate potatae, ob spiritu osum quo polent elementum, & ob salia mineralis prosapiae, quæ in sinu fovent, tenues non modo & fluxiles reddunt humores, atque obstructa & infarta minima vasa aperiunt, sed & per omnia, quæ evehendis a corpore alienis & morbi dis humoribus dictata sunt, excretoria, per hepaticos ductus videlicet, per alvum, per subcutaneum emunctorium, per vias urinarias, per mucum bronchiorum & narium, copiosissime & si ulla virium jactura per multis continuos dies materiam peccantem edificant. Hinc certe universalis morborum chronicorum præservatorii & curatorii nomen, si non altiores malum egerit radices, jure sibi vindicare possunt: si quidem ego, qui has salutiferas aquas viginti circiter vicibus frequentavi, sancte affirmare possum, quod non per artem existat vel inveniri possit tale remedium aut medicina, quæ huic, quam benignissimi, qui curam etiam corporis nostri.

nostris habet & semper habuit Creato-
ris beneficio pientissimo animo acce-
ptam referre debetius, & equiparari pos-
sit. Atqui id etiam obseruavimus, quod
si sub ipsa cura irruat hic affectus, lon-
ge mitior, brevior & placidior semper
procedat & finiatur. Neque etiam aliis
mineralibus fontibus thermalibus, &
quas acidulas salutare vulgo consue-
scunt, modo pro differentia corporum
& naturarum recte & cum debito regi-
mine & convenienti methodo prescri-
bantur, usurpentur, commendentur,
laudes & energias suas detrahere volu-
mus, cum passim etiam indubia adint
faustissimi effectus in ejusmodi radica-
tis & chronicis morbis exempla. Possunt
vero temperatores aquæ minerales, ad
quas pertinent Wildungenses, Seltera-
nes, Vetera quenches in Silesia, loco potus,
si tertia admisceatur vini pars, per to-
tum anni decursum in usum duci.

§. VI.

*Quibus non in-
seiores potus a-
iii tem-
peran-
tes.*

Postremo quoque potibus diluenti-
bus, acrimoniam salsam temperantibus
& demulcentibus, leniterque evacuantis
tibus, ut sunt lac, serum lactis, summan-
tum præservandi, tum curandi scopo
adhibitis, virtutem adscribimus, quippe
eam exeruisse multiplici experientia
comprobatum est. Id autem remedii
genus, in eodem morbo antiquissimos
jamjam maximi fecisse, HIPPOCRA-
TES & CELSUS loquuntur. Ille e-
näm passim speciatim in lib. de affec., in
difficillimis podagrīs & articulatio-
num doloribus, lac asinīnum commen-
dat. Hic vero lib. 4. cap. 24. ita scribit:
*quidam cum asinino lacte poto ex toto se
eluiscent, in perpetuum hoc mālo evase-
runt.* Præterea quoque PLINIUS, sunt
inter exempla, inquit, qui lac asinīnum
bibendo liberati sunt podagra, chiragra-
que. Novimus nos non paucos lactis bu-
buli per aliquot annos usu, item aquæ
pluvialis pro potu ordinario, per plures
a doloribus podagrīs annos immunes
vixisse. De cura vero lactea prudenter
instituenda, infra in cautelis & monitis
plura subjiciemus.

Porro, ad methodum tam præserva-
toriam quam curatoriam, nihil securius, *Disphe-*
nihil accommodatus regimine dia- *verica*
phoretico, salutari consilio procurato, *Iauden-*
inveniri potest. Nam si verum, uti est
verissimum, quod sanguis serofus im-
purior, qualis maxime ex transpiratio-
ne prohibita redditur, causa antecedens
& materialis paroxysmorum podagri-
corum sit; ipsa certe senior dictat ratio-
ne, quæ experienti confirmatur, atro-
cem hunc morbum, quam optime, &
tutissime, facta liberori transpiratione,
vel ea quæ secundum naturam fit resti-
tuta, esse remedium omnibus aliis su-
perius. Et quoniam hac de re insignissi-
mus & notabilis admodum locus in
CAROLI PISONIS utilissimis obser-
vationibus: de morbis a serosa colluvie
orundis Seçt. 5. cap. 2. extat; opera pre-
sumus nos duximus eundem nostræ tra-
stationi subiecte. Verba autem lau-
dati elegantioris Auctoris hæc sunt.
Denique quod spectat ad vacuatio-
nem seri per cutim eamque sensibi-
lem, hanc plurimi facio, ut debeo,
quia & revulsione vim habet, & ma-
xime est opportuna in his affectibus,
quippe quæ naturæ convenientissi-
ma, cum ea seri portio, quæ per cu-
tem insensibiliter ex naturæ institu-
to continenter quotidie exspirare de-
bet, suppressa quacunque ratione, &
introrum depulsa materiam præstet
arthriticis doloribus, ut ante hac de-
monstratum. Quamobrem consulo,
ut Illustris Presol sudorem quotidie,
si fieri potest, aliqua arte promoveat,
aut certe insensibilem expira ionē;
quod ut consequatur, in primis den-
sitat cutis, quam infert inclemensia
aeris, præserit hyberno tempore
consulere debet, nam quæ a poly-
sarcia aut ætate densitas intertetur, de
ea nulla providentia haberi potest.
Ergo accurate videat, ut bene tectus
incendat semper, & de nocte potissi-
mum stragulis levibus quidem, sed
calidis, pluma videlicet aut pelle an-
tar.

, farts desuper subterque stratis oper-
 , tus dormiat, & ita opertus ut sponte
 , sudor, sub diluculum erumpat: quod
 , eveniet, si non ita de mane expergi-
 , scatur, sed aliquantis per quietem in
 , lecto longiore capessat; & sudor
 , nihilominus non erumpat, is multa
 , longaque provocet universi cor-
 , poris frictione. Quod si eo frustre-
 , tur, aut hisce modis eum provocare
 , tedium illi est, suadeo certe, ut
 , semel in hebdomade hypocaustum
 , jejonus adeat, ibique per horulam
 , sudet, quod primum tentabit, ubi
 , plethora corporis venefictione prius
 , providerit, ut avertat cutaneos affe-
 , ctus, qui ab insolito hypocauti usu
 , sponte emanare solent. Atqui si his
 , artibus sudor erumpens minus e-
 , mendandæ colluvie seri in corporis
 , habitu stagnantis satisfacere potest,
 , certe auctor sum, ut ineunte vere &
 , autumno, quibus anni temporibus
 , fluxiones repeterè solent, utatur de-
 , cocto fudorifico sive sarcæperilla si-
 , veradicis Sinarum, idque per unam
 , aut alteram septimanam, vel certe
 , syrupo Ambrosiano, si metus sit a vi-
 , ferum & sanguinis æstu.

CURATIO IPSO IN PAROXYSMO.

S. I.

Immi-
nente
paroxys-
mo, al-
vus sub-
ducenda.

Ego imminentे paroxysmo, qui ex lassitudine insolita & inquieta, appetitu aducto & gravitate capitis & artuum cognoscitur, primam regionem ante omnia leniter a fôrdibus alvinis, neque minus a collectis in duodeno & reliquo intestinorum canali vitiis humoribus deplendam, & expurgandam suadere soleo: id quod tutissime tum per clystères emollientes & temperate carmina. tivos, tum interne per infusa rhabarbara & mannata, cremore tartari exaltata, perfici potest. Menini, me olim statim sub initio doloris podagrici & arthritici, insigni sepe cum fructu usum

fuisse sequenti mixtura: rec. aquæ flor. rum acacia uncias duas, cinnamomi si- ne vino unciam dimidiam, pulveris Cornachini drachmam, syrupi rosarum laxativi, vel cichorei cum rhabarbaro unciam semis. Nam instar aphorismi practici medicorum juniores teneant hoc: mitiores semper dolores evadere, in quoconque etiam loco consistant, si prima regio prius fôrdibus suis, ante usum aliorum medicamentorum, probe fuerit expurgata; quæ alias migrando in sanguinem, inque partes affectas penetrando, & dolores intensiores redundunt, & graviora symptomata producunt. Arque in eo quoque laudandum est SOLENANDRI consilium, quod extat in Oper. suis p. 78. ubi scribit, se in paroxysmi podagrîci principio magno cum successu exhibere aliquod purgans solere, primum id edoctum ab ALEX. TRALLIANO lib. 2. Et singulare esse, PECHLINUS obs. 26. eruditissime innuit, quod arthritici lenorem plerumque experiantur insultum, detracta ex primis viis vitiosa materia.

§. II.

Cum vero omnis doloris articulatis *Materia* & podagrîci paroxysmus motum febri. *vitiosa* lem comitem habeat, cuius etiam be. *poda-* neficio, natura optima morborum *grisea* me- dicatrix, solenniter & felicissimo sape *per transpi-* cum successu morbum curare, & qua ratione *austera* eum excitat vitiosam & hostilem ma- teriam convenienti tempore, per con- *distantia* grua emunctoria evacuare atque foras rescribere solet; idque in doloribus ma- xime per sufficientem, & auctiorem transpirationem perfici, dum non modo tota sanguinis & seri massa depuratur, sed & ipse dolorem in pedibus crea- ans vitiosus humor successiva difflatio- ne & exhalatione excernitur; prima ac princeps medentis debet esse intentio ac cura, ut placidam continuam & non *Quo* interruptam diaphoresin, suo consilio, *spectante* infusa & auxilio procuret & moderetur. Præ- *Theo* flare id opportunissime possunt ipsa in- *mixtu-* fusa, quæ loco Theæ, ex herba scordii, *re-*

cardui benedicti, veronicæ, radice glycyrrhizæ, corticibus citri recentibus parantur: cui scopo identidem egregie inserviunt mixturae, ex aquis destillatis cardui benedicti, galegæ, scordii, succo citri, lapidibus cancerorum, antimonio diaphoretico, cinnabari, nitro purificato, & syrupo acetosifatis citri, singulis debita dosi & proportione summis concinnanda. Instar omnium vero potest esse liquor noster anodynus mineralis, si cum quarta parte spiritus *Buffi*, & tartari volatilis roboretur: de quo triginta vel quadraginta guttae pro dosi, ex ordinario decocto vel infuso jam laudato propinari possunt. Præstat vero ejusmodi medicamenta mane, cum expectatione lenioris sudoris in lecto exhibere. Vesperi & circa noctem pulvres temperantes bezoardici nitrosi, cinnabarini, cum aquis analecticis, diaconoicis, vel cum emulsione amygdalarum dulcium aut seminum quatuor frigidorum majorum commodissime porrigi possunt.

§. III

*Negue
mlnus
decotta.* Expedit etiam pro feliori sanationis obtinendo scopo in hoc affectu, pro ordinario potu, decocti temperantis & diluentis paulo liberaliorem usum commendare, ex quo summum mæspius fructum percepisse recordor. Species hæ sunt: rec. radicis chinæ, sarsaparillæ, polypodii ana uncias duas, liquiritiæ, cichorei ana unciam, corticis ligni saffra unciam dimidiæ. Quarum dimidia pars in quinque aquæ mensuris & una vini coquantur ad consumtionem septimæ partis: quo decocto non modo pro ordinario potu & ad extinguendam situm utendum, sed & ex eo medicamenta propinanda sunt, atque insuper singulis duabus horis, octo unciae calide bibendæ sunt, idque statim a morbi insulto faciendum. Inde urina copiose fertur, & corpus in continua perspiratione servatur, alvus quoque fuida & laxa manet; si vero hæc officii sui fuerit immemor, supra propositum la-

Hoffm. Syst: T. IV. P. II.

xans exhibendum; abstinere quoque ab omnibus jusculis pinguibus nutrientibus expedit. In doloribus autem vagis præsertim a scorbutico humorum inquinamento qui oriuntur, serum lactis dulce vel acidulum, item fons Selteranus cum lacte remixtus utilissime pro potu dantur.

S. IV.

Ad mitigandos artuum, si acerbius affligant dolores, cautissime cum ipsis Topicis procedere æquum est: quia multa Topicis experientia telle, plus damni quam emolumenti attulisse constat. Consultius autem & securius est, partes dolentes culcitris levioribus plumaceis involutas, in quiete & temperato equa. bili calore retinere, ut lenis & successiva humoris vitiōsi diffusio procuretur. Ceteris vero externis omnibus minus noxiis, antiquissimum illud cataplasmæ ex mica panis albi, lacte, vitello ovi, croco & floribus sambuci paratum, mea quidem sententia præferendum erit. Potest etiam, præsertim in arthritide vaga, succus lumbricorum terrestrium addi. Novi quoque non sine insigni levamine in acerbioribus doloribus, frustum carnis ex recenter mactato animante parti affectæ applicatum fuisse: quod post viginti quatuor horas amotum, fetidum sparsit odorem. A tinctura sulphuris volatili, quæ ex calce viva, sale ammoniaco & sulphure paratur, cum charta bibula, membris affectis, non quidem statim in principio, sed circa finem, & ubi topi metuendi admota, ob fortiorem procuratam discussiōnem, effectus laudatissimos vidi: sed non omnes hoc medicamentum, ob summum, quem spargit foetorem, ferre possunt. Dolore & paroxysmo sublato, quando ingens in partibus affectis imbecillitas movendique impotētia remanet, balsamum nostrum spirituolum liquidum, cum aqua Reginæ Hungariæ dilutum, moderate inunctum insigne robur afferre crebro observavimus.

*Cantela, & observationes
Clinicae.*

§. I.

Venæfatio in Venæfatio, ut ut in corporibus, quæ quibus sanguine plus quam sero abundant, atdam cauque in ætate juvenili constituta, diæta se ad simul lauta vinoſa delectantur, ad praefranda, cavendos paroxysmos podagricos, & arthriticos utilissimam preſet operam, atque etiam ubi a defectu excretionis hæmorrhoidalis vel menstrualis morbus vel ejus paroxysmus metuendus, plane necessaria ſit: neque etiam imminente paroxysmo in arthritide valida & vaga reformatiā; ſed intrepide admittenda: nihilominus ubi corpus valde debilitatum, excrementiū ſeri copia obfum, ex vitio bona digestio- nis, & excretionis insufficientis prognati, cautius eſt ab ea abſtinere, & quidem hiſce de causis, quia excrementiū ſero, portio etiam conſiſtentis ſanguinis non ſine virium jactura amittitur, ſecundo, quia criticus ille naturæ motus ad exteriores, & peripheriam corporis ver- gens intercipi potest, quod in febribus erysipelaceis ſepiuſ fieri videmus: ter- tio, quia, candide quod fateri debo, aliquoties poſt venam ſectam acerbiorum ſymptomatum impetum animadver- ti.

§. II.

Cura laetis. Circa curam podagræ per lac, ſive potius ejus paroxysmorum ad magnum, & notabile tempus ſuſpensioni, id obſervavimus: quod ſi hac finita ad pristinum victum & vivendi genus ægrotantes redierint, vel ipſi paroxysmi bono omni reverti coepirint, vel loco horum, in corporibus preſertim ſenilibus & imbecilloribus, pathe- mata ſpasmodica, in abdomen colica, ventriculi cardialgiae inflationes, do- lores nephritici cum iſchuria, & non adeo longum poſt temporis ſpatium mors infecuta fuerit. Insuper etiam circa lacteam curam, quæ alias ad expu-

gnandos atque avertendos arthriticos, & podagricos dolores, non deſtituitur laude & effectu, id monendum duci- mus, quod, ubi corpus plethori- cum, vel ſero abundantiori impuro turget, vel ob tonum ventriculi, & intesti- norum labefactatum, prima regio ſemper fere cruditatibus vitiosis obfella eſt, aut ſi pathemata hypochondriaca, quod ſepiuſ fit, ſubſint, atque ipſa natura laetitia respuat, proṛſus hanc damna- dam eſſe judicemus, quippe in viſcerum ulteriore inſaratum, in cachexiam, hydrophem, & heclicam febrem tali pa- tho ægrotos præcipitari poſſe certu eſt.

§. III.

Reſte monet CRATO l.5. in confil. purgantia fortia ipſo in dolore non ex- iben- da. quod fortiter & violento impetu eva- cuantia, eo quod naturæ, & in primis ventriculo vim inferant, nequaquam inchoantibus & perseverantibus do- ribus exhiberi debeat. Hinc perite TRALLIANUS l.11.p.601. ſuadet, in podagra talia purgantia eſſe adhiben- da, quæ ſtomachum non ſubvertunt, & addit rationem hanc:nam hujus cura in omnibus affectibus haberit debet, ut ne ventriculi os ab iis, quæ adſumuntur offendatur. Ipſi namque infirmanti omnes nervi conſentiant, & fluxionibus ten- tantur.

§. IV.

Quod attinet ad decoctum Viennense, noſtro tempore ad podagrum curan- dam medicamen famigeratissimum, cuius inſignes virtutes una cum modo uſurandi in M.N.C. cent. 1. obſ. paulo curatius deſcribuntur, a multis qui eo ipſo uſi ſunt, magnopere quidem colaudatum memini, quorum autem cor- pora robustioris paulo conſtitutionis erant. Neque proṛſus ejus uſum impro- bare velim: ſed, quoniam plerumque debilioris, tenerioris, & ſenſibilioris na- turę podagrī affectione laborantes eſſe ſolent, ab hermodactylis & a ligno guaiaco, quæ illud ingrediuntur, & o- mnino ſale acri stimulante prædita ſunt,

sunt, lübens abstineo, qui securiora tan-
tum amo & approbo, quæ inter hoc
quod supra a nobis traditum est deco-
ctum præcipuum locum obtinebit.

§. V.

Tópicorū Externa remedia partibus dolentibus
circa u-
sum. applicata, utrū raro careant noxa, longe-
tamen periculosorem in corporibus
sanguine vel sero impuro repletis, sive
cacoehymicis, sensibilioris naturæ,
hypochondriacis & hystericas, in quibus
nervorum & fibrarum systēma spasmis
jam ad suatum est, fortiuntur eventus:
siquidem plurimum observationum si-
de constat, lethales horum applicatio-
nem excepsisse affectus, quos inter apo-
plexiam, hemiplexiam, memorię amissi-
onem, asthma convulsivum, cardial-
giā, colicam spasmodicam, ventriculi
& intestinorum inflammationem no-
minasse sufficiat.

§. VI.

Spíri-
tuosa
tópica
quibus
conse-
rant.

Topica spirituosa ac camphorata in
subjectis segnioribus & humidioribus
non adeo nocent: in siccioribus vero, si
materiam podagricam non retropel-
lant, ad calículum tamen disponunt, vel
tophorum generationi velificantur, aut
molestissimas partium contracturas re-
linquent.

§. VII.

Paucio-
ra & se-
cunda re-
medio u-
surpāda

Non possumus non iterum iterum
que monere, in affectibus podagricis &
articulatis, paucioribus & fidis reme-
diis tantummodo utendum esse, reje-
ctis insecuris & ancipitibus, quæ sèpius
damna intulisse animadvertis. Hinc mihi
perplacent, quæ tradit Cl. Romano-
rum Medicus ALEX. PASCOLIUS
Oper. tom. 3. Sect. 3. cap. 5. p. 220. At enim
vero, inquit, ut quicquid in eo morbi ge-
nere, quem in publicis noscomis non mis-
sus, quam in ædibus aliorum privatis,
crebro pre manibus habuimus, ad hoc
temporis observavimus, ingenuæ ut no-
stri moris est fareamur: proferre non de-
dignabimur eos, quibus aut nihil pror-
sus, aut nihil propemodum in rheumatif-
mo fecimus, felicius ut plurimum eva-
sisse, quam alii quos validioribus artis
præsidis subjecimus. Quæ res porro effe-

cit, ut posterioribus annis ejusmodi agro-
tantes tractando, præter victimum tenuem,
& congruum, ac uberrimas potionē ex
aqua vel simplici vel per levem infuso-
nem sarsaparille, glycyrrhize, florū
papaveris rheador, hisque similiūm me-
dicatas, nihil aliud præbere consueveri-
mus; quo solo temporis processu, sudores
plane cricicos, optimo cum successu ex-
citavimus.

§. VIII.

Galliarom medici celeberrimi, quos *Veneſea-*
inter CHESNEAU, BOTALLUS, & RIVERIUS, CAROL. PISO, referen-
*di, in doloribus podagrīs & arthriti-
cis crebro repetitam vena sectionem
maximopere laudant & commendant,
præservandique potissimum sine, &
scopo celebrant: quæ tamen methodus
in nostris septentrioni vicinis homini-
bus, quorum corpora non tanta sanguini-
nis abundant copia, haud curate quadrat.
Nihilominus, si morbus non adeo
inveteratus, & corpus ad sanguinis a-
bundantiam ingenerandam prouum
fuerit, levior & læpius repetita venæ se-
ctio, seu singulis potius mensibus in pe-
de admissa scarificatio, præmisso tamen
semper leniori laxante, non erit infru-
ctuosa. Eximius plane est locus, quem
de vena sectione utilissime frequentius
repetita, habet laudatus PISO l.c. Sect.
5. cap. 1. p. 406. hic merito apponendus:
Addo autem, inquit, singulis mensibus,
quoniam eadem experientia me docuit,
quotiescunque per inducias vel paucarū
septimanarū äger corpus resecerit, san-
guinisque jacturam reparaverit, tum pri-
ma quoque commotione aeris & altera-
tione sive ad algorem, sive ad astum om-
nino arthritim recrudescere. Et certe se-
pe audiri magnos viros ex arthriticorum
familia, nihil longo usq[ue] reperiisse retardan-
dis cohibendis que fluxionibus arthriti-
cis, si non prorsus tollendis, ipsa vena
sectione, eoque ejusdem usum etiam in
affectione etate non reformidasse. Itaque
repetita placet vena sectio & per epi-
crasis: quod si probatur, nemo non vides*

omnino parca manu esse administrans
strandam, & quantitatis hunc esse sco-
pum, ut providenter dumtaxat ne turge-
at sanguis in vasis & orgasmus sponta-
neo commoveatur.

IX.

*Tumor a.
foliatus
morbi
relictus
causa
trajectorius*

Paroxysmo finito & morbo soluto , in corporibus spongiosioribus habitus , & sanguine seroso turgentibus rema- net sappincule pedis affecti insignis & valde diffusus, qui impressa digitii vestigia relinquunt, tumor, caute profecto tra- standus; nam si quis eum pro incipien- te hydrope habuerit, & ad hunc præca- vendum vel abigendum , validioribus purgantibus uti velit , is non leve sani- tati & vita damnum infligere poterit . Opus tunc potius est lenioribus laxan- tibus balsamica virtute eminentibus , ut sunt rhabarbarum in substantia , pilulæ Cratonis, Becheri, nostræ, mediocri quidem dosi, sed crebrioribus exhibitis uti . Externe autem pulvere , ex farina fabarum, camphora & floribus sambuci conspergendi pedes, & leniter non au- tem nimis valide, vinculis, ne uberior serfi fiat affluxus & stagnatio, constrin- gendi.

S. X.

*Tophi
resolventi*

Ad tophos discutiendos & resolven- dos in senili & inveterata podagra, ego non praestitius, ipso balsamo sulphuris antimoniato, quod ex sale scoriarum reguli antimonii simplicis, superinfuso oleo terebinthinae & juniperi paratur, me deprehendisse, asseverare possum.

E N N A R R A T I O N E S
M O R B O R U M .

C A S U S . I.

*Podagra
ab empi-
rico re-
tropulsa
sancta*

Vir sexagenario major, sanguineo- cholericus, sanguine & succis plenus , habitus corporis robusti, animique ad iram valde proclivis, per complures an- nos doloribus convulsivis, colicis, spasti- cis, necnon podagrīcī misere divexaba- tur: quorum tamen malorum solamen, in usu Carolinarum singulis annis ad- hibitarum, nunquam non praestitissi-

mum invenit. Nihilominus, nescio sub quo infausto sidere, prodentissimus vir in empiricorum infelices manus irruit, qui fiduciam addentes amplissimam , nostro pedibus per aliquot dies laboran- ti pulverem commendarunt , cuius do- sis admodum quidem exigua, sed sapor valde constringens , & metallicè sine dubio mercurialis & vitriolicæ naturæ erat. Oblata duabus singulis horis dosi, bacque ad duodecimam usque reiterata, omnes dolores & cruciatus simul & semel conquieverunt . At vero altero die, in gravissimas incidit cardialgicas anxietates, cum inquietudine , ventris tormentis , alvi pertinacissima adstri- ctione , animique intercurrente deli- quio, comitatas: insuper nec corpus nec caput erectum detinere poterat ; quæ symptomata brevi post, cum insultus a- poplecticus exciperet, corpore mirum in modum inflato , capite in immen- sam molem turgescente, sanguineoque sero ex ore & faucibus effluente, nimia confidentiæ poenas morte miserrima luere debuit.

Epitaphis.

Funestæ hujus catastrophes causa , vix alia inveniri vel excogitari poterit ac infesti remedii antipodagrī assump- tio : quandoquidem sensibilioribus corporibus, si spastmodicis primarum viarum tentantur constrictiōibus, ejusmodi mercurialis & metallicā re- media semper nocentissima sunt, eo quod nonnisi spastica quadam strictu- ra operationem suam exerunt, & ita universum nervorum genus male affi- ciunt . Cui etiam in nostro casu repen- tina dolorum podagrīcorum remissio adscribenda venit, dum videlicet ob spasticam stricturam partium exter- narum , materia podagrīca intro coa- cta fuit ; qui spasmus simul efficit, ut sanguine plus justo ad pectus, & caput propulso , ex nimia vasorum disten- sione ejus extravasatio in cerebro o- borta fuerit . Hinc omnibus & sin- gulis.

gulis, qui praxin exercere sustinent; non sine summa ratione suademos, ut in quibusvis morbis spasticis, qui in sensibiliora praesertim corpora incident, cane & angue pejus, cuncta mercurialium, metallicorum, emeticorum atque aciorum purgantium genera, fugiant: inter quae etiam mercurium dulcem, aurumque fulminans, ob inauspicati successus, quem sibi sub ejusmodi circumstantiis observavimus, effectum, reponere non dubitamus; siquidem a pulveribus sic dictis solaribus non raro maximas praecordiorum anxietates, comite sanguitu, in podagrīcī obortas, doloribusque licet mitigatis omnia intus pejora redditā fuisse novimus.

C A S U S II.

Tumor pedum erysipelaceus retro-pulsus. Vir Illustris quadraginta & aliquot annorum, rheumatismis scorbuticis cerebrius affectus, tumore erysipelaceo in dextro corripitur pede, quod ulcus olim purulentam materiam continenter silans obessefit. Hic tumor inflammatiorius radium rubicundum a glandulis inguinalibus ad extremum usque pedem emisit. Altero die dolor metatarsum pedisque sinistri pollicem satis atrocum cum insigni tumore invaserit: unde plane immobiles redditi pedes fuere. Chirurgus in principio statim ad erysipelas profligandum spiritum camphoratum crocatum applicavit, & cum in alterum pedem dolor transiret spiritum removit, & hujus loco siccos pulveres cum camphora mixtos applicuit. Inde mox notabilis dolorum levatio & remissio in utroque pede succedit; non ita multo post autem tam gravis circa praecordia anxietas, & diaphragmatis constrictio, ut omnem penitus respirationem tolleret, cum astu & plenaria appetitus prostratione secuta fuit, quibus alvina obstrutio, cum inflatione associabatur. Praescripti quum me consultum adirent, ad alvum leniter edendum, decoctum mannatum; & ad flatus discutiendos materiamque retocessam sudore difflandam, aliquot

Hoffm. System. T. IV. P. II.

liquoris anodynī mineralis cum tertia spiritus Bölli parte remixti doses propinavi. Quo pacto & totum mox corpus largissimo sudore perfundebatur, & ipse haemorrhoides, quibus aliquando assuetus erat, denuo fluere coepérunt, omniaque sic evanuerunt symptomatibus penitus evanescentibus.

Epicrisis.

Similis fere casus, qui evidenter camphoratorum externum usum in podagra noxiū declarat, aliquorante annos in Illustrissima foemina mīhi occurrit: hac enim postquam minium cum camphora remixtum pedibus podagra tentatis applicasset, hec quidem filuit, at non multo post cardialgici dolores, summa virium prostratio, vomitus, inquietudo, cum astu febrili, alvus rentens & leve delirium accedebant; quae symptomata statim ab oblato cum emulgione ex seminibus 4. frigidis pulvere præcipitante nitroso, cum tertia parte grani unius camphoræ permixto prodoli, remiserunt, & materia podagrī ad exteriōres partes reversa est. Siquidem ego pallīm quoque animadveri, camphoram, cum exterius applicata noxam intulisset, interne exhibitam illata damna resarcivisse. Memorabilis quoque est observatio, quam recenset HAGENDORNIUS cent. 1. obs. 28. ubi mercator ex dolore & tumore scorbutico laborans, applicato epithemate ex aquis destillatis cum cerussa & camphora, doloribus sedatis, loquelam amissit, nec brachium movere potuit. Neque vero in totum camphoram ejusque spiritum in tumoribus & doloribus partium extremarum damnare & rejicere animus est, sed prudentia & distinctione naturarum opus esse vēlī: nam qui in artis versantur exercitio, subinde experiuntur, non omnia omnibus promiscue prodeesse, atque id maxime valere in topicis, dum quod alterum juvat, idem alteri noceat. Est autem causa non tam dispositio peculiaris humoris peccantis, sed potius ipsa tensiva tonica fi-

S 3 bra-

brarum, pororum & vasorum cutis constitutio: habent enim omnes partes & maxime quæ emunctorii, & colatorii vices gerunt, suum peculiare robur, tonum, tensionem, nec non suam quoque dilatationem, quæ species motus ad secretiones & excretiones summe necessaria, dependet potissimum a fluidi nervi influxu, & nervearum membranarum tensione; qualis itaque hæc sit in omnibus individuis atque morbis eorumque temporibus, in exhibitione topicorum provide animadvertisendum est ipsis medentibus. Quis enim non videt, si pori nimis fuerint constricti a dolore & spasmo, neutquam tunc spirituosa calida conferre, sed potius ea quæ blande constrictas partes relaxant; contra, si nimia est post dolorem relaxatio, quod appetet ex tumore, dolore mitiori reddito, omnia unguenta humida unctuosa anodynæ valde nocere, & potius tunc linimentis spirituosis nervinis utendum esse. Deinde utut quandoque topica egregie mulcent dolores, & febrem mitiorem reddant, nihil minus non semper illud valet, etiam in eodem individuo; paucis: quo robustior in expellendo est natura, majorque corporis corporis adeo vigor, major quoque motus internus, eo minus periculi inducunt externa decenter applicata: qua tamen, si vigor motuum casset, si ætas senilis vel status cachecticus supervenerit, plane sunt seponenda. Illud enim unice intendat medicus necesse est, ut externis non sistat evaporationem materiæ peccantis, sed eam promoveat: verum, quoniam magna prudenter in hac re opus est, securius potius est abstinere ab omnibus externis, & totum negotium curandi internis committere, partesque affe. Etas in blando tempore servare. Dein etiam hoc observavimus, toporum generationem, quæ sit maxime in arthritide fixa, improvidæ non raro ex-

ternorum applicationi deberi, stopes aientibus præsertim & infrigidantibus. Meretur hic adduci B. WEDELIUS qui in tr. de medicamen. facult. scribit: Frequenti experientia edocet sumus, plus damni ipsos podagricos inde passos, immo plures ex arthritide vaga hoc modo sibi fixam accercivisse, plurimos vero topbos, quod usurpaverint unctuosam, & pinguisa emplastica. Hinc, & ipse Galenus method. medend. l.4 e.3. topbos in articulari morbo produci recte memorat ex humore glutinoso & crasso, quando is non paulatim digestus, sed violentis remedii totus simul exsiccatus est: & FERNELIUS conf. 12. geminari inde dolores obseruat. Cæterum non omnia topica plane exterminanda esse in externis articulorum doloribus arbitramur: siquidem quando adfectos partium inverteratus cum torpore quadam & insensibilitate relicta, qualis in senili ætate sæpiissime evenit, tunc sedata prius interna sanguinis & humorum ebullitione, ad roborandos nervos & invitandum spirituosi elastici fluidi influxum in imbecilles partes, nervina linimenta balsamica virtute nobilitata, expectationi & medici & miseri ægrotantis eximie satisfaciunt.

C A S U S III.

Vir sanguineo melancholicus annum agens quadragésimum quartum, Podz.
gra,
trocedes
ex fri-
gore >
letha-
lis. habitus corporis strictioris, a decem annis passus est dolores tarsum pedis obsidentes, qui tamen non adeo vehementes erant, sed diaphoreticis facile cedebant, ut plurimum autem circa mensem Januarii revertebantur. Hi quatuor ante annos acerbiores facti ægrum lecto adfixerunt, abhinc autem duobus annis prædicto tempore adhuc gravius afflixerunt. His cum ipsis luctaretur ægrotans, ingenti terrore affectus est, quem diutunior cura & animi angor exceptit: quo pacto dolores interiora occupantes, anxios in abdomen cruciantur.

tus excitarunt ; qui mox remiserunt, mox reversi sunt. Elapsis aliquot septimanis sàvissimo frigore regnante, iter suscipere honestus vir debuit : a quo tempore dolores longe truculentiores invasere , qui ventrem, brachia, fauciumque interiora aggressi , quandoque in capite sublisebant , atque somnum & quietem admodum turbabant , aliquando etiam effluxum materiae fætidæ purulentæ ex aure interna egregio cum allevamento excitabant. Mense Junio ejusdem anni acidulas Egranas ulurpavit, sub quarum usu quidem dolores siluerunt & cuncta bene successerunt : absoluta vero cura abdomen multo atrocius affligentes , appetitum penitus profligarunt : ubi alvus pigra, urina coloris naturalis sed parcius reddebat, virium aderat dejectio, & æger de fixo ac duro tumore supra umbilicum conquerebatur. Nausea quoque premebatur, & saliva copiose ex ore sàpius emanavit, vomituque nonnunquam & alimenta & medicamenta rejecta sunt : siquidem dolor superiore petere , fauces constringere, atque ad scapulam usque se extendere sàpius solebat . Flatus ventrem distendentes per totum hinc inde intestinorum canalem cum fluctuatione & borborygmo percurrebant, & ad intestinum rectum ubi pervenerunt, mox regurgitabant , cum quasi exitus ipsis præcluderetur . Notatu dignum fuit, quod per periodos dolores hi infestarint, hora post meridiana quarta , media nocte & ante meridiana decima dum accederunt. Variis usus est remedii, & præcipua medendi intentio eo fuit directa, ut ad ipsos pedes rursus derivaretur infecta materia . Hinc frictiones, pediluvia in usum vocata, vene quoque in pede celebrata sectio. Hirudines tandem applicatae , nitrola cum camphoratis fine diaphoretico administrata , nec usus carminativorum, stomachicorum balsamica temperata virtute inclytorum neglectus ; alvus quoque clysteribus, lenioribusque laxantibus

ad officium redactus. Sed successus speratus fecellit . A nulla tamen re præsentius levamen ac a potu lactis calidi cum infuso florum sambuci remixti expertus est, quippe per duos quandoque dies ab eo assumto dolores conquiererunt. Quatuor abhinc septimanas elixir stomachicum ex amaris balsamicis extractis concinnatum exhibui , a cuius frequentiori usu, dolores sopiti , viresque cum appetitu erectæ fuerunt , adeo ut patiens domo egredi, functionibusque suis præesse potuerit. Sed inconstans hæc valetudo fuit, siquidem in manu & dorso dolores rursus apparuerunt, somnum impediverunt , & tumor umbilicalis regionem obsidens , exterius manu percipi potuit. Tandem his malis dirius insistentibus, succubere noster debuit , documentum sat clarum relinquens, contra mortis atrociam nullum inveniri remedium posse.

Epicrisis.

Ex præfata historia liquide apparet, quam contumax morbus sit ille, & quantum negotii creet medentibus, qui ex doloribus podagrīcī in corpus retrocedentibus ortum suum habet . Singulare illud est, quod materia , abesse dubio , vellicans aeris , indolis plus minus fixa & volatilis , si in extremis articulorum membranis subsistat , & ipsis denegetur fedes & exitus , occupet in abdomine viscera membranacea , nempe intestina , quæ maxime ex membranulis tendinoso-nerveis conflata sensu acutissimo prædicta sunt , & similis structuræ ac texturæ cum ligamentis articulorum nervo-tendinosis ac glandulosis sunt, unde etiam propter affinitatem & structuræ communionem materia peccans mox transit ad intestina , mox rursus ex ipsis ad articulos . At vero, quod talem viam ac modum servet materia podagrīca retropulsa, jam HIPPOCRATES suo tempore eleganter notavit lib. 6. epidem. part. 4. aph. 3. item Sect. 2. p. 20. hisce verbis: *qui articul*

Iari morbo detentus intestini dolore dextra parte vexabatur, quietior erat; hoc autem curato magis dolebat. Et memoratu hanc in rem digna sunt, quæ tradit SOLENANDER in Cons. pag. 77. ubi ait: in cura habui nobilem inveterata arthritide occupatum, in sexagesimo quinto atatis anno constitutum, qui colico dolore reprehensus fuit. Auctor eram, ut arthritis revocaretur, pedum lotionibus, frictionibus, venæ sectione in pede, monitus ab Hippocrate & Benedicto Sylvatico in Consil. Obstirit autem Senior medicus & ager interiit. Atqui ego, pergit, idem plane observavi in muliere, quæ arthritide fere semper laborabat, quando a doloribus coli liberata erat, & vice versa, cessantibus coli doloribus misere ex juncturis affiebatur.

C A S U S IV.

*Podagra funesta. Vir statuæ mediocris, circiter se-
omine rea, ptuagenarius, temperamenti sanguinopulsa, nei, habitus corporis spongiosior & robustioris, podagræ crebrius affletus doloribus, aliquot abhinc mensibus ad sedandam cruciatuum atrociam, ipsa in paroxysmi accessione, partes dolentes, spiritu quodam a pharmacopœo sibi missa, inunxit, a cuius crebriori & continuato usu, omnis proptermodum dolor evanuit. Exacto aliquot septimanarum spatio sæva in abdomen tormina passus est, juncta cum vomitu & alvo adstrictissima. Medicus in consilium accersitus, ob metum iliacæ passionis, alvum clysteribus aperiri curavit, aliaque interna, quæ inflammationi resistunt & dolorem levant, in usum vocavit. Inde non modo cessavit vomitus, alvusque soluta, sed & sedatus fuit abdominis dolor, ita prorsus, ut æger e lecto surgere, & in publicum rursus prodire potuerit. Sed paucò interjecto tempore paroxysmus modo descriptus, quia hæc valetudinis spes non diu perseveravit, rediit, nisi quod vomitus lenior fuerit: & isdem*

iterum in usum vocatis medicamentis ad sanitatem perductus est. Dibus vero elapsis hebdomadibus idem paroxysmus repetit, & exhibitis de novo remedii paruit. At vero aliquoties reversus iterumque depulsus est: remansit tamen omnium ciborum fastidium, corpusque in dies consumi cœpit. Interea nunquam rursus podagra affectus fuit, octiduoque nulla amplius persensit tormina: appetentia vero omnis periit, nec alvus nisi adjuta respondit, urina rubicunda, & semper adfuit oris siccitas cum humili desiderio, lectumque perpetuo custodire ægrotus debuit; qui rebus ita constitutis, inter vivos esse tandem desit.

Epicrisis.

Morbi, quem depinximus, cursus atque eventus, plurimos admonere poterit, quam caute & circumspete cum podagræ senioribus ratione topicorum agendum sit: siquidem ipsa natura, per senium & morbi vim debilitata tandem fatiscit, atque ad serum acre impurum, quod artuum doloribus materiam subministrat, per criticum & febrilem motum ad extremas partes & ambitum corporis propellendum, redditur minus idonea: quare materia peccans in corpore remanens nervosas & membranaceas ventriculi & intestinalium tunicas infestat, ventrisque tormina efficit: quæsi interna inflammatio excipit, ægri vel subito e medio tolluntur, vel successive marasma aut heclico calore vires ipsamque carnem defurante consumuntur. Notabile vero in præfata morbi historia fuit, quod podagræ dolor non redierit, sed per paroxysmos hujus loco, ventris tormina, vomitus, sitis, inappetentia afflictarint; quæ tamen symptomata per clysterum oleorum, medicaminum diaphoreticum, cinnabarinorum cum castoreo remixitorum usum exspirarunt: unde consensus intestinalium cum partibus nervosis & tendinosis manuum & pedum, quem in podagræ & chiragra affe-

affectis quam maxime observamus, liquido iterum evanescit. Nam in praxi medica perpetuum fere est, atrocia ventris tormenta ut plurimum transmissa ad artus vitioso humore solvi, & retrupsum etiam materiam arthriticam vel podagricam acerbiora ventriculi & intestinorum tormenta & spasmos sequi. Alvis ejusmodi in casibus, ob tonum primarum viarum destructum, officii sui nunquam non obliviscitur, atque per clysteres sollicitata parum excrementorum, sed multos foetidos fatus emittit. Ceterum in senibus, appetitus omnimoda viriumque prostratio, sitis & oris siccitas, lentam febrem, mortemque imminentem indicant.

C A S U S V.

Todagra in hemorrhoidario, ex opiatoriis usu frequentia. Vir sexaginta annos natus, spongiofi corporis habitus, haemorrhoidal fluxui adsuetus, dolorum podagriconum utut mitiorum, vere & autumno ineuntibus, tentatus fuit insultibus. Circa sextas exitum, horaeo fructas refrigerantes liberalius paulo ingessit, & contra podagricon dolores panaceam sic dictam ab empirico assumisit: quæ constabat, ex opii crudi in frustula dissesti drachma, cui duæ aquæ liuorum convallium spirituosa unciae affusæ fuerunt, & ita leni digestione steterunt. Hujus liquoris coquileare circa lecti introitum medicaster sumendum jussit: cuius usus, quod placidorem somnum conciliabat, per aliquot septimanas continuatus est: & paroxysmi, circa consuetum alias tempus infestare soliti, mirum in modum allevati sunt. At vero, elapsis aliquot hebdomadibus, mense Octobris, febris cum totali virium suppressione, extremonrum frigore & perpetua somnolentia infecuta, ægrum omnium præter opinionem jugulavit.

Epicrists.

Dici vix potest, quod tamen quotidiana declarat experientia, quam

perniciosum sit, consuetos podagriconum paroxysmos valentioribus remediis supprimere, & materiam illam acrem causticam, quæ solenniter, ut ut cum dolore, per congrua emunctoria protruditur, intus retinere: quippe tali modo partium internarum inflammations, spasmi vel sphacelationes, quam in nostro agro præsentem fuisse nulli dubitamus, perpetuo fere subsequuntur. Non potuit autem non, propinata narcotica medicina in corpore laxioris habitus, senio vicino & a refrigerantium fructuum abusu jamjam debilitato, infaustum relinquere effectum: quippe practicorum fide dignorum observationes confirmant, a solo refrigerantium abusu, corpora podagricorum orci fauibus tradita fuisse.

C A S U S VI.

Ante quadraginta propemodum annos, cum in principatu Halberstadiensi, provincialis medici munus obirem, me confulebat Illustris regiminis Consiliarius, qui parente hypochondriaco, & podagrico natus, jam per decem annos & ultra, vix enim tunc trigesimum quartum superavit, & hypochondriacis pathematis & doloribus podagricon fuit afflatus. Vere & autumno potissimum invadebant paroxysmi, cum gravativa artuum lassitudine, appetituque austro, quem postea sequebantur horripilatio cum extremonrum frigore & tremore, vomitusque crebriores, quibus liquamina pituitosa & valde corrosiva acida, quæ & dentes stupefaciebant, & pavimento immissa ebulliebant, copiose educebantur. Successit dein febrilis astus, & tertio vel quarto die acerbi dolores pedes oppetebant, qui ad aliquot saepe septimanas persistebant, & demum sudore foetido acidum spirante perque plures dies durante tollerabantur. Id vero erat memorabile, quod, si vomitus non præcesserint,

paro-

paroxysmi digitus semper & acerbius pedes affixerint. Inter medicamenta, quibus per complures annos usus fuit, non praesentius solamen atque lenimen, quam in pulvere absorbente nitroso, & essentia florum liliorum convallium, cum spiritu vini phlegmatico extracta & sexta parte essentiæ castorei remixa, expertus est. Tandem Illustris hic vir quinquagesimo ætatis anno, febre acuta Berolini defunctus est, & dissecto corpore pancreas totum scirrhosum, & valde tumentes etiam glandulæ mesenterii reperta fuerunt.

Epicrisis.

Hypochondriacos procedente ætate demum fieri podagricos experientia testatur, id quod ratione quoque demonstrari evidenter potest. Uterque videlicet affectus natura debiles & a parentibus iisdem morbis laborantibus genitos quam maxime infestat, atque primarium vitium potissimum in depravata alimentorum digestione, crudorum succorum abundantia, & excretionum, quæ sanguinis & humorum depurationi inserviunt, defectu consistit. Deinceps aliquot exemplis compertum habeo, in dissectis corporibus & hypochondriacorum & podagrorum, ubi ex superveniente alio morbo extinta fuerunt, inter alias viscerum corruptiones, pancreas scirrhosum maxime deprehensum fuisse, & ubi tale quid repertum fuit, ingenitem semper acido-ponticorum humorum prima in regione colluviem adfuisse, quæ appetitus præter naturam avicti, cardialgicæ anxietatis, obstructionis alvinæ, ructuum & vomitionum acidissimorum succorum vera causa existit. Quam inimicum vero acidum sit ad sanguinem delatum, dum temperatam ejus & gelatinosam erasit, imo fluxilitatem desiruit, præternaturalem spissitudinem ingignit, excretionesq; retardando, cacochymia & vilcidæ & tartareæ genitrix sit; is quam facile, qui fundamentis physico-mechanicis morborum generationem explicare novit, poterit penetrare. Ego

itaque semper cum singulari fructu & hypochondriacis & nephriticis & podagrīcīs, tum ad symptomatum mitigationem, tum etiam ad sanationem, si adhuc ejus spes fuerit integra, medicamenta, quæ acidum destruant in primis viis, ut sunt absorbentia sibi relata terrea, quæ subinde, cum in sal neutrum degenerent, alvum largius saepe ac si purgans sumptum fuerit, solvant, exhibeo; atque insuper elixiria amara, temperate balsamica, cum lixiviosis menstruis parata frequentius usurpanda, injungere ac commendare soleo. Tandem in præfata morbi historia id commemoratu dignum est, quod etiam in aliis saepe annotavi, leviores semper arthriticos & podagrīcos paroxysmo fieri, quando natura vel sponte vel arte adjuta se a colluvie vitiosorum humorum per vomitus ante accessum liberaverit; manifesto indicio, originem dolorum esse in primis viis: in cuius asserti confirmationem ipsum adduco MARTIANUM, qui ita dicit: *in arthriticis doloribus, ob acorem in ventriculo peccantem a doloribus correptos memini, qui ab iisdem liberati vel levati fuerunt, ubi actida evomiscent.* Quod idem probat SYLVIUS Oper. p. 786. aperte scribens, hanc curam per vomitionem utilissimam arthritidi, multisque a se confirmatam experimentis. Imo eadem ratione non paroxysmum tantum imminentem sublatum, sed & novi impetus semina extincta fuisse idem eodem loco scriptum reliquit. Atque ALPINUS de medicina Ægypt. multos se vidisse, qui, cum a podagræ calculique doloribus excrucianti fuisse, crebro usu vomitorii egregie adjuti fuerunt, affirmat.

C A S U S VII.

Vir generosissimus, sexagenario major, ob insignia merita in summam dignitate in hac provincia constitutus, & illustris regiminis consiliarius, tenerioris & sensibilioris quoad corpus & animalium.

*Podagra
heredita-
ria in-
terata in
corpore.
Carolinis-
expulsa
& alle-
vata.*

mum constitutionis, a parente, qui fere per totam vitam fuit podagricus, & pedes tophis obfessos habuit, genitus, ante 30. fere annos pathemata hypochondriaca, rheumatica, & podagrifica expertus erat, quæ procedente ætate magis ingravescabant, & utut moderata admodum diæta vita ratione inculcata usus fuerit, singulis tamen annis vere & autumno ob podagram afflictentem lecto decumbere, mox breviori temporis mox longiori intervallo, cogebatur. Aliquando vero consuetuta podagra, præter morem & consuetudinem, solito tempore non recurrebat, sed quia materia vitiosa intra successus vitales retinebatur, multis ac gravissimis tentabatur symptomatibus: continuis nempe ventriculi eructationibus, cordis palpitationibus, tremore artuum, inquietudine, dolore capitum acuto, tractorio, lacinatorio, circa tempora, circa nucham, accedente cogitationum confusione memoriaque debilitate. Consulebat me atque Clar. D. D. Strauchiūm Archiatriū Martisburgeūm, qui saepius frequentaverat Carolinas, atque imprimis ex nobis quærebat, num has thermas sanitati suæ profuturas judicaremus. Hic longiori experientia edocet, statim consilium probavit; cui ego quoque facile assentiebam: & ille cum eo ad fontes hos salutiferos profectus fuit, a quantum interno usu decenti cum regimine instituto, in tertia & ultima cura, vehemens paroxysmus podagricus, qui tamen non nisi per sepius dies durabat, ipsos pedes corripiebat, remittentibus mox omnibus prioribus symptomatibus. Inde optime quam se habuisset, binis adhuc vicibus, aquas hasce thermales cum summo fructu semper usurpavit.

Epicrisis.

Ego sane complura possem recensere & allegare exempla, quæ mirabilem & incomparabilem plane horum fontium virtutem & effectum in atrocibus & contumacibus morbis expugnandis, qui ab artriticâ & podagrifica ma-

teria remanente in corpore vel improvide retroupta oborti fuerunt, demonstrare valerent, qui potissimum in eo consistebant, quod materiam morbificam ad pristina sua loca ex interioribus relegaverint, conqiescente mox omnium symptomatum periculissimum syndrome. Vidi colicas spastodicas, vidi asthmata convulsiva, affectus seporosos, morbos melancholicos cum sensuum & rationis perturbatione conjunctos, pertinacissimaque tusses, atque pulmonum infarctus, qui non nisi a materia podagrifica remanente vel retrocedente originem suam habuere, hac ratione divino adjumento felicissime subactos & curatos; maxime vero, si non semel, sed bis vel ter in usum decentem fontes ducti fuerint.

C A S U S VIII.

Vir generosus, perstrenuus Chiliarcha, non procul ab hac urbe degens, corporis macilentioris, fibrosi tamen & robusti, superato jam 66. anno, in gravem & exitialem incidit morbum, cuius profligandi causa, me in consilium vocavit. Is jam ante 10. annos doloribus podagrīcīs, mitioribus tamen & obtusioribus vernali tempore fuit obnoxius, neque minus his deficiens, acerbis abdominis doloribus, sive potius intestinorum stricturis spasticis vexatos. Ante annum Generosus hic vir, sub initium hyemis praegressa vehementi corporis refrigeratione, neque minus ingenti animi, quam tamen prudenter comprescit, indignatione, desubito truculento ad suffocationem usque asthmate convulsivo corripitur. Ego tertio die accedens morti ferme proximum inveni: nam sub summa virium prostratione ad animi usque defunctionem, pulsus duro, debili & tremulo, extremorum frigore, & sub cogitationum ac rationis turbatione, ægerrime & cum loniti spiritum ducebatur. Primo omnium clysteres injiciendos, ad fortes alvinas

cum


cum flatibus educendas, curavi: de-
in mixturas blande diaphoreticas &
discutientes, singulis horis sumen-
das, præscripti. Factum hinc DEI
beneficio est, ut ad omnium ad-
stantium admirationem, intra quin-
que dies somnum, qui plane fuerat
antea sublatus, capere & respirare
sine molestia æger eceperit, atque
successive ingentem viscosæ materie
copiam tussi ejecerit. Verum non
ita multo post, de doloribus ac cru-
ciatibus ipsius abdominis Generosissi-
mus Vir conquerebatur, qui in
dies increscentes intolerabiles eva-
re. Alvus adstrictissima, præcor-
diorumque adfuit anxietas atque in-
quietudo. Sed singula hæc adhibitis
idoneis remedii, expulsa e sede sua
materia hostili, conquiescere cœper-
unt: relicta tamen statione sua in
regionem inguinalem non procul a
virili membro hæc ipsa descendit,
atque in musculis ibi conspicuis,
præcedente gravi dolore & inflam-
matione, abscessum efformavit insig-
nis certe magnitudinis, qui post
suppurationem factam demum aper-
tus plus quam libram puris per vi-
ces fundebat. Dum consolidari cœ-
pit, truculenti dolores pedes infe-
stare cœperunt: quos etiam com-
moda medicina abegimus, relicta
tamen debilitate & tumore cede-
matoso. Decursus autem hujus
morbi valde ancipitis & difficilis
per trium fere mensium spatum
duravit. Interea valetudini perfe-
cta fuit redditus Generosissimus æ-
grotans.

Epicrisis.


Medicamenta, quæ in toto hu-
jus morbi decursu in usum duxi,
non alia fuerunt, præter clysteres
& cataplasma, quam mixtura ex
ptisana, aqua cardui benedicti, flo-
rum sambuci & cerasorum nigro-
rum, adjectis, pulvere meo bezo-
ardico leniter camphorato, succo

citri, liquore anodynō minerali, &
succo papaveris albi composita:
quandoque mixturæ simplicis ali-
quot guttas pro dosi adjeci. Qua
plus quam vices reiterata u-
sus fuit. Præter hæc, infusum
Theiforme, ex herba veronicæ, sal-
viæ, floribus sambuci, semine fœ-
niculi, & decoctum nostrum uita-
tum pro potu ordinario largius su-
mendum præcepi, interposito inter-
dum electuario vel elixirio pecto-
rali, quia tussis longo tempore in-
sistebat. Ceterum me tam vehe-
mentem metastasin in morbo nun-
quam observasse memini. Atque
ex hac morbi historia & curatione,
illud curiosi naturæ & medicinæ
scrutatores, meo quidem judicio,
addiscere possunt, eam esse mate-
riæ, quæ dolores in articulis creat
& foget indolem & crasin, ut vix
ab ulla medicina immutari, alte-
rari, & ejus pernicialis vis destrui
possit: licet enim in præsenti calu
reliquerit suam sedem, nihilominus
salva hostili indole & crasi perma-
nente, eandem suam vim in aliis
& compluribus locis exercuit, ut
adeo remediorum, quæ vulgo & a
chymicis æque ac medicis minus in
praxi versatis, tantis laudibus pa-
sim venditantur ac celebrantur. &
ad auecupandum magis argentum
quam salutem afferendam apta sunt,
inanis atque plane impotens facul-
tas clare demonstrari possit. Cor-
datus autem & prudens medicus in
sanando ejusmodi morbo nihil aliud
efficere vel præstare potest, quam
ut temperiem & texturam earum
corporis partium, quæ nondum simili
vitio affectæ, integrum servet,
quo morbosa materia successiva &
blanda evaporatione & discussione
per universale cutis emunctorium
excludatur.

Plures invenies observationes in
consult. medic. Sect. 4. 167. 170.



Ju: Fran^c






ESTANTE 8.^o

Tabla 8.^a

N.^o 7





ACADEMIA
MEDICO-INA
RATIONALIS
TOM. VI.

25

20

12.862