

El segundo medio se reduce á contar en las floras y en las monografías, todas las especies propias de un determinado país y las que se hallan en muchos, llegando de esta manera á conocer cuáles tienen áreas menos extensas y cuáles mas extensas.

El tercer medio consiste en dividir la superficie de la tierra en regiones tan limitadas como sea posible, examinando despues las especies propias de una sola region y las que existen á la vez en dos, tres ó mas regiones. Convendria que las regiones fuesen próximamente iguales para la mayor exactitud de los resultados; pero sin tal igualdad, cuando las regiones establecidas sean cincuenta, puede suponerse que cualquiera especie propia de una sola region ocupa $\frac{1}{30}$ de la superficie terrestre, y aun cuando en algunos casos esto aisladamente conduzca al error, habrá compensacion á consecuencia de la reunion de muchos hechos.

El cuarto y último medio es el mas fácil, aunque menos exacto, y consiste en contar en una familia ó género el número de especies que tienen extensa área por ballarse en muchas de las regiones establecidas, comparando despues este número con el de las especies limitadas á una sola region. Está comprobado que en una familia ó género con pocas especies muy extendidas, es el área media de las demás especies bastante estrecha, mientras que las especies cosmopolitas se hallan principalmente en los grupos que contienen muchas de área extensa.

Estos diferentes medios de calcular las áreas relativas de las especies concuerdan entre sí, y además, segun parece demostrado por Alfonso Decandolle, no afectan notablemente á los resultados, que ellos dán, los descubrimientos de nuevas especies y localidades.

Los estudios hechos por el mismo Alfonso Decandolle sobre la extension relativa de la habitacion de las especies, segun que son criptógamas, fanerógamas y dicotiledóneas ó monocotiledóneas, le han permitido deducir algunas consecuencias, aunque no existan todavía obras completas en que se hallan enumeradas todas las especies vegetales con los suficientes pormenores acerca de sus habitaciones respectivas. Las anfigamas ó criptógamas celulares tienen generalmente el área mucho mas extensa que las demás plantas, siendo corto el número de las especies propias de cada país y considerable el de las comunes á muchos. Las eteógamas ó criptógamas semivasculares presentan un área media comunmente menos extensa que las anteriores, variando en los países á causa del predominio de las diversas fa-

milias, correspondientes al grupo, y efectivamente en la parte boreal de nuestro hemisferio, donde los musgos dominan, es la extension de las eteogamas casi igual á la de las anfigamas, mientras que en la parte austral es menor á causa de la abundancia relativa de las jungermanias, y menor tambien entre los trópicos á causa de los helechos. Las monocotiledóneas tienen al parecer un área media todavía menos extensa, aun cuando faltan datos para adquirir sobre ello certidumbre completa, pudiéndose sin embargo admitir que la indicada área sea intermedia entre la de las eteogamas y la de las dicotiledóneas, que es por consiguiente la mas limitada. Dedúcese, finalmente, que en general el área media de las especies disminuye en proporcion de lo completo, desarrollado, ó dígase perfecto de la organizacion que es propia de la clase ó grupo superior á que pertenecen.

Son curiosas é importantes las investigaciones sobre el área relativa de las especies consideradas respecto de las familias á que corresponden, aunque demasiado extensas y minuciosas para exponerlas aquí, bastando indicar que las familias con mayor área se hallan entre las criptógamas, viniendo en seguida importantes familias de las monocotiledóneas, los helechos y algunas familias de las dicotiledóneas, aunque entre ellas ninguna con ovario infero. Las familias que despues siguen no presentan distinciones tan claras y fáciles de expresar, sin embargo de hallarse numéricamente indicadas, y de todos modos se confirma que cuanto mas complicada es la organizacion, mas se estrecha el área media de las especies.

Ejercen las estaciones propias de las especies notable influjo sobre la extension del área media relativa de las mismas. Es cosa sabida que las especies acuáticas y marinas tienen un área media mas extensa que cualesquiera otras plantas, y las de terrenos pantanosos ó muy húmedos participan de la misma cualidad, así como las marítimas, ó sean las que viven á las orillas del mar y en terrenos salinos; pero no sucede otro tanto respecto de las que exigen una atmósfera muy húmeda y huyen de las aguas estancadas. Las plantas que crecen en los campos cultivados tambien presentan un área media muy extensa, y es fácil reconocerlo con solo recordar diversas especies comunes, aunque muchas de ellas mas bien pueden considerarse como transportadas. Van tambien con el hombre varias especies que viven en los escombros, los muros, las orillas de los caminos y los setos, aunque no sean demasiado numerosas, y por esto no ofrece grande importancia el estudio de su área media.

La duracion y la estatura de las especies influye tambien en la extension de su área media relativa, y en general puede suponerse mas extensa la de las anuales. En efecto, las plantas leñosas tienen el área media mas corta que las herbáceas, y los árboles sobre todo la presentan sumamente limitada, siendo pocos los comunes á países muy distantes.

Es igualmente de importancia por lo que toca á la extension del área media relativa de las especies su mayor ó menor facilidad de reproducirse y diseminarse, segun lo permiten sus frutos y semillas, facilitando ó al contrario dificultando los medios de transporte. No obstante, debe advertirse que las colas, alas y vilanos de los frutos no influyen notablemente en la extension de las especies, como se pudiera presumir; pero las alas y penachos de las semillas suelen favorecerla, y asimismo los pelos ganchudos y todo cuanto puede sujetar los frutos ó semillas á la ropa de las personas, al pelo y lana de los animales, como tambien á los objetos que se trasladan de unos á otros países. El ser los frutos carnosos ó no, apenas tiene influencia en la extension de las especies, aunque en cambio la ejercen el número y tamaño de las semillas, siendo mas favorable á la misma las pequeñas y numerosas. La facultad de conservarse por largo tiempo en disposicion de germinar, que es propia de las semillas de algunas plantas, y en particular de las malváceas, leguminosas, cucurbitáceas, solanáceas y poligóneas, ofrece muy ligera importancia respecto de la extension de su área media relativa.

Deben tambien considerarse las regiones donde se hallan las especies en cuanto pueden contribuir á extender ó estrechar los límites de las mismas, segun lo hace Decandolle, aunque bajo este punto de vista no sea permitido todavía llegar á resultados bastante exactos y satisfactorios. Las especies pertenecientes á una familia que se halle en las inmediaciones de la zona glacial, tienen el área media mas extensa que la de especies de la misma familia situadas en otras regiones. Las especies de la zona templada de nuestro hemisferio tienen en cada familia el área media menor que las de la zona glacial y mayor que las de la zona tórrida. Las especies de la zona tórrida tienen el área media menor que las de la zona templada boreal, segun se acaba de expresar, y sin embargo presentan mayor área media que las especies de la zona templada austral. Infírese de todo ello que el área media disminuye á medida que se va del polo ártico á las extremidades australes de los continentes: esto en parte parece depender de la mayor connexion de los diferentes territorios en

el hemisferio boreal respecto del austral, aunque tambien á otras causas presentes ó anteriores al actual estado del globo, se debe seguramente.

Hay especies cuya área es muy extensa, aunque ninguna de las fanerógamas habita en todo el globo, y pocas se hallan en la mitad de él, é igualmente no son muchas las que ocupan un tercio de la superficie del mismo. Existen otras especies cuya área es muy limitada, y son particularmente las propias de islas, sobre todo de las pequeñas y lejanas de los continentes ó de diferentes islas; pero tambien en lo interior de los continentes se encuentran algunas especies circunscritas en su habitacion por muy estrechos limites.

Es difícil determinar con alguna exactitud el área media absoluta de las especies, y debe suponerse que varía notablemente segun los países y las familias á que pertenecen aquellas. Cálculase que para la region mediterránea sea $\frac{1}{3}$ el área media absoluta de las especies, y la de todas las existentes en la tierra es valuada por Alfonso Decandolle en $\frac{1}{150}$ de la superficie de ella, equivalente á 0,007 de la misma. Respecto de la region mediterránea tambien es de notar que las especies á la vez propias de otras regiones son las mas extendidas en las subdivisiones de la misma region mediterránea, lo cual parece ser aplicable á las demás.

Cuando se reflexiona sobre las causas de que depende la extension relativa de las áreas, se reconoce la insuficiencia de las causas actuales para dar explicaciones satisfactorias y siempre aplicables. Atendiendo á las plantas y á los países se dividen las causas actuales en botánicas ó fisiológicas y en físicas ó geográficas, unas y otras de influencia indudable, aunque muchas veces por medio de ella no pueda comprenderse la mucha ó poca extension de las áreas de diversas especies. El transporte mas ó menos fácil y mas ó menos frecuente de las semillas en estado de germinar, la conexion ó separacion mas ó menos reales de territorios con climas mas ó menos análogos, las cualidades íntimas ó fisiológicas de cada especie, son ciertamente las tres categorias de las causas actuales de la extension de las especies; pero es preciso admitir otras causas anteriores, que son relativas á los cambios experimentados por el globo en diversas épocas, siendo facilitar ó dificultar el transporte de las semillas uno de los resultados, y acaso á la mayor antigüedad de varias especies y al número originario de los individuos de cada una deba atribuirse cierta influencia.

CAPITULO IX.

CAMBIOS DE HABITACION DE LAS ESPECIES.

Puede ser transportada por causas diversas una especie cualquiera de un país á otro lejano y resistir en él todas las variaciones posibles del clima, multiplicándose y haciéndose cada vez mas comun hasta el punto de extenderse tanto como se lo permitan los limites del país, cuyo clima le conviene, de modo que parezca una especie propia del mismo. Esto es lo que se llama *naturalizacion*, la cual presenta diferentes grados, porque además de las especies *antiguamente naturalizadas* y propagadas hasta el punto de confundirse con las espontáneas, las hay *recientemente naturalizadas* y poco extendidas, é igualmente existen otras que se encuentran algunas veces cerca de las habitaciones ó de los terrenos cultivados y que pueden denominarse *pasageras* ó *adventicias*, diferenciándose de todas ellas las *cultivadas*, naturalizadas tambien, aunque en grado insuficiente para conservarse sin los cuidados del hombre. Algunas especies cultiva este sin desearlo, y son aquellas cuyas semillas se siembran con las de varias plantas útiles, resultando de ello que en los campos, jardines y huertas hay especies cultivadas, antiguamente venidas de fuera, y por lo comun consideradas como espontáneas.

La naturalizacion puede verificarse á pequeña ó grande distancia, viniendo la especie de un país próximo ó lejano, directamente ó por intermedio de los jardines. Facilitanse las naturalizaciones por diversas causas que contribuyen mas ó menos eficazmente al transporte de las semillas: el viento es la causa mas comun y general que produce la diseminacion de las especies en un país, aunque no á distancias muy grandes, fuera de él; los rios arrastran las semillas y las llevan muy lejos, depositándolas en terrenos capaces de hacerlas germinar, y los torrentes trasladan de las montañas á las llanuras algunas especies que se establecen pasageramente; las corrientes marinas pueden transportar las semillas á inmensas distancias, aunque inútilmente cuando las llevan á climas impropios ó demasiado lejanos para que aquellas conserven la facultad de germinar durante la travesía y la prolongada inmersión en el agua del mar; los hielos flotantes de las regiones septentrionales pueden igualmente transportar algunas semillas; los animales y en particular las aves contribuyen mucho á la diseminacion de las espe-

cies, conduciendo las semillas á distancias mas ó menos considerables de diversos modos; el hombre, finalmente, de mil maneras, voluntariamente ó sin quererlo, ha transportado y transporta hoy multitud de semillas en todas direcciones. Pero en cambio se oponen varios obstáculos á las naturalizaciones, porque las semillas no caen siempre en terrenos donde puedan germinar y despues de nacidas tienen que luchar las plantas con las condiciones del clima, el cual, siéndoles favorable, permitirá su propagacion, y sin embargo todavia las especies introducidas habrán de luchar nuevamente con las antes existentes en el pais, apoderadas del suelo, y con numerosas semillas depositadas en el mismo.

No es tan fácil, como pudiera creerse, el reconocimiento de las especies naturalizadas en un pais desde tiempos remotos, y al contrario se necesitan con frecuencia laboriosas investigaciones para que aquellas sean distinguidas de las *indígenas*, *originarias* ó *nativas* del mismo pais. Estas investigaciones pueden ser *históricas*, *lingüísticas* ó sea fundadas en los nombres vulgares, particularmente de los antiguos idiomas, y *botánicas* ó sea *científicas*. La *Geografía botánica razonada* de Alfonso Decandolle contiene muy interesantes pormenores sobre esta materia y aplicaciones prácticas respecto de muchas especies naturalizadas unas á pequeña y otras á grande distancia, pudiendo verse en la misma obra las especies naturalizadas en Europa, principalmente despues del descubrimiento de América. Tambien Europa ha suministrado especies que se han naturalizado en América, y la comparacion de las regiones tropicales del antiguo y del nuevo mundo demuestra el cambio reciproco de especies que se ha verificado entre unas y otras; pero resulta haber recibido mas especies el antiguo mundo del nuevo, que este del anterior, aun cuando el número de especies naturalizadas en ambos es insignificante con relacion á la asombrosa riqueza que presentan las floras de las regiones tropicales.

A pesar de las causas diversas que facilitan las naturalizaciones, no son estas efectivamente en tanto número como pudiera esperarse, sobre todo desde que existen muchos jardines con multitud de especies procedentes de las varias regiones del globo. Es muy notable que muchas plantas exóticas se hagan espontáneas en los jardines botánicos, y que sin embargo no traspasen los limites de ellos, hallando fuera obstáculos bastante poderosos para impedir la naturalizacion, é igualmente han fracasado casi siempre los ensayos hechos, esparciendo mas ó menos lejos de los jardines muchas de las semillas de tales plan-

tas. Es verdad que pudieron no haberse elegido convenientemente, descuidando buscar las de países análogos al en que se hayan practicado los ensayos, siéndolo respecto de España las Californias y Chile, y por otra parte ofrecen mas probabilidades de naturalizarse las especies cuya habitacion es muy extensa, y las acuáticas ó que viven en terrenos húmedos, así como las de los escombros y campos cultivados. Por el contrario las especies leñosas y particularmente los árboles, las propias de las montañas, las que viven en los bosques y las muchas cuya habitacion originaria tiene estrechos límites, se naturalizan con grandísima dificultad, existiendo además familias enteras sin ejemplo alguno de naturalizacion, dando á esta palabra el significado arriba expreso, y que en rigor excluye las cultivadas por cuanto estas no viven sin los cuidados del hombre.

Pueden estrecharse los límites de algunas especies en ciertas circunstancias, como lo saben muy bien los botánicos acostumbrados á herborizar en algun territorio y que conocen la historia del mismo con respecto á los vegetales. La desaparicion de una ó mas especies generalmente se puede explicar por los cambios producidos á causa de los trabajos del hombre en la naturaleza de las estaciones, ó sitios que exigen aquellas, desecando pantános, talando bosques, desmontando terrenos, etc. En los países frios y húmedos la destruccion de un bosque ocasiona por lo comun la formacion de turba y esta impide la reproduccion de las especies leñosas, como se ha visto repetidas veces en el nordoeste de Europa y tambien en las montañas de Suiza. La intemperie de los climas y la incuria del hombre han contribuido á preparar circunstancias favorables para que la turba fuese en aquellos países la sepultura de algunas especies arbóreas, que han desaparecido en distritos mas ó menos extensos.

El origen de las especies generalmente cultivadas es difícil de averiguar en muchos casos, y para encontrar la verdadera procedencia de las que están sometidas al cultivo desde tiempos antiguos son por lo comun necesarias muchas investigaciones históricas, lingüísticas y botánicas, como sucede respecto de todas las plantas mas ó menos completamente naturalizadas. En compensacion este género de estudios proporciona conocimientos tan importantes como curiosos y conduce á resultados las mas veces satisfactorios, como puede verse en la *Geografia botánica razonada* de Alfonso Decandolle, donde se hallan numerosos pormenores que interesan igualmente á los botánicos y agrónomos, debiendo tambien merecer el aprecio de los eruditos.

En virtud de la naturalizacion á grande distancia pueden quedar los individuos de una misma especie separados por el intermedio de vastos territorios ó de extensos mares. Pero existen especies, que lejos de haberse naturalizado son originarias de paises distantes ó por lo menos separados de modo que el transporte natural haya sido imposible en el actual estado del globo, atendida la estructura de las semillas ó la manera de vivir las plantas. Tales especies se llaman *disjuntas* ó *desunidas*, calificándose del mismo modo los géneros y familias, que se hallan en igual caso, y tambien las áreas se dicen entonces *discontinuas* en contraposicion de las *continuas* ó no interrumpidas. Entre las especies desunidas se encuentran algunas leñosas con semillas gruesas y que no habitan en las costas, bastantes acuáticas y varias de las altas montañas, además de otras pertenecientes á diferentes regiones. Sin embargo, el número de todas ellas no es muy considerable, y estudiándolas en particular, se tiene que atribuir á la distribucion primitiva de las especies, conforme al estado del globo en el mismo tiempo, todo cuánto en la actualidad sería inexplicable respecto de las especies mas desunidas.

CAPITULO X.

ESTADO ANTERIOR Y ORIGEN PROBABLE DE LAS ESPECIES.

Cuanto mas se reflexiona sobre la distribucion actual de las especies espontáneas, mayor certidumbre se adquiere de haber existido anteriormente otra conforme á las causas contemporáneas de ella, y que han sido modificadas en épocas sucesivas. Condiciones de clima diferentes, otra division física de los territorios, diversos medios de transporte han influido en la distribucion actual de los vegetales, sin destruir por completo los resultados de la primitiva y del antiguo estado de las especies.

En efecto, se hallan ciertas especies en una sola region, pudiendo existir en otra por lo que toca á las actuales condiciones del clima; encuéntranse en algunos paises grandes masas de plantas leñosas, que hoy no se establecen allí del mismo modo, y como los climas apenas han variado en los tiempos históricos, deben suponerse aquellas anteriores al hombre; existen á la vez varias especies con semillas gruesas y otras que se naturalizan difícilmente en paises distantes ó separados por obstáculos que impiden en la actualidad el transporte natural de las semillas; muchas especies son comunes á elevadas monta-

ñas que se hallan á grande distancia, ó se encuentran igualmente en las montañas y en países septentrionales muy lejanos de ellas; hay bastantes plantas acuáticas y otras de terrenos pantanosos ó algo húmedos que crecen en regiones muy apartadas; viven ciertas especies simultáneamente en regiones distantes y separadas por el mar con clima bastante diferente hoy para creer á primera vista que pudiera verificarse esto, y al contrario existen especies muy diferentes y abundantes en territorios próximos y con clima análogo; países hay que son notables por el número de especies y géneros, así como otros en igual extension presentan una notable pobreza; finalmente, no guarda proporcion respecto de muchas plantas su extension geográfica con los medios de transporte y la manera de vivir que les son propios.

Todo inclina á creer que las especies vegetales actualmente existentes en la superficie del globo, ó por lo menos la mayor parte, son muy antiguas y anteriores á muchos de los cambios, que este ha experimentado. Nada hay que sin dejar dudas pruebe la frecuente renovacion de formas, y al contrario la estabilidad de las específicas está demostrada directamente desde tiempos históricos muy antiguos, puesto que las especies, figuradas ó conservadas en los mas antiguos monumentos de Egipto, no difieren de las actuales. Es dudoso el estado simultáneo del globo en cada época geológica, ó por lo menos en cada siglo de la misma, debiendo por tanto admitirse como posible que una especie cualquiera de las desaparecidas durante las épocas geológicas mas ó menos largas y próximas á la presente, se haya conservado por mas tiempo en algun territorio hoy ignorado ó quizá sumergido: nada tampoco parece oponerse á que una especie hubiese perecido en una region, extendiéndose á la vez y prolongando su existencia en otra. Estas y otras consideraciones hechas en particular sobre los efectos de las inundaciones obligan á creer que las especies actuales tengan mucha antigüedad y principalmente las marinas y acuáticas, las que subsisten en los terrenos inundados, las dotadas de semillas cuya facultad de germinar dura mucho, y las que pueden soportar climas diferentes, hallándose actualmente y con visos de certidumbre desde tiempos antiguos en países muy lejanos. Por consiguiente es muy probable que semejantes especies hayan atravesado algunas épocas geológicas anteriores á la actual, no obstante los últimos trastornos locales y sucesivos de la superficie del globo. Además la indudable y extraordinaria antigüedad de muchos árboles, cuya existencia supone la de otros

anteriores de bastante edad, conduce de generacion en generacion á tiempos remotisimos en que vivian especies iguales á las actualmente existentes; el exámen de los antiguos depósitos de turba en que se hallan huesos de mamíferos perdidos antes de los tiempos históricos ha permitido reconocer troncos de árboles, frutos y semillas pertenecientes á varias de las especies que vegetan en la actualidad; los bosques submarinos están formados de árboles no diferentes de los actuales y sumergidos en época de que no hay recuerdos históricos, aun cuando no sea de mucha antigüedad geológica. Resulta nuevamente ser muy probable la antigua existencia de varias especies vegetales, que no han sido destruidas por diferentes revoluciones del globo, las últimas á lo menos, y que han precedido al hombre. Pero se ignora si todas las especies actuales aparecieron simultáneamente ó en épocas sucesivas, y en este caso si las nuevas especies derivaron de las antiguas ó fueron todas creadas sucesivamente, ó en fin, si unas fueron creadas en ciertas épocas y otras derivadas.

Como quiera, cada vez aparece mejor demostrada la necesidad de recurrir á causas anteriores para explicar cumplidamente muchos de los hechos relativos á la actual distribucion de los vegetales. Estas causas, enumeradas por Alfonso Decandolle, son: la edad relativa de las especies; su primer modo de formacion y repartimiento; las modificaciones que hayan podido experimentar en su forma y naturaleza; los cambios realizados antes de la época geológica actual en la forma de las superficies y tambien en los climas.

Conviene ante todo fijar claramente qué debe entenderse por especie, cosa fácil á primera vista y en realidad no exenta de dificultades. Los botánicos dán generalmente á la semejanza de los individuos mayor importancia que á la sucesion de los mismos para definir la especie; los zoólogos por el contrario se atienen principalmente á la sucesion, considerando la semejanza como condicion secundaria; algun zoólogo y botánico colocó al mismo nivel los caractéres de reproduccion y semejanza. Estas diferencias están de acuerdo con la naturaleza particular de cada uno de los reinos vegetal y animal; pero respecto del primero y teniendo además en cuenta que de la semejanza depende la posibilidad de la reproduccion habitual é indefinidamente fecunda entre seres orgánicos reputados de la misma especie, cree Alfonso Decandolle que esta es toda *coleccion de individuos, que son bastante semejantes para tener caractéres comunes, numerosos é importantes y continuados durante mu-*

chas generaciones bajo el imperio de circunstancias variadas; que teniendo flores se fecundan reciprocamente con facilidad y dán semillas casi siempre fértiles; que se comportan respecto de la temperatura y demás agentes exteriores de una manera semejante ó casi semejante; que se asemejan en una palabra como las plantas análogas por su estructura, y de las cuales sabemos positivamente haber procedido de un origen comun, despues de considerable número de generaciones. Las especies vegetales son aquí consideradas tales como se nos presentan en la época actual y con los datos suministrados por la observacion de algunos siglos, independiente-mente de las hipótesis que puedan admitirse sobre la transmutacion de formas bajo el influjo de un tiempo extremadamente largo y de causas hoy desconocidas, así como sobre la existencia primitiva de individuos únicos ó múltiples.

Los cambios que actualmente experimentan las especies no las alteran esencialmente, aunque modifiquen mas ó menos sus órganos y propiedades fisiológicas. La manera como se conservan y propagan las modificaciones de que son susceptibles muchas especies, sirve de base á la distincion de las *variaciones*, *monstruosidades*, *variedades* y *razas*, estudiadas ya en la Organografia y Fisiologia. El estudio de las razas hace reconocer la posibilidad de formas nuevas, hereditarias, que derivan de las específicas ó que hayan derivado antes de ahora; pero estas modificaciones son difíciles respecto del mayor número de especies, particularmente sin la intervencion del hombre, y además en el estado natural tienen poca probabilidad de propagarse, siendo por tanto indudable la existencia de numerosas causas que tienden á conservar las especies actuales, oponiéndose al aumento de las formas nuevas.

Acaso en época anterior á la contemporánea del hombre por efecto de un tiempo muy largo y de condiciones diversas de las actuales pudieron derivarse de las especies espontáneas con mayor facilidad razas, cuya prolongada permanencia las haya constituido en especies reconocidas hoy como diferentes entre sí y distinguibles del tipo primitivo, cuando este no se haya perdido. Es un hecho que hay razas espontáneas, extremadamente antiguas, aun cuando al particularizar difieran á veces los botánicos en tomarlas como tales razas ó como verdaderas especies, y de todos modos ninguno pone en duda la posibilidad de que hayan llegado á nosotros y se conserven en fuerza de ser hereditarias. Como las especies anuales cuentan mas antigüedad que los estudios de los naturalistas, y como muchas

de ellas son probablemente anteriores al hombre, no hay dificultad en asegurar que hubo tiempo suficiente para que experimentasen modificaciones con el grado de permanencia capaz de originar razas muy caracterizadas, algunas de ellas tenidas hoy por especies. El aislamiento por haberse convertido continentes en islas ó en archipiélagos pudo favorecer la duracion y consolidacion de los cambios de forma sobrevenidos en las especies así localizadas, y en algunos casos la destruccion de las variedades intermedias al cabo de mucho tiempo, separando las extremas, les hubo de dar carácter de razas con apariencia de especies y consideradas en algunos casos como tales. No obstante, las formas derivadas son probablemente menos numerosas que las formas específicas primitivas, segun lo hace ver Alfonso Decandolle, fundándose en importantes consideraciones.

Admiten algunos mayor variabilidad de las especies en ciertas épocas geológicas y en ciertos periodos de la vida de aquellas. Lo primero es una mera hipótesis ideada para facilitar la solucion de varias cuestiones paleontológicas, y que tiene contra si el ningun efecto producido en la variabilidad de las especies por los fenómenos geológicos contemporáneos ó poco distantes de nosotros. Lo segundo, sostenido recientemente por Lecoq en sus *Estudios sobre la Geografía botánica de Europa*, consiste en considerar las especies como variables particularmente en su juventud, sentando que los géneros cuyas especies varían hoy con facilidad son mas modernos que los demás, y suponiendo ser las actuales variedades unas especies en el estado de juventud, como antes fueron variedades de otras las especies generalmente reconocidas y de origen mas ó menos antiguo. Es en verdad una hipótesis ingeniosa y algun tanto fundada, principalmente en lo tocante á las razas, aunque contradicha en lo demás por diversos hechos, cuales son muchos que demuestran la grande variabilidad de las especies pertenecientes á los géneros, tenidos por mas antiguos, y las cuales conforme á la teoría debieran ser ordinariamente muy numerosas, cuando por el contrario esto deja de suceder con frecuencia.

Cualquiera que sea la manera de explicar la formacion de las especies actuales, es indispensable la primordial existencia de un grande número de ellas, cuya creacion fisicamente considerada no puede comprenderse á pesar de las hipótesis imaginadas, confirmandose así la necesidad de atribuirla á una Causa Suprema. Pero es dado examinar si las especies actuales partieron de uno ó muchos paises diferentes, si fueron creadas

en épocas sucesivas, y si tuvieron desde su origen un solo representante ó muchos.

Linneo creía que todas las especies habian salido de un solo punto de la tierra, extendiéndose desde él á los demás, opinion insostenible en el actual estado de los conocimientos por muchas razones, y porque sería imposible la existencia de una region bastante extensa con todas las circunstancias físicas necesarias para contener la multitud de vegetales diferentes, que crecen en las diversas partes del mundo. Buffon, tomando en consideracion lo elevado de la temperatura del globo en otro tiempo, dedujo que la vegetacion podria haber empezado en las regiones polares, propagándose hácia las ecuatoriales á medida que se verificaba el enfriamiento; pero si esto puede admitirse, tomando en conjunto largos periodos geológicos, no sucede lo mismo cuando se aplica á cada periodo, estando probado que hubo variaciones sucesivas y contrarias en la temperatura de cada zona, segun lo indican las vegetaciones de que presentan restos. Willdenow sostuvo, como antes lo habia hecho Zinn, que las especies habrian comenzado en las montañas y cordilleras primeramente abandonadas por las aguas, conforme á los antiguos sistemas geológicos, y cuando se sabe que muchas son posteriores á las llanuras, no hay para qué combatir tal opinion. Está hoy generalmente reconocido que los fenómenos de emersion y sumersion de las tierras han sido sucesivos y locales, pareciendo por consiguiente lo mas probable que hayan existido desde épocas geológicas muy antiguas varios centros de vegetacion, mas ó menos diferentes en cuanto al número, forma y posicion, así como en virtud de todo ello respecto al clima.

Supuesto que se han elevado sucesivamente sobre el mar diversas porciones de la superficie terrestre, parece lo natural que las especies se hayan presentado tambien en un orden sucesivo. Además los terrenos no habrán podido tener desde luego toda clase de vegetales, ya se supongan aquellos salidos de un estado de fusion, ya impregnados de materias salinas en el momento de su emersion por haber permanecido largo tiempo debajo de las aguas del mar: líquenes y musgos sobre las rocas, y plantas marinas en la arena, debieron constituir la primera vegetacion, siendo despues necesario mucho tiempo para que los terrenos permitiesen otra mas complicada. El exámen de los vegetales fósiles correspondientes á diferentes épocas demuestra que las antiguas formaciones son menos ricas en restos vegetales que la terciaria ó cuaternaria, y por otra parte se ob-

serva en la época de la hulla una grande semejanza entre la vegetacion de localidades muy lejanas, mientras que en épocas mas recientes hay especies propias de cada region, siendo muy pocas las comunes: la uniformidad de la vegetacion correspondiente á la época de la hulla es indicio del corto número de especies entonces existentes, y la diversidad en épocas mas recientes demuestra un aumento de aquellas, habiendo mas aparecidas que desaparecidas.

Pudo haber existido primitivamente un solo individuo de cada especie vegetal ó un par con sexos separados; acaso hayan sido muchos los primitivos individuos; tambien es posible que haya sucedido lo primero respecto de unas especies y lo segundo respecto de otras: todas estas opiniones tienen defensores. El origen único presenta dificultades bastante graves, que no ofrece el múltiple; pero admitiendo la primitiva existencia de muchos individuos de cada especie vegetal, puede suponerse que las plantas de organizacion sencilla, mas extendidas hoy en todo el globo, hayan empezado por mayor número de individuos y mas dispersos que las de organizacion complicada.

Parece probable que algunas especies lleguen á extinguirse independientemente de las circunstancias exteriores y de las revoluciones geológicas. Hay, en efecto, unas cuantas especies con área muy corta, otras cuya extensa área se ha ido estrechando, y tambien las especies disjuntas pueden haber tenido continua y por consiguiente mas extensa su área en una época anterior, histórica ó geológica; además se sabe que algunas plantas cultivadas no se hallan en estado salvaje, pareciendo estinguidas como espontáneas. Pero en todo caso la extincion de las especies es sumamente lenta y en extremo limitada, alcanzando solamente á ciertas plantas, mientras que las razas se pierden con mayor facilidad por la accion de causas exteriores ó en virtud del cruzamiento entre las de una misma especie: el aislamiento es el mas eficaz medio de conservacion de las razas.

CAPITULO XI.

HABITACION DE LOS GÉNEROS Y SUS ÁREAS.

Es indudable que cada género se halla en alguna parte de la tierra, faltando en el resto, y es igualmente cierto que esto no siempre puede explicarse conforme á las circunstancias actuales, debiendo tomar en cuenta las anteriores al estado presente del globo y á la existencia de los seres orgánicos de nuestra época,

si ha de darse solucion á las varias cuestiones que sobre la distribucion de los géneros se ofrecen de ordinario.

Los límites geográficos de cualquier género se hallan demarcados por la mar ó dependen de los límites de especies que le corresponden, las cuales pueden extenderse unas mas y otras menos, quedando el género así circunscrito por una línea irregular, sea en las llanuras ó en las montañas. Puede suceder que la irregularidad de los límites no sea considerable en fuerza de la analogía de las especies; pero son numerosas las excepciones, viéndose frecuentemente especies que se extienden hasta latitudes ó alturas muy distantes de las que alcanzan las demás especies del mismo género, no siendo siempre por esta razon exacto indicio del clima la existencia de tal ó cual especie de un género.

Hay géneros cuyas habitaciones están interrumpidas por extensos espacios, hallándose una parte en el hemisferio boreal y otra en el austral con intermedio de la zona tórrida, ó estando separadas las especies por el Atlántico en unos casos y por el Grande Océano en otros. Los géneros son *disjuntos* ó *desunidos* con mayor frecuencia que las especies y sin ofrecer bajo este punto de vista tanto interés como ellas, aun cuando pudiera suponerse que el área de los géneros, antiguamente muy vasta, haya sido interrumpida á consecuencia de ciertas revoluciones geológicas.

Suelen hallarse en cada pais las especies del mismo género agrupadas en determinadas estaciones ó sitios, porque así lo exigen las analogías orgánicas y fisiológicas de las especies congéneres, y cuando es habitual el agrupamiento resultan de ello *géneros sociales*, ó cuyas especies siempre viven asociadas, así como se ha visto que existen especies cuyos individuos se hallan igualmente asociados.

La mayor ó menor difusion de un género en su habitacion puede considerarse con respecto á las especies ó relativamente á los individuos. Las especies de varios géneros se condensan en ciertos paises y se difunden en otros; géneros hay tambien cuyas especies se hallan casi todas agrupadas en una region, siendo pocas las dispersas fuera de ella; algunos géneros están distribuidos con uniformidad, y esto es bastante raro, aunque no suele llamar la atencion; otros géneros con escaso número de especies las tienen esparcidas en diversos paises: lo general es la reunion de muchas especies en una sola region. En cuanto á los individuos es de creer que tengan mayor número de ellos las especies excéntricas que las agrupadas, suponiendo

las primeras mas robustas por el hecho de ser su habitacion mas extensa.

En un pais cualquiera la frecuencia relativa de los géneros depende del número de las especies, así como de su difusión en diversas localidades, y del número de individuos de cada especie ó sea de la proporcion de las especies comunes respecto de las demás. Por consiguiente cuando se dice que un género es comun en algún pais, podrá entenderse que tiene muchas especies, ó que estas son comunes, y tambien habrá lugar á creer que muchas de las especies son comunes ó crecen en diversas localidades y estaciones, de modo que se repitan frecuentemente sin dominar en parte alguna.

El área media relativa de los géneros podria ser calculada como la de las especies, si el estado actual de la ciencia permitiese obtener resultados importantes respecto de todas las familias. La comparacion del área de los géneros con la de las especies, hecha en algunas de las familias mejor estudiadas, valuando la extension de cada área por el número de regiones, conduce á establecer que en condiciones iguales cuanto mas numeroso en especies sea un género, tanto mas considerable es su extension geográfica, debiendo advertirse que esta no es la única ley existente. Parece muy probable que los géneros menos homogéneos, ó sean los naturalmente divididos en subgéneros, tengan su habitacion mas extensa, porque verdaderamente debe contribuir á ello la mayor diversidad de las especies, de la cual hasta cierto punto es indicio el número. Pero la multiplicidad y la diversidad de los elementos del género no son las únicas causas que influyen en su existencia, dependiendo además de la naturaleza propia de las especies, segun lo manifiesta el no aumentar siempre el área de los géneros en igual proporcion con el número de las especies. Tambien parece que el área media de los géneros depende en parte del área media de las especies que los componen, aun cuando no dejen de presentarse hechos en contrario, y como quiera es de ordinario mas influyente el número, ó mas bien la diversidad de las especies. En fin, debe tomarse en cuenta que la distribucion de los géneros ha experimentado alteraciones desde su origen en virtud de muchos trastornos geológicos, capaces de modificarla y cuyo influjo no puede desconocerse en la actual.

Como el área de los géneros guarda relacion con la de las especies, no debe extrañarse que ofrezcan las mismas diferencias segun las clases ó grupos superiores, familias y paises á que pertenecen. Por esta razon los géneros de las criptógamas

deben tener mayor extension que los de las fanerógamas, y los de las monocotiledóneas tambien mayor que los de las dicotiledóneas; asimismo los géneros de la Flora del Cabo de Buena-Esperanza ó de Nueva-Holanda se extienden menos que los de la de Europa, y los de la Flora boreal ocupan mayor área que los de las regiones templadas de nuestro hemisferio, etc.

Hay géneros cuya área es muy basta, mientras que otros la tienen reducidísima, encontrándose solamente en algunas islas pequeñas, y esto se halla por lo comun en armonía con el número grande ó pequeño de las especies propias de cada género: pero el no suceder siempre lo mismo viene á confirmar el influjo ejercido en la distribucion actual por causas anteriores á nuestra época.

Al tratar del área de las especies se ha indicado que la media absoluta de las mismas, calculada por Alfonso Decandolle, es $\frac{1}{150}$ de la superficie terrestre, que equivale á 0,0067. Partiendo de este dato y de otros fundados en la relacion que existe entre el área media de las especies y la de los géneros, cree el mismo Decandolle que el área media absoluta de los géneros es 0,04, ó acaso mejor 0,05 de la superficie terrestre, aproximándose á este número las fanerógamas principalmente.

En la actualidad no se forma, ni se destruye género alguno: lo primero es hoy incomprensible, aun cuando se exagere mucho la variabilidad de las formas específicas, y lo segundo no fuera fácil, debiendo para ello perecer diversas especies. Pero la habitacion de los géneros es susceptible de modificarse en su extension por el transporte de las especies de unos paises á otros, bien que el número de ellas siempre permanezca mayor en la patria primitiva del género.

CAPITULO XII.

HABITACION DE LAS FAMILIAS Y SUS ÁREAS.

Causa sorpresa que haya familias exclusivas de paises determinados sin existir en la organizacion de las mismas nada que lo exija, cuando trasladadas á otros climas pueden vivir y prosperar como en el de su patria. La actual distribucion de las familias, como la de los géneros, no puede explicarse completamente por las causas presentes, y es menester buscar en las anteriores un influjo cuyos resultados alcancen hasta nuestra época.

Toda familia presenta limites extremos establecidos por los

de las especies correspondientes á los géneros, que se hallan en cada isla ó continente, siendo necesario por tanto recorrer el total perímetro, si han de examinarse las causas que impiden á las especies traspasar tales límites. Debe advertirse que á pesar de ello existen muchas familias cuyos límites ofrecen bastante uniformidad, conforme á la condicion predominante de los climas, cual es la temperatura; pero tambien sucede que estas mismas familias presentan especies excepcionales, cuya habitacion no puede explicarse como exclusivamente dependiente del clima.

No es raro que los géneros y especies de una misma familia se agrupen en determinadas estaciones ó sitios, porque las analogias orgánicas y fisiológicas sean bastante fuertes para motivarlo, y de ello resulta la existencia de *familias sociales*, así llamadas por vivir asociados sus elementos constitutivos, como pueden hacerlo las especies de un género y los individuos de una especie.

La difusion de las plantas de una familia debe ser examinada relativamente á los géneros, especies é individuos. Cada género tiene su habitacion propia en alguna parte de la habitacion general de la familia, pudiendo hallarse las de los géneros alejadas ó aproximadas, contiguas ó separadas, y por consiguiente cada familia diversamente difundida. Hay familias cuyos géneros en su mayor parte pertenecen á un continente ó dos, donde se hallan agrupados, estando esparcidos en otros los demás géneros; varias familias tienen casi todos sus géneros en un continente y pocos esparcidos fuera de él; las familias cuyos géneros se hallan distribuidos uniformemente no son muchas al parecer; algunas familias *disjuntas* ó *desunidas* causan extrañeza por comprender dos géneros situados á largas distancias. Respecto de las especies de cada familia es de suponer que se encuentran mas aproximadas en una ó muchas regiones, que en las restantes de la habitacion general; y por lo comun las que ocupan mayor extension son las próximas á los límites de la familia y de ordinario las mas robustas, así como hácia el centro, ó en él, están las especies cuya habitacion es pequeña. Por lo que toca á los individuos de una misma familia merece notarse que por ser las especies de la circunferencia de la habitacion las mas robustas, estas deben hacerse mas comunes, compensándose así la falta de las especies y géneros en la proximidad de los límites.

Es en todo pais la frecuencia relativa de las familias dependiente del número de los géneros y tambien del de especies, así

como de su extension en las diversas partes del territorio y de la frecuencia de los individuos de cada especie, ó aproximadamente de la proporcion de las especies comunes con relacion á las demás en cada familia. Generalmente se toma la proporcion de las especies como medida de la importancia relativa de las familias, sin tomar en cuenta las demás condiciones, cuya influencia, no obstante, es indudable en varios casos. Efectivamente, el número de los géneros dá lugar á la frecuencia de las especies, porque la diversidad de formas genéricas aumenta la probabilidad de que una familia se halle representada en muchos sitios, prefiriendo cada género determinadas estaciones. Tambien es atendible la extension de las especies en diversas partes del territorio, cuando esta sea algo considerable, pudiendo entonces suceder que algunas familias abunden mucho en unas partes y escaseen en otras. Merece igualmente tomarse en cuenta la frecuencia de los individuos de cada especie en el conjunto del territorio, la cual ofrece mucha importancia, en cuanto compensa no pocas veces la escasez de las especies. Finalmente, cuando se comparan dos ó mas paises respecto de su vegetacion, es menester considerar superficies próximamente iguales, supuesto que de lo contrario se obtienen resultados numéricos, bastante lejanos de la conveniente exactitud.

El área media relativa de las familias debe ofrecer analogía con la de los géneros, aunque estos sean grupos menos numerosos, y por consiguiente puede establecerse que cuanto mas numerosa en especies y géneros diferentes sea una familia, tanto mas extensa será por lo comun su habitacion, y que entre las familias con número de géneros y especies próximamente igual, hay diferencias cuyas causas en mucha parte se remontan á un orden de cosas anterior al actual estado de los climas y de los continentes.

Algunas familias ocupan total ó casi totalmente la superficie terrestre, teniendo representantes en las regiones que mas se diferencian en clima. Por el contrario hay otras familias, que se hallan solamente en una, dos ó tres regiones cuando mas, siendo por término medio su habitacion la vigésima parte de la superficie terrestre, y es de notar la influencia que en ello ejerce el número de los géneros y especies. Las criptógamas y las monocotiledóneas generalmente presentan familias con área muy extensa, y entre las dicotiledóneas se hallan las familias con área mas limitada.

No puede determinarse con todo rigor el área media absoluta de las familias, aunque hay medios de llegar á un resulta-

do aproximado, cual lo ha obtenido Alfonso Decandolle, fijando el área indicada en 0,5 de la superficie terrestre.

Nada hay que demuestre la formación actual de nuevas familias, aun cuando se exagere extremadamente el cambio de formas específicas, ni tampoco es fácil que desaparezca de la vista del hombre familia alguna del reino vegetal. La habitación de muchas, principalmente bajo el influjo del hombre, pudo haberse extendido á consecuencia de las naturalizaciones; pero de todos modos la actual distribución de las familias muy poco ha variado en un larguísimo transcurso de años, presentando todavía los efectos del estado anterior á la presente época geológica.

CAPITULO XIII.

MANERA DE CARACTERIZAR LA VEGETACION DE CADA UNO DE LOS PAISES, Y COMPARACION DE ELLOS BAJO DIVERSOS ASPECTOS.

Los caracteres de la vegetacion de un país son relativos á la proporcion en que se hallan las plantas pertenecientes á los diversos grupos naturales y á otros fundados en consideraciones de poca importancia botánica, aunque dignas de llamar la atencion al estudiar los vegetales geográficamente.

Todavía no se hallan bastante conocidas las *criptógamas* y su *proporcion con las fanerógamas*, particularmente fuera de Europa, para que bajo este punto de vista puedan ser caracterizados los países, y además ni las especies de las *criptógamas* están bien definidas, ni su estructura, aspecto y estaciones se prestan á ser útilmente comparadas con las de las *fanerógamas*.

Es lo comun que se mire con interés la *proporcion de las dicotiledóneas y monocotiledóneas*, y sin embargo pocas veces se determina con exactitud, sin tener por otra parte toda la importancia que se le suele dar. La falta de exactitud depende de que hay familias numerosas de las *monocotiledóneas*, tales como las *ciperáceas* y *gramíneas* en unos países, y las *orquídeas* en otros, que se descuidan, resultando de esto un número total demasiado bajo; tambien se origina aquella falta de ser el área de las *monocotiledóneas* mas vasta que la de las *dicotiledóneas*, y por consiguiente los números de unas y otras desigualmente proporcionados en territorios de diversa extension: esto último se puede eludir comparando países de extension próximamente igual. Pero las *monocotiledóneas* comprenden

familias demasiado diferentes para que se puedan considerar en conjunto como un elemento homogéneo que influye en la vegetación de un país en razón del número de las especies, comparado con el de las dicotiledóneas, y de aquí se origina la poca importancia de tal proporción, á no ser que se indiquen en particular las familias predominantes.

Influye bastante en el aspecto de la vegetación de un país la *proporción de las especies leñosas y herbáceas, la de las especies anuales, bienales, vivaces y leñosas, ó sea monocárpicas y policárpicas, la de las especies carnosas ó plantas crasas, la de las especies con hojas compuestas, con hojas permanentes ó con ellas caedizas*. Aunque tales grupos distan de ser naturales, ofrecen importancia bajo el punto de vista geográfico, y en particular las plantas leñosas, principalmente los árboles, la tienen muy grande, como que convendría indicar la *extensión de los bosques*, y hasta la *de los terrenos cultivados, praderas, pantanos, etc.*, contribuiría indudablemente á dar idea de la vegetación de un país.

El *porte ó traza de las plantas* permite agrupar muchas de ellas, que por lo demás pueden diferir considerablemente, y esto se ha hecho algunas veces para representar la fisonomía de su vegetación. No obstante, tiene el inconveniente de que hay formas demasiado vulgares, que no dejan lugar á distinciones notables, así como otras formas escasean demasiado para constituir grupos de importancia.

En cuanto á la *proporción de las diferentes familias pertenecientes á las fanerógamas* en un país, se procede como si las especies de cada familia abundasen igualmente en individuos, donde quiera; pero sería preferible fundar el cálculo, tomando solamente el número de las especies mas comunes, si el fijar cuáles sean no presentase grandes dificultades. Por otra parte el área media de las especies varía según las familias y las regiones, de modo que basta considerar mayor espacio para que se agreguen diferentes especies de algunas familias, cuyas áreas específicas sean limitadas respecto de las correspondientes á otras familias, produciendo bastante inexactitud en los resultados. Se evita mucha parte del error, cuando se comparan países de extensión próximamente igual, y cuando se trata de familias en que las áreas medias de las especies no difieren en extremo. Algunas veces se prescinde de la proporción entre las familias de las fanerógamas, limitándose á señalar las regiones en que se encuentran reunidas muchas ó la casi totalidad de las especies de ciertas familias. En una palabra, respecto de las fa-

milias como capaces de influir en el aspecto de la vegetacion de un pais, puede notarse cuáles sean *dominantes* en virtud de la proporcion de sus especies y cuáles *características*, es decir, propias de la region que se considera, ó cuando menos mas abundantes que en cualquiera otra region, teniendo tambien importancia la *ausencia* total ó casi total de una familia, particularmente si las condiciones del clima no explican esta falta, y finalmente la *combinacion* de las familias merece además ser examinada, tomando en cuenta las tres, cuatro ó mas que dominen.

Hay igualmente *géneros dominantes* por el número de especies ó individuos, y *géneros característicos* en el mismo sentido que se ha manifestado relativamente á las familias. Entrar en mas pormenores por lo que toca á los géneros de cada pais, seria difícil y no ofreceria grandes ventajas.

Es demasiado considerable el número de especies en un pais cualquiera para que sea posible bajo el aspecto geográfico fijar la atencion sobre todas ellas. Basta señalar las *especies espontáneas mas comunes*, particularmente las arbóreas y las que dominan en las estaciones mas importantes, así como las *especies espontáneas algo notables y características*, mas ó menos abundantes en el pais sin existir en los próximos; tambien las *especies cultivadas*, que lo sean general y extensamente, deben tomarse en consideracion. El *número total de las especies* con relacion á la superficie del territorio ofrece bastante interés, y sobre todo el de las que son *propias* del mismo pais.

La *variedad ó la uniformidad de la vegetacion* constituye uno de los caracteres de la propia de cada pais, pudiendo existir variedad de formas en todos los distritos ú observarse diversidad de unos á otros. En este caso es menester distinguir zonas ó regiones diferentes, como se hace siempre que se trata de paises montuosos, donde se presentan diversos grados de elevacion. Cuando las formas vegetales se hallan mezcladas en toda la extension del pais, caben los cálculos estadísticos, averiguando el número de especies diferentes y despues su proporcion por género y familia. Pero el valor de estos números proporcionales decae considerablemente á medida que los paises comparados difieren mas en la extension, lo cual se reconoce sin dificultad y se demuestra en la práctica.

Naturalmente ocurre reparar las *semejanzas y desemejanzas entre la vegetacion de un pais y la de los paises análogos ó adyacentes y algunas veces bastante lejanos*. Puede haber semejanzas en cuanto á las especies, géneros y familias:

tanto las semejanzas como las desemejanzas tienen que ser respectivas á todos los caracteres de la vegetacion, cuyo valor relativo es diferente.

No son los caracteres numéricos, como manifiesta Alfonso Decandolle en su *Geografia botánica razonada*, los preferibles á todos los demás, aunque lo parezcan por la precision de su forma. Hay caracteres expresados en lenguaje comun y bajo la forma ordinaria que dan mejor idea de la vegetacion de un pais, prestándose tambien algunas veces á la exactitud numérica, que en tal caso debe aceptarse como del mayor interés. La *division general del suelo en pantanos, praderas, bosques, terrenos salinos, tierras cultivadas, etc.*, representa muy bien el aspecto de la vegetacion y con una exactitud dependiente de los datos estadisticos que se posean sobre lo extenso de tales estaciones. En seguida es de importancia conocer las *especies mas comunes* en las estaciones que se extienden considerablemente, y en particular las *especies leñosas sociales* ó las que forman bosques, y no debe olvidarse la *indicacion de las especies agricolas* mas interesantes. Los *géneros principales*, las *familias dominantes* y las *familias características*, la frecuencia ó rareza de ciertas *categorías fisonómicas* constituidas por las *plantas crasas, las de hojas permanentes, etc.*, deben colocarse en este lugar. Corresponden al último los caracteres obtenidos, mediante las investigaciones hechas en los libros, como la *indicacion de las especies raras, la proporcion de las monocotiledóneas y dicotiledóneas, el número total de las especies, géneros y familias, el de las especies propias del pais, y el número medio de especies por género y familia*. Por lo que toca á las *analogías y desemejanzas* entre la vegetacion de diversos paises, es variable la importancia segun los caracteres sobre que las mismas versan, y en muchos casos obligan á suponer entre los paises comunicaciones anteriores á la actual época geológica.

Quando se comparan entre sí diversos paises, se reconoce lo mucho que varía la proporcion de las dicotiledóneas y monocotiledóneas, aunque los paises tengan una extension próximamente igual: corresponden á 100 fanerógamas, tomando en conjunto toda la superficie de la tierra, 83 dicotiledóneas y 17 monocotiledóneas, proporcion de la cual difieren mas ó menos las que resultan de comparar entre sí diversas porciones de la superficie terrestre. Pero en general, respecto de las regiones templadas de ambos hemisferios, la proporcion de las dicotiledóneas aumenta y la de las monocotiledóneas disminuye, acer-

ecándose al Ecuador, aunque no faltan modificaciones debidas á influencias secundarias, y por esta razon debe ser advertido que con análoga temperatura los países húmedos tienen las monocotiledóneas en mayor proporcion y las dicotiledóneas en menor, mientras que en los secos sucede lo contrario. En los terrenos montuosos se observa frecuentemente que la proporcion de las dicotiledóneas aumenta á medida de la altura, disminuyendo por consiguiente las monocotiledóneas, lo cual se explica por la menor humedad de las regiones elevadas.

Sería demasiado larga la indicacion de las familias predominantes por el número de las especies en todos los países del globo, bastando consignar aqui brevemente algunos de los principales resultados que de tal exámen ha obtenido Alfonso Decandolle. Hay en cada país un cierto número de familias cuyo conjunto constituye la mitad de las fanerógamas: son ocho ó nueve las familias que la componen en la zona templada, particularmente en Europa hasta los 60° de latitud, y basta para ello en las latitudes extremas hácia uno ú otro polo enumerar tres ó cuatro familias. Cuanto mas rica en especies es una Flora, absolutamente considerada, tantas mas familias de las numerosas es preciso juntar para comprender el número total de las fanerógamas; pero la extension del país influye en esto, porque con ella aumenta el número de las familias predominantes, que generalmente es reducido en las cúspides de las montañas y en las islas pequeñas, disminuyendo tambien en los países muy áridos. Son unas treinta y cinco las familias, que en cualquiera país ó en varios forman un 5 por 100 de las fanerógamas; once familias, consideradas de igual manera, representan de 10 á 19 por 100; las gramíneas llegan á variar desde el 18 hasta el 27 por 100; las compuestas alcanzan á constituir del 18½ al 27 por 100; finalmente, pasan del 30 por 100 en localidades excepcionales las compuestas y las ciperáceas. En las *regiones ecuatoriales y tropicales*, donde existen muchas familias desconocidas en las regiones templadas y que dán á la vegetacion un aspecto propio, dominan á pesar de todo las leguminosas, gramíneas y compuestas, siguiendo las rubiáceas y las orquídeas, como tambien las ciperáceas extendidas donde quiera, y las euforbiáceas, urticáceas, melastomáceas y escrofulariáceas, de las cuales solamente las melastomáceas son exclusivas de los países cálidos, abundando además en ellos los helechos siempre que haya humedad, como lo demuestran principalmente varias islas. En las *regiones templadas del hemisferio boreal* se observa una grande diversidad en la proporcion de las principales

familias á causa de los variados climas que hay, y por esta razon debe considerarse primeramente el centro de la zona templada, comparándolo despues con las partes meridionales y las septentrionales; pero sin entrar aquí en estos pormenores, es suficiente indicar que las familias predominantes en la mayor parte de los países templados de nuestro hemisferio son primeramente las compuestas, gramíneas, ciperáceas y leguminosas, siguiendo las crucíferas, umbelíferas y cariofileas, así como despues de ellas con menos constancia é importancia las labiadas, rosáceas y escrofulariáceas, mientras que las demás familias no llegan al 5 por 100, fuera de condiciones de localidad excepcionales, como los terrenos salinos respecto de las salsoláceas. En las *regiones polares*, ó sea en la *zona boreal*, bastan tres familias para comprender la mitad de las fanerógamas en las mayores latitudes, y son las gramíneas, crucíferas y saxifragáceas, viniendo en seguida las cariofileas, ranunculáceas, rosáceas y ciperáceas; pero en las latitudes que se aproximan á la zona templada hay alguna variedad respecto de las familias predominantes. En las *regiones australes* se observan considerables diferencias, que dependen principalmente de reinar en unas partes la sequedad y en otras la humedad, siendo necesario considerar separadamente las *regiones australes secas ó continentales* y las *regiones australes húmedas*, ó sean las *islas y promontorios angostos*: la familia de las compuestas domina extraordinariamente en las regiones australes secas, y sobre todo en las montañas de Chile, no tanto en el Cabo de Buena-Esperanza y bastante menos en Nueva-Holanda, siguiendo las leguminosas que sobresalen particularmente en Nueva-Holanda, donde figuran varias familias que le son peculiares; las gramíneas, ciperáceas, orquídeas y restiáceas aumentan al parecer en Van Diemen, disminuyendo las leguminosas, compuestas, y diversas familias como en otras de las regiones australes húmedas, tanto que en Nueva-Zelanda no figuran las leguminosas como dominantes, y no hay una siquiera en otras islas, mientras que las compuestas y gramíneas se acrecientan en razon de la distancia del trópico, elevándose tambien la proporción de las ciperáceas, y mas que todo es notable la preponderancia de los helechos en muchas islas de las regiones australes, incluidas algunas que pueden referirse al Africa, y las de Juan Fernandez próximas á Chile, dignas de atencion además por las muchas compuestas que poseen.

Es preciso tener presente que una familia puede ser característica de un país, cuando el número de especies de ella es

mayor que en cualquiera otro, y cuando la proporcion de las especies de la misma es mas considerable relativamente al conjunto de las fanerógamas, que en otras partes. Toda familia propia de una region es característica bajo ambos aspectos, y así lo son las tremandreas de Nueva-Holanda, las bruniaceas del Cabo de Buena-Esperanza y las cacteadas de América; pero sucede con mayor frecuencia que una familia tenga en diversas regiones las especies, hallándose estas principalmente agrupadas en una, dos ó mas de aquellas, sin presentarse necesariamente en proporcion notable respecto del total de las fanerógamas en cada una de las regiones; tambien puede acontecer que una familia se halle en proporcion considerable respecto de todas las fanerógamas, sin que el número de especies en la region sea mayor que en otra. Por lo que toca á las familias características ha dividido Alfonso Decandolle la superficie de la tierra en trece grandes regiones, expresando los centros de habitacion de las diversas familias y las relaciones notables de ellas respecto del conjunto de las fanerógamas; pero no es oportuno transcribir aquí tantos pormenores, que menoscabados perderian una parte principal de su interés.

La comparacion del número total de especies no puede hacerse útilmente entre paises diversos, cuando difieren demasiado en extension. Resulta de haberlo hecho con los datos mejor conocidos y de la manera mas próxima á la exactitud, que el número de especies en igualdad de extension aumenta desde los polos hácia el Ecuador, prescindiendo de algunas modificaciones locales debidas al influjo de las estaciones ó sitios dominantes, aunque la progresion es irregular por efecto de la sequedad reinante en algunos paises, distantes de uno ú otro polo, así como la humedad suele producir un aumento relativo. Es América mas rica en especies que el antiguo mundo, comparando iguales porciones de territorio, y esto se explica por dirigirse las cordilleras americanas de norte á sud, lo cual produce en cada latitud condiciones de clima muy diferentes; Africa presenta bastante pobreza de especies con excepcion de la parte meridional, donde el clima, sin ser muy variado, lo es mas que en lo interior; Nueva-Holanda no presenta tanta diversidad de especies como el Cabo de Buena-Esperanza. Las islas lejanas de los continentes, exceptuando las de la region boreal, tienen menos especies que los continentes ó las próximas á ellos, siempre que las condiciones sean iguales, é iguales tambien los territorios comparados; además hay islas muy pobres á causa de su formacion ignea ó madreporica, y otras lo son porque el

viento, el agua del mar ó los ardores del sol obran sobre ellas con demasiada intensidad.

Es muy irregular el aumento ó disminucion que experimenta el número de los géneros segun el de las especies en países de extension próximamente igual. La proporcion de las especies por género se presta mejor á las comparaciones, y en efecto se observa que es tanto mayor, cuanto mas vastos son los países considerados, y si estos tienen igual extension, aumenta ó disminuye la proporcion de las especies por género con el número total de las especies. La misma proporcion crece alejándose de los polos, aunque baja sensiblemente en Egipto y otros países, donde disminuye el número total de las especies, y una baja análoga sufren las islas.

El número de las especies y el de los géneros por familia depende del total de las especies, siempre que la extension de los países comparados sea próximamente igual. En cuanto al número de las familias es de notar que de un país á otro, aunque sean desiguales, no difiere tanto como el de los grupos inferiores á causa de ser la habitacion de aquellas mas vasta. La vegetacion de un país puede ser pobre sin que deje de tener representantes de bastantes familias, existiendo á pesar de ello pocos y miserables individuos, escasez de formas análogas ó constante uniformidad en todos los distritos; cuando por el contrario resaltan la abundancia y belleza de los individuos, la multiplicidad de las formas especificas ó la diversidad en los distritos, sea que existan estas cosas aisladas ó reunidas, la vegetacion no puede menos de ser rica.

CAPITULO XIV.

DIVISION DE LA TIERRA EN REGIONES RESPECTO DE LA VEGETACION.

Los ensayos mas ó menos felices, que en los tiempos modernos se han hecho para dividir la tierra con respecto á la distribucion geográfica de los vegetales, han dado por resultado que se estableciesen regiones físicas, regiones botánicas, ó regiones físicas y botánicas á la vez.

La Geografia física ha sido la base en que Humboldt se ha apoyado, caracterizando las principales regiones del globo por su clima, dependiente de la distancia al Ecuador, la altura sobre el nivel del mar y las influencias locales de los mares y continentes, sin olvidar los caracteres mas principales de

la vegetacion de tales regiones. Pero las consideraciones puramente geográficas y físicas conducen al establecimiento de regiones inmensamente extensas, cuyas subdivisiones son bastante arbitrarias é ilimitadas, si han de fundarse tan solo en la extremada variedad de los climas.

Consideraciones esencialmente botánicas fueron el fundamento de las veinte regiones establecidas por Decandolle en el año de 1820, y conforme á las mismas bases, ó sea tomando en cuenta principalmente las especies propias de ciertos paises y su proporcion respecto de las mas difundidas, llegó á distinguir el hijo del mismo Decandolle en el año de 1830 una cincuentena de regiones. Cada una de ellas debiera ser un espacio en lo posible circunscrito por limites naturales, y en el cual las especies propias constituyesen á lo menos la mitad de todas las existentes; pero la completa adopcion de este sistema obligaria á distinguir demasiadas regiones y muy desiguales á causa de la extremada desigualdad del área de las especies en las diferentes partes del mundo. El camino seguido por los dos Decandolle tiene el inconveniente de estar trazado sin consideracion á varios hechos que caracterizan la vegetacion de un territorio mas ó menos extenso, tanto como las especies del mismo.

Tomó en cuenta Schouw un conjunto de caracteres botánicos para distinguir las regiones primeramente establecidas por el mismo, y de las cuales pronto dejó de estar satisfecho. La mitad por lo menos de las especies conocidas en la region deberian ser propias de ella; la cuarta parte de los géneros habria de estar en igual caso, ó por lo menos las especies de estos géneros deberian tener su maximum en la region y no existir fuera á no ser como representantes aislados; ciertas familias deberian ser propias de la region ó hallarse por lo menos en una proporcion excepcional. A falta de este último carácter bastarian los anteriores y particularmente los relativos á los géneros; pero de todos modos Schouw prescindia de la abundancia de las especies y de algunas otras circunstancias muy influyentes en el aspecto de la vegetacion.

Otros principios sirvieron á Schouw para fundar después la distincion de las regiones, establecidas según la temperatura media, las familias dominantes, los géneros principales, los árboles y arbustos mas comunes, y los principales cultivos. Dió por una parte demasiada importancia á la temperatura media, y por otra desechó los caracteres tomados de la proporcion de las especies y de los géneros peculiares de cada pais, además de haberse mostrado á veces algo arbitrario en las divisiones.

Denominó las regiones, recordando los géneros ó familias principales en unos casos, y en otros el nombre de algun botánico explorador de la region: así es que distinguió la region de las magnolias, la de las labiadas ó cariofileas, etc., la de Michaux, la de Thunberg, etc., siendo lo primero poco ventajoso y bastante arbitrario, así como lo segundo inoportuno y de ninguna manera preferible al uso de los nombres geográficos.

Posteriormente se han ocupado varios botánicos en trabajos mas ó menos semejantes á los que hicieron los Decandolle y Schouw, sea con aplicacion á determinadas familias ó respecto del territorio de alguna Flora, extendiéndose á consideraciones mas generales. Meyer en su *Geografía botánica* se limita á dividir el globo en zonas, cuales son la ecuatorial, las tropicales, subtropicales, etc.

La grande divergencia de los botánicos sobre la division de la tierra, conforme á la distribucion geográfica de las plantas, demuestra que se han establecido muchas regiones arbitrarias y por consiguiente distantes de ser naturales. No permite todavía el estado de la ciencia una rigurosa clasificacion botánica de los países, y que debiera establecerse tomando en cuenta causas de dos categorias; las circunstancias anteriores al orden actual, ó sea la primitiva distribucion de los vegetales y la sucesiva disposicion geográfica de las tierras; los climas existentes desde tiempos remotos, que distan del presente millares de años, y en general todas las variadas circunstancias de nuestra época, capaces de limitar, estrechar ó extender las formas vegetales en las islas y continentes, tales como hoy son. Una vez establecidas las regiones naturales, seria menester dividir las y subdividir las conforme á los caracteres de la vegetacion de un orden correspondiente, y segun las modificaciones propias de los climas y demás circunstancias fisicas.

Entre tanto no será inútil enumerar aqui las cincuenta regiones admitidas por Alfonso Decandolle.

1. Region ártica, comprendida entre el círculo polar y el polo ártico en Europa, Asia y América.
2. Europa templada (Europa menos Laponia, Península ibérica, Languedoc, Provenza, Italia, litoral del Adriático, Grecia, Rumelia y Crimea).
3. Region del Mediterráneo (Contorno de este mar, exceptuando Egipto y comprendiendo Portugal).
4. Islas Canarias, Madera, Azores.
5. Senegambia, islas del Cabo Verde, Sahara.
6. Guinea al norte del Ecuador y Sudan.

7. Guinea meridional (Congo, Benguela hasta la parte central del Continente).
8. Islas de Santa Helena y de la Ascension.
9. Cabo de Buena-Esperanza (Africa austral extratropical).
10. Islas de Tristan de Acuña.
11. Islas del Príncipe Eduardo, de Kerguelen, de San Pablo.
12. Islas Madagascar, Mauricio, Borbon, Seicheles, Comoras.
13. Mozambique y Zanguebar hasta la parte central del Continente.
14. Region del Mar Rojo (Abisinia, Cordofan, Nubia, Egipto, Arabia occidental).
15. Persia, region del Eufrates y Arabia oriental.
16. Cáucaso, Crimea, Armenia, Montes Talisch.
17. Tartaria (region baja al oriente del Mar Caspio).
18. Siberia desde los Montes Urales hasta Kamtschatka, y desde el círculo polar hasta los Montes Altais.
19. Asia central entre los Montes Altais y el Himalaya.
20. Cachemira, Cabul, Afganistan hasta las bocas del Indus.
21. Himalaya (vertiente meridional) ó sea Nepalia, Butan.
22. China y Japon.
23. Islas Filipinas.
24. Cochinchina (Annan, Cochinchina, Tonquin, Bankok).
25. Pais de los Birmanos y Asan.
26. Bengala y curso del Ganges.
27. Peninsula indica y Ceilan.
28. Archipiélago indico y Peninsula de Malaca (islas de la Sonda, Molucas, Borneo, Timor, Nueva-Guinea, Nueva-Irlanda).
29. Nueva-Holanda é islas Van-Diemen, Nueva-Zelanda, Nueva-Caledonia, Norfolk.
30. Islas Fidgi, de los Amigos, de la Sociedad, de las Marquesas, de Pascua.
31. Islas Marianas, Carolinas, Molgraves.
32. Islas Sandwich.
33. Islas Aleutianas y nordoeste de América, Oregon, Montañas roqueñas, Nueva-California.
34. Estados-Unidos (menos Tejas y Oregon), Canadá, Labrador, islas de Terranova y Bermudas.
35. Méjico, Tejas, California propiamente dicha, Goatemala, Yucatan.

36. Antillas (Cuba y Bahamas hasta la Trinidad).
37. Venezuela.
38. Nueva-Granada.
39. Perú.
40. Islas de los Galápagos.
41. Bolivia ó Alto Perú.
42. Guayanas.
43. Curso del Rio de las Amazonas y de los Rios Negro y Madeira.
44. Brasil nordeste (Marañon, Goyaz, Piaulhy, Ceara, Bahía).
45. Brasil occidental y Paraguay (Matogroso, Cuyaba, Paraguay, Chaco).
46. Brasil sudeste (Minas, Rio, San Pablo, Santa Catalina, San Pedro).
47. Uruguay y la Plata (Banda oriental, Buenos-Aires hasta Chile).
48. Chile é islas de Juan Fernandez.
49. Patagonia, Tierra del Fuego, islas Maluinas ó Falkland.
50. Archipiélago antártico de las islas Shetland, Nueva-Georgia, Sandwich australes, etc.

La tercera region, ó sea la mediterránea, comprende toda la Península hispano-lusitana, aunque esta presenta diversidad en los caracteres de la vegetacion del vasto y accidentado territorio, que bajo el influjo de variados climas se extiende desde los Pirineos hasta cerca de Africa. Es menester por consiguiente dividir la Península hispano-lusitana en algunas regiones particulares, cuales son la septentrional ó cantábrica, la central ó celtibérica, la del Duero ó galécica, y la del Tajo inferior ó lusitánica, ambas occidentales, la meridional ó bética, y la oriental dividida en punibérica y tarraconense. Todas ellas difieren mas ó menos respecto del clima, tomando en cuenta la temperatura, los dias de lluvia y la cantidad de agua que cae anualmente, y todas ofrecen en la vegetacion diferencias bastante marcadas. La region septentrional, botánicamente considerada, liga á la Península hispano-lusitana con la Europa templada; la region del centro con su clima continental es un tránsito á la mediterránea; la region oriental, punibérica y tarraconense, es propiamente mediterránea; la region meridional, sin dejar de ser mediterránea, toma el aspecto de africana; las dos regiones occidentales, mas húmedas y menos extremadas en su temperatura que la parte central y orientales corres-

pondientes, tambien tienen en su vegetacion algunos caracteres propios.

CAPITULO XV.

ORÍGEN PROBABLE DE LAS ESPECIES, GÉNEROS Y FAMILIAS DE DIVERSOS PAISES.

Los vegetales que componen la Flora de cada pais no constituyen un todo homogéneo en cuanto á la antigüedad y al origen de sus variados elementos, como pudiera creerse antes de reflexionar. Es la vegetacion actual de cada pais el resultado de una porcion de cambios geológicos y geográficos acaecidos despues de la creacion de las diversas familias, géneros, especies y quizá de algunas razas, debiéndose por tanto atender no solo á la distribucion primitiva de estos grupos, sino tambien á las modificaciones más ó menos numerosas, que hayan podido efectuarse en virtud de las circunstancias subsiguientes. La importancia del papel ejercido por las actuales influencias en épocas geológicas anteriores está reconocida desde que Lyell insistió en demostrarla, y las ideas del célebre geólogo inglés han llamado la atencion de algunos botánicos, impulsándolos á estudiar la vegetacion de diversos paises bajo el indicado punto de vista.

Fueron investigados por Forbes los orígenes de la Flora y de la Fauna de las islas Británicas, sirviéndose de los trabajos de Watson en cuanto á la primera, aunque este haya tenido por objeto la distribucion geográfica y no los orígenes de las plantas británicas. Algunas de las existentes en las montañas de Escocia y demás partes de la Gran-Bretaña son alpinas ó boreales, hallándose en el Continente europeo, sea en las montañas ó en el norte, y con mayor frecuencia en regiones septentrionales, tales como Escandinavia, Islandia, Groenlandia y Labrador. Estas especies, segun Forbes, deben datar de la época que siguió al terreno terciario plioceno y precedió á la nuestra, época aquella llamada hoy pleistocena ó cuaternaria. Durante mucha parte de la misma el mar de Alemania, extendido hasta cerca de los Alpes y de los Urales, cubria parcialmente las islas Británicas; los Alpes tenian su actual elevacion; el clima del noroeste de Europa era análogo al actual de América bajo las mismas latitudes; los ventisqueros llegaban hasta la orilla del mar, como ha sido comprobado, y los hielos flotantes podian transportar semillas y hasta plantas enteras. Parecióle á Forbes que debia suponerse un levantamiento posterior de las montañas británicas,

y adoptando Martins la idea principal, no considera necesaria la del levantamiento para explicar la uniformidad de la vegetacion; pero Hooker va mas lejos todavía, partiendo de ser Inglaterra el clima mas templado de todos los situados en igual latitud, y como 5° de diferencia le darian el clima del Labrador, conveniente á las plantas árticas, muéstrase inclinado á suponer una vegetacion bastante uniforme al rededor del indicado mar por la accion de causas naturales. Las especies podrian provenir de todo el litoral, como de todas las islas entonces existentes, y no hay razon para que unas especies dejasen de ir desde Escocia ó las islas de Feroe al Labrador, así como otras especies del Labrador ó de Escandinavia irian á Escocia, aunque entrar en pormenores sea muy difícil despues de tanto tiempo, y habiendo desaparecido probablemente en muchas localidades las especies por efecto de los cambios de clima.

No carecen de probabilidad las ideas de Forbes sobre el origen de las plantas alpinas de la Gran-Bretaña y se apoyan en datos geológicos, cuyo fundamento está reconocido, aunque haya divergencia en ciertos pormenores de un valor secundario. Por otra parte nada muestra que la yegetacion de las islas Británicas haya sido destruida desde la época indicada en las porciones emergidas: muchas de las plantas que entonces vivian en Escocia debieron ser semejantes á las de los Alpes y á las de Escandinavia, Labrador, etc., y aunque se suponga la pérdida de algunas y la venida de otras, no puede admitirse la desaparicion total de las anteriores, resultando ser muy creible que las especies árticas ó alpinas hoy existentes en la Gran-Bretaña sean restos de las que antes habia. La presencia simultánea de algunas especies en las islas Británicas y en el nordeste del Continente americano se explica bien de semejante manera, é igualmente se comprende, viendo así las cosas, cuánto tiene relacion con las especies disjuntas que viven en las cimas de los Alpes, Pirineos, montañas de Silesia y Escandinavia, así como en las llanuras árticas, no bastando la identidad de climas para que la haya de especies, y siendo improbables las creaciones de unas mismas especies á distancias inmensas.

Los levantamientos y la emersion de llanuras entre los Alpes, los Urales y los montes de Escandinavia disminuyeron sucesivamente la extension del grande mar de Alemania y Rusia, originando al mismo tiempo depresiones, causa de la formacion del Canal de la Mancha, que antes no existia, como se demuestra por los bosques en él sumergidos é implantados sobre terrenos cuaternarios. Así fué separada completamente la Gran-Bre-

taña de nuestro Continente al fin de la época cuaternaria y quizá muchos miles de años antes de la presencia del hombre en Europa; pero durante una série de siglos pudieron pasar fácilmente muchas especies de Francia á Inglaterra, y las partes orientales de la Gran-Bretaña, que se habian aumentado al mismo tiempo que Alemania y Holanda salian del mar, pudieron igualmente recibir las especies de los países adyacentes: unas debian ser ártico-alpinas y otras procedentes del este, apoderándose las últimas del terreno en mayoría por hacerse el clima contrario á las primeras. Tambien se puede suponer respecto de las especies que exigen un clima frio ó la vecindad de los hielos, haberse retirado poco á poco á las montañas de Escocia y Escandinavia, y á las cimas de los Alpes ó Pirineos, segun el clima iba dejando de serles favorable, mientras que muchas especies de igual origen y menos sensibles á la accion de un clima templado, debieron quedarse en las costas de Escocia, Inglaterra, Escandinavia, América ártica, é islas intermedias, esparciéndose á la vez en el norte de Alemania y Rusia á medida que la extension de la tierra firme aumentaba. De esta manera considera Alfonso Decandolle que muchas plantas no alpinas sean procedentes de la época glacial, como lo son las existentes hoy en las montañas, segun las ideas de Forbes, que tenia por demostrado haber ido de Alemania la mayor parte de las especies de la Gran-Bretaña.

No se extraña despues de tales explicaciones, la existencia simultánea de muchas especies en varios países hoy separados por el mar, cuando las circunstancias no sean favorables al transporte de las semillas. El exámen de las relaciones que existen entre la vegetación de Irlanda é Inglaterra confirma que las especies no están limitadas precisamente por el mar, y si algunas dejan de existir en uno ó otro lado del Canal de San Jorge, mas bien es á causa del diverso grado de humedad: faltan, no obstante, ciertas especies de Inglaterra en Irlanda, donde gozarian de clima acomodado, como tampoco allí se encuentran muchos reptiles existentes en Inglaterra y el Continente. Es opinion de Forbes que Irlanda se ha separado de la Gran-Bretaña antes que esta del Continente; pero los geólogos todavia no se hallan de acuerdo al parecer sobre ello. Llama mucho la atencion que en los distritos montuosos del sudoeste y del oeste de Irlanda haya una docena de especies notables, que asimismo crecen en el sudoeste de Francia y algunas en España, Portugal, Madera ó las Azores, hallándose á veces en varias de estas partes. Casi todas las indicadas especies son saxifragáceas, ericáceas y vac-

cinieas, que las corrientes actuales no podrian haber llevado á las montañas de Irlanda, siendo además las semillas impropias para que el mar las transportára; pero acaso Irlanda haya estado contigua á las Azores y Asturias, así como lo estuvieron probablemente los archipiélagos de las Canarias, Madera y Azores, admitiendo que la region del Mediterráneo haya experimentado grandes cambios á mediados de la época terciaria, elevándose gradualmente el fondo de un mar que se extendia desde la Grecia á las Azores. Suponer un vasto continente extendido en la época terciaria desde la Siria á las islas Canarias y Azores es una hipótesis que hace comprender perfectamente la actual existencia de muchas especies disjuntas en la Península hispano-lusitana, Siria y el Cáucaso, así como la de otras en las costas septentrionales de Africa y en las meridionales de Europa, etc.

Concuerdan bastante las ideas de Forbes con las emitidas por Alfonso Decandolle sobre la antigüedad relativa de las especies actuales. En efecto, las compuestas, lobeliaceas, campanulaceas, dipsaceas y valerianeas, todas gamopétalas con ovario infero, que parecen tener una existencia menos antigua respecto de las restantes fanerógamas, no son tan numerosas en las islas del Atlántico como en el Continente próximo, y habiendo sido aquellas separadas en épocas mas ó menos antiguas, puede admitirse que entonces estaban todavía poco difundidas en el Continente muchas de las indicadas plantas, ó que estándolo se extinguieron por cambios locales de clima anteriores al estado actual de las cosas, que permitió de nuevo la existencia de las mismas especies hasta las costas occidentales del Continente, siendo impedido el paso á las islas por el mar. Nótese por el contrario que las especies acuáticas, las ciperaceas, gramineas, juncneas, poligoneas y otras familias, tenidas por mas antiguas, se hallan tan extendidas en las islas Británicas con inclusion de Irlanda, como en el Continente.

Parece que las plantas acuáticas deben estar distribuidas en Europa desde una época anterior á la existencia de los Alpes, y acaso á la de los Pirineos, é igualmente mas antigua que la separacion de Inglaterra é Irlanda, como tambien de la de Córcega y otras islas del Mediterráneo, siendo imposible que despues fuesen transportadas las semillas por encima de las cordilleras y al través del agua salada de los mares: las dificultades se aumentan respecto de las ninfeas, cuyas semillas son demasiado gruesas para que las aves pudieran dispersarlas. En caso de no admitir una distribucion de las plantas acuáticas tan antigua, de-

berian suponerse múltiples desde su origen, y aun así es bastante probable que su existencia se remonte á época harto lejana.

Los Alpes, notables por su vegetacion, llegaron á la actual altura durante la época terciaria y una parte de la cuaternaria; pero al principio de la misma época terciaria, ó sea desde el fin del mar cretáceo, ya esta parte de Europa se hallaba emergida, teniendo así muchísimo tiempo para acrecentar su Flora por la comunicacion con países próximos ó por la creacion local de especies, aunque hayan perecido muchas á consecuencia de los grandes trastornos geológicos. Existen al parecer en los Alpes cinco diversas categorías de plantas por lo que toca al origen: las especies comunes con los Pirineos, montañas del norte de Alemania, Escandinavia, Escocia y demás países septentrionales, siendo probablemente plantas antiguas cuya existencia data de la época glacial de Inglaterra y de la época en que estaba cubierta una parte de Alemania por el Océano; las especies análogas á las anteriores y de igual origen, que han desaparecido fuera de los Alpes; las especies procedentes de países próximos, mediante las llanuras y montes menos elevados que los Alpes, despues de haberse retirado el mar de Alemania; las especies propias de los Alpes y por consiguiente de fecha poco antigua, aunque pudieran haber existido en otra parte, si no fueron creadas en los mismos Alpes; las especies procedentes de otros países durante la época histórica, y que son raras en las regiones elevadas.

El estado de los conocimientos no permite todavía clasificar todas las plantas de los Alpes bajo el aspecto de sus diversos orígenes, conforme acaban de ser indicados, y la dificultad de tales estudios todavía es mayor respecto de otros países: los botánicos pueden preparar trabajos conducentes á la solucion de este género de cuestiones, aunque verdaderamente dependa de los progresos de la Geología y Paleontología en mucha parte. Todo lo que relativamente á los orígenes de las especies existentes en diversos países no pertenecientes á Europa, puede hoy decirse, carece del grado de certidumbre necesario para que se halle fuera del exclusivo dominio de las hipótesis.

Al comparar la vegetacion de un país con la de otro mas ó menos lejano, se observa con frecuencia que hay familias y géneros existentes á la vez en ambos, mediante la representacion debida á especies diversas, aunque análogas, y acaso en proporcion semejante, pudiendo reconocerse lo mismo entre cualquiera de las vegetaciones actuales y una anterior. Tales son los

hechos que exponen algunos sencillamente, considerándolos como documentos que la ciencia podrá utilizar en tiempo oportuno; pero muchos naturalistas se anticipan á deducir de ellos consecuencias relativas á los lazos anteriores ú originarios que pueden haber existido entre las vegetaciones comparadas.

Los que admiten una variabilidad indefinida de las especies en virtud del tiempo y de la diversidad de las circunstancias exteriores, pueden tener por probable que las especies análogas de países diferentes sean derivadas de una misma forma primitiva; pero ya se ha visto que la pretendida variabilidad de las especies, hasta el grado supuesto, carece de pruebas. Los que atribuyen á las especies mayor fijeza necesitan establecer otras hipótesis respecto de los géneros y familias á la vez existentes en varias floras, y conforme á tales hipótesis deben suponerse cambios de habitacion por consecuencia de modificaciones en los territorios y en los climas, extincion de especies y la consiguiente de géneros y hasta de familias, circunstancias relativas á la creacion de seres orgánicos: iguales suposiciones son aplicables para explicar las relaciones que se observan entre las vegetaciones actuales y las anteriores.

Aparece claramente la necesidad de confesar que hasta ahora no se ha salido del terreno de las hipótesis, aun cuando puedan parecer mas ó menos aceptables para explicar los hechos indicados. El influjo de la primitiva y misteriosa distribucion de los diversos grupos del reino vegetal se reconoce frecuentemente al examinar la vegetacion de nuestra época, sin embargo de haber atravesado otras anteriores. Finalmente, nada puede todavía asegurarse sin dejar dudas en cuanto al orden en que hayan aparecido los diversos grupos naturales en la totalidad de la tierra ó en cada pais, faltando mucho para que esté perfectamente comprobado que las criptógamas precedieron á las fanerógamas, y las monocotiledóneas á las dicotiledóneas, ciertas familias á otras mas complicadas como las compuestas, etc., estando tambien por demostrar que haya sucedido simultáneamente en toda la tierra ó en cada territorio despues de haber durado cierto tiempo las especies, como inclinan á creerlo varios hechos.

Pueden clasificarse los vegetales fósiles según las épocas geológicas á las que pertenecen, ó considerando las épocas diversas de su existencia, y esto es seguramente lo mas importante para el estudio de la historia natural de la vida orgánica. Los vegetales correspondientes á cada época debieron haber vivido en condiciones iguales, formando un conjunto, como hoy lo constituyen las especies existentes en los diversos países del globo: reunir y comparar entre sí los vegetales de

ADICION.

NOCIONES LIGERAS SOBRE EL ESTUDIO DE LOS VEGETALES FÓSILES.

El exámen de los vegetales cuyos restos se hallan sepultados, aunque propio de la Paleontologia, no puede considerarse extraño á la Botánica por lo que toca á la determinacion de las especies, cuyo conocimiento es además de importancia para la resolucion de varias cuestiones geográfico-botánicas. Como las partes delicadas y diminutas de la organizacion vegetal no pudieron conservarse en el estado fósil, es forzoso contentarse con los órganos mas abultados y mejor conservados, tales como el tallo, las hojas, algunos frutos y semillas, teniendo que prescindir de las plantas demasiado herbáceas muy alteradas, cuando no completamente destruidas. Los tallos leñosos se hallan petrificados por la lenta sustitucion de partículas minerales en lugar de las propias del leño y corteza sin alterarse la forma, y las hojas se suelen encontrar marcadas en las piedras. Para determinar las plantas fósiles, mediante sus restos mas ó menos incompletos y alterados, se hace precisa la comparacion con órganos semejantes de las actualmente vivas, llegándose así á reconocer los grupos donde cualesquiera de aquellas deban ser colocadas.

Fúndase la nomenclatura de los vegetales fósiles en su semejanza con los vivos, usando un nombre genérico conocido y el específico que parezca conveniente para distinguir la especie fósil hallada, ó formando en caso necesario un nombre genérico derivado de otro y distinguido del mismo, mediante la terminacion *ites*, existiendo afinidad con el género ó duda respecto á la identidad genérica: así se han formado *zamites* de *zamia*, *lycopodites* de *lycopodium* y otros. Antes de ahora se han indicado varios fósiles, dándoles nombres terminados en *lithis*, y supuesto que se ha prescindido de ello, debe añadirse el epíteto de *fossilis* al nombre de la planta que lo sea.

Pueden clasificarse los vegetales fósiles segun sus caracteres botánicos ó considerando las épocas diversas de su existencia, y esto es seguramente lo mas importante bajo mas de un aspecto. Los vegetales correspondientes á cada época debieron haber vivido en condiciones iguales, formando un conjunto, como hoy lo constituyen las especies existentes en los diversos países del globo: reunir y comparar entre si los vegetales de

cada época debe preceder á estudiarlos relativamente á los de otra ú otras épocas. Pero la antigüedad relativa de varias capas terrestres no se ha fijado de una manera que exima de toda duda, porque los geólogos toman en cuenta los fósiles, fundándose en los conocimientos suministrados por los zoólogos y botánicos, mientras que éstos por su parte determinan la antigüedad de los fósiles conforme á la de las capas terrestres en que se hallan.

Como quiera, los fósiles vegetales atestiguan los grandes trastornos acaecidos en el globo en épocas sucesivas, aunque no hayan sido simultáneos en todo él, y demuestran igualmente que las condiciones físicas no fueron siempre las mismas, variando mucho las de la atmósfera, que además, segun Adolfo Brongniart habrá tenido mucho ácido carbónico en la época de la vigorosa vegetacion revelada por la hulla. La Geologia debe al estudio de los fósiles vegetales, ó sea á la Paleontologia vegetal, una parte de sus progresos y otros tiene que esperar todavía, así como la Geografia botánica, siendo posible que alguna vez se obtenga del adelantamiento simultáneo de estas ciencias, la resolucion de altas cuestiones que actualmente se hallan envueltas en una enojosa obscuridad.

Abies, 139.

Aracis, 312.

Araucaria, 328.

Acalypha, 611.

Acalypha, 610.

Acanthaceae, 530.

Acanthaceae, 530.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Acanthaceae, 534.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

Adiantum, 312.

cada época debe preceder á estudios relativos á los de-
tales u otras épocas. Pero la antigüedad relativa de varias capas
terrestres no se ha fijado de una manera que exima de toda du-
da, porque los geólogos forman en cuenta los fósiles, fundándo-
se en los conocimientos suministrados por los zoólogos y botá-
nicos, mientras que estos por su parte determinan la antiqüe-
dad de los fósiles conforme á lo de las capas terrestres en que
se hallan. Como quiera, los fósiles vegetales atestiguan los grandes
cambios ocurridos en el globo en épocas sucesivas, aunque
no hayan sido simultáneos en todo él, y demuestran igualmente
que las condiciones físicas no fueron siempre las mismas, ya
modo mucho las de la atmósfera, que además, según Adol-
fo Brongniart, habia tenido mucho ácido carbónico en la época de
la vigorosa vegetación revelada por la balla. La Geología debe
al estudio de los fósiles vegetales, ó sea á la Paleontología vege-
tal, una parte de sus progresos y otros tiene que esperar toda-
via, así como la Geografía botánica, siendo posible que alguna
vez se obtenga del adelantamiento simultáneo de estas ciencias,
la resolución de altas cuestiones que actualmente se hallan en-
voladas en una opaca oscuridad.

ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LOS GÉNEROS, TRIBUS Y FAMILIAS QUE SE COMPRENDEN
EN EL CUADRO DE LAS MISMAS.

Los números indican las páginas.

- | | |
|----------------------|----------------------|
| Abatia, 231. | Acrocomia, 742. |
| Abietineas, 665. | Acrodichlidias, 586. |
| Abies, 668. | Acrodiclidium, 589. |
| Abolboda, 731. | Acrostichum, 779. |
| Abroma, 229. | Actaea, 177. |
| Abrus, 306. | Adansonia, 225. |
| Abutilon, 223. | Adelia, 619. |
| Abuta, 189. | Adenantha, 312. |
| Acacia, 312. | Adenophora, 442. |
| Acaena, 328. | Adenostemma, 418. |
| Acalifeas, 611. | Adenostemon, 588. |
| Acalypha, 616. | Adenostyles, 419. |
| Acantaceas, 530. | Adesmia, 304. |
| Acanteas, 532. | Adhatoda, 535. |
| Acanthodium, 534. | Adiantum, 780. |
| Acanthospermum, 423. | Adoxa, 393. |
| Acanthus, 534. | Adonis, 175. |
| Acer, 251. | Ægilops, 773. |
| Acerineas, 250. | Æginetia, 530. |
| Achillea, 426. | Ægiphila, 539. |
| Achyranthes, 574. | Ægle, 240. |
| Achyrophorus, 436. | Ægopodium, 386. |
| Acioa, 324. | Ægotoxicum, 622. |
| Acnistus, 518. | Æolanthus, 545. |
| Aconitum, 177. | Ærva, 574. |
| Acoroideas, 750. | Æschynomene, 304. |
| Acorus, 753. | Æsculus, 252. |
| Acosta, 213. | Ætheorhiza, 437. |
| Acourtia, 435. | Æthusa, 387. |

Afelandreas, 533.*Afilanteas*, 723.*Afzelia*, 319.*Agapanteas*, 716.*Agapanthus*, 719.*Agaricus*, 808.*Agati*, 302.*Agatophyllum*, 588.*Agave*, 705.*Agaveas*, 703.*Ageratum*, 418.*Aglaiia*, 240.*Agrimonia*, 328.*Agrostideas*, 761.*Agrostis*, 766.*Ailanthus*, 293.*Aira*, 768.*Aizoon*, 374.*Ajuga*, 553.*Akebia*, 187.*Alaccia*, 710.*Alania*, 723.*Alangieas*, 348.*Alangium*, 348.*Alaria*, 815.*Alchimilla*, 328.*Alchornea*, 617.*Alectoris*, 799.*Alepyrum*, 730.*Aletris*, 702.*Aleurites*, 617.*Algas*, 809.*Alhagi*, 304.*Alibertia*, 406.*Alibrexia*, 513.*Alisma*, 679.*Alisineas*, 196.*Alismaceas*, 678.*Alismeas*, 679.*Alkanna*, 510.*Allamanda*, 477.*Alliaria*, 200.*Allium*, 721.*Alnus*, 652.*Aloe*, 719.*Aloexylon*, 320.*Aloineas*, 717.*Alonsoa*, 525.*Alopecurus*, 764.*Alpinia*, 692.*Alpinias*, 690.*Alsineas*, 216.*Alsodea*, 210.*Alsodineas*, 209.*Alsophila*, 782.*Alstonia*, 480.*Alstonieas*, 476.*Alströemeria*, 705.*Alstroemerias*, 703.*Alternanthera*, 575.*Althaea*, 220.*Alyssum*, 199.*Alyxia*, 478.*Amarantaceas*, 572.*Amaranthus*, 574.*Amarileas*, 703.*Amarilideas*, 702.*Amaryllis*, 704.*Ambelania*, 477.*Amblogyna*, 574.*Ambraria*, 410.*Ambrosia*, 423.*Amelanchier*, 330.*Amianthium*, 727.*Amigdaleas*, 322.*Amirideas*, 286.*Amirola*, 257.*Ammannia*, 342.*Ammi*, 386.*Ammineas*, 382.*Ammophila*, 767.*Amomeas*, 690.*Amomum*, 691.*Amorpha*, 301.*Amorphophallus*, 751.*Ampelideas*, 261.

- Ampelopsis, 263.
 Amphiscopia, 534.
 Amsonia, 479.
 Amygdalus, 324.
 Amyris, 292.
 Anacardieas, 286.
 Anacardium, 287.
 Anacarideas, 677.
 Anacyclus, 426.
 Anagalideas, 458.
 Anagallis, 459.
 Anagyris, 296.
 Anamirta, 189.
 Ananassa, 707.
 Anandria, 435.
 Anaporeas, 750.
 Anastatica, 200.
 Anastaticeas, 196.
 Anchietea, 210.
 Anconieas, 197.
 Anchusa, 509.
 Anda, 617.
 Andira, 314.
 Andrachne, 621.
 Andraea, 789.
 Andreaceas, 790.
 Andrograsideas, 533.
 Andrographis, 535.
 Andromachia, 418.
 Andromeda, 451.
 Andromedeas, 449.
 Andropogon, 774.
 Andropogoneas, 762.
 Androsace, 459.
 Androsaemum, 242.
 Aneimia, 783.
 Anemone, 174.
 Anemoneas, 172.
 Anethum, 389.
 Angelica, 388.
 Angeliceas, 383.
 Angelonia, 525.
 Angiopteris, 783.
 Angraecum, 687.
 Anguloa, 686.
 Anguria, 361.
 Anigozanthus, 702.
 Anilema, 733.
 Anisocanthus, 535.
 Anisochilus, 545.
 Anisomeria, 563.
 Anisosperma, 358.
 Anisotes, 535.
 Anona, 184.
 Anonaceas, 183.
 Anoneas, 183.
 Anoplanthus, 530.
 Annesorhiza, 387.
 Anredera, 572.
 Anredereas, 571.
 Antennaria, 429.
 Antericeas, 717.
 Anthemis, 426.
 Anthericum, 722.
 Anthistiria, 774.
 Anthobolus, 598.
 Antholyza, 700.
 Anthospermum, 410.
 Anthoxanthum, 764.
 Anthriscus, 391.
 Anthurium, 753.
 Anthyllis, 298.
 Antiaris, 636.
 Antichorus, 231.
 Antidesma, 626.
 Antidesmeas, 625.
 Antirrhoea, 407.
 Antirrhinum, 526.
 Antirrineas, 523.
 Antirrinideas, 523.
 Antoboleas, 598.
 Antoceroteas, 793.
 Antonieas, 487.
 Antospermeas, 401.
 Apeiba, 232.
 Aphelandra, 534.

Aphelia, 730.
 Aphloia, 207.
 Aphyllanthes, 723.
 Apios, 306.
 Apium, 385.
 Apocinaceas, 475.
 Apocynum, 480.
 Aponogeton, 643.
 Apophragma, 490.
 Apostasia, 688.
 Apostasieas, 688.
 Apteris, 697.
 Aquifoliaceas, 277.
 Aquilaria, 285.
 Aquilarineas, 285.
 Aquilegia, 177.
 Aquiranteas, 573.
 Arabis, 199.
 Arabideas, 196.
 Araceas, 749.
 Arachis, 314.
 Aralia, 393.
 Araliaceas, 392.
 Araucaria, 670.
 Arbutas, 449.
 Arbutus, 450.
 Arctostaphylos, 450.
 Arctopus, 391.
 Archangelica, 388.
 Ardisia, 461.
 Ardisieas, 461.
 Areca, 737.
 Arecinas, 735.
 Arenaria, 217.
 Arenga, 738.
 Arethusa, 688.
 Aretuseas, 685.
 Argania, 466.
 Argemone, 194.
 Argemoneas, 193.
 Argireias, 501.
 Argophyllum, 445.
 Argyreia, 502.

Arisarum, 750.
 Arisema, 751.
 Aristolochia, 603.
 Aristololqueas, 602.
 Aristotelia, 238, 284.
 Aristoteliaceas, 238.
 Armeniaca, 324.
 Armeria, 557.
 Arnebia, 510.
 Arnica, 430.
 Aroideas, 748.
 Aromadendrum, 182.
 Arpophyllum, 686.
 Arrabidaea, 493.
 Arracacha, 392.
 Arrhenatherum, 768.
 Artemisia, 428.
 Arthrocnemum, 569.
 Arthrostemma, 346.
 Artabotrys, 184.
 Artocarpeas, 635.
 Artocarpus, 637.
 Arundinaceas, 761.
 Arundinaria, 770.
 Arundo, 767.
 Arum, 751.
 Asarum, 603.
 Ascarina, 639.
 Asclepiadeas, 481, 482.
 Asclepias, 484.
 Ascyrum, 243.
 Asfodeleas, 717.
 Asimina, 185.
 Asparagus, 722.
 Asperugo, 510.
 Asperula, 410.
 Asphodeline, 722.
 Asphodelus, 722.
 Aspidistra, 713.
 Aspidistreas, 714.
 Aspidium, 782.
 Asplenium, 781.
 Astelia, 730.

Astelieas, 729.
Aster, 420.
Asteriscus, 422.
Asteroideas, 416.
Astragalus, 303.
Astrantia, 385.
Astrephia, 412.
Astrocarpus, 205.
Astrocaryum, 742.
Astrolobium, 303.
Astroloma, 453.
Astronia, 348.
Astronium, 288.
Atalantha, 239.
Ataxia, 764.
Aterospermeas, 624.
Athamantha, 388.
Atherosperma, 625.
Atriplex, 568.
Atropa, 518.
Attalea, 743.
Aucklandia, 431.
Augia, 290.
Auranciaceas, 239.
Avena, 768.
Acenaceas, 762.
Averrhoa, 268.
Avicennia, 540.
Avicennieas, 537.
Axia, 413.
Aydendron, 589.
Ayugeas, 544.
Azadirachta, 259.
Azalea, 451.
Azara, 207.
Azima, 279.
Azolla, 784.
Azoleas, 783.
Baccaurea, 622.
Baccharis, 421.
Bacopa, 526.
Bactris, 742.
Badiera, 212.

Bacomyces, 797.
Balaniteas, 293.
Balanites, 293.
Balanoforeas, 605.
Balbisia, 431.
Ballota, 552.
Balsamia, 805.
Balsamifluas, 655.
Balsamineas, 266.
Balsamita, 267.
Balsamodendron, 291.
Bambusa, 770.
Banisteria, 250.
Banisterieas, 249.
Banksia, 595.
Banksieas, 594.
Baphia, 310.
Baptisia, 296.
Barbarea, 198.
Barberina, 471.
Barbiera, 300.
Barbula, 791.
Barkhausia, 437.
Barleria, 534.
Barlerieas, 532.
Barringtonia, 355.
Barringtonieas, 351.
Baselaceas, 570.
Baseleas, 571.
Basella, 572.
Bassia, 467.
Batatas, 502.
Bauereas, 379.
Bauhinia, 320.
Beatsonia, 215.
Begonia, 609.
Begoniaceas, 609.
Bejaria, 452.
Bellevallia, 720.
Bellis, 420.
Bellonia, 446.
Benincasa, 359.
Benthamia, 396.

Benzoin, 590.
Berberideas, 189.
Berberis, 182.
Berechemia, 280.
Berebera, 302.
Bergera, 240.
Berrya, 232.
Bertholletia, 356.
Besleria, 446.
Beslerieas, 446.
Beta, 566.
Betonica, 551.
Betula, 651.
Betulaceas, 650.
Biarum 751.
Biasoletia, 230.
Bidens, 424.
Biebersteinia, 270.
Biebersteinieas, 270.
Bignonia, 493.
Bignoniaceas, 492.
Bignonieas, 493.
Billardiera, 214.
Billbergia, 707.
Biota, 664.
Bitneriaceas, 226.
Bitnerieas, 227.
Bixa, 206.
Bixineas, 206.
Blakea, 348.
Blechnum, 781.
Blettia, 686.
Blighia, 256.
Blitum, 568.
Blumenbachia, 366.
Bocageas, 183.
Bocconia, 194.
Boehmeria, 629.
Boerhaavia, 578.
Boerhaavieas, 577.
Bolax, 385.
Boletus, 807.
Bolivaria, 475.

Bolivarieas, 475.
Bombaceas, 223.
Bombax, 225.
Bonaparteas, 708.
Bongardia, 190.
Bontia, 541.
Boottia, 678.
Boquila, 187.
Barasineas, 735.
Borassus, 740.
Borbonia, 296.
Borrageas, 506.
Borragineas, 505.
Borrageas, 509.
Borrera, 799.
Borreria, 409.
Borya, 723.
Bosea, 655.
Bosia, 568.
Boswella, 291.
Botryanthus, 720.
Botrychium, 783.
Botrytis, 804.
Bougainvilleas, 577.
Boussingaultia, 572.
Bouvardia, 404.
Bovista, 805.
Bowdichia, 321.
Brabejum, 595.
Bragantia, 604.
Brahea, 741.
Braquicarpeas, 198.
Brassia, 687.
Brassica, 201.
Brasiceas, 197.
Brayera, 328.
Brehmia, 489.
Brexia, 445.
Brexiaceas, 445.
Briaceas, 791.
Briedelia, 621.
Briza, 769.
Bromelia, 707.

- Bromeliaceas*, 700.
Bromus, 769.
Brosimum, 696.
Broussonetia, 633.
Browallia, 524.
Brownea, 315.
Brucea, 293.
Brunella, 550.
Brunellia, 293.
Brugmannsia, 609.
Brunfelsia, 524.
Bruniaceas, 282.
Brunonia, 555.
Brunoniaceas, 555.
Brya, 310.
Bryonia, 359.
Bryophyllum, 372.
Bubon, 389.
Buchanania, 288.
Buclea, 537.
Bucida, 334.
Bucnereas, 524.
Buddleia, 527.
Budleias, 524.
Buena, 403.
Bulbocodium, 727.
Bulbospermum, 714.
Bulbostylis, 418.
Bumelia, 466.
Bunehosia, 250.
Buniadeas, 197.
Bunias, 202.
Bunium, 386.
Buphthalmum, 422.
Bupleurum, 387.
Burasaia, 187.
Burchellia, 404.
Burmanna, 697.
Burmanniaceas, 697.
Bursera, 291.
Burseraceas, 286.
Butea, 309.
Butomeas, 727.
Butomus, 728.
Buxes, 611.
Buxus, 622.
Byrsonima, 250.
Byttneria, 229.
Bystropogon, 547.
Cabombaceas, 191.
Cabralia, 260.
Cacalia, 430.
Cachrys, 391.
Cacteas, 375.
Cadava, 204.
Caesalpinia, 316.
Caesarea, 265.
Cajanus, 308.
Cakile, 200.
Calaceas, 750.
Caladieas, 749.
Caladium, 752.
Calamagrostis, 766.
Calamintha, 548.
Calamus, 738.
Calandrinia, 369.
Calathea, 694.
Calceolaria, 525.
Calceolarieas, 523.
Caleas, 750.
Calectasieas, 729.
Calendula, 431.
Calicanteas, 331.
Calicereas, 414.
Calitriquineas, 340.
Calla, 753.
Callicarpa, 539.
Calligonum, 583.
Calliopsis, 424.
Callistephus, 420.
Callitris, 664.
Callophisma, 490.
Calluna, 451.
Calochortus, 718.
Calofileas, 243.
Calonyction, 503.

- Calophyllum, 245.
 Calosanthos, 493.
 Calotropis, 483.
 Caltha, 176.
 Calycanthus, 332.
 Calycophyllum, 404.
 Calyptranthes, 354.
 Calystegia, 504.
 Camassia, 720.
Camelaucias, 350.
Camelias, 237.
 Camelina, 200.
Camelineas, 197.
 Camellia, 237.
 Cameraria, 479.
 Campanula, 442.
Campanulaceas, 440.
Campanuleas, 441.
 Camphora, 588.
 Camphorosma, 569.
 Campomanesia, 352.
 Campnocarpus, 483.
 Canarina, 441.
 Canarium, 291.
 Canavalia, 308.
Canelaceas, 246.
 Canella, 246.
Canforeas, 585.
Canforosmeas, 565.
 Canna, 694.
Cannabineas, 629.
 Cannabis, 630.
 Cannaceas, 693.
 Cantarellus, 808.
 Canthium, 407.
 Cantua, 500.
 Capareas, 203.
Caparideas, 202.
 Capellia, 180.
 Capparis, 204.
 Capraria, 527.
Caprifoliaceas, 398.
 Capsella, 199.
 Capsicum, 516.
Caquilneas, 1973.
Caraceas, 811.
 Caragana, 303.
 Carapa, 261.
 Cardamine, 199.
 Cardiospermum, 254.
 Cardopatium, 431.
 Cardulovica, 746.
 Carduncellus, 433.
 Carex, 757.
 Careya, 356.
Carianteas, 346.
 Carica, 365.
Cariceas, 755.
Cariofleas, 215.
Cariseas, 476.
 Carissa, 477.
 Carlina, 432.
 Carolineas, 225.
 Caroxylon, 570.
 Carpinus, 647.
 Carpodinus, 477.
 Carrichtera, 202.
 Carthamus, 433.
 Carum, 386.
 Carya, 645.
 Caryocar, 253.
 Caryodaphne, 588.
 Caryophyllus, 354.
 Caryota, 738.
 Casearia, 283.
Casieas, 295.
 Casimiroa, 241.
Casiteas, 587.
 Cassia, 317.
 Cassipurea, 336, 337.
 Cassupa, 405.
 Cassyta, 590.
 Castanea, 650.
 Castela, 275.
 Castilloa, 637.
 Casuarina, 661.

- Casuarineas*, 660.
Catabrosa, 769.
Catalpa, 495.
Catananche, 435.
Catasetum, 686.
Catesbaea, 405.
Cattleya, 686.
Caturus, 617.
Caucalineas, 383.
Canalis, 391.
Cayaponia, 360.
Ceanothus, 281.
Cecropia, 673.
Cedrela, 260.
Cedreleas, 258.
Cedronella, 550.
Cedrus, 669.
Cefaloteas, 455.
Celastrineas, 276.
Celastrus, 278.
Celosia, 573.
Celosieas, 573.
Celtideas, 653.
Celtis, 654.
Cenchrus, 766.
Cenomyce, 797.
Centaurea, 432.
Centranthus, 412.
Centrolepideas, 730.
Centrolepis, 730.
Centropogon, 440.
Cephaelis, 409.
Cephalanthus, 409.
Cephalophora, 425.
Cephalotus, 455.
Ceradia, 430.
Ceramium, 814.
Cerastium, 217.
Cerasus, 325.
Ceratofleas, 341.
Ceratonia, 317.
Ceratopteris, 782.
Cerbera, 478.
Cercis, 320.
Cercodianas, 340.
Cereus, 376.
Cerinthe, 509.
Cervana, 422.
Cervantesia, 600.
Cesalpineas, 295.
Cestreas, 512.
Cestrum, 521.
Ceterach, 779.
Cetraria, 798.
Chailletia, 284.
Chailletiaceas, 284.
Chamaecyparis, 665.
Chamaepeuce, 434.
Chamaerops, 741.
Chara, 814.
Chaenestes, 518.
Chaeradodia, 705.
Chaerophyllum, 391.
Chaetogastra, 346.
Cheilanthes, 780.
Cheiranthus, 198.
Cheirostemon, 226.
Chelidonium, 194.
Chenopodina, 569.
Chenopodium, 567.
Chicoraceas, 417.
Chicharonia, 335.
Chiococca, 408.
Chimaphila, 454.
Chimonanthus, 332.
Chionanteas, 472.
Chionanthus, 474.
Chlora, 490.
Chloranthus, 639.
Chloraea, 688.
Chloroxylon, 260.
Chondodendrum, 188.
Chondrilla, 437.
Chondrus, 814.
Chorisia, 226.
Chuncoa, 335.

Chuquiraga, 435.

Chusquea, 770.

Chrysanthellum, 425.

Chrysanthemum, 427.

Chrysobalanus, 324.

Chrysophyllum, 465.

Chrysosplenium, 381.

Chymocarpus, 266.

Cicca, 621.

Cicadeas, 673.

Cicer, 304.

Cichorium, 435.

Ciclantecas, 746.

Cicuta, 385.

Cifaceas, 442.

Cinamomeas, 585.

Cinareas, 417.

Cinchona, 402.

Cinconaceas, 401.

Cinnamodendron, 246.

Cinnamomum, 587.

Cinocrambeas, 629.

Cinomorieas, 606.

Ciperaceas, 754.

Cipereas, 757.

Cipripedieas, 685.

Cipura, 698.

Circaea, 340.

Circeas, 338.

Cirileas, 279.

Cirsium, 434.

Cirtandraceas, 497.

Cirtandreas, 498.

Cissampelos, 188.

Cissarobryon, 265.

Cissus, 262.

Cistineas, 207.

Cistus, 208.

Citharexylum, 538.

Citineas, 607.

Citrosma, 625.

Citrus, 240.

Cladieas, 756.

Cladium, 758.

Cladonia, 797.

Clandestina, 530.

Clarisia, 660.

Clathrus, 805.

Clavaria, 806.

Clavija, 463.

Clavijeas, 463.

Claytonia, 369.

Clematideas, 172.

Clematis, 173.

Clenaceas, 234.

Cleome, 203.

Cleomeas, 203.

Clerodendron, 539.

Clethra, 450.

Clibadium, 422.

Clidemia, 347.

Cliftonia, 279.

Clintonieas, 440.

Clitoria, 300.

Clorantaceas, 638.

Clorideas, 761.

Clusia, 244.

Clusieas, 243.

Clypeola, 199.

Cnemidostachys, 616.

Cneorum, 292.

Cnestis, 293.

Cnicus, 433.

Cnidium, 388.

Cnidoscolus, 618.

Cobaea, 500.

Cochlearia, 199.

Cochlospermum, 237.

Coccinia, 360.

Coccoloba, 583.

Cocculus, 187.

Cocoinas, 736.

Cocos, 743.

Codarium, 321.

Codiaeum, 619.

Cofeaceas, 401.

- Coffea*, 408.
Coix, 764.
Corbertia, 180.
Colchicaceas, 725.
Colchiceas, 726.
Colchicum, 727.
Coldenia, 508.
Coleus, 545.
Colichodendron, 204.
Colignonia, 577.
Colletia, 281.
Colliguaya, 615.
Collinsonia, 549.
Collophora, 477.
Colocasia, 751.
Colophonia, 291.
Colubrina, 281.
Columeliaceas, 446.
Columellia, 447.
Columnea, 446.
Colutea, 303.
Combretaceas, 333.
Combreteas, 334.
Combretum, 335.
Commelinaceas, 732.
Commelineas, 732.
Commelyna, 732.
Commia, 615.
Comocladia, 288.
Comptonia, 660.
Compuestas, 415.
Conanthera, 722.
Concebeiba, 617.
Condaminea, 405.
Conserva, 816.
Conservaceas, 813.
Coniotalamos, 796.
Conium, 391.
Connaraceas, 287.
Conocarpus, 335.
Conoclinium, 418.
Conospermeas, 594.
Conyza, 421.
Convallarieas, 711.
Convallaria, 712.
Convolvulaceas, 500.
Convolvuleas, 501.
Convolvulus, 503.
Cookia, 239.
Copaifera, 319.
Copernicia, 741.
Coprosma, 410.
Coptis, 176.
Corallorrhiza, 686.
Corchorus, 231.
Cordia, 507.
Cordieas, 506.
Cordiereas, 401.
Cordyline, 723.
Corema, 623.
Coreopsis, 424.
Coriandreas, 384.
Coriandrum, 392.
Coriareas, 276.
Coriaria, 276.
Corifinas, 735.
Coris, 459.
Corispermeas, 566.
Coronilla, 303.
Corneas, 395.
Cornus, 395.
Cornutia, 540.
Cornicularia, 798.
Correa, 272.
Cortusa, 459.
Corydalis, 195.
Corylus, 647.
Corynephorus, 768.
Corynostylis, 210.
Corypha, 740.
Coscinium, 189.
Costos, 690.
Costus, 692.
Cotoneaster, 330.
Cotula, 427.
Couepia, 324.

- Coulteria, 316.
 Couma, 477.
 Couroupita, 356.
 Coutarea, 402.
 Continia, 481.
 Coutoubea, 490.
 Crambe, 202.
 Cranichis, 687.
 Craniolaria, 497.
Crasulaceas, 371, 372.
Crasuleas, 372.
 Crassula, 372.
 Crataegus, 329.
 Crataeva, 203.
 Cratoxylon, 242.
 Cremanium, 348.
 Crepis, 437.
Crescencieas, 493.
 Crescentia, 495.
 Cressa, 504.
 Crinodendron, 233.
 Crinum, 704.
Criptocariceas, 585.
Criptocorineas, 749.
 Crithmum, 388.
Crisitriqueas, 756.
Crisobalaneas, 321.
 Cristaria, 222.
 Critonia, 418.
 Crocus, 700.
 Crotalaria, 296.
 Croton, 619, 620.
Crotoneas, 611.
 Crozophora, 621.
Cruciferas, 196.
 Cryphiacanthus, 534.
 Cryptocaria, 588.
 Cryptocoryne, 750.
 Cucubalus, 216.
 Cucumis, 358.
 Cucurbita, 361.
Cucurbitaceas, 356.
Cucurbiteas, 357.
- Cumineas*, 383.
 Cuminum, 390.
 Cunila, 547.
 Cunninghamia, 670.
Cunoniaceas, 379.
 Cupania, 256.
 Cuphaea, 342.
Cupresineas, 661.
 Cupressus, 664.
Cupuliferas, 646.
 Curanga, 526.
 Curatella, 179.
 Curcas, 618.
 Curculigo, 715.
 Curcuma, 691.
 Cuscuta, 504.
Cuscuteas, 501.
Cusparieas, 271.
 Cyanella, 722.
 Cyanotis, 733.
 Cyathaea, 782.
 Cyathula, 575.
 Cybistax, 494.
 Cycas, 675.
 Cyclamen, 459.
 Cydonia, 331.
 Cylista, 309.
 Cymbidium, 686.
 Cymbocarpa, 697.
 Cymodocea, 682.
 Cynanchum, 484.
 Cynara, 433.
 Cynodon, 767.
 Cynometra, 319.
 Cynoglossum, 510.
 Cynomorium, 607.
 Cynosurus, 769.
 Cyperus, 758.
 Cyphia, 443.
 Cyphonandra, 516.
 Cypripedium, 688.
 Cyrilla, 279.
 Cyrtocarpa, 288.

Cyrtopodium, 686.
Cystoreira, 816.
Cytinus, 608.
Cytisus, 297.
Cyttaria, 806.
Dacrydium, 672.
Dactylis, 769.
Dactyloctenium, 767.
Daedalea, 807.
Daemia, 484.
Dafnidinas, 587.
Dahlia, 422.
Dais, 597.
Dalbergia, 310.
Dalbergias, 294.
Dalea, 300.
Dalibardia, 327.
Damasonium, 679.
Damnara, 670.
Danais, 404.
Danthonia, 768.
Daphne, 596.
Daphnidium, 590.
Datisca, 361.
Datisceas, 361.
Datura, 519.
Datureas, 512.
Daucus, 390.
Daucineas, 383.
Davilla, 179.
Decadia, 233.
Declieuxia, 407.
Decodon, 343.
Decostea, 396.
Deeringia, 573.
Deidamia, 364.
Delimeas, 179.
Deliseaceas, 439.
Delphinium, 177.
Dematium, 804.
Dentaria, 199.
Derris, 309.
Deschampsia, 768.

Desmanthus, 312.
Desmarestia, 815.
Desmodium, 304.
Detarieas, 295.
Detarium, 321.
Deutzia, 349.
Deyeuxia, 767.
Dialium, 321.
Diamorfeas, 372.
Dianella, 722.
Dianthus, 216.
Diapensia, 452.
Diapensiaceas, 452.
Diatoma, 816.
Diatomaceas, 813.
Dicera, 233.
Dicipelieas, 586.
Dicliptera, 535.
Dicliptereas, 533.
Diclytra, 195.
Dicondreas, 501.
Dictamnus, 271.
Dictyostega, 697.
Dicypellium, 589.
Didimocarpeas, 498.
Dieffenbachia, 752.
Diervilla, 399.
Digitalis, 527.
Digitaleas, 524.
Dileneas, 179.
Dileniaceas, 178.
Dilivaria, 534.
Dillenia, 180.
Dion, 675.
Dionaea, 211.
Dioscorea, 709.
Dioscoreas, 708.
Diosma, 271.
Diosmeas, 271.
Diospyros, 469.
Diotis, 427.
Dipholis, 466.
Diplazium, 781.

Diplochita, 347.
 Diplotaxis, 202.
 Diplothemium, 744.
Dipsaceas, 413.
 Dipsacus, 414.
 Dipteracanthus, 534.
 Dipteris, 315.
Dipterocarpeas, 233.
 Diptercarpus, 234.
 Dirca, 596.
 Discaria, 281.
 Dodonaea, 257.
Dodoneaceas, 254.
 Dolichos, 307.
 Dombeya, 230.
Dombeyaceas, 228.
 Dorema, 389.
 Doronicum, 430.
 Dorstenia, 635.
 Dorycnium, 299.
 Doryphora, 625.
 Dracaena, 723.
 Dracocephalum, 550.
 Dracontium, 753.
Dracunculinas, 749.
 Dracunculus, 751.
Driadeas, 322.
Drimirriceas, 688.
 Drimys, 181.
 Driptonod, 791.
 Drosera, 211.
Droseraceas, 210.
 Dryas, 326.
 Drymaria, 217.
 Dryobalanops, 234.
 Dryptopetalum, 337.
 Duguetia, 184.
 Durio, 226.
 Durvillaea, 816.
 Duvaua, 289.
 Dysodia, 425.
 Dysophylla, 546.
 Dysoxylon, 260.

Ebenaceas, 468.
 Ebenus, 304.
 Ecastaphyllum, 310.
 Echinocactus, 376.
 Echinophora, 391.
 Echinops, 431.
 Echinopsis, 376.
 Echites, 480.
 Echium, 509.
 Ecklonia, 815.
 Eclipta, 422.
 Edraianthus, 441.
Egiceraceas, 461.
 Ehretia, 508.
Ehretieas, 506.
 Eichwaldia, 375.
 Elaphrium, 272.
 Elaeagnus, 601.
 Elaeis, 743.
 Elaeococcus, 617.
 Elaedendron, 278.
 Elaeocarpus, 233.
 Elaterium, 360.
Eleagneas, 600.
 Elegia, 731.
Eleocarpeas, 232.
Eleoselineas, 383.
 Elephantopus, 418.
 Elettaria, 692.
 Eleusine, 767.
Elineas, 755.
 Elodea, 242.
 Elymus, 773.
 Embelia, 461.
Embelieas, 461.
 Emblica, 621.
 Embotrium, 595.
 Emilia, 430.
Empetreas, 622.
 Empetrum, 623.
 Enarthrocarpus, 202.
 Encephalartus, 675.
 Engelhardtia, 646.

- Enhalus, 678.
 Entada, 310.
 Epacreas, 453.
 Epacrideas, 453.
 Eperua, 319.
 Ephedra, 673.
 Epigaea, 450.
 Epidendreas, 684.
 Epidendrum, 686.
 Epilobium, 339.
 Epimedium, 190.
 Epipactis, 688.
 Epiphegus, 530.
 Epiphyllum, 376.
 Equisetaceas, 776.
 Equisetum, 777.
 Equiteas, 476.
 Erantemeas, 533.
 Eranthis, 176.
 Erianthus, 774.
 Erica, 451.
 Ericaceas, 449.
 Ericeas, 449.
 Ericibeas, 505.
 Erigeron, 420.
 Erineum, 804.
 Eriobotrya, 330.
 Eriocaulon, 731.
 Eriocauloneas, 731.
 Eriocephalus, 429.
 Eriodendron, 225.
 Eriogoneas, 579.
 Eriophorum, 758.
 Eriospermeas, 714.
 Eriospermum, 714.
 Erithalis, 407.
 Erithrichium, 510.
 Eritrospemas, 206.
 Eritroxileas, 247.
 Erodium, 264.
 Erophila, 199.
 Eruca, 202.
 Erucarieas, 197.
 Ervum, 305.
 Eryngium, 385.
 Erysimum, 200.
 Erysiphe, 805.
 Erythraea, 490.
 Erythrina, 309.
 Erythronium, 717.
 Erythroxyllum, 248.
 Escabioseas, 413.
 Escallonia, 380.
 Escalonieas, 379.
 Escandicineas, 384.
 Escepaceas, 626.
 Escevoleas, 443.
 Escirpeas, 757.
 Escleranteas, 370.
 Esclerieas, 755.
 Escobedia, 526.
 Escobedieas, 523.
 Escrofulariaceas, 522.
 Esenbeckia, 226, 272.
 Esfagnaceas, 790.
 Esfenocleaceas, 446.
 Esmilaceas, 710.
 Esmirneas, 384.
 Esparragueas, 717.
 Espeletia, 423.
 Espermaceas, 401.
 Espigeliaceas, 486.
 Espinacieas, 565.
 Espireaceas, 322.
 Espondiaceas, 286.
 Estacousiaceas, 623.
 Estafleaceas, 277.
 Estapeliaceas, 483.
 Estaquideas, 544.
 Estaliceas, 556.
 Estegnospemeas, 563.
 Esterculieas, 224, 227.
 Estifelieas, 453.
 Estilbaceas, 553.
 Estilidieas, 438.
 Estipaceas, 761.

- Etiraceas*, 470.
Etiraceas, 470.
Estratiotideas, 678.
Estrelladas, 401.
Estricneas, 486.
Eucaliptus, 351.
Euclea, 469.
Euclidieas, 196.
Eucrifieas, 235.
Eucryphia, 235, 243.
Euforbiaceas, 610.
Euforbieas, 611.
Eufrasieas, 524.
Eugenia, 354.
Euloganieas, 487.
Eulophia, 687.
Eupatoriaceas, 416.
Eupatorium, 418.
Euphorbia, 612, 613, 614.
Euphoria, 256.
Euphrasia, 528.
Eupomacieas, 186.
Eupomatia, 186.
Eurotium, 805.
Euryale, 192.
Eurycoma, 293.
Euscaphis, 277.
Eusesameas, 496.
Eustricneas, 486.
Euterpe, 736.
Euxolus, 574.
Evernia, 798.
Evolvulus, 504.
Evonimeas, 277.
Evonymus, 277.
Evosmia, 406.
Exidia, 806.
Exocarpus, 598.
Excoecaria, 615.
Exostema, 404.
Faba, 305.
Fabiana, 521.
Fabianeas, 512.
Fadgenia, 626.
Fagelia, 306.
Fagreaceas, 487.
Fagus, 650.
Falarideas, 761.
Faramea, 408.
Faseoleas, 294.
Febeas, 585.
Fedia, 412.
Fegatella, 794.
Feronia, 240.
Ferraria, 700.
Ferula, 388.
Festuca, 769.
Festucaceas, 762.
Feuillea, 358.
Ficaria, 176.
Ficoideas, 373.
Ficus, 633, 634.
Filadelfseas, 349.
Filago, 429.
Filanteas, 611.
Filesiaceas, 714.
Filidreas, 730.
Filipodendreas, 230.
Fischeria, 485.
Fistulina, 806.
Fitolacaceas, 561.
Fitolaceas, 562.
Flacourtia, 206.
Flacurcianeas, 205.
Flacurteas, 206.
Flagelarieas, 729.
Flagellaria, 730.
Flaveria, 425.
Flavifloras, 586.
Flindersia, 260.
Floerkea, 266.
Florideas, 812.
Flotovia, 435.
Flourensia, 424.
Fluggea, 622.
Foeniculum, 387.

- Foetidia*, 356.
Fontanesia, 473.
Fontinalis, 791.
Forestiera, 626.
Forestierias, 626.
Forskohlea, 629.
Forsteronia, 480.
Fotergileas, 395.
Fourcroya, 706.
Fragaria, 327.
Fragosa, 384.
Francoa, 455.
Francoaceas, 455.
Francoeuria, 422.
Frankenia, 215.
Frankeniaceas, 214.
Franklandias, 594.
Frasera, 491.
Fraxineas, 472.
Fraxinus, 472.
Freciereas, 236.
Freziera, 236.
Frimaceas, 536.
Fritillaria, 718.
Fucaceas, 813.
Fusieas, 338.
Fuchsia, 338.
Fucus, 815.
Fuirineas, 756.
Fumaria, 195.
Fumariaceas, 195.
Funaria, 791.
Funkia, 719.
Fuquieraceas, 367.
Fusanus, 599.
Gaertnereas, 487.
Gagea, 718.
Gaimardia, 730.
Galaceas, 454.
Galanthus, 703.
Galega, 301.
Galeopsis, 551.
Galinsoga, 425.
Galipea, 273.
Galium, 410.
Galleria, 563.
Garcinia, 244.
Garcinieas, 243.
Gardeniaceas, 401.
Gardenia, 405.
Gardneria, 489.
Gardnerieas, 486.
Gardoquia, 548.
Garriaceas, 626.
Garrya, 626.
Gaultheria, 451.
Gasteromicetes, 803.
Gasterotalamos, 796.
Gastrodia, 687.
Geastrum, 805.
Geisoloma, 595.
Geisolomeas, 595.
Gelidium, 814.
Gelsemieas, 487.
Gelseminum, 489.
Gencianeas, 489, 490.
Gendaruseas, 533.
Gendarussa, 535.
Genipa, 405.
Genista, 297.
Geniosporum, 545.
Gentiana, 491.
Geofreas, 295.
Geoffrea, 314.
Geophila, 409.
Geraniaceas, 263.
Geranium, 264.
Gerardieas, 524.
Gesneraceas, 445.
Gesnerieas, 445.
Geum, 326.
Giesekieas, 562.
Gillenia, 326.
Gilliesia, 715.
Gilliesiaceas, 715.
Ginomicetes, 802.

- Ginoria, 343.
Girocarpeas, 590.
Giomerieas, 562.
Giostemoneas, 563.
 Gladiolus, 700.
 Glaphyria, 356.
 Glaucium, 194.
 Glechon, 548.
 Gleditschia, 315.
 Gleichenia, 782.
Gleiqueniaceas, 778.
 Glinus, 374.
Globeas, 690.
 Globba, 691.
 Globularia, 555.
Globularieas, 554.
 Glossocardia, 425.
 Glyceria, 768.
 Glycosmis, 240.
 Glycyrrhiza, 300.
 Gmelina, 539.
 Gnaphalium, 429.
Gnetaceas, 672.
 Gnetum, 673.
 Gnidia, 597.
 Godoya, 244.
 Gomphia, 275.
 Gomphocarpus, 484.
 Gomphrena, 575.
Gonfreneas, 573.
 Gonianthes, 697.
 Goniolimon, 556.
Gonolobeas, 482.
 Gonolobus, 485.
Goodenieas, 443.
Goodenovieas, 443.
 Gordonia, 237.
Gordonieas, 236.
 Gossypium, 222.
 Gouania, 281.
 Govenia, 686.
Gracioleas, 523.
Gramineas, 760.
Grammatophyllum, 687.
Granateas, 332.
 Grangea, 421.
 Gratiola, 526.
Grevilleas, 594.
 Grewia, 231.
 Grias, 356.
 Grimmia, 791.
 Grindelia, 420.
 Grislea, 343.
 Gronovia, 361.
Gronovieas, 361.
Grosularieas, 378.
Grubiaceas, 282.
 Grubbia, 282.
 Guadua, 770.
 Guajacum, 270.
 Guarea, 260.
 Guatteria, 186.
 Guazuma, 229.
Guetardaceas, 401.
 Guettarda, 407.
 Guevinia, 595.
 Guilandina, 315.
 Guildingia, 333.
 Guilielma, 742.
 Guizotia, 423.
 Gundelia, 418.
 Gunnera, 394.
Gunneraceas, 392.
 Gustavia, 355.
Gutiferas, 243.
 Gymnadenia, 687.
 Gymnema, 485.
 Gymnocladus, 315.
 Gymnogramme, 779.
 Gymnosiphon, 697.
 Gymnotris, 766.
 Gynandropsis, 203.
 Gynarium, 767.
 Gynocardia, 207.
 Gynura, 430.
 Gypsophila, 216.

- Gyrocarpus, 590.
 Habenaria, 687.
 Habzelia, 185.
 Haemadictyon, 480.
 Haemanthus, 704.
 Haematoxylon, 317.
 Haemodorum, 701.
 Hakea, 595.
 Halogeton, 570.
 Halophila, 680.
 Halorageas, 340.
 Haloragis, 341.
 Hamameleas, 395.
 Hamamelideas, 394.
 Hamamelieas, 395.
 Hamamelis, 395.
 Hamelia, 406.
 Hamelieas, 401.
 Hancornia, 477.
 Haplophyllum, 271.
 Haronga, 242.
 Harpagophytum, 497.
 Hartighsea, 260.
 Hasseltia, 232.
 Hebenstreitia, 542.
 Hebradendron, 244.
 Hedeoma, 548.
 Hedera, 393.
 Hediotideas, 401.
 Hedisareas, 294.
 Hedwigia, 292.
 Hedycarpus, 257.
 Hedyosmum, 639.
 Hedyotis, 406.
 Hedypnois, 435.
 Hedysarum, 304.
 Heimia, 343.
 Heleboreas, 173.
 Helechos, 777.
 Helenium, 425.
 Heliamphora, 193.
 Helianthemum, 208.
 Helianthus, 424.
 Helichrysum, 429.
 Helicornieas, 695.
 Heliconia, 696.
 Helicteres, 224.
 Heliofleas, 198.
 Heliophytum, 508.
 Heliotropeas, 506.
 Heliotropium, 508.
 Helleborus, 176.
 Helleria, 258.
 Helminthia, 436.
 Helminthostachys, 783.
 Helonias, 726.
 Helosciadium, 385.
 Helosieas, 607.
 Helosis, 607.
 Helvella, 806.
 Helwingia, 282.
 Helvingiaceas, 282.
 Hemerocallis, 722.
 Hemidesmus, 483.
 Hemimerideas, 523.
 Hemodoraceas, 700.
 Henrietrea, 347.
 Hepatica, 175.
 Hepaticas, 791.
 Henriettea, 347.
 Heracleum, 389.
 Heritiera, 229.
 Hermannieas, 227.
 Hermas, 391.
 Hernandia, 598.
 Hernandiaceas, 598.
 Herniaria, 371.
 Herpestis, 526.
 Herreria, 714.
 Herrerieas, 714.
 Hesperis, 200.
 Hetaeria, 730.
 Heterotrichum, 347.
 Heuchera, 381.
 Hibisceas, 219.
 Hibiscus, 221.

- Hidnum*, 806.
Hidrangeas, 380.
Hidrocarideas, 676.
Hidrocaries, 338.
Hidrocotileas, 382.
Hidrofilaceas, 498.
Hidroleaceas, 510.
Hidroleas, 511.
Hidropeltideas, 191.
Hieracium, 437.
Hierochloa, 764.
Hifomicetes, 802.
Higrofileas, 532.
Himanthalia, 816.
Himanthoglossum, 687.
Himenofileas, 778.
Himenomicetes, 803.
Himenotalamos, 797.
Himeranthus, 518.
Hiosciameas, 512.
Hipecoeas, 194.
Hipericeas, 241.
Hipericineas, 241.
Hipocastaneas, 252.
Hipocrateaceas, 247.
Hipoestes, 535.
Hipolitreas, 756.
Hipomaneas, 611.
Hipoxideas, 714.
Hippobromus, 257.
Hippocratea, 247.
Hippocrepis, 304.
Hippomane, 615.
Hippophaë, 601.
Hippuris, 341.
Hiptaceas, 249.
Hipurideas, 341.
Hiraea, 250.
Holarhena, 480.
Holboellia, 187.
Holeus, 764.
Holigarna, 287.
Hololachna, 375.
Holosteum, 217.
Homalineas, 283.
Homalium, 284.
Homogyne, 419.
Hongos, 799.
Hordeaceas, 762.
Hordeum, 773.
Hortia, 273.
Hotonieas, 458.
Hovenia, 282.
Houttuynia, 643.
Hoya, 485.
Huerteas, 293.
Hugonia, 235, 268.
Hugoniaceas, 235.
Humirium, 258.
Humulus, 630.
Hunnemannieas, 193.
Hura, 615.
Hyacinthus, 720.
Hyaenanche, 622.
Hydnocarpus, 207.
Hydnora, 608.
Hydrangeas, 380.
Hydrastis, 175.
Hydrobryum, 680.
Hydrocharis, 678.
Hydrocotyle, 384.
Hydrolea, 511.
Hydropeltis, 191.
Hydrophilax, 410.
Hydrophyllum, 499.
Hydropyrum, 763.
Hydrostachys, 680.
Hygrophila, 534.
Hymenaea, 320.
Hymenocardia, 626.
Hymenodiction, 404.
Hymenophallus, 806.
Hyoseyamus, 519.
Hyoseris, 435.
Hypanthera, 358.
Hypocoum, 194.

Hypericum, 242.
 Hypba, 804.
 Hypbaene, 740.
 Hypnaea, 814.
 Hypnum, 791.
 Hypochaeris, 436.
 Hypoestes, 535.
 Hypolitrum, 758.
 Hypopitys, 456.
 Hypoporum, 758.
 Hypoxis, 715.
 Hyptis, 546.
 Hyssopus, 549.
 Iberis, 200.
 Icacina, 238.
 Icica, 291.
 Ichnocarpus, 480.
 Idiotalamas, 796.
 Ignatia, 489.
 Ilcebreas, 370.
 Ileodyction, 805.
 Illex, 278.
 Illicias, 181.
 Illecebrum, 371.
 Illicium, 181.
 Illigera, 590.
 Ilysanthes, 527.
 Imbricaria, 467.
 Impatiens, 267.
 Imperata, 774.
 Imperatoria, 389.
 Indigofera, 299.
 Inga, 311.
 Inocarpus, 598.
 Inula, 422.
 Ionidium, 210.
 Ipomaea, 503.
 Iresine, 575.
 Iriarteia, 737.
 Iridaea, 814.
 Irideas, 697.
 Iris, 699.
 Isatideas, 197.

Isatis, 201.
 Isercieas, 401.
 Isertia, 406.
 Isidium, 797.
 Isnardia, 340.
 Isoeteas, 786, 787.
 Isonandra, 466.
 Isotoma, 440.
 Ixerba, 445.
 Ixora, 408.
 Iva, 423.
 Jacaranda, 495.
 Jacinteas, 717.
 Jacobinia, 534.
 Jacquinia, 463.
 Jambossa, 355.
 Jaquineas, 463.
 Jasiona, 441.
 Jasminum, 474.
 Jasonia, 422.
 Jatropha, 617.
 Jazmineas, 474.
 Jeffersonia, 191.
 Johnsonia, 723.
 Joliffia, 361.
 Jossimia, 353.
 Jubaea, 744.
 Juglandeas, 644.
 Juglans, 645.
 Juliania, 269.
 Julocroton, 620.
 Juncaceas, 728.
 Juncagineas, 679.
 Juncneas, 728.
 Juncus, 730.
 Jungermanniaceas, 794.
 Juniperus, 662.
 Jusieas, 338.
 Jussiaea, 339.
 Justicia, 535.
 Kadsura, 186.
 Kaempferia, 691.
 Kageneckia, 326.

- Kalanchoe, 372.
 Kalidium, 569.
 Kalmia, 452.
 Kanahia, 483.
 Kentrophyllum, 433.
 Kerria, 326.
 Kielmeyera, 237.
Kingiaceas, 729.
 Kixia, 480.
 Kleinhovia, 229.
 Kleinia, 430.
 Knautia, 414.
 Knowltonia, 175.
 Kochia, 569.
 Koeleria, 769.
 Krameria, 213.
 Kuhlia, 207.
 Kundmannia, 387.
 Kunthia, 736.
 Kydia, 230.
 Kyllingia, 759.
Labiadas, 542.
 Lablab, 307.
Labordieas, 487.
 Lachenalia, 720.
 Lachnanthes, 701.
 Lacis, 680.
Lacistemeas, 658.
Lacnopileas, 487.
 Lactuca, 436.
 Laetia, 207.
 Laelia, 686.
 Lafoensia, 343.
 Lagascea, 418.
 Lagenaria, 358.
 Lagerstroemia, 343.
Lagerstroemicas, 342.
 Lagetta, 597.
 Lagoecia, 391.
 Laguncularia, 335.
 Laminaria, 815.
 Lamium, 551.
 Lampsana, 435.
 Lanosa, 804.
 Lansium, 260.
 Lantana, 538.
 Lapageria, 714.
 Laplacea, 237.
Laplaceas, 236.
 Lappa, 434.
 Lardizabala, 187.
Lardizabaleas, 187.
 Larix, 669.
 Laserpitium, 390.
 Lasia, 753.
 Lasiagrostis, 766.
 Lasiandra, 346.
Lasiopetaleas, 227.
 Latania, 740.
 Lathyrus, 305.
 Lathraea, 530.
 Laurelia, 625.
 Laurentia, 814.
Laurineas, 584.
 Laurus, 590.
 Lavandula, 546.
 Lavatera, 220.
Lavoisierias, 345.
 Lawsonia, 343.
 Laxmannia, 723.
 Lecanora, 798.
Lecitideas, 351.
 Lecythis, 356.
 Ledebouria, 727.
Ledocarpeas, 265.
 Ledocarpum, 265.
 Ledum, 452.
 Leea, 263.
Leeaceas, 262.
Legnotideas, 337.
Leguminosas, 293.
 Lemna, 681.
Lemnaceas, 680.
 Lemnopsis, 680.
Lentibularieas, 456.
 Leonitis, 552.

Leontice, 190.
 Leonurus, 551.
 Lepidineas, 197.
 Lepidium, 200.
 Lepidocarineas, 735.
 Lepidostachys, 626.
 Leptadenia, 485.
 Leptochloa, 767.
 Leptomeria, 599.
 Leptospermeas, 350.
 Loptospermum, 352.
 Leptostachya, 535.
 Lepurandra, 636.
 Leskia, 791.
 Lespedezia, 304.
 Lessertia, 303.
 Leucas, 552.
 Leucanthemum, 427.
 Leucojum, 703.
 Leucopogon, 454.
 Leucothoë, 451.
 Levisticum, 388.
 Lewisia, 374.
 Lexarza, 224.
 Liatris, 418.
 Libanotis, 387.
 Libertia, 698.
 Libocedrus, 664.
 Licania, 324.
 Lichtensteinia, 387.
 Licopodiaceas, 786.
 Licopodios, 787.
 Ligusticum, 388.
 Ligustrum, 474.
 Liliaceas, 715.
 Lilium, 718.
 Limeas, 562.
 Limnanteas, 266.
 Limnanthemum, 492.
 Limnanthes, 266.
 Limonia, 239.
 Linaria, 525.
 Lineas, 218.

Linnea, 400.
 Linostigma, 265.
 Linosyris, 420.
 Linum, 218.
 Lippia, 538.
 Liqueues, 795.
 Liquidambar, 656.
 Liriodendron, 183.
 Lisanthe, 453.
 Lisianthus, 491.
 Lisipomeas, 440.
 Listera, 687.
 Lithocarpus, 650.
 Lithospermum, 510.
 Litrarieas, 341.
 Littorela, 559.
 Livistoma, 741.
 Loasa, 366.
 Loaseas, 366.
 Lobelia, 440.
 Lobeliaceas, 439.
 Lobelieas, 440.
 Lodoicea, 740.
 Loeselia, 500.
 Lofiraceas, 234.
 Lofofteas, 606.
 Loganiaceas, 486.
 Loganieas, 487.
 Loiseleuria, 451.
 Lolium, 770.
 Lomatia, 595.
 Lonchocarpus, 301.
 Lonicera, 399.
 Lonicereas, 398.
 Lophira, 234.
 Lorantaceas, 396.
 Loranthus, 397.
 Loreya, 347.
 Loteas, 294.
 Lotus, 299.
 Lucuma, 465.
 Ludwigia, 339.
 Luffa, 359.

Luhea, 232.
 Lunaria, 199.
 Lunasia, 622.
 Lupinus, 308.
 Luzula, 729.
 Luzuriaga, 713.
 Luxemburgia, 210.
 Lychnis, 217.
 Lycium, 518.
 Lycoperdon, 805.
 Lycopersicum, 513.
 Lycopodium, 787.
 Lycopsis, 509.
 Lycopus, 547.
 Lygeum, 763.
 Lygodium, 783.
 Lygodysoidea, 407.
 Lyonnetia, 426.
 Lysimachia, 459.
 Lysurus, 806.
 Lythrum, 342.
 Mabea, 617.
 Macanea, 246.
 Machaerium, 301.
 Machaonia, 410.
 Maclura, 633.
 Macranthus, 306.
 Macrochloa, 766.
 Madia, 426.
 Maerua, 204.
 Magnolia, 182.
Magnoliaceas, 180.
Magnolias, 181.
 Magonia, 257.
 Maharanga, 509.
 Mahonia, 190.
 Maieta, 347.
Malaxideas, 684.
 Malcomia, 200.
Malesherbiaceas, 362.
 Malope, 219.
Malopeas, 219.
 Malpighia, 249.

Malpighiaceas, 249.
Malpighieas, 249.
 Malva, 219.
Malvaceas, 218.
 Malvaviscus, 220.
Malveas, 219.
 Mammea, 245.
 Mammillaria, 376.
 Mandragora, 518.
 Manetia, 404.
 Mangifera, 287.
 Manglietia, 182.
 Manicaria, 740.
 Manihot, 618.
 Manisuris, 773.
 Manungala, 274.
 Mappa, 617.
 Maprounea, 615.
 Maranta, 693.
Maratiaceas, 779.
 Marattia, 783.
 Marchantia, 794.
Marchantiaceas, 794.
 Maregravia, 247.
Maregraviaceas, 246.
 Margaris, 408.
 Margyricarpus, 328.
 Marignia, 291.
 Marlea, 348.
 Marrubium, 551.
 Marsdenia, 485.
Marsileas, 786.
 Marsypianthes, 546.
 Martinezia, 742.
 Martynia, 497.
 Maruta, 426.
 Mathiola, 198.
 Matisia, 224.
 Matricaria, 427.
 Mauria, 289.
 Mauritia, 739.
 Maxillaria, 686.
 Mayaca, 731.

- Maytenus, 278.
 Meconopsis, 194.
 Medeola, 711.
 Medicago, 298.
 Medinilla, 347.
 Meesia, 791.
 Melaleuca, 351.
 Melampyrum, 528.
 Melanorrhoea, 288.
 Melanoxylon, 315.
 Melanthera, 423.
 Melastoma, 347.
Melanostomaceas, 345.
Melanostomeas, 345.
 Melia, 259.
Meliaceas, 257.
Meliantes, 270.
 Melianthus, 270.
 Melica, 769.
 Melicocca, 257.
Melieas, 258.
 Melilotus, 298.
 Meliosma, 257.
Meliosmeas, 257.
 Melissa, 548.
 Melittis, 551.
 Melocactus, 376.
 Melochia, 229.
 Melodinus, 477.
 Melothria, 360.
Memecileas, 333.
 Memecylon, 333.
Meniantes, 490.
Menispermaceas, 186.
Menispermeas, 187.
 Menispermum, 188.
 Menodora, 475.
 Mentha, 546.
 Mentzelia, 366.
 Menyanthes, 492.
Merciereas, 441.
 Mercurialis, 616.
 Merendera, 727.
 Meriandra, 549.
 Meriania, 346.
 Mertensia, 782.
 Merulius, 807.
Meseas, 460.
 Mesembryanthemum, 374.
 Mespilodaphne, 588.
 Mespilus, 330.
 Mesua, 245.
Meternichieas, 512.
 Methonica, 719.
 Metrosideros, 352.
 Meum, 388.
 Michelia, 181.
 Miconia, 347.
Miconieas, 346.
 Microcachrys, 672.
 Microlonchus, 432.
 Micromeria, 548.
Microteas, 562.
 Miersia, 715.
 Mikania, 419.
 Milium, 765.
 Milnea, 260.
 Millingtonia, 493.
 Mimosa, 311.
Mimoseas, 295.
 Mimulus, 526.
 Mimusops, 467.
Minuarcieas, 370.
Mioporaceas, 541.
Mirabileas, 577.
 Mirabilis, 577.
Miriceas, 659.
Miristiceas, 591.
Mirsineaceas, 460.
Mirtaceas, 349.
Mirteas, 350.
 Mitreola, 487.
 Mniopsis, 680.
 Mocanera, 236.
 Modeca, 365.
 Mohria, 783.

- Molinia, 769.
 Molopospermum, 391.
 Molucella, 552.
 Mollugo, 217.
 Momordica, 360.
 Monarda, 550.
Monardeas, 544.
 Monarrhenus, 422.
 Moneses, 454.
Monimiaceas, 623.
Monimieas, 624.
 Monniera, 273.
 Monnina, 213.
 Monodora, 185.
Monoteceas, 463.
Monotropeas, 455.
 Monsonia, 264.
 Monstera, 753.
 Montagnaea, 423.
 Montinia, 338.
Montinieas, 338.
 Moquilea, 324.
 Mora, 315.
 Morchella, 806.
Moreas, 631.
 Morelosia, 471.
 Moricandia, 202.
 Morinda, 406.
Morineas, 413.
 Moringa, 315.
 Morisonia, 204.
 Moronobea, 246.
 Morus, 632.
 Moscharia, 435.
 Moschochylum, 259.
 Mourera, 680.
 Mouriria, 333.
 Moutabea, 213.
Moutabeas, 213.
 Mucor, 805.
 Mucuna, 308.
 Muhlenbeckia, 583.
 Mulgedium, 438.

- Mulineas*, 382.
 Mundia, 213.
 Muntingia, 232.
 Murdannia, 733.
 Muricia, 361.
 Murraya, 239.
 Murucuia, 363.
 Musa, 696.
Musaceas, 694.
 Musanga, 637.
 Muscari, 720.
Musgos, 788.
 Mussaenda, 404.
 Mutisia, 434.
Mutisiaceas, 417.
 Mycoderma, 804.
 Myginda, 278.
 Mylitta, 805.
 Myoschilos, 600.
 Myrosporum, 296.
 Myosotis, 510.
 Myosurus, 175.
 Myrcia, 353.
 Myrica, 660.
 Myricaria, 344.
 Myristica, 592.
 Myrodia, 224.
 Myrrhinum, 348.
 Myrrhis, 391.
 Myrtus, 353.
 Myrsine, 461.
 Nabalus, 438.
Nameas, 511.
 Nandina, 190.
Nandirobeas, 357.
 Napoleona, 447.
Napoleoneas, 447.
 Nardostachys, 412.
Narciseas, 703.
 Narcissus, 704.
 Narthecium, 730.
Nasauviaceas, 417.
 Nasturtium, 198.

- Nauclea, 402.
 Nayadeas, 681.
 Neckera, 791.
 Nectandra, 589.
 Nectandreas, 586.
 Neea, 578.
 Negundo, 251.
 Nelsonieas, 532.
 Nelumbium, 192.
 Nelumboneas, 192.
 Neotieas, 685.
 Neottia, 687.
 Nepenteas, 604.
 Nepenthes, 605.
 Nepeta, 550.
 Nepeteas, 544.
 Nephrodium, 781.
 Nerium, 480.
 Neuradeas, 322.
 Neurocarpum, 300.
 Neurolaena, 430.
 Neuwiedia, 688.
 Nicandria, 517.
 Nicocianceas, 512.
 Nicotiana, 520.
 Nictaginaceas, 576.
 Nigella, 177.
 Nima, 275.
 Ninfceaceas, 191.
 Ninfceas, 192.
 Niota, 250.
 Nipa, 745.
 Niphobolus, 780.
 Nisaceas, 348.
 Nitraria, 279.
 Nitrarieas, 279.
 Nolana, 513.
 Nolaneas, 512.
 Nonatelia, 407.
 Nonnea, 509.
 Noronhia, 474.
 Nostoc, 816.
 Notochlaena, 779.
 Nuphar, 192.
 Nyctanthus, 475.
 Nymphaea, 192.
 Nymphanthus, 621.
 Nyssa, 349.
 Obione, 568.
 Ochranthe, 243.
 Ochroma, 226.
 Ocimoideas, 543.
 Ocimum, 545.
 Ocnaceas, 275.
 Ocrantaceas, 243.
 Odontandra, 261.
 Oenanthe, 387.
 Oenocarpus, 736.
 Oenothera, 339.
 Ofiogloseas, 779.
 Ofiopogoneas, 714.
 Ofrideas, 685.
 Oidium, 804.
 Olacineas, 238.
 Olax, 238.
 Olea, 473.
 Oleaceas, 471.
 Oleineas, 472.
 Oldenlandia, 406.
 Olinieas, 348.
 Ombrophytum, 607.
 Omphalea, 617.
 Omphalodes, 510.
 Omphalodium, 292.
 Onagrarietas, 337.
 Onagreas, 338.
 Oncidium, 687.
 Oncinus, 464.
 Oncoba, 207.
 Oncus, 710.
 Onobrychis, 304.
 Ononis, 298.
 Onopordon, 433.
 Onosma, 509.
 Opercularieas, 401.
 Ophelia, 491.

Ophelus, 224.
 Ophioglossum, 783.
 Ophiopogon, 714.
 Ophiorhiza, 406.
 Ophioxylon, 478.
 Ophira, 282.
 Ophrys, 687.
 Oplismenus, 765.
 Opoidia, 392.
 Opopanax, 388.
 Opunciaceas, 376.
 Opuntia, 377.
 Orchis, 687.
 Oreodafneas, 586.
 Oreodaphne, 589.
 Oreodoxa, 737.
 Oriceas, 761.
 Origanum, 547.
 Orlaya, 390.
 Ormocarpum, 304.
 Ornithogalum, 720.
 Ornithopus, 304.
 Orobanaceas, 529.
 Orobanche, 530.
 Orobus, 306.
 Oronciaceas, 750.
 Orontium, 753.
 Orquideas, 682.
 Orthanthera, 485.
 Orthosiphon, 545.
 Oryza, 762.
 Osbeckias, 346.
 Osbeckia, 346.
 Osmanthus, 473.
 Osmitopsis, 429.
 Osmunda, 783.
 Osmundaceas, 779.
 Ossaea, 347.
 Ostrya, 647.
 Osyris, 599.
 Otanthera, 347.
 Ottelia, 678.
 Ottonia, 642.

Oxalis, 268.
 Oxalideas, 267.
 Oxleya, 261.
 Oxycoccus, 449.
 Oxydendrum, 451.
 Oxypetalum, 484.
 Oxyria, 580.
 Oxystelma, 484.
 Pachira, 225.
 Pachyrhizus, 307.
 Pacouria, 477.
 Pacourinia, 417.
 Padina, 814.
 Paederia, 407.
 Paeonia, 178.
 Palaquium, 467.
 Palicouria, 409.
 Paliurus, 280.
 Pallenis, 422.
 Palmas, 733.
 Panax, 393.
 Pancratium, 704.
 Pandaneas, 745, 746.
 Pandanus, 746.
 Pangiaceas, 207.
 Pangium, 207.
 Paniceas, 761.
 Panicum, 765.
 Papaver, 193.
 Papaveraceas, 193.
 Papayaceas, 364.
 Papilionaceas, 294.
 Papoforeas, 761.
 Pappaea, 256.
 Pardanthus, 700.
 Parideas, 711.
 Parietaria, 629.
 Parinarium, 324.
 Paris, 711.
 Parkia, 310.
 Parkinsonia, 317.
 Parmelia, 797.
 Parmentiera, 495.

- Parnasicas*, 211.
Parnasaia, 211.
Paroniquieas, 369.
Paronychia, 371.
Paropsia, 363.
Paropsieas, 362.
Parsonsieas, 476.
Parthenium, 423.
Pasifloreas, 362.
Paspalum, 764.
Passerina, 597.
Passiflora, 363.
Pastinaca, 389.
Patagonula, 508.
Patellaria, 798.
Patrisia, 206.
Paulinieas, 254.
Paullinia, 255.
Pavetta, 408.
Pavia, 252.
Pavonia, 220.
Pectidium, 418.
Pedalineas, 497.
Pedalium, 497.
Pederieas, 401.
Pedicularis, 528.
Pedilanthus, 612.
Pegamum, 271.
Pelargonium, 264.
Peliosanthes, 714.
Peltandra, 752.
Peltigera, 798.
Peltodon, 545.
Pemphis, 343.
Penaea, 595.
Peneaceas, 595.
Penicillaria, 766.
Pentadesma, 245.
Pentaptera, 335.
Pentatropis, 483.
Peoniaceas, 173.
Pereskia, 377.
Periandra, 300.
Periploca, 483.
Periploceas, 482.
Peristrophe, 535.
Pernettya, 450.
Perotis, 173.
Persea, 588.
Perseas, 585.
Persica, 324.
Persoonia, 594.
Persoonieas, 594.
Pertusaria, 797.
Petasites, 419.
Petiveria, 563.
Petiverieas, 562.
Petrophila, 594.
Petroselinum, 385.
Peucedaneas, 383.
Peucedanum, 389.
Peumus, 625.
Peziza, 806.
Phaca, 303.
Phacelia, 499.
Phagnalon, 421.
Phalaris, 764.
Phallus, 806.
Pharbitis, 502.
Pharus, 763.
Phaseolus, 306.
Phelipea, 530.
Philadelphus, 349.
Philesia, 714.
Philopodendron, 230.
Phillyrea, 473.
Philodendron, 752.
Philodice, 731.
Philydrum, 730.
Phleum, 764.
Phlomis, 552.
Phoenix, 741.
Phormium, 719.
Phragmites, 767.
Phryma, 536.
Phrymium, 694.

- Phyllanthus, 621.
 Phyllocladus, 672.
 Physalis, 517.
 Physocalymna, 343.
 Physostegia, 551.
 Phytelaphas, 744.
 Phytheuma, 442.
 Phytocrene, 637.
 Phytolacca, 564.
 Piaranthus, 485.
 Picnomon, 434.
 Picramnia, 289.
 Picria, 446.
 Picridium, 437.
 Pierorhiza, 528.
 Pierardia, 257.
 Pieris, 451.
 Pilea, 629.
Pilularieas, 786.
 Pilea, 629.
 Pineda, 284.
 Pinguicula, 457.
 Pinkneya, 404.
 Pimpinella, 386.
 Pinus, 666, 667, 668.
 Piper, 640, 641, 642.
Piperaceas, 639.
 Piptatherum, 766.
 Piptolepis, 626.
 Piqueria, 418.
 Piratinera, 636.
 Pircunia, 563.
Pirenomicetes, 803.
Pirolaceas, 454.
Piroleas, 454.
 Piscidia, 302.
 Pisonia, 578.
 Pistacia, 288.
 Pistia, 750.
Pistiaceas, 749.
 Pisum, 305.
 Pithecoctenium, 493.
 Pithecolobium, 312.
- Pitosporeas*, 214.
 Pittosporum, 214.
 Planera, 653.
Plantaginaceas, 557.
 Plantago, 558.
Plataneas, 637.
 Platanthera, 687.
 Platanus, 638.
Platistemoneas, 193.
 Platonía, 245.
 Platycrater, 381.
 Plectranthus, 545.
 Pleurotallis, 685.
 Plocamium, 815.
 Plocaria, 814.
 Ploesslia, 257.
 Pluchea, 421.
 Pluckenetia, 616.
Plumbageas, 556.
Plumbaginaceas, 555.
 Plumbago, 557.
 Plumeria, 479.
Plumerieas, 476.
 Poa, 768.
 Podaxon, 805.
 Podocarpus, 672.
Podofilaceas, 190.
Podofleas, 191.
 Podophyllum, 191.
 Podospermum, 436.
 Podostemon, 680.
 Pogostemon, 546.
Podostemoneas, 680.
 Poecilochroma, 518.
 Poederia, 407.
 Poinciana, 316.
 Poinsettia, 615.
 Poivrea, 335.
 Polanisia, 203.
Polemoniaceas, 499.
 Polemonium, 500.
 Polianthes, 719.
Policarpeas, 370.

- Poligaleas*, 211.
Polygonaceas, 578.
Polygonéas, 579.
Polypodiaceas, 778.
Poliquieas, 370.
Polyalthia, 186.
Polygala, 212.
Polygonatum, 712.
Polygonum, 581.
Polylepis, 328.
Polyozus, 408.
Polypodium, 780.
Polypogon, 766.
Polyporus, 807.
Polytrichum, 791.
Polyscias, 393.
Pomaceas, 323.
Pongamia, 309.
Populus, 657.
Pontederia, 724.
Pontederiaceas, 724.
Porcelia, 185.
Porliera, 270.
Portlandia, 406.
Portulaca, 368.
Portulaceas, 368.
Posoqueria, 405.
Potalia, 489.
Potamogeton, 682.
Potentilla, 327.
Poterium, 328.
Pothos, 753.
Poupartia, 291.
Pourouma, 636.
Pourretia, 224.
Prasieas, 544.
Prangos, 391.
Premna, 539.
Preslia, 546.
Primula, 458.
Primulaceas, 457.
Primuleas, 458.
Prinos, 279.
Prinsepia, 324.
Printzia, 435.
Prockia, 207.
Prockieas, 206.
Prosopis, 312.
Prostantercas, 544.
Protea, 594.
Proteaceas, 593.
Proteineas, 594.
Protium, 291.
Prunus, 324.
Psacalium, 430.
Psiadia, 420.
Psidium, 352.
Psiloteas, 787.
Psiquineas, 197.
Psophocarpus, 308.
Psoralea, 299.
Psychotria, 408.
Ptarmica, 426.
Ptelea, 292.
Pteleaceas, 286.
Pteris, 787.
Pterocarpus, 310.
Pterospermum, 230.
Pterosposea, 456.
Pteroxylon, 257.
Pterygota, 229.
Ptychotis, 386.
Pueraria, 300.
Puccinia, 804.
Pulicaria, 422.
Pulmonaria, 510.
Pulveraria, 797.
Punica, 332.
Pupalia, 575.
Putoria, 410.
Putranjiva, 626.
Putranjiveas, 626.
Puya, 708.
Pyrethrum, 427.
Pyrola, 454.
Pyrrhosa, 592.

- Pyralaria, 600.
 Pyrus, 330.
 Pyxidanthera, 452.
 Quamoclit, 502.
 Quasia, 274.
 Queloneas, 523.
 Quenopodieas, 565.
 Quercus, 648, 649.
 Queriaceas, 370.
 Quillaya, 326.
 Quinchamalium, 599.
 Quisqualis, 335.
 Rafaneas, 197.
 Raflesiaceas, 608.
 Rafflesia, 608.
 Rajania, 709.
 Ramalina, 798.
 Ramneas, 279.
 Ramondia, 498.
 Randia, 405.
 Ranunculaceas, 172.
 Ranunculeas, 172.
 Ranunculus, 175.
 Rapateas, 729.
 Raphanus, 202.
 Raphia, 739.
 Rauwolfia, 477.
 Ravenala, 696.
 Reaumuria, 375.
 Reaumuriaceas, 375.
 Remijia, 404.
 Remireas, 758.
 Renealmia, 692.
 Reptonia, 464.
 Reseda, 205.
 Resedaceas, 204.
 Restiaceas, 730.
 Retzieas, 512.
 Rhexieas, 346.
 Rhacodium, 804.
 Rhagadiolus, 435.
 Rhamnus, 281.
 Rhaponticum, 424.
 Rheedia, 246.
 Rheum, 580.
 Rhexieas, 346.
 Rhinacanthus, 535.
 Rhinanthus, 528.
 Rhipsalis, 377.
 Rhizoctonia, 805.
 Rhizomorpha, 805.
 Rhizophora, 337.
 Rhodea, 713.
 Rhododendron, 451.
 Rhodomenia, 815.
 Rhopala, 595.
 Rhus, 289.
 Rhynchanthera, 346.
 Rhynchotheca, 265.
 Rhytiglossa, 534.
 Ribes, 378.
 Richardia, 753.
 Richardsonia, 409, 410.
 Ricciaceas, 793.
 Ricinus, 619.
 Riedleia, 230.
 Rinantideas, 523.
 Rincosporeas, 755.
 Rincoteceas, 265.
 Ripogonum, 713.
 Ripsalideas, 376.
 Rivina, 563.
 Rivineas, 562.
 Rizoboleas, 253.
 Rizocarpeas, 785.
 Rizoforeas, 336.
 Robinia, 302.
 Roccella, 798.
 Rochea, 372.
 Rodoreas, 450.
 Roemeria, 194.
 Rondeletia, 406.
 Roquelieas, 506.
 Rosa, 329.
 Rosaceas, 321.
 Roseas, 323.

- Rosmarinus, 550.
 Rostellularia, 534.
 Rotboeliaceas, 762.
 Rottlera, 619.
 Roubieba, 568.
 Rouhamon, 488.
 Rouseaceas, 444.
 Roussea, 445.
 Roxburghia, 714.
 Roxburghiaceas, 714.
 Royena, 469.
 Rubia, 410.
 Rubiaceas, 400.
 Rubus, 327.
 Ruelieas, 532.
 Rumex, 583.
 Ruscus, 713.
 Ruta, 271.
 Rutaceas, 270.
 Rytiphlaea, 814.
 Sabal, 741.
 Sabattia, 490.
 Sabineas, 302.
 Saccharum, 773.
 Sacellium, 508.
 Sageretia, 280.
 Sagittaria, 679.
 Sagus, 739.
 Salacia, 247.
 Salicarieas, 342.
 Salicineas, 656.
 Salicornia, 569.
 Salicornieas, 566.
 Salisburia, 672.
 Salix, 657.
 Salmalia, 226.
 Salpigloseas, 522.
 Salsola, 570.
 Salsolaceas, 564.
 Salsoleas, 566.
 Salvadora, 557.
 Salvadoraceas, 557.
 Salvia, 549.
 Salvinias, 786.
 Samadera, 274.
 Sambuceas, 398.
 Sambucus, 398.
 Samideas, 282.
 Samoleas, 458.
 Samolus, 459.
 Sandoricum, 269.
 Sanguinaria, 194.
 Sanguisorba, 328.
 Sanguisorbeas, 322.
 Sanicula, 385.
 Saniculeas, 382.
 Sansevieria, 719.
 Santalaceas, 598.
 Santalum, 600.
 Santolina, 427.
 Sapindaceas, 253.
 Sapindeas, 254.
 Sapindus, 255.
 Sapium, 616.
 Saponaria, 216.
 Sapota, 466.
 Sapotaceas, 464.
 Saproisma, 408.
 Saracha, 517.
 Sarcocephalus, 404.
 Sarcocolla, 595.
 Sarcofiteas, 606.
 Sarcophyte, 607.
 Sarcostemna, 484.
 Sarcostignia, 598.
 Sargassum, 816.
 Sarmienta, 446.
 Sarotamnus, 297.
 Sarotheca, 535.
 Sarracenia, 193.
 Sarracenieas, 193.
 Sassafras, 590.
 Satureia, 548.
 Satureieas, 543.
 Saurauja, 236.
 Sauraujeas, 236.

Saurureas, 643.
Saururus, 643.
Saussurea, 431.
Sauvageas, 209.
Sauvagesia, 210.
Saxifraga, 381.
Saxifragaceas, 379.
Saxifrageas, 380.
Scabiosa, 414.
Scaevola, 444.
Scandix, 391.
Seepa, 626.
Scheferdia, 601.
Schinus, 290.
Schizandraceas, 186.
Schizandreas, 187.
Schizeaceas, 778.
Schizogyne, 422.
Schkuhria, 425.
Schmidelia, 256.
Schnella, 320.
Schoenocaulon, 726.
Schotia, 319.
Schultesia, 490.
Sciadopitys, 670.
Scilla, 720.
Scindapsus, 753.
Scirpus, 758.
Scleranthus, 371.
Scleria, 757.
Scleroderma, 805.
Scolopendrium, 781.
Scolymus, 435.
Scoparia, 527.
Scopolia, 520.
Scorpiurus, 303.
Scorzonera, 436.
Scrophularia, 526.
Scutellaria, 550.
Seytosiphon, 815.
Seaforthia, 737.
Secale, 772.
Secamone, 483.

Secamoneas, 482.
Sechium, 360.
Securigera, 304.
Sedum, 372.
Sequierieas, 562.
Selaginaceas, 542.
Selinum, 388.
Semecarpus, 287.
Sempervivum, 373.
Senebiera, 200.
Senecio, 430.
Senecionideas, 416.
Sequoia, 670.
Sericographis, 534.
Serissa, 410.
Serjania, 255.
Serratula, 434.
Sesameas, 496.
Sesamum, 497.
Sesbania, 302.
Seseli, 387.
Seselineas, 383.
Sessea, 521.
Sesubium, 374.
Setaria, 765.
Shorea, 234.
Sibtorpieas, 523.
Sida, 222.
Sideas, 219.
Sideritis, 551.
Siderodendron, 407.
Sideroxylon, 466.
Silaus, 388.
Silene, 216.
Sileneas, 216.
Silerineas, 383.
Silphium, 423.
Silybum, 433.
Simaba, 274.
Simaruba, 274.
Simarubeas, 273.
Simploceas, 470.
Sinapis, 201.

Sinfonieas, 243.
Sipanea, 406.
Siphocampylus, 440.
Siphonia, 617.
Siringeas, 472.
Sisimbreas, 197.
Sison, 386.
Sisymbrium, 200.
Sisyrinchium, 698.
Sium, 386.
Slevogtia, 490.
Sloanea, 232.
Smilacina, 712.
Smilax, 712.
Smirnum, 392.
Sobralia, 688.
Soforeas, 294.
Soja 307.
Solanaceas, 511.
Solandra, 519.
Solaneas, 512.
Solanum, 513, 514, 515, 516.
Soldanella, 459.
Solenostemma, 483.
Solidago, 420.
Sonchus, 437.
Sonneratia, 352.
Sophora, 296.
Sorghum, 774.
Soulamea, 213.
Soulameas, 213.
Soymida, 260.
Spadaca, 540.
Sparattosperma, 494.
Sparganium, 748.
Sparganophorus, 417.
Sparmannia, 231.
Spartium, 297.
Spathium, 643.
Spathodea, 494.
Specularia, 442.
Spergula 217.
Spermacoe, 409.

Sphacele, 549.
Sphacelia, 804.
Sphaeralcea, 220.
Sphaeranthus, 420.
Sphaeria, 806.
Sphaerococcus, 815.
Sphaerozyga, 816.
Sphagnum, 791.
Spigelia, 487.
Spilanthus, 424.
Spinacia, 568.
Spiraea, 326.
Spiranthes, 688.
Spondias, 290.
Stachys, 551.
Stachytarpha, 537.
Stackhousia, 623.
Stadmannia, 257.
Stagmaria, 288.
Stalagmitis, 245.
Stapelia, 485.
Staphylea, 277.
Statice, 556.
Stauntonia, 187.
Stellaria, 217.
Stemodia, 526.
Stemonacanthus, 534.
Stenandrium, 534.
Stenanthium, 727.
Stenolobium, 307.
Stenoptera, 697.
Stenostomum, 407.
Stenotaphrum, 765.
Stephania, 189.
Sterculia, 228.
Stereospermum, 494.
Sternbergia, 703.
Sticta, 798.
Stillingia, 616.
Stipa, 766.
Stratiotes, 678.
Stravadium, 355.
Streilitzia, 696.

Streptopus, 712.
 Strophanthus, 480.
 Strumpfia, 407.
 Strychnos, 488.
 Styloceras, 615.
 Stylodiscus, 622.
 Stylosanthes, 304.
 Styphelia, 453.
 Styrax, 471.
 Suaeda, 569.
Subularieas, 198.
Suedeas, 566.
 Susum, 730.
 Swartzia, 310.
Swartzieas, 295.
 Swertzia, 492.
 Swietenia, 260.
 Symphoricarpos, 400.
 Symphytum, 509.
 Symplocarpus, 753.
 Symplocos, 471.
 Synchodendron, 418.
 Syngonium, 752.
 Syringa, 473.
 Syzygium, 354.
 Tabebuia, 494.
 Tabernaemontana, 478.
Tacaceas, 710.
 Tacca, 710.
 Tachia, 491.
 Tacsonia, 363.
 Tagetes, 425.
 Talauma, 182.
 Talinum, 369.
 Tamarindus, 317.
Tamariscineas, 344.
 Tamarix, 344.
 Tamus, 710.
 Tanacetum, 429.
 Tanaecium, 495.
 Tandonia, 572.
 Tanghinia, 478.
Tapsieas, 383.

Tapura, 284.
 Taraxacum, 437.
Targionaceas, 794.
 Tasmannia, 181.
Taxineas, 670.
 Taxodium, 665.
 Taxus, 671.
 Tecoma, 494.
 Tectona, 539.
 Teesdalia, 200.
 Telanthera, 575.
Telefieas, 370.
 Temus, 181.
Teofrastaceas, 462.
Teofrasteas, 463.
 Tephrosia, 301.
 Teramnus, 306.
Terebintaceas, 285.
 Terminalia, 334.
Terminalieas, 334.
Ternstremiaceas, 235.
Ternstremieas, 235.
 Ternstroemia, 236.
Tersonieas, 563.
 Tessaria, 422.
 Testudinaria, 710.
 Tetilla, 455.
 Tetracera, 179.
 Tetragonia, 374.
Tetragoniaceas, 374.
 Tetragonolobus, 299.
 Tetrameles, 361.
Tetrantereas, 586.
 Tetranthera, 590.
 Teucrium, 552.
 Thalictrum, 174.
 Thamnia, 207.
 Thapsia, 390.
 Thea, 237.
 Thebetia, 478.
 Theligonum, 629.
 Theobroma, 229.
 Theophrasta, 463.

Thesium, 599.
 Thespesia, 222.
 Thibaudia, 448.
 Thlaspi, 199.
 Thuja, 664.
 Thuraria, 469.
 Thymus, 547.
 Thypha, 747.
 Thyphonium, 751.
 Tibouchina, 346.
 Ticorea, 273.
 Tifaceas, 747.
 Tigridia, 700.
 Tilia, 231.
 Tiliaceas, 230.
 Tillandsia, 707.
 Timeleas, 595.
 Tlaspideas, 196.
 Tococa, 347.
 Toddalia, 292.
 Tonina, 731.
 Tonsella, 247.
 Tordilineas, 383.
 Tordylium, 390.
 Torenia, 527.
 Torilis, 391.
 Tormentilla, 328.
 Torreya, 671.
 Torula, 804.
 Tournefortia, 508.
 Tovomita, 244.
 Toxicophlaca, 477.
 Trachelium, 442.
 Trachylobium, 319.
 Trachytella, 180.
 Tradescantia, 733.
 Tragia, 616.
 Tragopogon, 436.
 Trapa, 340.
 Tremandreas, 213.
 Tremella, 806.
 Trianthema, 368.
 Tribulus, 269.

Tricerastes, 361.
 Trichilia, 259.
 Trichoceros, 687.
 Trichodesma, 510.
 Trichonema, 700.
 Trichosanthes, 360.
 Tricuspidaria, 233.
 Tridax, 426.
 Trientalis, 459.
 Trifolium, 298.
 Triglochin, 679.
 Trigonella, 298.
 Trigonia, 213.
 Trigonaceas, 213.
 Trigueia, 513.
 Triguereas, 512.
 Trillium, 711.
 Triosteum, 399.
 Triphasia, 239.
 Triplaris, 584.
 Tripsacum, 773.
 Tripterococcus, 623.
 Triptilion, 435.
 Triptolemaea, 309.
 Triquilieas, 258.
 Trisetum, 768.
 Tristemma, 347.
 Tristicha, 680.
 Triticum, 771.
 Triumpheta, 231.
 Trixis, 435.
 Trochodendron, 181.
 Trollius, 176.
 Tropaeolum, 266.
 Tropeoleas, 265.
 Trophis, 637.
 Tuber, 805.
 Tulbaghia, 722.
 Tulipa, 718.
 Tulipaceas, 716.
 Tumbergieas, 532.
 Tupa, 440.
 Tupistra, 713.

- Turgenia, 391.
 Turnera, 367.
Turneraceas, 366.
 Turraea, 259.
 Tussilago, 420.
 Tylophora, 485.
 Typha, 747.
 Ulex, 297.
 Ullucus, 369, 572.
Ulmaceas, 652.
 Ulmus, 653.
 Ulva, 816.
Umbelíferas, 381.
 Umbilicaria, 797.
 Umbilicus, 372.
 Uncaria, 402.
 Unona, 185.
 Unxia, 423.
Uranieas, 695.
 Urceola, 478.
 Urceolaria, 798.
 Uredo, 804.
 Urena 220.
 Urginia, 720.
 Urtica, 628.
Urticaceas, 627.
 Usnea, 799.
Usterieas, 487.
 Utricularia, 457.
 Uvaria, 185.
 Uvularia, 727.
Vaccinieas, 447.
 Vaccinium, 448.
 Vahea, 477.
 Valeriana, 412.
Valerianeas, 411.
 Valerianella, 412.
Valisnerieas, 677.
 Vallisneria, 678.
 Vallea, 233.
 Vallesia, 478.
 Vanda, 687.
Vandeas, 685.
 Vandellia, 527.
 Vangueria, 407.
 Vanilla, 688.
 Varennea, 321.
 Variolaria, 797.
 Varronia, 507.
 Vateria, 234.
Veleas, 197.
 Vella, 202.
Vellosieas, 701.
 Veratreas, 726.
 Veratrum, 727.
Verbasceas, 523.
 Verbascum, 525.
 Verbena, 537.
Verbenaceas, 536.
Verbeneas, 537.
 Verbesina, 424.
 Vernonia, 417.
Vernoniaceas, 416.
 Veronica, 528.
Veroniceas, 524.
 Verticillaria, 244.
 Vestia, 521.
 Viburnum, 399.
 Vicia, 305.
Vicieas, 294.
 Victoria, 192.
 Vigna, 307.
 Villarsia, 492.
 Vinca, 479.
 Vincetoxicum, 483.
Viníferas, 261.
 Viola, 209.
Violarieas, 208.
Violeas, 209.
 Virgilia, 296.
 Viscum, 397.
 Vismia, 242.
Vismieas, 241.
 Visnea, 236.
Viteas, 537.
 Vitex, 540.

Vitis, 263.
Vivianieas, 265.
Viviania, 265.
Voandzeia, 314.
Vochisieas, 336.
Vochysia, 336.
Volkameria, 539.
Wahlenbergia, 441.
Wahlenbergieas, 441.
Walkera, 275.
Wallenia, 461.
Wallichia, 230.
Wallichieas, 228.
Walsura, 259.
Waltheria, 230.
Wattsonia, 700.
Wedelia, 423.
Weigeltia, 461.
Weimannia, 380.
Wendtia, 265.
Wigandia, 511.
Wilbrandia, 360.
Willdenowia, 731.
Willughbeia, 477.
Willughbeieas, 476.
Withania, 518.
Witheringia, 516.
Wrightia, 480.
Wrightieas, 476.
Xanthium, 423.
Xanthochymus, 245.

Xanthorrhoea, 723.
Xanthosoma, 752.
Xanthoxilaceas, 271.
Xerotideas, 729.
Xilopieas, 183.
Ximenia, 238.
Xirideas, 731.
Xylophia, 185.
Xysmalobium, 483.
Xyris, 731.
Yucca, 719.
Zacintha, 437.
Zalacca, 739.
Zamia, 675.
Zanonia, 358.
Zanthorrhiza, 178.
Zantoxylum, 272.
Zea, 763.
Zigofleas, 269.
Zileas, 197.
Zilla, 202.
Zingiber, 691.
Zingiberaceas, 688.
Zingibereas, 690.
Zinnia, 423.
Zizyphus, 280.
Zostera, 682.
Zumaquineas, 286.
Zygnema, 816.
Zygophyllum, 269.

ÍNDICE ALFABÉTICO

DE LOS NOMBRES VULGARES QUE CORRESPONDEN A LAS PLANTAS CONTENIDAS EN EL CUADRO DE LAS FAMILIAS (1).

Los números indican las páginas.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Ababol comun, 194. | Abobra del Brasil, 359. |
| — morado, 194. | Abobrinha do mató en el Brasil, 359, 360. |
| Abaca de Filipinas, 696. | Abridor, 324. |
| Abacaxir de tingir en el Brasil, 707. | Abrojo acuático, 340. |
| Abar de Filipinas, 493. | — de Asso, 432. |
| Abedul, 651. | — de la Florida, 377. |
| Abedulillo, 647. | — terrestre de Europa, 269. |
| Abejera, 687. | — terrestre de Cuba, 269. |
| Abelmosco, 221. | Abrotano hembra, 427. |
| Abeto blanco de Europa, 668. | — macho, 428. |
| — blanco del Canadá, 669. | Abuta del Brasil, 188. |
| — comun, 668. | — miuda del Brasil, 188. |
| — de las Californias, 669. | Abutua del Brasil, 188. |
| — de la Cochinchina, 670. | Acacia blanca, 302. |
| — de Levante, 668. | — de dos puas, 302. |
| — de Méjico, 669. | — de flores sedosas, 313. |
| — falso, 669. | — del pais, 325. |
| — negro del Canadá, 669. | — de Rusia, 303. |
| — rojo, 669. | — de tres espinas, 315. |
| Abey hembra de Cuba, 316. | — de tres puas, 315. |
| — macho de Cuba, 495. | — pegajosa, 302. |
| Abi del Brasil, 465. | — rosa, 302. |
| Abiu del Brasil, 465. | Acafresna, 331. |
| Ablage de Guinea, 437. | Acajú del Brasil, 287. |

(1) Agréganse los nombres de varias producciones de las mismas plantas.

- Acana de Cuba, 467.
 Acapulco de Filipinas, 318.
 Acariçoba del Brasil, 384.
 Acatlzautili de Méjico, 687.
 Acaya del Brasil, 290.
 Acayaiba del Brasil, 287.
 Acebo, 278.
 Acebuche, 473.
 Acedera acuática, 583.
 — blanca de Guinea, 221.
 — comun, 583.
 — de Tanger, 583.
 — redonda, 583.
 — roja de Guinea, 221.
 — romana, 583.
 Acederaque, 259.
 Acederilla, 268, 583.
 Acedinha do brejo en el Brasil, 610.
 Aceite de Behen, 315.
 — de Castor, 619.
 — de Cayeput, 351.
 — de Marmota, 324.
 — de María en Nueva-Granada, 245.
 — de Palo, 234.
 — de Pino, 667.
 — esencial de Trementina, 666.
 — pinhoen del Brasil, 618.
 — templino, 667.
 Aceitunillo de Cuba, 622.
 Aceituno, 473.
 Acelga cultivada, 566.
 — del Perú, 583.
 — silvestre, 566.
 — silvestre de Jarava, 556.
 Acelgueta de monte, 566.
 Acerolo comun, 330.
 — de fruto blanco, 330.
 — de fruto rojo, 330.
 Achacapuli del Perú, 233.
 Achicoria amarga, 435.
- Achicoria amarga en Méjico, 414, 437.
 — dulce, 437.
 — dulce de Méjico, 437.
 — silvestre 435.
 — verrugosa de Zante, 437.
 Achiotte, 206.
 Achiotillo, 206.
 Achiotl de Méjico, 206.
 Achira cimarrona del Perú, 694.
 — de monte en el Perú, 692, 694.
 — del Perú, 694.
 Achocasapos, 208.
 Achote, 206.
 Achupalla del Perú, 708.
 Acibar caballino, 719.
 — socotrino, 719.
 Acigutre, 525.
 Aco de Cumaná, 302.
 Acónito salutifero, 177.
 Acoro bastardo, 699.
 — palustre, 699.
 — verdadero, 753.
 Acouma de América, 466.
 Adelfa, 480.
 Adelfilla comun, 597.
 — de hoja estrecha, 339.
 — pelosa, 339.
 Adhatoda de Ceilan, 535.
 Adianto áureo, 791.
 Adormidera, 193.
 — espinosa, 194.
 — maritima, 194.
 Adornos, 267.
 Afaca, 306.
 Afreita, 768.
 Agalocho de Filipinas, 615.
 Agallas, 649.
 Agárico blanco, 807.
 — de los cirujanos, 807.
 — de Encina, 807.

- Agárico yesquero, 807.
 Agâti de la India, 302.
 Agavanzo, 329.
 Agavepalo de Méjico, 708.
 Agengibre, 691.
 Agenuz comun, 177.
 — de jardin, 177.
 Agerato, 426.
 Ages de los hist. prim. de las Indias, 502.
 — de Humboldt, 709.
 Agi de Nueva-Granada, 181.
 Agoho de Filipinas, 661.
 Agracejo de Europa, 189.
 — de Cuba, 293, 461.
 Agrecillo, 189.
 Agriaz, 259.
 Agrimonia, 328.
 Agripalma, 551.
 Agrito, 189.
 Agrostema 217.
 Aguacate comun de Méjico, 588.
 — oloroso de Méjico, 588.
 Aguarrás, 666.
 Aguashi de Quito, 739.
 Aguatle de Méjico, 650.
 Aguavientos, 552.
 Aguavilla, 450.
 Aguay del Brasil, 478.
 Aguazul, 374.
 Aguedita de Cuba, 289.
 Aguiña, 177.
 Aguinaldos de Cuba, 503.
 Aguja de pastor, 264.
 Ahnalizocotlque de Méjico, 249.
 Ahoehuettl de Méjico, 665.
 Ahuacaquauhilt de Méjico, 588.
 Ahuacate comun de Méjico, 588.
 Ahuehuete de Méjico, 665.
 Aiguazul, 374.
 Aimit de Filipinas, 634.
 Ajedrea comun, 548.
 — de América, 546.
 Ajenjo comun, 428.
 — de Canarias, 428.
 — de Méjico, 428.
 — marítimo, 428.
 — menor, 428.
 — pónico, 428.
 — romano, 428.
 — serifio, 200.
 Aji arnaucho del Perú, 517.
 — de las Antillas, 516, 517.
 — de Nueva-Granada, 181.
 — de Quito, 517.
 — guaguao de Cuba, 517.
 Ajito de Cumaná, 204.
 Ajo almizcleño, 722.
 — comun, 721.
 — de oso, 722.
 — pardo, 721.
 — porro, 721.
 — porruno, 721.
 — puerro, 721.
 Ajomate, 816.
 Ajonjera comun, 432.
 — juncal, 437.
 Aljonjoli, 497.
 Ala, 422.
 Alacrancillo de Cuba, 508.
 — de mar en Cuba, 508.
 Alacranera, 303, 569.
 Aladierna, 281.
 Alagao de Filipinas, 539.
 Alamo ateniense, 658.
 — blanco, 657.
 — de la Carolina, 658.
 — de Grecia, 658.
 — de Italia 657.
 — de Lombardia, 657.
 — de Virginia, 658.
 — negro, propiamente, 657.

- Alamo negro, abusivamente, 653.
 — plateado, 658.
 — temblón, 657.
 Alarguez de algunos, 622.
 Alas de ángel, 534.
 Alatonero, 654.
 Alazor, 433.
 Albada, 216.
 Albahaca aromática de Cuba, 545.
 — de hoja ancha, 545.
 — de Tomillo, 548.
 — fina, 545.
 — larga, 569.
 — limón, 545.
 — silvestre mayor, 548.
 — silvestre menor, 548.
 Albahaquilla común, 629.
 — de Chile, 299.
 — de Cuba, 419.
 — de río, 548.
 Albardin, 763.
 Albaricoque de Europa, 324.
 — de la isla de Santo Domingo, 245.
 — salvaje de Cayena, 356.
 Albaricoquero, 324.
 Albarraz, 177.
 Albérchigo, 324.
 Albohol de Castilla, 215.
 Alborocera, 450.
 Alcachofa, 433.
 Alcachofilla, 434.
 Alcana verdadera de Oriente, 343.
 Alcandia, 774.
 Alcanfor crudo, 588.
 — de Borneo, 234.
 — de Canarias, 550.
 — de la China, 588.
 — del Japon, 588.
 — de Sumatra, 234.
 Alcanfora del Brasil, 619.
 Alcanforada, 569.
 Alcaparrilla de Cuba, 319.
 Alcaparrillo del Perú, 319.
 Alcaparro de Europa, 204.
 — de Filipinas, 204.
 — de Nueva-Granada, 319.
 Alcaravca, 386.
 Alcaravía, 386.
 Alcarceña, 305.
 Alcassuz del Brasil, 300.
 Alcatraz de Méjico, 751.
 Alcaucil cultivado, 433.
 — silvestre, 434.
 Alcornoque de América, 260.
 — de Europa, 648.
 — del Orinoco, 321.
 — divino de Jamaica, 617.
 Alcozcaz, 751.
 Aldiza, 432.
 Alecrin bravo del Brasil, 242.
 — do campo en el Brasil, 538.
 Alegria, 497.
 Aleli amarillo, 198.
 — blanco, 198.
 — camaleón, 198.
 — de Mahon, 200.
 — del Papa, 200.
 — encanecido, 198.
 — encarnado, 198.
 — griego, 198.
 — liso, 198.
 — pajizo, 198.
 Aleluya de Europa, 268.
 — roja de Guinea, 221.
 — virgosa de Coquimbo en Chile, 268.
 Alerce africano, 664.
 — balsámico del Canadá, 669.
 — blanco, 669.
 — chileno, 664.
 — común del Canadá, 669.
 — de los Alpes, 669.

- Alerce del Canadá, 669.
 — de Siberia, 669.
 — español, 663, 664.
 — europeo, 669.
 — rojo, 669.
 Alestas, 764.
 Alfalfa arborea, 298.
 — cultivada, 298.
 Alfarroba de Canarias, 373.
 Alfabaca de cobra en el Brasil, 273.
 Alficós de Valencia, 358.
 Alfileres, 442.
 Alfilerillo de Chile, 391.
 — de pastor, 264.
 Alfonsigo comun, 288.
 — de tierra, 314.
 Alforfon, 582.
 Alga sensitiva, 816.
 — de algunos, 682.
 Algalia, 221.
 Algaritofé de Canarias, 550.
 Algarroba comun, 317.
 — de Castilla, 305.
 Algarroba veza, 305.
 Algarrobilla de Europa, 305.
 — de Santa Marta, 311.
 Algarrobo comun de Europa, 317.
 — de los Andes, 312.
 — de Chile, 312.
 — de Nueva-Granada, 312.
 — del Orinoco, 320.
 — loco, 320.
 Algazul, 374.
 Algodoeiro del Brasil 222.
 Algodoncillo de Méjico, 484.
 Algodonero arbóreo, 222.
 — blanco de América, 226.
 — herbáceo, 222.
 Algodonosa, 427.
 Algue-laguen de Chile, 549.
 Alhargama, 271.
 Alharma, 271.
 Alheña europea, 474.
 — oriental, 343.
 Alhocigo, 288.
 Alholva, 298.
 Alhucema comun, 546.
 — rizada, 546.
 Aliaga, 297.
 Alicaneja de Canarias 510.
 Aliculi del Brasil, 744.
 Aligustre, 474.
 Aliso comun de Europa, 652.
 — de Galeno para Cienfuegos, 551.
 — del Perú, 652.
 Alitierno, 473.
 Allozo, 324.
 Almácigo de Cuba, 291.
 — de Canarias, 288.
 Almajo comun, 569.
 — dulce, 569.
 — salado, 569.
 Almaro, 549.
 Almea, 679.
 Almendrero, 324.
 Almendro comun, 324.
 — de los bosques en las Antillas, 247.
 — de Cuba, 237.
 — de la India, 334.
 — de los trópicos, 334.
 — silvestre de Cuba, 466.
 Almendron de las Antillas, 352.
 — del Choco, 743.
 — de Nueva-Granada, 253, 314.
 Almez, 654.
 Almiron amargo, 435.
 — dulce, 437.
 Almizcleña, 513.
 Almizclera, 264.
 Almizclillo de Méjico, 519.
 — de Chile, 435.

Almizclillo del Perú, 519.
 Almoradux comun, 547.
 — de algunos, 546.
 Almorejo, 766.
 Almortas, 305.
 Almudela, 653.
 Aloe caballino, 706, 719.
 — hepático, 719.
 — leño, V. Leño aloes.
 — socotrina, 719.
 Alpiste, 764.
 Alpistera, 764.
 Alquimila de Méjico, 265.
 Alquitira, 303.
 Altabaca, 422.
 Altareina oficial, 426, 427.
 Altea comun, 220.
 — de algunos, 221.
 Altramuz comun, 308.
 — del diablo, 296.
 — hediondo, 296.
 Alubia, 306.
 Alverja cultivada, 305.
 — silvestre, 306.
 Alverjana comun, 306.
 — loca, 306.
 Alverjon, 305.
 Alzoyati de Hernandez,
 577.
 Amacayo de Méjico, 704.
 Amaceno, 325.
 Amacoztic de Méjico, 634.
 Amaga de Filipinas, 469.
 Amancaes del Perú, 705.
 Amapola comun, 194.
 — morada, 194.
 Amarantinas, 575.
 Amargaza, 427.
 Amargon comun, 437.
 — de Aragon, 437.
 Amargoso de Filipinas, 360.
 Amaro, 549.
 Amate de Méjico, 634.

Amatzauhtli, species de Hernandez, 686.
 Ambaiba del Brasil, 637.
 Ambaitinga del Brasil, 637.
 Ambarina comun, 221.
 — en Méjico, 414.
 Ambaúva do vinho en el Brasil, 636.
 — mansa del Brasil, 636.
 Ambú del Brasil, 290.
 Ameixeira da terra en el Brasil, 238.
 Amelanchiero, 330.
 Amesquite de Méjico, 634.
 Amiga de noche, 719.
 Amiqui de Cuba, 250.
 Ammi de Creta, 386.
 — verdadero, 386.
 — vulgar, 386.
 Amoguis de Filipinas, 224.
 Amolle de Méjico, 719.
 Amomo de los antiguos, 262.
 — vulgar, 386.
 Amoniaco, 389.
 Amor al uso, 221.
 — del Canadá, 320.
 — de hortelano, 411.
 — seco chico de Cuba, 304.
 — seco grande de Cuba, 304.
 — seco mediano de Cuba, 304.
 Amores mil, 412.
 Amormio, 704.
 Anabi del Brasil, 489.
 Anacanseros comun, 372.
 — siempre verde, 372.
 Anacardo de Asia, 287.
 Anamú de Cuba, 563.
 Ananas brava de América,
 707.
 — cultivada de América, 707.
 — selvática de América, 707.
 Anapelo azul, 177.
 — de Jarava, 177.

- Anaucho de Nueva-Andalucía, 221.
 Anauco de Nueva-Granada, 309.
 Ancoacha del Perú, 222.
 Ancochuta del Perú, 421.
 Anda-açu del Brasil, 617.
 Andiroba del Brasil, 261.
 Andurinha del Brasil, 614.
 Anea, 747.
 Anemone de los bosques, 174.
 — de los jardines, 174.
 Angélica carlina, 432.
 — oficial, 388.
 Angelim amargoso del Brasil, 314.
 — coco del Brasil, 314.
 — do mato en el Brasil, 407.
 Angelon de Caracas, 525.
 Angico del Brasil, 312, 313.
 Angiroba del Brasil, 261.
 Angostura brasileña, 272.
 — falsa, 488, 293.
 — verdadera, 273.
 Anguria, 358.
 Anime de los ingleses, 320.
 Aninga del Brasil, 752.
 Anís comun, 386.
 — estrellado, 181.
 — moseado de Filipinas, 592.
 Anís-anís del Perú, 425.
 Anisillo cimarron de Méjico, 425.
 — del Orinoco, 642.
 — del Perú, 425.
 Anon de Cuba y Filipinas, 184.
 Anona de Cuba, 184.
 — lisa de la Guayana, 184.
 Anredera de las Antillas, 572.
 Ansega enamorada, 304.
 Anserina, 568.
 Anublo, 804.
 Anteojo de poeta, 424.
 Anteojo de poeta, 424.
 Añil bastardo de Cayena, 301.
 — basto de la América septentrional, 296.
 — cimarron de Cuba, 300.
 — del Brasil, 300.
 — de Ceilan, 301.
 — de Goatemala, 299.
 — de la India, 299.
 — del Senegal, 300.
 — trepador del Brasil, 262.
 Añilera de la India, 299.
 Aongera, 432.
 Apasote de Cuba, 567.
 Api del Perú, 763.
 Apichu del Perú, 502.
 Apio comun, 385.
 — caballar, 392.
 — del Brasil, 300.
 — de monte, 388.
 — de perro, 387.
 — lechal, 389.
 Apogitagoara del Brasil, 272.
 Apui del Brasil, 244.
 Apuit de Filipinas, 236.
 Aracuy del Brasil, 314, 744.
 Arak de Persia, 557.
 Arándano agrio, 449.
 — comun, 448.
 — encarnado, 448.
 — negro, 448.
 — punteado, 448.
 Araña, 177.
 Arañon, 325.
 Arañuela, 177.
 Arar de Marruecos, 664.
 Araça del Brasil, 353.
 — de praya en el Brasil, 353.
 Araticu do mato en el Brasil, 184.
 Araticum do alagadisso en el Brasil, 185.
 — do mato en el Brasil, 184.

Araticum do rio en el Brasil, 185.
 Arbol cerero de la Luisiana, 660.
 — del Aceite de Maria en el Perú, 244.
 — del Ajo en el Perú, 507.
 — del Alcanfor de Borneo, 234.
 — del Alcanfor de la China y del Japon, 588.
 — del Algodon de la India, 225.
 — de Alverjas en las Antillas, 308.
 — del amor, 320.
 — del Bálsamo en las Antillas, 292.
 — del burro, 508.
 — de la brea en Filipinas, 291.
 — de las Calabazas en las Antillas, 495.
 — de la Canela de Ceilan, 587.
 — de la Canela de los primeros descubridores de América, 246.
 — del Castor en Virginia, 182.
 — de la cera en Europa, 660.
 — de la cera en Cuba, 616.
 — de la cera de la Luisiana, 660.
 — del Chunchu en el Perú, 335.
 — del cielo, 293.
 — del clavo, 354.
 — del coral, 309.
 — de las cruces en Acapulco, 405.
 — de las cuentas del jabon en América, 255.
 — de las cuentas jaboneras en América, 255.
 — de las cuentas de rosario en América, 257.

Arbol del cuerno en Cuba, 313.
 — del diablo en las Caribeas, 204.
 — de la falsa Pimienta, 290.
 — del Guaco de Nueva-Granada, 394.
 — del Incienso de la India, 291.
 — de Judas, 320.
 — de la leche de Caracas, 637.
 — de la leche de Demerara, 478.
 — de las manitas en Méjico, 226.
 — de las manitas en el Perú, 638.
 — de la Mostaza en la Biblia, 557.
 — de las Nueces jaboneras en América, 255.
 — de la Nuez moscada de las Molucas, 592.
 — del pan en Cuba, 637.
 — de Panamá, 478.
 — del Paraíso en Castilla, 601.
 — del Paraíso en Andalucía, 259.
 — de las pelucas, 289.
 — del Peregil en el Perú, 380.
 — del Perú, 290.
 — de los Piñones de Indias, 618.
 — de los pistachos, 288.
 — de las pulgas, 289.
 — de raiz en Filipinas, 634.
 — de roseta en el Orinoco, 495.
 — de la sal en Madagascar, 737.
 — de la sangre de Drago cartagenera, 310.
 — de Santa Lucia, 325.

- Arbol del sebo en Cuba, 616.
 — del sebo en el Perú, 592.
 — de la seda, 484.
 — del tambor en el Perú, 224.
 — del Té de la China, 237.
 — del Té de la India, 356.
 — de las Tulipas, 183.
 — del Ule en Méjico, 637.
 — de la vaca en Caracas, 636.
 — del viajero en Madagascar, 696.
 — de la vida americano, 664.
 — de la vida chino, 664.
 — de la vida de los Guaranos, 739.
 — maravilloso de Canarias, 589.
 — santo de Canarias, 589.
 — triste, 475.
 Arbore de paina en el Brasil, 226.
 Arbusto del Incienso, 663.
 Arce aplatanado, 251.
 — blanco, 251.
 — comun, 251.
 — con hoja de Fresno, 251.
 — de Azúcar, 251.
 — del Canadá, 251.
 — de Candia, 251.
 — de Creta, 251.
 — de España, 251.
 — de Italia, 251.
 — de Mompeller, 251.
 — de Virginia, 251.
 — menor, 251.
 — Real, 251.
 — sacarino, 251.
 Archipin de Méjico, 291.
 Ardivieja, 208.
 Areca de la India, 737.
 Arepa de América, 763.
 Arequiero de la India, 737.
 Arfueyo, 397.
 Argamula, 509.
 Argan de Marruecos, 466.
 Argel de Egipto, 483.
 — de Siria, 484.
 Argentina, 327.
 Argeña, 804.
 Argoma, 297.
 Arguenilla de Chile, 525.
 Aricuri del Brasil, 744.
 Ariri del Brasil, 744.
 Aristoloquia de Virginia, 603.
 — fabacea, 195.
 — hembra, 604.
 — hueca, 195.
 — larga, 604.
 — luenga, 604.
 — macho, 604.
 — redonda, 604.
 — ténue, 604.
 Arlo, 189.
 Armatoria das igresias en la India portuguesa, 675.
 Armuelles cultivados, 568.
 — de huerta, 568.
 — silvestres, 568.
 Arnacho de Asso, 298.
 — de algunos, 200.
 Arnaucho del Perú, 517.
 Aroeira del Brasil, 290.
 Aro comun, 751.
 — de Etiopía, 753.
 — egipcio, 751.
 — manchado, 751.
 Aromo comun, 313.
 — falso de algunos, 302.
 Arracacha de Nueva-Granada, 392.
 — del Perú, 268.
 Arraclan, 281.
 Arrak de la India, 763, 770.
 Arrayan blanco, 353.
 — comun, 353.
 — de Brabante, 660.

- Arrayan del Perú, 353.
 — morisco, 353.
 — portugués, 353.
 Arrebolera de Méjico, 577.
 Arrocillo de Nueva-Granada, 763.
 Arrow-root, 694.
 Arroz común, 762.
 — del Canadá, 763.
 Arrugas, 427.
 Artanita, 459.
 Artemisa común, 428.
 — de algunos, 423.
 — de Méjico, 423.
 Artos, 281, 327, 518.
 Arupo de Nueva-Granada, 474.
 Arvegilla del Perú, 412.
 Arzolla de Amat. Lusit., 303.
 — de Asso, 433.
 — de Clusio, 433.
 Asa de cántaro, 201.
 Asa dulce, 389.
 Asafétida, 389.
 Asana de Filipinas, 310.
 Asango del Japon, 733.
 Asapeixe del Brasil, 629.
 Asarabacara, 603.
 Asensio, 428.
 Asha pichana del Perú, 425.
 Asnacho de algunos, 200.
 Asnallo de Asso, 298.
 — de algunos, 200.
 Aspargate de Nueva-Granada, 493.
 Asperilla morada, 510.
 — olorosa, 410.
 Assacu del Brasil, 615.
 Atacu del Perú, 574.
 Atarfe, 344.
 Atecamez de la Guayana, 402.
 Ateje de Cuba, 507.
 Ateje hembra de Cuba, 507.
 Ates de Cuba y Filipinas, 184.
 Atlanchan de Méjico, 343.
 Atlanchana de Méjico, 343.
 Atocha, 766.
 Atolle de Méjico, 763.
 Atrapa moscas, 211.
 Atreu del Perú, 574.
 Atta del Brasil, 184.
 — de la isla de Santo Domingo, 184.
 Atulli de Méjico, 763.
 Atzauhtli de Méjico, 687.
 Aulaga, 297.
 Aunge, 432.
 Aurora común, 222.
 — de Méjico, 502.
 Auzuba de la Española, 466.
 Ava de la Oceania, 641.
 Avellana americana, 314.
 — del Brasil, 356.
 — de Valencia, 314.
 Avellanas indicas, 737.
 — purgantes de la isla de Santo Domingo, 618.
 — purgantes de Méjico, 618.
 Avellano común, 647.
 — de Chile, 595.
 — de Cuba, 617.
 — de la Florida, 648.
 — de Levante, 648.
 — de Turquía, 648.
 — montés, 647.
 Avena cultivada, 768.
 — loca, 768.
 Azacorito de Cumaná, 712.
 Azafran común, 700.
 — de la India, 691.
 — de montaña en el Perú, 526.
 — de Sicilia, 700.
 — romi, 433.
 — silvestre, 700.
 Azafrancillo de Méjico, 433.
 Azamboá, 331.
 Azamiboero, 240.

- Azarollo, 331.
 Azcalxochitl de Méjico, 704.
 Aznacho de algunos, 666.
 Aznallo de algunos, 666.
 Azofaifo comun, 280.
 — del Perú, 314.
 Azoita cavallo del Brasil, 232.
 Azua del Perú, 763.
 Azúcar, 773.
 Azucarito de Cumaná y las Antillas, 255.
 Azucarero de montaña en las Antillas, 292.
 Azucecillo del Rio Magdalena, 616.
 Azucena amarilla comun, 722.
 — amarilla de Méjico, 686.
 — anaranjada, 718.
 — anteadá, 722.
 — blanca, 718.
 — bulbifera, 718.
 — comun, 718.
 — de Ceilan, 704.
 — de Constantinopla, 718.
 — de Guernesey, 704.
 — de Lima, 705.
 — de Méjico, 704.
 — del monte en Méjico, 686.
 — de trompeta, 718.
 — de Santa Paula, 704.
 — listada, 704.
 — marítima, 704.
 — roja, 718.
 — silvestre, 718.
 — tabacal, 722.
 Azucenilla de noche, 700.
 Azucenita amarilla, 703.
 Azuceno del Perú, 403.
 Azufaifo, 280.
 Azufre vegetal, 787.
 Azul champagra del Perú, 705.
 — fino de la India, 299.
 Azulejo, 432.
 Azumbar comun, 679.
 — de alginos, 412, 774.
 Ayacahuite de Méjico, 668.
 Ayaguachi del Perú, 421.
 Ayapana del Brasil, 419.
 Ayayucu de Quito, 766.
 Ayotequeli de Méjico, 619.
 Ayri del Brasil, 743.
 Ayuda de Cuba, 272.
 — amarilla de Cuba, 273.
 — blanca de Cuba, 273.
 — hembra de Cuba, 273.
 — macho de Cuba, 273.
 Babosa, 570.
 Bacaba de aceite en el Brasil, 736.
 Bacabuey de Cuba, 179.
 Bacao de Choco, 229.
 — de Filipinas, 337.
 Bache de la Guayana, 739.
 Bachoca, 306.
 Bachoqueta, 306.
 Baco de Nueva-Granada, 355.
 Badea comun, 358.
 — del Perú, 363.
 Badiana, 181.
 Bajoca, 306.
 Bagá de Cuba, 184.
 — da praya en el Brasil, 583.
 Bago de Filipinas, 673.
 Baguetas, 497.
 Baladre, 480.
 Balanoi de Filipinas, 545.
 Balanti de Filipinas, 615.
 Balayon colorado de Filipinas, 319.
 Balibago de Filipinas, 221.
 Balimbín de Filipinas, 268.
 Bal-latin de Filipinas, 615.
 Ballestera blanca, 727.
 Ballico, 770.
 Ballueca, 768.
 Balsamilla de Aragon, 549.

Balsamina, 360.
 Bálsamo africano, 420.
 — Alcouchi, 291.
 — bastardo de las Antillas, 292.
 — carpático, 667.
 — Copalme de Méjico, 656.
 — Copalme de Oriente, 656.
 — del Canadá, 669.
 — de Copaiba, 319.
 — de flores de la isla de Francia, 242.
 — de jardín, 430.
 — de María en el Perú, 244.
 — de la Meca, 291.
 — de Nueva-España, 296.
 — del Perú, 296.
 — de Tolú, 296.
 — de Trementina, 666.
 — de Ungria, 667.
 — de Venezuela, 272.
 — falso de Gilead, 669.
 — Real, 291.
 Bambú de la India, 770.
 Banaba de Filipinas, 343.
 Banana, 696.
 Bananero, 696.
 Banano, 696.
 Bancal de Filipinas, 402.
 Bancudo de Filipinas, 406.
 Bangué de la India, 630.
 Banquelines de Filipinas, 621.
 Banza-tunza de Nueva-Holanda, 670.
 Baobab del Senegal, 225.
 Barahuna del Brasil, 315.
 Barba cabruna, 436.
 — de cabron, 326.
 — de Júpiter, 373.
 — de mono en Nueva-Granada, 584.
 — de palo en el Orinoco, 791.
 — de piedra en Cumaná, 799.

Barba de viejo en Chile, 419.
 — española de Méjico, 707.
 Barbadejo, 399.
 Barbajas, 436.
 Barbajove, 298.
 Barbas de capuchino, 504.
 — de chivo, 768.
 — del Perú, 707.
 Barbascajo del Orinoco, 621.
 Barbasco del Brasil, 527.
 — del Orinoco, 423.
 — del Perú, 463, 707.
 — de raíz del Orinoco, 301.
 Barbatimaó del Brasil, 313.
 Barbon, 436.
 Barbotina, 429.
 Barbudilla de Méjico, 635.
 Barbujas, 436.
 Bardaguera blanca, 657.
 Bardana comun, 434.
 — chilense, 394.
 — de Méjico, 694.
 — menor, 423.
 Barerico del Brasil, 698.
 Baria de Cuba, 507.
 Barniz de Aguarrás, 666.
 — de la China, 289.
 — de Cuba, 291.
 — del Japon, 293.
 Barrelleta, 570.
 Barrilla comun, 570.
 — borde, 570.
 — de Alicante, 570.
 — de Fuerte Ventura, 374.
 — de Lanzarote, 374.
 — de Sevilla, 570.
 — fina, 570.
 Barú del Brasil, 315.
 — de Filipinas, 738.
 Basourinha del Brasil, 527.
 Bastones de Tabago, 742.
 Batata de la China, 709.
 — de Cuba, 502.

- Batata de Málaga, 502.
 — de mar en el Brasil, 503.
 — de purga en el Brasil, 503.
 — purgante del Brasil, 503.
 Batatilla de Cumaná, 503.
 Baticulin de Filipinas, 493.
 Batidor de Filipinas, 605.
 Bauaibatai de Filipinas, 493.
 Bayogo de Filipinas, 311.
 Bayon, 747.
 Bdelio africano, 430.
 Becabunga, 528.
 Becerra, 526.
 Bedegar, 329.
 Bedelio africano, 430.
 — de Africa, 291.
 — de la India, 291.
 — siculo, 391.
 Bedoca del Perú, 363.
 Beebeerú de la Guayana, 589.
 Behen blanco, 432.
 — de Africa, 315.
 — encarnado, 556.
 — rojo, 556.
 Bejuco blanco de Cumaná, 493.
 — blanco del Perú, 407.
 — de agua del Orinoco, 263.
 — de berraco en Cuba, 408.
 — de canastas en Cuba, 563.
 — de la China en Cumaná, 262.
 — de conchitas en Cuba, 300.
 — de corrales en Cuba, 255.
 — de Cuba, 281.
 — de la estrella en el Perú, 603.
 — de Guaco, 419.
 — de Guayca en el Orinoco, 335.
 — de hoja de Carey en Cuba, 179.
 — de indio en Cuba, 503.
 Bejuco de leche en Cumaná, 484.
 — de Mamure en el Orinoco, 753.
 — de Mavacure del Orinoco, 489.
 — de Peonia en Cuba, 306.
 — de Toronja en Cuba, 320.
 — de Zarcillo en Caracas, 255.
 — jairol de Cuba, 308.
 — lombricero de Cuba, 686.
 — marrullero de Cuba, 307.
 — moniato de Cuba, 502.
 — prieto de Cuba, 480.
 Bejuquillo del Brasil, 210.
 — de Caracas, 503.
 Belbum de Chile, 410, 525.
 Belcho, 673.
 Belencanda, 700.
 Belenes de Méjico, 267.
 Beleño blanco, 520.
 — dorado, 520.
 — negro, 519.
 Bella de noche, 577.
 Bella-Diana, 424.
 Belladona de Carmona, 518.
 — medicinal, 518.
 Bella-sombra de Málaga, 563.
 — de la isla de Madera, 521.
 Bellas-noites del Brasil, 577.
 Bellomera, 330.
 Bellorita silvestre, 420.
 — de Jarava, 458.
 Bellota amarga, 648.
 — de Valparaíso, 466.
 — dulce, 648.
 Ben de Africa, 315.
 — de la India, 315.
 Benjuí, 471.
 Benção de Deos en el Brasil, 223.
 Bera de Cumaná, 269.

- Berbero, 189.
 Berengena, 514.
 Berengenilla, 518.
 Bergamota, 240.
 Berraza, 385, 386.
 Berrera, 385, 386.
 Berrillo de Canarias, 199.
 Berro comun, 198.
 — del Pará, 425.
 Berteraan de los árabes, 428.
 Berza arvense, 202.
 — colinaba, 201.
 — comun, 201.
 — de Siam, 201.
 — enana, 201.
 — marina, 504.
 — oriental, 200.
 — rizada, 201.
 — silvestre, 201.
 — verdal, 201.
 Betabel de Méjico, 567.
 Betel de la India, 641, 737.
 Betele de la India, 641.
 Betiguera, 630.
 Betle de la India, 641.
 Betónica, 551.
 Betre del Brasil, 642.
 Betys del Brasil, 642.
 Bibiri de la Guayana, 589.
 Bicararo de Canarias, 441.
 Bicuiba del Brasil, 592.
 Bicuiba redonda del Brasil, 592.
 Biengranada, 567.
 Bihai de las Antillas, 696.
 Bihao de las Antillas, 696.
 Bija, 206.
 Bijaguara de Cuba, 281.
 Bikma de la India, 176.
 Bilimbina del Brasil, 268.
 Bilitbitan de Filipinas, 466.
 Bimba del Perú, 226.
 Binonga de Filipinas, 617.
 Biriji de Cuba, 355.
 Bisa de C. Acosta, 177.
 Bish de la India, 177.
 Bishma de la India, 176.
 Bislingua, 713.
 Bisma de la India, 176.
 Bistorta, 581.
 Bittaog de Filipinas, 245.
 Bledo carbonero de Cuba, 564.
 — comun de Cuba, 574.
 — de Angola, 572.
 — de Europa, 574.
 — de Malabar, 574.
 — de monte en Cuba, 574.
 — de olor de clavo en Cuba, 574.
 — espinoso de Cuba, 574.
 — verde de Cuba, 574.
 Bledomera, 568.
 Bleo de Nueva-Granada, 377.
 Boas noites del Brasil, 577.
 Bobo de Cumaná, 312.
 Boboi de Filipinas, 225.
 Bobua de la India, 471.
 Bocado de gallina, 217.
 Bocha, 428, 555.
 Bocuroa del Brasil, 592.
 Bofa del Brasil, 590.
 Bohua de la India, 471.
 Boi gordo del Brasil, 317.
 Boighe de Chile, 246.
 Boj comun, 622.
 — de la China, 239.
 Boja blanca, 298.
 — blanca de Morella, 199.
 — comun, 239, 428.
 — peluda, 299.
 Bojeta, 427.
 Bolas de nieve, 399.
 Boldo de Chile, 625.
 Boldú de Chile, 625.
 Boletto de ciervo, 805.
 Bolillos de América, 255.

- Bolsa de pastor comun, 199.
 — del Brasil, 515.
 Bombitas, 254.
 Bonaci de Cuba, 406.
 Bondel de la India, 359.
 Bonduque de la India, 315.
 Bonete de clérigo en Filipinas, 355.
 Bonetero, 277.
 Bonetillos, 361.
 Boniato amarillo de Cuba, 589.
 — de Cuba, 502.
 Bonina del Brasil, 577.
 Boña de Filipinas, 737.
 Boquil blanco de América, 187.
 Boquillas de dragon, 526.
 Borbonesa, 217.
 Borlones, 573.
 Borona, 763, 765.
 Borrachera del Perú, 519.
 Borrachuela, 770.
 Borraja comun, 509.
 — africana, 510.
 Borrosa, 429.
 Bosboron de Filipinas, 444.
 Botanera de Caracas, 524.
 Boto de Filipinas, 444.
 Botoan de Filipinas, 696.
 Boton de oro comun, 175, 176.
 — de Portugal, 176.
 Boton de plata comun, 427.
 — de Francia, 175.
 — de Inglaterra, 174.
 Botoncillo de Europa, 432.
 — del Perú, 425.
 Botulo de Guayaquil, 237.
 — del Orinoco, 225.
 Bovochevo del Perú, 519.
 Branca ursina alemana, 389.
 — espinosa, 534.
 — espuria, 389.
 — medicinal, 534.
 Brasil de Nueva-Granada, 316.
 Brasil de Popayan, 316.
 — colorado de Cuba, 316.
 — de las Antillas, 316.
 — de la Jamáica, 316.
 Brasilete colorado de Cuba, 316.
 — de las Antillas, 316.
 — de Caracas, 310.
 — de la India, 316.
 Braço de precuiza en el Brasil, 515.
 Brea, 667.
 Brecoleras, 201.
 Bretaña de Canarias, 575.
 Bretones, 201.
 Bretónica de Cumaná, 229.
 — de Nueva-Andalucía, 230, 507.
 — macho de Cumaná, 230.
 Brezo arbóreo, 451.
 — bermejo, 451.
 — ceniciento, 451.
 — comun, 451.
 — de escobas, 451.
 Brigeta-Naranjo de Cuba, 278.
 Brincos de Sahoy en el Brasil, 312.
 Brindones de la India, 245.
 Brionia blanca, 359.
 — negra, 710.
 Brócoli, 201.
 Broquin de Chile, 328.
 Bruca de Margarita en Cumaná, 319.
 — macho de Cumaná, 319.
 Brufalaga, 597.
 Brugia, 527.
 Brujitas, 704.
 Brunela, 550.
 Brusco comun, 713.
 — de Canarias, 713.
 Brutí del Brasil, 739.
 Bubas, 422.

- Bucaré de Anauco en Caracas, 309.
 — de Caracas y Cuba, 309.
 Bucco de Africa, 272.
 Bucha de Paulistas en el Brasil, 360.
 Buchinha del Brasil, 359.
 Bucma del Perú, 465.
 Buen varon de algunos, 429.
 — de Jarava, 429.
 — silvestre de Jarava, 327.
 Buena vista de Filipinas, 619.
 Buenduque de la India, 315.
 Bufalaga verdadera, 552.
 Bufaralda, 597.
 Buglosa, 509.
 Bugula, 553.
 Bujarolla, 450.
 Bulacan de Filipinas, 504.
 Buli de Filipinas, 740.
 Buracan de Filipinas, 504.
 Buranhen del Brasil, 465.
 Burhalaga, 597.
 Buri de Filipinas, 740.
 Buriti del Brasil, 739.
 Burladora, 519.
 Buta de Filipinas, 615.
 Butingi de Filipinas, 307.
 Butua del Brasil, 188.
 — de corvo en el Brasil, 237.
 — de Méjico, 188.
 Buyo de Filipinas, 641, 737.
 Caa-ataya del Brasil, 527.
 Caamirin del Brasil, 279.
 Caaopia del Brasil, 242.
 Caapeba del Brasil, 188.
 Caapiá del Brasil, 635.
 — del Perú, 763.
 Caapim cheiroso del Brasil, 759.
 — de Angola en el Brasil, 765.
 Caatiguá del Brasil, 259.
 Caavurana del Brasil, 515.
 Cabalonga de Filipinas, 489.
 Cabellos de Europa, 504.
 — de ángel en Cuba, 174.
 — de ángel en el Perú, 504.
 — de negro en el Brasil, 248.
 Cabeza de monge en el Perú, 344.
 — de negro en las Antillas, 184.
 — de negro en el Brasil, 184.
 — de negro en Méjico, 192.
 — de negro en el Perú, 744.
 — de ternera, 526.
 — de turco, 361.
 Cabezuela, 432.
 Cabima del Perú, 244.
 Cabo de hacha en Cuba, 259.
 — negro de Filipinas, 738.
 Cabotz de Abisinia, 328.
 Cabrahigo, 633.
 Cabureiba del Brasil, 296.
 Cabuyá de la isla de Santo Domingo, 705.
 Cacahoatl de Méjico, 229.
 Cacahoaxochitl de Méjico, 224, 479.
 Cacahuate de Méjico, 314.
 Cacahuete de Méjico, 314.
 Cacalaco de Méjico, 316.
 Cacaloxochitl de Méjico, 479.
 Cacao, 229.
 Cacari de Méjico, 229.
 Cacauatl de Méjico, 229.
 Cacaquahuitl de Méjico, 229.
 Cacham del Perú, 514.
 Cachanlahuen de Chile, 490.
 Cachibu de Caracas, 694.
 Cachiquis del Perú, 346.
 Cachorrera, 434.
 Cachoy de Chile, 490.
 Cachumba de Filipinas, 433.
 Cachundé de la India, 630.
 Cachurera mayor, 434.
 — menor, 423.

- Cacomite de Méjico, 700.
 Cacto coronario, 376.
 Caculucage del Brasil, 422.
 Cada, 664.
 Cadava, 297.
 Cadillo comun, 423.
 — de hoja ancha, 391.
 Cadjuet de las Antillas, 308.
 Café comun, 408.
 — del Perú, 408.
 — rana del Brasil, 491.
 Cagarria, 806.
 Cagateira del Brasil, 355.
 Cagigala de Cuba, 425.
 Caguio de Filipinas, 308.
 Cahinca del Brasil, 408.
 Cahonlague de Chile, 490.
 Caiaué del Brasil, 743.
 Caicove del Rio de la Plata, 311.
 Caihua-caihua del Perú, 361, 535.
 Caihua chica del Perú, 361.
 Caimitillo de las Antillas, 465.
 Caimito de las Antillas, 465.
 — del Perú, 465.
 — de monte en el Perú, 213.
 Cainana del Brasil, 408.
 Cainça del Brasil, 408.
 Caious del Brasil, 287.
 Caju del Brasil, 287.
 Calabacilla hedionda, 360.
 Calabacito de chicha en América, 495.
 Calabaza bonetera, 361.
 — comun, 361.
 — confitera, 361.
 — de chicha en América, 495.
 — del Senegal, 225.
 — indiana de Chile, 361.
 — pastelera, 361.
 — redonda, 361.
 — totanera, 361.
 Calabaza vinatera, 358.
 Calabazo de chicha en América, 495.
 Calachuchi de Filipinas, 479.
 Calaguala de cordoncillo en el Perú, 779.
 — de Cumaná, 780.
 — delgada del Perú, 780.
 — falsa de Chile, 339.
 — fina del Perú, 780.
 — gruesa del Perú, 780.
 — mediana del Perú, 779.
 Calalu de Cuba, 574.
 Calambac de la India, 320.
 Calambibit de Filipinas, 316.
 Calamento, 548.
 Calamias de Filipinas, 268.
 Calaminta, 548.
 Calamita, 471.
 Calamo aromático del Brasil, 758.
 — aromático de Dioscorides, 774.
 — aromático de la India, 753.
 Calancapatlé de Méjico, 420.
 Calicedra de las Antillas, 260.
 Calmia, 452.
 Calnadillo, 673.
 Calocatingan de Filipinas, 230.
 Calumbit de Filipinas, 335.
 Calunga del Brasil, 274.
 Camagon de Filipinas, 469.
 Camambaya del Brasil, 708.
 Camamila de Aragon, 427.
 — fina, 427.
 Camará de bilro en el Brasil, 478.
 — do mato en el Brasil, 478.
 — juba del Brasil, 538.
 — tinga del Brasil, 538.
 Camarinheira de los portugueses, 623.
 Camariñera, 623.

- Camaroja, 437.
 Cambron, 281, 327.
 Cambrones, 280.
 Cambronera de muchos, 518.
 — de Jarava, 378.
 — colorada de Jarava, 378.
 Camcha del Perú, 763.
 Camedrio, 553.
 Camelote de Guayaquil, 765.
 — de Nueva-Granada, 765.
 Camepiteo, 553.
 Camias de Filipinas, 268.
 Camini del Brasil, 279.
 Camote de Méjico, 502.
 Camotic de Méjico, 502.
 Campanelo de Filipinas, 478.
 Campanilla blanca de Méjico, 519.
 — blanca del Perú, 519.
 — de Eguiluz, 703.
 — de otoño, 703.
 — de primavera, 703.
 — de verano, 703.
 — encarnada del Perú, 519.
 — tricolor, 504.
 Campeche verdadero, 317.
 Canadillo, 673.
 Cananga de la India, 185.
 — oetan de la India, 185.
 Canapomba del Brasil, 335.
 Canarieta, 266.
 Canarios, 266.
 Cancha del Perú, 763.
 Canchalagua americana, 490.
 — de Aragon, 218.
 — de Chile, 490.
 — de Quito, 490.
 Canchalahuen de Chile, 490.
 Canchelagua dulce de Chile, 534.
 Canchilagua de Aragon, 218.
 Candelero de Caracas, 394.
 Candelillo de Popayan, 207.
 Candileja, 390, 552, 750.
 Candilera, 525, 552.
 Candiles, 604, 750, 751.
 Candilillos, 751.
 Canela aclavillada de las Antillas, 353.
 — aclavillada de Ceilan, 354.
 — blanca, 246.
 — cubana, 589.
 — de la China, 587.
 — de Cuba, 589.
 — de la India, 587.
 — de Malabar, 587.
 Canelillo del Brasil, 588.
 — de Méjico, 620.
 — del Orinoco, 588.
 Canella de cheiro en el Brasil, 589, 590.
 — preta del Brasil, 589.
 Canelo de Ceilan, 587.
 — de Chile, 181.
 — de las Indias occidentales, 246.
 — de la isla de Francia, 589.
 — de Magallanes, 181.
 — de Manila, 587.
 — do mato en el Brasil, 589.
 — de páramo en Nueva-Granada, 181.
 — de Santa Fé de Bogotá, 589.
 — falso de Winter, 246.
 — silvestre de Cuba, 588.
 — silvestre de Malabar, 587.
 Cangaba del Brasil, 524.
 Canime del Perú, 244.
 Caninana del Brasil, 408.
 Canisté de Cuba, 466.
 Canjarana del Brasil, 260.
 Canjerana del Brasil, 260.
 Canna de macaco en el Brasil, 692.
 — do mato en el Brasil, 692.

- Canónigos de Europa, 412.
 — de Méjico, 413.
 Cantarifera de Filipinas, 605.
 Cantarillo, 459.
 Cantilagua de Aragon, 218.
 Cantoria, 361.
 Cantotai de Filipinas, 407.
 Cantú del Perú, 500.
 Cantueso, 546.
 Canudo amargoso del Brasil, 478.
 — de pita en el Brasil, 617.
 — de purga en el Brasil, 477, 478.
 Canutillo de Cuba, 733.
 Caña borde, 767.
 — brava asiática, 770.
 — brava de Cumaná, 767.
 — brava de Nueva-Granada, 770.
 — brava del Orinoco, 770.
 — comun, 767.
 — de azúcar, 773.
 — de Batavia, 773.
 — de Bengala, 738.
 — de Castilla en Méjico, 773.
 — de cuentas, 694.
 — de Indias para bastones, 738.
 — de la víbora en Nueva-Granada, 736.
 — dulce, 773.
 Cañacoro, 694.
 Cañaferla, 388.
 Cañafistolo de la India y América, 318.
 Cañaheja comun, 388.
 — hedionda, 390.
 Cañajelga, 388.
 Cañametes, 569, 570.
 Cañamiel amarilla, 773.
 — comun, 773.
 — criolla, 773.
 Cañamiel de Otabiti, 773.
 — listada, 773.
 — pálida, 773.
 — purpúrea, 773.
 Cáñamo, 630.
 Cañamones, 630.
 Cañaroya, 629.
 Cañeta, 767.
 Cañota, 767, 774.
 Cañuela comun, 769.
 — de oveja, 769.
 Caobilla de costa en Cuba, 620.
 — de Cuba, 620.
 Caobo de Cuba, 260.
 Caoutchouc comun, 477, 617, 634.
 — del Brasil, 617.
 — de Gaduas, 635.
 — de Nueva-Granada, 635.
 — de Popayan, 440.
 Capa de Rey, 574.
 Capallu de Chile, 361.
 Caparrosa del Brasil, 339.
 — de Caracas, 242.
 Cape negro del Perú, 403.
 Capecape del Perú, 404.
 Capecito del Perú, 403.
 Capia del Perú, 763.
 Capim Rey del Brasil, 698.
 Capitana de corazon en Méjico, 604.
 Capitaneja de Méjico, 424.
 Capitaô do mato en el Brasil, 538.
 Capito de Méjico, 507.
 Capoira branca del Brasil, 515.
 Capolí de Méjico, 325.
 Capuchina comun, 266.
 — de Cádiz, 267.
 — enana, 266.
 Capuli cimarron de Nueva-Granada, 281.

- Capulí cimarrón del Perú, 517, 518.
 — cultivado, 517.
 — de Méjico, 325.
 — mejicano, 325, 517.
 Capulín de Méjico, 325.
 Caquirau de Cuba, 319.
 Cara común, 812.
 Cará del Brasil, 709.
 Carachichu del Brasil, 515.
 Carachuchi de Filipinas, 479.
 Caracol Real, 307.
 Caracolera, 629.
 Caracoli de Nueva-Granada, 287.
 Caracolillo de Cádiz, 307.
 — de olor, 305.
 Caragilates, 307.
 Caragirates, 307.
 Caraguata del Paraguay, 705.
 Caraiiba del Brasil, 494.
 Carambillo, 570.
 Carambola de la India, 268.
 Caramboleiro del Brasil, 268.
 Caramillo, 570.
 Carandas de la India, 477.
 Caraña de las Antillas, 291.
 — de Nueva-Granada, 272.
 — del Orinoco, 291.
 Carapa de la Guayana, 261.
 Carapamacnan del Perú, 517.
 Carapeirana del Brasil, 324.
 Carapiá del Brasil, 635.
 Carapicho del Brasil, 220, 231.
 Carbon de las cereales, 804.
 — de Chile, 507.
 Carboncillo, 804.
 Carcanapire de Nueva-Granada, 619.
 — macho de Nueva-Granada, 619.
 Carcapulí de la India, 244.
 Cardal del Paraguay, 705.
 Cardamomo ceilánico, 691.
 — de Madagascar, 692.
 — javánico, 691.
 — largo de Ceilan, 691.
 — malabárico, 692.
 — mayor de Java, 691.
 — pimentado de Africa, 691, 692.
 — redondo de Bengala, 691.
 Cardenala azul, 440.
 — encarnada, 440.
 Cardencha, 414.
 Cardenilla, 555.
 Cardicuca, 431.
 Cardillo, 435.
 Cardo ajonjero, 432.
 — alcachofero, 433.
 — aljonjero blanco, 432.
 — aljonjero negro de Jarava, 431.
 — arentin, 385.
 — blanco, 434.
 — borriquero de Carratraca, 435.
 — borriquero de Sevilla, 433.
 — cabezudo, 376.
 — corredor, 385.
 — cundidor, 434.
 — de arrecife, 434.
 — de borrico, 434.
 — de cardadores, 414.
 — de comer, 433.
 — de liga, 432.
 — de liria, 432.
 — de la uva, 432.
 — erizo, 431.
 — estrellado, 432.
 — hemorroidal, 434.
 — huso, 433.
 — lechal, 433.
 — lechero, 433.
 — mariano, 433.
 — pinto, 432.

- Cardo santo de Europa, 433.
 — santo del Brasil, 194.
 — santo de Méjico, 194.
 — timonero, 434.
 — yesquero común, 431.
 — yesquero espinoso, 431.
 — yesquero pinchudo, 431.
 Cardohuso, 433.
 Cardon cabezudo, 376.
 — de algunos, 705.
 — de Canarias, 612.
 — de Chile, 708.
 — de Méjico, 377.
 — del Perú, 376.
 Carhuagero del Perú, 494.
 Carhuascasa del Perú, 190.
 Carhuas-sahuintu del Perú, 352.
 Cariaquito blanco de Nueva-Granada, 423.
 Caries, 804.
 Cariofilata acuática, 326.
 — montana, 326.
 — oficial, 326.
 Carita de Nueva-Granada, 312.
 Carminero de Canarias, 564.
 Carnauba del Brasil, 741.
 Carne de doncella en Cuba, 250.
 Carnestolenda de Caracas, 237.
 Caroba branca del Brasil, 494.
 — del Brasil, 495.
 — de flor verde en el Brasil, 494.
 Carotú del Perú, 406.
 Carpe, 647.
 Carpobalsamo, 291, 354.
 Carpunya del Perú, 642.
 Carqueja de Europa, 297.
 — amargosa del Brasil, 421.
 — doce del Brasil, 421.
 — del Perú, 421.
 Carquesa, 297.
 Carquesia, 297.
 Carraon, 772.
 Carrasca común, 648.
 — clofolluda de Valencia, 648.
 — de la isla Española, 279.
 Carraspique blanco, 200.
 — morado, 200.
 Carrasquilla, 553.
 Carretilla, 298.
 Carricera, 774.
 Carreton, 298.
 Carrizo común, 767.
 — de Nueva-Granada, 770.
 Cartamo cultivado, 433.
 — silvestre, 432.
 Caruru común del Brasil, 574.
 — vermelho del Brasil, 574.
 Caruto del Orinoco, 405.
 Casave, 619.
 Casca d' anta en el Brasil, 181.
 — de Paratudo en el Brasil, 246.
 — preciosa del Brasil, 588.
 Cascabelillo de Cuba, 297.
 — de Canarias, 216.
 Cáscara de Pingue en Méjico, 691.
 Cascarillo fino de Ruiz, 403.
 — lampiño de Ruiz, 403.
 — mestizo del Perú, 404.
 Cascarilla amarilla fina del Rey, 402.
 — amarilla fina de Ruiz, 403.
 — amarilla de Ruiz, 403.
 — aromática de la Florida, 620.
 — azahar hembra, 403.
 — boba amarilla, 403.
 — boba de hoja morada, 403.
 — boba de pata de gallareta, 403.
 — chahuarguera, 402.
 — colorada fina del Rey, 402.

- Cascarilla crespilla de Cuenca en América, 403.
 — crespilla negra parecida á la amarilla fina, 402.
 — delgada, 403.
 — de pata de gallareta, 403.
 — fina, 402, 403.
 — fina delgada, 403.
 — fina de Loja amarilla, 402.
 — fina de Loja gris, 402.
 — fina de Loja parda, 402.
 — fina de Loja verdadera, 402.
 — fina de Uritusinga, 402.
 — flor de azahar, 403.
 — gris fina de Uritusinga, 402.
 — Margarita, 403.
 — morada, 403.
 — negrilla, 403.
 — negruzca, 403.
 — pálida, 403.
 Cascol del Perú, 317.
 Casia acanelada, 587.
 — aclavillada del Marañon, 589.
 — del Brasil, 318.
 — de Java, 318.
 — de Méjico, 318.
 — lignea, 587.
 Casiamura del Perú, 516.
 Casina de la Florida, 278.
 Casoi de Filipinas, 287.
 Caspi de pasto en Nueva-Granada, 289.
 Castanha de Jobotá en el Brasil, 358.
 Castanheiro do Maranhão en el Brasil, 356.
 Castaña de agua, 340.
 — del Brasil, 356.
 — de Jobotá en el Brasil, 358.
 — de mar, 310.
 — de tierra, 386.
 Castaño caballuno, 252.
 Castaño comun, 650.
 — de Europa en Méjico, 252.
 — de Indias, 252.
 — de Malabar, 637.
 Castañuela comun, 758.
 Castañuelas del Perú, 369.
 Castellar, 242.
 Cassumunar, 691.
 Casupo de Nueva-Andalucía, 405.
 Cat de los árabes, 278.
 Catalpa, 495.
 Catas del Perú, 595.
 Catbalogan de Filipinas, 489.
 Cate de la India, 313.
 Cateci comun, 313.
 — de la India, 313.
 — de Filipinas, 737.
 Catinga de mulata en el Brasil, 552.
 Catmon de Filipinas, 180.
 Cato de la India, 313.
 Catuche de las Antillas, 184.
 Caven de Chile, 314.
 Cavi de Chile, 268.
 Caxon de Filipinas, 738.
 Caxapora do gentio en el Brasil, 335.
 Caxini del Brasil, 616.
 Cayapiá del Brasil, 635.
 Cayolizan de Méjico, 527.
 Cayutana de Filipinas, 272, 273.
 Cazamarucha de Quito, 423.
 Cazave de las Antillas, 618.
 Cazavi de las Antillas, 618.
 Ccaratú del Perú, 406.
 Ccurhur del Perú, 233.
 Cebada comun, 773.
 — de abanico, 773.
 — de dos carreras, 773.
 — ladilla 773.
 — ramosa, 773.

- Cebadilla de las Antillas, 727.
 — de Asso, 422.
 — del campo, 773.
 — de Méjico, 726, 727.
 Cebolla albarrana, 720.
 — comun, 721.
 — de lagarto, 720.
 — de Persia, 700.
 Cebollada, 555.
 Cebolleja de Méjico, 727.
 Cebolleta comun, 721.
 — de Nueva-Granada, 685.
 Cebollino comun, 721.
 — francés, 721.
 — inglés, 721.
 Cedacillo, 769.
 Cedoaria amarilla de Asia, 691.
 — larga de Asia, 691.
 — redonda de Asia, 691.
 Cedria, 670.
 Cedro blanco de Guayana, 291.
 — blanco de Virginia, 665.
 — de las Antillas, 260.
 — del Atlas, 670.
 — de las Azores, 664.
 — de las Barbadas, 260.
 — de las Bermudas, 663.
 — de Bussaco, 664.
 — de España con fruto encarnado, 663.
 — de España con fruto negro, 663.
 — de Filipinas, 260.
 — de Goa, 664.
 — de la India, 670.
 — del Libano, 669.
 — de Méjico, 665.
 — de Portugal, 664.
 — de Virginia blanco, 665.
 — de Virginia encarnado, 663.
 — encarnado de Virginia, 663.
 Cedro macho de las Antillas, 260.
 — macho del Perú, 293.
 — rojo de Chile, 664.
 — rojo de la Guayana, 291.
 Cedron del Perú, 538.
 — del Rio de la Plata, 538.
 Ceguta, 391.
 Ceiba blanca de Guayaquil, 410.
 — comun de América, 225.
 — de algunos, 225.
 — espinosa de América, 226.
 Ceibo de América, 226.
 Ceibon de América, 225.
 — de arroyo en Cuba, 225.
 Celidonia de Méjico, 614.
 — mayor, 194.
 — menor, 176.
 Celidueña, 194.
 Celinda, 349.
 Cempazuchil de Méjico, 425.
 Cempoalxochitl de Méjico, 425.
 Cenizo blanco, 567, 568.
 — de Puerto-Rico, 273.
 — de la uva, 804.
 Cenoria, 390.
 Centáura del Brasil, 490, 491.
 — de jardín, 424.
 — mayor, 432.
 — menor de Europa, 490.
 — menor de Méjico, 490.
 Centeno, 772.
 Centinodia, 581.
 Ceñiglo blanco, 567.
 — de Buenos-Aires, 568.
 — de jardín, 569.
 — verde, 567.
 Cepilla, 433.
 Cera de palma de las Indias, 738.
 Cerecero de Cuba, 249.

Cerecillo de Europa, 400.
 — del Perú, 249.
 Cereja de purga en el Brasil, 360.
 Cerezo-Aliso, 325.
 — comun, 325.
 — de aves, 325.
 — de Cayena, 355.
 — de cerezas costaleras, 325.
 — de cerezas de corazon de cabrito, 325.
 — de Cumaná, 248, 249.
 — de Lima, 249.
 — de la Luisiana, 660.
 — de Mahoma, 325.
 — de monte, 325, 395.
 — de Nueva-Granada, 326.
 — de Nueva-España, 325.
 — de la piedra, 325.
 — de racimo, 325.
 — de Virginia, 325.
 — durazno, 325.
 — garrafal, 325.
 — mollar, 325.
 — negro, 325.
 — perulero de Chile, 376.
 — silvestre, 395.
 Ceriflor mayor, 509.
 Ceroxilon de los Andes, 738.
 Cerraja comun, 437.
 — tierna, 437.
 Cerrajuda de Canarias, 712.
 Cerrillo, 774.
 Certadera de Nueva-Granada, 767.
 Césped, 557.
 Cestillo de oro, 199.
 Cicércula, 305.
 Ciclamor comun, 320.
 — del Canadá, 320.
 Cicuta acuática, 385.
 — mayor, 391.
 Cidra cayote, 358.

Cidra limon, 240.
 Cidrero, 240.
 Cidro, 240.
 Cidron del Perú, 538.
 Cidronela, 548.
 Cielo estrellado, 420.
 Cienñudillos de Jarava, 777.
 Ciento en rama, 216.
 Ciérrate - ciérrate del Perú, 311.
 Cigua de Cuba, 589.
 Cihuaraya de Cuba, 253.
 Cigüenita, 768.
 Cihuapatli de Méjico, 423.
 Cilantro, 392.
 Cimaya, 331.
 Cinamomo de Andalucia, 601.
 — de Castilla, 259.
 — de Manila, 343.
 Cinco en rama, 327.
 Cinco llagas de Filipinas, 535.
 Cineraria, 431.
 Ciprés comun, 664.
 — de abanico, 664.
 — del Canadá, 665.
 — de hoja de Acacia, 665.
 — de Levante, 664.
 — de Luisiana, 665.
 — de Portugal, 664, 665.
 — de rama abierta, 664.
 — de Virginia, 665.
 —ístico, 665.
 — hembra, 664.
 — macho, 664.
 Cipresillo, 427.
 Cirial de Méjico, 496.
 Cirifole de la India, 240.
 Cirio de flor grande, 376.
 — de Méjico, 496.
 — del Perú, 376.
 Cirpo lacustre, 758.
 Cirolero 324.
 Ciruelo agrio de Cuba, 290.

- Ciruelo amarillo de Cuba, 290.
 — colorado de Cuba, 290.
 — comun, 324.
 — de Cuba, 249.
 — de Damasco, 325.
 — de Filipinas, 290.
 — de fraile en Caracas, 250.
 — de fraile en el Perú, 250.
 — de Méjico, 290.
 — de montaña en el Perú, 250.
 — de Nicaragua, 250.
 Clavecito de Caracas, 339.
 Claveiro da terra en el Brasil, 354.
 Clavel chino, 216.
 — comun, 216.
 — coronado, 216.
 — de la China, 216.
 — de las Indias, 425.
 — de muerto en Cataluña, 431.
 — de muerto en Cuba, 425.
 — de sábana en Cuba, 481.
 Clavelina comun, 216.
 — de los cartujos, 216.
 — de pluma, 216.
 Clavelito comun, 216.
 — de Cumaná, 339.
 Clavelon, 425.
 Clavillos de canelo, 587.
 Clavo de especia, 354.
 — de Marañon, 589.
 — de olor en Méjico, 269.
 Clemolle en Méjico, 518.
 Clérigos boca abajo, 177.
 Cluigida, 553.
 Coajinguva del Brasil, 634.
 Coanabiichi de Méjico, 247.
 Coatzontecoxochitl de Méjico, 686.
 Coberteras, 192.
 Coca de Levante, 189.
 Coca de Nueva-Granada, 248.
 — del Perú, 248.
 — de Polonia, 438.
 — piojera, 177.
 Cocallera del Brasil, 619.
 Coco de catarro en el Brasil, 742.
 — de la India, 743.
 — de mar en las Maldivias, 740.
 — de mono en Caracas, 356.
 — de Palmito del Brasil, 736.
 — da praia en el Brasil, 744.
 — de purga en el Brasil, 617.
 — de quaresima en el Brasil, 744.
 Coçolmecatl de Méjico, 713.
 Cocotero de la India, 743.
 Coculo oriental, 189.
 Codagapala de Malabar, 480.
 Codeso comun, 297.
 — de los Alpes, 297.
 Codocoypa de Chile, 600.
 Coentrillo del Brasil, 273.
 Cofe-cofe de Canarias, 374.
 Coguillvochi de Chile, 187.
 Coguillvoqui de Chile, 187.
 Cogombro, 358.
 Cogomelos, 808.
 Cogon de Filipinas, 774.
 Cogul de Chile, 307.
 Cohombrillo amargo, 360.
 Cohombro comun, 358.
 — largo, 358.
 — luengo, 358.
 — serpentina, 358.
 Coilatapalo de Méjico, 637.
 Col Asa de cántaro, 201.
 — comun, 201.
 — de Maluco, 507.
 — de Milan, 201.
 — marina, 202.
 — murciana, 201.

- Col rizada, 201.
 Cola de Africa, 228.
 — de caballo, 777.
 — de golondrina, 679.
 — de raton, 175.
 — de zorra en Europa, 764.
 — de zorra en Méjico, 435.
 Colchico amarillo, 703.
 — común, 727.
 — de primavera, 727.
 Coletuy, 303.
 Coles maluco de Filipinas, 507.
 Coliflor, 201.
 Colinába, 201.
 Colinabo, 201.
 Collar de bruja, 296.
 Colleja comun, 217.
 — de Valencia, 556.
 Collejon, 200, 202.
 Colliguay de Chile, 615.
 Colmenilla, 806.
 Colocating de Filipinas, 300.
 Colofonia comun, 667.
 — de la isla de Francia, 291.
 Colombo, 187.
 Colongcolong de Filipinas, 598.
 Coloquintida, 359.
 Colorines de Méjico, 309.
 Colotan de Filipinas, 220.
 Colpalma de los Andes, 737.
 Colubrina de Virginia, 603.
 Colza comun, 201.
 — de algunos, 200.
 Comida de venado del Perú, 488.
 Cominillo, 770.
 Comino comun, 390.
 — de Candia, 387.
 — de Creta, 390.
 — de Marsella, 387.
 — de prado, 386.
 — rústico 390.
 Comino silvestre, 391.
 Commarin del Brasil, 517.
 Compañon de perro, 687.
 Conabi del Brasil, 621.
 Conejera de Canarias 217.
 Conejitos de los campos, 195.
 — de los jardines, 177, 526.
 — de los vallados, 195.
 Congona de Lima, 642.
 — de monte en el Perú, 642.
 Congonita cimarrona de Lima, 642.
 Consuelda mayor, 509.
 — media, 553.
 — menor, 509, 550.
 — Real, 177.
 — roja, 328.
 — sarracénica, 420.
 — turmosa, 509.
 Contracapitana de Mompox, 604.
 Contraculebra del Perú, 480.
 — de Venezuela, 539.
 Contrayerba blanca de Méjico, 299.
 — blanca del Perú, 797.
 — de las Antillas, 635.
 — del Brasil, 635.
 — de Chile, 419.
 — de Julimes, 484.
 — de Méjico, 299, 404.
 — del Perú, 425, 603.
 — de Virginia, 603.
 Copa de Júpiter, 424.
 Copachtli del Perú, 274.
 Copaiba del Brasil, 319.
 Copal blanco de la India, 234.
 — de Acapulco, 272.
 — de América, 289, 320.
 — de la India, 234.
 — del Brasil, 319.
 — de Cuba, 291.
 — de Madagascar, 320.

- Copal de Méjico, 234.
 — duro de la India, 234.
 — oriental, 234.
 Copalchi de Costa-rica para unos, 620.
 — de Costa-rica para otros, 620.
 — de Guadalajara en América, 402.
 — de Méjico, 620.
 — de Tehuantepeque en Méjico, 620.
 Copalcocote de Méjico, 288.
 Copalli de Méjico, 289.
 Copalke de Méjico, 620.
 Copalme de Méjico, 656.
 — de Oriente, 656.
 Copalquahuítl de Méjico, 289, 290.
 Copete, 425.
 Copetillo, 425.
 Copey de Cuba, 244.
 Copeysillo de Cuba, 244.
 Copihue de Chile, 714.
 — del Perú, 705.
 Copigite de Chile, 714.
 Coqueiro de dente en el Brasil, 743.
 Coquito de Chile, 744.
 Coralina de Córcega, 815.
 Coralitos comunes, 720.
 — de Cuba, 312.
 Coração de Jesu en el Brasil, 419.
 Corazoncillo de Europa, 242.
 — del Orinoco, 503.
 Corcia de Chile, 331.
 Corcolen de Chile, 207.
 Cordão de frade en el Brasil, 552.
 — de San Francisco en la India portuguesa, 788.
 Cordoban de Cuba, 347.
 Cordobancillo de Cuba, 406.
 Cordoncillo de Venezuela, 642.
 — del Perú, 779.
 Cornapuz, 474.
 Córnejo comun, 395.
 — encarnado, 395.
 — macho, 395.
 Cornezuelo del centeno, 804.
 Cornicabra, 288.
 Cornical de Canarias, 483.
 Cornijuelo, 330.
 Cornillo, 330.
 Cornizo, 395.
 Corojo de Cuba, 744.
 — de Guinea en Cuba, 743.
 Corona de fraile, 434, 555.
 — de Rey, 298, 431, 555.
 — de Rey marítima, 704.
 — imperial, 718.
 — Real, 424.
 Coronilla Real, 298.
 Corozo de los Marranos, 743.
 — de Nueva-Granada, 743.
 — del Orinoco, 743.
 Corregüela de los caminos, 581.
 — de mar, 581.
 — hembra, 341.
 — lechosa, 484.
 — mayor, 504.
 — marítima, 581.
 — menor, 503.
 — tricolor, 504.
 Corteza aclavillada de Amboina, 587.
 — copalche de Méjico, 620.
 — copalke de Méjico, 620.
 — Culilawan blanca de Amboina, 587.
 — Culilawan papuana de Nueva-Guinea, 587.
 — Culilawan roja de Amboina, 587.

- Corteza de Alcornoque en América, 321.
 — de Masoi, 587.
 — de Simaruba, 274.
 — de Sindoe verdadera de Java, 587.
 — de Sintoc espúria de la India, 587, 588.
 — de Sintoc verdadera de Java, 587.
 — de Winter, 181.
 Cortina, 374.
 Coru de la India, 479.
 Coscoja, 648.
 Coscojo, 648.
 Coscollina, 281.
 Coscomate de Méjico, 517.
 Cosconilla, 437.
 Cospi, 390.
 Costo hortense, 427.
 — verdadero de los antiguos, 432.
 Coto-coto del Brasil, 409.
 Cottonastro, 330.
 Cotoperiz de Cumaná, 353.
 Cotufa, 759.
 Couji de Caracas, 312.
 Coupí de la Guayana, 324.
 Cowdi de Nueva-Zelanda, 670.
 Coyol de Méjico, 692.
 Coyuacate de Méjico, 312.
 Sozticoatzontecóochitl de Hernandez, 686.
 Cozticzacatzacuxochitl de Hernandez, 686.
 Coztomate de Méjico, 517.
 Coztomatl de Méjico, 517.
 Graveiro da terra en el Brasil, 354.
 Cravo do defunto en el Brasil, 425.
 Cren, 199.
 Crespilla 806.
 Cresta de gallina, 549.
 Cresta de gallo blanca en Cuba, 306.
 — de gallo en el Brasil, 508.
 — de gallo en Cuba, 306.
 — de gallo en Europa, 528, 573, 700.
 Criadilla de tierra, 805.
 Crisantemo de la China, 427.
 Crispinde Nueva-Granada, 272.
 Cristoforiana, 477.
 Cruces de Jerusalem, 217.
 — de Malta, 217.
 Cruzada, 411.
 Cruzeirinha del Brasil, 408.
 Cuaba blanca de Cuba, 292.
 Cuacsaro del Perú, 779.
 Cuajaleche, 411.
 Cuajani de Cuba, 326.
 Cuajilote de Méjico, 496.
 Cuapilote de Méjico, 496.
 Cuarango del Perú, 402.
 Cuarentena, 198.
 Cuasia de Tupurubo en el Brasil, 491.
 — jamaicense, 274.
 — surinamense, 274.
 Cuatapanare de Cumaná, 316.
 Cuauchalalá de Méjico, 709.
 Cuauchalate de Méjico, 709.
 Cuautecomate de Méjico, 496.
 Cubebas de Java, 641.
 Cubilètes, 192.
 Cubios del Brasil, 514.
 Cuca del Perú, 248.
 Cucharillas del Perú, 595.
 Cucuyo de Cuba, 467.
 Cuercitron, 649.
 Cuernecillo del campo, 299.
 — de Cuba, 313.
 Cuerno de jardin, 376.
 — de ciervo, 558.
 Cuesco grande de lobo, 805.

- Cugula, 768.
 Cujate de Cuba, 691.
 Cujumary del Brasil, 589.
 Cula, 768.
 Culantrillo blanco de algunos, 782.
 — blanco mayor, 781.
 — blanco menor, 781.
 — del Canadá, 780.
 — de Chile, 455.
 — de Cuba, 780.
 — de Filipinas, 781.
 — de Nueva-Granada, 273.
 — de pozo, 780.
 — dorado, 782.
 — negro, 781.
 Culantro comun, 392.
 — de Cuba, 273, 385.
 Culebrina, 751.
 Culen de Chile, 299.
 Culhua de Méjico, 377.
 Culilawan de Amboina, 587.
 — papuano de Nueva-Guinea, 587.
 Culle amarillo del Perú, 268.
 — encarnado del Perú, 268.
 — morado del Perú, 268.
 — rojo de Chile, 268.
 Culupa de Nueva-Granada, 363.
 Cumarú del Brasil, 315.
 Cumarurana del Brasil, 315.
 Cumbarú del Brasil, 315.
 Cunabí del Brasil, 621.
 Cundeamor, 502.
 Cupameni de la India, 616.
 Cupaná del Orinoco, 255.
 Cupay de Nueva-Andalucía, 244.
 Cura de la India, 479.
 Curagua de Chile, 764.
 Curamaguey de Cuba, 480.
 Curare de la Guayana, 488.
 Curare del Orinoco, 488, 489.
 Curbana de Cuba, 246.
 Curbaril de América, 320.
 Curcuma americana, 694.
 — de Cuba, 694.
 — de la India, 691.
 Curiuva del Brasil, 670.
 Curivano de la Guayana, 758.
 Curo de la India, 479.
 Curodapala de la India, 479.
 Curraleira del Brasil, 619.
 Currucay del Orinoco, 244.
 Curubita de Santa Fé de Bogotá, 364.
 Curugey de Cuba, 708.
 Cururú del Brasil, 255, 481.
 Cuscullo, 391.
 Cuspa de Cumaná, 210.
 — del Orinoco, 273.
 Cuspare del Orinoco, 273.
 Cutsis de Méjico, 688.
 Cha de frade en el Brasil, 283, 538.
 — de pedestre en el Brasil, 538.
 Chacarilla de Bahamá, 620.
 Chacas del Perú, 380.
 Chachacoma del Perú, 380.
 Chadec de la Jamáica, 240.
 Chagas da miuda en el Brasil, 266.
 Chaiotl de Méjico, 360.
 Chalote, 721.
 Chamburu del Brasil, 365.
 Chamela, 474.
 Chamico de Cuba, 519.
 — del Perú, 519.
 Chamisa del Perú, 257.
 Chamiza del Perú, 257.
 Champa de Chile, 499.
 — de Loja, 705.
 — de las Malayas, 181.
 — de Nepalia, 182.
 Champaca de las Malayas, 181.

- Campagra azul del Perú, 705.
 — del Perú, 719.
 Chancelague de Chile, 490.
 Chanche de Quito, 276.
 Chañar de Chile, 466.
 Chapara manteca de la Guayana, 250.
 Chaparro bobo de Nueva-Andalucía, 409.
 — bobo de Nueva-Granada, 595.
 — comun, 648.
 — de Nueva-Granada, 179.
 — del Orinoco, 250.
 Chapin, 688.
 Chapuz de Méjico, 425.
 Charaguanaye hembra de Cumaná, 633.
 Charamasca, 429.
 Charameis de la India, 621.
 Charmilla 647.
 Charneca comun, 288.
 — de algunos, 288.
 Chaves del Perú, 513.
 Chaya de la India, 406.
 Chayote de Cuba, 360.
 Checca-socchonche del Perú, 548.
 Chequen blanco de Chile, 355.
 — colorado de Chile, 354.
 Chercan de Chile, 764.
 Cherva, 619.
 Chia de Méjico, 550.
 Chiagari de Nueva-Granada, 342.
 Chica de Panamá, 688.
 Chicalote de Méjico, 194.
 Chicozapote de Méjico, 466.
 Chicha de las Antillas, 763.
 — del Brasil, 229.
 — de Macqui en Chile, 238.
 Chicharo comun, 305.
 — de Sevilla, 306.
 Chicharo de Cuba, 308.
 — de Cumaná, 308.
 Chicharron de Cuba, 335.
 Chichicastre de Cuba, 629.
 Chichicaxtli de Méjico, 361.
 Chichillica del Perú, 637, 654.
 Chichimbina de Nueva-Granada, 312.
 Chichimicuna del Perú, 465.
 Chictzapotl de Méjico, 466.
 Chihai de los árabes, 428.
 Chihuchihue de Cumaná, 707.
 Chilca del Perú, 419, 421.
 Chilco de Chile, 338.
 Chilillo de Méjico, 581.
 Chillí de Méjico, 517.
 Chilochuelli de Méjico, 225.
 Chiltecpin de Méjico, 517.
 Chimalatl de Méjico, 424.
 Chimelea, 474.
 China de América, 713.
 — del Perú, 713.
 — occidental, 713.
 — oriental 713.
 — peruana, 713.
 China-china de América, 713.
 Chinapaya del Perú, 425.
 Chinceta, 758.
 Chinchileulma del Perú, 435.
 Chinchimali de Chile, 599.
 — del Perú, 425.
 Chinchin de Chile, 212.
 Chinchineulma del Perú, 435.
 Chinchinchu del Perú, 517.
 Chincholero, 329.
 Chinclin de Chile, 212.
 Chincumpa del Perú, 434.
 Chingoyo del Perú, 421.
 Chinininga del Perú, 526.
 Chininha del Perú, 526.
 Chinos de Méjico, 267.
 Chiquizapote de Méjico, 466.
 Chirchita de las Antillas, 574.

- Chirimoyo de Cuba, 184.
 — de la Florida, 185.
 — del Perú, 184.
 Chiringa, 473.
 Chirivía comun, 389.
 — de Cuaresma, 386.
 — tudesca, 386.
 Chirivita, 420.
 Chitan, 271.
 Chitra de Ceilán, 557.
 — de la India, 190.
 Chissiphuinac del Perú, 213.
 Chocho comun, 308.
 — de Nueva-Granada, 309.
 — del Perú, 309.
 Chogllos del Perú, 763.
 Chomoro de Java, 672.
 Chondol de Quito, 759.
 Chonta del Perú, 742.
 Chontadura del Choco, 742.
 Chonto del Choco, 742.
 Chopera, 281.
 Chopo balsamifero, 658.
 — comun, 657.
 — de Lombardia, 657.
 Chordon, 327.
 Chuchau del Perú, 705.
 Chuchoca de Chile, 763.
 Chuçhumeça del Perú, 484.
 Chuchunchulli del Perú, 210.
 Chucumpa del Perú, 534.
 Chufa, 759.
 Chuichicoca del Perú, 248.
 Chuima del Perú, 225, 226.
 Chuleo del Perú, 268, 577.
 Chuna del Perú, 376.
 Chunu del Perú, 513.
 Chuño del Perú, 513.
 Chupa de Nueva-Granada, 355.
 Chupachupa de Nueva-Granada, 224.
 Chupamieles, 527.
 Chupon de Chile, 707.
 Churumayu del Perú, 642.
 Chusque de Nueva-Granada, 770.
 Chuvé del Perú, 494.
 Chuviringana del Brasil, 478.
 Dagame de Cuba, 404.
 Daguilla de Cuba, 598.
 Dahue de Chile, 568.
 Dalia, 422.
 Dama de noche, 521.
 Damasco, 324.
 Damasquina, 425.
 Dambre del Brasil, 408.
 Dampalit de Filipinas, 374.
 Daracan de Filipinas, 467.
 Datilera, 741.
 Dátiles comunes, 741.
 — de perro, 741.
 Dauco crético, 388.
 Dayap de Filipinas, 241.
 Dedalera comun, 527.
 — con hoja de Gordolobo, 528.
 Dedos citrinos, 687.
 Degul de Chile, 306.
 Dentelaria, 557.
 Desflematoria del Perú, 425.
 Desmayo, 657.
 Destruccion de cirujanos en la India, 424.
 Detienebuey, 298.
 Deu de Chile, 276.
 Diamela, 474.
 Dictamo bastardo, 552.
 — crético, 547.
 — Real comun, 271.
 — Real de Cuba, 612.
 Diente de león, 437.
 — de perro, 435, 717.
 Digüenas de Chile, 650.
 Dinacio del Perú y Chile, 394.
 Disciplinas de monja, 582.
 Disciplinilla de Cuba, 613.

- Disparates del campo, 412.
 — de jardín 412.
 Dita de Filipinas, 480.
 Dividiri de Popayan, 316.
 Dividivi de Caracas, 316.
 Doble campeón, 217.
 Doca de Chile, 513.
 — del Perú, 374.
 Dolangian de Filipinas, 637.
 Dominica de Cuba, 479.
 Doncel, 428.
 Doncella de Europa, 608.
 — del Perú, 311.
 Don Bernardo del Brasil, 409.
 Don Juan de noche, 577.
 Don Diego de día, 504.
 — de noche, 577.
 Don Pedro de noche, 577.
 Dongon de Filipinas, 228.
 Doradilla comun, 779.
 — de Chile, 459.
 — de Méjico, 788.
 — de Nueva-Granada, 779.
 Dormidera comun, 193.
 — de América, 311.
 Doronico, 430.
 Doso de Filipinas, 691.
 Douradinha del Brasil, 230.
 — do campo en el Brasil, 409.
 Dragonal, 723.
 Dragoncillo 428.
 Dragoncillos, 526.
 Drago, 723.
 Dragontea, 751.
 Dringi de la India, 359.
 Duhat de Filipinas, 354.
 Dulcamara, 514.
 Dulciamarga, 514.
 Dulitan de Filipinas, 466.
 Dungon de Filipinas, 228,
 310.
 Duraznillo comun, 581.
 — de Nueva-Granada, 231.
 Durazno, 324.
 Durillo, 399.
 Durion de la India, 226.
 Dormiente, 318.
 Dusu de Filipinas, 691.
 Ebano amarillo de las Antillas,
 494.
 — de algunos, 280.
 — de Asia, 469.
 — de Candia, 304.
 — de Creta, 304.
 — de la isla de Santo Domin-
 go, 310.
 — de Oriente, 313.
 — del Perú, 278.
 — falso, 297.
 — negro de Filipinas, 469.
 — verde de las Antillas, 494.
 Elcaija de los árabes, 259.
 Eleborastro, 176.
 Eléboro blanco, 727.
 — negro, 176.
 — negro de Hipócrates, 176.
 — verde, 176.
 Emajagua de Puerto-Rico, 231.
 Enbira branca del Brasil, 597.
 — del Brasil, 186.
 Encibar, 297.
 Encienso de Andalucía, 428.
 — de Canarias, 428.
 Encinilla de Europa, 553.
 — de la isla Española, 279.
 Encina de bellotas amargas,
 648.
 — de bellotas dulces, 648.
 — de la isla de Santo Domin-
 go, 495.
 — de la isla Española, 495.
 — de mar, 815.
 — marítima, 815.
 — tintórea, 649.
 Encomienda de Santiago, 704.
 Encorvada, 304.

- Endrino, 325.
 Enea, 747.
 Enebro achaparrado, 664.
 — comun, 662.
 — de la miera, 664.
 — rastrero, 664.
 — Real, 662.
 — turifero, 663.
 Eneldo, 389.
 Enjalmos, 387.
 Enredadera campanilla, 502.
 — de Cuba, 300.
 Ensensio comun, 428.
 — marino 200.
 Ensiaõ de la isla de Madera, 373.
 Enula campana, 422.
 Epazote de Méjico, 567.
 Epazotl de Méjico, 567.
 Equiseto mayor, 777.
 — mecánico, 777.
 — menor, 777.
 Erguen de Marruecos, 466.
 Erisimo oficial, 200.
 Erizo de Caracas, 232.
 — hembra, 376.
 — macho, 376.
 Erva dos cachos da India en el Brasil, 564.
 — do capitaõ en el Brasil, 384.
 — da cobra en el Brasil, 419.
 — do collegio en el Brasil, 418.
 — de Nossa Senhora en el Brasil, 188.
 — de palo en el Brasil, 279.
 — de passerinho en el Brasil, 397.
 — de pipi en el Brasil, 563.
 — do rato en el Brasil, 409.
 — de San Caetano en el Brasil, 360.
 Erva de Santa Lucia en el Brasil, 614.
 — de Santa Maria en el Brasil, 567.
 — do sapo en el Brasil, 610.
 — do vicho en el Brasil, 115, 582.
 — grossa del Brasil, 418.
 — minuana del Brasil, 339.
 — moira de sertoã en el Brasil, 246.
 — moura del Brasil, 515.
 — mular del Brasil, 619.
 — pombinha del Brasil, 621.
 — santa del Brasil, 421.
 — toustaõ del Brasil, 578.
 — venenosa del Brasil, 300, 481.
 Ervato, 389.
 Ervinha da parida en el Brasil, 407.
 Escabiosa de Cuba, 527.
 — de Méjico, 300.
 — mordida, 414.
 Escalla, 772.
 Escaluña, 721.
 Escambrones de Jarava, 378.
 Escamonea de Alepo, 503.
 — de Antioquia, 484.
 — de Borbon, 483.
 — de Esmirna, 484.
 — de Valencia, 484.
 — falsa, 484.
 Escanda comun, 772.
 — mayor lampiña, 772.
 — mayor mocha, 772.
 — mayor peluda, 772.
 Escandia, 772.
 Escaña comun, 772.
 — de dos carreras, 772.
 — mayor lampiña, 772.
 — mayor mocha, 772.
 — mayor peluda, 772.

- Escaña mazorral, 772.
 — melliza, 772.
 — menor lampiña, 772.
 — menor vellosa, 772.
 Escaramujo, 329.
 Escarcha, 374.
 Escarchada, 374.
 Escarchosa, 374.
 Escarola, 436.
 Escoba amarga de Cuba, 423.
 — cimarrona del Perú, 220, 222, 223.
 — de bruja en Cuba, 222.
 Escobilla de Europa, 432, 570.
 — de Méjico, 421.
 — del Perú, 527.
 — morisca, 414.
 — parda, 428.
 Escobón, 297.
 Escobones, 432.
 Escordio, 553.
 Escorzonera de España, 436.
 — de Méjico, 385, 436.
 Escudete de Europa, 192.
 — de América, 192.
 Escurripa, 440.
 Esguru del Perú, 569.
 Espadaña común, 747.
 — fina, 699.
 Espadilla de Carichana, 297.
 — de Cumaná, 300.
 — de Europa, 700.
 Espantalobos, 303.
 Espantazorras, 556.
 Esparceta común, 304.
 — de España, 304.
 Esparcilla, 217, 304.
 Esparganio, 748.
 Esparraguera, 722.
 Espárrago amarguero, 723.
 — común, 722.
 — del Cabo, 642.
 Espárrago de lobo, 530.
 — de peñas, 723.
 — de perro, 530.
 — negro, 723.
 — triguero, 723.
 Esparto basto, 763.
 — común, 766.
 Especería de montaña en el Perú, 526.
 Especia de montaña en el Perú, 526.
 Espejo de Venus, 442.
 Espejuelo, 570.
 Espica céltica, 412.
 Espicanardo de la India, 412.
 — espúrio de la India, 774.
 Espiga florida, 551.
 — de agua, 682.
 Espigadilla, 773.
 Espiguilla, 768.
 Espina blanca, 433.
 — de Cristo, 280.
 — de vagra en Popayan, 511.
 — santa, 280.
 — vesa, 280.
 Espinaca común, 569.
 — de Holanda, 568.
 — de Malabar, 574.
 Espinardo, 570.
 Espinha do carneiro en el Brasil, 423.
 Espinheiro d'ameixa en el Brasil, 238.
 Espinillo de Cumaná 312.
 — de España en Canárias y Cuba, 317.
 Espino albar, 329.
 — amarillo, 601.
 — blanco, 329.
 — cervical, 281.
 — de Cuba, 720.
 — hediondo, 281.
 — falso, 601.

- Espino majoleto, 329.
 — majuelo, 329.
 — negro 281.
 — negro de algunos, 330.
 — Real, 330.
 Espinosilla de Méjico, 500.
 Espíritu de iva, 426.
 Espliego, 546.
 Espolin, 766.
 Espolon de gallo, 330.
 Esponjilla de algunos en América, 360.
 Esprilla, 772.
 Espuela de caballero, 177.
 — de galan, 266.
 — de Rey en Cuba, 464.
 Estacarocines, 271.
 Estafiate de Méjico, 428.
 Estiranervios del Perú, 421.
 Estoque, 700.
 Estoraque comun, 471.
 — del Brasil, 471.
 — de Méjico, 656.
 — de Oriente, 656.
 — del Perú, 296.
 Estragon, 428.
 Estramonio, 519.
 Estrellada, 217, 297.
 Estrellamar, 558.
 Estrellas, 420.
 Estropajo de Oajaca, 359.
 Esula redonda, 613.
 Eternas amarillas, 429.
 — blancas, 575.
 — encarnadas, 575.
 — moradas, 575.
 Euforbio, 612.
 Eupatorio de los árabes, 418.
 — de los griegos, 328.
 Extracto de Ajenjo, 428.
 Extraña, 420.
 Ezquahuitl de Méjico, 620.
 Faan de Borbon, 687.
 Faba crasa, 372.
 — de San Ignacio en el Brasil, 358.
 Fabaria, 372.
 Falsa Acacia, 302.
 Falsa Calaguala de Chile, 339.
 Falso Aromo de algunos, 302.
 Falso Canelo de Winter, 246.
 Falso Membrillo, 330.
 Falso Plátano, 251.
 Falso Turbit, 390.
 Farfala, 268.
 Farolillos comunes, 442.
 — de enredadera, 254.
 Farroba de Canarias, 373.
 Fava de San Ignacio en el Brasil, 358.
 Faya de Canarias, 660.
 Fedegozo del Brasil, 319.
 Fedorenta del Brasil, 408.
 Fernan Sanchez del Perú, 584.
 Figueira branca del Brasil, 634.
 Filigrana de Europa, 217.
 — de Cuba, 538.
 Filipéndula, 326.
 Filosa, 608.
 Flacoxochitl de Méjico, 404.
 Flamenquilla, 431.
 Flámula de Júpiter, 173.
 — trepadora, 173.
 Flecha de agua, 679.
 Fleja de Aragon, 472.
 Flor Adonis, 175.
 — del abanico, 700.
 — de la abeja, 687.
 — d'agoa en el Brasil, 750.
 — del aire, 708.
 — de Alcatras de Mompox, 604.
 — de amor, 573.
 — de babado en el Brasil, 481.

Flor de babeiro en el Brasil, 481
 — de la bola, 376.
 — de cabeza viperina en Méjico, 686.
 — de Cacao en Méjico, 224.
 — de calentura en Cuba, 484.
 — de calentura, blanca en Cuba, 484.
 — del cáliz, 376.
 — de Candia, 374.
 — del cangrejo, 694.
 — de Casia, 587.
 — de la cera, 485.
 — del clavo en Europa, 265.
 — del clavo en Méjico, 269.
 — de la codorniz, 497.
 — del corazon en Méjico, 182.
 — de la corona, 720.
 — de Corpus en Méjico, 686.
 — del cristal, 374.
 — del cuchillo, 374.
 — del cuclillo, 217.
 — del cuervo en Méjico, 479.
 — del embudo, 753.
 — de la espada, 700.
 — del incienso en Méjico, 708.
 — de Júpiter, 217.
 — del lagarto, 485.
 — del látigo, 376.
 — del lazo atigrada, 718.
 — del lazo roja, 718.
 — de Lis, 704.
 — de la Maravilla, 700.
 — de mayo en Popayan, 346.
 — de la melancolia en Panamá, 464.
 — de miel, mayor, 270.
 — de miel, menor, 270.
 — de la mistela en Chile, 369.
 — de mosquito en Quito, 687.
 — de muerto en Cataluña, 431.
 — de muerto en Cuba, 425.
 — de muerto en Méjico, 687.

Flor de Nochebuena, 615.
 — de Panamá, 577.
 — de Pascua, 615.
 — del pelicano, 688.
 — de la perdiz en Chile, 268.
 — de la perdiz en el Perú, 268.
 — del pescado, 265.
 — de la pluma, 426.
 — de primavera, 751.
 — del Príncipe, 479.
 — de Quaresima en el Brasil, 346.
 — de la Reina en el Perú, 484.
 — de Roma, 427.
 — de San Diego en Cuba, 575.
 — de la sangre en Europa, 266, 704.
 — de la sangre en el Perú, 266.
 — de San Juan en Cuba, 418, 686.
 — de San Juan en Méjico, 404.
 — de San Pedro en Cuba, 688.
 — de Santiago, 704.
 — de los Santos en Méjico, 686.
 — de la sardina, 265.
 — de la seda, 484.
 — del sol, cultivada, 424.
 — del sol, silvestre, 208.
 — del sueño, 268.
 — de todos los meses, 431.
 — de la Trinidad, 209.
 — del viento, 174.
 — extraña, 420.
 — negra de Méjico, 688.
 — tigre, 700.
 Floricuerno, 376.

- Floripondio blanco de Méjico, 519.
 — blanco del Perú, 519.
 — encarnado del Perú, 519.
 Floripundio del Perú, 519.
 Frailecillo cimarrón de Cuba, 620.
 — de Cuba, 618.
 Frailejon de Nueva-Granada, 423.
 Frailillos, 751.
 Frambueso, 327.
 Francesilla, 176.
 Fregosa de Nueva-Granada, 527.
 Frejol de olor en Cuba, 300.
 Fresa-Ananas, 327.
 — chilena, 327.
 — comun, 327.
 Freson, 327.
 Fresnadilla, 271.
 Fresnillo, 271.
 Fresno de Castilla, 472.
 — de la Carolina, 473.
 — del Perú, 495.
 — de la tierra, 472.
 — de Vizcaya, 472.
 — florifero, 473.
 Friegaplatos de Cuba, 515.
 Frijol caballero de Cuba, 307.
 — cimarron de Cuba, 307.
 — comun, 306.
 — de Antibo en el Perú, 307.
 — de fraile, 307.
 — de Maluco, 315.
 — de olor en la Habana, 300.
 — de la otra costa en el Perú, 307.
 — grande de América, 307.
 Frijolillo de Cuba, 302.
 — de la India, 307.
 Frisol menudo, 307.
- Fruta de arara en el Brasil, 617.
 — de burro en el Orinoco, 185.
 — da condessa en el Brasil, 184.
 — de la condessa en las Antillas, 184.
 — del machin, 244.
 — de paraó en el Brasil, 256.
 — de pomba en el Brasil, 248.
 — estrellada de los portugueses asiáticos, 180.
 Frutilla de Chile, 327.
 — de monte en el Perú, 385.
 — de sábana en Cuba, 250.
 Fuente de Nueva-Granada, 262.
 Fuco azucarado, 815.
 — de los antiguos, 814.
 Fumaria amarilla, 195.
 Fumo bravo del Brasil, 418.
 Fustete comun, 289.
 — de Cuba, 633.
 Fustique, 289.
 Gaby de Filipinas, 753.
 Gachipaes de Nueva-Granada, 742.
 Galabardera, 329.
 Galan de dia, 521.
 — de noche en Europa, 521.
 — de noche en Cuba, 524.
 Galanga mayor de la India, 692.
 — verdadera de la India, 692.
 Galbano, 389, 392.
 Galgana, 305.
 Galimeta de la Jamáica, 466.
 Galinha choca del Brasil, 248.
 Galio blanco, 411.
 Galipot, 667.
 Gallaritos, 528.
 Gallitos de Cuba, 535.
 — de Europa, 526.
 Gallocresta, 549.

- Gamarza, 271.
 Gambir de la India, 402. —
 Gamboas, 331.
 Gamelleira del Brasil, 634. —
 Gamon amarillo, 722.
 — blanco, 722.
 — comun, 722.
 Gamonita, 722.
 Gamonito, 722.
 Gandola de la India, 572. —
 Gandú de Cuba, 308.
 Gandul de Cuba, 308.
 Garambullo de Méjico, 450.
 Garbancera, 303. —
 Garbancillo de Andalucía, 303.
 — del Cabo de Gata, 569.
 — del Perú, 303.
 Garbanzos comunes, 304. —
 — del cura, 432.
 — de Filipinas, 308.
 Garmal de los árabes, 269.
 Garo de Malaca, 285.
 Garoe de Canarias, 589.
 Garrapata de Méjico, 471.
 Garranchuelo, 765.
 Garrobilla de Europa, 305.
 — de Curacao, 316.
 Garrofero, 317.
 Garrotilla, 503.
 Garrubias, 307.
 Gata rabiosa, 175.
 Gatasgatas de Filipinas, 614.
 Gatillo de Nueva-Andalucía,
 204.
 Gatos, 526.
 Gatuña, 298.
 Gaultro de Chile, 421.
 Gayuba de Europa, 450.
 — de Méjico, 450.
 Gayumbo, 297.
 Gazul de Alicante, 374.
 — de Granada, 374.
 Gazula, 374.
 Gelatrang de Java, 182.
 Geli del Perú, 335.
 Gemela, 474.
 Genciana amarilla, 491.
 — blanca, 390.
 — del Brasil, 491.
 — roja, 491.
 Gencianilla, 491.
 Gengiba de Jarava, 491.
 Gengibre blanco, 691.
 — de dorar, 691.
 — negro, 691.
 Genipi blanco, 426, 428.
 — espurio, 426.
 — negro, 426, 428.
 — verdadero, 426.
 Geranio de olor, 264.
 — de la Reina, 265.
 — rosa, 264.
 Geratacaca del Brasil, 524.
 Geremma del Brasil, 313.
 Geringuilla, 349.
 Germandrina, 553.
 Gervao del Brasil, 537.
 Gia blanca de Cuba, 283.
 — brava de Cuba, 283.
 — de Cuba, 283.
 Gibá de Cuba, 248.
 Gibalbera de Canarias, 713.
 Gigantea, 424.
 Gigantilla, 424.
 Gilo del Brasil, 514.
 Ginkgo de la China, 672.
 Ginseng de América, 393.
 — de la China, 393.
 Giquillite de Méjico, 299.
 Giralda 427.
 Girasol, 424.
 Girgola 808.
 Gitanas, 582.
 Gith, 217.
 Gitomate da Méjico, 513.
 Gli de los hotentotes, 387

- Goaconar de las Antillas, 292.
 Goajurú del Brasil, 324.
 Goao de costa en Cuba, 289.
 — de Cuba, 288.
 Gobernadora de Méjico, 269.
 Gogo de Filipinas, 311.
 Golandrina de Filipinas, 614.
 Golondrinera, 194.
 Golillas de Corte, 582.
 Golfan blanco, 192.
 Goma Anime de los ingleses, 234.
 — arábiga, 312.
 — de Acaju, 287.
 — de Bahía botánica, 723.
 — de Basora, 313.
 — de Batata del Brasil, 503.
 — de Berbería, 313.
 — de Campeche, 317.
 — de Limon en las Antillas, 292.
 — Kino de Africa, 310.
 — Kino oriental, 310.
 — Laca, 634, 635.
 — Opocalpaso, 313.
 — oremburgense, 669.
 — Senegal, 313.
 — Tragacanto de Grecia, 303.
 — Tragacanto del Líbano, 303.
 — uralense, 669.
 Goma guta de América, 242.
 — de Ceilan, 244.
 Goma laca de la India, 635.
 Gomo-resina Amoniaco, 389.
 — Asafétida, 389.
 — Euforbio, 612.
 — Galbano, 389, 392.
 — Hederina, 393.
 — Laser, 389, 390.
 — Opoponaco, 388.
 — Sagapeno, 389.
 Gongonha del Brasil, 279.
 — verdadeira del Brasil, 279.
 Gordolobo comun, 525.
 — de Méjico, 429.
 Gorgoreta de Filipinas, 605.
 Gota de Lino, 504.
 — de sangre, 175.
 Grama comun, 767.
 — de España, 767.
 — del norte, 772.
 — de olor, 764.
 — de praya en el Brasil, 765.
 Grana de Aviñon, 281.
 — Kermes, 648.
 Granadilla de mono en el Perú, 363.
 — del Perú, 363.
 Granadillo de Cuba, 310.
 Granadita de China en Méjico, 363.
 Granado blanco, 221.
 — comun, 332.
 Granévano, 303.
 Granillo de oveja, 303.
 Granos de amor, 510.
 — de las Molucas, 620.
 — del Paraíso de Guinea, 691.
 — de Zelin, 185.
 — tiglios de las Molucas, 620.
 Granza, 410.
 Grao de gallo en el Brasil, 465.
 Grassa, 664.
 Grasilla, 457, 664.
 Gravatá del Brasil, 707.
 Gritadeira del Brasil, 409.
 — do campo en el Brasil, 409.
 Grosella de Cuba, 621.
 — de Europa, 378.
 Grosellero americano, 377.
 — comun, 378.
 — negro, 378.
 — rojo, 378.
 Grumixameira del Brasil, 355.
 Gua de Chile, 763.
 Guaba de algunos, 311.

- Guaba del Perú, 311.
 Guabica de Cuba, 185.
 Guabo de Nueva-Granada, 312.
 — de Quito, 311.
 Guacalotes amarillos de Cuba, 315.
 — de Cuba, 315.
 — prietos de Cuba, 315.
 Guacamaya de Cuba, 316.
 — franca de Cuba, 318.
 Guacamayo, 574.
 Guacamote de las Antillas, 405.
 Guachapele de Guayaquil, 314.
 Guacharaco de Nueva-Granada, 291.
 Guacima amarilla de Cuba, 232.
 — baria de Cuba, 232.
 — de América, 229.
 — de baria en Cuba, 186.
 Guacimilla de costa en Cuba, 207.
 Guacimo de América, 229.
 — de Cumaná, 207.
 — macho de Cumaná, 229.
 Guaco de Chipó, 425.
 — de Colombia, 604.
 — de Goatemala, 419.
 — de Nueva-Granada, 419.
 — de tierra caliente en Méjico, 603, 604.
 Guacomaya de Nueva-Granada, 563.
 Guada de Chile, 361.
 Guadalagüen de Chile, 339.
 Guadua de Nueva-Granada, 770.
 — del Orinoco, 770.
 Guagaci de Cuba, 207.
 Guidil de Canarias, 504.
 Guairage de Cuba, 355.
 Guairagillo de Cuba, 355.
 Guaje de Méjico, 314.
 Guajerú del Brasil, 324.
 Guajilote de Méjico, 496.
 Guajiote de Méjico, 289.
 Gualda, 205.
 Gualdaperra, 527.
 Gualdilla, 205.
 Gualdon, 205.
 Gualtata del Perú, 583.
 Gualtro de Chile, 421.
 Guamá chico de Nueva-Granada, 311.
 — de Caracas, 311.
 — de Cuba, 301, 302.
 — de Cumaná, 312.
 — de machete en Nueva-Granada, 311.
 — de Nueva-Granada, 312.
 — del Orinoco, 311.
 Guamachi de Méjico, 312.
 Guamufate del Orinoco, 354.
 Guanabano cimarron de Cuba, 184.
 — de las Antillas, 184.
 Guanchu de Chile, 421.
 Guanima de Cuba, 317, 319.
 Guaniqui de Cuba, 563.
 Guansaguante de Méjico, 503.
 Guao de Cuba, 288.
 Guaparaiba del Brasil, 337.
 Guara colorada de Cuba, 256.
 — de Cuba, 256.
 — de la India, 601.
 Guarabú del Brasil, 288.
 — preto del Brasil, 288.
 Guaraiba del Brasil, 494.
 Guarana del Brasil, 255.
 — uva del Brasil, 255.
 Guarango del Perú, 313.
 Guarapero, 330.
 Guararema del Brasil, 563.
 Guaranhem del Brasil, 465.
 Guardalobos, 599.

- Guardaropa, 427.
 Guarernaoba del Brasil, 359.
 Guariare de Cumaná, 204. —
 Guaricano del Orinoco, 206.
 Guaritoto de Cumaná, 618.
 Guaruma de Cuba, 637.
 Guatacare de Cumaná, 508.
 Guatemala de algunos, 296.
 Guate pajarito de Cumaná, 397.
 Guau de Méjico, 289.
 Guaviroba del Brasil, 353,
 355.
 — de campo en el Brasil, 353.
 — de canorro en el Brasil,
 353.
 Guayaba-rana del Brasil, 353.
 Guayabilla del pinar en Cuba,
 353.
 Guayabillo agrio de Nueva-
 Granada, 354.
 — de Cuba, 355.
 — del pinar en Cuba, 353.
 — de sábana en Nueva-Gra-
 nada, 354.
 Guayabita del Orinoco, 335.
 Guayabito de monte en Cuma-
 ná, 355.
 Guayabo agrio de las Antillas,
 352.
 — Arrayan del Orinoco, 353.
 — bastardo de la Martinica,
 355.
 — blanco de Cuba, 352.
 — cotorrero de Cuba, 352. —
 — de Anselmo en Nueva-Gra-
 nada, 352. —
 — del Perú, 352. —
 — negro de la Guayana, 406.
 — silvestre de las Antillas,
 352.
 Guau de Méjico, 289. —
 Guauchilli de Hernandez, 194.
 Guauro de Cuba, 485. —
- Guaxima del Brasil, 220.
 Guayacan africano, 469.
 — de Africa, 319.
 — de América, 270.
 — de las Antillas, 270.
 — de Chile, 270. —
 — de Virginia, 469.
 Guayacana de Virginia, 469.
 Guayacancillo de Cuba, 270.
 Guayaco de Africa, 319.
 Guayca del Orinoco, 335. —
 Guayo colorado de Chile, 326.
 — colorado de Nueva-Grana-
 da, 313. —
 Guazumillo de Cuba, 508.
 Guelde, 399.
 Güevillgüevill de Chile, 521.
 Gueuin de Chile, 595.
 Guiabara de Cuba, 583.
 Guiabo de Africa, 221.
 Guijas, 305.
 Guijo de Filipinas, 236.
 Guilmo de Chile, 770.
 Guimba de Cuba, 185.
 Guindo comun, 325.
 — garrafal, 325.
 Guingombo de Africa, 221.
 Güira cimarrona de Cuba, 495.
 — criolla de Cuba, 496.
 — de las Antillas, 495.
 Guirito de Cuba, 515.
 Guirnalda, 326, 575.
 Güiro de Méjico, 496.
 Guisante comun, 305.
 — de olor, 305.
 — dulce de la isla de Santo
 Domingo, 312. —
 — mollar, 305.
 Guitiiba del Brasil, 324. —
 Guizacillo de Cuba, 766. —
 Guizazo de caballo en Cuba,
 231.
 — de Cuba, 765.

- Guluncha de la India, 188.
 Gumamila de Filipinas, 221.
 Guttapercha, 466.
 Haba comun, 305.
 — de Egipto, 192.
 — de Filipinas, 308.
 — de indio en Méjico, 615.
 — de San Ignacio, 489.
 — de San Ignacio en Méjico, 615.
 — loca, 305.
 — pichurin del Brasil, 589.
 — pinoli del Brasil, 589.
 — tonka del Brasil, 315.
 Habagbag de los árabes, 420.
 Habarraz de Jarava, 177.
 Habhel, 664.
 Habichuela comun, 306.
 — de Egipto, 307.
 Habilla de Nueva-Granada, 358.
 Habzeli de Africa, 185.
 Hacchiquis del Perú, 213.
 Hachichinoa de Méjico, 508.
 Hagonoi de Filipinas, 424.
 Hanchalagua de Chile, 490.
 Hanchinal de Méjico, 343.
 Harapamaman del Perú, 517.
 Harina lupulina, 631.
 Haya, 650.
 Hayo de Santa Marta, 248.
 Hedegar, 433.
 Hederina, 393.
 Hedionda, 519.
 Hediondilla de Méjico, 567.
 Hediondo de Canarias, 568, 655.
 — de Europa, 296.
 Helecho acuático, 783.
 — florido, 783.
 — hembra, 781, 782.
 — macho, 781.
 — Real, 783.
 Heliotropio comun, 508.
 Heliotropio de olor de vainilla, 508.
 — fino, 508.
 Henequen de la isla de Santo Domingo, 705.
 Henné de Cuba, 343.
 Heno blanco, 764.
 — comun, 768.
 — de Méjico, 707.
 Hepática blanca, 211.
 — comun, 175.
 — dorada, 381.
 — estrellada, 410.
 — fontana, 794.
 — terrestre, 798.
 Herbada, 216.
 Hermodactiles, 727.
 Hermosa del dia, 719.
 — Hudonia, 372.
 Hermosilla, 442.
 Herrumbre, 804.
 Hibila del Perú, 213.
 Hibuero de la isla Española, 495.
 Hicaco de las Antillas, 324.
 Hicamas de Filipinas, 308.
 Hiel de tierra, 490.
 Hielmo de Chile, 396.
 Higos del Cabo, 374.
 — del mastuerzo en América, 365.
 — marinos, 374.
 Higuera chumba, 377.
 — comun, 633.
 — de Adan, 696.
 — del diablo, 619.
 — de la India, 634.
 — de las Indias, 377, 696.
 — del infierno segun Jarava, 615.
 — de pala, 377.
 — de tuna, 377.
 — infernal, 619.

- Higuera loca, 519.
 Higuiereta, 619.
 Higuierilla, 619.
 Higüero de la isla Española, 495.
 Higueron de Caracas, 635.
 — de Méjico, 634.
 — de Nueva-Granada, 635.
 — del Perú, 634.
 Higuero de Méjico, 634.
 — de Nueva-Andalucía, 634.
 — de Nueva-Granada, 634.
 Higuera, 299.
 Higuillo de la India, 488.
 Hilo de oro en Caracas, 504.
 Himamao de Filipinas, 259.
 Hiniesta de escobas, 297.
 — de tintes, 297.
 — escobar, 297.
 Hinojo acuático, 387.
 — comun, 387.
 — marítimo, 388.
 Hisopo comun, 549.
 — de Méjico, 550.
 Hisopillo, 548.
 Hobo de las Antillas, 290.
 Hoja cruz de Filipinas, 496.
 — de Cucuyo en Cuba, 467.
 — de pescado en Méjico, 492.
 — de queso en Caracas, 527.
 — de San Pedro, 596, 597.
 — grande de Cuba, 753.
 — indica, 588.
 — peluda de Méjico, 516.
 Hojaranzo, 647.
 Holquahuil de Méjico, 637.
 Hombrecillo, 630.
 Hombú de Buenos-Aires, 563.
 *Homero del Perú, 744.
 Hong-lan de la China, 176.
 Hongo campesino, 808.
 — de Malta, 607.
 — de sauce, 807.
 Hongo pimentero, 808.
 Hordiate, 773.
 Horhor del Perú, 233.
 Hormino silvestre, 549.
 Hortensia, 380.
 Huaba de algunos, 311.
 — del Perú, 311.
 Huacamote de Méjico, 619.
 Huacayancacha del Perú, 525.
 Huachuaacso del Perú, 708.
 Huaco de Nueva-Granada, 419.
 Huacsaro del Perú, 779.
 Huage cirian de Méjico, 496.
 Huigan de Chile, 290.
 Hualle de Chile, 650.
 Huallhua del Perú, 299.
 Huampit de Filipinas, 239.
 Huampo del Perú, 226.
 Huanabano cimarron de Cuba, 184.
 Huancarssacha del Perú, 224.
 Huao de Cuba, 288.
 Huarango del Perú, 313.
 Huariturú del Perú, 413.
 Huayacan de Chile, 270.
 Huayhuacho del Perú, 708.
 — macho del Perú, 708.
 Huayo colorado de Chile, 326.
 Huele de noche, 521.
 Huevill huevill de Chile, 521.
 Huigan de Chile, 290.
 Huincus del Perú, 434.
 Huinghan de Chile, 290.
 Huiquilil de Méjico, 299.
 Huitz de Méjico, 514.
 Huméro, 652.
 Huminta del Perú, 763.
 Humo de pez, 667.
 Iambeiro de la India, 355.
 Iambolies de la India, 354.
 Iambolones de la India, 354.
 Ibirapitanga del Brasil, 316.
 Ibirarema del Brasil, 563.

- Icaco de las Antillas, 324.
 Icoctli de Méjico, 720.
 Ichu del Perú, 766.
 Iehu del Perú, 766.
 Icicariba del Brasil, 291.
 Icohueyo de Hernandez, 686.
 Icotli de Méjico, 478.
 Igname de Guinea, 709.
 — del Brasil, 709.
 Ieo del Brasil, 204.
 Ignia de Filipinas, 259.
 Illmú de Chile, 722.
 Imbira del Brasil, 186.
 Imbu del Brasil, 290.
 Imburana del Brasil, 291.
 Imbuzeiro del Brasil, 290.
 Imperatoria romana, 389.
 Imyra-Quiyinha del Brasil, 589.
 Iname de algunos, 308.
 Incienso de Africa, 663.
 — de Andalucía, 428.
 — de Asia, 291.
 — de Canarias, 429.
 — de Caracas, 423.
 — de Chile, 469.
 — de la isla de Juan Fernandez, 431.
 — de Méjico, 420.
 Inchic del Perú, 314.
 Indaja del Brasil, 743.
 Indayaçu del Brasil, 617.
 Indianilla, 307.
 Indiecito de Caracas, 343.
 Indigo de la India, 299.
 Inguinaria, 422.
 Inhame de Américo Vespucio, 418.
 — del Brasil, 709, 752.
 — de la China, 709.
 — de Cochinchina, 709.
 — de Guinea, 709.
 — del Japon, 709.
 Inhapéçanga del Brasil, 712.
 Ipadú del Brasil, 248.
 Ipé blanco del Brasil, 508.
 — contrasarna del Brasil, 494.
 — del Brasil, 494.
 Ipeca de la Guaira, 484.
 Ipecacuana amilácea de Nueva-Granada, 410.
 — anillada del Brasil, 409.
 — antipoda, 595.
 — blanca del Brasil, 210, 410.
 — blanca de Cayena, 210.
 — blanca de Nueva-Granada, 410.
 — de América, 299.
 — de Borbon, 483.
 — del Brasil, 409.
 — de la Carolina, 191.
 — de Méjico, 210.
 — de Venezuela, 484.
 — de Virginia, 326.
 — estriada de Nueva-Granada, 408.
 — gris blanquecina del Brasil, 409.
 — gris del Brasil, 409.
 — gris rojiza del Brasil, 409.
 — negra de Ceilan, 409.
 — peruviana, 408.
 — undulada de Nueva-Granada, 410.
 Ipeuva del Brasil, 494.
 Ipil de Filipinas, 319.
 Iraiba del Brasil, 744.
 Irak de Persia, 557.
 Iscumnin del Perú, 405.
 Islera, 381.
 Ison de Quito, 300.
 Itaca de la Guayana, 301.
 Iteumaqua de Méjico, 686.
 Iva artética, 553.
 — comun, 553.
 Ixtli de Méjico, 706.

- Izquioxochitl de Hernandez, 471.
 Iztactepetzacuxochitl de Hernandez, 686.
 Jaboncillo de América, 255.
 — de Méjico, 471.
 Jabonera blanca, 217.
 — comun, 216.
 — de Egipto, 190.
 — de Levante, 190.
 — de la Mancha, 216.
 Jabonero de América, 255.
 Jaborandi del Brasil, 642.
 Jaboticabura del Brasil, 354.
 Jabuti del Brasil, 353.
 Jabuticabeira del Brasil, 354.
 Jaca de la India, 637.
 Jacare-uva del Brasil, 245.
 Jacifate del Orinoco, 291.
 Jacinto estrellado, 720.
 — legitimo, 720.
 — muscari, 720.
 — penachudo, 720.
 — silvestre, 720.
 Jacio del Orinoco, 617.
 Jacobea morada, 431.
 Jacque de Cumaná, 312.
 Jagua de Cartagena de América, 405.
 — de Cuba, 405.
 Jaguarza, 208.
 Jaguarzo, 208.
 Jaguey hembra de Cuba, 634.
 — macho de Cuba, 634.
 Jal de la India, 557.
 Jalapa del Brasil, 503.
 — de Méjico, 503.
 Jalapaó del Brasil, 618.
 Jaltomate de Méjico, 517.
 Jangi de la India, 678.
 Janipaba del Brasil, 405.
 Janipabeiro del Brasil, 405.
 Japicanga del Brasil, 712.
 Jaquita de Cumaná, 534.
 Jara blanca, 208.
 — comun, 208.
 — estepa, 208.
 — jarguna, 208.
 Jaracatiá del Brasil, 365.
 Jaramago amarillo de los tejados, 202.
 — amarillo medicinal, 200.
 — blanco, 202.
 — oficial, 199.
 Jarilla de Chile, 304.
 — de jardin, 420.
 — de monte, 208.
 Jarillo, 751.
 Jaro, 751.
 Jaron, 208.
 Jarro de Filipinas, 605.
 Jarvaó del Brasil, 537.
 Jatobá del Brasil, 320.
 Javari del Brasil, 743.
 Javilla de Nueva-Granada, 358.
 Jazmin azul, 557.
 — de Arabia, 474.
 — de España, 475.
 — de Francia en Cuba, 474.
 — de la India, 405.
 — de Italia en Cuba, 514.
 — de Virginia, 494.
 — morisco, 475.
 — oloroso, 475.
 — Real, 475.
 — trompeta, 494.
 Jazminillo de Nueva-Granada, 479.
 Jazminorro, 475.
 Jeratacaca del Brasil, 524.
 Jerema del Brasil, 313.
 Jervaó del Brasil, 537.
 Jetai del Brasil, 320.
 Jetaiba del Brasil, 320.
 Jetica del Brasil, 502.
 Jeve del Brasil, 617.

- Jibá de Cuba, 248.
 Jicama de las Antillas, 307.
 — de Cuba, 307.
 — de Filipinas, 308.
 Jijirri del Orinoco, 742.
 Jipijapa del Perú, 746.
 Jiquí de costa en Cuba, 250.
 — de Cuba, 467.
 Jiquima de las Antillas, 307.
 — de Cuba, 307.
 Jiraraca del Brasil, 753.
 Jiride, 699.
 Jistra, 386.
 Jito del Brasil, 259.
 Joazeiro del Brasil, 280.
 Jobo de las Antillas, 290.
 — jibaro de Quito, 621.
 Jocoyoli de Méjico, 268.
 Jocuma de Cuba, 466.
 Joho-inco de Javita, 465.
 Joyo, 770.
 Juá del Brasil, 280.
 Juapecanga del Brasil, 712.
 Júcaro de Cuba, 334.
 Judia comun, 306.
 — de careta, 307.
 — escarlata, 306.
 Judihuelo, 306.
 Jugo de Acacia, 313.
 Jujano de Cuba, 408.
 Juliana comun, 200.
 — falsa, 216.
 Julpai de la India, 233.
 Juncia avellanada, 759.
 — olorosa, 758.
 — redonda, 758.
 Junco comun, 730.
 — de cobra en el Brasil, 758.
 — de esteras, 730.
 — de Méjico, 376.
 — florido, 728.
 — oloroso de la Arabia, 774.
 Junquillo amarillo, 705.
 Junquillo de Méjico, 376.
 — de noche, 700.
 Jupicanga del Brasil, 712.
 Júpiter, 343.
 Jurema del Brasil, 313.
 Juripeba del Brasil, 515.
 Jusbarba, 713.
 Juvia del Orinoco, 356.
 Kakaterro de Nueva-Zelanda, 672.
 Keule de Chile, 588.
 Kibei de Cuba, 440.
 Kikapas de la India, 186.
 Kilunglung de Java, 182.
 Kino americano, 583.
 — austral, 351.
 — de Africa, 310.
 — de Jamáica, 583.
 — de Nueva-Holanda, 351.
 — de Senegambia, 310.
 — verdadero de la India, 402.
 Kodoya Bikh de la India, 176.
 Kokra de la India, 626.
 Labiernago blanco, 473.
 — obscuro, 473.
 — prieto, 474.
 Labrusca, 263.
 Lactang de Filipinas, 189.
 Lactucario, 436, 437.
 Ladierna, 473.
 Lagetta de las Antillas, 597.
 Lágrimas de Job, 764.
 — de Moisés, 764.
 — de Pino de Oriente, 668.
 — de Salomon, 712.
 — de San Pedro, blancas, 720.
 — de San Pedro, coloradas, 338.
 Lagundi de la playa en Filipinas, 540.
 Lalo del Senegal, 225.
 Lamparilla, 657.

- Lampazo de Castilla, 434.
 — del Guadaira, 192.
 — de Méjico, 192.
 Lampote de Méjico, 424.
 Lanceta del Brasil, 420.
 Landan de Filipinas, 739.
 Landy del Brasil, 245.
 Lanotan de Filipinas, 185.
 Lantim del Brasil, 245.
 Lantochil, 783.
 Laparasa, 434.
 Laranjeiro do mato en el Brasil, 272.
 Lárgalo, 411.
 Larice americano, 669.
 — europeo, 669.
 Laser, 389, 390.
 Laston, 766, 768.
 Lata de Cumaná, 767.
 Latazi de Popayan, 614.
 Laton, 768.
 Laupe del Perú, 244.
 Laurel alejandrino comun, 713.
 — alejandrino de hoja estrecha, 713.
 — cáustico de Chile, 289.
 — comun, 590.
 — del alcanfor de la China, 588.
 — de Chile, 625.
 — de Cuabal en Cuba, 185.
 — de Indias, 588.
 — de nieve, 474.
 — de Nueva-Granada, 590.
 — del Perú, 507.
 — del Senegal, 256.
 — de Venezuela, 589.
 — Real, 325.
 — Tulipan comun, 182.
 — Tulipan de Méjico, 182.
 Laureola de algunos, 713.
 — hembra, 596.
 — macho, 597.
 Lauro Real, 325.
 — Tulipan comun, 182.
 Lavapratos del Brasil, 319.
 Lavendula hembra de Jarava, 546.
 — macho de Jarava, 546.
 Leche de coco, 743.
 — de gallina, 720.
 — de pájaro, 720.
 Lechecino, 437.
 Lechera amarga, 212.
 — de Cuba, 614, 616.
 Lechero de Cumaná, 614.
 Lechetrez del Brasil, 613.
 Lechetrezná arbórea, 613.
 — comun, 613.
 — encarnada, 615.
 — macho, 615.
 Lechias de Filipinas, 256.
 Lechoso de Cuba, 408.
 Lechuga arrepollada, 436.
 — cimarrona de Cuba, 750.
 — espinaca, 436.
 — espinosa, 437.
 — flamenca, 436.
 — larga, 436.
 — ponzoñosa, 437.
 — repollada, 436.
 — repolluda, 436.
 — rizada, 436.
 — romana, 436.
 — silvestre espinosa, 437.
 — venenosa, 437.
 Lechugon, 436.
 Lechuguilla de Cuba, 750.
 — de Méjico, 420.
 — silvestre, 437.
 Leitariga del Brasil, 613.
 Leiteira del Brasil, 613.
 Lengua de buey, hongo, 806.
 — de buey medicinal, 509.
 — de buey salvaje, 509.
 — de ciervo, 781.

- Lengua de gato en Nueva-Granada, 478.
 — de oveja en Andalucía, 303.
 — de oveja en Canarias, 288.
 — de pájaro, 581.
 — de perro en Europa, 510.
 — de perro en Filipinas, 613.
 — de serpiente, 783.
 — de vaca en Cuba, 466.
 — de vaca en Europa, 539, 583.
 — de vaca en Nueva-Granada, 244.
 — de vaca en el Perú, 369, 583.
 Lenguamora de Méjico, 289.
 Lenguaza, 509.
 Lenteja comun, 305.
 — de agua, 681.
 — de Aragon, 305.
 Lentilha d'agoa en el Brasil, 750.
 Lentisco de Europa, 288.
 — del Perú, 290.
 Leña blanca de Canarias, 292.
 — buena de Canarias, 292.
 — noel de Canarias, 504.
 — santa de Canarias, 292.
 Leño Aloes, 285, 615.
 — Aloes de Cochinchina, 320.
 — Aloes de Filipinas, 615.
 — Aspalato de Berberia, 297.
 — blanco de las Antillas, 494.
 — colubrino, 406, 478, 488.
 — colubrino de Timor, 488.
 — de plomo de los Estados-Unidos, 596.
 — fierro de Etiopía, 466.
 — hediondo, 296.
 — nefritico de la India, 315.
 Levistico, 388.
 Licopodio, 788.
 Liebrecilla, 432.
 Liga de Europa, 397.
 — del Perú, 397.
 Ligasan de Filipinas, 337.
 Lignaloe, 285.
 Ligtu de Chile, 705.
 Ligústico, 388.
 Lila comun, 473.
 — de las Antillas, 259.
 — de Persia, 473.
 Lima, 240.
 Limalima de Filipinas, 393.
 Limero, 240.
 Limon agrio, 240.
 — cimarron de Nueva-Granada, 625.
 — de Ceuta, 241.
 — dulce, 240.
 — sutil de Filipinas, 241.
 — sutil de Filipinas, 241.
 — sutil de Filipinas, 241.
 Limoncillo de China, 239.
 — de Lima, 241.
 — de Méjico, 300.
 — de Nueva-Granada, 625.
 Limoncito de Batavia, 239.
 — de Cachos en Nueva-Granada, 615.
 — de Cuba, 239.
 Limonero, 240.
 Limpia-Tunas de Méjico, 420.
 Limpion del Perú, 222, 223.
 Lingua de fiu en el Brasil, 283.
 — de tucano en el Brasil, 385.
 Lino de Nueva-Zelanda, 719.
 — montesino de Jarava, 525.
 — purgante, 218.
 — usual, 218.
 Liquen de embudo, 797.
 — de Islandia, 798.
 — de las tapias, 797.
 — estrellado, 794.
 — perruno, 798.
 Liquidambar comun, 656.

- Liquidambar de Méjico, 656.
 Lirio amarillo, 699.
 — azotado, 699.
 — azul, 699.
 — blanco de Cuba, 479.
 — blanco de Europa, 699.
 — bulboso comun, 699.
 — cárdeno, 699.
 — de Caracas, 704.
 — de Cuaresma, 699.
 — de Florencia, 699.
 — de Méjico, 686.
 — de monte en Cumaná, 479.
 — de Nueva-Granada, 704.
 — de Nueva-Zelanda, 719.
 — de Persia, 699.
 — de piel de tigre, 700.
 — de Siberia, 699.
 — de los valles, 712.
 — enano, 699.
 — enlutado, 700.
 — espadañal, 699.
 — fétido, 699.
 — franciscano, 700.
 — hediondo, 699.
 — hermoso de Venezuela, 704.
 — pálido, 699.
 — silvestre de Cuba, 479.
 — turco, 700.
 Lisimaquia amarilla, 459.
 — roja, 342, 459.
 Lithi de Chile, 278, 289.
 Litho del Perú, 374.
 Litre de Chile, 278, 289.
 Liun de Chile, 380.
 Liutu de Chile, 705.
 Lividivi de Curaçao, 316.
 Locoloco de Filipinas, 545.
 Lodoñero, 469.
 Lodoño, 654.
 Loiqui-labuen de Chile, 391.
 Lombarda, 201.
 Longam de la India, 256.
 Lope del Perú, 326.
 Loro, 325.
 Loto egipcio, 192.
 — mitico de los egipcios é indios, 192.
 Luchan de Filipinas, 240.
 Lucetro del Brasil, 613.
 Lucuma de Chile, 331, 466.
 — de Coquimbo, 465.
 — de monte en el Perú, 255, 463.
 — del Perú, 465.
 Luma de Chile, 353.
 Lumban de Filipinas, 617.
 Lumboi de Filipinas, 354.
 Lun de Chile, 380.
 Lunaria comun, 199.
 — menor, 783.
 Lunas de Filipinas, 622.
 Lupio, 630.
 Lúpulo, 630.
 Lutu-yuyu de Nueva-Granada, 572.
 Llagas de Cristo, 266.
 — de San Francisco, 266.
 Llamapañauí del Perú, 308.
 Llanta, 201.
 Llanten alesnado, 559.
 — blanquecino, 558, 559.
 — de agua, 679.
 — de hojas anchas, 558.
 — de hojas estrechas, 558.
 — de perro, 559.
 — mayor, 558.
 — menor, 558.
 Llaupanke de Chile, 455.
 Llava de las Antillas, 314.
 Llave del año, 751.
 Llerenes de Cuba, 693.
 Lloqui del Perú, 284.
 Lloron de Cuba, 407.
 — de Europa, 657.

- Lluvia de oro, 297.
 Maboá de Cuba, 479.
 Mabolo de Filipinas, 469.
 Macabuhai de Filipinas, 188.
 Macae del Perú, 413.
 Macauba del Brasil, 742.
 Macetilla, 216.
 Machi del Perú, 380.
 Machichi del Brasil, 359.
 Machin-parrani del Perú, 595.
 Macis, 592.
 Macoya de la Guayana, 742.
 Macpalxochi de Méjico, 228.
 Macpalxochiquahuitl de Hernandez, 226.
 Macqui de Chile, 238.
 Macucú de la Guayana, 279.
 Macupa de Filipinas, 355.
 Macurige de Cuba, 256.
 Madamas de Cuba, 267.
 Madi de Chile, 426.
 Madivileum de Chile, 426.
 Madreselva comun, 399.
 — de color de grana, 400.
 Madrona, 530.
 Madroñera, 450.
 Madroño comun, 450.
 — de Canarias, 450.
 — de Levante, 450.
 — de Méjico, 450.
 — de Nueva-Granada, 246.
 — del Perú, 380.
 Maestrante del Brasil, 538.
 Maga paqui del Rio-Magdalena, 550.
 Magarza comun, 427.
 — de Canarias, 427.
 Magarzueta, 426, 427.
 Maglia de Chile, 514.
 Magnolia de los jardines, 182.
 Magthun de Chile, 278.
 Magú de Chile, 773.
 Magney de Cocuy en Caracas, 720.
 — de Cocuy en Cuba, 706.
 — de Cocuiza en Cumaná, 706.
 — de Méjico, 705.
 — divino, 706.
 Maguillo, 330.
 Mahra del Perú, 708.
 Mahaujo de Cumaná, 232.
 Mahonesa, 200.
 Maicillo del Perú, 764.
 Maiz cocido, 763.
 — comun, 763.
 — de agua en América, 193.
 — de Guinea, 765, 774.
 — de monte en el Perú, 607.
 — duro del Perú, 763.
 — en leche, 763.
 — fresco, 763.
 — negro, 766.
 — tierno, 763.
 — tostado, 763.
 Maizurrye de Afghanistan, 741.
 Majagua de Cuba, 221.
 — macho de Cuba, 231.
 Majagüilla de Cuba, 220.
 Majugna de Cuba, 302.
 Majuito de Cuba, 527.
 Malabatro de la India, 588.
 Malacara, 557.
 Malagueta de Africa, 691.
 — de Cuba, 186.
 — de los negros, 185.
 — de varios, 354.
 Malamujer de Cumaná, 618.
 — de Méjico, 262.
 Malanga de Cuba, 752.
 — de Guinea, 751, 752.
 Malcasada de Cuba, 614.
 Maleiteira del Brasil, 613.
 Malla del Perú, 266.

- Maluco de Filipinas, 507.
 Maluñgai de Filipinas, 315.
 Malva arbórea, 220.
 — blanca de Cuba, 230.
 — camoesa, 265.
 — cimarrona de Cuba, 220.
 — común de Cuba, 229.
 — común de Europa, 219.
 — crespa, 220.
 — de las Antillas, 220.
 — del Brasil, 222.
 — del Cabo, 222.
 — de flor chica, 219.
 — de hoja redonda, 219.
 — de olor, 265.
 — de Veracruz, 223.
 — limon, 265.
 — loca, 220.
 — Real común, 220.
 — Real con hojas de Higuera, 220.
 — Real de Sevilla, 221.
 — rizada, 220.
 — rosa común, 264.
 — rosa de Cuba, 221.
 — Té de Cuba, 231.
 Malvaisco del Brasil, 220.
 Malvalisco del Brasil, 220.
 Malvaisco arbóreo de algunos, 221.
 — común, 220.
 — de Méjico, 220.
 — salvaje, 219.
 — verdadero, 220.
 Malvilla, 219.
 Mamangá del Brasil, 319.
 Mamaó del Brasil, 363, 365.
 Mambú de la India, 770.
 Mamey colorado de Cuba, 465.
 — de las Antillas, 245.
 — de Filipinas, 465.
 — de Méjico, 465.
 Mamon de Caracas, 257.
 Mamon de Cuba, 184.
 — de mico en Nueva-Granada, 257.
 Mamona, 619.
 Mamoncillo de Cuba, 257.
 Maná cedrino, 670.
 — de Brianzon, 669.
 — de Calabria, 473.
 — de Oriente, 304.
 — de Persia, 304.
 — laricino, 669.
 Manaca del Brasil, 524, 736.
 Manacun del Brasil, 524.
 Mancapaquí del Perú, 525.
 Mandalusa de Filipinas, 535.
 Mandiiva del Brasil, 618.
 Mandioca de las Antillas, 618.
 Mandovi del Brasil, 314.
 Mandul del Perú, 236.
 Manecillas, 806.
 Manga brava de Ceilan, 478.
 — de la India, 287.
 — venenosa de Ceilan, 478.
 Mangaba brava del Brasil, 477.
 — del Brasil, 477.
 Mangaraz del Brasil, 752.
 Mangarito del Brasil, 752.
 Mangerona do campo en el Brasil, 548.
 Mangla del olivo, 804.
 Mangle amarelo del Brasil, 337.
 — blanco de Cuba, 541.
 — blanco de Chile, 541.
 — blanco de Nueva-Granada, 261.
 — branco del Brasil, 335.
 — colorado de Cuba, 337.
 — de algunos, 335.
 — de la Luisiana, 301.
 — negro de algunos, 337.
 — prieto de Cuba, 334.
 — prieto de Cumaná, 541.

- Mangle rojo de la India, 337.
 — verdadeiro del Brasil, 337.
 — vermelho del Brasil, 337.
 Mangliet de Java, 182.
 Manglillo del Perú, 461.
 Mangó de la India, 287.
 Mangostan de la India, 245.
 Mangrove del Brasil, 335.
 Mangue amarelo del Brasil, 541.
 — branco del Brasil, 541.
 Mangueira del Brasil, 287.
 Mani del Brasil, 246.
 — del Orinoco, 314.
 Maniba del Brasil, 618.
 Manigue de Chile, 672.
 Manioc de las Antillas, 619.
 Manirote de la Guayana, 184.
 Maniu de Chile, 672.
 Manli del Brasil, 314.
 Manoti del Brasil, 314.
 Manovi del Brasil, 314.
 Manteca de Galaam, 743.
 — de Corozo, 743.
 Mantina de los árabes, 428.
 Manto de Santa Maria, 751.
 — de la Virgen en Méjico, 502.
 — Real, 177.
 Manungal de Filipinas, 274.
 Manzanero de la cumbre en Canarias, 331.
 Manzanilla comun, 426.
 — del campo europea, 426.
 — del campo de Valparaíso, 425.
 — fina, 427.
 — hedionda, 426, 427.
 — loca, 426, 427.
 — morada, 431.
 — Real, 429.
 — romana, 426.
 — yesquera, 421.
 Manzanillo de Caracas, 288.
 Manzanillo de Cuba, 616.
 Manzano comun, 330.
 — de ramo, 331.
 — silvestre de Europa, 330.
 — silvestre de Quito, 330.
 Mapato del Perú, 213.
 Marañon de Cuba, 287.
 Marañuelo de Canarias, 503.
 Mararo del Orinoco, 291.
 Maravilla del Brasil, 577.
 — del campo en Chile, 424.
 — del campo en Europa, 431.
 — de Indias, 502, 577.
 — de Jalapa, 577.
 — de jardin, 431.
 — de noche, 577.
 — de Nueva-Granada, 534.
 — de patos, 192.
 — de Quito, 700.
 — de río, 192.
 — morada de Cuba, 491.
 Maray-maray de Cumaná, 310.
 Marco del Perú, 423.
 Mardoño del Perú, 380.
 Marfil vegetal del Perú, 745.
 Margarita blanca, 719.
 — comun, 420.
 — de Otoño, 703.
 — mayor, 427.
 — olorosa, 719.
 Margosa de la India, 259.
 Mari del Brasil, 314.
 Maria de Nueva-Granada, 245.
 — preta del Brasil, 315, 418.
 Mariguana de Méjico, 630.
 Mari Lopez de Cuba, 367.
 Mariangana de Canarias, 327.
 Marianinha del Brasil, 733.
 Marinheiro del Brasil, 260.
 — de folha larga en el Brasil, 260.
 — de folha miuda en el Brasil, 259.

- Mariricó del Brasil, 698.
 Marisma, 568.
 Marjoletto, 329.
 Marmaleiro do mato en el Brasil, 283.
 Marmeleiro do campo en el Brasil, 615.
 Marmelos de Bengala, 240.
 Marmita de mono en Cayena, 356.
 Marmoxaia de Canarias, 567.
 Maro de algunos, 549. —
 — de Sevilla, 549.
 — verdadero, 553.
 Marojo, 397.
 Maron de Java, 242.
 Marquiaas de Surinam, 363.
 Marroguines de Aragon, 569.
 Marrubio bastardo, 552.
 — blanco, 551.
 — negro, 552.
 Martagon comun, 718.
 — de Virginia, 718.
 Martinica, 318, 319.
 Marubá del Brasil, 274.
 Maruguito de Caracas, 297.
 Maruru de América, 192.
 Masca del Perú, 213.
 Massaquila de Cumaná, 654.
 Massasa de Egipto, 572.
 Mastranto, 547.
 Mastranzo comun, 547.
 — de sábana en Caracas, 546.
 — nevado, 547.
 Mastuerzo acuático, 198.
 — de Indias, 266.
 — hortense, 200.
 — mayor amargo, 199.
 — mayor silvestre, 201.
 — menor silvestre, 201.
 — pratense, 199.
 — verrugoso, 200.
 Masua de Chile, 266.
 Mata, 288, 569, 570.
 Mata de la seda, 484.
 — pinchosa, 570.
 — virgen del Perú, 311.
 Matabuey, 387.
 Matacaballos, 440.
 Matacan agudo, 484.
 — de la India, 488.
 Matacandil, 200.
 Matacandiles, 720.
 Matacanna del Brasil, 527.
 Matagallegos, 433.
 Matagallo, 552.
 Matagusanos del Perú, 425.
 Matalobos de flor amarilla, 177.
 — de flor azul, 177.
 — de flor compuesta, 430.
 Matalahuga, 386.
 Matapalo de Mompo, 634.
 — de Quito, 397.
 Matapasto del Brasil, 319.
 Mataperros de la India, 488.
 Matapez de Colombia, 302.
 — de Méjico, 302.
 Matapiojos, 177.
 Matapollo, 597.
 Matapulgas, 399.
 Matára del Perú, 421.
 Matarubia, 648.
 Matasarna del Perú, 302.
 Matavirgen del Perú, 311.
 Mate de algunos, 306.
 — de Méjico, 495.
 Matecllu del Perú, 384.
 Matico de Huanuco, 642.
 — de Quito, 419.
 Matilla, 569, 570.
 Matlalitztic de Méjico, 733.
 Matojo, 570.
 Matulera, 552.
 Matricaria, 427.
 Matronal, 200.

Matzapotl de Méjico, 184.
 Matzatli de Méjico, 707.
 Maya, 420.
 Mayten de Chile, 278.
 Mayú de Chile, 296.
 Mayna del Perú, 266.
 Mayueta, 327.
 Mazamorra del Perú, 765. —
 Mazatetes de Méjico, 413.
 Mazuca, 699.
 Meados de burro, 704.
 — de zorra, 704.
 Meaperros, 567.
 Mecapatli de Méjico, 502.
 Mecatlancasis de Méjico, 502.
 Mecaxochitl de Méjico, 641.
 Mecereo, 596.
 Mechoacan de Méjico, 503. —
 Mejorana cultivada, 547.
 — silvestre, 548.
 Melera, 509.
 Meliloto azul, 298.
 — oficial, 298.
 Melindre de monja, 502.
 Melindres, 338.
 Melisa bastarda, 551.
 — comun, 548.
 — de Canarias, 550.
 Melloco de Quito, 369, 572.
 Melocotonero, 324.
 Melojo, 649.
 Melon de monte, 376.
 — escrito, 358.
 — moscatel, 358.
 Meloncillo de olor, 359.
 Melosa de Chile, 426.
 Membrillejo del Perú, 507. —
 Membrillero, 331.
 Membrillo común, 331.
 — de montaña en Nueva-Granada, 355.
 — falso, 330.
 Menjui, 471.

Menta romana, 547.
 Mentastro, 547.
 Mentironera, 399.
 Mentrasto del Brasil, 418.
 Meones, 704.
 Mercadela de Méjico, 431.
 Mercimarona de Méjico, 619.
 Mercurial de Europa, 616.
 — de Méjico, 426.
 Mercurio de campo en el Brasil, 248.
 — vegetal del Brasil, 524.
 Merey del Orinoco, 287. —
 Mermulana de la isla de Madera, 466.
 Mesto arbóreo, 648.
 — enano, 649.
 Metel de los árabes, 519.
 Metl de Méjico, 705.
 Meu, 388.
 Mexical de Méjico, 705.
 Mexixquilitl de Hernandez, 266.
 Mezcal de las Californias, 705.
 Mezquite de Méjico, 311, 312.
 Mezquitl de Méjico, 311, 312.
 Mezquiquez de algunos, 311.
 Michino de Nueva-Granada, 465.
 Miel cedrina, 670.
 Mielga, 298.
 Mierdacruz, 597.
 Miezgado, 327.
 Miichqui-panque del Perú, 692.
 Mija de la India, 507.
 Mijediega, 299.
 Mijo comun, 765.
 — del sol, agreste, 510.
 — del sol, cultivado, 510.
 — mayor, 765.
 — menor, 765, 766.
 — turquesco, 763.

- Milengrana, 371.
 Milenrama, 426.
 Milgranos, 371.
 Millaca, 774.
 Mimbrera, 657.
 Mimos, 550.
 Minutisa, 216.
 Miñoneta, 205.
 Mirabel, 569.
 Miraguama de Cuba, 741.
 Mirame y no me toques del Perú, 311.
 Miramelindos, 267.
 Mirasol común, 424.
 — de Cumaná, 423.
 Mirla, 372.
 Mirobalanós beléricos, 335.
 — cetrinos, 335.
 — de América, 598.
 — del Brasil, 290.
 — emblicos, 621.
 — indicos, 335.
 — negros, 335.
 — québulos, 335.
 Mirra, 291.
 Mirto común, 353.
 — de Brabante, 660.
 Mishmee Teeta de la India, 176.
 Mithos del Perú, 365.
 Mithrio de Chile, 397.
 Miu del Perú, 521.
 Mocan de Canarias, 236.
 Moco de pavo en España, 574.
 — de pavo en Méjico, 573.
 Mocundo de Cartagena de América, 224.
 Mohintli de Méjico, 534.
 Moho, 805.
 Mohomoho del Perú, 642.
 Mohuitl de Méjico, 399, 535.
 Moietle de Méjico, 534.
 Moira—quynha del Brasil, 589.
 Mojardón, 808.
 Mojera, 331.
 Mokal de la India, 444.
 Molave sagat de Filipinas, 540.
 Molavin de Filipinas, 540.
 Moldávica, 550.
 Molinera de Canarias, 503.
 Molle del Perú, 290.
 Mollocantoo del Perú, 339.
 Mollocantu del Perú, 339.
 Molono del Perú, 281.
 Mombin de las Antillas, 290.
 Monacillo de Méjico, 221.
 Mongo de la India, 307.
 Moniato de Cuba, 502.
 Montelucuma del Perú, 255.
 Mootha de la India, 759.
 Mora común, 632.
 — colorada de Cuba, 633.
 — colorada de Quito, 633.
 Moradilla de Europa, 513.
 — del Perú, 549.
 Moradillo de Santa Lucía en Canarias, 514.
 Moral común, 632.
 — de Cuba, 633.
 — de la China, 633.
 — de la India, 444.
 — rojo, 633.
 — silvestre del Paraguay, 633.
 Mordisco del diablo, 414.
 Morera común, 632.
 — de Filipinas, 632.
 — de papel, 633.
 Moringa de la India, 315.
 Morita del Perú, 355.
 Morivivi de Cuba, 311.
 Mororo del Brasil, 320.
 — sipó del Brasil, 320.
 Morro de lobo, 526.
 Morsana blanca, 269.
 — común, 269.
 Mortas de Carrátraca, 434.

Moruro de costa en Cuba, 314.
 — de Cuba, 314.
 Moscatela, 393.
 Moscatelina, 393.
 Moscón, 251.
 Moserñon, 808.
 Mosqueta amarilla, 326.
 — blanca 329.
 — común, 329.
 — del Perú, 620.
 — silvestre, 329.
 Mostaco de hoja recortada, 331.
 Mostajo, 331.
 Mostaza blanca, 201.
 — china, 201.
 — negra, 201.
 Mostellar, 331.
 Motamba del Brasil, 229.
 Mote del Perú, 763.
 Moytle de Méjico, 535.
 Mudar de la India, 483.
 Muelas, 305.
 Muérdago de Europa, 397.
 — de Méjico, 397.
 Muermara, 173.
 Muicle de Méjico, 535.
 Muitle de Méjico, 535.
 Mularia, 781.
 Mulli del Perú, 290.
 Mullucasa del Perú, 405.
 Mundillos, 399.
 Muñeco del Río Magdalena, 508.
 Murages, 459.
 Murapa de Nueva-Granada, 746.
 Murecí del Brasil, 250.
 Murichi del Orinoco, 739.
 Murte de Cuba, 538.
 Murtilla de Chile, 353.
 Murtiñera, 353.
 Murucuja del Brasil, 363.

Murucuja do estralo en el Brasil, 363.
 — suspiro del Brasil, 363.
 Murucuya de las Antillas, 363.
 Muruchu del Perú, 763.
 Murúgula, 806.
 Murumuru del Brasil, 742.
 Muscadeira del Brasil, 592.
 Muschina del Brasil, 409.
 Musgo arbóreo, 799.
 — capiláceo, 791.
 — de Córcega, 815.
 — del cráneo humano, 799.
 — derecho, 788.
 Mustaco común, 331.
 — de hoja recortada, 331.
 Musti del Perú, 763.
 Mutamba del Brasil, 229.
 Naba, 201.
 Nabicol, 201.
 Nabilla, 201.
 Nabillo redondo silvestre, 442.
 Nabina, 201.
 Nabo colorado de Jarava, 567.
 — común, 201.
 — de Filipinas, 673.
 — gallego, 201.
 — gordo, 201.
 — redondo, 201.
 Naga de Filipinas, 310.
 Nalcas del Perú y Chile, 394.
 Nananchi de Méjico, 250.
 Nanchi de Méjico, 250.
 Nandiroba del Brasil, 261.
 Nangca de Filipinas, 637.
 Naranjita de Quito, 514.
 Naranjo agridulce, 240.
 — agrio, 240.
 — cagel, 240.
 — chino, 240.
 — con hoja de Mirtó, 240.
 — dulce, 240.
 — de Malta, 240.

- Naranjo de sangre, 240.
 — moreiro de Cuba, 240.
 — Real, 240.
 — tangerino, 240.
 Narciso color de sangre, 704.
 — de lechuguilla, 704.
 — de manojo, 704.
 — de mar, 704.
 — de otoño, 703.
 — de los prados, 704.
 — oloroso, 704.
 Nardo céltico, 412.
 — coronado, 704.
 — indico, 412, 774.
 — montano, 412.
 Nariz cortada, 277.
 Narra de Filipinas, 310.
 Nato de Filipinas, 228.
 Natre de Chile, 515.
 Nauta de Canarias, 548.
 Navanche de Yucatan, 590.
 Nazarenos de Andalucía, 534.
 — de la Guayana, 320.
 Nebeda, 548.
 Neba de Chile, 595.
 Negrillo, 653.
 Negro humo, 667.
 Negrura del olivo, 804.
 Neguilla, 177.
 Nenguillon común, 217.
 — cultivado, 217.
 Negundo hembra de la India, 540.
 — macho de la India, 540.
 Nenufar amarillo, 192.
 — blanco, 192.
 — de América, 192.
 Neou del Senegal, 324.
 Nepi del Orinoco, 753.
 Nequen de la isla de Santo Domingo, 705.
 Neta de Canarias, 550.
 Nevada, 548.
 Nevadilla, 371.
 Nha del Brasil, 356.
 Nhandi del Brasil, 642.
 Nhandu del Brasil, 642.
 Nia del Brasil, 356.
 Niambi del Brasil, 642.
 Niaragato de las Antillas, 273.
 Nicaraguas, 267.
 Nicua de Nueva-Andalucía, 503.
 Nido de ave, 688.
 — de pájaro, 688.
 Niebla de las cereales, 804.
 Niepa de la India, 274.
 Nimbo de la India, 259.
 Ninfa amarilla, 192.
 — blanca, 192.
 — común, 192.
 — de Méjico, 492.
 Nino de Filipinas, 406.
 Ninsi de la China, 386.
 Niopo del Orinoco, 314.
 Niormo de Nueva-Granada, 320.
 Nipa de Filipinas, 745.
 — de la India, 745.
 Niscallo, 808.
 Nispero común, 330.
 — del Japon, 330.
 — de Nicaragua, 466.
 — del Perú, 466.
 Nito de Filipinas, 783.
 Nitongputi de Filipinas, 783.
 Niungue de Caracas, 519.
 Nixtamaxochitl de Méjico, 494.
 Nocheznopalli de Hernandez, 377.
 Nochizo, 647.
 Noctli de Méjico, 377.
 Noel chagil de Canarias, 504.
 Nogal común, 645.
 — de Cuba, 645.

Nogal de la India en Cuba, 617.
 — del Japon, 672.
 — negro, 645.
 Noguera, 645.
 Nogueruela, 613.
 Noiglo, 201.
 No me dejes, 479.
 No me olvides, 479.
 Nopal comun, 377.
 — cultivado en Méjico, 377.
 — de Castilla en Méjico, 377.
 — de la cochinilla, 377.
 — de las huertas y jardines de Méjico, 377.
 — silvestre, 377.
 Nopalera, 377.
 Nopalillo de algunos en Méjico, 377.
 — de Méjico, 377.
 Nopalnocheztli de Hernandez, 377.
 Nopalxochicuezaltic de Hernandez, 376, 377.
 Norchila de la India, 540.
 Notijo de Caracas, 242.
 Noz moscada del Brasil, 588, 592.
 Nuctli de Méjico, 377.
 Nuez aclavillada de Madagascar, 588.
 — comun, 645.
 — de agua, 340.
 — de Areca de Filipinas, 737.
 — de Malabar, 228.
 — de Ravensara, 588.
 — de Sudan, 228.
 — moscada de Filipinas, 592.
 — moscada de las Molucas, 592.
 — vómica, 488.
 Nueza blanca, 359.
 — negra, 710.
 Nungue de gato de las Antillas, 273.

Naju del Perú, 221.
 Name de algunos, 502.
 — de Canarias, 751.
 — de Cochinchina, 709.
 — de la China, 709.
 — de Egipto, 751.
 — de Guinea, 709.
 — del Japon, 709.
 Nancunlahuen de Chile, 218.
 Norbo hediondo del Perú, 363.
 Nuñunga del Perú, 516.
 Nupehucrí del Perú, 405.
 Oacaju del Brasil, 287.
 Oajuru del Brasil, 324.
 Oanani del Brasil, 246.
 Oanassu del Brasil, 743.
 Oassacu del Brasil, 615.
 Oca de Chile, 268.
 Ocoloxochitl de Méjico, 700.
 Ocote de Méjico, 668.
 Ocozotl de Méjico, 656.
 Oessa del Perú, 766.
 Oessapurga del Perú, 698.
 Octil de Méjico, 705.
 Ocuje de Cuba, 245.
 Ojaranzo comun, 647.
 — de Alcalá de los Gazules, 451.
 — de Algeciras, 451.
 Ojo boyal, 422.
 — de borrico en Cuba, 308.
 — de buey en Cuba, 308.
 — de buey en Europa, 427.
 — de Cristo, 720.
 — de perdiz, 175.
 — de perro en el Perú, 369.
 — de raton en el Perú, 563.
 Olibano, 291.
 Oliva de Filipinas, 675.
 Olivarda, 422.
 Olivardilla, 422.
 Olivilla blanca, 553.

- Olivilla comun, 292.
 — de Chile, 622.
 Olivillo, 292, 473.
 Olivo bastardo de las Antillas, 541.
 — comun, 473.
 — de Cumaná, 204.
 Olla de mono en Cumaná, 356.
 Ollato de Nueva-Barcelona, 356.
 Olluco de Quito, 572.
 Olmedilla, 647.
 Olmo comun, 653.
 — de América, 653.
 Olozotl de Méjico, 656.
 Ombligo de Venus en Europa, 372.
 — de Venus en Méjico, 384.
 Ombliguera, 510.
 Omizochitl de Méjico, 719.
 Onocochenini del Orinoco, 275.
 Onoquiles, 510.
 Ontina, 429.
 Opoponaco, 388.
 Oraciones de Filipinas, 577.
 Orcaneta amarilla, 509.
 Orchilla de Canarias, 798.
 — de tierra, 798.
 Ordiate, 773.
 Orégano cabruno, 548.
 — cimarron de Cuba, 546.
 — comun, 547.
 — de Creta, 547.
 — de Filipinas, 545.
 — de Méjico, 538.
 — de Tehuacan, 538.
 — francés de Cuba, 550.
 Oreja de abad en el Perú, 384.
 — de fraile, 603.
 — de hombre, 603.
 — de Judas, 806.
 — de liebre, 387, 510.
 Oreja de monje, 372.
 — de oso, 459.
 — de perro en el Perú, 369.
 — de raton, 218, 437, 510.
 Orelha de gato en el Brasil, 242.
 — de onça en el Brasil, 188.
 — de rato en el Brasil, 527.
 Oreoselino, 389.
 Organo de Chile, 376.
 Orgibaô del Brasil, 538.
 Orijama de Canarias, 292.
 Orillas de arroyo en Cuba, 275.
 Ornaballo, 483.
 Oropesa, 549.
 Orobol de muchos, 518.
 — de Salvador, 518.
 Orozuz comun, 300.
 — de Cuba, 538.
 — del Perú, 319.
 — falso, 303.
 Ortela del Brasil, 546.
 — do mato en el Brasil, 545.
 Ortiga brava del Perú, 366.
 — de pelotillas, 628.
 — encarnada del Perú, 366.
 — hedionda, 551.
 — mayor, 628.
 — menor, 628.
 — moheña, 628.
 — muerta amarilla, 552.
 — muerta blanca, 551.
 — muerta hedionda, 551.
 — muerta purpúrea, 551.
 — romana, 628.
 Oruga comun, 202.
 — marítima, 200.
 — palustre, 198.
 — salvaje, 201.
 — silvestre, 202.
 Orval, 518.
 Orzaga, 568.

- Orzita de pellejo en el Perú, 517.
 Osagra, 568.
 Ossapurga del Perú, 698.
 Otiba de Nueva-Granada, 592.
 Otoba de Nueva-Granada, 592.
 Ova de río, 816.
 Ovejera de Canarias, 559.
 Oyamel de Méjico, 669.
 Pacae del Perú, 311.
 Pacana blanca de América, 646.
 — de las Antillas, 645.
 Pacay del Perú, 311.
 Pachá velluda de Nueva-Barcelona, 774.
 Pachaca de Cumaná, 204.
 Pachana de Cumaná, 204.
 — de la India, 188.
 Pachatacyá del Perú, 421.
 Paclas del Perú, 339.
 Pacova del Brasil, 186, 692.
 — del Paraguay, 696.
 Pacory del Brasil, 245.
 Pacoyuyu cimarron del Perú, 426.
 — fino del Perú, 425, 426.
 Pacurero de Cumaná, 466.
 — de Nueva-Andalucía, 578.
 Padrastro, 547.
 Padre é hijos, 429.
 Paguhin de Chile, 527.
 Paico de Chile, 567.
 Paiquillo de Chile, 568.
 Paja de camello de la Arabia, 774.
 — de Meca, 774.
 — del Potosí, 766.
 — purgante del Perú, 698.
 Pajarillas, 177.
 Pajarita, 525.
 Pajaritos amarillos, 266.
 — de Cumaná 397.
 Pájaro bobo del Perú, 422.
 Pajitos, 427.
 Pajo de Filipinas, 288.
 Pajomarioba del Brasil, 318.
 Pajon del Perú, 766.
 Pajui de Cumaná, 467.
 Pala de la India, 480.
 Palacalay de Filipinas, 246.
 Palacpalac de Filipinas, 467.
 Palaglar minjak de Java, 234.
 Palalan de Filipinas, 739.
 Palame de la Florida, 590.
 Palancapatli de Méjico, 420.
 — de la Puebla de Méjico, 420.
 Palillo del Perú, 352.
 Palisandra, 301.
 Paliuro, 280.
 Pallares de Chile, 306.
 Palma Almendron del Choco, 743.
 — Bache de la Guayana, 739.
 — barrigona de Cuba, 744.
 — brava de Filipinas, 741.
 — común, 741.
 — Corozo del Orinoco, 742.
 — Christi, 619, 687.
 — de cobija en Caracas, 741.
 — de cocos de la India, 743.
 — de cüesco en Nueva-Granada, 743.
 — d'iglesia en la India portuguesa, 675.
 — del marfil en el Perú, 744.
 — de sombrero en Caracas, 741.
 — de vino en Nueva-Granada, 743.
 — dulce de Méjico, 741.
 — dulce de Nueva-Granada, 743.
 — enana, 741.
 — espinosa de las Antillas, 742.

- Palma Iraiba del Brasil, 744.
 — Irase de Caripe, 742.
 — Jijiri del Orinoco, 742.
 — Jissara del Brasil, 736.
 — Jicara del Brasil, 736.
 — Murichi del Orinoco, 739.
 — Oacury del Brasil, 743.
 — Quiteve del Brasil, 739.
 — Real de Cuba, 737.
 — Real de Nueva-Granada, 743.
 — redonda, 741.
 — Sancona en Cartagena de América, 737.
 — Soyale de Méjico, 741.
 Palmero común, 741.
 — de la Tebaida, 740.
 Palmiche de Cuba, 737.
 Palmillo de Méjico, 741.
 Palmira de la India, 740.
 Palmito amargo del Perú, 742.
 — común, 741.
 — de los Andes, 737.
 — del Brasil, 736.
 — de Cuba, 737.
 — de Europa, 741.
 — de Nueva-Andalucía, 736.
 — del Perú, 421.
 — de Tierra-Firme, 741.
 Palo amargo de Cuba, 287.
 — amarillo de Méjico, 194.
 — amarillo del Perú, 190.
 — blanco de Chile, 435.
 — blanco de Cuba, 274.
 — blanco de Popayan, 539.
 — Brasil, 316.
 — Brasil de Jamaica, 316.
 — Brasil de Nueva-Granada, 316.
 — Brasilete de la India, 316.
 — bronco de Cuba, 249.
 — Cachumba de Cuba, 394.
 — Campeche de Cuba, 316.
 Palo Campeche verdadero, 317.
 — cochino de las Antillas, 292.
 — colorado del Perú, 405.
 — coto de América, 815.
 — 816.
 — de aceite de la isla de Francia, 248.
 — de aceite en el Perú, 244.
 — del águila en Malaca, 285.
 — de balsa en el Perú, 226.
 — de Bañon, 281.
 — de belas en Panamá, 495.
 — del Brasil en las Antillas, 316.
 — de Brasilete en Caracas, 310.
 — del Brasil, encarnado, 316.
 — de caja en Cuba, 256, 301.
 — de chanco en las Antillas, 224.
 — de cruz en Cumaná, 315.
 — de Fernambuco, 316.
 — de hierro en la isla de Borbon, 257.
 — de hierro de la Martinica, 407.
 — de las Indias, 270.
 — de leche en Cuba, 616.
 — de Melambo en Nueva-Granada, 181.
 — de las Molucas, 620.
 — de requesón en Popayan, 403.
 — de rosa de las Antillas, 507.
 — de rosa del Brasil, 309, 292.
 — de rosa de las Canarias, 504.
 — de rosa de la Guayana, 589.

Palo de rosa de la Jamaica, 292.
 — de Santa María, 316.
 — de seca en las Antillas, 314.
 — de vaca en Caracas, 636.
 — de Yaicuaje en Cuba, 257.
 — dulce de Europa, 300.
 — dulce de Méjico, 321.
 — fierro de la India, 245.
 — lloron de Cuba, 407.
 — María de Filipinas, 245.
 — María de Nueva Granada, 584.
 — Mato de Chile, 435.
 — Mesto de Asso, 281.
 — moro de Cuba, 408.
 — mulato de Méjico, 431.
 — sano de Cumaná, 269.
 — santo de América, 270.
 — santo de Filipinas, 293.
 — santo del Perú, 584.
 — Sapan de la India, 316.
 — Sasafras americano, 590.
 Palómera, 509.
 Palomilla comun, 195.
 — de tintes, 510.
 Palomina de Canarias, 509.
 Palqui de Chile, 521.
 Palquin de Chile, 527.
 Palsahinquin de Filipinas, 291.
 Palta del Perú, 588.
 Palto del Perú, 588.
 Palugapig de Filipinas, 228.
 Pameclater de Filipinas, 244.
 Pamitlatin de Filipinas, 244.
 Pampelmusa de la India, 240.
 Pamplina comun, 194.
 — de agua, 459.
 — de canarios, 217.
 Pan de cafre, 675.
 — de mono, 225.
 — de puerco, 459.

Pan de tierra caliente en Méjico, 619.
 — de Yuca en las Antillas, 619.
 — y agua de Cumaná, 204.
 Panacoco de Cayena, 310.
 Paneololote de Méjico, 485.
 Pandacaqui de Filipinas, 479.
 Pandan de Filipinas, 746.
 Pangí de Andalucía, 601.
 — de Puerto-Rico, 287.
 Pangue del Perú y Chile, 394.
 Panipez, 653.
 Paniquesillo, 199.
 Panizo comun, 765, 766.
 — de Daimiel, 766.
 — de las Indias, 763.
 — negro, 766, 774.
 Panke del Perú y Chile, 394.
 Panvaliva de Filipinas, 578.
 Paño de Holanda, 615.
 Pao Brasil, 316.
 — d'alho en el Brasil, 203, 563.
 — d'arco en el Brasil, 494.
 — de cobra de la India, 488.
 — de Filipinas, 288.
 — de formiga en el Brasil, 507.
 — de lacre en el Brasil, 242.
 — de rosa del Brasil, 343.
 — de sabaó en el Brasil, 256.
 — de xiringa en el Brasil, 617.
 — cravo del Brasil, 589.
 — forquilha del Brasil, 478.
 — pereiro del Brasil, 289, 478.
 — precioso del Brasil, 588.
 — rozado del Brasil, 316.
 — santo del Brasil, 237.
 — Sassafrás del Brasil, 589.
 — siringa del Brasil, 617.

- Papa comun, 513.
 — de Lomas en el Perú, 513.
 — de monte, 513.
 — del Perú, 513.
 — montana del Perú, 513.
 — purgante del Perú, 502.
 — silvestre de Chile, 514.
 Papagayo comun, 574.
 — del Brasil, 752.
 Papamoseas, 216.
 Papaya de Cuba, 365.
 Papayo de Cuba, 365.
 Papelero de la China, 633.
 Papelillo del Perú, 502.
 Papilla del Perú, 502.
 Papiro de Egipto, 759.
 Papiro del Perú, 502.
 Papó de Perú en el Brasil, 603.
 — de la Reina en Cuba, 306.
 Paragis de Filipinas, 765.
 Paraguata del Orinoco, 405.
 Paraiba del Brasil, 274.
 Paraíso de Andalucía, 259.
 — de Castilla, 601.
 Para-para de Cumaná, 255.
 Parasol de la China, 228.
 Paratudo del Brasil, 246, 595.
 Parchita de Cumaná, 363.
 Pareira brava del Brasil, 188.
 — brava de Cuba, 188.
 — brava de la Guayana, 189.
 Parietaria, 629.
 Pariparoba del Brasil, 642.
 Paripón de la Guayana, 742.
 Parqui de algunos, 521.
 — de Chile, 521.
 Parra bravia, 263.
 — cimarrona de Cuba, 263.
 — de Chipre, 263.
 — del Orinoco, 263.
 — virgen, 263.
 Parriza americana, 263.
 Parriza europea, 263.
 Parunapin de Filipinas, 228.
 Parxi de Méjico, 521.
 Pascueta, 420.
 Pasionaria azul, 363.
 — vejigosa de Cuba, 363.
 Pasitis de Filipinas, 517.
 Pasote, 567.
 Pastle de Méjico, 707.
 Pata de Canarias, 374.
 — de leon en Europa, 328.
 — de leon en Méjico, 265.
 — de mulo, 420.
 Pataca, 424.
 Patata comun, 513.
 — de caña, 424.
 — de Lomas en el Perú, 513.
 — de Málaga, 502.
 — del Perú, 513.
 — de Telinga, 751.
 Patagua de Chile, 233.
 Patahua de Chile, 233.
 Patani de Filipinas, 307.
 Patchuli de la India, 545, 546.
 Patilla en Cartagena de América, 358.
 — de Canarias, 374.
 Patita de burro, 699.
 Patlahuac de Méjico, 508.
 Patubo de Filipinas, 675.
 Pavame de la Florida, 590.
 Pavana de la India, 620.
 Pavate de la India, 408.
 Pavia, 324.
 Payama de Nueva-Granada, 452.
 Payanquit de Filipinas, 485.
 Pé de becérro en el Brasil, 752.
 — de perdiz en el Brasil, 619.
 Pebete de Méjico, 577.
 Pebetera de Caracas, 418.
 Pebrero, 808.

- Pechiche del Perú, 540.
 Pegajosa del Perú, 578.
 Pegamoscas, 216.
 Pegatpat de Filipinas, 352.
 Pehuen de Chile, 670.
 Peine de bruja, 264.
 — de pastor, 391.
 — de Venus en Europa, 391.
 — de Venus en Chile, 391.
 Peladillo, 324.
 Pelicanos, 177.
 Peligalo de Nueva-Granada, 534.
 Pelitre, 426.
 Pellin de Chile, 650.
 Pelon de Méjico, 266.
 Pelonquahuil de Méjico, 290.
 Pelosilla, 437.
 Pelota marina, 682.
 Penca de Chile, 361.
 Pendejera cimarrona de Cuba, 515.
 — de Cuba, 515.
 — espinosa de Cuba, 515.
 Peonia arbórea, 178.
 — de Cuba, 306.
 — medicinal, 178.
 Pepinata de Caracas, 360.
 Pepinillo de San Gregorio, 361.
 Pepino comun, 358.
 — culebra, 360.
 — del diablo, 360.
 — de lagarto, 360.
 — del Perú, 514.
 Pensamientos, 209.
 Pensies, 209.
 Peral comun, 330.
 — de la Martinica, 494.
 Peralejo de Cuba, 250.
 Perdiguera, 208.
 Perebecenue de Haití, 520.
 Peregrina de Cuba, 221, 617.
 Peregrina de Lima, 705.
 Pereiorá del Brasil, 588.
 Perejil comun, 385.
 — de Macedonia, 386, 388.
 — de Macedonia para Barnades, 386.
 — de mar, 388.
 — de monte, 389.
 — de perro, 387.
 — de la Reina, 374.
 Perfoliada, 387.
 Perichargua de Cumaná, 320.
 Perifollo, 391.
 Periná del Brasil, 692.
 Perillas de Méjico, 408.
 Perlitas de Méjico, 408.
 Perpétuas amarillas, 429.
 — blancas, 575.
 — del Brasil, 575.
 — de monte, 429.
 — de Virginia, 429.
 — encarnadas, 575.
 — moradas, 575.
 — silvestres, 429.
 Pérsico, 324.
 Pérsigo, 324.
 Peruétano, 330.
 Petacones del Perú, 384.
 Peten del Chaco, 520.
 Peti del Chaco, 520.
 Peumo rojo de Chile, 588.
 Pevetera de Caracas, 418.
 Pez amarilla, 667.
 — blanca, 667, 669.
 — de Borgoña, 667, 669.
 — griega, 667.
 — naval, 667.
 — negra, 667.
 — resina, 667.
 Phu verdadero, 412.
 Piadera, 473.
 Piami de la Guayana, 319.
 Piamich del Perú, 660.

- Picagallina, 217.
 Picahonha del Brasil, 409. —
 Picahuai del Perú, 595. —
 Picaó de praya en el Brasil, 423.
 Picapica del Perú, 308. —
 Picea comun, 669. —
 — de algunos, 667.
 Pichana del Perú, 222, 223.
 Pichi de Chile, 521. —
 Pichoa de Chile, 613. —
 Pichuquita del Perú, 548.
 Picietl de Méjico, 520. —
 Picna del Perú, 278. —
 Pickna del Perú, 222.
 Pico de cigüeña, 264.
 — de gallo en Cuba, 319.
 — de gorrión, 581.
 — de grulla, 264.
 Pié de ánade, 568.
 — de cabra en Acapulco, 320.
 — de Cristo, 327.
 — de gallina en Cuba, 768.
 — de gallo en Cuba, 768.
 — de ganso, 568.
 — de gato, 429.
 — de león, 328.
 — de liebre, 299, 559.
 — de lobo, 547.
 — de paloma en Europa, 264.
 — de paloma en Nueva-Granada, 232.
 Pierno, 399.
 Pietra fungaia, 807.
 Pigna del Perú, 278.
 Pignoli del Brasil, 589.
 Pigonil de Quito, 769.
 Pihiguoá del Brasil, 742.
 Pilpilboquil de América, 187.
 Pimenta Comari en el Brasil, 359.
 — Malaguetta del Brasil, 517.
 Pimentaô comprido del Brasil, 516.
 — de galiuha en el Brasil, 515.
 Pimenteira del Brasil, 640.
 Pimentero de América, 290.
 — de Etiopia, 185.
 Pimentinha del Brasil, 517.
 Pimienta blanca de la India, 640.
 — de agua, 581.
 — de Cuba, 354.
 — de Egipto, 641.
 — de Etiopia, 185.
 — de Jamáica, 354.
 — del Japon, 272.
 — de los negros, 185.
 — de Tabasco, 353, 354.
 — larga de la India, 641.
 — Malaguetta, 354.
 — mejicana, 354.
 — negra de la India, 640.
 Pimientillo, 540.
 Pimiento atomatado dulce, 516.
 — bravo del Perú, 517.
 — caribe del Perú, 517.
 — comun dulce, 516.
 — comun picante, 516.
 — de Mozambique, 517.
 — dulce atomatado, 516.
 — falso, 290.
 — grueso del Perú, 517.
 — largo dulce, 516.
 — largo picante, 516.
 — morado de Quito, 517.
 — tomate, 516.
 Pimpinela mayor, 328.
 — menor, 328.
 Pinabete, 668.
 Pincho, 570.
 Pindaiba dal Brasil, 186.
 Pindicua de Méjico, 450.

- Pindova del Brasil, 743.
 Pinga de perro en Cuba, 204.
 Pingüica de Méjico, 450.
 Pinha del Brasil, 184, 618.
 Pinhaò Paraguay del Brasil, 618.
 Pinheiro branco del Brasil, 670.
 — de purga en el Brasil, 618.
 — vermelho del Brasil, 670.
 Pinhoen del Brasil, 618.
 Pinillo almizclado, 553.
 — hembra de Jarava, 552.
 — oloroso, 553.
 Pinito de Cádiz, 569.
 — de flor, 200.
 Pino acipresado de Chile, 664.
 — albar de algunos, 666.
 — albar de muchos, 667.
 — araucano, 670.
 — Balsain, 666.
 — bermejo, 666.
 — blanco de España, 666, 667.
 — blanco de Méjico, 668.
 — carraseo de algunos, 666, 667.
 — carrasqueño, 667.
 — clusiano, 667.
 — comun, 666.
 — cortezudo, 666.
 — de Alepo, 667.
 — de Canarias, 668.
 — de Chile, 670.
 — de comer, 667.
 — de Córcega, 667.
 — de Cuba, 668.
 — de Flandes en Andalucía, 667.
 — de Labrador, 668.
 — de Levante, 668.
 — de piñones, 667.
 — de Riga, 666.
 Pino de Segura, 667.
 — de la tierra, 667.
 — de Virginia, 668.
 — doncel, 667.
 — gallego, 667.
 — hispánico, 667.
 — manso, 667.
 — marítimo, 667.
 — mollar, 667.
 — nazaron, 667.
 — negral de algunos, 666, 667.
 — negro, 667.
 — piñonero, 667.
 — Real de Europa, 667.
 — Real de Méjico, 668.
 — rodeno, 667.
 — rojal, 666.
 — salgareño, 667.
 — sargareño, 667.
 — uñal, 667.
 Pinoli del Brasil, 589.
 Pinsapo, 669.
 Pinsoles, 305.
 Piña de América, 707.
 — de raton en Cuba, 406.
 Piñol de Cumaná, 618.
 Piñon botija de Cuba, 618.
 — de Cuba, 309.
 — del Paraguay, 618.
 — espinoso de las Antillas, 309.
 — francés de Cuba, 309.
 Piñoncillo comun, 615.
 — de Méjico, 618.
 Piñones de las Molucas, 620.
 — purgantes de Méjico, 618.
 Piñuela de Jarava, 372.
 Piorno, 297.
 Piperisa, 201.
 Pipi del Brasil, 563.
 Pipilboquil de América, 187.
 Pipiloxihuitl de Méjico, 521.

- Pipirigallo comun, 304.
 — de España, 304.
 Piquí del Brasil, 253.
 Piquiá del Brasil, 253.
 Piracanta, 330.
 Piramidal, 442.
 Piranga del Brasil, 493.
 Pireun de Chile, 563.
 Piriguaia del Brasil, 210.
 Pirijao del Brasil, 742.
 Pisa de Filipinas, 292.
 Pisate de Méjico, 567.
 Píscol colorado de Quito, 376.
 — verde de Quito, 376.
 Pispura de Popayan, 300.
 Pissando del Brasil, 744.
 Pistacho comun, 288.
 — de tierra, 314.
 Pita acuática, 678.
 — comun, 705.
 Pitahaya de Cartagena de América, 376.
 — del Chimborazo, 376.
 Pitajoní de Cuba, 406.
 — hembra de Cuba, 406.
 Pitangueira del Brasil, 355.
 — do mato en el Brasil, 355.
 Pitano, 202.
 Pitazabila, 719.
 Pitos, 305.
 Pitoya de la Guayana, 402.
 Pittomba del Brasil, 256.
 Piuva del Brasil, 494.
 Placaminero de Virginia, 469.
 Planta de los Azarotes de Africa, 595.
 — hedionda de Méjico, 521.
 Plantaina de hojas anchas, 558.
 — de hojas estrechas, 558.
 — mayor, 558.
 — menor, 558.
 Plantano, 696.
 Platago, 331.
 Platanaria, 748.
 Platanero, 696.
 Platanillo de Cuba, 318, 694.
 Plátano camburi de Méjico, 696.
 — chino, 696.
 — de América, 696.
 — de monte en el Perú, 185.
 — de Occidente, 638.
 — de Oriente, 638.
 — de Virginia, 638.
 — dominico, 696.
 — falso, 251.
 — grueso, 696.
 — guineo, 696.
 — harton de Méjico, 696.
 — hembra, 696.
 — hembrita, 696.
 — largo, 696.
 — manchado, 696.
 — mayor, 696.
 — menor, 696.
 — pequeño, 696.
 — rojo de la China, 696.
 — rosado, 696.
 — tenduque de Filipinas, 696.
 Plateado, 327.
 Pluma de Santa Teresa, 376.
 — Quiona de Quito, 766.
 Plumero amarillo, 420.
 — azul, 509.
 Poas de las Filipinas, 292.
 Poaya branca del Brasil, 210.
 — de botica en el Brasil, 409.
 — do campo en el Brasil, 212, 409, 410.
 — de hasta comprida en el Brasil, 409.
 — da praya en el Brasil, 210, 409, 410.
 — do rio en el Brasil, 410.
 — preta del Brasil, 409.
 — verdadeira del Brasil, 409.

Pochepoche del Perú, 173.

Pochote de Méjico, 225.

Pochotl de Méjico, 225.

Pochotle de Méjico, 225.

Podagra de Lino, 504.

Poejo del Brasil, 547.

Poguy de Chile, 513.

Pohón upas de las Molucas,
636.

Poleo comun, 547.

— de Quito, 547.

— montano, 552.

Poligala comun, 212.

— de Virginia, 212.

Polillera, 525.

Polipodio comun, 780.

— de las Antillas, 780.

— de Méjico, 780.

Politrigo, 791.

Pollo, 569.

Polluelo, 569.

Polvillo de la uva, 804.

Pomarosa de Cuba, 355.

Ponaci de Cuba, 406.

Ponopinito de Cumaná, 612.

Pony de las Antillas, 494.

Poquell de Chile, 425.

Poquill de Chile, 425.

Porotillos de Chile, 521.

Potoc de Filipinas, 757.

Praga de Nueva-Andalucía,

736.

Presera, 411.

Primavera comun, 458.

— glutinosa, 459.

Pringamoza de Cuba, 616.

— de Nueva-Granada, 629.

— del Rio Magdalena, 629.

Prisco, 324.

Puaia del Brasil, 408.

Puchepuche del Perú, 173.

Pucheri del Brasil, 589.

Pucherillos, 442.

Pucheritos, 442.

Puchicango de Nueva-Granada, 767.

Puchury del Brasil, 589.

Puchury-miri del Brasil, 589.

Puechato sumacmisqui del Perú, 448.

Puchuccacha del Perú, 268.

Puerro agreste, 221.

— comun, 721.

— de viña, 721.

— salvage, 721.

Puerto-Rico de América, 746.

Pullipuntu del Perú, 744.

Pulmonaria arbórea, 798.

— medicinal, 510.

Pulque de Méjico, 705.

Pulsatila comun, 174.

— negruzca, 174.

Pumachilca del Perú, 380.

Pumacuchu del Perú, 213.

Pumbo de Quito, 548.

Pumos de Méjico, 741.

Puncela, 216.

Puncheri del Brasil, 589.

Puntupuntu del Perú, 780.

Purataruru de Taiti, 204.

Purga do Caboculo en el Brasil, 360.

— do campo en el Brasil, 481.

— do gentio en el Brasil, 360,

617.

— de Joao Paes en el Brasil,

360, 527.

— de Méjico, 503.

— do pastor en el Brasil, 481.

— dos Paulistas en el Brasil,

617.

— macho de Méjico, 503.

Purhampuy del Perú, 713.

Purupuru de Quito, 364.

Purutu del Perú, 306.

Pusopuso de Filipinas, 590.

- Pussea del Perú, 535.
 Puthey de Chile, 520.
 Puya de Chile, 708.
 Quaautzontetl de Méjico, 568.
 Quamochitl de Hernández, 311.
 Quarango del Perú, 402.
 Quasi de Méjico, 274.
 Quauhayohuachtili II de Hernández, 318.
 Quauhchilli de Méjico, 517.
 Quauhchitle de Méjico, 397.
 Quauhmecatl de Méjico, 255.
 Quauhtecomatl de Méjico, 496.
 Quauhxilotl de Méjico, 496.
 Quauhtzapotl de Méjico, 184.
 Quaautzontetl de Méjico, 568.
 Quebracho de Cuba, 319.
 Quebrantapiedras, 371.
 Queimadeira del Brasil, 618.
 Quejigo-Arce, 251.
 — común, 649.
 Quelguen de Chile, 327.
 Quelite de cocina en Méjico, 567.
 Quereme de cali en Nueva-Granada, 448.
 Queule de Chile, 588.
 Quiapo de Filipinas, 750.
 Quibal de Filipinas, 307.
 Quiebrahacha de Cuba, 319.
 Quigombo del Brasil, 221.
 — de cheiro en el Brasil, 221.
 Quijones, 391.
 Quila de Chile, 714.
 Quilites de Filipinas y de América, 574.
 Quillai de Chile, 326.
 Quimbombo de Cuba, 221.
 Quina amarilla de Loja, 402.
 — amarilla de Mutis, 403.
 Quina amarilla de Zea, 403.
 — amarilla Real, 403.
 — anaranjada, 403.
 — anaranjada de Santa Fé, 403.
 — anaranjada de Mutis, 402, 403.
 — aromática de la Florida, 620.
 — Atecamez de la Guayana, 402.
 — bicolorada de la Guayana, 402.
 — blanca, 403.
 — blanca de Méjico, 620.
 — boba amarilla, 403.
 — calisaya, 403.
 — calisaya arrollada del comercio, 403.
 — calisaya arrollada de Lima, 403.
 — cana, 402.
 — caribea, 404.
 — Cartagena amarilla, 402.
 — collisaya, 403.
 — colorada de la Guayana, 402.
 — cuspa del Orinoco, 273.
 — del Brasil, 272, 273, 281, 515.
 — de Cayena, 274.
 — de Camamú, 481.
 — do campo en el Brasil, 273, 404, 488.
 — de Cuba, 283.
 — de Cujaba en el Brasil, 403.
 — de Diego de Sousa en el Brasil, 404.
 — de Don Diego en el Brasil, 404.
 — de Huanuco, 403.
 — de la Jamaica, 404.
 — de Loja, 402.
 — de Loja delgada, 403.
 — de Loja delgadilla, 403.

Quina de Loja hembra, 403.
 — de Manda en el Brasil, 488.
 — de la Martinica, 404.
 — do mato en el Brasil, 404, 488, 521.
 — de Pernambuco en el Brasil, 402.
 — del Perú, 403.
 — de Piahtuy en el Brasil, 404.
 — de plancha, 403.
 — de planchuela, 403.
 — de Remijo en el Brasil, 404.
 — do Rio de Janeiro, 404.
 — de Santa Lucía, 404.
 — da serra en el Brasil, 404.
 — da terra en el Brasil, 521.
 — de Virginia, 182.
 — delgada, 403.
 — delgadilla, 403.
 — fina, 403.
 — fina americana, 403.
 — fina delgada, 403.
 — fina de Loja amarilla, 402.
 — fina de Loja gris, 402.
 — fina de Loja parda, 402.
 — fina de Loja verdadera, 402.
 — gris, 402.
 — gris fina de Lima, 403.
 — gris pálida, 403.
 — gruesa 403.
 — nueva de Jamáica, 406.
 — parda, 402.
 — Piton de las Antillas, 404.
 — Pitoya de la Guayana, 402.
 — roja de Mutis, 403.
 — surinamense, 404.
 — Tecamez de la Guayana, 402.
 — Tunita, 402.
 — verdadera de Lima, 403.

Quinchamaly de Chile, 599.
 Quinctral de Chile, 397.
 Quino de Virginia, 182.
 — oficial de Linneo syst. veg., 403.
 — oficial de Linneo sp. pl., 402.
 — oficial de Ruiz, 403.
 Quinoa de Chile, 568.
 — de perro en el Perú, 567.
 — de la tierra en Quito, 568.
 Quinoquino del Perú, 296.
 Quintral de Chile, 397.
 Quinua de Chile, 568.
 Quinual del Perú, 328.
 Quinuar del Perú, 328.
 Quirihuela, 451.
 Quirivela, 208.
 Quirueta, 208.
 Quisco de Chile, 376.
 Quisoar del Perú, 527.
 Quisnal del Perú, 328.
 Quisuar del Perú, 527.
 Quitameriendas, 727.
 Quitasolillo de Cuba, 384.
 — partido de Cuba, 384.
 Quitatinta, 268.
 Quiteve del Brasil, 739.
 Quitlacoetli de Méjico, 591.
 Quitoco del Brasil, 422.
 Rabaniza blanca, 202.
 — comun, 202.
 Rábano acuático, 198.
 — comun, 202.
 — marítimo, 200.
 — rusticano, 199.
 — silvestre, 202.
 — vagisco, 199.
 Rabiacana, 751.
 Rabillo, 770.
 Raho de alacran en Cumaná, 508.
 — de zorra en Cuba, 765.

- Rabo de zorra en Europa, 774.
 Racimillo, 372.
 Raguayes del Perú y Chile, 394.
 Raicilla del Brasil, 409.
 Raigon del Canadá, 315.
 Raiz de Cassumunar de Asia, 691.
 — de Cedoaria de Asia, 691.
 — de frade en el Brasil, 408.
 — de Galanga mayor de la India, 692.
 — de Guiné en el Brasil, 563.
 — del indio en Méjico, 603, 604.
 — de Jacare-arú del Brasil, 491.
 — de Juan Lopez, 187.
 — de lagarto en el Brasil, 618.
 — del manso en Méjico, 424.
 — de mora en Filipinas, 774.
 — del moro, 422.
 — do padre Salerma en el Brasil, 575.
 — de resfriado en Nueva-Granada, 635.
 — de Teiú en el Brasil, 618.
 — de Tibú del Brasil, 618.
 — de Tiuh del Brasil, 618.
 — para los dientes en el Perú, 213.
 — preta del Brasil, 408.
 Rama, 432.
 Rambutan de la India, 256.
 Ramilletes de Constantinopla, 217.
 Ramo de Pascua, 615.
 Ramon de Cuba, 637.
 Ramram del Perú, 652.
 Ram-tilla de la India, 423.
 Ramturi de la India, 221.
 Ranúnculo de los jardines, 176.
 Raponce, 442.
 Raponchigo, 442.
 Rapóntico exótico, 581.
 — vulgar, 584.
 Raquel, 704.
 Rascabarriga de Cuba, 540.
 Rascamoño, 423.
 Raspalengua de Cuba, 283.
 Raspasaya de Canarias, 436.
 Raspilla, 510.
 Ratanhia de las Antillas, 213.
 — del Perú, 213.
 — da terra en el Brasil, 213.
 Ratonera de Canarias, 629.
 Rebollo, 649.
 Regaliz de los Alpes, 299.
 — de las Antillas, 306.
 — de Cuba, 538.
 — de Europa, 300.
 — de los Pirineos, 299.
 Regaliza, 300.
 Reina del bosque, 376.
 — de las flores, 376.
 — de los prados, 326.
 — Margarita, 420.
 Reinita de Méjico, 431.
 Rejalgar de algunos, 751.
 — de Jarava, 175.
 Remedio de los pobres en la India, 424.
 — do vaqueiro en el Brasil, 545.
 Remolacha, 567.
 Repollo, 201.
 Reseda, 205.
 Resedan, 205.
 Resina acaroides del Bahía botánica, 723.
 — amarilla, 667.
 — amarilla de Nueva-Bélgica, 723.
 — Anime, 291.
 — Cachibú de las Antillas, 291.

- Resina Cedria, 670.
 — Chibú de las Antillas, 291.
 — Chicle ó Chitli, 466.
 — Copal, 289, 291.
 — Cowdi de Nueva-Zelanda, 670.
 — Damnara de las Molucas, 670.
 — dulce de las Californias, 668.
 — Elemi de las Antillas, 292.
 — Elemi occidental, 291.
 — hembra de la isla de Juan Fernandez, 431.
 — Hog de la Jamaica, 244, 289.
 — Manajú de Cuba, 245.
 — Mara de la Guayana, 291.
 — Tezcalama de Méjico, 635.
 — Vare de Nueva-Zelanda, 670.
 Retama blanca de Castilla, 599.
 — de escobas, 297.
 — de flor, 297.
 — de montaña en Cumaná, 504.
 — de olor, 297.
 — macho, 297.
 Retamilla de Chile, 218.
 Retamon, 297.
 Revienta caballos de Cuba, 440.
 Reyán de Méjico, 355.
 Rima de Filipinas, 637.
 Rimú de Chile, 268.
 Riñon de Cumaná, 185.
 Roble amarillo de Cuba, 508, 539.
 — blanco de Cuba, 494.
 — comun, 649.
 — de algunos, 649.
 — de Bahía botánica, 595.
 — de bellotas dulces, 650.
 Roble de Chile, 650.
 — de Chiloe, 243.
 — de duelas en Méjico, 650.
 — de la Guayana, 495.
 — de Guayaquil, 495.
 — enano, 649.
 — guayo de Cuba, 508, 539.
 — negro de Cuba, 508.
 Rocambola, 721.
 Rocío del monte Libano, 670.
 — del sol, 211.
 Roccoto del Perú, 517.
 Rocotito de monte en el Perú, 514.
 Rocot uchu del Perú, 517.
 Rodela, 399.
 Roldon, 276.
 Romaza comun, 584.
 Romaneeta de Nueva-Andalucía, 538.
 Romerillo blanco de Cuba, 424.
 — cimarron de Cuba, 418.
 — de Chile, 421.
 — de Cuba, 426.
 — de Méjico, 550, 570.
 — de Quito, 242.
 Romerito de Méjico, 550, 570.
 Romero comun, 550.
 — de la tierra en Chile, 421.
 — de Chile, 549.
 — especie de Jara, 208.
 — marino de Canarias, 421.
 Romperopa de la isla de Santo Domingo, 507.
 Rompesacos, 773.
 Rompesaraguei de Cuba, 418.
 Ron, 773.
 Roqueta comun, 202.
 — de hortaliza, 199.
 — marítima, 200.
 — palustre, 198.
 — salvage, 201.
 Rosa albardera, 178.

- Rosa de amor, 192.
 — de Berberia en Caracas, 315.
 — de la China, 221.
 — del cielo, 217.
 — de Jericó del Egipto, 200.
 — de Gueldres, 399.
 — del monte en Cumaná, 315.
 — de Navidad, 176.
 — de rejalgar, 178.
 — del río en Cuba, 343.
 — de Santa Clara, 178.
 — de Siria, 221.
 — de Venus, 192.
 — macho de Caracas, 315.
 — pálida, 329.
 — rubia, 329.
 Rosal amarillo comun, 329.
 — amarillo muy doble, 329.
 — blanco, 329.
 — castellano, 329.
 — de Alejandria, 329.
 — de Bengala, 329.
 — de cien hojas, 329.
 — de Damasco, 329.
 — de enredadera, 329.
 — de Jericó, 329.
 — de pitimini, 329.
 — de rosas pálidas, 329.
 — de rosas rubias, 329.
 — fino de olor, 329.
 — lunario, 329.
 — perruno, 329.
 — romano, 329.
 Rosadelfa, 339, 451.
 Rosadelfilla, 339.
 Rosamaria de Méjico, 630.
 Rosariera, 259.
 Rosea para as mulas en el Brasil, 224.
 Roseta morada, 194.
 Rosilla de Méjico, 732, 733.
 Rovellon, 808.
 Roya, 804.
 Rozado del Brasil, 316.
 Rubia, 410.
 Rubilla, 410.
 Ruda cabruna de Europa, 301.
 — cabruna de Méjico, 300.
 — canina, 526.
 — cimarrona del Perú, 299.
 — de Bogotá, 425.
 — hortense, 271.
 — inglesa, 303.
 — montesina, 271.
 Ruibarbo bastardo, 584.
 — blanco, 580.
 — de Alejandria, 580.
 — do campo en el Brasil, 700.
 — de la China, 580.
 — del Himalaya, 580.
 — de la India, 580.
 — de Levante, 580.
 — de monges, 584.
 — de Moscovia, 580.
 — de Persia, 580.
 — de pobres, 174.
 — de Siberia, 581.
 — de Turquía, 580.
 — dinamarqués, 580.
 — holandés, 580.
 — imperial, 580.
 — rojo, 581.
 Ruiponce, 442.
 Ruipontico exótico, 581.
 — vulgar, 584.
 Ruldó, 276.
 Rurama del Perú, 278.
 Sabicú de Cuba, 313.
 Sabila, 719.
 Sabina albar, 663.
 — albarra, 663.
 — colorada de Virginia, 663.
 — morisca, 664.
 — oficial, 663.
 — rastrera, 663.

- Sabina Real, 663.
 — roma, 663.
 — suave, 663.
 — terrera, 663.
 Sabino de Oaxaca, 665.
 Sabucaja del Brasil, 356.
 Saboeja de Méjico, 727.
 Sabonera, 568.
 Sabugueiro del Brasil, 399.
 Sabutá del Brasil, 247.
 Sacasile de Méjico, 572.
 Sacatechichi de Méjico, 421.
 Sacharacacha, 392.
 Sach-hopra del Perú, 708.
 Saeta de agua, 679.
 Saga de Filipinas, 306.
 Sagapeno, 389.
 Sagopra del Perú, 708.
 Sagú de Bowen, 307.
 — de Cuba, 694.
 — de Portlandia, 751.
 — verdadero de la India, 675,
 739.
 Sahopra del Perú, 708.
 Saina, 774.
 Sajareña de Carratraca, 551.
 Saladilla, 568.
 Salado blanco, 568.
 — comun, 568, 570.
 — negro, 570.
 Salago de Filipinas, 597.
 Salce, 657.
 Salep, 687.
 Salgada, 568.
 Salicon de la Mancha, 570.
 Salicor borde, 570.
 — de la Mancha, 570.
 — duro, 569.
 — fino, 570.
 Sallacapo de Filipinas, 508.
 Salsa del Brasil, 583.
 — do mato en el Brasil, 714.
 — de praya en el Brasil, 503.
 Salsaparrilla de Chile, 714.
 Salsifi, 436.
 Salsilla de Lima, 705.
 Saltaojos, 175, 178.
 Salva del Brasil, 538.
 Salvadera de Cuba, 615.
 Salvage macho del Perú, 708.
 Salvagina del Perú, 707, 708.
 — macho del Perú, 708.
 Salvia cimarrona de Cuba,
 430.
 — de Bengala, 549.
 — del Brasil, 538.
 — de Creta, 549.
 — de Cuba, 424.
 — de Granada, 549.
 — de jardin, 549.
 — de Méjico, 538.
 — de Moncayo, 549.
 — de montaña, 551.
 — de playa en Cuba, 422.
 — de prado, 549.
 — de Tanger, 549.
 — fina, 549.
 — macho de Chile, 419.
 — poblana de Méjico, 538.
 — Real de Europa, 549.
 — Real de Méjico, 527.
 — Real del Perú, 549.
 Samambaya del Brasil, 782.
 Samatito de Méjico, 634.
 Sambac, 474.
 Sambaiba del Brasil, 179.
 Sambaibinha del Brasil, 179.
 Sambon de Filipinas, 421.
 Sanamunda de Jarava, 326.
 Sándalo bermejo de Filipinas,
 310.
 — blanco de la India, 600.
 — citrino de la India, 600.
 — colorado de Filipinas, 310.
 — de agua, 547.
 — de huerta, 546.

- Sándalo de las islas de Sandwich, 600.
 — de jardín, 546.
 — falso de Creta, 653.
 — rojo de Filipinas, 310.
 Sandaraca, 664.
 Sandia, 358.
 Sandia laguen del Perú, 537.
 Sangradera de Canarias, 575.
 Sangre de doncella en Cuba, 250.
 — de drago cartagenera, 310.
 — de drago de Filipinas, 310.
 — de drago de la India, 738.
 — de drago de Nueva-Granada, 620.
 — de Francia, 427.
 Sangüño, 395.
 Sangüeso, 327.
 Sanguinaria de Cuba, 574, 575.
 — mayor comun, 581.
 — mayor de Carratraca, 371.
 — menor, 371.
 Sanguino comun, 391.
 — de Andalucía, 281.
 — de Córdoba, 474.
 Sanguino, 281.
 Sanicula hembra, 385.
 — macho, 385.
 Sansao de Filipinas, 188.
 Santa María blanca, 427.
 — morada, 431.
 Santimonia, 427.
 Santol de Filipinas, 259.
 Santónico de Alepo, 429.
 — de Levante, 429.
 Santopalo del Perú, 584.
 Santor de Filipinas, 259.
 Santú del Perú, 763.
 Sao, 473.
 Sapang de Filipinas, 316.
 Sapanque de Quito, 615.
 Sapé del Brasil, 774.
 Saperá, 215.
 Sapillo, 569.
 Sapina, 569.
 Sapos, 526.
 Sapote amarillo de Méjico, 465.
 — borracho de Méjico, 465.
 — de las Antillas, 466.
 — de culebra en Cuba, 465.
 — del Perú, 224.
 — de Sevilla, 563.
 — grande de las Antillas, 465.
 — negro de Cuba, 469.
 — negro de Filipinas, 469.
 — negro de Méjico, 469.
 — pequeño de las Antillas, 466.
 — prieto de Méjico, 469.
 Sapotillo de las Antillas, 466.
 Sapucaya branca del Brasil, 356.
 Sapucaya del Brasil, 356.
 Sapatá del Brasil, 247.
 Saranguina de Nueva-Granada, 467.
 Saraqui de Nueva-Granada, 380.
 Saraquioa de Quito, 775.
 Sarbatana de Turbaco, 424.
 Sarcocola del Cabo de Buena-Esperanza, 595.
 Sardinera, 567.
 Sardonia, 175.
 Sarga, 657.
 Sargadilla, 569.
 Sargazo azucarado, 815.
 — comun, 816.
 — feculento, 815.
 Sarilla, 548.
 Sarna de perro en Cuba, 283.
 Sarro, 804.
 Sasa de Filipinas, 745.

Sasa sasa del Perú, 686.
 Sasafrafr americano, 590.
 — del Brasil, 589.
 — de Nueva-Holanda, 625.
 — del Orinoco, 589.
 — oriental, 590.
 Satirion manchado, 687.
 — oficial, 687.
 Sálce blanco, 657.
 — cabruno, 657.
 — colorado, 657.
 — de Levante, 657.
 Saucejo, 581.
 Sauco amarillo de Cuba, 494.
 — blanco, 398.
 — del Brasil, 399.
 — del Canadá, 399.
 — de Méjico, 399.
 — del Perú, 399.
 — de Tepeaca, 399.
 — rodol, 399.
 — rodely, 399.
 Saumerio de Quito, 620.
 Sauquillo, 399.
 Sauzgatillo comun, 540.
 — chino, 540.
 Savenata de Nueva-Granada, 300.
 Savintu del Perú, 352.
 Savoeja de Méjico, 727.
 Saxifraga blanca, 381.
 — dorada, 381.
 — roja, 326.
 Sayon, 568.
 Sayre del Perú, 521.
 Sayri del Perú, 520.
 Scorpi Spina de Hernandez, 385.
 Schuru del Perú, 569.
 Sebesten de las Antillas, 507.
 — de Egipto, 507.
 — de Forskal, 507.
 — de Linneo, 507.

Schipira del Brasil, 321.
 Sebupira del Brasil, 321.
 Sebuu uva del Brasil, 479.
 Seggay de Filipinas, 236.
 Seguidillas de Filipinas, 308.
 Segullada, 555.
 Seje del Orinoco, 743.
 Sello de Salomon, 712.
 Semillas del Obispo en Méjico, 296.
 Semiramis, 424.
 Sen de Alejandria, 317.
 — de Alepo, 317.
 — de Chile, 600.
 — de España, 317.
 — de los Estados-Unidos, 317.
 — de Italia, 317.
 — de Moka, 317.
 — de Palta, 317.
 — de Senegambia, 317.
 — de Tripoli, 317.
 Sencapuspu del Perú, 307.
 Sené do campo en el Brasil, 317.
 Sensitiva, 311.
 Serbal comun, 331.
 — de cazadores, 331.
 Sereiba-tinga del Brasil, 541.
 Seringueira del Brasil, 617.
 Serpentaria comun, 751.
 — de Virginia, 603.
 Serpol, 548.
 Serradella, 304.
 Servato, 389.
 Servencia, 555.
 Sesamo bastardo, 200.
 Seta campesina, 808.
 — de cardo comun, 808.
 — de cardo segun G. Ortega, 808.
 Sete sangrias del Brasil, 342.
 471.
 Sibucão de Filipinas, 316.

- Sicómoro de algunos, 251.
 — verdadero, 634.
 Sicopira del Brasil, 321.
 Siemprenjuta, 555.
 Siempreviva amarilla, 429.
 — arbórea, 373.
 — de Chile, 435.
 — de Huannuco, 642.
 — de Méjico, 374.
 — mayor, 373.
 — menor, 372.
 — picante, 372.
 Siete camisas de Chile, 380.
 — cortezas, 326.
 — en rama, 328.
 Silfio cirenáico, 389, 390.
 Simbí de la India, 307.
 Simira del Brasil, 408.
 Simonillo de Méjico, 421.
 Sindoc de Java, 587.
 Sinfito de Méjico, 328.
 — petreo, 459.
 Sintoc de la India, 587, 588.
 — de Java, 587.
 Sipo-cruz del Brasil, 408.
 — cururu del Brasil, 481.
 — d'algo en el Brasil, 563.
 — del Brasil, 210.
 — de caboclo en el Brasil, 179.
 — de carixó en el Brasil, 179.
 — de chumbo en el Brasil, 504.
 — de cobras en el Brasil, 188.
 — de escada del Brasil, 320.
 — de Imbé en el Brasil, 752.
 — de jarrinha en el Brasil, 603, 604.
 — de mil homens en el Brasil, 603, 604.
 Sisallo, 569, 570.
 Socconcha del Perú, 548, 549.
 Socconche fino del Perú, 548.
 Socoyoli de Méjico, 268.
 Sofia de los cirujanos, 200.
 Soga de árboles, 504.
 Sojon, 568.
 Sol de las Indias, 424.
 Solano furioso, 518.
 Solasi de Filipinas, 545.
 Soldadillo de Méjico, 484.
 Sombrerera, 419.
 Sombrerillo comun, 372.
 — de agua, 384.
 Sonaja de Canarias, 509.
 Sonting de Filipinas, 318.
 Sora del Perú, 763.
 Sorosora de Filipinas, 613.
 Sorveira del Brasil, 477.
 Sosa alacranera, 569.
 — azuleja, 570.
 — blanca de Alicante, 568, 570.
 — comun, 570.
 — de las salinas, 569.
 — fina de Andalucía, 569.
 — negra, 569.
 — parda, 569.
 — prima, 569.
 Soso de Méjico, 511.
 Soyale de Méjico, 741.
 Suan de Mompox, 634.
 Suaçuia del Brasil, 418.
 Suaye de Nueva-Granada, 774.
 Súca, 747.
 Suche del Perú, 479.
 Suche blanco-amarillo del Perú, 479.
 Sucopira del Brasil, 321.
 Sucuuba del Brasil, 479.
 Suegra y nuera de Aragon, 399.
 — de Sevilla, 209.
 Suelta blanca, 712.
 — consuelda de Europa, 509.
 — consuelda de Méjico, 328.
 Sulla, 304.
 Suluque de la India, 268.
 Sumá del Brasil, 210.
 Sumacmisqui del Perú, 448.
 Sumic-ichu de Quito, 766.
 Sururucuja del Brasil, 363.
 Suspiros de Filipinas, 577.

- Suçuaya del Brasil, 418.
 Suzon comun, 430.
 — Real, 430.
 Syalita de los portugueses asiáticos, 180.
 Tabaco cimarron de Cuba, 514, 520.
 — cimarron de Méjico, 520.
 — cimarron del Perú, 520.
 — comun, 520.
 — del diablo en Chile, 520.
 — de montaña, 430.
 — habano, 520.
 Tabaquera, 520.
 Tabaquero de Nueva-Andalucía, 515.
 Tabaquillo de Nueva-Granada, 582.
 Tabayba dulce de Canarias, 614.
 Tablero de damas, 718.
 Taca de la Oceanía, 752.
 Tacamaca comun, 658.
 — de Borbon, 245.
 — de Filipinas, 245.
 — de Madagascar, 245.
 — de Méjico, 272, 292.
 — de Nueva-Granada, 291.
 — de Venezuela, 319.
 Tacarontilla de Canarias, 751.
 Tache de Popayan, 296.
 Tachima de Quito, 431.
 Tacopatlle de Méjico, 604.
 Tacorangan de Filipinas, 221.
 Tacyamacho del Perú, 421.
 Tagarnina, 435.
 Tagbac de Filipinas, 692.
 Tagua de Nueva-Granada, 397.
 — del Perú, 744.
 Taguara del Paraguay, 770.
 Tajabussú del Brasil, 752.
 Talahiponai de Filipinas, 519.
 Talancao de Filipinas, 557.
 Talaya, 344.
 Talisai de Filipinas, 334.
 Taloto de Filipinas, 229.
 Tamalapatra de la India, 588.
 Tamarindo de América, 317.
 — de la India, 317.
 Tamariz, 344.
 Tambalisa de Filipinas, 296.
 Tamohilan de Filipinas, 692.
 Tamojo, 570.
 Tampui de la India, 257.
 Tanag de Filipinas, 229.
 Tangle, 815.
 Tanhoraò del Brasil, 752.
 Tanhorom del Brasil, 752.
 Tantan de Quito, 511.
 Tapacamino de Cuba, 418.
 Tapaculo del Orinoco, 288.
 Tapanera, 204.
 Tapate-puta del Perú, 311.
 Tapia del Brasil, 203.
 Tapioca de las Antillas, 619.
 Tapisote, 306.
 Tapogomo de la Guayana, 409.
 Taquipan de Filipinas, 738.
 Taquibuso de Filipinas, 384.
 Tara de la Oceanía, 752.
 — de Chile, 316.
 Taragontia comun, 751.
 — de Canarias, 751.
 Taragontina, 751.
 Taraje, 344.
 Tarantan de Cumaná, 319.
 Tarasca de los negros en Méjico, 564.
 Taray de Europa, 344.
 — de Méjico, 321.
 Tareroqui del Brasil, 319.
 Tarilla d'agoa de los indios portugueses, 655.
 Tármica, 426.
 Taro de la Oceanía, 752.
 Tárrago, 549.
 Tarrico, 570.
 Tarro de Nueva-Zelanda, 752.
 Tártago comun, 615.
 — de Valencia, 615.
 Tartara de Cumaná, 618.

- Taruca-micuna del Perú, 488.
 Taruma del Brasil, 540.
 Tascalpachon de Méjico, 763.
 Tassta del Perú, 380.
 Tataiba del Paraguay, 633.
 Tatayiba del Paraguay, 633.
 Tatzingueni de Méjico, 686.
 Tauri del Perú, 309.
 Tauta del Perú, 763.
 Taya del Brasil, 752.
 — de la Oceania, 752.
 Tayará del Brasil, 752.
 Tayaz del Brasil, 752.
 Tayoba de Santo Tomé en el Brasil, 752.
 Tayoiá del Brasil, 359.
 Tayomtayom de Filipinas, 485.
 Tayoyá grande del Brasil, 359.
 — de Pimenta Comari en el Brasil, 359.
 Tayuyá del Brasil, 359.
 — de Quiabo en el Brasil, 360.
 Té de América, 527.
 — de las Antillas, 527.
 — de Aragón, 422.
 — de Bogotá, 471.
 — de Borbon, 687.
 — del Brasil, 299, 367.
 — del Cabo de Buena-Esperanza, 296.
 — de los calmucos, 301.
 — de Canarias, 222.
 — de Chile, 299.
 — de la China, 237.
 — de Cochinchina, 553.
 — de Europa, 528.
 — de la India, 356.
 — de la isla de Santo Domingo, 620.
 — de la Jamáica, 346.
 — del Labrador, 452.
 — del mar del Sud, 352.
 — de Méjico, 424, 567.
 — de los noruegos, 327.
 — de Nueva-España, 567.
 Té de Nueva-Gales, 351.
 — de Nueva-Jersey, 281.
 — de Nueva-Holanda, 352.
 — de Nueva-Zelanda, 328.
 — del Paraguay, 279, 299.
 — de Pensilvania, 550.
 — del Perú, 348, 527.
 — de los pobres en la China, 281.
 — de Santa Fé de Bogotá, 471.
 — de Siberia, 328.
 — de Suecia, 400.
 — de Veracruz, 424.
 — indígena, 549.
 — Shulang, 237.
 Tea de Canarias, 668.
 Teatina del Perú, 527.
 Tecamez de la Guayana, 402.
 Tecomate de Méjico, 495, 496.
 Tecomatl de Méjico, 495, 496.
 Tecú de Chile, 238.
 Tejo comun, 671.
 — de Canarias, 451.
 Tejocote de Méjico, 330.
 Telasprios, 199.
 Temare del Orinoco, 465.
 Tembladera, 769.
 Temblon, 657.
 Temecatl de Méjico, 503.
 Temú de Chile, 181.
 Tengue de Cuba, 314.
 Teocote de Méjico, 668.
 Tepeamatl de Méjico, 634.
 Tepiacuilotl de Méjico, 396.
 Tepozan de Méjico, 527.
 Tercianaria, 550.
 Terciopelillo de Méjico, 300.
 Testículo de perro, 687.
 Teta de cabra en Chile, 455.
 — de vaca, 436.
 Tetilla de Chile, 455.
 Tetona pecosa de Nueva-Granada, 705.
 Tetzocana de Méjico, 733.
 Texcalamatl de Méjico, 634.

- Tezcalama de Méjico, 635.
 Tezontzapotl de Méjico, 465.
 Thapi de Chile, 516, 517.
 Thecú de Chile, 238.
 Thekel de Chile, 705.
 Theomtl de Méjico, 706.
 Thecu de Chile, 238.
 Thilco de Chile, 338.
 Tianguispepetatl de Méjico, 575.
 Tiborna del Brasil, 479.
 Tícla de Filipinas, 539.
 Tiemblo, 657.
 Tientayernos, 525.
 Til de Canarias, 589.
 Tila americana, 232.
 — comun, 231.
 — silvestre, 231.
 Tilo americano, 232.
 — comun, 231.
 — silvestre, 231.
 Timbangan de Filipinas, 604.
 Timbirichi de Méjico, 707.
 Timbó del Brasil, 255.
 Timbó sipó del Brasil, 255.
 Timelea, 597.
 Tina del Perú, 507.
 Tindalo de Filipinas, 319.
 Tingi da praga en el Brasil, 463.
 Tinguí del Brasil, 257.
 Tinhoraó del Brasil, 752.
 Tintones, 264.
 Tintureira del Brasil, 564.
 Tipolo de Filipinas, 637.
 Tiquiltiquil del Perú, 508.
 Tiquio de Filipinas, 759.
 Tirabeque, 305.
 Tiraña, 457.
 Titio de Filipinas, 759.
 Titos, 305.
 Tizne del Olivo, 804.
 Tizon de las cereales, 804.
 Tlacopatli de Méjico, 424, 604.
 Tlalayotl de Méjico, 484.
 Tlalcacahuatl de Méjico, 314.
 Tlalpopolotl de Méjico, 424.
 Tlanchalagua de Chile, 490.
 Tlanepapaquelitl de Méjico, 642.
 Tlapatl de Méjico, 519.
 Tlaspíos, 199.
 Tlauli de Méjico, 763.
 Tlemolli de Méjico, 518.
 Tlepatli de Méjico, 557.
 Tliltxochitl de Méjico, 688.
 Tliltzapotl de Méjico, 469.
 Toba, 433.
 Toco de Cumaná, 203.
 Tocusso de Abisinia, 767.
 Todabuena, 242.
 Todasana, 242.
 Tojo, 297.
 Toloache de Méjico, 519.
 Tomate comun, 513.
 — de Brihuega, 518.
 — de invierno, 518.
 Tomate de la Paz, 516.
 — redondo, 513.
 Tomatera, 513.
 Tomatillo cimarrón del Perú, 517.
 — del diablo, 514.
 Tomatl de Méjico, 513, 518.
 Tomatzin de Méjico, 514.
 Tomillo andaluz, 548.
 — comun, 548.
 — Real, 548.
 — salsero, 548.
 — sanjuanero, 548.
 — sapero, 215.
 Tonaloxochitl de Méjico, 686.
 Tonga del Perú, 519.
 Toola de la India, 229.
 Topana, 386.
 Topiro del Orinoco, 515.
 Topozan de Méjico, 527.
 Torbisca, 597.
 Torbisca comun, 597.
 — de los Pirineos, 597.
 Torcido de Cuba, 333.
 Torito de Quito, 686.
 Tormetilla, 328.

- Tornasol, 621, 798.
 Torongil cidrado, 548.
 — de Méjico, 548.
 — de Turquía, 550.
 Toronjo, 240.
 Tosiguero, 289.
 Toston de Cuba, 578.
 — de Filipinas, 369.
 Totoncaxococoyollin de Hernandez, 610.
 Totumo del Perú, 495.
 Traboeraba del Brasil, 733.
 Tragacanto comun, 303.
 — de Méjico, 377.
 Tragapan, 704.
 Tragantina, 751.
 Trapoeraba-rana del Brasil, 733.
 Trébol acedo, 268.
 — acuático, 492.
 — blanco, 299.
 — comun, 298.
 — de castor, 492.
 — de Cuba, 419.
 — de olor, 298.
 — dorado, 175.
 — encarnado, 299.
 — fibrino, 492.
 — hediondo, 299.
 — hemorroidal, 299.
 — oloroso, 298.
 — rastrero, 299.
 — Real oloroso, 298.
 Trecuáns del Brasil, 752.
 Trematre del Brasil, 418.
 Trementina cocida, 667.
 — comun, 666.
 — de Abeto, 668.
 — de Boston, 668.
 — de Burdeos, 667.
 — de Chio, 288.
 — de Estrasburgo, 668.
 — de Venecia, 669.
 Trepacaballos encarnada, 432.
 Trepoeraba del Brasil, 733.
 Tres folhas brancas del Brasil, 273.
 — vermelhas del Brasil, 272.
 Triaca de Chile, 380.
 — de Europa, 604.
 Tridacio, 436, 437.
 Trigo alaga, 771.
 — Alonso, 771.
 — arisnegro, 771.
 — azulejo, 771.
 — barbilla, 771.
 — barqueño, 771.
 — bascuñana, 771.
 — bascuñana negra, 771.
 — blanco, 771.
 — blanquillo, 771.
 — blanquillo rampludo, 771.
 — candeal, 771.
 — candeal chamorro, 771.
 — candeal velloso, 771.
 — cañivano, 771.
 — cascalbo, 771.
 — cascaruleta, 772.
 — Castro, 771.
 — chamorro, 771.
 — chamorro velloso, 771.
 — chapado lampiño, 772.
 — chapado velloso, 772.
 — claro, 771.
 — claro de raspa negra, 771.
 — Cuchareta, 772.
 — de aumento, 772.
 — de Bona, 772.
 — de Egipto, 771.
 — de Esmirna, 772.
 — de estío, 771.
 — de las Indias, 763.
 — de Jerusalem, 772.
 — de marzo, 771.
 — del milagro, 772.
 — de Polonia, 772.
 — de primavera, 771.
 — de provision, 771.
 — de raspa negra, 771.
 — de San Isidro, 772.

Trigo desraspado, 771.

— dorado, 771.

— emella, 771.

— fanfarron, 772.

— fanfarron lampiño, 771.

— fanfarron velloso, 771.

— fimia, 771.

— fino, 771.

— fiñana, 771.

— fiñano negro, 771.

— fiñano rubio, 771.

— fontegis, 771.

— francés, 772.

— grosal, 771.

— guija, 771.

— hembrilla, 771.

— jeja, 771.

— jeja blanco, 771.

— jeja de monte, 771.

— jejar, 771.

— Jijona, 771.

— larguillo, 772.

— macho, 771.

— marroqui, 771.

— marzal, 771.

— mayor, 771.

— mella, 771.

— mocho, 771.

— mochon, 771.

— monago, 771.

— morato, 771.

— morillo, 771.

— morisco, 771.

— moro, 771, 772.

— moro lampiño, 772.

— moro velloso, 772.

— moruno, 771, 772.

— moruno lampiño, 772.

— moruno velloso, 772.

— navarrés, 771.

— negrilla, 771.

— negro, 582.

— ordenado, 771.

— patiancho, 772.

— patianchuelo, 772.

Trigo pelado, 771.

— pelon, 771.

— perinán, 771.

— piche, 771.

— pichon, 771.

— piel de buey, 771.

— polaco, 772.

— puro, 771.

— racimal, 772.

— racimudo, 771.

— ramoso, 772.

— raspinegro, 771.

— recio blanco, 771.

— recio rubio, 771.

— redondillo lampiño, 771.

— redondillo velloso, 771.

— rochal, 771.

— rojal, 771.

— royal, 771.

— rubio, 771.

— rubion, 771.

— rubion blanco, 771.

— salmeron, 771.

— sarraceno, 582.

— siciliano, 772.

— sietespiguin, 771.

— simiente nueva, 771.

— sin barbas, 771.

— tosa, 771.

— tosella, 771.

— toseta, 771.

— trechel, 771.

— tremes, 771.

— tremesino, 771.

— Trujillo, 771.

— vacuno, 528.

Triguera caballuna, 764.

Trinitaria, 209.

Trompa de elefante, 497.

Trompeta del juicio, 519.

Trompetilla común, 519.

— de Méjico, 534, 577.

Trompillo de Cumaná, 207.

Trompon, 704.

Tronadores de Méjico, 494.

- Truppa de Chile, 440.
 Tsjampaca de las Malayas, 182.
 Tsjampaca Gunung de Java, 182.
 Tuac de la India, 739.
 Tuaiussu del Brasil, 260.
 Tuatua de Cuba, 618.
 Tuba de Filipinas, 745.
 Tuberosa azul, 719.
 — blanca, 719.
 Tubli de Filipinas, 309.
 Tuca de Europa, 359.
 — de Chile, 773.
 Tucum del Brasil, 743.
 Tucumá del Brasil, 742.
 Tuera, 359.
 Tuero, 390.
 Tugui de Filipinas, 710.
 Tulang de Filipinas, 469.
 Tulipan, 718.
 Tulipanero, 188.
 Tulipero, 183.
 Tulpay del Perú, 660.
 Tumbirichi de Méjico, 707.
 Tumbo del Perú, 363.
 Tumpu del Perú, 525.
 Tuppa de Chile, 440.
 Tuna, 377.
 Tunal, 377.
 Tunera salvage de Canarias, 377.
 Túnica de Cristo, 519.
 Tupeiçava del Brasil, 527.
 Tupinambo, 424.
 Tupitcha del Brasil, 222.
 Turbit blanco, 555.
 — de la India, 503.
 — de montaña, 390.
 — de los Pirineos, 388.
 — falso 390.
 Turinoa del Brasil, 324.
 Turma almizelada, 805.
 — de Berbería, 805.
 — de ciervo, 805.
 — de las Landas, 805.
 — del Piamonte, 805.
 Turma de sierra, 805.
 Turmeric de los Estados-Unidos, 194.
 Turmeruela, 208, 608.
 Turnep, 201.
 Turu del Perú, 500.
 Turucasa del Perú, 270.
 Tusilla de la Guayana, 425.
 Tutumo del Perú, 495.
 Tuzpatli de Hernandez, 635.
 Tzacutli de Hernandez, 686.
 Tzacatlscalli de Méjico, 504.
 Tzacuxochitl de Hernandez, 686.
 Tzacuxochitl altera de Hernandez, 686.
 Tzauhtli acuática de Hernandez, 687.
 — arundinacea de Hernandez, 687.
 — florida de Hernandez, 686.
 Tzauhxilol de Hernandez, 686.
 Tzonpanquahuil de Méjico, 309.
 Tzonpautli de Méjico, 309.
 Tzopilotlontecomatl de Hernandez, 260.
 Ubi de Cuba, 262, 263.
 — de Filipinas, 709.
 Uchu del Perú, 517.
 Ucuares de Méjico, 413.
 Ucuuba del Brasil, 592.
 Udo del Japon, 393.
 Ugui de Chile, 353.
 Ula de la India, 673.
 Ullpu del Perú, 765.
 Ullu del Perú, 278.
 Ullucina del Brasil, 619.
 Ulluco de Quito, 369, 572.
 Ullucu de Quito, 572.
 Ulmaria, 326.
 Ulpo de Chile, 764.
 Ulux del Perú, 447.
 Umapuma del Perú, 642.
 Umari del Brasil, 314.
 Umbú del Brasil, 290.

- Uminta de Chile, 763.
 Umiri del Brasil, 258.
 Undequiera de Nueva-Granada, 283.
 Unha de boy en el Brasil, 320.
 Unoperquen de Chile, 441.
 Uña de asno, 420.
 — de caballo, 419, 420.
 — del diablo en Méjico, 497.
 — de gato en Europa, 372.
 — de gato en Filipinas, 316.
 — de gato en Méjico, 329.
 — de gato en Nueva-Granada, 314.
 — de leon, 430.
 Uñas gatas, 298.
 Uñuperquen de Chile, 441.
 Upaguando de Nueva-Granada, 518.
 Upas tietteek, 488.
 Urape de Caracas, 320.
 Urarema del Brasil, 314.
 Uraye de Caracas, 288.
 Urce, 451.
 Urgevaô del Brasil, 537.
 Uris de Filipinas, 224.
 Urita micuna del Perú, 326, 508.
 Urucú del Brasil, 206.
 Urucurana del Brasil, 220.
 Urucuri del Brasil, 743.
 Uteus del Perú, 539.
 Uthiu de Chile, 400.
 Utnapoca del Brasil, 260.
 Uva assu del Brasil, 478.
 — canilla, 372.
 — cimarrona de Nueva-Granada, 448.
 — de monte en el Perú, 188.
 — de mar, 673.
 — de moro, 518.
 — espin, 378.
 — marina, 673.
 — pacuri del Brasil, 245.
 Uvaduz, 450.
 Uvalha del Brasil, 355.
 Uvas de América, 564.
 — de la caleta en Cuba, 583.
 — de gato, 372.
 — de mar, 673.
 — de monte en el Perú, 188.
 — de moro, 518.
 — de oso, 711.
 — de raposa, 711.
 — de zorro, 711.
 Uvero de Cuba, 583.
 Uvilla de Méjico, 521.
 Uvularia, 713.
 Vainilla de Méjico, 686.
 — del Perú, 508.
 Valeriana azul, 500.
 — encarnada, 412.
 — griega, 500.
 — medicinal, 412.
 Vara de Jesé, 719.
 — de oro, 420.
 Vare de Nueva-Zelanda, 670.
 Variadera-barredera, 432.
 Varilla de Chile, 268.
 Vasillo, 372.
 Vassoura del Brasil, 222.
 Vaçourinha del Brasil, 527.
 Vavalisin de Filipinas, 223.
 Vedegambre blanco, 727.
 — negro, 176.
 Vejiga de perro, 517.
 Velame do campo en el Brasil, 619.
 Velesa, 557.
 Velonia de Levante, 649.
 Vellosilla, 437.
 Vencetósigo, 483.
 Venenillo de Méjico, 484.
 Veneno del Perú, 515.
 Venivel de Ceilan, 189.
 Verbachina de Méjico, 564.
 Verbasco de Europa, 525.
 — de Méjico, 429.
 Verbena comun, 537.
 Verde-zahuintu del Perú, 352.

- Verdin, 816.
 Verdolaga comun, 368.
 — de América, 368.
 — de Indias, 374.
 — francesa, 369.
 — marítima, 568.
 Verdolaguilla blanca de Cuba, 575.
 Vergonzosa, 311.
 Vermicular, 372.
 Verónica hembra, 528.
 — macho, 528.
 Vetiver de los franceses, 774.
 Veza, 305.
 Vibona de Cuba, 394, 407.
 Viborera comun, 604.
 — morada, 509.
 Viborillo de Canarias, 509.
 Viburno comun, 399.
 Vicarios, 720.
 Vicho de Cumaná, 369, 575.
 — menudito de Cumaná, 575.
 Victorial larga, 722.
 Vid cultivada, 263.
 — con hoja de perejil, 263.
 — del Canadá, 263.
 — de la Carolina, 263.
 — Labrusca, 263.
 — silvestre de América, 263.
 — silvestre de las Antillas, 263.
 — silvestre de Europa, 263.
 Vidalba, 173.
 Vidarria de algunos, 630.
 Vidraria, 173.
 Vidriella, 173.
 Vidrio de Cuba, 374.
 Vilanera, 518.
 Vinagrera comun, 583.
 — de Cuba, 268.
 Vinagrera, 583.
 Vinagrillo de Cuba, 268.
 Vinapa del Perú, 763.
 Vincapervinca, 479.
 Viniebla, 510.
 Viniega, 510.
 Vinático de Canarias, 588.
 Viola mariana, 442.
 Violeta de Méjico, 222.
 — de olor, 209.
 — diente de perro, 717, 718.
 — estrellada de Méjico, 210.
 — perruna, 209.
 Violeta, 324.
 Viperina de Virginia, 603.
 Viravira de Chile, 429.
 Vireina de Méjico, 431.
 Viriji de Cuba, 355.
 Virundera del Perú, 316, 317.
 Visnaga, 386.
 Vitú del Perú, 405.
 Viudas, 414.
 Víz naga, 386.
 Voavanga de Madagascar, 407.
 Volador de Nueva-Granada, 591.
 Volatines de Cuba, 203.
 Volcameria, 539.
 Vomitel blanco de Cuba, 507.
 — colorado de Cuba, 507.
 — encarnado de Cuba, 507.
 Voquí de Chile, 484.
 Voquicillo de Chile, 484, 485.
 Vuarama del Brasil, 224.
 Vulvaria, 567.
 Xalxocotl de Hernandez, 352.
 Xeringueira del Brasil, 617.
 Xiliuquilitl de Méjico, 299.
 Xilo de Méjico, 296.
 Xiloxochitl de Méjico, 225.
 Xiloxochitl de Méjico para algunos, 311.
 Xitomamac de Méjico, 513.
 Xitomate de Méjico, 513.
 Xitotomatl de Méjico, 513.
 Xochiocotzotl de Méjico, 626.
 Xocot de Nicaragua, 250.
 Xocoxochitl de Hernandez, 353.
 Xolochichitl de Méjico, 419.
 Xoxocoyoli de Méjico, 268.
 Xoxonitzal de Méjico, 418.

- Yaba de las Antillas, 314.
 Yaca de la India, 184.
 — de Jamáica, 672.
 Yacal de Filipinas, 236.
 Yagruma hembra de Cuba, 637.
 — macho de Cuba, 393.
 Yaití de Cuba, 615.
 Yalhoy del Perú, 213.
 Yamao de Cuba, 260.
 Yambeiro de la India, 355.
 Yambo de la India, 355.
 Yame del Brasil, 709.
 — de Canarias, 751.
 — de Guinea, 709.
 Yana de Cuba, 238, 335.
 Yanilla de Cuba, 256.
 Yantoc de Filipinas, 739.
 Yari-yari de la Guayana, 184.
 Yaro comun, 751.
 — de Etiopía, 753.
 Yaruma de Cuba, 637.
 Yarumba de Cuba, 637.
 Yasmichi del Perú, 660.
 Yatum condenado de América, 788.
 Yayá de Cuba, 185, 186.
 — cimarron de Cuba, 333.
 — macho de Cuba, 333.
 Yayabico de Cuba, 281, 407.
 Yedra arbórea, 393.
 — campana, 504.
 — campanilla, 504.
 — comun, 393.
 — de Nueva-Andalucía, 247.
 — morada de Méjico, 500.
 — terrestre de Cuba, 222.
 — terrestre de Europa, 550.
 — terrestre de Méjico, 384, 502.
 — terrestre del Perú, 419.
 Yelmo de Chile, 396.
 Yema de huevo en Cayena, 466.
 Yeo del Brasil, 204.
 Yepazotl de Méjico, 567.
 Yerba algodonosa, 429.
 Yerba artética, 553.
 — babosa, 719.
 — ballestera blanca, 727.
 — ballestera negra, 176.
 — ballestera negra ilegítima, 176.
 — becerra, 526.
 — belida, 175.
 — buena comun, 547.
 — buena del agua, 547.
 — buena de sabor de pimienta, 546.
 — buena morisca de Jarava, 547.
 — buena rizada, 547.
 — buena silvestre, 547.
 — cabruna, 299.
 — caiman de Cumaná, 582.
 — callera, 372.
 — cana, 430.
 — carderona, 534.
 — carmin, 564.
 — centella de algunos, 175.
 — centella de Castilla la Nueva y Estremadura, 175.
 — centella de Castilla la Vieja, 176.
 — cicutaria, 391.
 — cidrera del Perú, 538.
 — cinta, 764.
 — clin, 553.
 — cotones, 514.
 — cupido, 435.
 — del acibar, 719.
 — del alacran, 303.
 — de la alferecia, 376.
 — del almizcle, 264, 393.
 — del amor, 268, 303.
 — del ángel en Méjico, 419.
 — de las ánimas en Méjico, 425.
 — de la apostema en Chile, 339.
 — de la araña en el Perú, 229.
 — de la bolsilla en el Perú, 525.
 — del canario, 266.

- Yerba del cáncer, 557.
 — del cáncer en Méjico, 575, 617.
 — del cáncer de Puebla en Méjico, 342.
 — de los canónigos, 412.
 — del carnero en el Perú, 299.
 — de la celada, 550.
 — de las chinches, 178.
 — de las cinco llagas en Filipinas, 535.
 — del clavo en Méjico, 269.
 — del clavo en el Perú, 339.
 — de las coyunturas, 673.
 — del cuadrillo, 208.
 — de cucharas, 199.
 — de la culebra en Europa, 751.
 — de la culebra en el Perú, 343, 526.
 — del cura en Méjico, 236.
 — del diablo en las Antillas, 557.
 — de D. Carlos en Cuba, 774.
 — de la doncella en Méjico, 610.
 — del espanto en el Perú, 425.
 — de la flámula, 175.
 — del fuego, 797.
 — del gallinazo en el Perú, 549.
 — del gato, 412.
 — del gato segun Jarava, 422.
 — del gato en Canarias, 551.
 — de la gitana, 387.
 — de la Gobernadora en Méjico, 269.
 — de la Gobernadora de la Puebla en Méjico, 418.
 — de la golondrina en Europa, 194.
 — de la golondrina en Méjico, 614.
 — de la golondrina en el Perú, 549, 614.
 — de la gota, 211.
 — de Guinea, 765.
 — del halcon, 436.
 — de heridas en Chile, 391.
 Yerba de la herradura, 304.
 — del huevo, 514.
 — del indio en Méjico, 604.
 — de junturas, 553.
 — de lombrices en Nueva-Andalucía, 487.
 — de llagas en Chile, 391.
 — de Maluco, 424.
 — del maná de Prusia, 769.
 — del maravedí en Nueva-Granada, 278.
 — de mataduras en Chile, 299.
 — del Mate en el Paraguay, 278.
 — del Mate en el Perú, 278.
 — de la matriz, 530.
 — de la moneda, 459.
 — de Monserrate, 597.
 — del moro en Europa, 264.
 — del moro hembra en el Perú, 575.
 — de la muela en Nueva-Granada, 546.
 — del nácar, 199.
 — del negro en Méjico, 220.
 — de la oblea, 564.
 — de los ojos, 549.
 — de la paciencia, 584.
 — del Paraguay, 278.
 — de la parálisis, 458.
 — del páramo en Popayan, 430.
 — de las paridas en Filipinas, 539.
 — del pastor en Europa, 299.
 — del pastor en Méjico, 617.
 — de la perla en el Perú, 328.
 — de la perlesía, 551.
 — de la perlilla en el Perú, 328.
 — del perro en Méjico, 431.
 — de los perros en Méjico, 514.
 — del pico, 304.
 — de la plata, 374.
 — del podador, 431.
 — de la polilla, 525.
 — del pollo en Cuba, 613.
 — del pollo en Méjico, 733.

Yerba de pordioseros, 173.
 — del porrazo en Méjico, 339.
 — de la Princesa, 538.
 — de la Puebla en Méjico, 431.
 — de punta, 768.
 — de la purgacion en el Perú, 578.
 — de la rabia, 199, 551.
 — del rosario, 694.
 — del rosoli en Chile, 268.
 — de sábana en Cumaná, 504.
 — del sacré, 437.
 — de San Alberto, 200.
 — de San Antonio, 339.
 — de San Benito, 326.
 — de San Bonifacio, 713.
 — de San Carlos en Cuba, 774.
 — de San Cristóbal, 177.
 — de San Felipe, 201.
 — de San Gerardo, 386.
 — de San Guillermo, 328.
 — de San Jorge, 412.
 — de San Juan, 242, 428.
 — de San Lorenzo, 385.
 — de San Martin en América, 210.
 — de San Nicolás en Méjico, 373.
 — de San Pablo, mayor, 458.
 — de San Pablo, menor, 458.
 — de San Pedro, 629.
 — de San Ruperto, 264.
 — de la sangre en Cuba, 507.
 — de Santa Bárbara, 198.
 — de Santa María en Europa, 427.
 — de Santa María segun Jara-
 va, 581.
 — de Santa María en el Perú, 642.
 — de Santa María en Quito, 418.
 — de Santa María de tierra
 adentro en Méjico, 425.
 — de Santa Quiteria, 616.
 — de Santa Rosa, 178.

Yerba de Santiago, 430.
 — del sapo en Cuba, 385, 581.
 — del sapo en Méjico, 385.
 — de la segur, 304.
 — de siete sangrias, 510.
 — del sol, 424.
 — del tabardillo en Méjico, 418.
 — de los tiñosos, 434.
 — del toimiento de Jarava, 429.
 — de las torcidas, 552.
 — del toro, 342.
 — de la Trinidad, 175, 700.
 — del vidrio en Europa, 374.
 — del vidrio en Canarias, 374.
 — del vidrio en Chile, 513.
 — del vidrio en Cuba, 374,
 508.
 — del zopilote de Méjico, 435.
 — del zorrillo en Méjico, 620.
 — doncella de Europa, 479.
 — doncella de Java, 479.
 — dulce de Méjico, 538.
 — estoque, 700.
 — estrella, 558.
 — fina, 766.
 — fuerte, 553.
 — garbancera, 298.
 — gatera, 550.
 — gigante, 534.
 — hedionda de Cuba, 318.
 — hedionda de Europa, 567.
 — hedionda de Méjico, 519,
 521.
 — hedionda del Perú, 521.
 — hedionda de Popayan, 515.
 — jabonera, 216.
 — lagunera, 175.
 — lechera de Europa, 212, 479.
 — lechera de Cuba, 614.
 — lombricera, 429.
 — lombriguera comun, 429.
 — lombriguera hembra, 427.
 — lombriguera macho, 428.
 — llavera, 176.
 — Luisa, 538.

Yerba melera, 298.
 — mimosa, 311.
 — mora comun, 514.
 — mora de las Antillas, 514.
 — mora de Chile, 515.
 — mora de Filipinas, 774.
 — mora que hace dormir, de Jarava, 518.
 — mora vellosa, 514.
 — pajarrera, 217.
 — Paris, 711.
 — pastel, 201.
 — pedorrera de Canarias, 490.
 — pejiiguera, 581.
 — peluda, 498.
 — pincel, 459.
 — piojera, 177.
 — pulguera, 422.
 — puntera, 373.
 — purga de Chile, 563.
 — racimosa, 567.
 — raton de Caracas, 188.
 — ratonera de Canarias, 629.
 — rodela, 199.
 — romana, 427.
 — santa comun, 547.
 — santa de algunos, 520.
 — santa de Méjico, 642.
 — santa del Perú, 521.
 — soldadora, 459.
 — tora, 530.
 — tosera, 498.
 — turca, 371.
 — turmera, 208.
 — unciana, 299.
 — vaquera, 526.
 — velluda, 175.
 — verruguera, 508.
 — vidriera en Canarias, 374.
 — viva, 268.
 Yerbo, 305.
 Yero, 305.
 Yetl de Méjico, 520.
 Yezgo de Europa, 399.
 — de Méjico, 628.

Yito del Brasil, 259, 260.
 Yolochiahitl de Méjico, 299.
 Yoloxiltic de Méjico, 418.
 Yoloxochitl de Méjico, 182.
 Yoro de Filipinas, 739.
 Yoya de Canarias, 236.
 Yuca amarga de las Antillas, 618.
 — boniata de las Antillas, 619.
 — brava de las Antillas, 618.
 — cazave de las Antillas, 618.
 — del Orinoco, 619.
 — de raton en el Perú, 300.
 — dulce de las Antillas, 619.
 — mortífera de las Antillas, 618.
 Yulan de la China, 182.
 Yuquilla de Nueva-Andalucía, 619.
 Yuraccarhuas suche del Perú, 479.
 Yurac-ichu de Quito, 766.
 Yurahuacta del Perú, 515.
 Yurahuanium del Perú, 407.
 Yurahuassa del Perú, 515.
 Yurapunga de Quito, 418.
 Yuyo del Perú 574.
 Zabila, 719.
 Zabucajo de la Guayana, 356.
 Zacatasal de Méjico, 504.
 Zacate de las Antillas, 765.
 — camelote de Méjico, 765.
 — chichi de Méjico, 421.
 Zachhopra, del Perú, 708.
 Zadorija, 194.
 Zagua, 570.
 Zamarrilla, 552, 553.
 Zamboa, 331.
 Zamboero, 240.
 Zannahoria, 390.
 Zandia, 358.
 Zantú, 763.
 Zapalote de Méjico, 696.
 Zapan de comer ó de palomas en las Antillas, 232.
 Zapatero de la Guayana, 320.

- Zapote blanco de Méjico, 466.
 — de las Antillas, 466.
 — pequeño de las Antillas, 466.
 — prieto de Méjico, 469.
 Zapotillo de las Antillas, 466.
 Zara del Perú, 763.
 Zaragatona comun, 559.
 — de los arenales, 559.
 — fruticosa, 559.
 — mayor, 559.
 Zarapico, 200.
 Zaraza, 200.
 Zarcilla de Lima, 705.
 Zarcillejo de Popayan, 346.
 Zarcillo de Caracas, 255.
 Zarcillitos, 769.
 Zargatillo, 657.
 Zarza comun, 327.
 — de Moisés en el Perú, 281.
 — de olor, 327.
 Zarza ó Zarzaparrilla, 712.
 Zarzamora, 327.
 Zarzaparrilla de Alemania, 757.
 — del Brasil, 712.
 — de Chile, 714.
 — de Filipinas, 712.
 — de Honduras, 712.
 — de Italia, 712.
 — de Jamáica, 712.
 — de Lisboa, 712.
 Zarzaparrilla del Marañon, 712.
 — de Nueva-Holanda, 712.
 — de Orizaba, 712.
 — del pais, 712.
 — de Pará, 712.
 — de Veraacruz, 712.
 Zarzilla de Lima, 705.
 Zarzillitos, 769.
 Zarzon, 327.
 Zaza-Zaza del Perú, 686.
 Zencapuspu del Perú, 307.
 Zerumbet de Asia, 691.
 Zeutli de Méjico, 763.
 Zitac de Quito, 539.
 Zizaña acuática del Canadá, 763.
 — comun, 770.
 Zoapatli de Méjico, 423.
 Zocollada, 555.
 Zopilotl de Méjico, 260.
 Zueco, 688.
 Zulla, 304.
 Zumaque de la Carolina, 289.
 — de Méjico, 289.
 — de tenerías, 289.
 — de Virginia, 289.
 — falso, 293.
 — venenoso, 289.
 Zumillo, 390.
 Zurrone, 568.

FIN DEL CURSO DE BOTÁNICA.

CORRECCIONES IMPORTANTES.

Pág.	Lín.	Dice	Léase
108	14	<i>universalis</i>	<i>universale</i>
552	43	el <i>Botrys</i> L.	el <i>T. Botrys</i> L.
553	11	Chuigida	Cluigida
557	8	S.	A.
587	11	lacerineas	laurineas
592	17	moscada	moscado
593	20	monacarpelado	monocarpelado
597	4	Sideria	Siberia
601	28	<i>Hippophæ</i>	<i>Hippophæ</i>
610	1	<i>tuberosa</i>	<i>tuberosa</i>
617	19	Xeringueira	Xeringueira
627	24	apedicelado	apincelado
633	11	<i>Macclura</i>	<i>Maclura</i>
644	9	pagadas	pegadas
656	1	Olozotl	Ocozotl
691	37	<i>angustifolia</i>	<i>angustifolium</i>
704	37	Jazetta	Tazetta
734	20 y 22	periferie	periferia
742	40	El C.	El
746	24	otras	otros
	17	<i>Sparganium</i>	<i>Sparganium</i>
748	18	Espargamio	Esparganio
	30	hendidas	hundidas
752	18	Tayará	Tayará
779	31	Cuacsaro	Guacsaro
789	Las figuras de los Anteridios ó Zootecas		y fitozoarios están al revés.
797	2	aseigere	ascigero
808	21	<i>hariolarum</i>	<i>hariolorum</i>
809	36	un caso	este caso
815	27	<i>digita</i>	<i>digitata</i>
816	42	Don.	Dan.
863	42	anuales	actuales
869	7	bastá	vasta
903	3	Corbertia	Colbertia
904	43	Cyrtocarpha	Cyrtocarpa
905	2	Cystoseira	Cystoseira
	20	Elaeococcus	Elaeococcus
906	21	Elaedendron	Elaeodendron
	2	<i>Helicornieas</i>	<i>Heliconieas</i>
911	24	Henriettea	Henriettea
921	2	Parnasaia	Parnassia
923	26	Pterosposea	Pterospora
929	15	Trigueia	Triguera
960	32	Sozticoat...	Cozticoat...
962	17	Chilochuelli	Chilochuchi
999	27	Plateado	Plateada
1003	5	Raspabarriba	Raspabarriga

CORRECCIONES QUE DEJARON DE HACERSE
EN LA PARTE PRIMERA.


288	2 y 43	<i>higrospicidad</i>	<i>Higroscopicidad</i>
289	16	<i>higrospicidad</i>	<i>higroscopicidad</i>
457	38	podrian	suelen
	39	cuadrantura	pié de gallo
561	38	Reliquæ	Reliquiæ
563	20	(espora : 273)	(teca : 252, 273)
569	32	Glacinus	Glaucinus
571	11	Olymum	Ocymum


Pág.	Lín.	Dice	Léase
572	32	Pseudo-platanus L.	platanoides L.
573	4	Cardenche	Cardencha
573	21	Minosa Catechu L.	Acacia Catechu Willd.
573	8	Amyris elemifera L.	Amyris Plumieri Willd.


Algunos ejemplares de la *Parte primera* exigen además en sus últimas páginas las correcciones siguientes:

Pág.	Lín.	Dice	Léase
555	7	Pitiolatus	Petiolatus
558	12	Podospermio	Podospermo
571	29 y 31	Aguilegia	Aquilegia
	32	Cheitanthus	Cheiranthus
	20	otros	otras
	25	distanchya	distachya
572	29	fruticosus	fruticosus
	30	Hyoseymus	Hyoseyamus
	38	Biengranado	Biengranada
	44	Asafaetida	Asafoetida
	8	otros	otras
573	23	Urginia	Urginea
	42	Cañaleja	Cañaheja
	32	Daquilla	Dagulla
574	33	nunifera	nucifera
	34	nocturnum	nocturnum L.
	14	otros	otras
575	18	Schlchrđ	Schlecht
	19	Fardillo	Farolillo
	10	Gineko	Gincko
	46	ambrosiaceum Moench	racemosum Mill.
576	21	Rueda	Reseda
	22	Gúisa	Gúira
	28	Conmarouna	Coumarouna
	44	Faeniculum	Foeniculum
577	20	Cratoegi	Crataegi
	31	Hypogoea	Hypogaea
	8	otros	otras
578	19	otros	otras
	5	Romarinus	Rosmarinus
579	15	Agabe	Agave
	48	Robural	Robur var.
	20	otros	otras
580	33	chrystillinum	crystallinum
	48	otros	otras









8

COLMEIRO

CURSO
DE BOTÂNICA

3

8148