5305

28

129

ARISMEYCA.

RACTICA, Y
EGVLATIVA DEL BACHILLER IVAN PEREZ
de Moya.

FORA NVEVAMENTE COR-
ida, y añadida por el mismo author muchas cosas,
con otros dos libros, y una tabla muy copiosa de
las cosas mas notables de todo lo que
en este libro se contiene.

RIGIDO A DIEGO DE VER-
gara Gaudia, Rector de Indias.

Año

1619.

CON LICENCIA.

Alcala: En casa de Iuan Gracian,
que sea en gloria.

En casa de Antonio Sanchez, mercader de libros.

En la Lib^{ra} de la vid.

ERRATAS.

Folio 44. lin. 12. 52. lee 62 lin. 15. 3. lee 8. li. 19.
 6. lee 4. Fol. 45. li. 24. del 2. lee del 7. Fol. 100
 lin. 16. infinino, infinito. Fol. 132. lin. 8. son 24.
 son 34. Fol. 135. li. 27. 24 es 34. Fol. 194 lin. 11.
 torcios, tesrcios. Fol. 230. lin. 18. entos, enteros.
 Fol. 260. lin. 5. cauala canela. Fol. 264. lin. 1. vua,
 vna. Fol. 629. lin. 8. dobe, duze. Fol. 637. lin. 24.
 nana, nona.

Este libro intitulado *Aritmetica de Moya*. Cō estas
 erratas estã bien, y fielmente impresso: y correspon-
 de a su original. Dada en Alcalã en veynte y dos de
 Abril de 1619.

*El Corrector. El Licenciado Sebastian
 de Lirio.*

L I C E N C I A.

YO Hernando de Vallejo Escriuano de Camara del Rey nuestro señor de los q̄ residen en su Consejo, certifico, y doy fee, q̄ por los señores del se d o licencia a Antonio Sanchez librero, para q̄ por vna vez pudiesse imprimir vn libro intitulado, *Aritmetica de Moya*, que va firmada de mi nombre, con q̄ del qual no se pueda vender, sin que primero se trayga ante los dichos señores para que se corrija, y tasse el precio a que cada vno se ha de vender. Y para q̄ dello conste, di la presente en Madrid a 26. dias del mes de Junio, de 1618. años.

Yo Hernando de Vallejo.

T A S S A.

YO Hernando de Vallejo Escriuano de Camara de su Magestad, y vno de los q̄ en su consejo residen, certifico, y doy fee, que auiendo se visto por los dichos señores del Consejo vn libro intitulado, *Aritmetica de Moya*, que con licencia de los dichos señores fue impresso, tassaron el dicho libro a 4. maravedis, y tiene 47. pliegos, y a este precio mandaron se venda, y no a mas. Y para que dello conste de pedimiento de Antonio Sanchez, vecino desta villa de Alcalá mercader de libros, y mandado de los señores del Consejo doy esta fee, q̄ es fecha en la villa de Madrid, a diez y siete del mes de Mayo, de 1619. años.

Hernando de Vallejo.

TABLA DE LAS CO
sas mas memorables de
tratado por la ordē del
A. B. C.

- A**
A Breuiar particiones para partir con menor numero, libro.2. fol.124.
Abre ir quebrados a menor denominacion, libro. f. 134. 135. 136. 137.
Abca que quiere dezir en numeros quebrados, lib.126.
Abreuiar caracteres en la regla de la cosa lib.7. fo. 432. 433. ibidē.
Acrecentar quebrados en denominacion, libro.2. fol.141.
Acetabulū es quarta parte de la hemina, lib.8. fol.622.623.624.
A Edades del mundo, libro.8. fol.624.
A Equinoctium de do se dize, lib.8. fo.626.
A Euo q̄ tiempo signifie lib.8. fo.629.
A Es aris, significa varias cosas, lib.8. fo.609.
Algebra, lib.7. fo.432.
Almucabala. lib.7. fo.219.
Amblygonia figura de geometria, lib.4. fo.299.
Amphora, li.8. fo.622.
Aneajes de do se dize, libro.3. fo.262.
Año como se define lib.8. fo.629.
Año solar, lib.8. fo.630.
Año comun, ibidem.
Año bisextil, ibidem.
Año grande, libro octauo, fol.631.

T A B L A.

- Aproximar rayzes quadradas, lib. 7. fo. 448.
- Apreciar obras de pozos o de taperia, li. 9. f. 665.
- Arabigos que characteres de numeros vsaron, lib. 8. fo. 410.
- Ardite quanto vale, lib. 8 fo. 610.
- Ardites reduzirlos a maravedis, lib. 6. fo. 410.
- Argento Turonense, lib. 8. fo. 619.
- Argētum se toma por toda moneda, libr. 8. fo. 609.
- Area q̄ quiere dezir en geometria, lib. 4. f. 297.
- Ariēço en el marco q̄ pesa es, lib. 3. fo. 275.
- Arithmetica de do se dizze assi, li. 1. fo. 1.
- Arithmetica proporcionalidad, lib. 5. fo. 333.
- Arithmetica que quiere dezir lib. 3. fo. 247.
- Arithmetica practica, li. 1. fo. 1.
- Arithmetica theorica, o speculatiua, li. 5. fo. 309.
- Arithmetica speculatiua ibidem.
- Arithmetica como se de t̄ne y diuide, li. 1. fol. 1.
- Aritmetica es vna de las artes matematicas, li. 1 fol. 1.
- Artes matematicas quãtas son ibidem.
- Arte mayor, lib. 7. fo. 432
- Assentar y nombrar los quebrados, li. 2. fo. 126. 129.
- Assentar enteros cõ quebrados, lib. 2. fo. 147.
- As is. libr. tercero, f. 137 li. fo. 609. 610.
- Astrologos q̄ characteres de numeros vsauan lib. 8. fo. 605.
- Assi pondiũ es lo mismo que pondo, vale quatro maravedis, li. 8. fol. 611
- Atomo que tiempo es, li. bro 8. fo. 638.
- Aureo, lib. 8. fo. 612.
- Aureolus, ibidem.
- Auisos de sumar, li. 1. 12.

T A B L A.

- Anisos de partir, libro 1.
 fo. 84.
 Anisos para comprar pa-
 ños, libr. 6. fo. 419.
 Anisos de las ygualecio-
 nes, lib. 7. fo. 525. 527.
 Anisos para proponer q̄-
 itiones, li. 7. fo. 528.
 Aureo, o numero, libro 8
 Axedrez, lee li. 9. fo. 682.
 B.
 Batalla, o contienda de
 numeros, lib. 5. fol. 374.
 fol. 638.
 B. has era lo mismo que
 metreta, lib. 8. fo. 624.
 B. iratar, o trocar merca-
 derias, lib. 3. fo. 258.
 Bes, is, lib. 8. fol. 609.
 Bessis, is por lo mismo,
 ibidem.
 Bellon de que se hazē los
 quartos, y blancas, li. 5.
 fo. 289.
 Bimodius media hanega
 lib. 8. fol. 622.
 Binomio, l. bro. 7. fo. 269
 509. 112.
 B. sexto, lib. 8. fo. 642.
 Bisiliqua, lib. 8. fol. 320.
 Burgales moneda anti-
 gua, l. b. 8. fo. 617.
 Blancas reduz rias a ma-
 raedis. l. br. 8. fol. 410.
 Blancas reduz rias a cor-
 nados, libro. 6. fol. 441.
 C.
 C vale ciēto, li. 8. fo. 599.
 Campana quātas hormi-
 gas la moueran, libr. 9.
 fo. 671.
 Castellano de oro, lib. 3.
 fo. 275. libro. 8. fol. 619.
 Censos, o juros como se
 compran, lib. 1. fo. 119.
 Centussis libr. 8. fo. 612.
 Ceratium, libr. 8. fo. 614.
 Ceramium, li. 8. fo. 624,
 273.
 Cetares, lib. 8. fo. 620.
 Caracteres de Arismet-
 tica, lib. 1. fol. 2.
 Caracteres de la cuen-
 ta castellana, li. 1. fo. 17.
 Caracteres de la regla
 de la cosa, li. 7. f. 414. 434
 Caracteres q̄ se tratan
 en lib. 7. fo. 436.

T A B L A.

- Caracteres de numeros
 diuerfos que vsaron
 los Romanos, lib. 8. f.
 397.599.
- Caracteres de numeros
 que vsan muchos As-
 trologos, lib. octauo,
 fo. 605.
- Caracteres de numeros
 que vsan los Arabigos
 li. 8. fo. 603.
- Caracteres de numeros
 que vsan los Chaldeos
 lib. 8. fo. 605.
- Caracteres que vsan los
 medicos, libro. 8. fol.
 624.
- Chalcus, li. 8. fo. 620.
- Chaldeos que caracte-
 res de cuenta vsan, li.
 8. fo. 605.
- Chotus, li. 8. fo. 622.
- Choenies, li. 8. fo. 622.
- Choa es lo mismo q̄ Cō-
 gio li. 8. fol. 625.
- Ciceron que caracteres
 vsa de numeros, lib. 8.
 fo. 601.
- Circunferencia, lib. 4.
 fo. 297. 303.
- Circulo, libro quarto fo.
 297.
- Cinquen. lib. octauo, fo.
 618. i
- Ciatho cabe quarro liu-
 las, libro octauo folio
 622. & 624.
- Cochlearia es lo mismo
 que ligula, lib. 8. folio
 622.
- Codo real, libro octauo,
 fo. 620.
- ibidem.
- Compañia simple o sin
 tiempo, li. 3. fo. 233.
- Compañia mixta o sin
 tiempo, lib. 3. fo. 237.
- Composicion de quanti-
 dades proporcionales
 lib. 7. fol. 499.
- Congio es seys sextarios
 lib. 8. fo. 622. 624.
- Conocer de dos o mas
 quebrados qual es ma-
 yor. lib. 2. fo. 149.
- Consonancia como se
 define, libro 5. folio
 361.

T A B L A.

- Consonancias de musica**
 quantas son, li. 5. fo. 362.
Cofonancias simples son
 4. lib. 5. fo. 362.
Consonancias compues-
 tas lib. 5. fo. 365. 367
Contienda de numeros,
 lib. 5. fo. 373.
Contar con calculos, o cõ-
 tadores, lib. 1. fo. 111.
Conuertir vna moneda
 en otra, li. 1. fo. 117.
Cõuertir vn quebrado en
 otro, li. 2 fo. 147.
Contar con los dedos y o-
 tras partes del cuerpo,
 lib. 8. fo. 605.
Cornados hazerlos blan-
 cas, lib. 6. fol. 410.
Cornados hazerlos ma-
 rauedis, lib. 6. fol. 410.
Cotyla es lo mismo q̄ he-
 mina, li. 8, fol. 432.
Cozinero que fue por vn
 par de huevos a vna def
 pensa, libro 9. fol. 679.
Cubitus se toma en tres
 modos, libro. 8. fo. 620.
Cubitum lo mismo es q̄
 cubitus, libro. 3. fo. 416.
Cubito geometrico, li. 8.
 fol. 316.
Cubito real, li. 8. fo. 316.
Cuenta de los granos de
 trigo del axedrez. lib. 9.
 fo. 340.
Cuentas de griegos, li. 3.
 fo. 307.
Cuentas Ecclesiasticas, li-
 bro 3. fol. 124.
Cuenta de vnas perdices
 q̄ cõprò vno, li. 4 fo. 349.
Cuenra q̄ dizen de la for-
 tija, lib. 9. fo. 349.
Culcus, l. 8. fo. 317.
Cuerpo en geometria co-
 mo se define, li. 4. fo. 10.
Cruzados Portugueses 12
 duzirlos a marauedis,
 lib. 6. fol. 215.

D

D. vale quinientos, lib. 8.
 fol. 306.
Declaracion de vn passo
 de Macrobio del setimo
 de los Saturnales, lib. 3.
 fol. 309.
Declaracion de otros pas-
 sos

T A B L A.

- fos de Plinio, y Juvenal. ibid.
 Decús, peso de onze onças, lib. 8. fol. 611.
 Deculis valia quaréta marabedis, li. 8. f. 612.
 Definicion del numero, lib. 1. f. 2.
 Demandas para exercitar las quatro reglas generales de Arithmetica, lib. 2. fol. 203.
 Demãdas diferentes proporcionales. lib. 5. fol. 351.
 Demandas en que se conoce ser imposible. lib. 7. fol. 527.
 Demandas en que se conoce si tienen mas que vna respuesta, lib. 7. f. 529.
 Demandas para declaraciõ de la primera igualdad simple de dos cantidades, lib. 7. f. 539.
 Demandas para declaracion de la segunda igualdad simple de los
- cantidades, libr. 7. fol. 554.
 Demandas para declaracion de la tercera igualdad simple de dos cantidades. libro 7. fol. 558.
 Demandas para declaracion de la igualdad simple de dos cantidades, libro 7. folio 560.
 Demandas para declaraciõ de la primera igualdad compuesta de tres cantidades, lib. 7. fol. 566.
 Demandas para declaraciõ de la segunda igualdad, cõpuesta de tres cantidades, lib. 7. f. 572.
 Demandas para declaraciõ de la tercera igualdad, cõpuesta de tres cantidades, l. folio 574.
 Demandas para declaracion de algunas annotations pertenecieu

T A B L A.

- tres para la regla de la
cosa, lib. 7. fo. 576.
- Denarius vale quatro ma
rauedis, lib. octauo, fo.
612.
- Denario, li. 8. fo. 611.
- De dos omas quebrados
saber qual es mayor,
lib. 2. fol. 611.
- Denominador en que-
dos que es, lib. 2. f. 125
- Denominacion de pro-
porciones que es, lib.
5. fo. 327.
- Deux lo mismo que de
cuns, lib. 8. fo. 611.
- Decuens onze onças es
lo mismo que deusx,
ibidem.
- Dextans, lib. octauo ibi-
dem.
- Diaulus, medida de pies
lib. 8. fo. 620.
- Dia que es, lib. octauo f.
631.
- Dia natural, lib. octauo
fo. 633.
- Dia artificial, lib. octauo
ibidem.
- Dia como le comiençan
muchos diferente mé-
te, ibidem.
- Diametro como se halla
por la circunferencia,
lib. 4. fo. 301.
- Didrachmalis, lib. 8. 612
- Diapason. li. 5. fo. 365.
- Diapente, li. 5. ibidem.
- Diateffaron, lib. 5. f. 367.
- Diadrahmium, lib. 8. fo.
615.
- Diferencias de quebra-
dos ay dos, libro. 2. fo.
717.
- Diobulos, lib. 8. fo. 615.
- Dinero burgales, lib. 8.
fo. 619,
- Dinero de Valencia, lib.
9. fo. 619. lib. 6. fo. 392.
- Dinero de ley en plata
que es, lib. 3. fo. 277.
- Dissonancia lib. 5. f. 361.
- Disiuncto o residuo que
es, lib. 7. fo. 510. & 513.
- Dineros reduzirlos a ma-
rauedis, libro 6. folio
410.
- Dixono, lib. 5. fo. 367.

T A B L A.

- Diuidir herencias en par
 tes desiguales, libro. 3.
 fol. 257.
- Diuision del numero, li-
 bro 1. fol. 3.
- Diuerfos caracteres de
 numeros que vsaron
 los Romanos, libro 8.
 fo. 505.
- Dipondius, libro octauo
 fol. 610. vale ocho mara-
 uedis.
- Doblas Castellanas, lib.
 8. fol. 618.
- Doblas antiguas, libro. 8
 fol. 618.
- Doblas que dizen de ca-
 beça. ibidem.
- Doblas moriscas, libr. 8.
 ibidem.
- Doblas zaenes es lo mis-
 mo que doblas Moris-
 cas, lib. 8. ibidem.
- Doblas azenes es lo mis-
 mo que doblas zaenes
 libro 8. ibidem.
- Doblonos reduzirlos a
 marauedis. libr. sexto,
 fo. 396.
- Doblas zaenes reduzir
 las a marauedis, lib. 6.
 fol. 398.
- Doblar todo genero de
 rayzes, li. 7. fo. 453.
- D. odrans lib. 8. fo. 610
- Dozena consonãcia de
 Musica, libro quinto
 fol. 371.
- Dos caminãtes que co-
 medidas diferentes,
 partierõ cierto vino
 libro 9. fol. 673.
- Ducados reduzirlos a
 marauedis, li. 6. f. 380.
- Drachma. lib. 8. fo. 420.
 620. 624.
- ### E
- Edades del mundo, li. 8
 fol. 625.
- Efetos de cantidades
 proporcionales, lib. 5.
 fol. 339.
- Emiscella, lib. 8. f. 620.
- En ladrillar aposentos,
 lib. 4. fo. 307.
- En losar aposentos, li. 4
 fo. 696.
- Enteros como se reduzẽ
 aque-

T A B L A.

- quebrados, li. 2. fo. 143.
 Enteros como se assiétá
 có quebrados, li. fo. 147
 Eno lib. 8. fol. 627.
 Estadio, lib. 8. f. 620
 Estio que meses trae, li.
 8. fol. 629.
- F
- Falsas posiciones, lib. 3.
 fol. 263.
 Figura en Geometria, q̄
 es, lib. 4. fol. 297.
 Figuras, o caracteres de
 Arithmetica, lib. 1. fo. 3
 Figuras, o caracteres de
 cuenta Castellano li. 1.
 fo. 15.
 Figuras Geometricas va
 rias, lib. 4. fol. 297.
 Fineças de oro y plata,
 lib. 3. fol. 275.
 Fin en los numeros no le
 ay, lib. 1. fol. 5.
 Franco valia diez reales
 lib. 8. 618.
 Fundamento de la Arith
 metica es la vnidad,
 lib. 1. fol. 1.
 Fundaméto en la Geome
- tria q̄ es, lib. 4. fo. 295.
- G
- Geometria como se defi
 ne, lib. 4. fol. 295.
 Generos de proporción
 son cinco. lib. 5. fol. 32
 Godos como contauan,
 lib. 8. fol. 605.
 Grano de fineça de oro
 que es, lib. 3. fol. 275.
 Grano quando es peso, q̄
 parte es del marco, li. 3.
 fol. 275.
 Griegos que caracteres
 de numeros vsaron, lib.
 8. fol. 603.
- H
- Hanega de trigo quátos
 granos tiene li. 9. f. 608.
 Harmonica proporciona
 lidad, lib. 5. fol. 333.
 Helmuayr. figura de Geo
 metria, lib. 4. fo. 299.
 Helmuarife, que figuras
 senombran assi, lib. 4.
 fo. 614.
 Hebreos, q̄ caracteres
 de numeros vsaron li. 8
 fo. 603.

Hemina, lib. 8. fo. 622.
Hereditades como se mi-
den, lib. 4. fo. 305.
Huevos que le quebrarõ
a vna muger, li. 9. f. 673.

I

I. vale vno, lib. 8. fo. 304.
Iano como le figurauan
los antiguos li. 8. f. 606.
Idus como se cuenta con
ellos, lib. 8. fo. 636.
Iutos, o censos como se
compran, libr. 1. fo. 119.
Indiction, li. 8 fo. 627.
Inuierno que meseste tre,
lib. 8. fo. 629.
Inuentor de las consonã-
cias de musica fue Phy-
thagoras, libr. 1. fo. 365.
Inuentores de la Arith-
metica, lib. 1. fo. 7.
Inuctores de la geome-
tria, lib. 4. fol. 295.
IX. vale nueue, l. f. 597.

K

Kalendas como se cuenta
lib. 8. fo. 636.

L

Ley de los oros, lib. 3.
fo. 278.
Ley q̄ comieça, Sitalaf
criptum sit. li. 3. f. 249.
Ley q̄ comieça. Sitalaf
criptu fuerit ff. de hæ.
instituendis. li. 3. fo. 151
Ley interdũ §. Si pater
familias, lib. 3. fo. 255.
L. vale 50. li. 8. fo. 645.
Letras, o carateres de la
Arimerica, lib. 1. fo. 3.
Letras q̄ se ponen en el
lib. sept. por dictiones
lib. 7. fol. 436.
Libella es lo mismo q̄
as, lib. 8. fo. 611.
Libra se toma por as,
lib. 3. fo. 246. 625.
Ligula, libro 8. fo. 623.
Linea como se define, li-
bro. 4. fol. 295.
Linea recta, li. 4. fo. 95.
Linea curua, li. 4. f. 295.
Linea perpendicular,
lib. 4. fo. 301.
Lunes toma denomina-
ciõ de Luna, l. 8. f. 597.
Luf.

T A B L A.

Lustrum, libro. 8. fo. 627.

M

- Magnitudo porque se en
tiende, lib. 5. fol. 627.
- Marauedis reduzirlos, o
hazerlos ducados, li. 6.
fol. 384.
- Marauedis reduzirlos en
otra qualquier moneda
lib. 6. fo. 388.
- Marauedis reduzirlos a
doblonos, lib. 6. fo. 406.
- Marauedis reduzirlos a
doblaszaene s. l. 6. f. 398
- Marauedis reduzirlos a
reales de a 24. li. 6. f. 597
- Marauedis reduzirlos a
quartillos, li. 6. fo. 403.
- Marauedis reduzirlos a
medios reales, l. 6. f. 403
- Marauedis reduzirlos a
reales de a 2. l. 6. f. 406.
- Marauedis reduzirlos a
reales de a 2. li. 4. f. 601.
- Marauedis reduzirlos a
reales de a 4. y de a 8.
lib. 6. fo. 406.
- Marauedis reduzirlos a
tarjas de 20. l. 6. fo. 408.
- Marauedis reduzirlos a
tarjas de a 9. i. 6. fo. 408
- Marauedis reduzirlos a
tarjas de a 4 l. fol. 410.
- Marauedis reduzirlos a
ardites, lib. 6 fol. 40.
- Marauedis reduzirlos a
quartos de a dos, lib. 6.
fol. 410.
- Marauedis reduzirlos a
dineros de a tres blan-
cas, lib. 6 fo. 606.
- Marauedis reduzirlos a
blancas, lib. 6. fol. 412.
- Marauedis reduzirlos a
cornados, li. 6. fo. 412.
- Marauedis reduzirlos a
cruzados Portugueses,
lib. 6 fo. 426.
- Marauedi nuestro en q̄
monedas se diuiden, li. 8
fol. 616.
- Marauedi viejo que va-
lia, lib. 8. fol. 616.
- Marauedi bueno que era
libro. 8 fol. 618.
- Marauedi de oro, libr. 8.
fol. 618.
- Marauedi blanco, lib. 8.
fol.

fo. 618.
Mansio significa la jornada, libro, 8. fo. 622.
Marco de oro quanto vale, libro. 3. fo. 275.
Marco de plata quanto vale, lib. 3. fo. 285.
Mathematicas que arte son. li. 1. fol. 1.
Meaja que moneda era libro 8. fo. 616.
Meaja de oro, l. 8. f. 618
Medicamêto cõpuesto como se sabe si es calido ofrigido, sabiendo los grados de sus simples, lib. 3. fo. 293.
Medir heredades, lib. 4. fo. 305.
Medir alturas cõ espejo o agua, li. 4. f. 305. 307.
Medir anchuras de rios lib. 4. fo. 306,
Medir tierras l. 4. f. 307
Medir ciculos, l. 4. f. 307
Medio armanico como se halla entre dos extremos, libro quinto fo. 333.

Medio Arithmetico. li. 5 fo. 333
Medio Geometrico, li. 5. fo. 335. 337.
Medio marauedi. lib. 8. fo. 619.
Medimnus, libro octauo fo. 622.
Memisis, lib. 8. fol. 614.
Mes de do se dize, lib. 8. fo. 629.
Mes lunar, lib. 8. fo. 629.
Mensis peragratiõnis. libro 8. idem.
Mensis coniunctionis. libro 8. fo. 631.
Mensis apparitionis, libro 8. fo. 631.
Mes solar, lib. 8. ibidem.
Mes vsual, lib. 8. ibidem.
Meses del año son doze, lib. 8. ibidem.
Mezclar oros diferentes lib. 3. fo. 277.
Mercadurias, como se mezclan, lib. 3. fo. 289.
Medico que Caracteres vsa en sus receptas, libro 8. fo. 624.

- I A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z
- Metreta. l. 8. fol. 624.
Metal quanto valia. libr. 8. fol. 618.
Mina es lo mismo q mna l. 8. fol. 618.
Minuto es el q dicen vn cia tiempo. l. 8. fo. 636.
Mistrum magnum. libr. 8. fol. 624.
Mistrum parum, libr. 8. fol. 624.
Mitad, y tercia y quarto de vn numero como se saca, libr. 9. fol. 657.
Mitad como se saca de qualquier rayz, libr. 7. folio. 453.
Mil como se figura cõ di uersos caracteres, libr. 8. fol. 599.
Milla que quiere dezir, libr. 8. 8. fol. 620.
Monedas antiguas Espa ñolas, libr. 8. fol. 616.
Moneda vieja. l. 8. 616.
Moneda Burgales, libr. 8. fo. 618.
Moneda de los Agnus Dei, libr. 8. fol. 618.
Modius, libr. 7. fol. 624.
Modio es lo mismo que modius, libr. 8. fol. 624.
Modio medida de cosa li quida cabe diez, y diez sextarios, libr. 8. fo. 624.
Môto de reales, o tâto como se sabe quãtos a sabido la proporciõ d su procreaciõ. l. 9. f. 715.
Modiulus, libr. 8. fol. 624.
Momento de tiempo, libr. 8. fol. 618.
Moruis Alfonsoes, mone da era, libr. 8. fol. 618.
Muros o paredes, saber las piedras o ladrillos, q han menester segun su largor, altor, y anchor, libr. 4. fol. 307.
Multiplex proporciõ. li. libr. 5. fol. 321.
Multiplex super particu laris, libro. 5. folio 321.
Multiplex super partiens libr. 5 fol. 323.
Multiplicar con breue dad por numeros arti culos

T A B L A.

- culos, libr. 1. f. 59.
- Multiplicar de memoria, libr. 1. fol. 33. lib. 6. f. 410. 416
- Multiplicar por otro modo, libr. 1. f. 63.
- Multiplicar pesos, y medidas euitando quebrados, libr. 1. f. 63.
- Multiplicar con calculos, o getones, o contadores, libr. 1. f. 117.
- Multiplicar por numeros quebrados, libro 2. f. 170.
- Multiplicar proporciones, libr. 5. f. 329.
- Multiplicar numeros cuadrados, libr. 7. f. 455.
- Multiplicar numeros cubicos, libr. 7. f. 409.
- Multiplicar numeros cubicos por numeros cuadrados, y al contrario, libr. 7. f. 408.
- Multiplicar numeros dos vezes quadrados, que por otro nombre se dicen numeros media-
- les, libr. 7. f. 487.
- Multiplicar caracteres lib. 7 f. 495.
- Multiplicar rayzes vniuersales, libro septimo, f. 596. 515
- Multiplicar binomios, lib. 7. f. 521.
- Multiplicando vn numero por otros, si el vltimo producto se partiese por el numero que primero fue multiplicado, como se sabra quanto vendra al quociente, lib. 9. f. 67.
- Mna es lo mismo que mana, libr. 8. f. 614.
- N
- Naranjas q̄ repartio vno a tres criados, libro. 9. fol. 669. 671.
- Noche, libr. 8. f. 633.
- Noche se diuide en vigi-
lias, y otras partes, lib. 8. f. 633.
- Nombres de los meses, lib. 8. f. 629.
- Nõbres diuersos del dia

T A B L A.

- lib. 8. fo. 633.
 Nombres para saber el valor de los numeros, li. 1. fo. 5.
 Nombrar numeros quebrados, li. 2. f. 129. 125.
 Nonas como se cuentan, li. 8. fo. 677.
 Notas y auisos de partir lib. 1. fo. 85.
 Notas y auisos para sumar, lib. 1. f. 21.
 Nouen moneda era antigua, lib. 8. fo. 618.
 Numus vale diez maravedis, lib. 8. fo. 612.
 Numisma es nombre general de toda moneda, lib. 8, fo. 609.
 Numerar el saber el valor de todo numero, libro 1. fo. 7.
 Numerador que quiere dezir, o quebrados, lib. 2. fo. 125.
 Numero como se define, y divide, lib. 1. fo. 3. li. 5 fo. 309.
 Numero digito que cosa es, li. 1. fo. 3.
 Numero articulo q̄ quiere dezir, ibidem.
 Numero compuesto omito, ibidem.
 Numero par, lib. 5. f. 109
 Numero pariter par lib. 5. 309.
 Numero pariter impar, lib. 5. f. 311.
 Numero impariter par, lib. 5. fo. 313.
 Numero impar, l. 5. f. 313
 Numero primo in compuesto, li. 5 fo. 915.
 Numero segundo in compuesto, li. 5. fo. 160.
 Numero superfluo, lib. 5. fo. 315.
 Numero superante, lib. 5 fo. 315.
 Numero diminuto, lib. 5 fo. 315.
 Numero perfeto, lib. 5. fo. 315.
 Numero superficial, lib 5 fol. 317
 Numero solido, li. 5. fo. lio 317.

T A B L A.

- Numero triangular, li. 5. fol. 317.
- Numero quadrado. li. 5. fol. 319. libr. 7. fo. 437.
- Numero cubo, o cubico, lib. 5. fo. 319. li. 7. f. 461.
- Numero circular. lib. 5. fol. 319.
- Numero comunitante, como se halla, libro 5. fo. 343.
- Numero quebrado, o roto, lib. 2. fol. 123.
- Numero es infinito, lib. 1. fo. 5.
- Numero simple, porque se toma en esta, libr. 7. fo. 453.
- Numero medial, libro. 7. fo. 482.
- Numero dos vezes quadrado, lib. 7. fo. 482.
- Numero de yguualaciones, lib. 7. fo. 585.
- O
- Oculus, li. 8, fo. 613. 614. 620. 625.
- Ochofen, lib. 8, fo. 618.
- Oculus, lib. 8. fo. 613.
- Olca vnos lo toman por tres escrupulos, o por drachma, lib. 8. fo. 625.
- Olimpia, lib. 8. f. 627.
- Onzena consonancia, de musica, l. 5. fo. 371.
- Origen delos quebrados lib. 2. f. 123.
- Origen de las proporciones de las consonancias, de musica, lib. 5. f. 373.
- Orthogonia figura, lib. 4. fol. 269.
- Otoño que meses trae, libro 8. f. 629.
- Oxigonia figura en geometria, lib. 4. fo. 299.
- P
- Para llelogramo que figura es de geometria, lib. 4. fo. 299. 303.
- Partes proporcionales entre dos extremos, como se facan, li. 5. f. 337
- Parte aliquota que es, libro 5. fo. 311.
- Partes, ovigilias dela noche, lib. 8. fo. 633.

T A B L A.

- Palmo, libr. 8. fo. 619.
 Para fanga que distancia
 sea, lib. 8. fol. 622.
 Passo quantos pies tiene
 lib. 8. fol. 620.
 Partes de A\$, assi lib. 3.
 fo. 247. lib. 8. f. 609.
 Partir por numeros ente-
 ros, lib. 1. fo. 65.
 Partir de muchos mo-
 dos, lib. 1. fo. 85.
 Partir numeros quadra-
 dos, lib. 2. f. 183.
 Partir herencias en par-
 tes diferētes, li. 3. f. 243.
 Partir por numeros que
 brados, lib. 7. fo. 263.
 Partir numeros cubicos,
 lib. 7. fo. 477.
 Partir numeros cubicos
 por numeros quadra-
 dos, lib. 7. fo. 480.
 Partir numeros dos ve-
 zes quadrados dichos
 por otro nombre nume-
 ros mediales, l. f. 487.
 Partir caracteres, lib. 7.
 fo. 502.
 Partir binomios, l. 7. 523
 Partir rayzes vniuersales
 lib. 7. fo. 595.
 Partir proporciones, lib.
 5. fo. 331.
 Perdizes q̄ cóprò vno pa-
 ra ganar, b oluendolas
 a véder al precio de lo
 q̄ las cóprò, lib. 9. f. 668.
 Perpendicular como se
 halla en vn triangulo,
 lib. 4. fol. 303. 305.
 Pelea, o cótienda, o bata-
 lla de numeros, l. 5. 373.
 Pecunia se extiende a to-
 da moneda, y hazienda,
 li. 8. fo. 609.
 Pepion que moneda era
 lib. 8. fol. 620.
 Pes, es la sexta parte del
 cuerpo humano, libr. 8.
 fo. 620.
 Pesa q̄ quebrò vno con q̄
 vèd a h gos, li. 9. fo. 677
 Pythagoras inuentor de
 las consonancias de mu-
 sica, lib. 5. fo. 560.
 Potécia en numeros, por
 que se entiende, libr. 7.
 fo. 453.

T A B L A.

- Pozos como se aueriguã sus cuentas, li. 9. fo. 662
- Pondus, o libra se toma por As, lib. 3. fo. 247.
- Portio circuli, que es, libro 4. fo. 297.
- Portio maior, li. 4. fo. 299
- Portio minor, li. 4. fo. 299
- Pondo lo mismo es que As o libella, li. 8. fo. 611.
- Pondo lo mismo es que assi pondium, li. octauo fol. 611.
- Punto de tiempo que es, lib. 8. fo. 637.
- Punto es fundamento de la Geometrica, libr. 4. fol. 295.
- Pujas deretas, li. 3. f. 257.
- Pulgada, lib. 8. fo. 618.
- Plata como se sube y baxa sus dineros de ley, libro 3. f. 289.
- Plata quebrada llamã la plata por labrar, libr. 8. fo. 618.
- Presupuestos, o principios para la Arithmetica, lib. 1, fo. 7.
- Presupuestos para operacion de numeros quebrados, li. 2. f. 123.
- Preposiciones para las reglas generales, libr. 1. fol. 17.
- Prestar dinero, y que gane el interese como el caudal, lib. 1. fo. 122.
- Prieto que moneda era, lib. 8. fol. 618.
- Prima hora quando comienza, libr. 8. fo. 638.
- Principios para operacion de los numeros q̄brados, libr. 2. fo. 637.
- Progresiones q̄ cola es, y de que siruẽ, lib. prime ro, fo. 91.
- Producto, que quiere decir, lib. 1. fo. 46.
- Proporcion como se diu de y define, li. 5. f. 321.
- Proporcion en quebrados, lib. 5. fo. 329.
- Proporcionalidad, libr. 5 fo. 333.
- Proporcionalidad Harmonica, lib. 5. fol. 333.

T A B L A:

- Proporcionalidad arif-
 metica, lib. 5. f. 333.
 Proporcionalidad Geo-
 metrica, lib. 5. f. 335.
 Proportio æqualis, lib. 5.
 f. 321. o igual.
 Proportio inæqualis, o
 in igual, lib. 5. f. 321.
 Proporción mayor in
 igual, lib. 5. f. 321. 325.
 Proporción menor in
 igual, lib. 5. f. 321. 323.
 Proporciones de las con-
 fonancias simples de mu-
 sica, lib. 5. f. 365.
 Proporciones de las cõ-
 sonancias cõpuestas de
 musica, lib. 5. f. 367.
 Propriedades de canti-
 dades proporcionales,
 lib. 5. f. 341.
 Propriedades de canti-
 dades binomiales, libr.
 5. fol. 345.
 Proporcionar numeros
 en qualquiera propo-
 cion, lib. 5. f. 329.
 Prueba real en el sumar,
 lib. 1. f. 41.
 Prueba real del restar, li.
 1. f. 41.
 Prueba real del multipli-
 car, lib. 1. f. 89.
 Prueba real del partir, li.
 1. f. 89.
 Pruebas de 3. 5. 7. 9. y sus
 semejantes para todas
 quatro las reglas gene-
 rales, lib. 1. f. 97.
 Prueba de abreviar que-
 brados, lib. 2. fol. 135.
 Pruebas de reduzir que-
 brados, li. 2. f. 163.
 Prueba de sumar de que-
 brados, lib. 2. f. 169.
 Prueba del restar de que-
 brados, li. 2. f. 177. 179.
 Pruebas de otro modo
 para el sumar, y restar
 de quebrados, libro. 2.
 fol. 177. 179.
 Prueba del multiplicar
 de quebrados, libro. 2.
 fol. 197.
 Prueba del partir quebra-
 dos, lib. 2. f. 199.
 Pruebas de las reglas de
 tres, lib. 3. f. 217.

T A B L A.

- Prueua de las reglas de
compañia, son las mis-
mas que las de las re-
glas de tres, lib. terce-
ro, fol. 217.
- Prueua de las quatro re-
glas generales de pro-
porcion, lib. 5. f. 333.
- Prueuas de las quatro re-
glas generales de todas
las rayxes, libro septi-
mo, f. 506.
- Prueua de las quatro re-
glas generales de cha-
racteres, o cantidades
proporcionales, libro 7
fol. 490.
- Prueuas de las quatro re-
glas generales de bino-
mios, li. 7. fo. 329.
- Q**uadrado que figura es
en Geometria, li. 4. 299.
- Quantidad continua se
trata en la Geometria
lib. 5. fo. 309.
- Quantidad discreta se tra-
ta en los numeros, li. 5.
fol. 309.
- Quantidad immobil, li-
bro 5. f. 309.
- Quantidad mobil, lib. 5.
fo. 309.
- Quadrar vn numero, que
quiere dezir, li. 7. f. 453.
- Quadrado de vn numero
que es, li. 7. fo. 453.
- Quadrans es quarta par-
te del As, li. 8. fol. 617.
- Quadrans en el tiempo,
es 6. horas, lib. 8. f. 635.
- Quarta en la onça que va
le lib. 5. fo. 275.
- Quarta menor en musica
que es lib. 5. f. 397.
- Quarta mayor imperfe-
ta, lib. 5. f. 369.
- Quarta parte como se fa-
ca de numeros quadra-
dos, lib. 7. f. 453.
- Quatro reglas que abra-
çan todas las ygalacio-
nes de arte mayor, lib.
7. fo. 585.
- Quatro téporas del año,
quando caen, l. 8. f. 629.
- Quatro tiempos del año,
lib. 8. f. 629.

T A B L A.

- Quadrantal** es lo mismo q̄ vrna, li. 8. f. 622.
Quartarius, lib. 8. f. 623.
Quartos de aquatro, re-
 reduzirlos a marauedis
 lib. 6. f. 410.
Quaréta pieças si en tres
 las repartieffen, toman-
 do cada vno las q̄ mas
 pudieffe, saber por nu-
 meros quãtas toma ca-
 da vno, lib. 9. fol. 700.
Quebrado como se defi-
 ne, lib. 2. f. 123.
Quebrado como se nom-
 bra, y assienta en figura
 lib. 2. f. 125. 129.
Quebrado simple, que es
 lib. 2. fo. 129.
Quebrado compuesto q̄
 quiere dezir, li. 2. f. 129.
Quebrado de quebrado,
 que quiere dezir, lib. 2.
 f. 199. 201. 205.
Quebrado quo y como se
 haze entero, lib. 2. f. 145.
Quebrado como se re-
 duze en otra denomina-
 cion, lib. 2. f. 149.
Quebrado como se acre-
 cienta, o abreuia su de-
 nominacion, li. 2. f. 149.
Questiõ sobre saber quã-
 to es la mitad de doze
 lib. 9. f. 655.
Questiõ sobre el medir,
 o atar cõ cuerdas, li. 9.
 f. 659.
Question sobre apreciar
 obras de poços, o de
 tapicerias, lib. 9. f. 665.
Questiõ en que se cono-
 ce no tener respuesta,
 lib. 7. f. 527.
Questiõ sobre el tomar
 tantos en la mano, lib.
 9. f. 703.
Question sobre mandar
 tomar en la memoria
 vn numero. li. 9. f. 705.
Quinto y tercio como se
 saca de vna herencia,
 lib. 3. f. 253. 254. 256.
Quinta menor en musi-
 ca, q̄ quiere dezir, lib. 5
 fol. 396.
Quincuns, li. 8. f. 611.
Quinari, lib. 8. fo. 612.

T A B L A.

Quintilis, es Iulio, lib. 8
fol. 631.

Quilate en el oro que significa. li. 3. f. 111.

Quociente q̄ quiere dezir. lib. 1. f. 65.

R

Rayz q̄ cosa es, y como se saca. lib. 7. f. 437.

Rayz quadrada de quebrados como se saca, libro 7. f. 450.

Rayz quadrada como se saca de numeros enteros y quebrados juntamente, lib. 7. f. 451.

Rayz quadrada como se suma cō otra. l. 7. f. 455.

Rayz cubica como se saca, lib. 7. f. 465.

Rayz cubica de quebrados, como se saca, lib. 7. fo. 469.

Rayz cubica como se saca juntamente de numeros enteros y quebrados, lib. 7. fo. 473.

Rayz quadrada como se saca de caracteres, o

de cantidades proporcionales. lib. 7. fol. 505.

Rayz con los binomios, quando se antepone al numero, y quando no, lib. 7. fo. 506.

Rayz quadrada como se saca de los binomios lib. 7. f. 513.

Rayz cubica como se saca de binomios, l. 7. f. 517

Rayz vniuersal, que quiere dezir, libr. 7. fo. 395.

Rees, o reaes, dize el Portugues al marauedi, libro 6. fo. 424.

Raes, es marauedi acerca de Portugueses, li. 6. fol. 424.

Reales de a 34. reducirlos a marauedis, lib. 6. fo. 403.

Recopilaciō de todas las ygualizaciones en quatro reglas, li. 7. f. 585.

Reducir qualquiera moneda en otra, l. 6. f. 406.

Reducir toda moneda mayor a otra menor,

T A B L A.

- Reduzir monedas a ma-
 raucdis, libr. 6. fo. 392.
 Reduz r muchos quebra
 dos diferentes a vna
 comun denominacion
 lib. 2. f. 151.
 Reglas de testamento, o
 partijas, lib. 3. fo. 239.
 Reglas de particiones de
 herencias, lib. 3. fo. 239.
 Regla de tres simple, l. 3
 fol. 217.
 Regla de tres mixta, lib.
 3. fo. 229.
 Regla de tres por nume-
 ros quebrados, l. 3. f. 222
 Regla de compañia sim-
 ple, o sin tiépo, l. 3. f. 233
 Regla de compañia mix-
 ta, o con tiempo, libr. 3.
 fo. 235.
 Reglas generales de Ari-
 thmetica son 4. y pue-
 den ser dos, lib. 1. fo. 21.
 Reglas calculatorias, l. 1
 fol. 117.
 Regla de la cosa, o arte
 mayor, lib. 7. fo. 233.
 Regla del cos, es lo mis-
 mo q̄ regla de la cosa,
 lib. 7. f. 233.
 Reglas reales, es lo mis-
 mo que regla de la co-
 sa, li. 7. f. 233.
 Reglas n̄ ayores, es lo
 mismo que regla de la
 cosa, lib. 7. fo. 233.
 Regla de algebra, es lo
 mismo que la regla de
 la cosa. lib. 7. f. 233.
 Regla de Almucabalaes
 lo mismo que regla de
 la cosa. lib. 7. ibidem.
 Regla de la cantidad, li-
 bro 7. fo. 580.
 Regla de la segunda cosa
 es lo mismo q̄ regla de
 la cãtidad, lib. 7. f. 580.
 Reglas para saber por pre-
 guntas el numero q̄vno
 imaginare en su memo-
 ria, li. 9. fo. 692.
 Reduzir monedas en o-
 tras, lib. 1. fo. 117.
 Reduzir enteros en que-
 brados, libr. 2. fo. 143.
 Reduzir quebrados en
 enteros, li. 2. f. 145.

T A B L A.

- Reduzir vn quebrado de vna denominacion a otra qualquiera, libr. 2. fol. 143.
 Reduzir quebrados diferentes a vna denominacion, lib. 2. fol. 151.
 Remissa que cosa es en musica, lib. 5. fol. 369.
 Restar monedas de vna especie, lib. 1. fol. 27.
 Restar de muchos modos, lib. 1. fol. 35.
 Restar cosas diferentes como pesos, o medidas lib. 1. fol. 36.
 Restar con calculos, geones, o contadores li. 1. fol. 115.
 Restar por numeros quebrados, lib. 2. fol. 171.
 Restar proporciones, li. 5. fol. 329.
 Restar numeros quadrados, lib. 7. fol. 457.
 Restar numeros cubicos lib. 7. fol. 477.
 Restar numeros quadrados y cubicos, libro. 7. folio. 481.
 Restar numeros dos vezes quadrados, o numeros mediales, libro 7. fol. 484. 486.
 Restar caracteres o cantidades proporcionales, lib. 7. fol. 591.
 Restar rayzes vniuersales, lib. 7. fol. 494.
 Restar binomios, libr. 7. fol. 521.
 Residuo que quiere dezir, o disito, li. 7. f. 509.
 Richmimachia es vnapelea de numeros, lib. 5. fol. 372.
- ## S
- Se denota mitad de alguna cosa, li. 8. f. 613. 624.
 Saber el valor de toto numero, lib. 1. fol. 7.
 Saber el valor de todo quebrado, lib. 2. fol. 129.
 Saber de dos quebrados qual es mayor, libro. 2. fol. 149.
 Sabbathu se toma por la semana, lib. 8. fol. 631.

T A B L A.

- Sacar rayz quadrada, li-
bro 7. f. 440.
- Salarios de criados, lib.
6. fol. 418.
- Sathum, lib. 8. f. 317.
- Semicirculo que es, li. 4.
fol. 297.
- Semiditono, lib. 5. f. 363.
- Semidrachnio, lib. octa-
uoo, f. 614.
- Semana, lib. 8. f. 631.
- Semitono mayor incãta
ble, lib. 5. f. 367.
- Semitono menor canta-
ble, lib. 5. fo. 367.
- Semis, sis. La mitad de to-
da cosa, libr. 8. fol. 611.
- Semi. Lo mismo es que
semis, sis, libr. 8. f. 611.
- Semodius, lib. 8. f. 622.
- Simiuncia. Por corona-
do, o centi Portugues
lib. 8. f. 611.
- Septima mayor en musi-
ca, l. b. 3. f. 369.
- Septima menor. lib. 3.
fo. 369.
- Septunx, catorze corna-
dos, o siete onças, li. 8.
- fo. 611.
- Sextertium neutro, lib. 8
fo. 613.
- Sexta mayor en musica,
lib. 3. f. 369.
- Sexta menor, li. 5. f. 369.
- Sextula, libr. 8. fo. 616.
- Sextale. Por el Castella-
no, lib. 8. fo. 614.
- Sextarius. Es dos onzas
mayor q̄ nuestro quar-
tillo, lib. 8. f. 624.
- Sexcuns, o fescuns. Tres
cornados, lib. 8. fo. 611.
- Sextãs quatro cornados,
lib. 8. f. 611.
- Sextario, vale dos hemi-
nas, es lo mismo q̄ Sex-
tarius, libr. 8. fo. 622.
- Sexquimodios, quatro
celemines, lib. 8. f. 622.
- Sexticula. Lo mismo es
q̄ Sextula, lib. 8. fo. 616.
- Sextilis dezian los anti-
guos al mes de Agosto,
libro, 8. f. 613.
- Siglo, lib. 8. fo. 627.
- Siliqua, li. 8. fo. 614.
- Siclo valia 360. maraue-
dis

T A B L A.

- dis. lib. 8. f. 616.
- Sicilius. lib. 8. fo. 620.
- Solido, li. 8. fo. 633. Es lo
q̄ dezimos Catellano.
- Sollitio, lib. 8. fo. 629.
- Sonancia q̄ es, li. 5. f. 361.
- Sumar cosas de vn espe-
cie, lib. 1. fo. 16.
- Sumar cosas diferentes,
como pesos o medidas,
lib. 1. fo. 23.
- Sumar de progresiones
lib. 1. fo. 61.
- Sumar con calculos, o cõ
radores, o getones, lib.
1. fo. 111.
- Sumar numeros quebra-
dos, lib. 1. fo. 161.
- Sumar proporciones, li-
bro 6. fo. 327.
- Sumar proporciones de
consonancias de musi-
ca, lib. 5. fol. 371.
- Sumar numeros quadra-
dos, lib. 7. fo. 257.
- Sumar numeros cubicos
lib. 7. fol. 477.
- Sumar numeros quadra-
dos y cubicos, libro 7.
- fo. 478.
- Sumar numeros quadra-
dos dos vezes, que son
numeros, que dezimos
mediales. 1. 7. f. 487. 574
- Sumar caracteres, o can-
tidades proporcionales
lib. 7. fo. 490.
- Sumar binomios, lib. 7.
fo. 519.
- Sumar residuos, libro. 7.
fo. 519.
- Sumar rayzes vniuersa-
les, lib. 7. fo. 591.
- Sueldo Burgales, libr. 8.
fo. 618.
- Sueldo bueno es lo mis-
mo que el Burgales, li-
bro 8. fo. 424.
- Sueldo menor li. 8. f. 618
- Suertes como se echan
por numeros, li. 9. f. 687
- Superficies en Geome-
tria, lib. 4. f. 295.
- Superficies producto en
el, lib. 5. fo. 339.
- Superficies plana, lib. 4.
fol. 295.
- Superficies concaua, lib.

T A B L A.

4. fo. 295.
 Superficies conuexa, libro 4. fo. 295.
 Super particularis proportio, lib. 5. fo. 321.
 Superpartiens proportio lib. 5. fo. 323.
 Species en Arithmetica, q̄ cosa es, y quantas son lib. 2. fo. 1.
 Stadium, lib. 8. fo. 620.
 St. t o. ibidem.
 Stater. Es lo mismo q̄ mina, o libra, li. 8. fo. 614.
 Stater Daricus, 616
 Stater Philippicus, lib. 8 fo. 616.
 Stater de oro, ibidem.
 Schœnus, lib. 8. fo. 622.
 Scrupulus, lib. 8. fo. 616.
 Speculatiua Arithmetica lib. 5, fo. 269.
 Stipendium, li. 8. fo. 609.
- T
- Tabla para multiplicar, lib. 1. f. 43.
 Talentum Atheniense, libro 8. fo. 616.
 Talentum Babilonicum, lib. 8. fo. 616.
 Talentum Sytiũ, ibidem
 Talentũ egyptiũ, ibidem
 Talentũ Rhodiũ, ib. dẽ.
 Talentũ Bizantiũ, ib. ibi:
 Talentũ Sanctuarium, libro 8. fo. 616.
 Talẽtum cõgregationis, ibidem.
 Talentum auri, valia poca cosa. lib. 8. fo. 618.
 Tarjas de a 20. reduzir las amarauedis. l. 6. 408
 Tarjas de a 9. reduzir las a marauedis. li. 6. fo. 603
 Tarjas de a quatro reduzirlas a marauedis, libro 6. fo. 409.
 Teruntius es marauedi nuestro, lib. 8. fo. 611.
 Tertio, y quinto como se saca en las herencias lib. 3. fo. 245.
 Tertia parte como se saca de numeros quadrados, o cubicos, lib. sepr. fo. 455.
 Tertia parte de doze como se saca, lib. 9. fo. 657
- Te.

T A B L A.

- Tejado quantas tejas tiene, lib. 9. fo. 671.
- Tetragono que figura es en geometria, li. 5. 299.
- Tetradrachmium, lib. 8 fo. 614.
- Tierras, o heredades como se miden, li. 4. f. 305
- Tiempo como se define, y diuide, lib. 8. fo. 625.
- Tomin, que peso es en el marco, li. 3. f. 275.
- Tono en musica, li. 5. 395
- Tornes moneda era antigua, li. 8. fo. 618.
- Telton moneda es Portuguesa, lib. 8. fo. 614.
- Tres joyas, si entre tres se repartiessen, saber por numeros con 24. tantos que joya toma cada persona, lib. 9. fo. 702.
- Tressis valia doze maravedis, lib. 8. f. 611.
- Tresemis, lib. 8. f. 614.
- Tremissa por medio maravedi, o meaja de oro, lib. 8. fo. 618.
- Treyntapieças, si tres las repartiessen tomando cada vno las que mas pudiesse, saber por numeros quantas toma cada vno, lib. 9 fo. 700.
- Triangulo, lib. 4. fo. 299.
- Triangulo como semide lib. 4 fo. 303.
- Triens, ocho cornados, lib. 8. fo. 611.
- Trimodius nuene celamines, li. 8. f. 622.
- Triobolus, lib. 8. fo. 614.
- Trino quarta mayor, libro 5. fo. 367.
- Trocar, o baratar mercaderias, li. 3. fo. 257. 259.

V

- V. vale cinco, lib. 8. f. 597.
- Valor de los caracteres o figuras de la Arithmetica, lib. 1. f. 3.
- Valor de las figuras de la cuenta Castellana, libro 1. fo. 7.
- Valor del quebrado como se sabe, lib. 2. fo. 129
- Valor de las monedas Castellanas, lib. 6. fo. 390.

T A B L A.

- Verano que meses tiene lib. 8. fol. 626. drantal, lib. 8. f. 622.
- Vesper es el luzero de la tarde, lib. 8. fol. 635. X
- Victoriatu, lib. 8. f. 613. X. vale diez, da se la causa porque, libr. 8. f. 597.
- Vigilias, lib. 8. f. 635. XC. vale nouenta, y porq̄ causa. libr. 8. f. 597.
- Vigefis, lib. 8. f. 613. Xestem es lo mismo que Sextarius, libr. 8. f. 624.
- Vlna, lib. 8. f. 620. Y
- Vncia en el tiempo, es lo que dizē momento, lib. 8. f. 637. Ygualacion que es, y que quiere dezir, li. 7. f. 524
- Vncia es duodecima parte del As, libr. 8. f. 611. Ygualaciones simple, q̄ es y quantas son, lib. 7. fol. 533.
318. 622, Vnidad es fundamento de la Arifmetica, l. 1. f. 1. Ygualaciones mixtas, o cōpuestas, libr. 7. f. 535.
- Vnidad no es numero, mas es su principio, y fundamento, libr. 1. f. 3. Ygualaciones demas que tres cantidades, libr. 7. f. 509.
- Vnisonus en musica, lib. 5. f. 371. Ygualaciones quãtas son libr. 7. f. 585.
- Vno que toma vna posada, libr. 9. f. 675. Z
- Vno que visita quatro pobres, libr. 9. f. 675. Zero de do se dize, y de que sirue en el guarismo, libro primero, f. 2. y f. 12.
- Vrna es lo mismo q̄ qua-

Fin de la Tabla.

T R A T A D E

LAS QUATRO ESPECIES,
o reglas generales de Arithmetica, pra-
ctica, por numeros enteros: conue-
ne a saber, Sumar, Restar,
Multiplicar, Par-
tir.

CAPITULO PRIMERO.

*De la difinicion, y diuision de la
Arithmetica.*

SENTENCIA Es de Tulio *Lib. 1.*
bien trillada de Escritores, y de los
Lectores, que toda qualquier *ofic.*
doctrina que se emprende de al-
guna cosa conforme a razon, ha
de començar por la difinicion:
para que mejor se entienda, que es de lo que
se disputa, y trata en la tal doctrina, o question.
Al qual precepto teniendo respeto quise aqui
por principio de este primero libro difinir que
cosa sea Arithmetica, y en quantas partes se di-
uida. Y ansi (que Arithmetica) vna de las
quatro Artes Mathematicas, que en Griego
A por

LIBRO PRIMERO.

*Defin.
Arith.*

por excelencia quiere dezir, disciplinas demon-
stratiuas, por la gran certidumbre que tienen, es-
ciencia, que trata de numeros: dicha por los Fi-
losofos, cantidad discreta: finalmente es vna ar-
te que nos muestra perfectamente contar. Cuya
deducion y etymologia por ser muy vulgar no
curo de la explicar muy expreso: mas de lo que
me parece ser necessario, para su perfeto enten-
dimiento. Dize se Arithmetica deste verbo Grie-
go, Arithmeo, que en nuestra lengua Española,
quiere dezir contar.

*De do
se dize
Arith-
metica.*

¶ Diuidese la Arithmetica en Theorica, y en
Practica. La Theorica trata de la naturaleza del
numero, y de su definicion, y diuision, y compa-
racion: de la qual escriuio Boecio cumplida y di-
ligentemente. La Practica trata la orden del in-
uestigar, y hallar los numeros dudosos deman-
dados, con el auxilio de la qual parte venimos
en conocimiento de lo que se ha de vsar cerca
de los tratos de la humana vida, para no defrau-
dar, ni ser defraudados.

*El fun-
dameto
del Ari-
thmeti-
ca.*

¶ El fundamento, o principio de la Arithmeti-
ca, es la vnidad, assi como el puto lo es de la Geo-
metria. Sus especies, o reglas generales, son qua-
tro, Sumar, Restar, Multiplicar, Partir. Podria-
mos dezir no ser mas que dos: conuiene a saber:
Sumar, y Restar: porque el multiplicar, se podra
reduzir al sumar, y el partir al restar, como se in-
fiere de la primera, y de otras muchas del 7. de

Euclides.

Euclides. Dezimos especies en Arithmetica ciertas formas, o modos de obrar por numeros: por causa de hallar algun numero incognito pedido. Dizen: reglas generales, porque con estas quatro reglas generalmente se hazen, y absueluen todas las reglas y questiones que por Arithmetica se pueden ofrecer. Assi como en la Dialectica las formas de los argumentos son comprehendidas en quatro especies. Cõuiene saber en sylogismo, induccion, enthymema, y exẽplo.

¶ Las letras, o figuras deste arte son diez: y no son mas, porque todos los numeros lleuan al numero de diez por fundamento, porq̃ sobre diez luego comiençan otra vez por la vnidad, dizen do onze, doze, treze, &c.

Porque no son mas de diez las figuras de Arith

Cap. II. De la definicion, y diuision del numero, segun practica

¶ En la 2. defini. del 7

Hemos definido el Arithmetica, diziendo q̃ es ciencia que trata de numeros: por tanto conuiene dezir que cosa sea numero, y como se engendra. ¶ Y assi digo que numero (segun Euclides) es vna multitud compuesta de vnidades como 2. 3. 4. 5. 6. &c. Y es a saber, que assi como de flujo, o mouimiento del punto (segun longitud) se describe, y haze linea, assi de vn alegamiento de vnidades es hecho el numero. ¶ El numero generalmente se diuide en digito, articulo, y compuesto.

¶ La vni. ad n. es num. mas es principio y fin da suya y medi

LIBRO PRIMERO.

Ar. ft. **¶** Numero digito, es aquel que no llega a diez,
libr. 6. así como 2.3.4.5.6.7.8.9. Numero Artículo, es
Meta- aquel que es diez, o diezés justos, así como 10.
physic. 20.30.40.100.200. &c. Numero compuesto es
 aquel que participa de Dígito, y de artículo. Así
 como 12.15.25.207. &c. De las demás diuisiones
 que los Arithmeticos dá a los numeros. Lee
 ei quinto libro deste tratado.

Capitulo III. De las letras, o caracteres de la Arithmetica.

Hemos dicho que tiene esta arte diez letras,
 o caracteres, que son estos que se figuén, 1.
 2.3.4.5.6.7.8.9.0. En cada vna de las quales
 letras notaras tres cosas, orden, figura, y poderio.
 Orden, muestra los assientos conuenientes
 a cada vna, como se trata en el. v. cap. deste libro
 primero. Figura, es la forma, o delineaciõ, o he-
 chura de cada vna. Poderio, es el valor que cada
 vna por si vale. Las nueue primeras se dizen fi-
 guras significatiuas, porque cada vna por si sola
 significa tanto, quanto el assiento en que ahora
 esta representa. Porque la primera que es desta
 manera. 1. vale vno. La segunda que se figura así.
 2. vale dos. La tercera, 3. La quarta, 4. y así ha-
 sta la nouena, que vale 9. La decima, q̄ es esta, 0.
 se dize zero, que en Arauigo quiere dezir ningu-
 na cosa: y así digo, que por si ni acompañada,
 no vale nada, mas tiene virtud para dar valor de
 augmen

augmento a las otras nueue: con las quales figuras puedes contar quanto quisieres, poniendo vnas y otras muchas vezes, assi como se escribe con las veynte y dos letras del. A.B.C. quanto en el vniuerso se ofrece.

¶ Despues que se sepan hazer los caracteres de cada vna de las diez figuras, y sus valores, encomendaras a la memoria los nombres siguiétes.

¶ Vnidad.

Dezena.

Centena.

Vnidad de millar

Dezena de millar

Centena de millar

Vnidad de cuento

Dezena de cuento.

Centena de cuento

Vnidad de millar de cuento

Dezena de millar de cuento

Centena de millar de cuento

Vnidad de cuento de cuento

Dezena de cuento de cuento.

Centena de cuento de cuento.

Vnidad de millar de cuento de cuento

Dezena de millar de cuento de cuento

Centena de millar de cuento de cuento.

¶ No pongo mas nombres, porq̄ seria proceder *Lib. 3.*
en infinito, segū aquello de Filosofo. Si aliquid *Physic.*
infinitum est, numerus est. Y porque con estos *tex. 56*

se puede numerar harto gran cantidad.

¶ Antes que generalmente se declare, para que siruen estos nombres : dire particularmente lo que cada vno quiere dezir. Y afsi digo, que vnidad, en quanto al proposito de estos nōbres, quiere dezir vna cãtidad que no llega a diez: afsi como 1.2.3.4.5.6.7.8.9.

¶ Dezena, quiere dezir diez, afsi como diez, veynte, treynta, quarenta, cinquenta, y hasta nouenta.

¶ Centena, quiere dezir ciētos, afsi como ciēto, dozientos, trezientos, &c. hasta nuevecientos.

¶ Vnidad de millar, quiere dezir, vnos de millares, y que no lleguen a diez mil, afsi como mil, dos mil, tres mil, &c. hasta nueue mil.

¶ Dezena de millar, quiere dezir diez justos de millares, afsi como diez mil, veynte mil, &c. hasta nouenta mil.

¶ Centena de millar, afsi como cien mil, doziētos mil, &c. hasta nuevecientos mil.

¶ Vnidad de cuento, quiere dezir vnos de quētos como vn cuento, dos cuentos, tres cuentos, &c. hasta nueue cuentos. Vn cuento es diez vezes cien mil marauedis, a la qual cantidad los Italianos dizen millon.

¶ El millon, en contrataciones Españolas, es diez vezes cien mil ducados.

¶ Cuento de cuentos, es diez vezes cien mil cuentos.

Capit. III. De algunos presuuestos, a principios
que se han de tener por fundamento en
esta arte.

Omnes
sciētia
cōmuni
cantur
in prin
cipijs cō
muni-
bus.

Arist.

li. i. Po
ster. cō-
tra ne-
gantes
princi-
pia non
est dis-
putādū

Arist.

l. i. Py.
Necessē
est ma-
gis cre-
dere pri
ncipijs,
quā cō-
clusioni

Arist.

libr. i.

poster.

EL primero sea saber cōtar hasta diez, porque
en este numero se incluyen todos desta ma-
nera, que juntando vna vnidad con otra, hagan
dos, y tres, hagan tres, &c.

¶ El segundo, saber que viene multiplicado vn
numero digito por otro digito.

¶ El tercero, multiplicado dezenas por numero
digito, el producto serā dezenas. Si dudas q̄ quie-
re dezir producto, lee el c. 9. deste primer libro.

¶ El quarto, los numeros iguales se figuran con
vnos mismos caracteres.

¶ El quinto, si dos numeros iguales se multipli-
caren por vn qualquiera numero, los productos
seran iguales.

¶ El sexto, si la vnidad multiplicare algun nume-
ro, el producto sera el mismo numero.

¶ El septimo, si la vnidad partiere algun nume-
ro, el quociente sera el mismo numero. Quocien-
te se declara, que sea, en el x. cap.

¶ Si vn numero excede a otro en alguna cātidad
añadiendo el exceso al numero menor, el con-
junto, o suma de ambos sera igual al mayor.

¶ Todo numero que fuere multiplicado por
otro qualquier numero: digo que si el producto
fuere partido por qualquier dellos dos, vendra
al quociente el otro.

Partiendo vn qualquiere numero por otro, si el quociente se multiplicare por el diuisor, védra al producto el numero q̄ al principio se partiere. Como se prueua por la 19. del. 5. Euclides, y por la primera del 2. Esto se exemplificara en el processo de la obra.

Capitulo V. Muestra numerar.

NVmero es saber dezir, o explicar el valor de qualquiere numero. Y afsi digo que pue sta qualquiera figura delas q̄ diximos significati uas, sola no valdra mas ni menos de lo que por si representare simplemente (segun se declaró, a donde diximos que la primera vale vno, y la segunda dos, &c.) mas quando vieres juntas dos, o tres, o mas tendra cada vno el valor segun el lugar do estuuiere. Quiero dezir: que la primera letra, o figura, que estuuiere al principio de la ma. no derecha viniendo àzia la yzquierda, a imitacion del escriuir de los Chaldeos, o Hebreos (los quales fueron inuentores desta arte, como refiere Diodorus) vale tantas vnidades, quantas lat al letra por si sola representare: y la letra del segundo lugar vale diezes. Y la del tercero vale cientos. Y la del quarto lugar, vale millares. Y la del quinto lugar, vale diezes de millares. La del sexto lugar, ciento demillares, como por los exemplos mejor entenderas. Pon por exemplo, que quieres saber quanto montan estas tres figuras

ras figuientes. 257. Para lo qual miraras primero que es el valor de cada vno por si. Y hallaras, que la primera de àzia la mano derecha vale siete, y la segunda cinco, y de la tercera dos, estendido esto, daras a cada vna vn nombre, que los que diximos que se encomendassen a la memoria, en el iij. capitulo. Començando de la mano derecha dela primera letra que es siete, diziêdo vnidad, que quiere dezir vnos tantos, quantos la tal letra valiere: y porque es siete, diras que vale siete vnos, ya que sabes el valor de la primera, passa a la segunda, y dile dezena, que quiere dezir diez, y valdra tantos diez, quantas vnidades la tal letra por si valiere: pues por quanto esta figura a do dizes dezena vale cinco vnos, por tanto seran cinco diez, que son cinquenta: y como es cinco fuera seys, valiera seys diez, y si nueue, nueue diez, &c. De suerte, q̄ las dos primeras letras, montan cinquenta y siete: passa a la tercera letra que es 2. Y di centena (que es el tercero nombre) que quiere dezir cientos, y valdra tantos cientos quantas vnidades la tal letra por si sola valiera. Pues porque aqui es dos, por tanto valdra docientos: De suerte, que si la letra a do dizes centena fuere vno, valdra ciêto: y si dos, docientos, y si nueue, nueue cientos, &c. Y assi respôderas que el valor de las susodichas tres figuras es docientos y cinquenta y siete, como parece figurado.

Centena	Dezena	Vnidad
---------	--------	--------

2

5

7

Dozientos	Cinquenta	Siete
-----------	-----------	-------

¶ Otro exemplo pregunto. Estas ocho figuras
siguientes quanto montan. 39541080.

¶ Para declaracion de la qual començaras a nu
merar desde el zero primero que esta a la mano
derecha diziendo. Vnidad (que quiere dezir
Vnos) y porque el zero no vale ninguna cosa, di
ras que esta primera letra no vale nada. Prosi
gue adelante diziendo, Dezena. En la figura si
guiente que esta despues del zero prosiguiendo
hazia la mano yzquierda que es ocho, y porque
vale ocho, diras que son ocho diezes, que por o
tra denominacion seran ochenta. Passa ala terce
ra figura que es zero, y di zétena (que quiere de
zir cientos) y seran tantos cientos, quantos la fi
gura a la qual tal nombre dieres valiere vnida
des, y porq̄ el zero no vale ninguna cosa, no aura
ningun ciéto. Passa a la quarta figura que es vno
y diras, vnidad de millar, que quiere dezir que
qualquiera letra que tal nombre le dieres val
dra tantas vezes mil, quántas la tal figura valiere
vnidades, y porque aqui vale vno, di que es mil.
Y assi passaras a la figura del quinto lugar, que
es. 4. y diras, dezena de millar, que quiere dezir,
que vale diezes de millares, assi como diez mil,
veynte mil, &c. de arte que la letra que tal nom
bre tuuiere valdra tantas vezes diez mil, quan
tas

ras vnidades la tal letra sola valiere. Pues porq̃
 aqui vale quatro, por tanto valdra quatro diez
 de millares, que son quarenta mil, y si como es 4.
 fuera cinco valiera cincuenta mil, y si seys sefen-
 ta mil, &c. Passa a la sexta figura, que es cinco, y
 di centena de millar (que quiere dezir, cientos
 de millares) y seran tantos cientos, quãtos la fi-
 gura a la qual tal nombre das valiere vnidades,
 pues aqui vale cinco, por tanto serã cinco vezes
 cien mil, que por otro nombre seran quinientas
 mil. Y a ssi diras q̃ las seys primeras letras mon-
 tan quinientas y quarenta y vn mil y ochenta.
 Prosigue diziendo en la figura, o letra del septi-
 mo lugar, vnidad de cuento, que quiere dezir
 que seran tantos cuentos, quantos la tal figura
 valiere vnidades, y porque es nueue, diras que
 monta nueue cuentos. Passa a la octaua figura
 que es tres, y di dezena de cuento, y seran tan-
 tos diez de cuentos, quantas la tal figura por
 si sola valiere vnidades. Y porque esta figura va-
 le tres, seran tres diez, que son treynta, y por-
 que se nombran ser de cuentos, diras que vale
 treynta cuẽtos. Y a ssi auras numerado las ocho
 figuras precedentes, y responderas que montan
 treynta y nueue cuentos, y quinientas y quaren-
 ta y vn mil y ochenta maravedis, o reales, o lo q̃
 quisieres. Nota bien esta pratica, porque a ssi co-
 mo a cada figura has dado su nombre por ordẽ,
 a ssi profiguiras con las demas (si mas huiera)

¶ Dira alguno, no puedo acabar de entēder esto porque me auia des informado, que las nueue letras, o figuras del guarismo, la vna vale vno, y la otra dos, &c. hasta nueue la que mas. Veo que en tres, o quatro letrillas montā mas de nueue mil, si de la duda no salgo, afsi me quedo como quando comence a leer. A lo qual respondo que es verdad las nueue letras del guarismo no valer mas, desde vno hasta nueue la que mas, tomāndolas singularmente cada vna por si, o en principio de cuenta, mas ha se de entender, que quando vienen juntas dos, o tres, o mas, &c. que la primera de la mano derecha, siempre conserua su valor, y nunca vale mas, ni menos. Y la figura del segundo lugar vale tantos diezes, quantos ella vale por si vnidades. Y por orden la del tercero lugar vale cientos, y la del quarto lugar vale millares, &c. segun que diximos. Y porque mejor sea entendido pongo exemplo en estas tres letras siguientes. 444. Bien vemos que todas tres figuras son quattros. Luego si cada vna no se contasse mas de por quatro, todos montariā doze, lo qual sera falso. Porque el primero quatro que estā a la mano derecha, vale quatro, y el segundo procediēdo hazia la yzquierda vale diezes, y por quanto por si vale quatro vnidades, por tanto contamos quatro diezes, que son quarenta. El tercero, aunque tambien es quatro como los otros, por estar en el tercero lugar vale quatro-

CAPITVLO V.

quatrocientos. Y esto es afsi como acontece en
 los hombres, q̄ puesto que todos seamos de vna
 mesma naturaleza, y para con Dios que no haze
 acepcion de personas, tanto es el pobre, como
 el rico. Viene el mundo, y a vnos pone en el pri
 mero grado començando de abaxo, y aquellos
 tienen su valor; a otros en el segundo grado su
 biendo, que son mas que los del primero, y a o
 tros mas altos, y puesto que todos seamos de vna
 especie humana, reuerenciamos vnos a otros co
 mo a señores. Y conforme en el estado que a
 vno vemos, afsi le tratamos. Pues semejantemē
 te passa en los numeros: porque puesto caso que
 estos numeros de la figura sean iguales, y seme
 jantes todos tres, por estar vno en el primero lu
 gar, que es el mas baxo, y otro en el segundo lu
 gar, y otro en el tercero lugar, el qual es mas al
 to que el segundo, por tanto son mas vnos que
 otros, en potencia. Aun con todo lo que auer
 practicado (pōdria dezir algun rustico) no por
 esso lo entiendo, ni aun me parece que lo en
 tendere, aunque mucho mas se me platique, por
 lo qual me parece que sera cosa acertada dexar
 esta materia, y passar a otra duda, y es esta. Que
 se ha dicho que el cero en lēgua Arauiga quiere
 dezir lo mismo que en lengua Española nada.
 Pues si no vale nada, para que se pone en el nu
 mero de las diez figuras de la cuenta? Que aya
 dicho que no vale nada, es verdad mas dize,
 que

que tenia virtud para dar valor de mayor argumento a las otras letras, ya que el no lo tenga para si. Y digo que assi como el señor sin el criado, ni el criado sin el señor no podrian vivir politicamente, assi mesmo con las dichas nueue figuras del guarismo sin el zero, ni el zero sin las figuras del guarismo, no podriamos contar todo lo que quisiessimos. Exemplo. Si quisiesses contar, o assentar dos mil y treynta, o otro qual quiere numero, porque la regla manda que los millares se assienten en el quarto lugar. Para assentar dos mil, assentaras vn dos y los treynta, porque son diez en el segundo lugar, de manera que faltan dos figuras, la vna que le ponga delante del treynta, en el lugar de las vnidades que se anteponen a las dezenas, y la otra q se ponga en el lugar de los cientos que faltan antes de los millares. Y estas dos figuras han de tener propiedad, que ocupen los tales lugares, y que no signifiquen algun valor, y que solamente se pongan por hazer estar el tres de el treynta en el segundo asiento, y al dos del dos mil en el quarto, para lo qual no se hallara otra figura, sino el zero. Los quales assentaran de la manera que parece 2030. Y assi quedaran los dos mil y treynta que querias. Mas si en lugar de estos zeros pusieres otras figuras qualesquiera de las nueue assi 2538. en tal caso no quedaran assentados los dos mil y treynta que

que tu querias. Y si los dos zeros no se pudiesen por pensar que no hazen al caso quedado el dos y tres solos, de esta fuerte. 23. no valen mas de veynte y tres. Por lo qual parece claro la necesidad que del zero ay. Y ansi concluyo diziendo que la orden que se tendra en assentar los numeros serà, que todo lo que no llegare a diez se ponga al principio, y los diezes que no llegaren a ciento, en el segundo lugar, comenzando de la mano derecha, y prosiguiendo hazia la yzquierda. Y los cientos que no llegaren a mil, en el tercero, y los millares en el quarto lugar, y los diezes de millares en el quinto lugar, y los cientos de millares en el sexto lugar, segun los nombres dados nos demuestran. Y el zero se pone quando no ay que poner en el primero lugar, o segundo, o tercero, &c.

Capitulo VI. Trata de los caracteres, o figuras de la cuenta Castellana.

CONforme a la cuenta de los Pitagoreos, las letras del A. B. C. teniã ciertos numeros (como parece por Terenciano, Mauto) y pidiose, y quedaron solamente aquellas que sirven de cuenta, q̄ son estas I. V. X. L. C. D. Con las quales, y las q̄ de estas se componen se suelen demostrar la suma que queremos, desta manera. Por I. vno, por V. cinco por X. diez, por L. cinquẽta, por C. ciento

En el verso Sotadeo.

ciento, por D. quinientos. Y puesto que todas fueron inuentadas de los Latinos, o Romanos, por alguna justa causa, no me atreuo tratar, por que razon esta v. vale cinco, y esta x. diez, &c. Y principalmente que ay pareceres de tantos, que difiere mas que los rostros. Remito me a q̄ el Lector tome la opinion que mejor le agrade, de lo que dize Terenciano Mauro en el verso Sotadeo, y Prisciano al principio del libro q̄ intitula de *Ponderibus & Mensuris*. Las figuras que se componen de los caracteres precedentes son las siguientes.

j.	vno	lx	sesenta
ij.	dos	lxx	sesenta
iiij	tres	lxxx	ochenta
iiij	quatro	xc	nouenta
v	cinco	c	ciento
vj	seys	cc	dos cientos
vij	fiete	ccc	tres cientos
viiij	occho	cccc	quatrociētos
ix	nueue	D	quinientos
x	diez	Dc	seys cientos
xx	veynte	Dcc	fiete cientos
xxx	treyntra	Dccc	ocho cientos
xl	quarenta	Dcccc	nueue ciētos
l	cinquenta.		

¶ Ultra de estos veynte y siete caracteres arriba puestos, ay vn punto desta manera, el qual sirve en la cuenta Castellana de lo mismo que el zero

zero en el guarismo.

¶ Esta figura ix. vale nueue, y esta xl. quarenta, y esta xc. nouenta por vna regla q̄ dize. Todo numero menor que se antepone al mayor, significa que se ha de quitar del mayor. Y por tanto, quando esta figura ix. vieres, entenderas q̄ se ha de quitar el vno de los diez que vale la x. y por el configuiente esta l. vale cincuenta, poniendo le antes vn x. desta manera. xl. será tãto como si se le quitasse, y assi quedara en quatro diezes q̄ son quarenta. Esta figura c. vale diez diezes, que son ciẽto: mas si le pones esta x. antes, desta manera. xc. es tãto como si se lo quitasse: y assi quedaran nueue diezes, que son nouenta. Y esto no se vsa sino en estas tres figuras dichas.

¶ Nota que sobre quatro y ochos se acostumbra poner vna, o excepto sobre el quarenta. Esto se haze para que el contador, quando fuere contando, y viere algunas letras mal hechas no dude si es quatro, o tres, o otra cosa.

¶ Nota mas, que sobre el nueuecientos, se pone e. a diferencia del ochocientos, que quiere o.

¶ Nota mas, que vna o. sobre vna raya, o sobre vna M. desta manera $\frac{o}{M}$ quiere dezir medio. Y si la o. es a dize media.

¶ Esta figura ij. denota, q̄ todo numero que se le antepusiere vandra tantos millares, quantos el tal numero valiere vnidades. Quiero dezir, que si le vieres desta manera; xiiij. denota doze mil,

por causa que el numero que està antes de la figura es doze. Mas si antes de si no tuuiere ningun numero, no valdra ninguna cosa. Esta figura $\dot{q}$. quiere dezir, quento: y assi $\dot{q}s$. quentos: de las quales notarás lo mismo que se dixo de la figura de los millares. Quiero dezir, que si los vires tener antes de si algun numero, valdra tantos quentos quantas vnidades el tal numero valiere. Y si las hallares desacompañadas de los numeros, no significan algun valor desta manera, $\dot{r}$. $\dot{q}$. quiere dezir vn quento, y assi v . $\dot{q}s$. cinco quentos, y assi $\dot{q}$. ninguna cosa.

Capitulo VII. Trata de la primera especie, y regla general de Arismetica, que se dize sumar.

ANtes que en declaracion de la presente regla entremos, esde saber que tenemos quatro preposiciones para practica operatiua de las quatro reglas generales de Arismetica, que son estas. Con. De. Por. A.

¶ Con, sirue al sumar, como si dixessen, suma esto, con esto, o tanto con tanto, &c.

¶ De, sirue al restar, diziendo resta esto de esto, o tanto de tanto.

¶ Por, sirue al multiplicar, diziendo. Multiplica esto por esto, o tanto por tanto.

¶ A, sirue al partir diziendo, parte tanto a tãtos compañeros. Aunque estas dos vltimas preposi-

posiciones del multiplicar y partir el vulgo la trueca, diciendo, multiplica tantas varas, a tanto cada vara: parte tanto por tantos compañeros, &c.

¶ Samar no es otra cosa sino juntar muchos numeros en vna suma. Para declaracion de la qual notarás dos cosas. La primera que los numeros, o partidas que huieres de sumar esten ordenadamente assentadas. Quiero dezir que las vnidades de vna partida esten enfrente de las de la otra, y los diezes enfrente de diezes y cientos enfrente de cientos, &c. La segunda, todas las partidas, o numeros que huieres de sumar sean de vna especie de moneda. Quiero dezir, que todas sean marauedis, o reales, o ducados, o otra qualquiera moneda, o peso: por que si vnas partidas son de ducados, y otras de marauedis, y otras de otra cosa, la suma que de lastales partidas procediesse, no sería vno ni otro. Y despues que las partidas estuieren assentadas por la orden que hemos dicho, haras vna raya debaxo de todas para assentar debaxo de ella la suma que hizieres: y si en lo que huieres de sumar huiere medios, haras los enteros que pudieres, y començaras de la mano derecha, juntando todas las vnidades que en cada vna de las partidas huiere, notando los siete auisos siguientes. El primero, si juntando las primeras letras que estan al principio

*Auisos
para su
mar.*

ázia la mano derecha de cada partida no llegare a diez, todo lo pondras debaxo de la raya en frente de las letras que fueres fumando. Lo segundo, si passare algo de diezes, assentaras lo q̄ passare poco, o mucho, y el diez, o diezes que hizieres, guardarlos has para juntarlos con las letras segundas de todas las partidas, por ser alli el assiento de las dezenas. Lo tercero, si hizieres diez, o diezes justos, assentaras vn zero enfrente de lo que fueres fumando, y los diezes guardarlos has para llevarlos adelante, como se ha dicho. Lo quarto si alguna ringlera fuere toda de zeros sin letras significatiuas, entienda se esto contando de arriba para abaxo, o de abaxo para arriba, aunque aya mil zeros, pondras vn zero debaxo de la raya en lugar de todos. Lo quinto, si huviere alguna ringlera de zeros y letras significatiuas, contaras las letras, y dexaras los zeros. Lo sexto, si llevando algo topares con alguna ringlera de zeros, assentaras lo que truxeres poco, o mucho, y no curaras de los zeros. Lo septimo, si llevares algo, y no huviere con quien juntarlo, pondras lo que llevares debaxo de la raya: y assi hallaras (si biẽ aduertes)

En las no ser otra cosa el fumar, sino hazer de vnidas
Proble des diezes, y de diezes cientos, y de cientos mi
mas se- llares, &c. La qual orden va della suerte, q̄ diez
Etio. 15 vnos hazen vn diez, diez diezes, vn ciento, diez
 9.3. cientos vn millar, &c. como en la pratica de los

exemplos entenderas mejor. Ca causa porque todas las gentes cuentan por diezes Arist. la da por natural, y necesaria.

¶ Exemplo.

¶ Pó por caso que quieres sumar las quatro partidas siguientes.

1	5	0	9	6	7	0	2	Antes que comiences a	<i>Trac a</i>
3	8	0	9	9	6	0	1	sumar, mira quãto mō-	<i>la me-</i>
2	2	0	8	0	1	0	4	ta cada partida, y halla-	<i>moria</i>
2	8	0	7	4	2	0	0	ras que la primera mō-	<i>el prin-</i>
<hr/>								ta quinze cuētos, y no-	<i>cipio</i>
uenta y seys mil y setecientos y dos: la segunda								<i>prime-</i>	
treyn ta y ocho cuētos, y nonenta y nueue mil								<i>ro del.</i>	
y seyscientos y vno: la tercera veyn te y dos cuē-								<i>4. cap.</i>	
tos, y ochenta mil y ciento y quatro: la quarta y									
ultima monta veyn te y ocho cuētos, y setenta									
y quatro mil y dozientos, como en la figura pa-									
rece. Pues començando a su mardiras, dos que									
estã en la primera partida de arriba, y vno mas									
abaxo son tres, y quatro son siete (Del zero que									
estã en la quarta partida no cures pues no vale									
nada) y porque esta suma no llegan a diez, assen-									
taras estos siete, debaxo de la raya enfrente de									
la misma ringlera que sumas, como manda el									
primer auiso de sumar.									

¶ Ya que has sumado las vnidades, q̄ fue la primera ringlera, passa a la segunda que es el assiento de las dezenas, y hallaras que todos son zeros, por lo qual no haras otra cosa, sino assen-

tar vn zero debaxo de la raya enfrente de los zeros, como muestra el quarto auiso.

¶ Passa a la tercera ringlera, que es el lugar donde estàn los cientos de todas quatro partidas, y di. Siete y seys son treze, y vno catorze, y dos diez y seys. Assienta seys debaxo de la raya (que es lo que passa diez enfrente de la ringlera que sumas, y lleva vno, por el diez que hiziste para juntarlo con las primeras letras que se siguieren, como manda el segundo auiso.

¶ Passa a la quarta ringlera, diciendo: Vno que traygo y seys son siete, y nueue diez y seys, y quatro son veynete: pues por quanto son diezes justos, pondras zero debaxo de la raya enfrente de la ringlera que sumaste como manda el tercer zero auiso, y llevaras dos por los dos diezes que hiziste para juntarlos con lo de la quinta ringlera, y assi diras, nueue y dos que traygo son onze, y otro nueue que està mas abaxo, son veynete, y ocho son veynete y ocho, siete treynta y cinco assienta los cinco que passan de diezes debaxo de la raya.

¶ Y lleva tres vnos por los treynta para juntarlos con los que hallares en la ringlera que se sigue, en la qual hallaras no auer nada, porque todos son zeros, y assi assentaras los tres que trayas debaxo de la raya enfrente de los zeros.

¶ Y passarte has a la otra ringlera siguiente, que es do està el assiento de los quentos, no lleuando
ningu-

ninguna cosa, porque en la ringlera antes desta no hiziste ningun diez, y diras cinco que estan en la partida alta, y ocho de mas abaxo son treze, y dos quinze, y ocho son veynte y tres. Por quanto passan tres de mas de diezes justos assentarlos has debaxo de la raya, y por los veynte llevaras dos para juntarlos cō los que se siguieren. Pues prosigue diziendo dos que traygo, y vno que està arriba son 3. y 3. son 6. y 2. son 8. y 2. son 10. porque son 10. justos, pondras vn zero (como manda el auiso tercero) y llevaras vno para juntarlo con lo que se siguiere, el qual le pondras adelante del zero, porque no ay con quien juntarlo, por auer dado fin a la cuenta, como parece figurado.

15096702 ¶ Y assi auras dado fin a esta suma, y diras que monta ciento y tres cuentos, y trecientas y cincoenta mil, y seyscientos y siete maravedis. Nota bien este exemplo, porque assi se sumará otras qualesquiera sumas de vna especie, aunque sean de menor, o mayor cantidad.

¶ Quando sumares procura euitar esta letra. Y. quiero dezir. Que quando fueres sumado no digas tanto, y tãto, y tanto es tãto. Nota quãdo las partidas de las sumas no estan assentadas segun el precepto de sumar (quedize) las vnidades estẽ enfrente delas vnidades, y dezenas esten enfrente

te de dezenas. En tal caso juntaras las primeras letras de cada partida, de las que estuuiere hazia la mano derecha, y despues las segundas, y luego las terceras hasta acabar, excepto si no fuere suma de multiplicacion, como se dira en su lugar.

*Sumar monedas, o cosas diferentes, como pesos,
y medidas.*

SI quieres sumar monedas, o otras cosas diuersas como ducados, reales, marauedis, o libras sueldos, dineros, a vso de Valencia, y de otros reynos, o quintales, arrobas, onças, cahizes, hanegas, celemines, quartillos de trigo, o ceuada, arrobas, açumbres, quartillos de vino, &c. La regla sea q̄ en qualquiera suma de qualquier diferencia q̄ sea, començaras siempre de lo mas menudo que en la tal suma viniere, como queriendo sumar arrobas, libras, onças, &c. haras de las onças libras, y de las libras arrobas, y asy en todas las otras diferencias, como en la figura de los exemplos mejor entenderas.

¶ Exemplo de sumar libras, sueldos, dineros a vso de Valencia, y otros reynos.

¶ Como si dixessemos, suma 15. libras, y siete sueldos, y 10. dineros, con 37. libras, 18. sueldos, y nueue dineros, y por otra parte 40. libras, y 12. sueldos, y 4. dineros, como parece.

¶ Vna

¶ Vna libra, es 20. sueldos.	15. lib. 7. suel. 10. diner.
En Valencia.	37. lib. 8. suel. 9. diner.
Vn sueldo doze dineros.	40. li. 19. suel. 4. diner.
Vn dinero, 3. blancas.	<hr/> 94. lib. 5. suel. 11. diner.

¶ La regla es, que sumaras primero los dineros: de los quales haras sueldos: y los dineros, que no llegaren a sueldos, ponerlos has debaxo de la raya, enfrente de los dineros que sumares, y despues con los sueldos que de los dineros hizieres, passaras a sumar los sueldos: de los quales haras libras. Y los sueldos que no llegaren a libra, ponerlos has debaxo de la raya, enfrente de los mismos sueldos que sumas. Y las libras que hizieres de los sueldos, juntartas has con las otras libras. Y assi montara esta suma 94. libras, y 5. sueldos, y 11. dineros.

¶ Exemplo de sumar quintales, arrobas, libras, onças, adarmes, &c.

¶ Vn quintal es quatro arrobas.

Vna arroba veynte y cinco libras.

Vna libra diez y feys onças.

Vna onça diez y feys adarmes.

¶ Pues si quisieses sumar estas 3. partidas siguientes a razón q̄ la libra valga. 16. on. la on. 16. adar.
 7. quintales. 3. arrobas, 20. lib. 8. onç. 3. adarmes
 15. quintales, 1. arroba, 13. libras, 13. on. 7. adar.
 2. arroba. 10. lib. 7. onç. 0 adar.

23. quinta. 3. arrob. 19. lib. 12. onç. 10. adarm.

H. r. is de adarmer, onças: de onças, libras, de li. arrob. y de arrob. quintales, &c. y montará 33. quintales, 3. arrob. y 15. lib. 12. onç. 10. adar. Desta manera sumarascahizes, hanegas, celemines, sabiendo q vn cahiz, es 12. hanegas, y hanega es. 12. celemines, y vn celemin. 4. quartillos. Haziendo de quartillos celemines, de celemines, hanegas, de hanegas cahizes como parece en esta figura.

15. C. 7. fanegas. 8. celemin. 3. quartillos.
 104 ——— 11 ——— 9 ——— 1 ———
 33 ——— 3 ——— 3 ——— 0 ———
 153 ——— 10. fa. ——— 9. cc ——— 0 ———

Exemplo de sumar vino.

¶ Vn cãraro, o arroba de vino, es ocho açúbres

¶ Vna açumbre quatro quartillos.

¶ La regla es, q de quartillos haras açúbres, de açúbres, arrob. como en el exêplo puedes ver.

354. Arro. 7. açumb. 3. quartillos.

100. Arro. 5. açumb. 2. quartillos.

53. Arro. 2. açumb. 0. quartillo.

500. Arro. 0. açumb. 0. quartillos.

1008. Arro. 7. açumb. 1. quart.

Montan mil y ocho arrob. o cantaras, que todo es vno, y siete açumbres, y vn quartillo.

Cap. VIII. Trata de la segunda especie, y regla general de Arithmetica, que se dize Restar.

Restar es sacar la diferencia que vn numero mayor haze a otro menor, para la qual son necesarios dos numeros, el vno que sea mayor q̄ el otro, porq̄ si ay entre si ygualdad, ental caso no auria q̄ hazer, ni se llamarian restar. Hazese esta regla, sacando el numero menor del mayor como auiendo recebido seys y gastado quatro, diras, Quiē de 6. saca 4. quedan 2. estos dos es la diferencia q̄ ay de 4. a 6. y hasta esto no ay duda ni es dificultoso el restar. Mas si la suma que quiessies restar fuesse tan grande que no se pueda facilmente comprehender, la diferencia que ay de la vna a la otra, de manera quiero dezir, que la vna suma y la otra, esten compuestas de muchas letras, assentaras la mayor sobre la menor guardando que las vnidades esten enfrente de las vnidades, y diezes enfrente de diezes, &c. Y despues de assentadas las dos partidas, ya sea la de arriba el galto, o a la de abaxo, no importa, con tal que no olvidemos de sacar la menor de la mayor. Y despues de lo que quedare, o viniere por diferencia, deuera la persona, cuya fuere la menor partida, a la persona cuya fuere la mayor. Para declaracion de lo qual notaras las 7. diferencias siguientes, porque cō ellas haras

haras qualquier resta de grande, o pequeña cantidad.

¶ La primera diferencia es, quando se saca de vna figura mayor, otra menor: como quien sacasse cinco de ocho diras. Quien de ocho saca cinco, quedan tres: esto que queda lo assentaras debaxo de la raya, enfrente de los ocho, y del cinco, y esto hecho passar a otras letras.

¶ La segunda diferencia es, quando de vna figura menor, se saca otra mayor: como quien dixesse. De tres quien saca 6. en tal caso diras, que no puede ser: y por quanto no puede ser, mira de la figura mayor, que en este exemplo es. 6. quanto falta para 10. y hallaras que quatro, los quales juntaras con la figura menor, que es tres, y será siete. Assienta. 7. debaxo de la raya, en frête del 6. y todas las vezes q̄ esto hizieres lleuaras vno, para juntarlo cō la primera figura que se siguiere de la partida de debaxo.

¶ La tercera diferencia es, quando sacares alguna figura significatiua de algun zero, como quiẽ dixente. De zero quien saca, 4. no puede ser, mas de quatro para 10. faltan. 6. estos. 6. se auian de juntar con el zero, y porque no vale nada: no se hara otra cosa, sino poner seys debaxo de la raya, enfrente del 4. y lleuaras vno, para juntarlo con la primera figura que se siguiere de la partida de abaxo, como se dixo en la segunda diferencia.

¶ La quarta diferencia es quando lleuares vno y la figura con quien lo juntas de la partida de abaxo es nueue, en tal caso diras. V no que traygo, y nueue son diez, assentaras la figura que estuviere en la partida de arriba, qualquier q̄ sea y passaras adelante, lleuando vno: como se dixo en la segunda, y tercera diferencia. De fuerte, que todas las vezes que estãdo nombrares diez lleuaras vno para juntarlo con la primera figura que se siguiere de la partida de abaxo.

¶ La quinta diferencia es, quando restas de alguna figura significatiua algun zero, como quiẽ dixesse. De ocho quien saca zero, que es lo mesmo que dezir de ocho quie saca nada, quedan ocho. En tal caso no se hara otra cosa, sino poner la figura significatiua, de la parte de arriba, debaxo de la raya, enfrente del zero, y passar adelante, sin lleuar nada: porque no se ha de lleuar algo, sino fuere quando nombrares diez, como se dixo en la 2. 3. 4. diferencia.

¶ La sexta diferencia es, quando sacares vna figura y gual de otra, como quien dixesse. De cinco quien saca cinco, o detres quiẽ saca tres, o de zero quien saca zero, en tal caso no ay q̄ hazer sino poner vn zero debaxo de la raya, y proseguir adelante con nuestra resta sin lleuar nada.

¶ La septima y vltima es, que si lleuando vno topares con zero, di. De tanto que estã arriba, quitando vno, queda tanto. Y si la figura de arriba

ba fac.

ba fuere zero, di. De vno q̄ traygo para diez fal-
 tā 9. pôdras 9. debaxo, y llevaras vno de nueuo.
 ¶ Exemplo y practica. Vno recibio tres mil y se-
 rentay tres, gastò mil y trecientos, y quarenta y
 dos marauedis, o lo que quisieredes, y por quan-
 to no pago tãto como recibio, quiere saber quã-
 to es lo que queda deuiêdo, o que diferencia ay
 de lo que recibio, a lo que gasto. Para hazer esta
 cuenta, y las semejantes, assentaras el recibo, q̄
 es mayor cantidad sobre el gasto, como se ha
 dicho, y aqui parece figurado.

Recibo	3 0 7 3	Y començaras de la ma- no derecha, diziendo.
--------	---------	---

Gasto	1 3 4 2	Quien de tres saca dos, queda vno. Assienta este
-------	---------	---

Alcance	1 7 3 1	queda vno. Assienta este vno debaxo de la raya, enfrente del mesmo dos y passaras a las segundas figuras, diziendo. Quiê de siete saca 4. quedan 3. Assienta 3. debaxo de los 4. Y. passa a las terceras figuras, y di. De zero quien saca 3. no puede ser, mas de tres a diez, fal- ran 7. Junta 7. con la que estuviere arriba, y as- sentar se ha lo que montare debaxo, como later- cera diferencia manda, y por quanto no ay con quien juntarlo por ser zero, assentaras los 7. sola- mente enfrente del 3. y llevaras 1. el qual vno juntaras con la primera letra que se siguiere, del region de abaxo diziendo. Vno que lleuo, junto con otro, que vale la primera figura que se si- gue de la partida de abaxo son dos, sacados de 3 quedã
---------	---------	--

quedara vno, asienta vno debaxo de la raya, como parece figurado.

R. 3073

Y así auras dado fin a esta regla, y diras, que quien de tres mil, y setenta y tres maravedis,

G. ~~1342~~
~~3424~~

A. 1731

faca mil y trezientos y quarenta y dos quedan. 1731. Y tanto es lo que se queda deuiendo para cumplimiento de paga, y así diras, que la diferencia que ay de. 3073. à 1342. es. 1731.

¶ Otro exemplo. Pon por caso, que vno recibio cincuenta y nuene mil y trezientos y setenta y cinco ducados, y gasto cincuenta mil y ciento y ochenta y seys ducados. Asíeta la mayor partida sobre la menor, como parece.

R. 59375 Y començaras a restar de la mano derecha, diziendo. Quien de

G. 50186 cinco saca seys no puede ser.

Pues q̄ no puede ser, diras. De 6 para 70. faltan quatro, estos quatro juntaras con los 5. que estan arriba, y seran 9. los quales nueue pondras debaxo de la raya, enfrente del seis y llevaras vno para juntarlo con la primera figura que se figuiere de la partida de abaxo, segun manda la segunda diferēcia de restar. Pues vno que llevas, y ocho, que es la figura que se sigue, son 9. Resta estos. 9. del siete que esta arriba, diziendo. Quien de siete saca nueue, no puede ser, mas de nueue a diez, falta vno, jūta vno cō la fi-

gura de arriba, que es siete, y seran ocho: los qua-
 les. 8. pondras debaxo de la raya: y llevaras vno
 el qual vno, juntaras con lo q̄ se sigue en la parti-
 da de abaxo que es vno, y seran dos. Pues quien
 de tres q̄ ay en el recibo faca dos, queda vno, af-
 sentaras vno debaxo de la raya, y passar te has
 a restar otras figuras, como la primera diferen-
 cia mada, y hallaras en la partida de arriba nue-
 ue, y abaxo vn zero: pues quié de nueue faca ze-
 ro, quedan 9. pon los mismos 9. debaxo de la ra-
 ya, segan la 5. diferencia manda, y profigue ade-
 late, y hallaras dos cincos, pues di. Quié de cin-
 co faca cinco, no queda nada: asienta vn zero
 debaxo, como mada la 6. diferēcia: aunque por
 ser las vltimas figuras, se puede dexar de poner.
 Porque el zero puesto hazia la parte yzquierda
 de qualquiera figura, no da, ni quita valor, y asi-
 aurás dado fin a tu resta: y hallaras debaxo de la
 raya, nueue mil y ciento y ochenta y nueue, y en
 tantos ducados responderas que alcança el se-
 ñor dela mayor cantidad al de la menor, como
 parece figurado.

R 5 9 3 7 5

—————

G 5 0 1 8 6

A 0 9 1 8 9

—————

Otro exēplo.

Vno recibio 8.

cuentos, y noue

cientos, y nouē-

ta y cinco mil y

treynta maravedis. Y gasto nueue cuētos, y tre-
 zientos y quatro mil maravedis. Pidese quanta

es la

es la diferēcia que haze la vna partida a la otra, por quanto en este exemplo, es mayor cantidad el gasto, que el recibo: pon el gasto sobre el recibo, de la manera que parece figurado.

G. 9304000 Hecho esto, resta, segun se ha
 ————— visto en los exemplos prece-

R. 8995030 dentes, diciendo. Quien de zero saca zero, no queda nada: pon vn zero debaxo de la raya. Y passaras a las segundas figuras, como muestra la 6. diferencia: y hallaras en la partida de arriba vn zero, y en la de abaxo vn tres: pues di. Quien de zero saca tres, no puede ser: pues porque no puede ser, mira quanto falta de 3. para 10. y faltan 7. estos 7. juntaras con lo de arriba, si huuiere algo, y ponerlo has todo debaxo: y porque la figura de arriba es zero, no ay que juntalle, sino poner el 7. debaxo de la raya enfrente del 3. y llevaras vno, como la tercera diferencia muestra. Passa con vno a las terceras figuras, y hallaras que la figura de la partida de arriba, y la de abaxo, son zeros. Pues el vno q̄ traes juntalo con el zero de abaxo, y sera vno, Aora di. Quien de zero (que esta arriba) saca vno, no puede ser, mas de vno para diez faltan naue. Estos naue juntarlos has con el zero de arriba, y seran 9. Pongase debaxo la raya, y passaras adelante, llevando otro, diciendo. Vno que traygo junto con 4. que es la figura que se sigue de la partida de abaxo, seran. 6. saca

Como
mues-
tra la
7. dife-
rencia.

dos de 4. que ay arriba, no puede ser. Pues porq̄ no puede ser, mira de 6. quanto falta para diez, y hallaras faltar quatro: los quales juntaras con los otros quatro que estan arriba: y seran ocho. Asienta ocho de baxo de la raya, enfrente del cinco (como manda la diferencia segunda) y lleuaras vno para juntarlo con la primera figura q̄ se siguiere de la partida de abaxo. Profigue, diciendo. Vno que traygo, junto con la figura que se sigue, que es nueue seran diez, porque hiziste diez justo, no ay que hazer, sino assentar debaxo de la raya la figura que estuviere en la partida de arriba (sea qualquiera) y lleuaras otro para adelante (como muestra la quarta diferencia.) Y porque es zero, pondras zero. Y assi passaras a las sextas figuras con vno, y juntarlohas con otro nueue que està en la partida de abaxo, y seran diez. Y por quanto hiziste otra vez diez justo pondras debaxo de la raya la figura, que estuviere arriba (que es 3.) y lleuaras vno (como manda la quarta diferencia.) Passa a las septimas figuras, y hallaras en la partida de abaxo vn ocho con el qual juntaras el vno que lleuas, y serã nueue, y en la partida de arriba hallaras otro nueue pues resta vno de otro, diciendo: Quien de 9, falta 9 no queda nada. Pon zero debaxo de la raya aunque por ser las vltimas figuras de la resta, no haze caso que el zero se dexede poner. Y assi auras dado fin a tu resta: y responderas que
 el ga-

el gasto es mas que el recibo, trecientos, y ocho mil y novecientos y setenta marauedis. Y tanto deue el señor de la menor cantidad a el de la mayor, como parece. Y assi se haran las semejantes.

G. 9304000

R. 8995030

A. 308970

Nota, algunos quando restan usan dezir. Quié recibio tanto, y gastó tanto, no puede ser: como si vno huuiesse rece-

bido veynte y cinco, y gastado diez y siete, despues de assentadas las partidas en figura, como la regla manda, y aqui parece.

R. 25

G. 17

Comiençan diziendo. Quien recibio cinco, y gastó siete, no puede ser: lo qual suena mal a los q

presentes estan, oyendo, o viendo hazer la tal cuenta: porque bien puede vno recibir poco, y gastar mucho mas, y por esto es mejor dezir. Quien de cinco saca siete, no puede ser: esto suena mejor. Porque claro está, que de cinco no se pueden sacar siete, siendo el cinco, y el siete de vna especie.

¶ Otra suerte de restar hazen algunos diferente de la que auemos declarado: la qual se entiende en el exemplo siguiente. Como si vno huuiesse recibido 95. y gastado 68. Assientan la mayor partida sobre la menor, como se ha dicho, y aqui parece figurado.

R. 95 Y luego comiençan , diziendo

Quiende cinco saca 8. no puede

G. 68 ser Por quanto no se pueden sacar

ocho de cinco, quitan de la primera figura q̄ se si

gue de la partida de arriba vno, el qual vale diez

y juntanlo todo, y dizen. Quien de 15. saca 8. que

dan siete. Assientan 7. debaxo de la raya, en fren

te del 8. y passan a las segundas figuras . Y por

quanto del 9. se quito vno, quedan en ocho: pues

de ocho quien saca 6. quedan dos, &c. De fuerte

que todas las vezes que no se puede sacar vna fi

gura de otra, añaden vn diez a la menor, y des

pues restan.

¶ Otra diferencia de restar. Quando restares,

despues que la menor partida estuviere assenta

da debaxo de la mayor, saca siẽpre las letras de

abaxo de vn diez: y lo que restare juntarlo con

las de arriba, y si no llegare la suma a 10. p̄dras

todo lo que fuere debaxo de la raya , y llevaras

vn: y si passare de diez, assentaras lo que passa

re, y no llevaras nada.

¶ Otra diferencia para restar con breuedad, y

menos palabras. Quando quitiere restar vn nu

mero de otro, assienta el mayor sobre el menor,

segun hemos mostrado, y guardaras las reglas si

gientes.

¶ Si la letra de abaxo fuere semejante a la de ar

riba. pon vn zero debaxo de la raya.

¶ Si la letra de arriba es mayor que la de abaxo

resta

resta la menor de la mayor, y lo que quedare põ gase debaxo.

¶ Si la letra de abaxo excede a la de arriba en vn punto, pon 9. debaxo de la raya, y lleua vno para juntallo con la primera letra que se sigue de del mismo renglon de abaxo.

¶ Si la letra de abaxo excediere en dos a la de arriba, pon 8. debaxo de la raya, y lleua otra. Y si excediere 3. pondras 7. y si excediere en quatro, pondras seis. Y si excediere en cinco, pondras 5. Y si 6. 4. y si 7. 3. y si 8. 2. y si 9. vno. De suerte que digo, que quando excede la letra de abaxo a la de arriba en vno, pondras 9. porque de vno a 10. faltan 9. Y quando excede dos, pondras ocho, porque de dos a diez faltan 8. &c. ¶ Si quando lleuares vno le juntares con algun nueue, de arte que haga 10. pondras lo de arriba, qualquier cosa que fuere, y llevaras.

¶ Si en la suma de arriba huuiere alguna letra, o letras mas que en la de abaxo, pon las abaxo, quando llegares a ellas.

Otra diferencia de restar.

¶ Esta diferencia se funda en vn punto, yes, que quando la letra de abaxo fuere mayor que la de arriba, añadiras diez a la misma letra de arriba, y restaras de todo esto la de abaxo. Y lo q̄ que-
dare, ponerlo has debaxo de la raya, y llevaras vno para proseguir, &c. *Nam si inequalibus equalia addas, ipsa quoque fient inequalia.*

5. Cõce
cio del
1. de Eu
cli.

Exemplo. Quiero restar 757. de 901. pongase en figura, poniendo lo que es mas arriba desta manera que parece. Y comiença diziendo.

R. 901 Quien de vno saca siete, no
 ————— puede ser: pues porque no

G 757 junta diez con el vno, y seran onze. Resta aora diziendo. Quien de onze saca 7. quedan 4. Pon 4. debaxo de la raya, y lleva vno para juntarlo con la primera letra q̄ se sigue de la partida de abaxo, que es 5. y serã 6. los quales restan de la letra de arriba, que es zero. Y porque no pueden ser restados seys de vn zero, añadiras diez con el zero, y seran 10. Resta aora los seys, y quedaran quatro, los quales pondras debaxo de la raya, y llevaras vno: el qual juntas con el siete que se sigue, y seran ocho. Resta ocho de los nueue de arriba, pues puede ser, diziendo. Quien de nueue saca ocho, queda vno. Pon vno debaxo de la raya, y assi auras acabado: y diras, que restando 757. de 901. quedã 144. como parece. Nota esto, porque assi se restaran qualesquier cuentas de menor, o mayor cantidad, y con menos trabajo.

Recibo.	901
	—————
Gasto.	757
Alcançò	144
	—————

Restar

*Restar monedas diferentes, o cosas de pesos,
o medidas, &c.*

PARA restar algunas cantidades de diuersas diferencias, tendras auiso de poner cada cosa debaxo de su semejante. Como si quisieses restar quintales, arrobas, libras, y onças. Pondras (como dixen en el sumar) quintales debaxo de quintales, arrobas debaxo de arrobas, libras debaxo de libras, &c. Y començarás a la mano derecha, restando las onças del renglon de abaxo de las de encima, y las que quedaren ponlas debaxo de la raya, enfrente de las onças. Y si las onças de abaxo fueren mas que las de arriba, sacaras las de abaxo, de vna libra, que vale diez y seys onças, y lo que restare, juntarlas has con las otras onças que estan encima, y todo juto ponerlo has debaxo de la raya, enfrente de las onças, y llevaras vna libra para juntarla con las otras libras, q̄ estan debaxo, las quales restaras de las libras de arriba, y las que restaren, ponerlas has debaxo de la raya, enfrente de las mismas libras. Y si a caso fueren mas las libras de abaxo q̄ las de encima, quitalas de vna arroba, q̄ valen veynte y cinco libras, y lo que quedare juntalo con las libras q̄ estan arriba, y p̄lo todo debaxo de la raya, enfrente de las libras, y esta arroba de que te seruieste, juntala cō las arrobas

40 LIBRO PRIMERO.
de abaxo, y restaras segun hemos mostrado, y
aqui parece figurado.

R. 15 quinta. 2.arrob. 7.libr. 23.onç.

G. 13 quinta. 2.arrob. 9.libr. 8.onç.

A. 1 quinta. 9.arrob. 23.libr. 5.onç.

¶ Esta es la orden que se ha de tener para en todas diferências, ya sea pesos, o medidas: porque no aura que hazer otra cosa, sino restar vn semejante de otro, como. Adarames, de adarmes, onças, de onças, &c. Afsi como en el sumar se declaró que sumasses vnos generos con otros. Lo mismo guardarás en las medidas, en que restes celemines, de celemines: anegas, de anegas: cahizes, de cahizes, &c. Y en el vino quartillos, de quartillos, açumbres, de açumbres, &c.

Prueuas para el sumar, y restar.

¶ Ya que hemos puesto lo necesario acerca del sumar, y restar: resta dar prueuas, para saber si las tales sumas, o restas estan verdadera, o falsaméte hechas. Acerca de lo qual se notara, que la prueua real del sumar, es restar: y al contrario, la del restar, sumar: como por la práctica de los exemplos mejor se entendera.

Prueua real del sumar.

¶ Para prouar, y saber, si vna suma está verdaderamente

tamente hecha, fumaras otra segunda vez las mismas partidas, dexando vna qualquier dellas por fumar, y restando la segunda suma de la primera, lo que viniere a la resta sera tanto como la partida que dexares de fumar la segunda vez. Exemplo. Pon que quieres fumar las quatro partidas siguientes.

4	5	6	¶	La primera de las quales monta
2	0	3		quatrocientos, y cincuenta y seys.
7	1	2		La segunda dozientos y tres. La
1	1	2		tercera setecientos y doze. La quar-
—————				ta, y vltima, ciento y doze. Que su-
1	4	8	3	madras segun hemos mostrado mon-

taran, mil y quatrocientos y ochenta y tres, como parece figurado.

¶ Pues para saber si esta suma está verdaderamente hecha, quitaras vna partida, qualquiera de las quatro, señalandola con vna raya, y pongo que quitamos la vltima de abaxo, que es ciento y doze (aunque no importa nada que sea otra qualquiera) desta manera.

¶ Hecho esto fumaras otra vez las tres partidas, que quedan fuera del ciento, y doze que quitaste, que son estos que se figuen.

4 5 6 Y montaran mil y trecentos y setenta
 2 0 3 y vno los quales restaras de los 1 4 8 3.
 7 1 2 que es la suma principal de todas qua-
 — — tro, y quedaran 112. que es tanto como
 1 3 7 1 la partida de abaxo que quitaste. Y así
 — — se prouaran qualesquiera sumas de grã
 de, o pequeña cantidad.

Prueba real del Restar.

¶ La prueba del restar se haze sumando. Para declaracion de lo qual sabras (segun se ha dicho) como qualquiera resta de pequeña, o grande cantidad que sea trae tres numeros, o partidas. La primera es el recibo, o el numero, del qual queremos sacar alguna cosa. La segunda es la del gasto, o la que se ha de restar. La tercera es la diferencia q̄ el numero mayor haze al menor, que es lo que dezimos alcance, o resta. Entendido esto, la prueba es, que la suma de las dos partidas menores, sera tanto como la mayor, y sino fuere tanto la resta, estara falsamente hecha. Exemplo. Resta dozientos y doze, de trecientos y quarenta y seys, que restando, segun la regla manda, quedaran 134. como parece. Digo q̄ juntando las dos partidas menores destas tres que son 212. con 134. han de hazer tanto como la mayor. Y porque es cosa clara q̄ sumando el hasto con los que se quedare de
 uien-

uiendo, ha de ser tanto como lo que se recibe,
no curò de poner mas exemplos por euitar pro-
lixidad.

Recibo 3 4 6

Gasto. 2 1 2

Alcanço 1 3 4

Prueba Partir. 3 4 6 *Prueba*

Cap. IX. Trata la tercera especie, o regla general de
Aritmetica, que se dize multiplicar.

Multiplicar vn numero por otro, es buscar
vn otro numero tercero de tal condicion,
que se aya con el vno de los numero en la pro-
porcion que el otro con la vnidad, y al cõtra-
rio. Exemplo. Tres vezes 4. son doze, digo que
este 12. se ha con el 4. que es el vno de los dos
numeros multiplicados, como el otro numero
que es 3. con la vnidad que es tripla. Y al cõtra-
rio la proporcion que haze 12. a 3. essa haze el 4.
a la vnidad que es quadrupla. Finalmente este
tercero numero cõtiene a qualquiera delos dos
numeros tãtas vezes, como el otro tiene vni-
dades. Y aunq̃ multiplicar el tres por el 4. o otros
qualesquiera par de numeros, no quiere dezir

Para
funda-
mẽto de
esta re-
glatrae
a la me-
moria
el 2. y 3.
y seys
princi-
pio del
4.º de
ste. li.
La ra-
zõ deste
multi-
licar.
Zãber.
en la 16
del 9.

otra

otra cosa mas que tomar el 3. quatro vezes, o el quatro tres vezes, que sumandolo de vna manera, o de otra, hazen lo mismo, fue inuentada la regla del multiplicar, para sumar con mayor breuedad. Para operacion desta regla, ay necesidad de saber lo que monta, multiplicado qualquier numero digito por si mismo, o por otro, lo qual se declara facilmente por las tablas siguientes.

9—9—81	8—6—48	7—2—14	5—2—10
9—8—72	8—5—40	7—1—7	5—1—5
9—7—63	8—4—32	6—6—36	4.ve.4.son16
9—6—54	8—3—24	6—5—30	4—3—12
9—5—45	8—2—16	6—4—24	4—2—8
9—4—36	8—1—8	6—3—18	4—1—4
9—3—27	7.ve.7.son49	6—4—24	3.ve.3.son9
9—2—18	7—6—42	6—1—6	3—2—6
9—1—9	7—5—35	5—5—25	3—1—3
8 ve.8.son64	7—4—28	5—4—20	2.ve.2.son4
8—7—56	7—3—21	5—3—15	2—1.son2
		1.ve.1.—es—1	

¶ Para entenderla tabla precedete se ha de presuponer que el 9. de la mano yzquierda pregunta al otro de enmedio, y responde el numero tercero, que esta a la mano derecha, desta manera. Dize el primer 9. al segundo 9. vezes nueue quãtos son, responde el numero tercero y dize, ochenta y vno. Y assi mismo pregunta el 9. de mas

mas abaxo al 8. diziendo nueue vezes ocho quãto es? Y responde el tercero, y dize 72. Por la mesma orden preguntan todas las primeras letras, a las de enmedio, y responden las terceras hasta tanto que la tabla se viene a fenecer diziẽdo. Vna vez vno quanto es? Responde el postre ro, y dize, es vno.

¶ Porque algunos se les haze cosa dificultosa decorar la tabla de la fuerte que se ha dado, pondre tres diferencias de tablas: porque cada vno estude laque pudiere, sino pudiere, la que quisiere: pues es cosa que no se puede escusar para cõtar.

Regla primera para el 9.

¶ Todas las vezes que multiplicando vn numero digito por si mesmo, o por otro: si el vno, o ambos fueren nueues, se tendra esta regla, que quites vno del numero menor: y los que quedaren seran diezes, y mira desto que quedare quanto falta para 9. y lo que faltare seran vnidades, y jũtate han con los diezes. Exemplo. Pongo que quieres saber, ocho vezes 9. quanto montan? quita del menor destos numeros que es 8. vno, y q̄daran 7. estos siete haras diezes, y assi seran setenta. Mira ahora quanto falta del 7. para 9. y hallaras faltar 2. los quales añade a los setenta, y seran setenta y dos, y tãto es 9. vezes 8. ò ocho vezes 9. Otro exẽplo. Nueue vezes 9. quanto montan. Porque ambos son nueues, y ninguno es me

nor que otro, del vn 9. quita vno segun manda la regla, y quedaran 8. estos ocho hazlos diez, y seran ochenta, mira quanto falta del mismo 8. para 9. y hallaras faltar vno, que junto con los ochenta seran 81. y tanto monta 9. vezes 9. Hazese esto de otra manera dos vezes 9. hazlos dos diez, y seran 20. quita destes 20. los mismos dos, y seran diez y ocho.

Regla para el ocho.

¶ Quando multiplicares vn numero digito por otro, si el vno alomenos fuere 8. o ambos, haras diez el menor, y si fueré iguales el vno dellos, y destes diez quitaras tantas vnidades quãtas montare el duplo del mismo numero menor.

¶ Exemplo. Dos vezes 8. quanto montan: Haz diez el dos que es el numero menor, y seran 20. dobla el mismo numero menor, y seran 4. sacalos de los 20. quedan 16. y tanto diras q̄ monta dos vezes 8. Si dezimos ocho vezes 9. ya sale de la regla del 8. y se hara por la del nueue que se dixo primero.

Regla del siete.

¶ Quando multiplicares dos numeros digitos vno por otro, si el vno, o ambos fueren siete tomaras tantos diez como vnidades hãuiere en la mitad del numero menor, y juntarse han con ellos tãtas vnidades como huiere en el doblo del mismo numero. Exemplo. Dos vezes siete quãto montã, la mitad del 2. es vno, el qual haras 10.

Junta con este 10. el duplo del mismo numero, menor que son 4. y seran 14. ytanto montan 7. vezes 2. &c.

¶ Otro exemplo 7. vezes 7. quanto montan? Porque son yguales, no importa tratar mas con el vno que con el otro, y sacaras la mitad q̄ son 3. y medio, hechos diezes valen 35. dobla el mesmo 7. y seran 14, Juntalos con 35. hazen 49. ytãto montan 7. vezes 7.

¶ Regla para 6.

¶ Quando multiplicares vn numero digito por otro, si el vno dellos fuere 6. o ambos, añade al numero menor tãtos diezes, como vnidades huuiere en el numero menor. Exemplo, 2. 6. quanto môtã? Saca la mitad del 2. q̄ es el menor, y sera 1. Hazese diez, el qual juntaras cõ el mesmo numero menor, q̄ es 2. y seran 12. y tanto monta 6. vezes dos. Otro exemplo 3. vezes 6. quãto montan? La mitad de tres es vno y medio, hecho diezes son 15. Juntos cõ el mismo 3. q̄ es el numero menor seran 18. y tãto diras q̄ monta 3. vezes 6

¶ Regla para el 5.

¶ Quando multiplicares vn par de numeros siẽdo el vno 5. y el otro qualquiera de grande, o pequeña cantidad, dexa el 5. tomar tantos diez es como huuiere vnidades en la mitad del otro. Exemplo 4. vezes 5. quanto monta? Toma la mitad del 4. que son dos, hechos diezes serã 10. y tanto monta 5. vezes quatro.

lamita

Regla para el 4.

¶ Dos vezes 4. toma la mitad del dos que es vno, hazle diez, y serà 10. faca el mismo 2. y quedaran ocho, y assi en lo demás.

¶ Del 3. ni del dos no doy regla, porque quien ignora que tres treses hazen nueue, y dos doses quatro. &c.

Otra diferencia de tabla.

¶ Si quieres multiplicar vn numero digito por si mismo, por otro qualquiera numero digito. Como 8. vezes 6. o siete vezes 6. &c. Assentaras el vn numero qualquiera dellos encima del otro poniendo delante de cada vno, hazia la mano derecha lo que les faltare para llegar a diez. Como si dixesse mos 8. vezes 7. quanto montã? Pon el vno encima del otro, poniendo delante del 8. vn dos, y delante del 7. vn tres, que es lo que les falta par a diez, como parece.

8—2 ¶ Hecho esto, multiplicaras las faltas 7—3 que a los tales numeros les falta para llegar a diez, la vna por la otra, como son dos, y tres diziendo 2. vezes tres hazen 6. Estos 6. se assentaran debaxo de la raya por vnidades como parece.

8—2 ¶ Y luego restaras la falta del vno
7—3 numero del otro numero contrario,
—6 y no importa que sea qualquiera.
Quiero dezir, que el tres, que es la falta del siete, lo restes del ocho, o los dos que es la falta del

que sera cosa mas embaraçosa, que compendio
sa.

¶ Otro modo de multiplicar numeros digitos,
ocho vezes 7. quanto monta? Has el ocho die-
zes, y seran 80. mira de siete que es el otto quan-
to le falta para 10. y seran 3. multiplica 3. para 8.
y seran 24. resta 24. delos 80. y quedaran 56. y tã-
to monta, y al contrario haras con el 7. lo que
hiziste con el 8. De Orócio en el primero de su
Arifmetica.

¶ Despues que la tabla se entienda, has de saber
que en qualquier multiplicacion ocurren siem-
pre tres numeros. El vno se dize multiplicante,
o multiplicaciõ: y sera este tal numero, todo co-
sa que se comprare, o vendiere. El otro se dize
multiplicador, que es el precio, o valor dela co-
sa comprada, o vendida. Y de la multiplicacion
destos dos numeros sale otro numero tercero q̄
se dize producto, que es el valor de las tales co-
sas q̄ se cõpran, o venden a tanto precio cada
vna, como quien dixesse. Veynte hanegas de tri-
go, a 4. reales la hanega, montan ochenta reales
Las 20. hanegas se dira multiplicante, o multi-
plicacion, el precio de cada hanega se dize mul-
tiplicador, los 80. reales que dezimos que valẽ
se dize producto.

¶ Nota este numero q̄ dizen producto, en quan-
to al proposito que aqui presupongo, siempre se-
ra del especie de moneda, o cosa de las q̄ fuere
el

el multiplicador. Quiero, dezir, q̄ si el multiplicador fuere marauedis, lo que viniere al producto sera marauedis, y si ducados, ducados, &c. Y assi entenderas en el exemplo preccediente de las veynte hanegas de trigo, que los ochenta q̄ vinieron al producto son reales: porque el multiplicador en este exemplo fue reales.

¶ Exemplo y platica. Pongo por caso que quieres saber 24. varas de paño, o lo que te pareciere, a razon cada vara de 13. reales quanto motá? Assentaras el vn numero sobre el otro, poniendo las vnidades, enfrente de vnidades y dezenas, enfrente de dezenas, &c. como aqui parece figurado.

Multiplicacion, o multiplicante.	4 2
Multiplicador.	1 3

¶ Y despues multiplicaras con cada letra de las del multiplicador, todas las de la multiplicacion, començado de la vnidad del multiplicador que es 3. diziendo. Tres vezes 2. son 6. assienta 6. debaxo de la raya, enfrente del 3. del multiplicador, y passa con el mismo 3. a multiplicar el 4. que està en la multiplicacion. Diziendo. 3. vezes 4. son 12. Assienta 2. adelante delos 6. que pusiste primero, discurrendo hàzia la manoyzquierda, y el vno del 10. assientalo, porque no ay mas letras en la multiplicacion por multiplicar, como parece figurado.

4 2 ¶ Y así auras multiplicado con el tres
 1 3 que está en el multiplicador, las figu-
 ——— ras que están en la multiplicación. To
 1 2 6 ma otra letra del multiplicador, que
 fera el vno, y multiplica otra vez los mismos
 42. que están en la multiplicación, cada vna le-
 tre por sí, como hiziste con el 3. diziendo. Vna
 vez 2. son 2. asíenta 2. debaxo del mismo 1. del
 multiplicador enfrente del dos, desta manera
 que parece.

4 2 ¶ Y prosiguiras, multiplicando con el
 1 3 mi movno del multiplicador los 4. que
 ——— están arriba en la multiplicación, dizié-
 1 2 6 do. Vnavez 4. son 4. asíenta 4. mas ade
 2 lante del dos, que acabaste de poner,
 viniendo haziendo partidas, àzia la mano yz-
 quierda, como parece figurado.

4 2 Esto hecho, por quanto con cada letra
 1 3 de las del multiplicador se han multipli-
 ——— cado todas las de la multiplicación, ha
 1 2 3 ras vna raya debaxo de todas las letras,
 4 2 desta manera.

Y sumaras lo q̄ estuviere entre ambas las 4 2
 2. rayas (como se mostro en la regla ge- 1 3
 neral de Arismetica, q̄ se dize sumar) af-
 sentado la letra que estuviere sola deba 1 2 6
 xo de la raya, enfrente del lugar do la 4 2
 hallares, y las q̄ estuieren vnas en par ———
 de otras, juntáolas todas, segū se entendera en
 este

este exēplo, en que el 6. que està al principio de la mano derecha, le pondras debaxo de la raya, porque està solo, y passaras adelante a sumar el 2. con el 2. y seran 4. Afsienta quatro, y profigue juntando el 4. que està mas adelante con el vno y seran 5. pon 5. como parece figurado.

4 2 ¶ Y afsi quedaran figurados qui-

1 3 nientos y quarenta y feys, y este es

———— el tercero numero, que llaman pro-

1 2 6 ducto, y tantos reales valen las di-

4 2 chas 42. varas a 13. reales cada va-

———— ra. Esta es la orden que se tendra

5 4 6 en otra qualquiera multiplicacion

de mayor, o menor cantidad.

¶ Otro exemplo. 57. reales, quantos maravedis seran? Afsi como digo reales, se puede dezir de otra qualquier moneda, y afsi como puse 57. se puede poner otro qualquier numero de mayor, o menor cantidad. Pues boluiēdo a nuestro proposito afsienta los 57. reales, y debaxo dellos los maravedis que vn real vale, que son 34. como parece.

5 7 Y multiplica con cada letra del multipli-

3 4 cador todos los de la multiplicacion, se-

— gun en el primero exemplo se declarò di-

zendo 4. vezes 7. son 28. Afsiēta 8. debaxo de la

r. ya, enfrente del mismo 4. y por los 20. lleua-

rás dos para juntarlos con el producto de la pri-

mera letra que multiplicares. Multiplica mas

con el mismo 4. el 5. que está en la multiplicacion, diziendo 4. vezes 5. son 20. Junta con estos 20. los dos que traes, y seran 22. afsienta 2. que passan de diez, adelante del 8. yendo de la mano derecha házia la yzquierda, y llevaras 2. por los 20. Mas porque se han multiplicado con el 4. del multiplicador todas las letras de la multiplicacion, assentaras los dos que auias de llevar (si mas letras huiera por multiplicar) adelante del otro 2. como parece figurado.

5 7 ¶ Multiplica mas con el 3. del multiplicador los 57. cada letra por si, diziendo
 3 4
 ——— 3. vezes 7. son 21. afsienta vno que passa
 2 2 8 de diez debaxo de la raya, enfrente del 2. que está junto al ocho, y por los 20 lleva-
 ras 2. Passa a multiplicar cō el mismo 3. los 5. de la multiplicacion, diziendo.

Tres vezes 5. son 15. con los quales juntaras los 2. que trayas de los 20. y seran 17. Afsienta 7. q̄ passa de 10. debaxo de la raya enfrente del segūdo 2. que está adelante del 8. y llevaras vno por el 10. el qual porque no ay mas que multiplicar, lo assentaras adelante prosiguiendo házia la mano yzquierda, como parece.

5 7 ¶ Y fumar se ha segun se ha dicho to
 3 4 do lo que estuuiere entre las rayas, y
 2 2 8 hallaras q̄ monta mil y nouecientos
 2 7 1 y treynta yocho, y tantos m̄rs montā
 los dichos cincuenta y siete reales.

1 9 3 8.

¶ Otro

¶ Otro exemplo, quatro mil y ochenta carneros, a setecientos, y sesenta maravedis cada carnero, quanto montan? Pon los carneros, y debaxo el precio de vno, desta manera.

5 7

3 4

2 2 8

1 7 1

1 9 3 8

4 0 8 0 Carneros.

7 6 0 Precio.

¶ Multiplica con el zero, que es la primera letra del multiplicador diziendo. Zero vezes zero (Que es tanto como dezir nada vezes nada) es zero. Assienta vn zero debaxo de la raya en frente del mismo zero, y passa adelante con el mismo zero a multiplicar el 8. y di. Zero vezes 8. es zero; porque lo mismo es dezir, zero vezes 8. que nada vezes 8. Pues por quanto no monta nada, assentaras vn zero debaxo de la raya, en frente del 8. que multiplicaste, y passaras con el mismo zero a multiplicar otra letra dela multiplicacion, que también es zero, y diras, zero vezes zero, es zero. Assiéta otro zero debaxo de la raya, adelante de los otros dos que tenias assentados, discurrendo házia la mano yzquierda y passaras con el mismo zero a multiplicar otra letra dela multiplicaci6n, q es 4. diziendo, zero vezes 4. es zero. Podras otro zero, y assi auras aca

bado de multiplicar con el zero, que es la primera letra del multiplicador, todas las de la multiplicacion y auratevenido por el producto de la primera letra quatro zeros, q̄ todos ellos no valen nada: quales quedaran figurados desta manera.

4 0 8 0 ¶ Ya que has multiplicado con la
 7 6 0 primera letra del multiplicador todas las de la multiplicacion, toma
 ————— otra letra del multiplicador. La primera siguiente, que es 6. con el qual multiplicaras las de arriba, diziendo, 6. vezes zero es 0, asienta vn zero debaxo de la raya, enfrente del mismo 6. porque multiplicando qualquier figura con el zero, o zero con qualquier figura, nunca monta nada. Y assi passaras con el mismo 6. a multiplicar otra letra de las de la multiplicacion, que es 8. Y diras 6. vezes 8. son quarenta y ocho. Asienta ocho, que pasan de diez justos mas adelante del zero que ~~ahora~~ acabaste de asentar, viniendo azia la mano y izquierda, guardando las derechas comenzadas con los zeros, y lleuaras 4. por los quarenta, para juntarlos con el producto de la letra primera siguiente. Pues multiplica con el mismo seys la otra letra que le sigue despues del ocho que está en la multiplicacion, que es zero: diziendo. Seys vezes zero, es zero: con lo qual juntaras los quatro que trayas en la memoria de los quarenta, y seran quatro:

tro los quales pondras debaxo de la raya, enfrente del vntimo zero, q̄ està ázia la mano yzquierda. Multiplica mas con el mesmo seys, otra letra de la multiplicacion, que es quatro. Diciendo 6. vezes 4. son veynte y quatro. Assienta 4. adelante dela otra que assentaste, y lleuaras dos por los 20. Y porq̄ no ay mas letras en la multiplicacion que multiplicar cō el 6. assentaras los dos que traes de los 20. adelante de los 24. porque los diez es que con vna letra del multiplicador se hizieren, no se han de guardar para juntarlos con lo que se multiplicare con otra: y assi auras multiplicado con el seys, y quedara la figura desta manera.

$$4 \ 0 \ 8 \ 0.$$

$$\underline{7 \ 6 \ 0}$$

$$0 \ 0 \ 0 \ 0.$$

$$2 \ 4 \ 4 \ 8 \ 0.$$

$$\underline{2 \ 8 \ 4 \ 6 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0}$$

¶ Profigue multiplicando con el siete, que està en el multiplicador, las de la multiplicacion: assi como hiziste con el seys, diziendo. Siete vezes zero, es zero. Assienta zero debaxo de la raya, enfrente del 7. y passa a multiplicar con el mesmo 7. los ocho que estan adelante del zero, diziendo. siete vezes ocho, son 56. assienta 6. debaxo de la raya, enfrente del primer 4. que està en la partida q̄ hiziste con el 6. y lleuaras cinco por

los cincuenta , para juntallos con lo que se fi-
 guiere : y passaras a multiplicar con el mesmo
 siete la tercera letra de la multiplicacion , que
 es zero, y diras. Siete vezes zero, es zero: asien-
 ta el cinco que trayas del cincuenta , adelante
 del feys, discurriendo hàzia la manoyzquierda,
 y multiplicaras la quarta letra dela multiplica-
 cion, que es quatro, diziendo. Siete vezes qua-
 tro son veynte y ocho. Y porque no ay mas
 que multiplicar, assiéta los veynte y ocho, ade-
 lante del cinco que acabas de poner , viniendo
 discurriendo hàzia la mano yzquierda como pa-
 rece figurado.

$$\begin{array}{r}
 4080 \\
 760 \\
 \hline
 0000 \\
 24480 \\
 28560 \\
 \hline
 3100800
 \end{array}$$

¶ Que sumando lo que ay entre las dos rayas
 monta tres cuentos , y cien mil y ochocientos
 marauedis , y tanto responderas que valen los
 dichos 4080. carneros , a 760. marauedis cada
 vno , como parece en la figura , y assi se haran
 otras qualesquiera multiplicaciones de mayor,
 o menor cantidad.

4 0 8 0

7 6 0

0 0 0 0

2 4 4 8 0

2 8 5 6 0

3 1 0 0 8 0 0

Avisos de multiplicar por numero articulo, por causa de breuedad.

QVando en la multiplicacion, o multiplicador viniere la vnidad sola, cō zeros, pocos, o muchos: digo q̄ añadiendo los zeros q̄ huuiere en la parte de la vnidad a la otra quedara hecha la tal multiplicaciō. Exemplo 1000. vacas, y 3048. q̄ monta? Ponlo en figura como parece.

1 0 0 0

3 0 4 8

¶ Y porque en la multiplicacion esta la vnidad sola, sin otra letra significatiua, cō tres zeros, no ay que hazer otra cosa, segun se ha dicho, sino añadir a los 3048. que estā en el multiplicador, los tres zeros que estan en la multiplicacion, de esta manera 3048000. y tātō es lo que montan las dichas mil vacas, a razon cada vna de 3048. marauedis.

¶ Otro

60 LIBRO PRIMERO.

¶ Otro exemplo. Dozientas gallinas, a cien marauedis cada vna, quanto monta?

2 0 0

1 0 0

Por quanto en el multiplicador viene la vnidad añadirse han los dos zeros que trae la multiplicacion, que es 200. Desta manera.

2 0 0 0 0

1 0 0

Y quedaran figurados veynte mil, y tanto mō tan las dichas gallinas.

¶ Otro exemplo. 100. aues a diez marauedis cada vno quanto montan? Afsienta la vna suma sobre la otra, como parece.

1 0 0

1 0

¶ Y porque en la vna parte y otra, viene la vnidad con zeros, añadiras el zero de abaxo a los 100. y seran mil, o los dos zeros de arriba abaxo, y tambien seran mil: y afsi se haran las semejantes.

¶ Nota mas, que si huuiere en el multiplicante, o multiplicador el dos solo sin otra letra de las significatiuas, doblaras la otra partida, y añadele los zeros de la parte del dos, segun se dixo de la vnidad.

Exemplo.

Exemplo. 2000. hanegas de trigo a 153. maravedis la anega, quanto valen? porque en la multiplicacion viene el 2. y trae tres zeros consigo, doblalos 153. del multiplicador, y será 306. a los quales añadiras los 3. zeros, desta manera 306000. y sera el numero de lo que valen las dichas hanegas de trigo

¶ Nota lo que hemos dicho del dos, porq̄ si fuere tres, tres doblaras, y añaditas los zeros. Y si quatro, quatro dobla: y si cinco, cinco doble, &c

Regla para multiplicar desde onze vezes onze hasta diez y nueue vezes diez y nueue. Finalmente, es regla general para multiplicar qualesquier numeros siendo yguales en dezenas.

Para multiplicar desde onze vezes onze, hasta diez y nueue vezes diez y nueue, o de otros numeros iguales en dezenas, assi como: doze vezes catorze, onze vezes quinze: diez y seys vezes diez y seys, y assi de otros qualesquier numeros: tendras la regla; que en estos exemplos se declarare. Doze vezes treze, quanto montan? luenta los 2. del 12. con los 13. o los 3. del 3. con los 12. que de vna manera y de otra monta 156. Ellos 156. será diezes, multiplica agora las vnidades destos dos numeros vno por otro,

que

que son dos y tres, diziendo. Dos vezes tres son seys. Estos seys juntaras por vnidades a los 15. diezies que tenias, y fera 156. y tanto monta doze vezes 13. Otro exemplo 15. vezes 15. quanto monta? Junta el 5. del vn quinze con los otros 15. y seran 20. Estos 20. son diezies, y assi seran dozientos. Multiplica aora las dos vnidades de estos quinzes, que son dos cincos, diziendo. Cinco vezes cinco, son 25. junta estos 25. cō los dozientos, y fera todo doziētos y veynte y cinco. Y tanto diras que monta quinze vezes quinze. Otro exemplo. 24. vezes 26. quanto monta? Junta el quatro que es la vnidad del 24. con los 26. o el 6. de los 26. con los quatro que no haze mas vno que otro, y de qualquiera suerte hazen 30. Los quales doblaras (por causa que en cada vno de los dos numeros que multiplicas traen dos diezies) y seran 60. Estos 60. seran diezies que son seyscientos. Hecho esto, multiplica las vnidades de los dos numeros, que son quatro, y seys, diziendo. Seys vezes quatro son 24. juntos con los seyscientos, son 624. y tanto monta 24. vezes veynte y seys.

¶ Nota, que assi como en el exemplo precedente doblaste los cincuenta, por causa que cada vno de los numeros truxo dos diezies, que si truxeren a tres diezies, tres doblaremos, y si 4. quatro doblaremos,

Algunos compendios para multiplicar de memoria.

Multiplicando vnidades por dezenas : lo q̄ viniere seran dezenas. Exemplo. Seys vezes 40. quanto monta? Multiplica el 6. por el 4. del 40. no curando del zero, diziendo. Seys vezes 4. son 24. y asfi diras q̄ seys vezes 40. montan 24. dieztes, que valen docientos y quarenta. Multiplicado dezenas por dezenas, hazen ciētos. Exemplo 60. vezes 50. quanto monta? multiplica el 6. por el 5. no curando de los zeros, diziendo. Cinco vezes 6. o 6. vezes cinco son 30. Estos treynta son cientos, que valen 3000. y tanto monta 60. vezes 50.

Multiplicando dieztes por cientos, se hazen millares. Exemplo 20. vezes 700. quāto mōta? multiplica el 2. del 20. por el 7. de los 700. diziēdo. Dos vezes 70. fiete vezes dos son 14. estos 14. son millares. Y asfi diras, que 20. vezes 700. montan 14000.

¶ Multiplicando cientos, por ciētos, vienen dieztes de millares. Exēplo 300. vezes 200. quanto monta? Multiplica el 2. por el 3. diziendo. Dos vezes 3. son seys. Estos 6. son dieztes, q̄ son sesenta. Y por quanto se nōbran ser de millares, seran sesenta mil, y tanto es 200. vezes 300.

Y desta manera, el que quisiere ser curioso, añuentara compēdiosas multiplicaciones. Edo
fitas

firue para el multiplicar de calculos, que se mostrara adelante en xiiij. cap. deste libro primero.

¶ Nota este exemplo para multiplicar cosas de pesos, o medidas, euitando quebrados. Quatro arrobas y cinco libras de lino, a razon de a veynte reales y veynte marauedis el arroba, quanto valen? Reduze las 4. arrobas a libras (q̄ es la mas baxa pesa que en este exemplo se haze mencion) y seran 105. libras. Reduze mas los 20. reales y 20. marauedis, todo a marauedis: y seran 700. marauedis, parte aora 700. marauedis, que es el precio de vna arroba, por 25. libras que tiene el arroba. Por saber a como sale la libra, y vendran 28. y tantos marauedis sale la libra. Aora multiplica 105. libras, por 28. marauedis (segun el precio deste exemplo vale la libra) y vendran 2940. y tantos marauedis valen quatro arrobas y cinco libras de lino, a veynte reales y veynte marauedis el arroba, y afsi haras las semejantes. Otros muchos modos ay de multiplicar, los quales no pongo, porque por lo dicho sacara, y inuentara el que le pareciere bien quanto quisiere.

Cap. X. De la quarta especie, y regla general de Arismetica, que se dize partir, o diuidir.

LA quarta especie de Arismetica se dize partir: y no es otra cosa partir vn numero por otro,

otro, sino buscar vn otro numero tercero, que se aya con la vnidad en tal proporcion, como el numero que partieremos con el partidor, como si partiessemos 8. a 2. digo que lo que cupiere se aya en tal proporcion con la vnidad, como se ha el 8. (que en este exemplo es la particion) cō el 2. que es el partidor.

¶ En el partir principalmente ocurren tres numeros. El primero se dize suma partidera, o particion: y este tal numero es toda cosa que quisieremos partir, o diuidir en qualesquier partes iguales, o desiguales. El segundo se dize partidor, o diuisor, que son los compañeros, o partes en quē se ha de diuidir la particiō. El tercero se dize quociente: que es lo que cabe, o viene a cada parte, o compañero, como quien dixesse. Parte 12. a 3. compañeros. Responderas q̄ cabe a cada vno de los 3. Pues los 12. que partimos, se dize particiō, o suma partidera. Los 3. se dize partidor, diuisor. Los quatro que cupieron a cada compañero, se dize quociente.

¶ Para mayor declaracion desta regla, se diuidira en tres partes. La primera sera enseñar partir por numero digito: q̄ sera, quando los compañeros, o partes en quē huieres de diuidir, o partir alguna cantidad, no llegaren a diez: a la qual diferencia el vulgo dize medio partir. La segunda por numero articulo, que sera, quando los compañeros fueren diezes justos. La tercera, y

ultima por numero compuesto: que sera, quando el partidor estuviere compuesto de diez, y vnidades. Y puesto que yo aya nombrado tres diferencias, no se entienda, que en el obrar sean diferentes: porque de la suerte que partieres por numero dígito, assi partiras por articulo y compuesto, sino fuere queriendo vsar de algun compendio particular.

¶ Antes que entremos en declaraci6n desta primera diferencia, se notaran ciertos preceptos generales.

¶ Lo primero, haras vna raya debaxo de lo que huieres de partir: y a la parte de la mano izquierda, se pondran los compañeros, haziendo vna raya atrauessada entre la particion y el partidor, como si nos demandassen 860. ducados, a quatro hombres, quanto vendra a cada vno? Pondras los ducados que quieres partir, y al lado izquierdo los quatro compañeros, con las rayas desta manera.

$$4 \mid \underline{860}$$

¶ Y començaras a partir por hãzia la mano yzquierda, partiendo primero los ochos, y luego los seys, y assi por orden procediendo de figura en figura hasta llegar a la postrera de la mano derecha.

¶ Lo segundo, todas las vezes que la letra del partidor no cupiere en la letra de la particion, se
han

han de hazer dos cosas. La primera, assentar vn zero debaxo dela raya, enfrente de la letra que no se puede partir, por señal que no cabe, sino fuere en principio de la particion: porque en tal caso el zero no haze, ni deshaze, por estar antepuesto a las letras. La segunda, que esta letra que no se pudiese partir, en este grado, o lugar que aora lo tomas, se juntara con la primera letra, que se le siguiere de la particion: y la primera valdra tantos diezes quantos vnos por si sola valiere, y aquella que le ayuntares, tendra lugar de vnos. Como queriendo partir 215. a 5. cópañeros, despues de puestosen figura, como hemos mostrado, diras. Dos repartidos a cinco no cabe, pues porque no cupo el 5. en el 2. enteramente, ayuntaras los dos con la figura que se sigue en la particion, que es vno, y diras. En veynete y vno, quantas vezes entran cinco, hallaras que caben quatro vezes, y sobra vno.

¶ Acerca desto notarás dos cosas. La primera, que lo que cabe se assentara enfrente dela figura següda destas dos que partes, que en este exemplo sera enfrente del vno. La segunda, que lo que sobrare se pondra encima de la misma segunda letra de la particion (siendo el partidior numero digito) y la sobra tambien.

¶ Lo tercero, si la primera letra de la particion se pudiese partir por la del partidior, partase, y lo que cupiere, ponerseha debaxo de la raya, en-

frente de la misma letra que partiere, y lo que sobrare encima, y fino sobrare nada pongase vn zero.

¶ Lo quatto, las letras que pusieres sobre otras letras de la particion, por causa que sobran, que deran en lugar de diez por quanto se han de juntar con la letra que se figuiere despues para partirlo todo: mas fino huuiesse ninguna letra (por estar al fin de la particion) que juntarle, en tal caso no estara en el lugar de dezena, sino de vnidad.

+ ¶ Lo quinto, todas vezes que cupiere algo multiplicaras lo que cupiere por el partidor: y lo que montare, restarlo has de la letra, o letras que partieres, y si restare algo, ponerlo has sobre las mismas letras, de que restas: y fino restare nada pondras zeros, en señal que no queda nada por partir.

¶ Lo sexto. Quando partieres qualquier letra, no siendo la primera de la mano derecha, procuraras, que la tal particion no se quiebre la vnidad. Como si partiesses $7.4 \div 2$. diras q̄ cabe 3. y sobra 1. Quero dezir, q̄ aunq̄ pudieras partir los siete a los dos, y darles a 3. y medio, no les daras sino a 3. y sobrata vno porque se rompe la vnidad: el qual vno aunque dezimos que sobra: no por esso entenderemos, que se ha de quedar por partir: porque ya que no le partas en vn lugar, partirlo has en otro pues se ha dicho que lo que sobrare

en vna parte, se haze diez, en respecto de la letra que se le siguiere.

¶ Lo septimo. Quando en la particiõ vieres vnas letras sobre otras, siempre haras cuenta de las mas altas, y no de las que estuieren debaxo.

¶ Lo octauo. Quando vas partiendo, y dizes Tãto quantas vezes entra, entanto. Digo, que las mas vezes que puede caber el partidor en la suma partidera, seran 9. en vna vez, en qualquier lugar que el partidor este.

¶ Lo nono es. Que quando ayas partido, o llegado a la vltima letra de la particion, que esturiere al principio de la mano derecha, la letra, o letras que no tuieren zeros sobre si, ni otra alguna letra, ni esten borradas con alguna raya, que algunos vsan en lugar del zero, siendo estas letras las mas altas de todas las que huuiere en la particion, digo que sobra el valor de las tales letras: y si todas tuieren zeros sobre si, en tal caso entenderas que no sobra cosa alguna, porque lo mismo es poner zero sobre vna figura, que si la borrasses.

¶ Lo decimo, si en alguna particion sobrare algo, poco, o mucho lo que sobrare se pondra sobre vna raya, poniendo los compañeros, o partidor debaxo. Como por la platica de los exemplos mejor se entendera.

¶ Nota mas, que ninguna particion, despues que ayas acabado de partir, puede sobrar tan-

to quãto fuere el partidior. Mas q̄ puede sobrar desde vno hasta otro menos del valor del partidior. Como si partieses cierta cantidad de maravedis, a cinco compañeros: porque los cõpañeros son 5. puede sobrar vno, y dos, y tres y quatro cinco no, ni mas: porq̄ si mas sobrasse, auria necesidad de partir otra vez, y assi seria hazer vn recaudo en dos caminos, como dizen.

¶ Exemplo, y platica de la diferencia primera es partir por numero digito.

¶ Para declaracion desta diferencia. Pongoporexemplo, que quieres partir 168. ducados, o varas de paño, o lo que te pareciera, a dos compañeros, assienta la particion y el partidior. Como manda el notado primero. Dela manera que parece.

2 | 1 6 8

¶ Parte ahora el vno, que es la primera letra de la particion, diciendo. Vno partido a 2. compañeros, no cabe enteramente nada, pues porque cabe, pon vn zero debaxo dela raya, enfrēte del vno que partes, mas por ser principio de particion le puedes dexar de poner, como mãda el 2. notado. Pues prosigue juntando este vno que no podiste partir con la primera letra que se siguiere despues de si, que es 6. seran 6. (como manda el dos notado) y assi partiras 16. a dos, diziendo 16. partidos a 2. cabe a 8. y no sobra nada. Assiē

ras que partiendo 168. ducados a 2. compañe-
ros igualmente: cabe a cada vno 84. ducados co-
mo parece en la figura.

¶ Oro exemplo. Si quisieres saber 752105. ma-
rançedis, o lo que te pareciere, partidos a 3. cõ-
pañeros, quanto viene a cada vno? Assentaras la
particion, y partidor (como manda el primero
notable) y aqui parece figurado.

$$\begin{array}{r} 3 \ 1 \ 7 \ 5 \ 2 \ 1 \ 0 \ 5 \\ \hline \end{array}$$

¶ Y començaras a partir la primera letra dela
particion, que 7. es por el partidor que es 3. di-
ziendo. Siere repartidos a 3. cabe a 2. y sobra vno.
Porque dos vezes 3. son 6. para 7. que parto, fal-
ta vno, pon los dos que cupo debaxo de la raya,
enfrente de los 7. que partiste, y el vno que so-
bro encima de los 7. (como muestra el 3. nota-
ble) y quedara figurado desta manera.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \ 1 \ 7 \ 5 \ 2 \ 1 \ 0 \ 5 \\ \hline \end{array}$$

2
¶ Parte mas, haciendo diez el vno, que pusif-
te sobre el 7. y juntalo con la letra primera, que
se sigue, que es cinco, y seran 15. (como muestra
el 4. notable.) Profigue diziendo. Quinze parti-
dos a 3. cabe a 5. y no queda nada: porque tres
compa-

ñeros a cinco a cada vno, monta quinze. Pues pon los cinco, que cupieron debaxo de la raya enfrente del cinco de los 15. y porque no sobra nada, pondras fentos zeros encima de los 15. desta manera.

$$\begin{array}{r} 0 \\ 10 \\ \hline 31752105 \end{array}$$

25

¶ Parte mas la otra figura, que se sigue despues de los 15. que es 2. diziendo. Dos partidos a 3. no cabe nada enteramente. Pues hazlo que mãda el sexto notado, que es poner vn zero (porq̃ el dos, no se puede partir a 3. (debaxo de la raya enfrente del mismo 2. y juntaras el 2. con otra letra de mas adelante, que es vno, y seran veynte y vno, quedara la figura desta manera.

$$\begin{array}{r} 0 \\ 10 \\ \hline 31752105 \end{array}$$

250

¶ Di agora 21. partidos a 3. hombres cabe a 7. y no sobra nada: porque 3. a 7. son 21. Pues pò los 7. que cupieron debaxo de la raya enfrente del vno de los 21. y porque no sobro ninguna cosa, pondras zeros sobre los 21. desta manera.

E 5

0

0

1 0 0 0

3 1 7 5 2 1 0 5

2 5 0 7

Y assi passaras adelante, a partir la primera letra que se figuere, (que en este exemplo es zero) diziendo. Zero partido a 3. cabe a zero. La razon es, porq̄ el zero (segun he mostrado) quiere dezir nada. Pues quando dezimos zero partido a tres, es tãto como si dixessimos nada repartido a 3. cabe a nada. Y por esto dixẽ q̄ cabe a zero q̄ estãto como ninguna cosa. Pues porq̄ no cupo nada, pō vn zero debaxo de la, raya, en frẽte del mismo zero q̄ partiste, y mira q̄ no dexes de poner este zero, porq̄ ya q̄ el no sea nada, haze mucho alcafo, para q̄ las otras figuras significatiuas q̄ tienẽ puestas, cõseruẽ su valor. Digo esto, por que si alguno pensando queno es menester, pues no cabe nada le dexasse de poner todas las vezes q̄ se ofreciere, erraria, sino fuesse al principio de particion (como se mostro en el segundo notable.) Pues boluiendo a nuestro proposito, quedara la figura de la particion desta manera.

0

1 0 0 0

3 1 7 5 2 1 0 5

2 5 0 7 0

¶ Profigue partiendo otra letra de las de la particion, que es 5. diziendo 5. partidos a 3. cabe a vno, y sobran dos: porque 3. vezes vno, son 3. para cinco, que partes quedaran 2. pon el vno, que cupo debaxo dela raya enfrente del 5. y los 2. q̄ sobraron, ponerse han sobre el 5. como parece.

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 \hline
 100002 \\
 51752105 \\
 \hline
 250701
 \end{array}$$

¶ Y porque al 2. que se puso sobre el 5. no se le sigue otra ninguna figura: por tãto no se hara diez. Porque esta al fin como se dixo en el 4. notable. Y assi auras dado fin a esta particion, y responderas: que partiendo 752105. a tres compañeros, a cada vno le viene por su parte lo que esta debaxo de la raya, que son dozientos y cinquenta mil setecientos y vno, y sobraron 2. los quales se pôdran sobre vna raya, y los cõpañeros debaxo (como mãda el 10. notable) della manera. $\frac{2}{3}$ La qual figura quiere dezir 2. tercios de vn marauedi, por causa q̄lo que se partio son marauedis. Y dos tercios de marauedi quiere dezir, q̄ hecho vn marauedi 3. partes iguales, las 2. como en el lib. 2. desta obra mejor entenderas. Nota esto, porque de la manera que has partido por 2. y por 3. assi partiras por 4. y por 5. y por 6. &c. hasta 9. como parece en estos exemplos.

	00		0
	1305		010
Por.	6 17541	Por	51315
	<u> </u>		<u> </u>
	12565		63
	<u> </u>		
	6		

	00		00
	110		083000
Por.	419721	Por	91534672
	<u> </u>		<u> </u>
	24301		59048
	<u> </u>		
	4		

	00		0
	176		030
Por.	8 1950	Por.	71525
	<u> </u>		<u> </u>
	1186		75
	<u> </u>		<u> </u>
	8		

¶ Nota cerca del partir por numero digito que partir por dos, es lo mismo q̄ sacarla mitad de la cosa que se parte. Como si partes 34. a dos, cabe a 17. Digo que 17. es la mitad de 34. Y partir por 3. es sacar el tercio, y por 4. el quarto, y por cinco el cinco, por 6. el 6. &c. Y assi por orden con

con los demas numeros. Y porque hize mención de tercio digo, que si quisieres saber quanto es el tercio de vna hazienda, partiras la tal hazienda, por 3. y lo que cupiere sera la tercia parte. Y para sacar el quinto partiras por 5. y lo q cupiere sera el quinto.

¶ La segunda diferencia es partir por numero articulo. El partir por numero articulo es quando el partidor es diez o justos. Pues todas las vezes que aconteciere venir en el partidor esta letra 1. (sola sin otra alguna de las significatiuas) y traxere zeros delante de si pocos, o muchos: en tal casa quitaras de la particion tantas letras de àzia la mano derecha, como zeros huviere en el partidor: y lo q quedare sera el quociente de la tal particion, y lo que se quitare sera lo que sobra. Exemplo, parte 60570. a 10 compañeros, porque en el partidor que es 10. viene la vnidad y trae vn zero, quitavna letra de la particion, y sea la primera de hazia la mano derecha, que es zero, y quedara la particion assi 6057. y tanto diras que cabe a cada vno de los diez cōpañeros, y porque el zero que quitaste en este exemplo no vale nada, por tanto diras, que no sobra nada. Otro exemplo. Parte la misma cantidad, que es 60570. a 100. compañeros. Quita de la particion 2. letras: porque en el partidor ay dos zeros (que serã estas 70.) y quedaran 605. y tanto es lo q le cabe a cada vno, y

los 70. que quitaste, es lo que sobra. Y assi se ha
ra de otros numeros. Nota mas q̄ si la letra del
partidor fuere 2. (y no huviere otra alguna) cō
zeros pocos, o muchos, quitaras como hemos
mostrado tantas letras de la particion, como ze
ros huviere en el partidor. Y lo q̄ quedare, par
tirse ha como si los compañeros fuessen. Segun
se dixo en el partir del numero digito.

¶ Exemplo: Parte 3676. a 200. cōpañeros. Qui
ta por los 2. zeros, que vienē en el partidor, dos
letras de la particion: y sean las primeras, que
estuuieren hazia la mano derecha, que son estas
76. y quedaran estas 36. las quales partiras por
2. que está en el partidor, y cabra a diez y ocho,
como en la figura parece. Y los setenta y feys
que quitaste es lo que sobra.

$$\begin{array}{r}
 \textcircled{0} \\
 10 \\
 2 \overline{) 3676} \\
 \underline{ 20} \\
 18
 \end{array}$$

¶ Si la letra del partidor fuere 3. y truxere ze
ros, quita tantas letras de la particion, como ze
ros huviere en el partidor, y parte lo que queda
re, como si el partidor fuesse 3. y si fuere 4. parte
por 4. y si 5. por 5. Y assi consecutiivamente con
otra qualquiera letra de las nueue letras que di
ximos significatiuas.

CAPITULO X.

La tercera diferencia muestra partir por todo número, así Artículo, como Compuesto. Mas antes en la platisa declaratiua desta diferencia es necessario notar, los terminos o principios siguientes.

Primeramente quando quisieres partis alguna cantidad grande, o pequeña, o lo q fuere se assentara en figura: y los cōpañeros, o partes en quien se huuiere de partir, ponerse han debajo de la particion, poniendo la primera letra del partidor enfrente de la primera de la particion comenzando por la mano yzquierda, y viniendo azia la derecha, assentando la segunda letra del partidor, enfrente de la segunda de la partición, &c. Y a la parte derecha de la particion, haras vna raya atrauessada y algo larga, encima de la qual assétaras lo q cupiere, como si dixessen. Parte 10000. marauedis, o lo que te pareciere a 25. compañeros. Assienta la particion, y partidor, desta manera.

Particion.	1 0 0 0 0 0	
Partidor.	2 5	

Mas nota, que si las primeras letras de la particion fueren de menor cantidad y valor (tomandolas particularmente, y no respectiue) que las del partidor, como en esta figura precedente parece: en tal caso podrás la primera letra de partidor, enfrente de la segunda de la partición, y la segunda del partidor, enfrente de la tercera de la

par-

particion desta manera.

Particion.	1000001	—————
Partidor.	25	

Dixe tomadas particularmente, y no respecti-
uè. Porque si el vno que està al principio de la
particion, se toma a respecto de por lo que se pu-
so (que fue por cien mil) no ay dada, sino que es
mas que los veynte y cinco del partidor : mas
tomando las dos letras primeras de la particiõ
por causa de otras dos que ay en el partidor,
que son estas 10. significan diez. Y por esto dixè,
si fueren mayores las letras del partidor , que
las primeras de la particion.

¶ Lo segundo, quãdo las letras del partidor no
cupieren en las de la particion, pondras zero so-
bre la raya, q̄ està adelante de la particion, en lu-
gar q̄ no cupo nada: y mudaras el partidor otra
letra mas adelante de la particion: como por la
platica de los exemplos mejor entenderas.

¶ Lo tercero, quando la vnidad del partidor lle-
gare a ponerse enfrente de la vnidad de la parti-
cion: en tal caso, no mudaras mas el partidor:
porque alli se concluyra, y sera al fin de la tal
particion. En las demas particularidades, que
para esto se requieren, me remito a los siete no-
tables vltimos, que puse antes del partir por nu-
mero digito: los quales son generales para to-
das las tres diferencias de partir.

¶ Nota que algunos hazè dos rayas debaxo de

la particion, para assentar en medio lo que cabe. Importa poco que se ponga de vna manera, o de otra, cada vno vse lo que mas le agradare.

¶ Exemplo de la platica desta diferencia tercera. Pon por caso, que quieres partir mil y setecientos y cinquenta ducados, a quinze companeros. Assienta la particion, y debaxo los quinze, como en los notables se ha mostrado, y aqui parece figurado.

Particion.	1	7	5	0		
Partidor.						15

¶ Y despues de assi assentada la particion, y partidor mira quanto tienen sobre si los quinze companeros, y hallaras diez y siete. Pues di (no curando de las demas adelante de la particio.) En diez y siete quantas vezes entra el quinze. Y hallaras que vna vez. Assienta el vno, que cabe, sobre la raya que està adelante de la particion desta manera.

1	7	5	0		1
					—

¶ Y multiplica el vno que cupo por los 15. del partidor, para saber lo que sobra por partir, diciendo 15. vezes vno son 15. restados, o sacados de los 17. que partiste, quedan 2. Assienta 2. sobre los 17. poniendo sobre el 10. del diez y siete vn zero (que es lo mismo que borrarle) y los 2. sobre el 7. desta manera.

$$\begin{array}{r} 0 \ 2 \\ 1 \ 7 \ 5 \ 0 \ | \ 1 \\ 1 \ 5 \end{array}$$

¶ Hecho esto, mudaras las letras del partidor otra letra mas adelante, procediendo házia la mano derecha, poniendo el vno que está en el partidor, enfrente del 7. que es la segunda letra de la particion, y el 5. del partidor, enfrente de la tercera de la particion, que tambien es 5. y los otros 15. que quedan del partir, borrar se há, dando vna raya por medio de cada vno, como parece figurado.

$$\begin{array}{r} 0 \ 2 \\ 1 \ 7 \ 5 \ 0 \ | \ 1 \\ 1 \ 5 \ 5 \end{array}$$

¶ Mira (como primero se hizo) quanto tiene el partidor encima de si: y gallaras tener 25. Pues di. En 25. quantas vezes caben 15. y hallaras q̄ vna vez. Assienta este vno sobre la raya, adelante del otro que auias puesto, desta manera.

$$\begin{array}{r} 0 \ 2 \\ 1 \ 7 \ 5 \ 0 \ | \ 1 \ 1 \\ 1 \ 5 \ 5 \end{array}$$

¶ Y para saber si sobra algo, multiplica los 15. por el vno q̄ cupo, y lo que montare restarse ha de los 25. que partiste, diziendo 15. vezes vno son 15. quitados de los veynte y cinco, quedan 10.

Assene

CAPITVLO X.

83

Affentaras diez sobre los 25. y borraras los 25. dando vna raya atrauessada por medio de cada letra, o poniendo zeros sobre ellos, desta manera que parece.

I				
o	2	o		
I	7	5	o	I I
I	5	5	5	_____
I				

¶ Y mudaras los quinze otra letra mas adelante, poniendo el vno de los quinze enfrente de la tercera letra de la particion, que es 5. y el 5. del quinze, enfrente de la quarta letra dela particion, que es zero: y a los quinze que quedan, darse ha vna raya por medio de cada vna letra, en señal que no se ha de hazer caso dellas, como en la figura mejor se entendera.

I				
o	2	o		
I	7	5	o	I I
I	5	5	5	_____
I				

¶ Y mira quanto ay sobre los quinze por partir, y hallaras 100. Pues parte diziendo, en ciento, quantas vezes entran quinze? Y hallaras 6. Assienta los 6. que cupieron adelante de los onze, que estan puestos, desta manera.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 020 \\
 1750 \quad | \quad 116 \\
 1555 \quad | \quad \text{---} \\
 11
 \end{array}$$

¶ Para saber lo que sobra multiplica los 6. que cupieron por los quinze, diziendo. Seys vezes quinze son 90. restado 90. de ciento quedan diez, los quales se assentaran sobre la particiõ, poniendo zeros sobre las demas letras q̄ quedan partidas, desta manera.

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 11 \\
 020 \\
 1750 \quad | \quad 116 \\
 1555 \quad | \quad \text{---} \\
 11
 \end{array}$$

¶ Y assi auras dado fin a tu particion: y diras que partiendo 1750. ducados a quinze cõpañeros, cabe a cada vno 116. ducados, y sobran diez, los quales se assentaran sobre vna raya, poniendo debaxo los cõpañeros de esta manera. 70 Que quieren dezir : que vltra de los ciento 75 y diez y seys ducados que a cada vno cabe, les viene mas diez quinzenas de vn ducado, que son dos tercios de ducados.

Nota ¶ *Nota* en este mismo exemplo, la orden que se lo q̄ sobra. ha de tener a cerca delas sobras, si por lo que he dicho no he sido entendido. Dezimos que par- tien-

tiendo 1750. ducados 15. compañeros, cabe a cada vno 116. y sobrarian 10. ducados por partir, por causa que 10. en 15. enteramente no pueden ser partidos en especie de ducados. Pues en esta y en las semejantes reduciras la moneda q̄ sobrare a otra especie de moneda mas baxa: y lo que montare la tal reduccion: partirla has otra vez, por el mismo partidior. Pues reduce los diez ducados a marauedis, y seran tres mil y setecientos y cinquenta. Parte ahora estos 3750. marauedis por los mismos 15. compañeros segun la regla de partir por numero cõpuesto mãda, y vendra a cada vno 250. como parece.

o o

1 2 0

3 7 5 0 | 2 5 0

1 5 5 5

1 1

Y afsi diras, que vltra de los 116. ducados, que a cada vno de los quinze cupo, le viene mas 250 marauedis, por los diez ducados que sobrarian.

Nota quando partieres, abreuias el partidior, y particion, y sera mas breue.

Otro modo de partir, partiẽdo 960. a 12. cabe a 80. busca dos numeros qualesquiera, q̄ multiplicado vno por otro haga 12. q̄ seran 3. y 4. y parte 960. por 3. y cabra a 320. parte 320. por el 4. y vendra 80. que es lo mismo. Y lo mismo haze en mas partes, con tal que la multiplicaciõ de to-

das vnas por otras, haga el mismo partidor.

¶ Nota quando partiendo multiplicas la letra, que cabe por los cōpañeros, o partidor, comiēça por las letras de la mano derecha, y sera mas breue. Y afsi acabo quanto a esta regla, porque por mucho papel que se gaste, no por esto sera mejor entendida. Principalmente que bastā los exemplos dados, poniendo diligencia necessaria, para hazer qualquiera particion, sin la qual no solamente no entenderas esta, mas aun en lo mas facil no haras nada.

¶ Nota vn modo de partir. Pōgo por exēplo, que dizē que partas 4956. ducados, a 12. cōpañeros. Antes q̄ comiences se han de multiplicar los 12 por todas las 9. figuras del guarismo, conuiene saber, por vno, y dos, y afsi hasta 9. y las multiplicaciones assentarse han ordenadamente, y delāte dellas el multiplicador, que las causare (quiere dezir) que quando multiplicares por vno los 12. cōpañeros, montaran 12. Assienta 12. antes del vno, desta manera 12—1. Afsi mismo quando multiplicares por 2. montará 24. Pon 24. antes de los 3. y desta suerte procederas hasta multiplicar por 9. y quedara hecha vna tabla. Como aqui parece.

	12—1
¶ Hecho esto tomaras tantas letras	24—2
de la particion, quantas quiere en el	39—3
partidor. Pues porque el partidor en	48—4
este exemplo tiene dos letras, toma	60—5

otras

otras 2. de la particion, y sean las pri- 72—6
 meras que hallares, començando de 84—7
 la mano siniestra, que seran 49. los 96—8
 quales 49. partiras a los doze. Y pa- 108—9
 ra saber a quanto caben, mira en la tabla, que sea
 ma ay, que se llegue mas a igualar con 49. que
 quieress partir, y hallaras ser el 48. Pues mira
 este 48. que letra tiene delante de si, y hallaras
 tener vn 4. Pues estos 4. son las vezes que cabe
 el doze en los 49. Ahora no resta otra cosa, sino
 assentar los 4. que dezimos que caben, y restar-
 los 48. de los 49. y quedara vno, al qual vno aña-
 diras adelante por vnidad otra letra de la parti-
 cion, y sea la primera que se siguiere despues de
 las que huuieres partido. Pues añade 5. que es la
 letra que se sigue en este exemplo, y seran quin-
 ze. Parte quinze como partiste los 49. y a lo q̄ so-
 brare, añadele otra letra, ya fsi procederas de le-
 tra en letra, hasta llegar a la vltima. Nota si to-
 mando de la particion tantas figuras como hu-
 uiere en el partidor, fueren de menor cantidad
 q̄ las del partidor, en tal caso tomaras vna mas.
 Nota si quando fueres partiêdo (despues de auer
 hecho principio) si añadiendo vna letra, como
 manda la regla, no se pudiere partir: en semeja-
 te caso pondras zero en lugar de lo que cabe, y
 proseguiras adelante, añadiendo otra letra.

¶ Otros parten, sacâdo en limpio lo q̄ va quedâ-
 do, por no ofuscarfe con las figuras que se ponê

sobre las otras. Exemplo. Parte 8947. a 72. partiendo como se ha mostrado la primera vez, queda assi la figura.

$$\begin{array}{r} 17 \\ 8974 \quad | \quad 1 \\ \underline{72} \end{array}$$

¶ Assientan los diez y siete, que sobran, y adelante lo q̄ no se ha partido. Desta manera 1774. y parten de nuevo por los mismos 72. y cabe 2. y queda assi la figura.

$$\begin{array}{r} 33 \\ 1774 \quad | \quad 2 \\ \underline{72} \end{array}$$

¶ Mudan lo que sobro, y lo que esta por partir, que es 334. y parten de nuevo como parece.

$$\begin{array}{r} 4 \\ 334 \quad | \quad 4 \\ \underline{72} \end{array}$$

¶ Y porque lo que ahora sobra, que en este exemplo es quarenta y seys, no se puede partir a setenta y dos enteramente, no prosiguen adelante. Y porque se han hecho tres figuras, y a la primera cupo vno, y en la segunda 2. y en la tercera 4. Responden diziendo: q̄ partido 8974. a setenta y dos, cabe a cada vno 124. y sobran 46.

¶ Otros van quitando de lo que quieren partir, cantidades ciertas que saben segun los compañeros a como cabe: y luego quitan otra, hasta acabar,

acabar , y despues juntan lo que cabe de todas las cantidades que han partido.

¶ Otros multiplican el partidor por otros numeros, hasta topar vn numero, que multiplicado por el partidor , haze tanto como la particion. De lo qual, ni de otros modos que algunos vsan, no pongo exemplos, porque aunque no vá fuera de fundamento, es andar a tienta.

¶ No he puesto exemplo en ninguna de las reglas generales en cuenta Castellana: porque quien supiere las del guarismo, facilmete obrara por ella, pues vno no difiere de lo otro, sino en los caracteres, o figuras de letras: porque en lo demas, como fumo, y resto por guarismo, assi se hara por los caracteres del Castellano: vsando de puntos en lugar de zeros.

Prueuas para multiplicar , y partir.

¶ La prueua real del multiplicar , es partir, y la del partir multiplicar. Ponese primero la prueua del multiplicar.

¶ Si el producto que resultare de la multiplicacion de vn qualquier numero en otro, se partiere por vno de los dos numeros multiplicados, vendra al quociente el otro, si la tal multiplicacion estuuere bien hecha. Exemplo. Multiplico 12. hanegas de trigo, a siete reales cada hanega, puesta en figura la multiplicacion, y multiplicador, segun en su lugar se mostro: y multiplicando ha-

*Nota el
9 prin
cipio, o
presu-
puesto
del iiij.
cap.*

$$\begin{array}{r} 12 \\ 7 \\ \hline 84 \\ \hline \end{array}$$

¶ Pues digo: que la prueua fera partir los 84. que montan por los doze, que es la multiplicacion, y vendra a la particiõ los 7. que es el multiplicador. Y al contrario si partes los 84. por los 7. que es el multiplicador, vendra a la particiõ los doze, que es la multiplicacion. Y assi se prouara otra qualquier multiplicaciõ de mayor, o menor cantidad.

Prueua del partir.

*Lea el
10. prin
cipio
del iiij.
cap.*

¶ Si quando huuieres hecho vna particion, quisieres saber, si esta acertadamẽte hecha, multiplicaras el quociente por el partidor, y añadiras a esta multiplicacion lo que en la tal particion sobrare, si algo sobrare, y fera tanto como la particion.

¶ Exemplo. Parte 84. marauedis a 7. compañeros: y siguiendo la regla de partir, cabrá a doze. Pues la prueua es, que multiplicando los doze que es lo que cabe, por los siete, que son los compañeros, vendra a la multiplicacion 84. que es tanto como lo que se partio.

¶ Otro exemplo, parte 874. marauedis, o lo que quisieres a 4. compañeros, que obrádo segun se
dixo

lixo en la diferencia de partir por numero di-
 tito, cabe a 218. y sobran 2. como parece.

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 032 \\
 4 \overline{) 874} \\
 \underline{218}
 \end{array}$$

¶ Pues para saber si está bien hecha, multipli-
 caras los 218. que cupieron, por los 4. (que son
 los compañeros) y añadiras a la tal multiplica-
 cion los dos, que sobraron, y sera tãto como los
 874. que partiste. Pues multiplica los 218. por
 los quatro, y montaran 872. a los quales añadi-
 ras los dos que sobraron, y seran 874. Y assi se
 prouaran qualesquier particiones de menor, o
 mayor cantidad.

Cap. XI. Trata de Progresiones.

PROGRESION, no es otra cosa, sino vn proce-
 der de numeros, con algun exceso igual. El
 fin suyo, es dar reglas, o compendios breues,
 para con mayor facilidad sumar los tales nu-
 meros. Y aunque algunos cuentan esta por vna
 de las siete especies de Arismetica, yo no en-
 tiendo que es su intencion, pues no es otra co-
 sa, sino sumar. Y haze tan poco al caso para los
 Matematicos, que la dexara, sino fuera por-
 que en este volumen no faltasse, lo que todos
 comun-

comunmente han con mucho papel y parola declarado. Boluiendo al proposito. Esta regla muestra sumar los numeros, que exceden vno a otros en vna cantidad yguar: de tal arte, que si el segúdo excede al primero en primero, el tercero ha de exceder al 2. en otro, y el quarto al tercero. Desta manera 1.2.3.4. Y si el segúdo excede al primero en dos, el tercero ha de exceder al segundo en otros dos. Afsi como 1.3.5.7. &c. o afsi 2.5.8.11.&c. q̄ el exceso es 3. Estos numeros puedē proceder en vno de tres modos. Y afsi se sumara quantas diferencias de progresiones se ofrecieren con tres reglas. El primero modo, es quando crecen, por la orden de la continua proporcion Arifmetica, que es quãdo excede el segundo numero al primero en tanto como el tercero al segundo. (como entenderas en el 5. lib. cap. 4. de proporcion Arifmetica) Y afsi por orden en los de mas numeros, aunque el exceso sea poco, o mucho. Afsi como en estos exemplos 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. En semejãte caso la regla que se ha de tener para cõ breuedad sumar lostales numeros, sera juntar el primero cõ el postrero, y facar la mitad, y multiplicarla por todos los numeros, que en la tal progresion huuiere, y el producto fera la suma de los tales numeros. Pues junta el vno del primero exemplo, con el cinco de su fin, y seran seys, toma la mitad de seys, que es tres, y multiplicala por todos los

cinco numeros que ay en el primero exemplo, y montara quinze, y tanto diras que montan estos numeros 1.2.3.4.5. Afsi mismo suma el vno con los onze, que son los extremos del exemplo segundo, y seran doze, toma la mitad que es 6. y multiplicala por los 6. numeros que ay en la progresion que puse por exemplo segundo, y seran 36. Y tanto diras que montan los seys numeros del exépllo segundo, y afsi fumaras otros semejantes, aunque sean los numeros pares, o impares, como quiera que venga.

¶ La segunda regla es, quando los numeros crecen por vna continua proporcion Geometrica, y esto es, quando la proporcion que ay del segundo al primero, ay del tercero al segundo, y del quarto al tercero. En esta regla entran las progresiones (q̄ dizen) duplas, triplas, quadruplas quintuplas. La regla desto, es reduzir primero los tales numeros a 3. y despues la suma de los 3. fera tãto como la de todos los numeros, q̄ huuie re en la tal progresion. Este reduzir a 3. numeros, se haze en esta manera. Passando abaxo el numero primero, y restandolo del vltimo de todos los numeros, y partiẽdo la resta por vno menos de lo que la progresion se fuere aumentando, quiero dezir, que si fuere duplando, partiras por vno, y si fuere 3. doblando, partiras por 2. y si quatro doblando por 3. &c. Y despues sumando el numero primero, y la resta, y el quociente

ciente sera el valor dela tal progresion. Exemplo: pongo que quiero sumar vnos numeros que proceden en duplo, quiero dezir, que el segundo numero es doblado que el primero, y el tercero el duplo del segundo. Sigue la regla, poniendo el 3. que es el numero primero debaxo del vltimo, que es 96. Resta los 3. de los 96. y quedarán 93. Parte aora estos 93. por vno menos de lo que va duplicando. Pues porque en este exemplo, la denominacion de la proporcion, es dos, partiras por vno, pues partiendo 93. por vno, vendrán los mismos 93. como se prueua por el septimo principio, que se puso en el cap. 4. del libro primero. Suma aora los tres numeros, que estan entre las dos lineas, que el primero es el numero menor de los numeros desta progresion, y el segundo es la resta que restò, quando sacaste el numero menor del mayor, y el tercero es quociēte. Y montará 189. lo qual diras que es el valor de los seys numeros que en esta progresion se pusieron, como parece figurado.

¶ Nota, que mas facilmente se suma vna progresion, quando se va doblando, assi como la precedente, doblando la vltima y mayor suma, y quitando del doblo, la primera, y menor, como si en este exemplo doblas los nouenta y seys, que es el numero mayor montaran 192. de los quales 192. si quitas el numero primero, que es 3. quedarán
 3
 6
 12
 24
 48
 96
 8
 ciento

ciento y ochenta y nueue. Como has visto por la otra regla. En la primera regla se puede dudar, porque se ha de partir por vno menos de lo que la progresiõ se fae re duplando? Para declaracion dela duda pongo que quiero sumar vna progresion que procede tres doblando, como parece en la figura.

Pues si multiplicas el 4. que es el numero menor desta progresion por el 1. que es el numero menor dela proporciõ, montaran 4. multiplica mas el 108. (que es el numero mayor de la proporcion) por 3. que es el mayor de la proporcion, montara 324. de estos 324. quitaras los 4. que es la multiplicaciõ del numero menor de la proporcion en el menor de la progresion, y restara 320. Estos 320. dezimos ser la diferencia de las dos multiplicaciones, las quales partiras por la diferencia que ay de vn numero a otro de la proporcion que es 321. que es 2. y vendran ciento y sesenta, y tanto sera el valor de los 4. numeros progresionales puestos en figura. Y esta es la razon de las semejantes, y te puede seruir de la regla general.

¶ La tercera y vltima regla es, quando los numeros no lleuan la orden del proceder, que dezimos que lleuan los numeros, que crecen por vna continua proporcion Geometrica, assi como

mo los numeros que parecen en esta figura, los
 quales, ni se exceden por la continua pro- 4
 porcion Arismetica, porque el segundo ex- 9
 cede al primero en cinco, y el tercero al 19
 segundo en 10. ni tampoco por la propor- 34
 cion continua Geometrica, porque la pro- —
 porcion del segundo numero, que es 9. al prime-
 ro, que es 4. es dupla sexquiquarta, y la propor-
 cion del tercero numero, que es 19. a la del segú-
 do, que es 9. es dupla sexquinona. La regla gene-
 ral que has de tener para sumar las semejantes
 progresion, sera dexar el numero primero y vl-
 timo: los demas partirlos por tres, y añadir al
 quociete vno. Y esto multiplicarse ha por la di-
 ferencia que huviere del numero primero al vl-
 timo, y añadir despues la multiplicacion del nu-
 mero primero, cõ todos los numeros de la pro-
 gresion. Pues esta progresion trae quatro nu-
 meros dexando el primero, y ultimo, quedan 2.
 estos dos, partelos por 3. y vendran dos tercios,
 añade vno por regla general, y montara vno, y
 dos tercios. Multiplica vno, y dos tercios por
 la diferencia que ay de quatro, que es el prime-
 ro a 34. que es el ultimo, que sera treynta, y mō-
 taran 50. Multiplica mas los quatro numeros
 que trae esta progresion por el numero prime-
 ro, que tambien es quatro, y mōtara diez y seis,
 juntos con 50. montaran 66. y tãto diras que es
 la suma de los 4. numeros desta progresion.

¶ Nota vna regla general para sumar las progresiones, que tengã dos excessos diferentes, como en estos numeros parece, porque el segundo excede al primero en 4. y el tercero al segundo en 6. el quarto al tercero en 4. y el quinto al quarto en 6. De arte q̄ el vn exceso vna vez es 4. otra vez 6. Pues la regla para sumar, esta, y sus semejantes, fera (si los terminos dela progressiõ fueren pares) sumar el primero y vitimo, y la suma multiplicarla por la mitad de todos los numeros de la progressiõ. Pues suma 7. con 31. y ferã 38. multiplica 38. por 3. que es la mitad de los 6. numeros que en esta progressiõ vienen y môtaran 114. y tanto es la suma de todos: y si los numeros de la progressiõ fueren impares dexa el primero, o postrero, y suma los demas como has visto, y junta despues el que dexares.

Cap. XII. Trata de algunas prueuas para las reglas generales de Arismetica

PRueuase qualquiera regla de las generales, si està verdaderamente hecha, de muchas fuerres (vltra de las prueuas que se han puesto en los capitulos precedêtes.) Cõuiene a saber, por las prueuas que dicen submultiplices que por otro nombre llama el vulgo prueuas de 7. y 9. y sus semejantes. Quãto al prouar por siete y nue-

ne , es de saber , que tan solamente las reglas pueden prouar por tres, cinco, siete, y nueue, mas aun por otros numeros pares , o impares, de qualquiera suerte que nos pareciere : Afsi mismo es de saber , que todas estas prueuas se hazen de vna misma manera , digo esto : porque algunos piensan que la de siete se haze de vna manera , y la de nueue de otra la causa porque la de nueue no se haze como la de siete, es, porque de nueue a diez es vno, diferencia , por tanto quando sacan los nueues, no hazen diezes como quãdo sacamos los siete. Y porque mejor sea entendido , pongo por exemplo,

	3	4	3
que hemos sumado la suma siguiete	1	7	8
que monta 521. para saber si està biẽ			
sumada dizen, que se saquen quantos	5	2	1

nueues pudieren de las partidas que huieren sumado, y que no miren lo que sobrare, y que lo mismo que sobrare arriba sacando nueues , o siete, o otro qualquier numero , lo mismo sobrara en la suma. Pues sacando los nueues del primero renglon que monta 343. quedara vno. Y en el renglon de mas abaxo, que monta 178. quedan siete. Pues juntando vno que quedo en la primera partida con estos siete dela segunda, montan 8. Pues si en los 521. q̄ dezimos, que es lo que monta, sobraren otros ocho, sacando los nueues, dizen que estara buena la cuenta. A esto digo, que en esta orden de prouar, has de notar, que

que si a qualquiera cuenta añades 36. que es lo que monta multiplicando siete por nueue prouando por siete, o por nueue, no se siente lo que añadiste. Afsi mismo, si añades 945. no se echará de ver por ninguno de los numeros impares, que ay antes del 10. esto es porque multiplicando el 357. y nueue vnos por otros montan 945. de la qual cantidad, quedan estos numeros por partes aliquotas, y afsi no se podra sentir el agrauio. De lo dicho queda claro, no ser afirmatiuas estas prueuas de los numeros, usando de ellas, como los Autores antiguos quieren. Y porque es cosa que está muy recebida en el vso, prouar por nueue, o siete, o por otro qualquier numero par, o impar, de clarare vna orden que se ha de tener para euitar fraudes.

¶ Para declaracion de lo qual, pongo que quiero prouar la suma siguiente.

¶ La qual monta 906. pues digo que	632
mires en la primera partida, que monta	274
632. quantos nueues ay, y quanto sobra.	—
y hallaras que ay setenta nueues, y sobran	906
dos vnos, los quales pondras adelante.	—
Afsi mismo mira en el segundo renglon,	
que monta 2. y 4. quantos nueues ay, y hallaras	
q̄ ay treynta nueues, y sobran 4. Pues suma aora	
estos 30. nueues, y quatro puntos del segundo	
renglon, con los 70. nueues, y 2. puntos, que hu-	
uo en el primero renglon, y montará todo 100.	

nueues y seyfes puntos. Pues passa a la suma, que es 906. y mira quantos nueues ay, y si huuie re otros ciento y mas seyfes puntos (como es verdad) diras estar buena, y si en algo discrepare, estara falsa. Y assi prouaras por otro qualquier numero, y no se podra fraudar. Como muestra la comun sentencia. Nam si æqualibus æqualia auferantur remanētia erūt æqualia. Nota las prueuas reales, y las que se hazen por estos numeros son circulares, quiero dezir, que quando hazemos la prueua real en el sumar, sumamos de nueuo, para hazer la prueua de la suma primera, y principal. Pues para saber si la segūda suma està verdadera, tambien sera menester hazer la prueua: y assi de vna suma en otra, seria proceder in itinino, mas hemos de pretender darle algun fin, quando vieremos que quadra cō lo que buscamos.

Otra prueua muestran algunos para el sumar y es que quando han sumado vna suma si se sumare de abaxo para arriba, la suma en otra segun davez de arriba para abaxo, y si corresponde lo vno a lo otro està buena.

Otra prueua ay, la qual algunos llaman racional, y es quando por razon y comunes pareceres prouamos ser verdad alguna cosa.

Prueuas de Restar.

¶ Prueuase el restar por la pueua, que dizen del

del nueue y siete, y sus semejantes. De la suerte que en los exemplos siguientes se declara.

Vno deue nueue mil y quinientos y setenta y quatro ducados, paga ocho mil y trecientos, y ochenta y vno, queda deuiendo mil y ciento, y noventa y tres como parece.

9 5 7 4

8 3 8 1

1 1 9 3

Saca de la suma de la deuda, que es 9574. los nueues, diziendo 9. y 5. son catorze, y siete son veynte y vno, y vno y quatro son 25. Y sacando los nueues que ser pudieren, restan 7. guarda este 7. Así mismo saca los nueues de la suma de la paga que en este exemplo es 8381. diziendo 8. y 3 son onze y ocho son diez y nueue, y vno son veynte, de veynte sacando los nueues, restan dos los quales dos, restaras de los siete que guarda ste y quedará cinco. Pues en alcance que en este exemplo es 1193. han de quedar otros cinco si la tal resta está bien hecha.

Otro exemplo. Vno deue 894. paga 321. resta deuiendo 573. Saca los nueues de la suma de la deuda (como en la passada hiziste) y quedarán 3. guardalos. Saca mas los nueue, o nueues que pudieres de la suma del gasto, que en este exemplo es 321. y quedaran seys, los quales seys restaras

de los 3. que guardaste , y porque no puedes sacar seys de tres, añade a los 3. vn nueue , y seran doze. (Este añadir nueue, es porque hazes prueua de 9. que si hizieras la del 7. añadiras siete, y assi de las otras) destos doze resta los 6. y quedaran otros 6. Pues si esta resta esta bien hecha en la partida del alcãçe, que en este exemplo es 573. han de quedar otros 6. sacando el nueue, o los nueues que pudieres.

¶ Otro exemplo. Vno deue 212. ducados, pago 152. deue 60. saca los nueues de la suma de la deuda, diziendo 2. y vno son tres, y 2. son 5. porque no ay 9. que sacar guarda estos 5. assi mismo saca los nueues, o nueue que pudieres de la suma de la paga, que en este exemplo es 152. diziendo vno, y 5. son 6. y 2. son 8. porque no ay nueues, ni nueue q̄ sacar, tomalo (porque en estas prueuas no se tiene cuenta , sino con lo que passa de nueue, o nueues, o con lo que no llega a nueue) el qual 8. restaras de los 5. que guardaste, y porq̄ no se puede restar 8. de 5. añade 9. al 5. y seran 14. quita los 8. y quedaran seis. Pues en la suma del alcançe hallaras auer otros 6. si la resta esta bien hecha. Otro exemplo. Vno deuia 729. ducados, pago 571. quedo deniendo 158. sacando los nueues de la suma de la deuda, como hemos dicho , y de la suma de la paga no queda nada, quando assi fuere no ay que añadir nada a ninguna parte, sino miras que la suma del ancance
no ha

no ha de quedar algo, si la tal resta estuviere bié hecha. Y assi se prouaran otras qualesquiera restas, que a la mano te vinieren.

Prueba del multiplicar por nueue y siete, y sus semejantes.

¶ Para declaracion de la prueba del 9. del multiplicar, pongo por caso, que he multiplicado 321. carneros 782. monta 251022. como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 321 \\
 782 \\
 \hline
 642 \\
 2568 \\
 2347 \\
 \hline
 251022 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

¶ Para hazer la prueba del nueue, faca los nueues (como hemos mostrado en la prueba del restar) de la multiplicacion, q̄ en este exemplo es 321. y sobrara 6. los quales guardaras. Luego faca semejãtemẽte los 9. o nueues, si pudieres del multiplicador: y lo q̄ sobrare, o no llegare guardarlo hastãbiẽ puesen este exẽplo el multiplicador es 782. sacando los nueues, quedan 8. multiplica estos 8. por el 6. que arriba guardaste y serã 48. destes 48. sacãdo los nueues, quedieros que daran 3. pues si en la suma que dizes que mōta.

G 4

251022.

251022. quedaren otros, 3. sacando los nueues estara buena la cuenta, y sino estara falta.

¶ Otro exemplo multiplicando 135. cosas a 426 monta 57510. como parece.

$$\begin{array}{r}
 135 \\
 426 \\
 \hline
 810 \\
 270 \\
 540 \\
 \hline
 57510
 \end{array}$$

¶ Sacando los nueue, o nueues de la multiplicacion, que en este exemplo 135. no queda nada. Por este nada toma vn zero, y guardalo. Afsi mismo sacando los nueue, o nueues del multiplicador, que es 426. quedá 3. los quales 3. multiplicas por el zero, que guardaste, y no montara nada. Pues en la suma de todo, que es cincuenta y siete mil, y quinientos y diez, sacando los nueues, que pudieres, no quedara nada, si la tal multiplicacion estuviere bien hecha. De arte que si en la multiplicaciõ, o multiplicador huviere zero, o en ambas partes juntamente, no ay q̄ perder tiempo, sino mirar para que la tal cuenta este buena si en lo que montare, que es lo que dicen producto ay zero, quiero dezir, que sacando nueue, o nueues no sobra cosa alguna.

¶ Otro exemplo 200. hanegas de trigo a 300. mara-

marauedis, montan 60000. Para prouar si es verdad, saca los nueues de la multiplicacion q̄ son las 200. hanegas, y vendran dos, guarda estos 2. Afsi mismo saca los nueues del multiplicador, que es el precio q̄ en este exemplo es 300. y vendran tres, multiplica estos 3. por los 2. que guardaste, diziendo 3. vezes 2. hazen 6. porque de 6. no se puede sacar ningun nueue no se saque, como hiziste en el exēplo primero, antes los guardaras, y si la multiplicacion esta verdaderamente hecha en los 60000. marauedis que dezimos que monta, quedaran otros 6. sacando los nueues. Y afsi se prouaran otras qualesquiera multiplicaciones, de menor, o mayor cantidad.

¶ Otro modo de prouar las multiplicaciones por el nueue y sus semejantes. Pongo que multiplicas 45. cosas a 38. mōta 1710. La prouea sea q̄ saques quantos nueues huuiere en los 45. y hallaras auer 5. nueues. Multiplica ahora estos 5. por los 38. y montará 190. passa aora a los 1710. que es lo que dezimos, que monta, y si ay otros 190. nueues esta buena, y si no, no. Otro exemplo 47. multiplicados por 38. monta 1786. sacando los nueues de los 47. son 5. y sobrá 2. puntos. Pues multiplica los 38. por los 5. nueues, y montará 190. los quales son nueues. Multiplica mas los 38. por los 2. puntos, y seran 76. haz dellos quantos nueues pudieres, hallar 8. nueues, y quatro puntos, pues junta estos 8. nueues, y 4.

puntos, con los 190. que tienes, montaran 198. nueues, y 4. puntos, y passa al producto, que es 1786. y si huuiere otros 198. nueues, y 4. puntos estara buena la cuenta, y sino estara falsa, y assi prouaras qualquiera multiplicacion, y de la fuer te que prouaste por 9. prouaras por 3. 0. 5. 0. 7. 0. por otro qualquier numero de menor, o mayor cantidad.

¶ Nota que los quebrados se pueden prouar como se pruená los enteros, por nueue, o por otro, qualquier numero. Exemplo: multiplicando 6. 2 por 8. $\frac{1}{2}$ monta 554¹ (como el cap. 18. libro segundo se muestra.) Reduze los 62 $\frac{1}{2}$ a medios, y seran 13. medios, saca los nueues, y quedaran 4. redzelos 8. 2. en su quebrado, y saca los nueues, y sobrarian 8. multiplica 4. por 8. y seran 32. sacando los nueues quedan 5. pues si los 554¹. los reduzes a quartos, y sacas los nueues, te quedaran otros 5. Ten auiso de no abreuiar los quebrados, de como en los productos vinieren.

Prueba del nueue, y sus semejantes en el partir.

¶ Pon por caso, que has partido 5745. a 12. compañeros, que cabe a cada vno 478. y sobrarian 9. (como por la regla precedéte del partir podras ver) (ahora para saber si esta buena la particion, saca los nueues del partidor que son los compañeros, que en este exemplo son 12. y quedará 3. los

los quales guardaras. Luego saca los nueues del quociente, que es de lo que cabe (que en este exemplo es 408.) y quedara vno, el qual multiplicaras por el 3. que guardaste, y seran 3. y de esta multiplicacion se auia de sacar los nueues, que pudieres, y con lo que te quedare, juntaras lo con lo que sobrare: pues junta estos 3. (pues no puedes sacar ningun nueue) con los nueues que sobran, y seran doze, saca los nueue, o nueues que pudieres, y quedaran otros 3. pues si en la suma que haspartido (que en este exemplo es 5745.) te quedaren otros tres sacando los nueues, dizen que esta buena, y sino quedare otro tanto, estara falsa. Otro exemplo 7886. a 72. cabe a 109. y sobrarian 38. sigue la regla sacando los nueues del partidor (que es 72.) y no quedara nada, por tanto guardaras vn zero. Afsi mismo saca los nueues del quociente, que es lo que cupo (que en este exemplo es ciento y nueue) y quedara vno, el qual multiplicaras por el zero, que guardaste, y montara zero: passa sin llevar nada, a lo que sobro (que en este exemplo es 38.) y saca los nueues que pudieres, y quedaran dos, pues si la particion esta buena, en los 7886. que partiste quedaran otros dos sacando los nueues de la fuerte que se ha mostrado. Otro exemplo. Partiendo 8667. a 963. cabe a nueue, y no sobra nada, para saber si esta bien hecha la tal particion, saca los nueues (como has hecho en los ejemplos

plos possados (del partidor) que en este exem-
 plo es 963. y no quedara nada, por lo qual guar-
 daras vn zero. Afsi mismo saca los nueues del
 quociente que es 9. y no quedara nada, pues to-
 ma otro zero, y multiplicalo por otro, que guar-
 daste, y sera nada (porq̄ ex nihilo nihil fit) passa
 a lo que sobro, y porque no sobra nada, tomaras
 vn zero, y si en la particion que es 8667. no que-
 dara nada, como es verdad, estara buena la tal
 particion. Otro exemplo. Parte 8689. a 963. y ca-
 bran a 9. y sobrarian dos, saca los nueue, o nueues
 del partidor, que es 963. y no quedara nada, por
 lo qual guardaras vn zero. Afsi mismo saca los
 nueue, o nueues, que pudieres del quociente (q̄
 en este exemplo es nueue) y no quedara nada,
 por lo qual tomaras otro zero, y multiplicar lo
 has por el otro que guardaste, y sera todo nada.
 passa a lo que sobro (que en este exemplo que-
 daron dos) y saca nueue, o nueues si pudieres, y
 lo que sobrare, o lo que no llegare, guardarlo
 has. Pues de dos no ay nueue que sacar, guarda
 dos, y si en la particion (que en este exemplo es
 8669.) sobraren otros dos, sacando los nueues,
 esta buena, y si no, al contrario.

Nota lo q̄ has hecho con el nueue para prouar
 todas las reglas generales, que es afsi prouaras
 por otros numeros, cõuiene saber por 3. y 5. y
 7. 8. y 6. y otros qualesquiera numeros mayores
 o menores, teniendo auiso de sacar por si de ca-
 da

de letra, y fino llegare al numero, por quien pro-
 uares, hazerla diezes, y juntarle la que se le si-
 guiere, y si la letra fuere mayor que la letra, o
 numero por quien prueuas, faca la menor de la
 mayor, y lo que sobrare haz los diezes, y junta-
 los con la que se siguiere: y afsi prosiguiendo de
 letra en letra hasta acabar. Lo qual porque me-
 jor se entienda, pondras por exemplo, que quie-
 res sacar los siete, desta cantidad 8270. lo qual
 haras començando de la figura que està a la ma-
 no yzquierda (que en este exemplo es. 8.) Dizié-
 do, quien de 8. saca 7. queda 1. Este vno hazle
 diez, y juntale con el 2. que se sigue, y seran 12.
 de doze saca 7. quedaran 5. Estos 5. haz los die-
 zes, y juntalos con los 7. que se siguen, y serã. 57
 saca los siete que ouiere en 57. y quedara vn pũ-
 to, el quan haras. 0. y porque se sigue vn zero, se-
 ra diez, solo saca los 7. y quedaran 3. destes 3. te-
 seruiras, como hazias quando sacauas los nue-
 uos. Otro exemplo, saca los siete deste numero
 72.49. comiêça por la primera letra de la mano
 yzquierda (q̄ en este exêplo es 7.) y sacando 7.
 no quedara nada. Passa el 2. y porque no llega a
 7. hazlã diezes. y juntala con el 4. y seran 24. de
 los quales sacaras los siete que pudieres, y que-
 daran 3. estos 3. hazlos diezes, y juntarlos cõ la
 otra letra que se sigue, que es 9. y seran 29. Saca
 los siete que pudieres, y quedaran 4. estos 4. por
 que estan al fin, no los haras diezes, fino diras,
 que

que sacando los siete de esta suma 7249. quedan quatro. Otro exemplo, saca los siete de 1137. comienza (como hemos mostrado) por el vno, y por que no llega a 7. hazle 10. y juntalo con el otro, y seran onze, de estos onze, saca 7. y quedaran 4. estos 4. hazlos diezes, y juntalos con los dos, y seran 42. saca los siete que pudieres de 42. y no sobra nada. Por lo qual passaras a otra letra: y porque es 7. sacaras 7. y no quedara nada, y porque no queda nada, tomaras zero. Y assi responderas, que sacando los siete de 1127. queda zero, porque son siete justos, y no sobra nada.

Otro exemplo de 600. saca los siete, comienza por el 6. y porq̄ no llega a 7. hazle diezes, y juntale vn zero, de los 2. y seran 60. Saca de 60. los siete q̄ pudieres, y quedaran 4. los quales 4. haras diezes, y juntarlos has con el otro zero, y seran 40. saca los siete que pudieres, y quedarã 5. los quales 5. por estar sobre la vltima letra no se haran diezes, antes diras, que sacando los siete de los 600. quedan 5. Mira como has hecho en estos exemplos, que assi haras vniuersalmente en todo numero, y como hazes diezes, quando sacas los siete, no llegando a 7. la tal letra, assi haras, quando prouares por 3. o por otro numero qualquiera, si la letra de do sacares treses, o cinco, &c. no llegare a 3. o a 5. En lo que toca al prouar por estos numeros, remitome a q̄ hagas como mostrẽ cõ el 9. pues aqui he puesto como

re has de auer en la orden del sacar sietes, o tres, o cinco, yalli se dio el orden, de donde y como se han de sacar para prouar. Teniendo auiso que quando el sumar prouares por sietes, o 3. ò 5. o por otro numero que no sea 9. has de sacar de cada partida que huuiere en la suma, los sietes por si, y lo que sobrare ponerlo adelante de las mismas partidas: y despues llanamente sumar las sobras de todas las partidas, y sacar los sietes sin hazer diezes, y lo que sobrare, guardarlo has, y en la suma principal (sacando los sietes) sobrara otro tanto, ya sea algo, ya sea zero. Soy en esto corto, porque sabiendo las prueuas (que dizen reales) no ay para que perdertiempo con tanta filateria.

*Cap. XIII. Trata las reglas (que dizen)
calculatorias.*

EL orden de contar con Calculos, o contadores, es en dos modos. El primero. Hazien do rayas, y poniendo en primera dè abaxo vna piedra, o contador para denotar vno, y para 2. hasta 4. y para denotar 5. ponen 1. en el espacio que esta primera raya tiene encima, hasta llegar a la segunda, de suerte que en la raya primera cõ su espacio se puede poner desde 1. hasta nueue.

De la suerte que hemos mostrado assentar vnidades en la raya primera, y su espacio, assi se pondran en la segunda los diezes, y en la terce-

ra los cientos, y en la quarta los millares, proce-
diendo en infinito. Segun los nombres q̄ dizen,
vnidad, dezena, centena, millar, como parece en
la figura de abaxo, que monta 7916.

¶ El segundo orden de contar se haze sin rayas
mas en su lugar se ponen contadores, desta fuer-
te que en la figura parece.

Dezena de millar. ○ monta 8023.

	○	
Millar.	○	○ ○ ○
Centena.	○	
Dezena.	○	○ ○
Vnidad.	○	○ ○ ○ ○

¶ Y así se pondran, y nombraran otros nume-
ros de menor, o mayor cantidad.

Sumar con Calculos, o Conta- dores.

¶ Despues de entendida la orden del assentar
qualquiera cantidad que se ofrezca, para sumar
qualesquiera sumas que te vengán, tendras este
orden. Que cada cinco contador es de los que
estuuieren en raya, hazen vno de su espacio de la
misma

misma raya, y dos de espacio hazen vno de la raya que se le siguiere, como mejor se entendera en la figura siguiente, la qual trae tres partidas. La primera de la mano siniestra monta 1534. La segunda 605. La tercera 3158.

¶ Para sumarlas todas tres en vna, començaras por la primera raya de abaxo diziendo. Quatro que estan en la primera suma, y tres en la otra son 7. destes 7. quita 5. para hazer vno de los del espacio, y sobran 2. pon 2. adelante de la raya que està trauesada, y por los 5. llevaras vno para juntarlo con lo que en los espacios hallares. Pues vno que traes junto con dos que ay en el espacio, que esta sobre la primera raya, hazen 3. y porque dezimos, que de dos de vn espacio se haze vno de vna raya, por tanto sacaras dos, y el vno que queda, ponerle has en el mismo espacio que sumas, y prosiguiras passando a la segunda raya con el vno que traes, diziendo. Vno que traygo, y tres que ay en la segunda raya hazen 4. pues porque no llegan a 5. pon los 4. en la misma raya: como parece en la figura, y assi passaras sin llevar ninguna cosa al espacio, que esta

H

enci-

encima de la segunda raya, y hallaras, que no ay mas de vno, pues ponlo como està en el mismo espacio, a do assentares la suma. Passa a la tercera raya, sin llevar nada, y suma lo que tiene, y seran dos, los quales se assentaran en la suma. Passa al espacio, que està encima desta tercera raya, y hallaras dos, los quales, porq̄ son de espacio, valen vno de raya, y asì no pondras nada, sino passarte has a la quarta raya, llevando vno con el qual juntaras quatro que ay en ella, y seran 5. y porque de 5. contadores de raya se haze 1. de espacio, no pôdras nada en la raya, sino passarte has al espacio que està encima de la quarta raya, y porque no ay cosa alguna que sumar, pôdras el que traes, y asì quedaran sumadas estas tres partidas, y montaran 5267. como.

¶ Nota que estas figuras, pueden ser como quifieres no me da mas que sean de musica, que de cuenta, que de otra qualquiera forma, que te agradare.

Restar con Calculos.

En el restar se tendra la misma orden q̄ en el sumar, en quanto al tener cuenta, que cinco de raya hazen vno de espacio, y dos de espacio vno de raya, como mejor se entendera por la platica del exemplo siguiente, en el qual se pone que quieres restar 5292. de 7213.

Pues comienza de la primera raya de abaxo como heziste en el sumar, diziendo. Quien de tres que estan en el recibo sacaca 2. que estan en el gasto, queda 1. pon 1. en la misma raya, y pasa a la segunda, pues en el espacio de la primera raya no ay nada diziendo. Quien de vno que està en el recibo saca 4. que estan en el gasto, no puede ser. Pues de quatro para 5. falta 1. el qual se juntara con el otro, que està en el recibo, y seran 2. pon 2. en la misma raya a do se pone el alcance, y prosigue, llevando en la memoria vno: porque todas las vezes que en las rayas nombrares cinco, se ha de llenar vno, y en los espacios nombrando 2. se llevara otro: pues vno q̄ traes

juntandolo con el otro, que está en el espacio
 de encima de la segunda raya seran dos, y pon
 que en el espacio del recibo no ay nada passa
 ras a la tercera raya llevando vno, el qual jun
 tandole con los dos que estan en el gasto ser
 tres, restalos de los dos del recibo, diziendo
 Quien saca tres de dos no puede ser: pues de
 à cinco faltan dos, los quales juntaras con los
 otros 2. que estan en la misma raya, en la parti
 da del recibo, y seran quatro, pon quatro en la
 tercera raya, y prosigue, llevando el primero, el
 qual primero se sacara de lo que huviere en el
 espacio de la tercera raya, y porque no ay nada
 diras. Quien de ninguna cosa saca vno, no pue
 de ser, pues de vno a dos falta otro, este vno pón
 dras en el espacio de esta tercera raya, a do se
 asienta el alcance, y proseguiras, llevando vno
 el qual juntaras en la quarta raya, y diras. Quié
 de dos que estan en el recibo quita vno q̄ tray
 go, queda vno, pon vno en la misma raya, y pas
 sa al espacio, sin llevar ninguna cosa, y di. De
 vno sacando otro, no queda nada: pues porque
 no queda nada, no se ponga nada, y desta fuer
 te aurás dado fin a la resta, y quedaran 1921. y
 assi se respondera, que si vno recibio 7213. y ga
 stò 5292. queda deuiendo 1921. como parece
 figurado.

R. G. A.

Multiplicar con Calculos.

Para multiplicar, se han de saber vnos compẽ-
didos, que puse al fin del cap. 9. deste primero li-
bro, a do comienza multiplicado vnidades por
dezenas, lo que viniere serã dezenas. Presupue-
sto esto, pon por exemplo q̃ quieres saber, quan-
to valen 22. varas de paño a 17. reales la vara.
Pon en figura la multiplicaciõ y multiplicador,
como parece,

Var. Pre.

Y multiplica con los 7. los 22. cada letra por si
liziendo 7. vezes 2. son 14. ponlos en las rayas:
como al principio se mostro) y passaras a los
liezes, diziendo 7. vezes 2. son 14. Estos 14. son
liezes q̃ valen 140. asietã los, segun se ha mo-
trado, y prosigue adelante multiplicado los 22.
por el 10. cada letra por si, diziendo. Vna vez 2.
son 2. y porque la vna destas letras que multi-

H 3

plica-

plicas es dezena, estos dos seran diez, y assi valdra 20. Assienta estos 20. y prosigue multiplicado con el mismo 10. las 20. varas. y seran 200. porq multiplicando diez por diez, hazen cientos. Los quales 200. assentaras, y no faltara otra cosa, sino sumar todo lo que estuviere en las rayas, que son 374. como parece figurado. Y assi haras en las semejantes de mayor, o menor cantidad.

El partir de lo dicho puede el curioso colegir y ordenar lo que mejor le pareciere.

Cap. XIII. Muestra la orden de reduzir las unas monedas en otras.

Quando quieres reduzir vna, qualquiere qualidad de moneda mayor en otra menor, multiplicaras. Exemplo 100. coronas quãtos maravedis seran? Multiplica las 100. coronas por 400. q son los menores q vna corona vale, y vendra al producto 40000. y tantos maravedis valen las 100. coronas. Y assi hara de otra mayor, o menor cantidad, y sera exemplo para otras monedas.

nedas. Nota si la mayor moneda no cõtiene ala menor algunas vezes justamente. Como si dizē 80. ducados quantos reales seran? Por razõ que vn ducado no tiene reales justamente (porque vltra de los onze reales, es su valor vn marauedi mas) reduziras primero los 80. ducados a marauedis multiplicando 80. por 375. que son los marauedis de vno (como se dixo en el primero exēplo deste capitulo) y montaran 30000. marauedis. Parte estos 30000. por 34. (que es el valor de vn real) y vendra a la particion 882. y sobran doze, assi responderemos que 80. ducados son 882. reales y doze marauedis.

¶ Quando de monedas menores quisiéremos reducir las a otras mayores, partira. Exēplo 68000 marauedis quãtos reales serã? Parte 68000. marauedis, por 34. (que son los m̃s q̃ vn real vale) y vendra al quociēte 2000. Y assi diras q̃ 68000. marauedis valen 2000. reales. Nota si las menores monedas no son justa medida de la mayor, como si dixessen 2000. reales quantos ducados seran? Porque el ducado no es justamēte reales, por el marauedi q̃ tiene mas de 11. reales reduziras primero los 2000. reales a m̃s, por la regla primera, y serã 68000. m̃s, estos 68000. partelos por 375. que son los marauedis, que vale vn ducado (como manda esta regla segunda) y lo que vinieren seran ducados. Y assi se puede reducir qualquiera especie de moneda a otra.

Cap. XV. Trata de juros, o censos.

SI te fuere preguntado, con quantos marauedis se comprara vn ducado de renta, a razon de la 14000. marauedis el millar. Multiplicaras los marauedis que el ducado vale, que son 375. por 14. y montaran 5250. los quales son marauedis. Y assi responderas, que con 5250. marauedis se compraran 375. marauedis de renta, a razon de 14000. el millar, multiplicaras con 40. assi como multiplicaste con 14. primero.

¶ Otro exemplo. Con cien mil marauedis, quanto cõprare de juro, a razon de 40000. el millar? Parte los 100000. por 40. y vendra a la particiõ dos mil y quinientos. Pues dos mil y quinientos daran por los 100000. marauedis, a razon de 40000. el millar, como dixo a razon de 40000. partiras los 100000. por 14. &c.

¶ Otro exemplo. Con dos mil ducados quanto se comprara de juro, a razon de 140000. el millar. Reduze primero los dos mil ducados a marauedis: segun la regla del reduzir monedas, del cap. xiiij. deste primero lib. y montaran 750000 marauedis. Parte 750000. a 14. y vendra a la particiõ 53571. $\frac{4}{7}$ que en menor denominacion es $\frac{4}{7}$ y assi diras. Que a razon de 140000. el millar, daran de renta 53571. marauedis, y mas $\frac{4}{7}$ de marauedi, por dos mil ducados. La razon desto entendi-

tenderas en el libro tercero cap. de la regla de tres.

Cap. XVI. Trata de prestar dinero, y que gane el interese como el caudal.

SI vn mercader diesse a otro cierta cantidad de dinero, por ciertos años : con tal condiciõ que tambien ganasse la ganancia como el caudal, a razon de tanto por ciento. Haras lo que en la platica del exemplo siguiente se pondra.

¶ Vn tutor dio 20. ducados que tenia de vn menor, a vn mercader por tiempo de tres años, con esta condicion, que el mercader aya de dar razõ de 10. ducados por ciento, en cada vn año: y que tambien gane la ganancia como el caudal. Pide se, quãtos ducados boluera este mercader en fin de los tres años. Haras asì, q̄ mires quãto pueden ganar 20. ducados, en vn año, a razon que 100. ducados ganã 10. y hallaras q̄ ganã 2. ducados. Pues suma, o junta estos dos con los 20. y serã 22. Estos 22. pondras tres vezes, porque son tres los años, desta manera 22. 22. 22. y debaxo desto se pondra la cantidad que se presta (que en este exemplo son 20.) vna vez menos que son los años, por quãto se empresta el dinero. Quiero dezir : que si emprestaren por quatro años, pondras lo prestado tres vezes, y si por 3. dos: y asì en lo demas. Desta manera.

22.

22.

22.

Caudal y ganancia.

20.

20.

Caudal.

¶ Y despues de puesto en figura (como parece) multiplicaras las sumas que estuuieren sobre la raya, vnas por otras, y lo que saliere sera partition. Afsi mismo multiplicaras las sumas que estuuieren debaxo de la raya vnas por otras, y sera partidor, diziendo afsi veynte y dos vezes veynte y dos, hazen 484. Otra vez 484. vezes veynte y dos, hazen 10618. los quales son partition. Multiplicalo debaxo de la raya diziendo veynte vezes veynte, hazen 400. Esto es partidor, pues parte ahora 10648. a los 400. y cabrá 26. $\frac{248}{400}$ abos, que en menor denominacion es $\frac{31}{50}$ abos. Que por el capitulo quinto, del libro segundo monta dozientos y treynta y dos marauedis y medio: è afsi hallaras, que los veynte ducados ganando cada año dos, en tres años, ganando tambien la ganancia, al mismo respecto, ganaran veynte y feys ducados, y dozientos y treynta y dos marauedis y medio. Y tanto bolnera el mercader al tutor en fin de los dichos tres años.

Fin del primer libro.

TRATA

TRATA DE NVMEROS
quebrados, y de sus diferencias,
y operaciones.

A q̄ en el libro primero he-
mos declarado, Sumar, Res-
tar, Multiplicar, Partir to-
do por numeros enteros: en
este segundo libro se decla-
rá las mismas reglas por nu-
meros (q̄ dicen quebrados,
o rotos, q̄ es vna mesma cosa. Y porque toda ar-
te, y ciencia, procede ciertos principios conoci-
dos y otorgados, para intelligencia de lo que
en este libro se ha de tratar, pondre los princi-
pios, o presupuestos siguientes.

- 1 Primero principio todo numero menor, es parte, o partes del numero mayor.
- 2 Todos los quebrados que tuieren vna mesma denominacion se trataran como enteros
- 3 Todos los quebrados que tuieren vna misma proporcion, son de vn mesmo valor, conuersa desta, diciendo: son los mesmos en vn valor luego de la misma proporcion.
- 4 Toda parte es menor que su todo, y ay cótra-rio el todo es mayor que su parte.
- 5 Toda parte, o q̄brado es menor quãto mayor fuere su dominacion, y al contrario tanto fera

fera mayor, quanto menor fuere su denominacion, auiendo igualdad en los numeradores.

- 6 Todo entero se puede diuidir en quãtas partes quisiéremos. Y tantas partes como le quisiéremos hazer, tanto le auemos de dar por denominacion.
- 7 Quando el numerador es tan grande, que se iguala con su denominador, se haze entero.

CAPITULO PRIMERO.

De la distincion del quebrado.

Quebrado es vna cosa, que tiene vna parte, o dos, o tres, o muchas de algun entero, y no toda: porque si todas las tuiesse, no seria quebrado, antes seria entero.

Cap. II. Del origen de los quebrados.

LA origen y nacimiento de los quebrados es, quando se parte vn numero por otro: y en la tal particiõ sobra alguna cosa, porque en tal caso aquello que sobra, y no se puede partir enteramente, es parte del partidor, y llamãle quebrado, o roto. Como si partiésemos 30. a 3. compañeros cabe a 6. y sobran 2. estos dos que sobran se pondrá sobre vna raya, y los tres compañeros de baxo desta manera: $\frac{2}{3}$. La qual figura quiere de

zir dos tercios de vna cosa de aquellas que partimos (como adelante diremos.) Solamente entenderas por aora, q̄ todo aquello que estuuere sobre la raya, ha de ser partido por lo que tuuiere debaxo. Nacé afsi mismo, quando es mayor el partidor que la suma partidera. Como si dixetemos. Parte 3. panes a 4. pastores: por q̄ los tres panes no pueden ser partidos a quatro: de manera, que quepa a pan entero a cada vno: por tanto pondras los 4. debaxo de los 3. haziendo vna raya en medio desta manera $\frac{3}{4}$ y quedaran partidos. La qual figura quiere dezir tres quartos de vn pan. Y afsi diras q̄ partiendo tres panes a quatro pastores; cabe a cada vno tres quartos de vn pan: y es cosa clara: porque tres panes hazen doze quartos. Pues doze quartos repartidos a quatro compañeros vendra a cada vno tres quartos de vn pan, como hemos dicho. Y afsi de los demas quebrados. Mas si el partidor entra ygualmente en la suma partidera: quiero dezir, que si partiendo vn numero por otro, no sobrare adna, en tal caso no se engendrara quebrado.

Nota, que quando vienen estos quebrados, toman la denominacion de la cosa que se parte: quiero dezir, que si partiendo ducados viniere algun quebrado, el tal quebrado diremos ser de ducado, y por el semejante de otro qualquier moneda.

Cap. III. De la orden que se ha de tener en assentar
y nombrar los quebrados.

ES de saber, que para poner qualquiera quebrado en figura, se ha hazer vna raya pequena desta manera — encima de la qual assentaras el numero quebrado, que es lo que sobra en las particiones, y debaxo se deue assentar el partidior (que son los compañeros) Y notaras que el numero que està sobre la raya, se dize numerador, o numero que ha de ser diuidido. Y siẽpre sera menor que el que se assienta debaxo, y el que se pone debaxo de la raya, se llama denominador, o diuisor: y siempre sera mayor. Como si dixessemos, tres quartos de ducados: assentar se han desta manera que parece figurado.

3 — Numerador.

4 — Denominador.

El numerador nombra, diziendo todo lo que està encima de la raya. El denominador denomina el ser de aquello que nombro el numerador, como el exemplo puesto declara: porque el numerador nombra, diziendo tres: y el denominador da a entender, que los tres que nombrò el numerador, son quartos. Y esto es lo quiere dezir el quatro que està debaxo, como mas claramente se entendera en las figuras siguientes.

Esta figura 2^a quiere dezir medio, y figura se
así

afsi, porque la raya denota tãto como partidos: y afsi querra dezir la figura, que vno partido a dos que estan debaxo, cabra a medio: porque si vna cosa se diuide en dos partes iguales, qualquiera dellas se dira medio.

¶ Esta figura 3^a se dize vn tercio. Que quiere dezir, que si vna cosa se diuide, o haze tres partes iguales, la vna se diravn tercio, y las dos, dos tercios que se figura afsi. $\frac{2}{3}$ Esta figura 4^a se dize quarto, o quarta parte. Que quiere dezir, que si diuides qualquier cosa, o moneda en quatro partes iguales, la vna se dize quarta parte, y las dos se diran dos quartos: que es tanto como la mitad, y se figura afsi $\frac{3}{4}$ y las tres se dizen tres quartos, desta manera. $\frac{1}{4}$ Quatro quartos no dezimos: porque todas las vezes que las letras que estuieren sobre la raya, se igualaren con la de abaxo, en qualquiera denominacion de quebrado se haze entero. Y si excediere la de arriba ala de abaxo, sera mas que entero. Por lo qual los numeros que se pusierẽ sobre la raya, no se igualaran con los de abaxo. Esta figura 5^a se dize vn quinto, y afsi $\frac{2}{5}$ dos quintos, y afsi $\frac{3}{5}$ tres quintos, y desta manera $\frac{4}{5}$ quatro quintos, y vn quinto es, si vna cosa se diuide en cinco partes iguales la vna. Esta figura 6^a quiere dezir vn sexto, o sexta parte, ya fssi $\frac{2}{6}$ dos sextos, ya fssi $\frac{3}{6}$ 3. sextos, y afsi $\frac{4}{6}$ quatro sextos: y desta manera $\frac{5}{6}$ 5. sextos. Y vn sexto es, si vna cosa se diuide en seis partes
 igua-

iguales, la vna. Vno sobre vn siete, quiere dezir, vn septimo, y vn dos, dos septimos: y vn tres, tres septimos, &c. hasta que dezimos 6. seprimos. Septimo se dize hecha vna cosa 7. partes iguales: la vna parte. Vno encima de vn 8. quiere dezir vn ochauo: y vn dos, dos ochauos: y vn 3. tres ochauos, &c. hasta dezir siete ochauos. Ochauo es, si vna cosa se haze ocho partes iguales, la vna parte. Vno encima de vn 9. con su raya, quiere dezir, nona, o nouena parte, y vn dos, dos nouenas, y vn tres, tres nouenas, &c. hasta dezir ocho nouenas: nona parte es, hecha vna cosa nueue partes iguales, la vna. Vno encima de vn diez, quiere dezir, vn diezmo, o dezimo: y vn dos, dos dezimos, y vn tres, tres dezimos, &c. hasta dezir, nueue dezimos. Dezimos dezimos hecha vna cosa diez partes iguales, la vna.

¶ Hasta aqui se han nombrado todos estos quebrados conforme a la denominacion, o valor de sus mismos denominadores. Conuiene saber, diziendo medios, a do quiera que debaxo de la raya auia dos: y tercios, a do auia tres, y quartos a do auia quatro, &c. hasta diezmo, por ser el denominador diez. De aqui arriba en todos los de mas quebrados, que mayor denominador traxeren, se nombraran con esta diction abos. Como por la figura presente se declara. $\frac{7}{4}$. La qual se nombra, diziendo. Siete, treynta y quatro abos de vna cosa. Como si dixessimos de vn
duca

ducado, o de otra qualquiera moneda, y quiere dezir. Que hecho vn ducado 34. partes iguales, las 7. de ellas. O que siete ducados enteros, partidos en 34. partes iguales, vendra a cada vna de las treinta y quatro partes siete $\frac{34}{4}$ abos de vn ducado. De suerte, que para nombrar vn quebrado, de grande, o pequeña denominacion, nombraras primero lo que estuviere sobre la raya, y luego lo q̄ estuviere debaxo, y añadiras despues esta diction, abos, como si dixessemos $\frac{75}{4}$, quinze quarenta y cinco abos de qualquier cosa. Pues si este quebrado se nombrare ser de real, diras q̄ quiere dezir, que diuidido el real en 45. partes iguales, las 15. dellas, que es tanto como la tercera parte: y si fuere de otra moneda, la misma orden se guardara.

Cap. IIII. De dos especies, o diferencias que ay de quebrados.

¶ Dos diferēcias ay de quebrados, vnos son dichos quebrados simples, y son aquellos, que son parte, o partes de numero entero. Como los que hasta aqui hemos declarado. Otros son dichos quebrados de otros quebrados, que por otro nombre se dizen quebrados compuestos, y son aquellos que tienen parte, o partes de algun quebrado simple. De los quales breuemente tratare despues.

Capitulo V. Muestra saber el valor de todo quebrado simple, de qualquiera moneda que sea.

¶ Para saber el valor de qualquier quebrado, miraras primeramente de que especie de moneda se nombra ser el tal quebrado, y despues de sabido, assentaras el valor de la tal moneda en otra moneda mas baxa, y multiplicarse ha por el numerador del quebrado, y lo que viniere ala multiplicaciõ, partirlohas por el denominador del mismo quebrado, y lo que al cociente viniere, sera el valor del tal quebrado. Exemplo: ¿tres quintos de ducado que valen? Por quanto se nõ braron, ser de ducado, reduziras el ducado a otra moneda, como a marauedis, y serã 375. marauedis, los quales multiplicaras por el numerador deste quebrado, qes 3. y mõtara 1125. Parte estos 1125. por el denominador q es 5. y vëdra a la particiõ 225. y tãtos marauedis, responderas, q ualẽ los $\frac{3}{5}$ de vn ducado. Y es cosa clara, porque vn quinto de ducado es 75. Pues tres quintos, serã tres vezes 75. que juntos hazen 225. como hemos dicho. Nota saber $\frac{3}{5}$ de ducado quãto es? no es otra cosa, sino buscar vn numero proporcional, q se aya a los 375. que es el valor del entero como se ha el 3. con el 5. que es la regla de tres diziendo. Si 5. dan 3. quedaran 375. y por esto se multiplica como arriba has visto. Y asì se hara de

de otro qualquiera quebrado. De suerte, que para saber perfectamente el valor de vn quebrado notarás tres cosas. La primera, entender que el numerador de qualquiera quebrado son enteros: y del especie de la moneda que el tal quebrado se nombrare. Quiero dezir, que si vn quebrado se nombrare ser de ducado, el numerador del tal quebrado, seran ducados enteros, y si se nombrare ser real, seran reales, y así de otra moneda, y el denominador, siempre es el partidor, a quien se ha de partir el numerador. La segunda es, saber como se nombra el tal quebrado. La tercera, que quiere dezir, o quanto es su valor. Lo qual porque mejor se entienda, pongo por exemplo estos $\frac{51}{2}$ abos de real. Quanto a lo primero has de entender, que porque este quebrado se nombra de real, que los cincuenta y vno que estan sobre la raya son reales, y los cientos y dos, que estan debaxo, que es el denominador, son los compañeros, a quien han de ser partidos. En quanto a lo segundo, digo, que se nombra, diciendo primero lo que estuviere sobre la raya, y luego lo que estuviere debaxo, y despues de todo esto, añadirás esta diction, abos, y así lo nombrarás diciendo. Cincuenta y vn ciento, y dos abos. Quanto a lo tercero, digo, que quiere dezir, que hagas la pieza de la moneda, cuya el tal quebrado se nombrare ser tantas partes iguales

quantas vnidades huuiere en el denominador, y q̄tomes dellas tantas partes, quantas vnidades huuiere en el numerador, y tanto sera su valor. Pues por quanto estos abos se nombraró ser de real: diuide vn real en 102. partes yguales, y toma las 51. de ellas. Lo qual se haze mejor por euitar prolixidad, como hemos mostrado, assentando el valor de vn real, que son 24. marauedis, y multiplicandolos por el numerador del quebrado, q̄ en este exēplo es 51. y montaran 1734. los quales parte por el denominador que es 102. y vendra a la particion 17. los quales seran marauedis, y el valor del quebrado. Y assi diras, que cinquenta y vno, ciēto y dos abos de vn real valen 17. marauedis, y es cosa clara, porque si vn real se diuide en 102. partes yguales, tomando las 51. de ellas, es lo mismo que tomar las medias, y tomar las medias, es tanto como tomar el medio real, que es 17. marauedis, como por la regla has visto. Otro exemplo $\frac{4}{7}$ de ducado, quantos marauedis montan? Haz segū la regla manda, enque multipliques los marauedis de vn ducado, que son 375. por los 4. que es numerador deste quebrado, y montara 1500. los quales parte por el 7. que es el denominador, y vendra a la particion 214. y mas $\frac{2}{7}$ y assi diras, que 4. septimos de ducados es 214. marauedis, y dos septimos de marauedi. Para saber estos dos septimos de marauedi, quanto montā

multi-

multiplicaras el 2. que es nombrador, por el valor de vn marauedí, que sera por dos blancas, y sera 4. parte 4. por el 7. que es el denominador, y vendra a la particion quatro septimos de blanca, que sera lo mismo q̄ hazer 7. partes iguales vna blanca, y tomar las 4. q̄ es poco mas de media blanca: sabras mas quanto es $\frac{4}{7}$ de blanca, multiplicando el valor de vna blanca, que son dos cornados, por el 4. que es numerador de los 4. septimos, y mostraran 8. parte ocho a los 7. que es el denominador, y vendra a la particion vno, y sobrara otra. Y assi diras que los dos septimos de marauedí, es vn cornado, y mas vna septima parte de cornado. Pues para saber quanto es vna septima parte de cornado, pondras por caso, que vn cornado vale 14. auellanas, o lo que te pareciere (pues no ay mas baxa moneda que cornado en España) multiplica 14. auellanas por el numerador de vn septimo, que es 1. y montara catorze, parte estos 14. por el denominador, que es 7. y vendra a la particion dos, las quales seran auellanas, y assi diras que $\frac{1}{7}$ de ducado vale 2 14. marauedis, y vn cornado, y dos auellanas, a razon que por vn cornado dieffen 14. auellanas. Nota bien la platica de los exemplos precedentes: porque assi se sabra el valor de otro qualquiera quebrado de mayor, o menor denominacion.

Cap. VI. *Muestra abreuiar quebrados a menor denominacion.*

¶ Muchas vezes acontece venir vn quebrado de tantas letras que ay necesidad de abreuiarlo a menor denominacion, para que mas facilmente se pueda obrar con el tal quebrado en las reglas generales, no quitandole nada de su valor, y fuerza, que primero tenia. Y assi digo, que abreuiar no es, ni quiere dezir otra cosa, sino abaxar el numerador, y denominador de vn quebrado, a otro numerador, y denominador mas pequeños, de aquella misma proporcion que el tal quebrado tiene: como si dixesse, abreuiar a menor denominacion $\frac{1}{2}$, que es lo mismo que buscar otro quebrado, que valga tanto como los 4. dozabos, y que sea mas pequeña su denominacion. Lo qual se haze buscando vn numero, que pueda partir el numerador, y denominador del tal quebrado, enteramente. Quiero dezir, que no sobre nada, ni se quiebre la vniidad en las tales particiones. Pues busca vn numero, que pueda partir el numerador, y denominador deste quebrado enteramente, y hallaras que es quatro: pues parte ahora el numerador de los quatro dozabos, que es quatro por este 4. y vendra a la particion vno, el qual vno pondras sobre vna raya. Parte mas con este mismo 4. con que partiste el numerador, los 12. y vendra

dra a la particion 3. los quales pondras debaxo del 1. que esto sobre la raya, desta manera $\frac{1}{3}$ / assi auras abreuado los quatro dozabos a menor denominacion, que es vn tercio, y tanto sera dezir vn tercio de vna cosa, como los 4. dozabos de la mesma cosa. Otro exemplo $\frac{10}{34}$ abos en menor denominacion que seran? Saca la mitad de los diez, que son 5. y luego de los 34. que son 17. pues no ay otra parte que integralmente pueda partir: y pongase el 5. sobre el 17. poniendo por medio vna raya desta manera $\frac{5}{17}$. Y assi diras, que $\frac{10}{34}$ abos de vna cosa abreuados a menor denominacion son 5. y diez y 7. abos, y no se pueden mas abreuuar, por causa que no aura letra, que pueda partir al 5. y al 17. enteramente, porque puesto caso, que el numerador se puede partir por 5. el 17. no puede ser partido por 5. sin que sobre algo: y al contrario la letra, que partiere el 17. no podra partir al 5. sin que se quiebre la vnidad: y pues no se puede abreuuar, dexesse assi, y di, que tanto sera hazer vna pieça de moneda 34. partes, y tomar los 10. como hazer la 17. y tomar los 5. Pruuelo, porque sea auiso para todas las demas abreuaciones. Pon, que los diez treynta y quatro abos son de vn real para saber quantos maravedis serã, assentaras el valor de vn real, que es 24. y multiplicaras por el numerador del quebrado que son 10. y montaran 340. Ellos 340. partelos por 34.

que es el denominador (como manda la regla del cap. 5. deste segundo libro) y vendra a la particion 10. y assi diras que los $\frac{10}{34}$ abos de vn real valen 10. marauedis. Haz lo mismo cõ los $\frac{1}{34}$ abos multiplicando los 34. que son los marauedis del real, por los 5. que es el numerador, y montara 170. parte 170. po: 17. que es denominador, y vendran 10. como por la otra via hallaste. Por lo qual se prueua no ser falso el abreuiar, y como aunque se le diminuye la denominacion, no por esso se le diminuye su valor. Nota, despues que vn quebrado se abreuia lo posible, los numeros en que quedare el tal quebrado, se llamã adinaicem primos, o incompósitos, los quales fino es la vnidad, ningun numero los puede dividir, sine fractione vnitatis. Y por esto se dize ser los tales numeros los menores de su misma proporcion.

¶ Nota, que si abreuiando quebrados huieres de partir por 2. o por 3. o por 4. &c. en lugar de partir por 2. tomaras la mitad de lo que huieres de partir, y por tres el tercio, y por el 4. el quarto, &c. como mostre en el libro primero cap. 10. diferencia primera de partir por numero digito.

Auisos para abreuiar algunos quebrados.

¶ El numerador, o denominador, que su vnidad fuere par, el tal quebrado tendra mitad.

¶ Si

¶ Si la vñdad del numerador, y denominador de qualquier quebrado fuere 5.º zero, el tal quebrado tendra quinta parte; como cinquenta sesenta abos $\frac{15}{50}$, y otros semejantes.

¶ Si en el numerador y denominador de vn quebrado huuiere zeros, pocos, o muchos quitaras tantos zeros de vna parte, como de otra, y quedara abreuiado. Exemplo abreuia estos $\frac{200}{600}$ abos. Quitando de cada parte 2. zeros, quedaran 2. tercios, esto se entiende, como no aya letra significatiua entre los zeros de ninguna parte. Porque si viniessse vn quebrado desta manera $\frac{200}{6020}$ no quitaras mas de vn zero de cada parte, y quedaran $\frac{200}{602}$. Porque aunque en el denominador del dicho quebrado ay 2. zeros, no se quitaran ambos, por causa que entre el vn zero, y el otro ay letra significatiua, porq̄ han de estar juntos los zeros, para auerse de quitar, como en el exemplo primero.

¶ Nota, que no todos los quebrados se pueden abreuiar a menor denominacion. Afsi como estos $\frac{1}{7}$ abos, $\frac{7}{24}$ abos, y otros muchos. La causa es: porq̄ los numeradores, o denominadores de los tales quebrados son numeros dichos primos. Y numeros primos son aquellos q̄ no pueden ser diuididos, sino por la vñdad. Pues todas las vezes que vn quebrado no se puede diuidir por otro numero ninguno, sino por la vñdad,

138 LIBRO SEGUNDO.
digo, que el tal quebrado no se puede abreuiar.

Otra diferencia de abreuiar quebrados.

¶ Por esta regla hallaras con breuedad vn numero, con el qual ala primera vez que partieres el numerador, y denominador de vn quebrado quedara el tal quebrado abreniado lo posible, y assi mismo muestra conocer si vn quebrado se puede abreuiar, o no. Lo qual se haze partiendo el denominador por el numerador del quebrado, y si sobrare algo sea partidor, y assi profiguiendo, partiendo lo mas por lo menos (no haziendo caso de lo que cabe, sino de lo que sobra) hasta tanto que no sobre nada, el partidor q̄ hiziere particion justa.) Quiero dezir, que el partidor que hiziere la particion, que no sobre nada) este tal sera el numero mayor, que para abreuiar el tal quebrado se puede hallar, como lo demuestra Euclides, en la segunda proposicion del septimo. Exemplo. Pon, que quiere abreuiar este quebrado $\frac{120}{280}$. Parte como la regla manda, los 280. (que es el denominador) por los 120 (que es el numerador) y vendra a la particion 2. y sobrarian 40. No cures en los 2 que cupieron, sino de los 40. que sobran, porque con ellos partiras otra vez aquello que en la particion que precedio, fue partidor, que es 120. Pues partiendo 120. a los 40. vendra a la
par-

particion 3. y no sobrara nada. Pues por quanto no sobro nada, no ay que partir mas, y assi diras que 40. es el numero, con el qual abreuiaras este quebrado, partiendo el numerador, y denominador del tal quebrado, vna sola vez por el 40. pues parte 120. por 40. y vendran 3. parte mas el denominador, que es 280. por el mismo 40. y vendra a la particion 7. los quales asentaras debaxo de los 3. desta manera $\frac{3}{7}$ (estos $\frac{3}{7}$ se prueuan ser los menores numeros desta proporcion del quebrado por la 35. del septimo de Euclides ex Zamberto) Y assi aurás abreuiado los 120. dozientos y ochenta abos, y diras que es 3. septimos. Y tanto sera dezir $\frac{120}{280}$ abos de vna cosa como tres septimos de la misma cosa. Y assi se hara con otros qualesquier quebrados. Mas es de notar, que si partiendo el denominador de vn quebrado por su numerador, como muestra la regla, viniere la vniidad a ser el partidor, por quien se ha de abreuiar el quebrado: digo, que en este caso el tal quebrado no se puede abreuiar, como se muestra por la primera del septimo de Euclides. Exemplo. Pon por caso que quieres abreuiar estos $\frac{678}{869}$ abos. Parte como la regla manda, el denominador, que es 869. por el numerador que es 678. (y no cures de lo q cupiere, sino de lo que sobrare) y vedra 1. y sobrarian 191. Parte mas los 678. por estos 191. que sobrarian, y vedra a 3. y sobrarian 105. parte los 191. (que en la parti-

partició antes desta fue partidór) por los 105. q̄
sobraron en esta segunda particion, y vendra a
la particion 1. y sobrarán 86. por los quales 86.
partiras los 105. y vendra 1. y sobrarán 19. parte
86. por 19. y cabra a 4. y sobrarán 10. parte estos
19. por 10. y cabra a 1. y sobrarán 9. parte 10. por
9. y cabra a 1. y sobrara orro. Parte 9. por este vno
q̄ sobró, y vendra a 9. y no sobrara nada. Y por quã
to fue vno el partidór que hizo que no sobrasse
nada, digo, que este 1. es el numero cõ que se ha
de abreuiar el tal quebrado. Pues ninguna cosa
que fuere diuidida por la vnidad, se disminuye,
luego este quebrado, y los semejantes no se pue
den abreuiar, como al principio diximos. Nota
 $\frac{6}{18}$ abreuiados segun las reglas dadas es $\frac{1}{3}$ la pro
porcion que ay del 6. a 18. que son los numerado
res, aũra de 18. a tres, q̄ son los denominadores.
Y porq̄ esto se prueua ser la misma proporcion
de 1. a tres, q̄ de 6. a 18. y son de vna proporció,
fera tanto el vno como el otro, como se dixo al
principio deste segundo libro presupuesto terce
ro. Prueuase esto por la 15. del 5. 19. y 21. del sep
timo de Euclides. Nota, que el abreuiar, no tan
solamente aprouechara en quebrados, mas tam
bien en las particiones de gran cantidad, pue
des aprouecharte, abreuiando la particion, y
partidór, como si fueren quebrados, y despues
partiendo. Exemplo, Parte 100. a 20. compañe
ros, abreuialos ciento, y los veynte, cada vno
por

por si, proporcionadamente por los preceptos dados, vendran los 100. a ser 5. y el 20. sera 1. Ahora digo que sera lo mismo partir cienro a veynte, que partir cinco a vno: que de vna fuer- te, y otra cabe a cinco. Y assi haras en las seme- jantes.

Capitulo VII. Muestra acrecentar la denomi- nacion a los quebrados.

¶ Esta regla es contraria dela precedente, por- que muestra acrecentar la denominacion, a qualquiera quebrado. La qual no es, ni quiere dezir otra cosa, sino subir el numerador, y de- nominador del quebrado que quieres, a mayo- res numeros, de aquella misma proporcion q̄ el tal quebrado tiene, no acrecentando nada a su valor. La qual regla se haze, multiplicâdo el nu- merador, y denominador del quebrado, cuya denominacion quisieres acrecentar, por vn nu- mero qualquiera que te pareciere, como si di- xessen. Acrecienta la denominacion a este $\frac{1}{3}$ to- ma el numero que te pareciere, y pon que sea 4. por el qual multiplicaras el numerador del tercio, q̄ es 1. y el denominador, q̄ es 3. cada vno por si, diziendo. Quatrovezes 1. son 4. põgase so- bre vna raya: luego multiplica los 3. del numera- dor. Diziêdo, 4. vezes 3. son 12. põlos debaxo de los 4. desta manera $\frac{4}{12}$ y assi auras acrecentado vn poco mas la denominacion al tercio: y diras que

que tanto es dezir el tercio de vna cosa , como quatro dozabos de la misma cosa. Y si quisieres dar mayor denominacion, multiplica el numerador destes 4. dozabos , por el numero que te pareciere, como hiziste en el $\frac{1}{3}$. Y assi los podras acrecentar en infinito : y si alguno no creyese ser tanto vn tercio de vna cosa , como 4. dozabos de la misma cosa, puede se prouar por la regla del quinto capitulo deste segundo libro, que trata de saber el valor de los quebrados, presuponiendo que el $\frac{1}{3}$ y los 4. dozabos son de vn ducado, o de otra qualquier moneda (o por la regla del abreuiar (hallaras ser tanto el valor de $\frac{1}{3}$, como el de los $\frac{4}{12}$ abos.

*Innatura
ranihil
est su-
perfluū
cōmen-
tator
philoso-
phi, li.
1. Pby.*

¶ Esta regla de acrecentar la denominacion a los quebrados, sirue para sacar con facilidad mitad, o tercio, o quarto, &c. de otras qualesquier partes de algun quebrado, que carece de las tales partes: como si dixessen. La mitad de $\frac{3}{8}$ quanto sera ? Por quanto del numerador de los tres ochauos (que es 3.) no se puede sacar mitad sin que se quiebre la vnidad, por tanto multiplicaras el numerador, y denominador, por 2. Diciendo 2. vezes 3. hazen 6. y 2. vezes 8. son 16. puesto lo vno sobre lo otro , desta manera $\frac{6}{16}$ se aura acrecentado la denominacion a los 3. ochauos: y diras que tanto es dezir $\frac{6}{16}$ como 3. ochauos. Pues saca la mitad de los 6. q̄ es el numerador de los 6. diez y seis abos, q̄ son 3. y pongãse sobre los

los 16. desta manera, $\frac{3}{3}$ y di que la mitad de 3. ochauos, es tres diez y seys abos. Este multiplicar por 2. se haze: porque assi como para sacar la mitad de vna cosa se parte por dos, assi para hazer que vn quebrado téga mitad, multiplicaras el numerador y denominador del tal quebrado por 2. y para que tenga tercia parte, multiplicas por 3. y para quarta parte por 4, &c. mas si quieres sacar de vn quebrado vna parte, si el numerador del tal quebrado la tiene: en tal caso no ay necesidad de acrecentarle la denominaci6: como si dixessen. Saca la mitad de $\frac{1}{2}$ abos, por quãto en 10. que es el numerador ay mitad sin que se quiebre la vnidad, saquese, que son 5. y di que la mitad de 10. dozabos es 5. doze abos. Y assi se hara de otra qualquiera parte, q̄ quieras sacar mitad. Prueuase este acrecentar a los quebrados su denominaeion, por las contrarias del abreuiar del capitulo precedente.

Capitulo VIII. Muestra reducir, o b zer de enteros quebrados.

¶ Ay necesidad para operacion de las reglas generales, de saber reducir enteros a quebrados. Como si dixessen, vn entero (o muchos quantos quisieren) quantos quartos haze? o medios, o tercios, y assi de otros qualesquiera quebrados. Para lo qual digo, que todo entero tendra tantas partes, quãtas vnidades tuuiere la denominacion.

nomination del quebrado en que quisieres reducir el tal entero (como se dixo en el principio deste segundo libro, en el sexto presupuesto.)

Quiero dezir, q̄ si preguntassen vn entero quantas mitades tiene? Diras q̄ 2. porque 2. medios hazen vn entero. Quantos tercios tiene? diras que tres. Y quintos 5. Y sextos 6. Y si preguntan quantos dozabos tiene? diras que 12. Y si dixerẽ treintabos: diras que 30. Y assi por el configuiẽte de otro qualquier quebrado, de grande, o pequeña denominacion. Entendido esto: si quisieres saber 2. enteros, o 3. o mas quantos medios hazen? No haras otra cosa sino multiplicar los enteros, quantos fueren, por vn 2. como si dixessen. Siete enteros quãtos medios son? Multiplica 7. por 2. y seran 14. Y assi diras que son 14. medios. Y si quisieres saber quantos tercios son los mismos 7. enteros: multiplica por 3. porque cada entero tiene 3. tercios. Diciendo 7. vezes 3. son 21. Y para hazer los quartos, multiplicaras por 4. y para quintos por 5. y para sextos por 6. Y assi por orden de las demas partes. Otro exemplo 3. enteros, y 5. abos, quantos octauos son? Reduziras primero los 3. enteros, a octauos multiplicando los tres, por 8 (q̄ son los octauos q̄ cada entero tiene) y seran 24. a los quales 24. juntaras los cinco q̄ estan sobre la raya, y seran por todos 29. Y assi diras, que 3. enteros, y 5. octauos son 29. octauos, assi ẽta 29. sobre vna raya, y de baxo

baxo los 8. desta manera ;^o Puede alguno dudar diciendo. Aueys dicho que el numerador (que es lo que se pone sobre la raya) siēpre es menor que el denominador (que es el que se pone debaxo) luego como es al contrario en este exemplo de 29. ochauos? que es el nombrador 29. y el denominador 8. A lo qual se responde, que es verdad quando el quebrado no llega a entero, mas en esta figura de 29. ochauos, claro parece que es mas quebrado: y està aora asentado a imitacion de quebrados impropriamēte puesto: porque solamēte se puso el 8. debaxo de los 29. por que no se olvidasse que son ochauos. De suerte, que si vieses vn numerador ser mayor que su denominado, en tal caso diras, que es mas que entero: como en esta figura parece. ^o La qual denota (por estar el 4. debaxo) que los 60. que estan sobre la raya son quartos, y si como es 4. fuera 5. denotara quintos, y 6. sextos, y si 7. septimos, &c.

¶ Otro exemplo. 2. varas y $\frac{2}{5}$ de paño, quantas sexmas serā? Multiplica las 2. varas por el denominador del quebrado, que es 5. y seran 12. aña de los 5. que es el numerador) y serā 17. los quales 17. son sexmas: y assi diras que dos varas y $\frac{2}{5}$ sexmas, reduzido todo a sexmas, montan 17. sexmas, como parece figurado. ¹⁷/₅

¶ Ponense los 5. debaxo de los 17. para denotar que los 17. son sexmas.

Cap. IX. Muestra reducir, o bazer de quebrados enteros.

¶ Diximos en el septimo principio, que se puso al principio deste segundo libro: que quando el numerador de vn quebrado se igualare con el denominador, se haze entero. Agora digo, que si el numerador fuere tan grande que se pueda partir por su denominador, que se parta y tantas quantas vnidades viniere al quociente, tantos enteros seran. Exemplo. $29 \frac{5}{8}$ abos, quantos enteros seran? Parte los 29. por los 8. y vendra a la particion 3. y sobrarian 5. los quales se pondran sobre los 8. desta manera $\frac{5}{8}$ y assi diras que veinte y nueue ochauos son 3. enteros, y cinco ochauos. Otro exemplo. 17. sexmas de varas, quantas varas seran? Parte las 17. por 6. que son las sexmas que tiene vna vara, y vendra a la particion 2. y sobran 5. pon los 5. que sobran sobre el mismo partidior que es 6. desta manera $\frac{5}{6}$ y los 2. que vinieron, son enteros, y assi responderas, q 17. sexmas, hechas enteros son 2. enteros, y 5. sexmas. Otro exemplo: quantos enteros seran sesenta y quatro quartos? Parte los 60. por el 4. y vendra a la particion 15. y no sobrara nada, pues di que $60 \frac{4}{4}$ son 15. enteros, de suerte, q si dizen 20. medios quantos enteros son? Partiras el 20. por su denominador (que es 2) y lo que viniere seran enteros. Y si dizen 20. tercios, quantos enteros son? Partiras

ras 20. por 3. y vendra 6. y dos tercios, y tantos enteros son los 20. tercios. Y assi por ordē, si dixeren quartos. parte por 4. Si quintos por 5. Si sextos por 6, &c. Nota tanto quanto faltare a vn numerador de vn qualquiera quebrado, para y-gualarse consu denominador, tal parte, o partes le faltara al tal quebrado para ser entero. Como si dizen $\frac{5}{6}$ de vn real, o de otra cosa, quanto es menos, o quanto le falta para ser todo el real? Mira quanto falta al 6. que es numerador para ocho q̄ es su denominador, y hallaras faltarle 2. pues 2. ochauos partes falta a los 6. ochauos, para ser todo el real, y assi en otro qualquiera quebrado

Capitulo X. Muestra assentar enteros con quebrados.

¶ Quando quisieres assentar algunos enteros entre quebrados, para que los vnos de los otros se diferencien y conozcan, se tendra auiso de poner debaxo de los enteros la vnidad. Como quisieres assentar quatro septimos, y tres enteros, y dos quintos. Assentar se há desta manera, $\frac{4}{7}$ $\frac{3}{5}$. Y assi entenderas, q̄ el 7. que esta debaxo de los 4. da a entender ser septimos los 4. q̄ tiene encima. Y el 5. q̄ está debaxo de los dos denota ser quintos los 2. mas el vno que esta debaxo de los 3. denota q̄ los 3. q̄ tiene encima son enteros. Tomaron los enteros por deno-

81: LIBRO SEGUNDO.
minador al vno, porque no lo es de ningun quebrado.

Cap. XI. Muestra reducir vn quebrado en otro.

¶ Si quisieres saber $\frac{2}{3}$ o otro qualquier quebrado, quantos tercios son, multiplicaras el numerador de los dos sextos que es 2. por el denominador del tercio que es 3. Diciendo, 2. vezes 3. son 6. Estos 6. partiras por el denominador de los 2. sextos (q̄ es 6.) y vendra al quociente 1. el qual es tercio. Y assi responderas, que 2. sextos de vn entero, cōuertidos en tercios, es vn tercio del mismo entero: y tanto sera dezir, dos sextos de vna cosa, como el tercio dela misma cosa. No es otra cosa esto, sino buscar vn numero que esté con el 3. como está 2. con 6. y segun esto, caufase regla de 3 y diras. Si 6. dan 2. quedaran 3. Lee en el primero capitulo del tercero libro.

¶ Otro exemplo. 3. quartos, quãtos ochauos seran? Assienta los 3. quartos, y porq̄ los quierēs hazer ochauos, assientaras ocho adelante; como parece.

$$3 \text{ --- } 8$$

¶ Y multiplicaras el 3. (que es el numerador de los 3. quartos) por el 8. y seran 24 los quales se partiran por el 4. (q̄ es denominador de los mismos tres quartos) y vendra al cociete 6. los quales son ochauos. Y assi diras q̄ 3. quartos de vna cosa

cosa, reducidos a ochauos, son 6. ochauos de la mesma cosa. La prouena de isto es, q̄ abreuiãdolos 6. ochauos a menor denominacion, por la regla del cap. vj. deste segundo libro, bolueran en tres quartos: y si esta prouena no te agradare, sabe que valen tres quartos de vna cosa (por el v. cap. de este segundo lib.) y despues sabras por el mesmo capitulo, quanto valen $\frac{6}{8}$ de la tal cosa, y hallaras ser tanto el valor de los 3. quartos, como de los 6. ochauos, si la tal reduccion estuuiere acertada mente hecha. Y desta manera se prouaran y reducirã qualesquier quebrados, o otra qualquiera denominacion.

Cap. XII. Muestra qual de dos quebrados es mayor.

¶ Para saber de dos quebrados qual es el mayor se assentaran en figura, poniendo el vno a lado del otro, y despues multiplicando en cruz el numerador del vno, por el denominador del otro, y el numerador que hiciere mayor multiplicacion, aquel tal sera el mayor.

¶ Exemplo: quiero saber qual es mas $\frac{3}{4}$ quartos ò $\frac{6}{8}$ ochauos: multiplica los 8. por el 3. y seran 24 los quales pondras encima de los 3. Luego multiplica assi mesmo los 4. por los 6. y seran 24. Ponganse sobre el 6. y porque ambas estas multiplicaciones, son yguales, diras que es tanto el vno como el otro, como parece figurado.

*Lee la
13. del
5. y 9.
del 7 de
Euclides.*

$$\begin{array}{r} 24 \\ 3 \times 8 \\ 4 \quad 6 \end{array}$$

¶ Otro exemplo. Qual es mas, dos tercios, o tres quintos? Ponganse en figura.

¶ Y multiplica en cruz como hemos mostrado y vendra sobre los dos tercios 10. y sobre los $\frac{2}{3}$ 6. Y porq̄ el 10. que està encima de los dos tercios, es mas que los nueue, que estan sobre los $\frac{3}{5}$ por tanto diras, que es de mayor valor $\frac{2}{3}$ de vna cosa, que $\frac{3}{5}$ de la misma cosa.

$$\begin{array}{r} 10 \\ 5 \times 9 \\ 3 \end{array}$$

¶ Saber quanto es mas vn quebrado que otro, el restar de quebrados lo mostrara.

¶ Nota, que quanto mayor fuere la denominacion de vn quebrado, tanto sera menor. Y al contrario tanto quanto fuere menor, tanto sera mayor. Como se dixo en el 5. principio. Exemplo. vn quarto es menor que vn tercio; porque vna cosa diuidida entres partes yguales, mayor parte sera cada vna de las tres, que si la mesma cosa se diuidiesse en quatro partes. Finalmente, mayor es vna tercia de vna vara, q̄ vna quarta de la misma vara y paño. Y por el configuiente de los demas q̄brados, mas es vn sexto q̄ vn septimo, siendo los numeradores de los tales q̄brados iguales

Cap. XIII. *Muestra reducir dos quebrados, o mas, quantos quisieres, a vn comun denominador.*

¶ Antes que declaremos la orden que se ha de tener para saber reducir dos, o muchos rotos a vna comun denominacion, se notaran dos cosas. La primera, que cosa es reducir. La segunda, para que es necessario, o para que aprouecha. Quanto a lo primero, reducir dos rotos, o mas, q̄ tienen diuersos denominadores, es traer los a vn comun denominador, y general para los dos, o mas quebrados, y que conforme al denominador nuevo, demos a cada vno otro numerador nuevo. Como por la practica de los exemplos mejor se entendera. Quanto a lo segundo, que es saber para que sirue. Digo, que assi como en enteros, si quisieses sumar ducados con reales, o otras qualesquier monedas diferentes, seria necesario reducir, todas las monedas a vna semejante: assi digo, que los quebrados de diferentes denominaciones, no se puede sumar vnos con otros, ni restar, ni hazer otra ninguna regla de las generales, si primero no se reduxessen a vna comun denominacion. Como quando de sumar tercios con quintos, y assi de otros quebrados. Pues siendo el vn quebrado tercios, y el otro quinto, la suma que de estos dos procediesse, ni bien se podria llamar quin-

tos, ni bien serian tercios, y desta manera no se podria obrar con ninguna regla general, si los quebrados diferentes no los conuirtiessemos a vn ser y denominacion comun. Estos quebrados pueden venir a ser reducidos en seys modos. Y esto no porque el reducir sea diferente en estas seys diferencias, sino porque el juntarse vnos quebrados con otros, o con enteros, puede ocurrir en seys maneras. De las quales particularmente pondre exemplos.

Diferencia primera. Muestra reducir vn quebrado solo con otro solo.

¶ Si quisieres reducir vn quebrado con otro, qualesquiera que sean, como medio con tres quintos, assentaras el vno a par del otro, desta manera.

$$\frac{1}{2} \qquad \frac{3}{5}$$

¶ Y multiplicaras los denominadores, vno por otro. Diciendo 2. vezes 5. son 10. Estos 10. sera comun denominador del medio, y de los tres quintos. Despues facaras la mitad del 10. que son 5. y poner lo has encima del medio. Luego facaras los tres quintos de los meses 10. que son 6. y ponerlos has encima de los tres quintos, desta manera.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ 3 \end{array}$$

$$2 \text{ --- } 5$$

10

¶ Y así auras reducido el medio, y los 3. quin-
tos, a vn comun denominador, que es a diezmos
y tanto sera dezir medio, como cinco diezmos
y tanto es dezir tres quintos, como seys diez-
mos. Y esta es la orden que se ha de tener por re-
gla general, para reducir pocos, o muchos que-
brados, a vna comun denominacion.

¶ Otro exemplo, quando quisieres reducir vn
quebrado con otro, se pueden reducir, con ma-
yor facilidad q̄ en el exemplo precedente decla-
ramos, multiplicando los denominadores vno
por otro, y la multiplicación sera el comun deno-
minador, y despues multiplicar el numerador
del vn quebrado, por el denominador del otro,
y el producto sera denominador del quebrado,
cuyo numerador multiplico, como las lineas de
sta figura muestran, en los mismos quebrados q̄
tomalte por exemplo.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \end{array} \times \begin{array}{r} 3 \\ 5 \end{array}$$

10

Pues

¶ Pues multiplica los dos denominadores, vno por otro que son 2. y 5. y seran 10. pongase debajo de la raya. Despues multiplica el 5. que es el denominador de los 3. quintos, por el 1. q̄ es numerador del medio, y seran 5. los quales pōdras sobre el 1. Multiplica mas los 2. q̄ es denominador del medio, por los tres, q̄ es numerador de los 3. quintos, y seran 6. los quales pōdras sobre el mismo 3. Y así aurás dado fin a tu abreuiación y responderás, que el medio tiene por numerador nueuo vn 5. y por denominador vn 10. Y los 3. quintos tienen por numerador nueuo 6. y por denominador 10. Y así dirás, que es t̄anto dezir la mitad de vna cosa, como los 5. diezmos de la misma cosa. Y por el consiguiente, tanto será 3. quintos, como 6. diezmos, como prouare despues que destas 6. diferencias enteramente ay tratado. Diximos q̄ los 10. en este exēplo es comun denominador. La razón es, porque se comunican del el medio, y los 3. quintos, quiero dezir, que compete, y haze estos dos quebrados.

La segunda diferencia es reducir en entero solo, con quebrado solo.

¶ Como si quisieses reducir quatro enteros cō 3. septimos. En tal caso no ay q̄ hazer otra cosa, sino reducir los 4. enteros a septimos (como se muestra en el cap. viij. deste segundo libro) y seran 28. septimos, y los 3. septimos dexar los has
 estar

estar así, sin reducirlos a ninguna denominacion. Y así diras, que tanto es dezir 4. enteros, como 28. septimos, como parece.

28 3 3

4. enteros son ——— y ——— son ———

7 7 7

¶ Nota, que reduziendo enteros solo con quebrado, no se haze, con solo conuertir el entero en el especie del quebrado, con que se reduce.

¶ La tercera diferencia es, reducir el entero solo con quebrado y entero, como si dixessemos, Reduce 3. enteros con 2. enteros, y vn quarto.

I

3. enteros, con 2. ———

4

¶ Lo qual no es, ni quiere dezir otra cosa, sino que reduzgas los 3. enteros, y los 2. y vn quarto todo a quartos. Pues reduce (como semostro en el capitulo viij. deste segundo libro) y hallaras q̄ los 3. enteros valen 12. quartos. y los dos, y vn quarto, s̄o 9. quartos, como parece en esta figura.

12 7 9

3. enteros, son ——— y 2 ——— son ———

4 4 4

¶ De arte que en esta diferencia los enteros se bueluē en el especie del quebrado q̄ traen consigo, como se dixo en la segunda diferencia.

¶ La quarta diferencia es reducir enteros y q̄brados, con quebrado solo: como si dixessemos.

Re-

156 LIBRO SEGVNDO.
 Reduze 3. enteros, y cinco sexros, con vn tercio.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 3 \text{ --- } \text{ con } \text{ ---} \\ 6. \qquad \qquad \qquad 5 \end{array}$$

¶ Primero que en figura se pōgan, reduziras los 3. enteros, y 5. sextos, a sextos (como se muestra en el septimo capitulo, deste libro segundo) y seran 23. sextos. Asienta 23. sextos, y adelante el tercio desta manera.

$$\begin{array}{r} 23 \times 1 \\ 6 \times 3 \end{array}$$

¶ Y despues de assi puestos en figura, multiplicaras con cruz (como diximos en el segundo exemplo, de la diferencia primera de reducir) y seran los 13. sextos 69. 28. abos, y el tercio sera seys 18. abos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r} 69 \times 6 \\ 23 \times 1 \\ 6 \quad 3 \\ 18 \end{array}$$

¶ Y tanto sera dezir veynte y tres sextos, como sesenta y nueue diez y ocho abos. Y tanto sera dezir vn tercio como seys 18. abos.

¶ La quinta diferencia es, reducir entero y quebrado, cō entero y quebrado, como si dixessen. Reduze 3. y medio cō 2. y 2. tercios. Reduze primero cada entero en el especie de su quebrado, q̄ sera hiziédolos 3. y medio, todos medios, y los 2. y 2. tercios todos tercios, por el cap. viij. deste se-

segundo libro. Y seran los 3. y medio, siete medios, y los 2. y 2. tercios, 8. tercios, lo qual se podrá en figura desta manera.

$$\begin{array}{r} 7 \times 8 \\ 2 \times 3 \end{array}$$

¶ Y multiplicaras en cruz, como hemos hecho en los exemplos precedentes: y seran los 7. medios 21. sextos: y los 8. tercios seran 16. sextos. Y assi responderas, que tanto es dezir tres y medio, como 7. medios, o como 21 sextos: y tanto es dezir 2. y 2. tercios, como 8. tercios, o como 16. sextos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r} 21 \quad 16 \\ 7 \times 8 \end{array}$$

$$2 \ 6 \ 3$$

¶ La sexta y vltima diferencia, muestra reducir, tres, o quatro, o mas, quantos quebrados quisieres, a vn comun denominador, segun que con 2. quebrados has hecho: como si dixessen. Reduze vn medio cō 2. tercios, y cō 3. quartos, y 3. quintos. y assi de otros qualesquier qbrados. Assentaras todos los quebrados, q̄ huieres de reducir a la larga, desta manera. 1 2 3 3

$$2 \ 3 \ 4 \ 5$$

¶ Y buscaras vn numero qualquiera que sea, q̄ tēga mitad, y tercio, y quarto, y quinto, que son los

258 LIBRO SEGVNDO.

los quebrados que quieres reducir. El qual numero se hallara multiplicando los denominados de todos estos quebrados vnos por otros, diciendo. Dos vezes 3. hazen 6. Seys vezes 4. son 24. Otra vez 24. vezes 5. son 120. Estos 120. es el numero que tendra mitad, y tertio y quarto, y quinto justamenre, y sera denominador comun para todos los 4. quebrados, q̄ en la figura estan y assi los pondras debaxo, desta manera.

1.	2.	3.	5.
2.	3.	4.	5.
120.			

¶ Ya que has hallado el denominador comun (q̄ es 120.) saca su mitad, q̄ son 60. y ponerlos has sobre el medio. Assi mismo sacaras sus dos tercios que son 80. y ponerlos has sobre los dos tercios. Luego sacaras los tres quartos de los mismos 120. que son 90. y assentar los has sobre los 3. quartos. Saca mas los 3. quintos de 120. q̄ son 72. y ponganse sobre los 3. quintos, como parece figurado.

60.	80.	90.	72.
1	2	3	3
2.	3.	4.	5.
120			

¶ Y assi auras dado fin a tu reduccion: y responderas, que tanto es dezir medio como 60. cierto,

y 20. abos, y lo mismo es dezir 2. tercios, q̄ dezir 80. ciento y veyn tabos, y tanto es dezir 3. quartos: como 90. ciento y veintabos: y lo mismo es dezir 3. quintos, que dezir 71. 120. abos. Y desta fuerte se auran buelto todos quatro quebrados (aunque diferentes) a vna misma y comú denominacion. Si alguno dudare como se sacara la mitad, o dos tercios, o 3. quartos, de los 120. lea el exemplo que se sigue. Reduze estos 3. quebrados siguientes, que son 4. septimos, y vn tercio, y cinco nueues. Ponganse en figura, como hemos mostrado, y aqui parece en figura.

4 1 5

7 3 9

Y buscaras vn numero, q̄ téga septima y tercia, y nouena parte, q̄ s̄o parte de los denominadores destos quebrados, q̄ quieres en este exēplo reducir. Pues para hallar vn numero, que tenga septima, tercia, y nouena parte justamente, sin q̄ se quiebre la vnidad, multiplicaras los denominadores destos quebrados q̄ quieres reducir, vnos por otros: como son 7. 3. y 9. diziendo 7. vezes 3. son 21. Otra vez 21. vezes 9. son 189. Pues este 189. es el numero, que tendra tercia, septima, y nouena parte justamente, y fera comun y nueuo denominador de los sobredichos 3. quebrados. Pues ya que has hallado el numero que tiene las cōdicioncs pedidas sacaras la septima parte

parte. Desta manera, q̄ partiras los 189. por 7. y vendra a la particion 27. estos 27. es el valor de vn septimo. Y por quanto ay 4. septimos, multiplicaras los 27 por 4 que sera lo mismo, que tomar quatro vezes 27. y montara 108. y tanto diras que son los quatro septimos, de 189. Asienta 108. encima de los 4. septimos. Parte mas los 180. por 3. por causa de saber quanto es el tercio, y vendra a la particion sesenta y tres: y tãto diras que es el tercio de 189. Ponganse estos 63. encima del tercio, y passaras a sacar los nonos de los mismos 189. Lo qual se hara partiendo 189. por 9. y vendra a la particiõ 21. multiplica 21. por 5. que es el numerador de los 5. nonos, y montara 105. Asientalos encima de los 5. nonos, de la manera que aqui parece.

$$\begin{array}{r}
 108. \quad 63. \quad 105. \\
 4 \quad 1 \quad 5 \\
 7 \text{ --- } 3 \text{ --- } 9 \\
 189
 \end{array}$$

¶ Y assi aurã reduzido a vna comun denominacion los dichos 3. quebrados, y diras. Que quatro septimos, es lo mismo que 108. 189. abos, y tanto es dez r vn tercio, como 63. 189. abos, y tãto es dezir $\frac{1}{3}$ de vna cosa, como $\frac{105}{189}$ abos de la misma cosa. Nota bien los dos exeplos de reducciones precedentes, porque por ellos se sabẽ reducir quantos quebrados quisiere de qualquier denominacion. Nota q̄ quando partes estos de-
nomi-

nominadores comunes, no te sobrara nada. La razón es, porq̄ son procreados los tales numeros de la multiplicacion de los denominadores de los quebrados de do ellos son el todo, y los tales numeros q̄ lo procrearon, son sus partes aliquotas: lee el cap. ij. del libro v.

¶ Aunque se ha puesto regla general para hallar denominador de muchos, o pocos quebrados, no dexare dedar otra regla, por ser cosa breue, la qual declarare por el exemplo siguiente, en que presupongo, que quiero reduzir los cinco quebrados que en esta figura parecen.

1	2	3	5	7
2	3	4	9	8

¶ En q̄ el primero es medio, y el segundo dos tercios, el tercero 3. cuartos, el quarto 5. nueues, el quinto 7. octauos. Pues la regla para buscar vn numero que tēga mitad, y tertio, y quarto, nono y octano, es esta (vltra dela que se ha declarado) que todo; los denominadores destos quebrados q̄ se pudiere diuidir justamente a otro denominador se borrarán, y no se hará caso dellos, y los que quedaren, por causa que no pueden diuidir a otros enteramente, se multiplicaran vnos por otros: y lo que al producto viniere, sera comun denominador. Quiero dezir, que sera el numero en el qual se hallaran todos los tales quebrados, como se prueua por la quinta cōcepciō del

septimo de Euclides. Pues los denominadores de estos quebrados q̄ estan en la figura son estos 2. 3. 4. 9. 8. Pues mira quales son los que pueden partir a otros, y hallaras que el 2. que es denominador del medio, puede partir al 4. por lo qual borraras el 2. dandole vna raya por medio. Assi mismo hallaras que el 3. que es denominador a los 2. tercios, puede partir al 9. que es denominador a los 5. nouenes. Pues borra el 3. como haziste al 2. Y por el configuiente prosiguiendo, hallaras que el 4. que es denominador de los tres cuartos puede partir al 8. (que es denominador de los 7. otauos) por tanto le señalaras como se ha hecho a los demas : y quedara el 8. y el 9. por causa que con ellos no se puede partir ningun denominador de estos quebrados enteramente. Pues multiplica el 8. por el 9. y seran 72. y no cares del 2. ni del 3. ni del 4. Y assi diras que 72. es el numerador que tendra medio y tercio, y todos los demas quebrados, que estan en la figura precedente. Pues auiendo hallado el denominador comun de todos los quebrados, prosigue con la regla, segū que he mostrado en los exemplos precedentes : y no importa mas q̄ se haga desta manera, que de la otra, pues ambas reglas guardan su proporcion, como se puede prouar por la regla que se sigue de sumar quebrados.

¶ Nota : Quiero buscar denominador comun a estos quebrados $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{8}$ vn numero,

23456789

que

que quepa en los tres menores quebrados, que son $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, y sera doze, hecho esto para que tenga quinto, multiplica por cinco, y seran sesenta, en el qual sesenta tambié aura sexta y dezima parte, y assi no te faltara, sino que tenga $\frac{111}{70}$ para que tenga nouena parte. Tres dobla sesenta, y seran ciento y ochenta, porque si sesenta tenia tercio, tresdoblado sera ciento y ochenta, y tendra nouena parte. Y porque ciento y ochenta tiene $\frac{1}{4}$ dobla 180. y seran 360. y tendra $\frac{1}{2}$ falta que tenga, $\frac{1}{7}$ y porque el septimo no tiene parte aliquota, sino la vnidad, multiplica por 7. los 360. seran 2520. Y este es el comun denominador para estos quebrados: y a imitacion desto haras para otros muchos.

Prueba de las reducciones.

¶ Para prouar vna reduction, si está falsa, o verdaderamente hecha: tendras la orden que en el exemplo siguiente se vera. Pongo que quieres reducir dos tercios de ducado, o de otra cosa, con tres quintos de la misma moneda; o cosa, que puestos en figura, y obrando segun se declaró en el exemplo segundo de la primera diferencia de reducir quebrados, y hallaras ser los dos tercios diez quinzabos, y los 3. quintos, nueue quinzabos, como parece figurado.

$\frac{10}{3}$ $\frac{9}{3}$
 $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{3}$
 $\frac{3}{3}$ — $\frac{3}{3}$

15

¶ Para saber si es verdad ser tanto 2. tercios, como diez quinzabos, y nueue quinzabos, como 3. quintos: abreuiaras los 10. quinzabos, segun muestra la regla del c. vj. que trata de abreuiar la denominacion a los quebrados. Y hallaras, si la tal reductiõn se ha hecho bien, que se bolueran a $\frac{1}{3}$, y por la misma regla abreuiaras los 9. quinzabos, y seran 3. quintos, como eran primero, y si desta manera no quedare el entendimiento satisfecho, prueuolo de otro modo. Mira por la regla del cap. v. deste ij. lib. quanto valen dos tercios de ducado, y hallaras valer 250. marauedis. Pues si dos tercios de ducado son 250. marauedis, siguefe, q̄ pues diez quinzabos dezimos ser tanto como los dos tercios que han de valer otros 250. marauedis. Pues por la misma orden que prouares ser tanto 2. tercios como 10. quinzabos, prouaras ser tãto otros qualesquier quebrados que abreuiares.

Cap. XIII. Muestra sumar quebrados

¶ Ya que se ha declarado lo necesario para intellie

eligencia del quebrado, en el presente capitulo mostraremos la ordē que se ha de tener para saber sumar muchos quebrados. Para declaracion de lo qual digo, que el sumar puede venir en tantas diferencias, en quātas vino el reduzir y es cosa facil, si las reglas de reducciones hā sido entendidas, porque no ay q̄ hazer otra cosa, sino redazir los quebrados q̄ quisieres sumar, si son diferētes avn comū denominador, y despues de reducidos sumar los numeradores nuevos: y partirse han, si ser pudiere, por el denominador nuevo, y sino, estar se han afsi sobre vna raya, poniendo debaxo el comun denominador, como por los exemplos mas claramente entenderas.

¶ La primera diferencia es, sumar vn quebrado con otro. Como si quisieses sumar vn teteio con tres quintos. Y afsi otros qualesquier quebrados, reducir los has a vn comun denominador, como se mostrò en el capitulo xiiij. en la diferencia primera de reducir. Y sera el tercio 5. quinzabos, y los 3. quintos 9. quinzabos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 5 \times 3 \\
 1 \times 3 \\
 \hline
 3 \text{ --- } 5 \\
 15
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 14 \\
 \text{monta --- abos} \\
 15
 \end{array}$$

¶ Ya que estan los 2. quebrados reducidos a vn comun denominador, y tomaras los numerado-

res nue uos, que en este exemplo son 5. y 9. y seran 14. los quales se assentaran sobre el denominador nueuo, que es 15. desta manera $\frac{14}{15}$. Y assi responderas, que sumando vn tercio de la moneda que te pareciere, con 3. quintos de la misma moneda, montan $\frac{14}{15}$ de la tal moneda, que para ser entero, le falta vna quinzena parte.

¶ Otro exemplo, suma 2. tercios, con tres quartos. Reduze segun se ha dicho, y parece en la figura.

$$\begin{array}{r} 8 \quad 9 \\ 2 \times 3 \\ \hline 3 \quad 4 \\ 12 \end{array}$$

¶ Y seran los dos tercios 8. dozabos, y los tres quartos 9. dozabos. Suma los numeradores nueues, que son 8. y 9. y seran 17. Ponganse sobre el denominador nueuo, que es 12. desta manera $\frac{17}{12}$. Y assi auas acabado tu suma, y diras que sumado, tres con tres quartos, montaran 17. dozabos que hechos enteros como muestra el cap. ix. de este segundo libro es vn entero, y 5. dozabos, como parece en la figura.

$$\begin{array}{r} 17 \\ 8 \quad 9 \\ 2 \times 3 \\ 3 \times 4 \\ \hline 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ 17 \quad 15 \\ 12 \end{array}$$

Y assi

¶ Y assi se sumaran qualquiera par de quebrados, de qualquiera denominacion que sean.

¶ La segunda diferencia es, sumar entero solo con quebrado solo, como si dixessen. Suma 6. enteros, cō 2. tercios de vn entero. En esta, y las semejantes, no ay necesidad de gastar tiempo en reducir, sino responder, que monta 6. enteros, y 2. tercios.

Sumãdo 6. cō $\frac{2}{3}$ — mōta 6. y $\frac{2}{3}$ —

¶ La tercera diferencia es, sumar entero solo, con quebrado y entero, como si dixessen. Suma 4. enteros, con 3. enteros, y 5. sextos. En esta diferencia, mas breuemente se haze sin reducir sumando vn entero con otro: y la tal suma añadirle el quebrado, diziendo. Quatro y 3. hazen 7. juntos con los 5. sextos, son 7. enteros y cinco sextos, como parece.

¶ La quarta diferencia es, sumar entero y quebrado, con quebrado solo, como si dixessen. Suma 3. y $\frac{4}{6}$ medio, con vn tercio. Por mayor breuedad dexaras los 3. enteros y sumaras el medio con el tercio, como muestra la primera diferencia de sumar vn quebrado solo con otro, y montara $\frac{5}{6}$ con los quales juntaras los 3. enteros que apartaste, y seran por todo 3. entros, y 5 sextos, como parece figurado.

capitulo xiiij) y sera el medio $\frac{2}{4}$ abos, y los 2. tercios $\frac{2}{4}$ abos, y los 3. quartos $\frac{3}{4}$ abos, como parece figurado.

	46		
	12	16.	18.
Suma	1. con	2 y	3
	2	3	4
	—————		
	24		

¶ Suma los numeradores nuevos, como son 12. y 16. y 18. montaran 46. Puestos sobre el comun denominador, que es 24. desta manera $\frac{46}{24}$ diras, que monta 46. veynte y quatro abos. Que hechos enteros (como la regla del capitulo ix. muestra) es vno, y veynte y dos 24. abos. que abreuados (segun la regla del vj. cap. muestra, es 11, dozabos) Y assi auras dado su suma, y responderas, que sumando vn medio, y 2. tercios, y 3. quartos, monta vn entero, y 11. dozabos de otro entero. Nota, que quando sumares algunos quebrados yguales en denominacion, que no ay necesidad de reduction: solamente se sumaran los numeradores de los tales quebrados, y partisehan (si respondiere) por el denominador del vno de los quebrados. Exemplo, suma $\frac{3}{7}$ y con $\frac{2}{7}$ y con $\frac{2}{7}$, &c. Por quanto todos se nombran ser septimos, sumaras sus numeradores, como son 3. y 2. y montará 9. ponganse sobre la denominacion del vno de los quebrados, que sera sobre vn 7. desta manera $\frac{9}{7}$. Y assi responderas,

dera, que sumando tres septimos por vna parte, y por otra vn septimo, y por otra dos septimos, monta todo 6. septimos. Otro exemplo. Suma 4. nouenes $\frac{2}{3}$ nouenes, y por otra parte 5. y por otra ocho, &c. Pues porque todos se nombran nouenes, sumarás los numeradores, como son 4. y 2. y 5. y 8. y montará 19. los quales son nouenes partanse por el denominador del nouen, que sera por vn 9. y vendra al quociente 2. enteros, y vn nouen. Y tanto montará los dichos quebrados, como parece.

$$\begin{array}{r}
 19 \\
 4.2.5.8. \\
 \hline
 99.9.9. \\
 9.
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 01 \\
 9|19 \\
 \hline
 2\frac{1}{9}
 \end{array}$$

¶ La razon porque los 19. se parte por el 9. es por reducir los quebrados a enteros, segun se mostro en el ix. cap. deste segundo libro.

Prueba del sumar quebrados.

¶ La prueba que vno ha de usar para saber si la suma está bien hecha, sera esta que declararemos (aunque prolixa) por este exemplo de sumar dos quintos de ducado, con vn tercio del mesmo ducado. Pues sumando segun la diferencia primera de sumar vn quebrado solo, con otra, hallaras montar onze quinzabos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 6 \text{ --- } 5 \\
 2 \quad \times \quad 1 \\
 3 \quad \quad \times \quad 3 \\
 \hline
 15
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1 \quad 1 \\
 1 \quad 5
 \end{array}$$

¶ Para saber aora si esta bien sumada, mira quãto valen dos quintos de ducado por la regla del cap. V. que trata de saber el valor del quebrado y hallaras q̄ valen 150. marauedis, porque quinto de ducado es 75. luego los dos quintos seran dos vezes 75. que son 150. Mira asì mismo vn tercio de ducado quãto es? por la regla del mismo capit. V. y hallaras, que son 125. Pues suma aora 150. marauedis de los dos quintos, con los 125. del tercio, y montaran 275. Pues la prueua fera, que los onze quinzabos, que dezimos fera la suma de los dos quintos, y del tercio han de valer otros 275. marauedis. Y asì se prouaran otras qualesquiera sumas y reglas, aunque adelante se pondra prueua mas breue.

Cap. XV. Del restar quebrados.

¶ El restar puede venir en 5. diferencias, yes cosa facil, porque no tiene que hazer otra cosa sino despues que los quebrados esten reducidos a vn comun denominador, restar el menor numerador del mayor, como en la practica de los exemplos menor entenderas.

¶ La

¶ La primera diferencia es, restar vn quebrado solo de otro, como si dixessen. Resta 2. tercios de 3. quartos, redúzelos a vna comun denominaciõ (segun la regla del redúzir manda) y vendran a ser los 2. tercios 8. dozabos, y los 3. quartos 9. dozabos, como en la figura parece.

$$\begin{array}{r} 8 \text{ de } 9 \\ 2 \quad 3 \\ 3 \text{ — } 4 \\ 12 \end{array}$$

¶ Hecho esto, restaras el vn numerador nueuo de los 2. tercios del numerador de los 3. quartos diciendo. Quien de 9. dozabos saca 8. queda vn dozabo, assi auras acabado tu resta. Y diras, que quien de 3. quartos saca dos tercios, quedara vn dozabo, y assi diras, que la diferencia que ay de dos tercios, a tres quartos es vn dozabo, como parece en la figura precedente.

¶ La segunda diferencia es, restar quebrado solo, de entero solo, como si dixessemos. Resta cinco sextos, de 3. enteros. Pongase en figura, segun se ha mostrado, y redúze, como quien redúze quebrado solo, y vendran a ser los en los 18. sextos y los 5. sextos desta manera.

$$\begin{array}{r} 5 \times 18 \\ 5 \times 03 \\ 6 \end{array}$$

6

6

$$\begin{array}{r} 01 \\ 6113 \\ 26 \end{array}$$

¶ Pues resta aora diziendo. Quien de 18. sextos saca 5. sextos, quedan 13. sextos: que hechos enteros (como manda la regla del capitulo ix.) seran 2. enteros, y vn sexto. Y assi responderas, que restado 5. sextos de 3. enteros, quedaran 2. enteros y 1. sexto.

¶ La tercera diferencia es, restar entero solo de entero y quebrado, como si dixessen. Resta 5. enteros, de 7. y 2. tercios. En esta no ay necesidad de reduzir, sino sacar 1. entero de otto, sin hazer mencion del quebrado, diziendo. Quien de 7. y 2. tercios saca 5. quedaran 2. y 2. tercios: y assi responderas, que restado 5. enteros de 7. y 2. tercios, quedaran 2. y 2. tercios.

¶ La quarta diferencia es, restar quebrado solo de entero y quebrado, como si dixessen. Resta 4. quintos de 3. enteros y 5. sextos: por quanto en los 5. sextos, que vienen con los 3. enteros, ay harto para que dellos se puedan restar quatro quintos, por tanto no ay que tocar a los 3. enteros, sino restar los quatro quintos de los cinco sextos (como manda la primera diferencia de restar quebrado solo, de otro quebrado solo) y hallaras que resta vn treyntabo: que junto con los 3. enteros q̄ dexaste a parte, será 3. y vn trintabo. Y assi diras, que restado 4. quintos de 3. enteros y 5. sextos, quedaran tres enteros, y vn treyntabo, como parece en esta figura: y assi se haran las semejantes.

I

 $24 \text{---} 25$

de

 $4 \sqrt{5}$ Restando $\frac{4}{5}$ de $3 \frac{2}{5}$ quedan $3 \frac{1}{5}$. $5 \text{---} 6$

30

¶ Nota, que si el quebrado que huieres de restar, suerte mayor, que el quebrado que viene con los enteros: ay necesidad de tomar algun focolo de los enteros, como si dixessen. Resta tres quintos de tres enteros y medio. Si los 3. quintos fueran menor que medio, para que pudierã ser restados del mismo medio, no tuieras necesidad de tocar a los enteros: mas porque es mas tres quintos que vn medio, ay necesidad de sacar vno de los tres enteros, y quedaran 2. Y este vno que sacaste reduzirlo has a medios, juntando con ello el medio, y ferã tres medios. Resta agora tres quintos de los tres medios, como manda la regla del restar quebrado solo, de quebrado solo: y quedaran nueue decimos. Los quales juntaras con los dos enteros que dexaste a parte, y serau dos y nueue decimos. Y assi diras, que restando tres quintos de tres enteros y medio, quedan dos y nueue decimos, como parece en esta figura.

$$\begin{array}{r} 9 \\ 6 \text{ --- } 15 \end{array}$$

Restando $\frac{1}{2}$ de $3\frac{1}{2}$ $\times$ $3\frac{1}{2}$ quedan $2\frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 5 \text{ --- } 2 \\ 10 \end{array}$$

¶ La quinta diferencia es, restar enteros, y quebrado, de enteros, y quebrado: como quien restasse 3. y medio de 4. y 2. tercios. En esta, y las semejantes restaras vn entero de otro: diziendo quien de 4. saca 3. queda 1. Guarda este 1. y passa a restar el medio de los 2. tercios (como manda la regla del restar vn quebrado solo de otro) y hallaras que restara vn sexto. Y assi responderas que restando tres, y medio de 4. y 2. tercios. restara vno y vn sexto, como parece.

1

Restando $3\frac{1}{2}$ de $43\frac{2}{3}$ $\times$ $2\frac{1}{6}$ queda $1\frac{1}{6}$

$$\begin{array}{r} 2 \text{ --- } 4 \\ 6 \end{array}$$

¶ Mas es de notar, que si el quebrado de la suma mayor, de la qual se resta la menor, fuesse de menor valor que el quebrado que ha de ser restado. Digo, que en tal caso ay necesidad que el quebrado menor tome algun socorro de su entero, como quien dixesse. Resta 2. y 3. quartos de

4. y 2.

4. y 2. tercios: por quãto el 2. tercios es el quebrado de do sehan de sacar los tres quartos, yes menor, sacaras de los 4. enteros 1. y reducirlo has a tercios por la regla del cap. viij. deste segundo libro, y juntarlos has con los 2. tercios, para que de ello se pueda sacar, y restaras los 3. quartos porque de vna cosa menor, no se puede sacar otra mayor. Pues sacando vno de los 4. y hazienlo tercios, y juntando con ello los otros 2. seran 5. tercios. Resta aora 3. quartos destes 5. tercios, por la regla del restar q̄brado solo de q̄brado solo, y quedaran 11. dozabos. Ya q̄ has restado vn quebrado de otro, restaras los enteros, sacando de los tres que quedaron los 2. y quedara 1. y así auras dado fin a tu resta, y diras, q̄ restado 2. y 3. quartos, de 4. y dos tercios, resta 1. y 11. dozabos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 9 \text{ --- } 20 \\
 3 \text{ X } 5 \\
 \text{Restando } 2\frac{3}{4} \text{ de } 4\frac{2}{3} \text{ queda } 1\frac{11}{12} \\
 4 \text{ --- } 3 \\
 12
 \end{array}$$

¶ Nota, que si restares vn quadrado de otro que tenga vna misma denominacion, no aura necesidad de reducir, porque mas breuemente se hara restado el numerador menor del otro mayor como quien dixesse: Resta 7. treyntabos de 17. treyntabos: por quãto el vn quebrado, y el otro se

se dizē treintabos, saca los 7. que es numerador del vno de los 17. que es numerador del otro, y quedarán 10. los quales 10. son treintabos: y es la resta, y diferēcia que ay de 7. treintabos, a 17. treyntabos. Y assi se haran las semejantes.

¶ Nota, que todas las diferencias que se hã declarado de restar, se pueden hazer reduziēdo siēpre los enteros que vienen, en el especie de sus mismos quebrados, y despues de reduzidos ambos numeros, restar. Y desta manera no aura necesidad de cotejar, si el quebrado que tengo de restar es mayor que el otro, de do se ha de restar y lo mismo saldra por vna via que por otra, saluo que seria cosa prolixa, si viniēse alguna resta de muchos enteros, con los quebrados.

Prueba de restar quebrados.

¶ Para prouar vna resta, si esta verdadera, o falsa tendras la orden que en este exemplo se declara. Pon que quieres restar dos quintos de ducado de dos tercios de otro ducado, que segun muestra la regla de restar quebrado solo de quebrado solo hallaras que restan 4. quinzabos, como parece figurado.

$$\begin{array}{r} 4 \\ 6 - 10 \\ 2 \circ 2 \\ 5 \times 3 \\ 15 \end{array}$$

M

¶ Pues

¶ Pues para saber si es verdad, mira primeramente $\frac{2}{3}$ de ducado quantos marauedis son: y hallaras (por el V. cap. deste segundo lib.) que valen 250. marauedis. Mira mas, por esta misma regla quanto valen $\frac{2}{5}$ quintos de ducado, y hallaras valer 150. marauedis. Pues resta aora 150. marauedis, q̄ es el valor de los $\frac{2}{5}$ quintos, de los 250, que es valor de los $\frac{2}{3}$ tercios, y restaran 100. marauedis. Pues si la cuenta està bien hecha, los $\frac{4}{15}$ quinzabos de ducado, que dizes que restaron, han de ser otros 100. marauedis, y fino lo fuerē, la resta estara falsamente hecha, y sera necessario hazer la otra segunda vez, o hasta tanto que quadre lo vno con lo otro.

Cap. XVI. Muestra prauas breues, para sumar y restar quebrados.

¶ La praua del sumar se haze restando, y la del restar sumando, segun se dixo en el viij. cap. del libro primero, para declaracion de lo qual pondras por exemplo, que quieres sumar $\frac{2}{3}$ tercios con vn medio: que sumando segun la primera diferencia de sumar, monta $\frac{7}{6}$ sextos, que valen 1. y vn sexto, como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 7 \\
 4 \text{ --- } 3 \\
 2 \times 1 \\
 3 \text{ --- } 2 \\
 \hline
 6
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 6
 \end{array}$$

¶ La prueva es, que restando los dos tercios de los $\frac{2}{3}$ quedara medio, que es el otro quebrado q̄ sumaste con los $\frac{1}{3}$. Y al contrario restando de 1. $\frac{2}{3}$ que es la suma el medio, quedaran $\frac{2}{3}$. Y assi se prouaran todas otras qualesquiera sumas de pocos, o muchos quebrados.

Prueba del restar.

¶ La prueva del restar, es sumar: para lo qual digo, que si la suma de los dos quebrados menores fuere tanto como la de mayor, la tal resta estara bien hecha. Exemplo, restando $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ quedan 3. dozabos.

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 4 \text{ de } 9 \\
 3 \times 3 \quad 12 \\
 3 \text{ — } 4 \\
 12
 \end{array}$$

¶ Digo, que la suma de los 3. dozabos, y del tercio, ha de ser tãto como la de los 3. quartos, q̄ es el mayor quebrado destes 3. q̄ en esta resta ocurren, y si no fuere tanto la tal restara falsa.

Cap. XVII. Del multiplicar quebrados.

¶ El multiplicar quebrados acontece en 5. modos. ¶ El primero modo, o diferencia, es multiplicar vn quebrado solo, por otro quebrado so-

lo, como si dixessen. Multiplica 4. sextos, por 5. ochauos: asentaras los quebrados desta manera que parece.

$$\begin{array}{r} 20 \\ 4 \text{ ————— } 5 \\ 6 \text{ ————— } 8 \\ 48 \end{array}$$

Y multiplicaras los numeradores vno por otro y lo que viniere, ponerse ha sobre la raya: y luego los denominadores, vno por otro, y el producto ponerse ha debaxo, y partiras lo de arriba por lo de abaxo, si ser pudiere, y fino, quedar se ha assi como quebrado, y esto es lo que se ha de hazer en qualquiera diferencia de multiplicar. Pues multiplica los numeradores de los dos quebrados, diziendo. Quatro vezes 5. hazen 20. Pon estos 20. sobre vna raya, y multiplica de la misma suerte los denominadores, diziendo. Seis vezes 8 hazen 48. Ponlos debaxo de los 20. desta manera $\frac{20}{48}$. Y assi auras dado fin a la multiplicacion, y responderas que multiplicando 4. sextos por 5. ochauos, viene el producto, veynte quatro y ocho avos, que abreviados a menor denominacion, son 5. dozabos. Mas dudaras, que quiere dezir multiplicar 4. sextos, por 5. ochauos? Digo, que quiere dezir si vna cosa entera vale 4. sextos de vn entero: los 5. ochauos de la tal cosa, valdra cinco dozabos. De suerte, que si vna vara de paño, vale 4. sextos de ducado: digo que los 5. ochauos desta vara, valdrá 5. dozabos de

de ducado, y al contrario, si la vara vale 5. ochauos de ducado, los 4. sextos de vara valdran 5. ochauos de ducado. Y este es el proposito principal del multiplicar quebrados.

¶ Otro exemplo. Multiplica medio por medio, assientale como hemos mostrado, y aqui parece.

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$$

¶ Y multiplica los numeradores, vno por otro: y despues los denominadores (como hizite en el exemplo precedente) y montara.

$$\frac{1 \times 1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$$

¶ Y assi responderas, que multiplicandovn medio por otro, monta vn quarto de vn entero.

¶ Puede alguno dudar que. Como puede ser, que multiplicando medio por medio, venga vn quarto, q̄ es menor que ninguno de los multiplicadores? Para entendimiento de lo qual has de saber, q̄ multiplicar vn numero por otro, es tomar tãtas vezes el vno, como vnidades ay en el otro. O multiplicar vn numero por otro, es buscar vn otro tercero numero, q̄ se aya con el vno de los dos numeros multiplicados, como el otro con la vnidad (como declare otr a vez en

el ix. cap. del primero libro. Y segun esto, si yo digo que quiero multiplicar vn tercio por vn quarto, sera tomar vna quarta parte de vn tercio de vna vnidad, o el vn tercio de vna quarta parte de vna vnidad. Y porque ninguno de estos quebrados allega a su basis, q̄ es la vnidad, de aqui viene, que en el multiplicar de quebrados solos, de necesidad ha de salir menos que ninguno de los numeros multiplicados. Boluédolo al proposito multiplicar medio por medio sera tomar tãtas vezes el vn medio, como vnidades ay en el otro: y porque en qualquiera dellos ay media vnidad: por tanto tomaras a otro media vez, que sera tãto como tomar la mitad de medio, que es vn quarto. Entendido esto, el intento principal que el estudiante ha de tener quando le dizen que multiplique medio, por medio, o otros quebrados, es presuponer que quieres saber que valdra medio, valiendo vn entero otro medio, como quiẽ dixesse. Que vale media vara de paño, a razõ, que la vara entera valiesse medio real. Pues si vna vara vale medio real, la mitad de la vara, valdra la mitad es medio real, q̄ es vn quarto de real, Pues si esto es asì, quando el producto de la multiplicacion de vn medio por otro fue vn quarto, no por esso vino otra cosa de lo que es y buscamos.

¶ Quanto a la segun parte de la difinicion del multiplicar, digo, que quando yo multiplico vn medio

medio por vn tercio, o por otros qualesquier quebrados, y viene a la multiplicacion vn sexto, no es otra cosa, sino saber que este sexto, que vino al producto se ha con el medio, como el vntercio con la vnidad. Y assi es verdad, porq̄ la proporcion, que ay de vn sexto a medio, que es subtripla la misma ay de vn tercio a la vnidad.

¶ La segunda diferencia es, multiplicar entero solo, por quebrado solo, como si dixessen. Veinte varas de paño, a tres quartos de real cada vara quanto monta? Lo qual se deue hazer assentandolas veynte varas, y debaxo dellas la vnidad, porque es denominador de los enteros, y antes, o adelante los 3. quartos. Desta suerte, que parece figurado.

$$20 \text{ --- } 3$$

$$1 \text{ --- } 4$$

¶ Y despues multiplicaras los 20. por los tres que son numeradores, diziendo. Veynte vezes tres, hazen 60 los quales pondras sobre vna raya, y multiplicaras mas los denominadores vno por otro, como son 1. y 4. diziendo. Vna vez quatro son 4. Ponganse debaxo de los 60. desta manera ⁶⁰. Y assi responderas, que veinte varas de paño, cada vara a tres quartos de real, o de lo que quisieres, montan todas sesenta quartos de real, que hechos enteros por la regla del capitulo ix. son quinze reales, y assi se haran todas las semejantes.

M 4

¶ La

Opor- ¶ La tercera diferencia es, multiplicar entero
tet ad solo, con entero, y quebrado, como si dixessen;
discen- Diez varas de paño, o de otra cosa, a razon ca-
tem nõ da vara de tres ducados y dos quintos de ducado
incre- quanto montan? Por quãto en el multiplica-
dulã es dor viene entero, y quebrado reduziras los tres
se Arif. enteros en quintos, juntando con ellos los mis-
libr. 1. mos dos quintos (como se mostrò en el libro se-
Poste- gundo cap. viij. de reducir enteros a quebrados)
riorũ. y seran 17. quintos. Assentaras las 10. varas, po-
 niendo la vniidad debaxo, y los 17. quintos ade-
 lante, como parece.

01 ——— 17

1 ——— 5

Y multiplicaras los numeradores, vno por otro, diziendo. Diez vezes diez y siete, son 170. as: è ra 170. sobre vna raya, y luego multiplica los denominadores, diziendo. Vna vez 5. y son 5. pò 5. debaxo de los 170. delta manera 17° . Y assi au ras dado fin a la multiplicacion, y responderas, que multiplicando diez varas de paño, a razon cada vara de tres ducados, y dos quintos de ducado, montan ciento y setenta quintos, que hechos enteros (como muestra el capitulo IX.) hallaras ser 34 y tantos ducados, monta la multiplicacion. Puede alguno dezir, en que se conoce ser estos 34 ducados, mas que otra moneda? A lo qual se responde: q̄ de la especie de moneda, que es el multiplicador, de la misma es el

pro-

producto. Pues porque en este exemplo dixiste 10. varas, cada vara a tres ducados, y 2. quintos de ducado, por tanto los 170. quintos se nombraran ser de ducado.

¶ La quarta diferencia es multiplicar entero, y quebrado con quebrado solo, como quien dixesse. Multiplica 2. varas, y $\frac{1}{2}$ por dos tercios de ducado cada vara. Reduze las varas en la especie del quebrado que trae, que sera a medios, y montara 5. medios. Pongase en la figura adelante, o antes los dos tercios de ducado, que es el precio, como parece.

$$5 \text{ ——— } 2$$

$$2 \text{ ——— } 3$$

¶ Y despues multiplica, segun en los exemplos precedentes se ha dicho, y las rayas demuestrã, y montara $1\frac{2}{3}$ que hechos enteros, es vn entero, y quatro sextos, que en menor denominacion son dos tercios. Y assi responderas, que multiplicando dos varas y media, cada vara a dos tercios de ducado, valen vn ducado, y dos tercios de ducado, como parece.

10

$$5 \text{ ——— } 2$$

$$2 \text{ ——— } 3$$

6

$$0 \ 4$$

$$6 \ 1 \ 1 \ 0$$

1

$\frac{2}{3}$ abreuiados $1\frac{2}{3}$

¶ La quinta y vltima diferencia es, multiplicar entero y quebrado cõ entero y quebrado, como quiẽ dixesse. Multiplica 2. varas y $\frac{1}{2}$ a 2. reales y

M 5

de real

$\frac{3}{4}$ de real cada vara: lo qual se deve hazer, y todas las semejantes, reduziendo los enteros en el especie de sus quebrados, que sera hazer las 3. varas quartos, y montaran 13. quartos. Afsi mismo reduce los 2. reales en sus quintos, y sera 13. quintos. Ponganse vna como parece.

$$13 \text{ — } 13$$

$$4 \text{ — } 5$$

Y multiplica los numeradores, diciendo. Treze vezes 13. son 169. ponganse sobre vna raya, y luego los denominadores, diciendo. Quatro vezes 5. son 20. ponganse debaxo de los 169. desta manera $\frac{169}{20}$, que reducidos a enteros (como se muestra en el ix. c. deste libr. 2.) sera 8. y $\frac{9}{20}$ abos. Y afsi diras, q multiplicando 3. varas y vna quarta, a razon de 2. reales, y 3. quintos la vara, monta 8. reales y 9. veyntabos de real. El que quisiere saber declarar, o prouar por circunloquios euidentes, si vna multiplicacion esta verdaderamente hecha, tenga la orden que declare en el exemplo que se puso en la quarta diferencia de multiplicar 2. varas y media, a razon cada vara de 2. tercios de ducado, que diximos que monto vn ducado, y 2. tercios de ducado. Pues por quanto cada vara diximos que se vendio a 2. tercios de ducado, mira quantos marauedis son 2. tercios de ducado, y hallaras que son 250. marauedis (segan la regla del capit. 5. del 2. lib.) Pues 2. varas cada vna a 250. marauedis montan 500. marauedis,

dis, la mitad dela vara valdra la mita de 250. marauedis, que es el precio de la vara entera, q̄son 225. marauedis. Pues suma 125. marauedis, que es el precio de la media vara con los 500. que es el precio delas dos varas, y montaran 625. Luego el ducado, y dos tercios de ducado, que diximos por via de quebrados, que montaron, han de ser otros 625. marauedis: para que la tal multiplicacion esté bien hecha. Pues vn ducado es 375. y los dos tercios de ducado son 250. marauedis: pues sumando 375. cō 250. son 625. como lo otro. Por do parece ser biē hecha la multiplicacion, pues por vna y otra via sale lo mesmo. Y así se pueden prouar qualesquiera multiplicaciones de todas las diferencias ya dichas.

Capitulo XVIII. De partir quebrados.

¶ El partir acontece en cinco modos: mas antes que del tratemos, es de saber, como ay dos especies de partir, integral, y nominal. Partir integral se dizen, quando la parricion es mayor que el partidor, de la qual parricion siempre sale entero. Partir nominales, quando la parricion es menor que el partidor, de la qual parricion nunca sale entero, antes sale otro quebrado, nombrado por otro numerador, y denominador nuevo, de do toma principal denominacion de llamarse nominal,
por-

porque el quociente se llama por otro nombre, y no por si mismo. Para declaracion de lo qual pondre vn exemplo de cada especie, no olvidando de dezir, que la definicion de partir enteros compete a los quebrados.

¶ La primera diferencia es, partir vn quebrado solo, por otro solo, como quien dixesse. Parte 2. quintos a vn sexto, lo qual haras assentando la particion, q̄ son los 2. quintos, a la mano izquierda, y el partidor que es vn sexto, a la derecha, de la manera que parece.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 5 \end{array} X 6$$

¶ Y hecho esto reduziras (segun se mostrè en c. xiiij. deste segundo libro) multiplicato en cruz como las rayas muestran, no curando de multiplicar los denominadores. Y lo que estuviere sobre la particion se partira por lo que estuviere sobre el partidor, como parece.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 2 \end{array} X 5$$

02

5 | 12

2

5 6

¶ Pues parte 12. que ay sobre los 2. quintos (q̄ es la particion) por los 5. q̄ estan sobre el vn sexto (que el partidor) y vendran 2. y 2. quintos: y assi diras, q̄ partidos dos quintos a vn sexto, cabe a 2. y 2. quintos. Y esta particiõ se dize integral, porq̄ lo q̄ viene son enteros. De suerte, que

en el partir de quebrados, el quociente se acrecienta, y en enteros disminuye. Exemplo de la nominal. Pongo que partes vn sexto a 2. quintos, multiplica (segun se hizo en la precedente) y aqui parece figurado.

$$\begin{array}{r} 5 \quad 12 \\ 3 \quad 2 \\ \times \quad 2 \\ 6 \quad 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ 5 \end{array}$$

¶ Y vendra por particion 5. y por partidor 12. Pues parte 5. a 12. y porq̄ no se puede partir enteramente, sin que la vnidad se quiebre, pódras los 5. sobre los 12. desta manera $\frac{5}{12}$. Y assi diras que partiendo vn sexto, a dos quintos, cabe a 5. dozabos: lo qual se dize partir nominal, aunque no va mas que sea nominal, que integral, que en la vna y en la otra ay la misma razon y orden: como prouare en los mismos exemplos dados. Para lo qual digo, que si alguno preguntasse, que. Como se entienda que partiédo 2. quintos a vn sexto, venga la particion 2. enteros, y 2. quintos, q̄ es muy mayor cantidad lo que viene a la particion, que lo que se partio. A lo qual se responde, que lo que viene en las particiones integrales, seran enteros, teniendo respecto a enteros. Quiero dezir, que quando partimos los 2. quintos a vn sexto, y salio al quociente 2. y 2. quintos: no fue otra cosa, sino buscar vn numero q̄ se aya con la vnidad, assi como la particion con el partid

ridor. Exemplo: Partiendo 12. a 4. compañeros, cabe a 3. digo, que estos 3. estan con la vuidad en tal proporcion, como la particion, que es 12. cō el partidor (que es 4.) y al cōtrario. Pues lo mismo passa en quebrados, porque la proporcion q̄ tienē los 2. quintos, que es la particion, al $\frac{1}{6}$ q̄ es el partidor, essa tienē los 2. y 2. quintos, que es el quociēte, a la vuidad. Y assi diras q̄ partir 2. quintos a vn sexto: y venir 2. y 2. quintos, quiere dezir. Que si vn sexto de vna cosa vale, o costasse 2. quintos de ducado, o de otra cosa, la cosa entera valdra 2. ducados, y 2. quintos de ducado. Y esto es el intēto principal de partir quebrados. Y de esta manera, quādo partilte vn sexto a los 2. quintos, y salio a la particiō 5. dozabos, quiere dezir, q̄ si 2. quintos de vna vara vale, o cuesta vn sexto de vna qualquier moneda: digo, q̄ la vara entera al mismo respeto valdra 5. dozabos, de la tal moneda, o cosa, y esto es lo q̄ se ha de tener, y vsar a cerca del partir quebrados. Y los q̄ dizen, q̄ lo q̄ viene al quociēte en estos quebrados, no son enteros, sepā q̄ van cōtra todos aquellos, q̄ algo saben, como se prueua en la definiciō del partir.

¶ Otro exemplo, parte medio a vn tercio. Assiēta la particion, y el partidor, y parte como manda la regla, y vendra a la particiō vno y medio, como parece.

$$\begin{array}{r}
 3 \quad 2 \\
 1 \quad 1 \\
 \times \\
 2 \quad 3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1 \\
 2 \overline{) 3} \\
 1 \quad \frac{1}{2}
 \end{array}
 \qquad
 \text{Lo}$$

Lo qual quiere dezir, q̄ si vn tercio de vna cosa entera costasse, o valiesse medio ducado: toda la tal cosa al mismo respeto valdra vno y medio como si dixesemos. Vna tercia de terciopelo cuesta medio ducado. Digo, q̄ la vara entera valdra ducado y medio. Y es cosa euidente, q̄ si el 3. de vna cosa vale medio ducado, q̄ la cosa entera, pues es 3. tercios, q̄ valga 3. medios, q̄ es $\frac{3}{2}$ como hemos dicho. ¶ Notavn modo de partir, quando el numerador del partidor cõtiene en si justamēte al numerador dela particiõ multiplica el denominador dela particiõ por las vezes q̄ es cõtenido el nu. dela particiõ del partidor, y el producto sera denominador del cociente, y el denominador del partidor sera numerador del cociente. Exēplo, parte $\frac{2}{3}$ por $\frac{6}{7}$ porq̄ los 3. de los $\frac{6}{7}$ entra en el 6. 3. vezes por tãto multiplicaras el 9. por el 3. y serã 27. estos 27. serã denominaciõ de lo q̄ cabe, y el nu. sera el 7. q̄ era denominador del p. Y assi se respõdera q̄ partiẽdo $\frac{2}{3}$ por $\frac{6}{7}$ cabe $\frac{2}{7}$ abos. Y assi imitãdo este, ordenaras muchos cõpēdios de partir. ¶ La 2. diferēcia es, partir entero solo, a q̄brado solo, como si dixesē. Parte 3. enteros a medio. Assi èta los 3. enteros, q̄ es la particiõ ala mano yzquierda, poniẽdo debaxo el vno q̄ es el dominador de los enteros, y a delãte el partidor, q̄ es medio, como parece.

$$\begin{array}{r}
 3 \quad 1 \\
 \times \quad 0 \\
 \hline
 1 \quad 6 \\
 3 \quad 0 \\
 \hline
 6 \quad 0 \quad 0 \\
 \hline
 6 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

¶ Y multiplicando en cruz, como manda la primera diferencia de partir quebrados, vèdra a la particion 6. y al partidor vno. Pues parte 6. a 1. y cabra a seys. Y assi auras dado fin a la particion: y diras, que partiendo tres enteros a vn medio, vienen a la particion 6. Que quiere decir: que si media vara de paño vale tres ducados la vara entera valdra 6. al mismo respecto, o que si a medio hombre le dau tres cosas, a vno le daran 6. Y esta particion es del especie del partir, que dizen integral: mas si partes el medio a los tres se dira nominal. La qual se harà, assentando a la mano yzquierda el medio, porq̃ es particion, y adelante los tres como parece.

¶ Y partiendo segun se ha declarado en los exemplos passados, vèdra vn sexto. Y assi respòderas, si 3. varas de paño valen medio ducado, la vara sale a vn sexto de ducado. No tratare mas deste especie nominal, porque en las demas diferencias haras como en estas dos se ha declarado.

¶ La tercera diferencia es, partir entero y quebrado, a quebrado solo: como si dixessen. Parte tres y vn quarto, a 2. tercios, reduce primero los 3. enteros en quattros, y seran 13. quattros, los qua
les

les pondras a la mano yzquierda: y adelante los dos tercios (que es el partidor) como parece figurado:

$$\begin{array}{r} 39 \quad 8 \\ 13 \quad 2 \\ \times \quad \quad \\ \hline 4 \quad 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \quad 7 \\ 8 \quad 13 \quad 9 \\ \hline 4 \frac{7}{2} \end{array}$$

¶ Y multiplicaras, como la regla manda, y vendra por particion 39. y por partidor 8. Pues parte 39. a 8. y vendra al quociente 4. y 7. ochabos, y asi diras. Que partiendo 3. enteros, y vn quarto a 2. tercios, cabe a 4. y 7. ochavos. De suerte, que si 2. tercios de vna vara valen 3. ducados, y vn quarto, digo, que la vara entera valdra 4. ducados, y 7. ochavos de ducado.

¶ La quarta diferēcia es, partir entero solo, por entero y quebrado: como quien dixesse. Parte 10. reales, o lo que quisieres a 2. y medio. Assentaras los 10. que es la particion a la mano yzquierda poniēdo debaxo la vnidad, porque son enteros, y reduziras los 2. y medio (q̄ es el partidor) a medios, y seran 5. medios. Assientense a la mano derecha, y multiplica en cruz, segun se ha mostrado, y parece figurado.

$$\begin{array}{r} 20 \quad 5 \\ 10 \quad 5 \\ \times \quad \quad \\ \hline 1 \quad 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 5 \quad 1 \quad 2 \quad 0 \\ \hline 4 \end{array}$$

N

¶ Y ven-

¶ Y vendra sobre la particion 20. y sobre el partidior 5. parte aora 20. a 5. y vendran 4. Y assi diras, que partiendo 10. a 2 hombres y medio, cabe 4. a cada vno de los 2. y al medio le viene 2 que es la mitad de lo que cupo a cada vno de los dos. De fuerte, q̄ si dos varas y media costassen 10. reales, saldra la vara a 4. reales. Si alguno dudare, porque razon se multiplica lo que queremos partir, por el denominador del partidior. Digo q̄ se haze por causa de reducir la particion en el especie del quebrado, que fuere el partidior, como se prouara por el mismo exemplo precedete, en que partiendo 10. enteros a 5. medios multiplicas los diez por el dos, que es de nominador de los 5. medios, y montò 20. y assi se auran hecho medios, y seran del especie del partidior, y assi los 20. son medios, y los 5. tambien. De fuerte, que si la particion se multiplica por 3. sera por reducir la tal particion a tercios y si fuere por 4. sera por reducir la a quartos. Y por semejante de otro qualquiera quadrado: y despues que la particion y partidior son de vna especie, partiras segun se ha visto en todos los exemplos: y lo que cupiere seran enteros. Acerca de lo qual se puede dudar, diziendo: que en la particion precedente de partir medios a 5. medios, cupo a 4. si son medios, porque segun enteros es precepto, que si partimos marauedis, lo qual al quociente viene son marauedis, y por el

el configuiente de otra qualquiera moneda. Pues por la misma razon partiendo 20. medios por 5. medios : lo que viniere al quociente parece q̄ han de ser medios. A lo qual se responde, que partiendo vn quebrado por otro iguales en denominacion, como medios por medios, tercios por tercios, &c. lo que viniere al quociente, seran enteros, y se tratan como enteros, como se mostrò al principio deste segundo libro, en el presupuesto segundo. Exemplo, 20. medios, partidos a 4. medios, vienen 5. Estos 5. digo, que son enteros, porque veynte medios, hechos enteros son 20. y por el configuiente los 4. medios hechos enteros, que es el partidor, son 2. partièdo agora diez, a dos vendran 5. como primero.

¶ La quinta diferencia es, partir entero, y quebrados, a entero y quebrado, como quien dixese. Parte 4. por 3. y vn quinto. Reduze primero los 4. enteros de la particion. en el especie de su quebrado, que sera hazerlos todos medios, y montaran 9. medios. Reduze assi mismo el partidor en el especie de su quebrado, que sera, hazer los quintos, y montaran 16. quintos, los quales assentaras a la mano derecha de la particion como parece.

¶ Y Multiplicando, segun se ha dicho, las líneas demuestran, vendra sobre la particion 45. y sobre el partidor 32. Pues parte 45. a 3. y vendra al quociente 1 y $\frac{15}{32}$ abos. Y así respóderas, q̄ si 3 varas y vna quinta valen 4. reales y medio la vara valdra vn real, $\frac{15}{32}$ abos de real, o que partiēdo 4. reales y medio a tres hombres, y vn quinto de hombre a cada vno de los 3. enteros cabe vn real, y mas treze, treynta y dos abos de real Y al hombre que ha de auer el quinto le viene $\frac{9}{32}$ abos, que es la quinta parte de lo que cupo a cada vno de los 3. enteros, como mejor entenderas por los exemplos siguientes. Para lo qual digo, que todas las vezes que partieres algo por algunos enteros, y quebrados, has de presuponer; que los enteros son compañeros: y que el quebrado (por el semejante) es compañero, mas no quieres que le quepa tanto como a ninguno de los enteros, y así quādo en la quarta diferencia partite 10. a 2. y medio, entenderas, que aquellos 10. se han de partir 3. hombres con tal condicion, que el vno dellos no ha de lleuar sino la mitad de lo que cupiere a vno de los dos, y q̄ los dos cada vno lleue y gual parte. Pues partiendo 10. a 2. y medio, vendra a la particion 4. Los quales quatro es la parte que ha de auer cada vno de los enteros, y la mitad de 4. es lo que ha de auer el medio. Y así diras, que partiendo 10. a 2, y medio, a cada vno de los 2, ente

ros le caben 4. y al medio le caben 2. Otro exē-
plo 50. ducados, o lo que te pareciere, re parti-
dos a 5. hombres, y dos tercios, quāto cabe a ca-
da vno de los 5. Y quanto cabe a los dos ter-
cios? En la qual entenderas, ser los compañeros
6. saluo, que los 5. han de llevar partes iguales, y
el otro los dos tercios de lo que cupiere a vno
de los cinco. Pues entendido esto, assentaras los
50. que quieres partis a la mano y zquierda, po-
niendo debaxo vno, por causa que son enteros,
y los 5. compañeros reduzirlos has en el espe-
cie de su quebrado, que son tercios y seran 17.
tercios, los quales se pondran adelante de los
50. como parece figurado.

$$105 \quad 17$$

$$50 \times 17$$

$$1 \times 3$$

¶ Y multiplicaras los 50. por el 3. que es el de-
nominador, del partidor, y seran 150. Lo qual se
haze para reduzir los 50. enteros a tercios, por-
que la particion, y partidor sean de vna especie.
Parte aora los 150. que es la particion a los 17.
tercios que es partidor, y vendra a la particion
8. y $\frac{17}{17}$ abos. Y esto es lo que cabe a cada vno de
los 5. Para saber quanto viene al hombre que ha
de auer los dos tercios, sacaras los 2. tercios, de
150. que es la particion, q̄ seran 100. lo qual par-
tiras por 17. y vendra al quociente 5. y 15. diez
y siete abos, y tanto le viene al hombre que ha

de auer los dos tercios. Y assi responderas, que partiendo 50. ducados a 5. hombres, y dos tercios a cada vno de los 5. enteros, cabe a 8. ducados y 14. diez y siete abos deducado, y al que a de auer los dos tercios, le cabe a 5. ducados, y 15 diez y siete abos de ducado.

Cap. XIX. Muestra prueuas para multiplicar, y partir de quebrados.

¶ La prueua del multiplicar, se haze partiendo el producto por el multiplicador, y vendra a la particion la multiplicacion, y al contrario partiendo el producto por la multiplicacion, vendra el multiplicador. Exēplo. Multiplicando 3. quattos, por 4. quintos, mōta $\frac{12}{20}$ abos, q̄ en menor denominacion son 3. quintos. Pues digo, q̄ la prueua es partir estos 3. quintos, que es el producto, por los 3. quattos, que es la multiplicaciō y vendra al quociente 4. quintos, q̄ es el multiplicador. Y al contrario, si se partē los 3. quintos por los 4. quintos, que es el multiplicador, vēdra a la particion 3. quattos (q̄ es la multiplicaciō) Y assi se prouaran otras qualesquiera multiplicaciones de menor, o mayor cantidad.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 3 \text{ — } 4 \\ 4 \text{ — } 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \quad 12 \quad \text{vale} \quad 3 \\ \quad 20 \quad \quad \quad \quad 1 \end{array}$$

Prue-

Prueua del partir.

¶ La prueua del partir se haze multiplicado lo que cabe por el partidor, y vendra la particion. Exemplo, partiendo medio a vn tercio vendra vno y medio. Digo que multiplicando $1\frac{1}{2}$ que fue lo que cupo por el $\frac{2}{3}$ (que es el partidor) vendra a la multiplicacion medio, que es lo que se partio. Y assi acabo, quanto a quebrados simples.

Capitulo XX. Trata de los quebrados de quebrados.

¶ El quebrado de quebrado, es vna cosa que tiene vna parte, o partes del quebrado simple, y escriuiese con dos, o tres, o mas numeradores, y denominadores, como si dixessen $\frac{2}{3}$ de $\frac{2}{3}$ que quiere dezir los tres cuartos, de dos tercios de vna cosa entera. Otro exemplo $\frac{2}{5}$ de $\frac{3}{5}$ de $\frac{3}{5}$ quiere dezir dos quintos de cinco sextos de vn quarto de vna cosa. Y assi se asentaran, y escriuiran los demas quebrados de quebrados.

Capitulo XXI. Muestra saber el valor del quebrado de quebrado.

¶ Para saber el valor de qualquiera quebrado de quebrado, redziras el tal quebrado de quebrado, a quebrado simple: y despues de redu-

zido, el ca. v. deste segūdo libro te dira su valor.
Exemplo, el $\frac{1}{3}$ de $\frac{2}{3}$ de vna tarja de a 9. que vale?
Ponganse en figura como parece.

$$\frac{1}{3} \text{ de } \frac{2}{3}$$

¶ Y multiplica los numeradores vnos por otros aunque sean muchos, y despues los denominadores, diziendo. Vna vez 2. son 2. ponganse sobre la raya. Luego los denominadores, diziendo. Tres vezes 3. son 9. ponganse debaxo, desta manera.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 1 \text{ ————— } 2 \\ \text{de} \\ 3 \text{ ————— } 2 \\ 9 \end{array}$$

¶ Y assi auras reduzido el quebrado de quebrado, a quebrado simple. Y diras, que el tercio de dos tercios de 9. marauedis es tanto como dos nouenos de nueue marauedis, que por el v. cap. deste segundo libro, hallaras que valen 2. marauedis. Otro exemplo, la mitad de 2. quintos de 2. tercios de ducado, quanto monta? Lo qual no quiere dezir otra cosa, sino saber primero los 2. tercios de vn ducado, quanto es, y del valor de los 2. tercios, tomar 2. quintos, y destos 2. quintos la mitad, mas por mayor breuedad, digo, q̄ multiplicaras los numeradores destos quebrados, y despues los denominadores, y quedara hecho quebrado simple, y despues de reduzido a quebrado simple, facilmente alcançaras el valor

lor, por la regla del v. cap. deste libro. Pues multiplica diziédo. Vna vez 2. son 2. y 2. vezes 2. son 4. assentaras 4. sobre vna raya. Luego multiplica los denominadores vnos por otros diziendo Dos vezes 5. hazen 10. y diez vezes tres son 30. ponganse debaxo de los 4. desta manera $\frac{4}{30}$ que en menor denominacion valen 2. quinzabos. Y assi diras, que tanto es la mitad de 2. quintos, de dos tercios de ducado, como 4. treyntabos, o como dos quinzabos del mismo ducado. Que por la regla del quinto cap. hallaras ser 50. marauedis. Y es cosa clara, porque los dos tercios de ducado son 250. marauedis, y los dos quintos destos 250. marauedis son 100. y la mitad de 100. es 50. como cada vno lo puede prouar.

$$\begin{array}{r}
 4 \\
 1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 2 \\
 \text{--- de --- de} \\
 2 \text{ --- } 5 \text{ --- } 3 \\
 30
 \end{array}$$

Cap XXII. Del orden que se ha de tener para obrar con estos quebrados de quebrados, en las reglas generales de Arismetica.

SI estos se juntaren con algun quebrado simple, o con algun entero, ya sea para reduzir, o sumar, o para otra qualquiera regla de las generales, siépre los reduziras primero a quebrados simples, y despues obra segun hemos mostrado

N 5

como

como si dixessen. Reduze 3. quartos de ducado con la mitad de 3. quintos de ducado. Primero reduziras la mitad de 3. quintos a quebrado simple por la regla dada, y seran 3. dezimos, pues ya que lo has traydo a quebrado simple, reduziras 3. quartos en los tres dezimos, como la regla de reduzir quebrado solo, con quebrado solo muestra, y assi se hara con otro qualquiera quebrado, de quebrado.

¶ Exemplo de su sumar. Suma el $\frac{1}{4}$ de $\frac{2}{5}$ de la $\frac{1}{2}$ de vn ducado con el $\frac{1}{4}$ de los $\frac{2}{5}$ de los $\frac{3}{8}$ de vn ducado. Reduze la vna parte y otra a quebrado simple, segun se ha mostrado. Y sera la primera parte 2. treyntados, q̄ en menor denominaciō, es vn quinzabo, y la segunda sera $\frac{6}{12}$ abos, que en menor dominacion, es $\frac{2}{3}$ abos. Y pues se han reduzido a quebrados simples, suma como manda la regla de sumar quebrado solo, con quebrado solo, y montara vn dezimo.

¶ Exemplo de restar. Resta el $\frac{1}{4}$ de vn $\frac{2}{5}$ de ducado, de los $\frac{2}{5}$ de $\frac{7}{8}$ abos de otro ducado. Haz segun se ha dicho, y vedra a ser la paga vn dozabo y el recibo siete decimos. Pues resta vn dozabo de 7 decimos, segun se ha mostrado en la regla de restar q̄brado solo, de quebrado solo y restarā $\frac{3}{60}$ abos. Y assi se hara en las de mas reglas, como hasta aqui: porq̄ despues de reduzido el q̄brado de quebrado, en q̄brado simple, vsaras del, segun en los capitulos del quebrado simple has visto.

Cap. XXIII. En el qual se ponen algunas demandas para exercitar las reglas generales de Arismetica.

¶ De do se restaron tres quintos, que quedaron 4. septimos? Suma tres quintos, con 4. septimos por la regla de sumar quebrado solo, con quebrado solo, y montara vno, y seys treynta y cinco abos. Y de tanto diras que fueron restados los tres quintos, para que quedassen en quatro septimos.

¶ Con que sumaras dos tercios, que hagan vno y medio? Resta dos tercios de vno, y 2^o por la regla de restar quebrado solo, de entero, y quebrado: y restaran cinco sextos. Pues con esto se sumaran los dos tercios, para que la suma sea vno y medio.

¶ Que se partio por dos septimos, que vino a la particion tres, y vn quatro? Multiplica 2. septimos por 3. y vn quarto, por la regla de multiplicar quebrado solo, por entero y quebrado, y montara $1\frac{3}{4}$ abos. Y tanto diras que fue lo que se partio a los dos septimos, que vino al quociente 3. y vn quarto.

¶ Con q̄ partiras 3. ochauos, que venga al quociente $1\frac{7}{3}$. Parte 3. ochauos a vn $\frac{2}{3}$ por la regla de partir quebrado, a quebrado solo, y vendra vno y vn ochauo. Por tanto diras que se partiran los tres

tres ochavos para que venga al quociente vn tercio.

¶ Tres quintos, de que numero sera 3. quartos. Ponganse en figura los tres quintos, y los tres quartos desta manera.

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline 5 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 4 \end{array}$$

¶ Y parte los 3. quintos a los 3. quartos, por la regla de partir qbrado solo a quebrado solo, y vendran $\frac{3}{5}$ abos. Y assi diras, que 3. quintos son tres quartos de 12. quinzabos. Otro exemplo tres de que numero seran 4. septimos? Multiplica 3. por 7. que es denominador de los 4. septimos, y seran 21. Parte 21. por 4. (que es el numerador de los 4. septimos) y vendran 5. y vn quarto. Y assi diras, que 3. enteros son 4. septimos de 5. $\frac{3}{4}$

¶ Si 3. fueren la mitad de 10. que sera la mitad del 8.? Saca mitad de 10. q son 5. y la mitad del 8. que son 4. y di. Si 5. es 3. que sera 4. Multiplica 3. por 4. y seran 12. Parte 12. por 5. vendran 2. y 2. quintos. Y assi respóderas, q si la mitad de 10. fueren 3. la mitad de 8. (al mismo respecto) seran dos y dos quintos. Otro exemplo. Si los dos tercios de 9. son dos, y medio, que seran los 3. quartos de 12. Toma los dos tercios de 9. q son 6. y los 3. quartos de 12. que son 9. y di. Si seys que son los dos tercios de nueue, se tornan en dos y medio, en que se tornaran 9. que son tres quar.

quartos de 12. Multiplica dos y medio, por nue-
 ue, por la regla de multiplicar entero y quebra-
 do por entero solo: y montaran 22 y medio. Par-
 te estos 22. y medio, a dos, por la regla de partir
 por enteros y quebrado a entero solo: y vendra
 a la particion 3. y 3. quartos. Y afsi responderas
 que si los dos tercios de 9. son 2. y medio, los 3.
 quartos de 12. seran 3. y 3. quartos.

¶ Son dos messas denogal, que la mayor es qua-
 tro tercios de la menor, pregunto, que parte es
 la menor de la mayor? No ay en esta que hazer
 otra cosa, sino poner el denominador de la ma-
 yor por numerador de la menor, y el numerador
 de la mayor, por denominador de la menor.
 Quiero dezir, q̄ porque dize q̄ la mayor es 4. ter-
 cios de la menor, que mudes el 4. abaxo, y el 3.
 arriba desta fuerte $\frac{3}{4}$ y diras, que la menor sera
 3. quartos de la mayor.

¶ Cinco varas de paño de 7. palmos de ancho,
 quantas varas de tafetan de 3. palmos de ancho
 sera menester para aforro? Multiplica las 5. va-
 ras de paño, por 7. q̄ son los palmos que cada va-
 ra tiene de anchura, y montaran 35. estos 35. par-
 tiras por 3. (que son los palmos que tiene la va-
 ra de tafetan ancho) y vendra a la particion 11
 y 2. tercios: las quales seran varas. Y diras q̄ son
 menester 11. varas, y 2. tercias de tafetan para
 aforro de las cinco varas de paño.

¶ Dame dos numeros que sean tanto los tres
 qui nros

quintos del vno, como los dos septimos de lo otro busca vn numero, que tenga 5. que sera 5. y saca sus 3. quintos, que son 3. los quales se pondran sobre el cinco, desta manera $\frac{3}{5}$. Busca otro numero que tenga septimo, que sera 7. y ponle encima sus dos septimos, que serã dos desta manera $\frac{2}{7}$. Hecho esto multiplicaras en cruz como se ha dicho en el capitulo diez y ocho de partir quebrado solo, a quebrado solo, y saldran de las multiplicaciones 2. numeros, el primero es 21. y el otro es 10. por los dos numeros demandados, porque tanto sera los dos septimos de 21. como 3. quintos de 10. y es assi, porque los dos septimos de 21. son 6. y los 3. quintos de 10. son otros 6. Y assi se haran las semejantes. O reduce los tres quintos, y los dos septimos, como se mostrò en el capitulo xiiij. y los numeradores nuevos seran los numeros demandados.

¶ Dame dos numeros, que hagan tanto sumados vno con otro, como multiplicados el vno por el otro. Assi como dos doses, que sumando o multiplicando vno por otro, hazen quatro. La qual se hara, tomando vn numero qualquiera que te parezca, y pongo que tomas 6. este seys diuidiras en dos partes qualesquiera, con tal que sumadas hagan 6. Y pongo que sean las partes 2. y quatro. Parte aora los 6. por dos, y vendran a la particion 3. estos 3 es el numero parte mas el mismo 6. por la otra parte, que es quatro y ven-

y vendra vno $\frac{1}{2}$ y este fera el otro numero. Y assi diras, que $\frac{1}{2}$ y tres son los numeros demandados, porque tanto haran sumados, como multiplicados, que de vna suerte, o de otra montan quatro $\frac{1}{2}$ y assi se haran las semejātes. Acerca de lo qual digo, q̄ esta demanda tiene infinitas respuestas: porque de qualquier numero q̄ te pareciere, saldran tantos numeros que tēgan lo que la demanda pide, como pares de partes del tal numero se hizieren. Los dosdoses que pusimos por exemplo nacen todas las vezes, que el numero de q̄ queremos hazer lastales partes se diuidiere y igualmente.

¶ Haz de 8. o de otro qualquier numero 2. partes tales q̄ partiendo la mayor por la menor, venga a la particion 8. o lo que quisieres. Esta y las semejātes se haze, añadiendo vno a lo que quisieres partir, y poniendolo debaxo de lo que huieres de partir, a manera de quebrado, y sera la vna parte: y la otra fera lo que faltare desta primera parte, para cumplimiento de aquello q̄ partieres, como mejor se entendera en la practica desta demanda. Pues añade a los ocho q̄ quieres partir vno, y seran nueue: ponganse debaxo del mismo ocho desta manera $\frac{1}{2}$, fera esta la vna parte, y la otra fera lo que falta destos 8. nueues, para ocho enteros, que son 7. y vno nouen. Y assi diras, que vna parte es ocho nouenes, y la otra es siete y vn nouen, que sumadas

ha-

hazen ocho: y partiendo la mayor (q̄ es 7. y vn nouen) por la menor (que es ocho nueues) vendra a la particion ocho, que es lo que la demanda pide.

¶ Vno comprò cabras, y no sabe quãtas, ni quãto le costaron, mas bien se acuerda, que si luego q̄ las cõprò las boluiera a vèder vèdiendo cada vna a 6. reales, que ganara en todas ellas 40. Y si las vendiera a 8. reales ganara 60. Pide se quãtas cabras cõprò, y a como cada vna? Mira la diferencia q̄ ay de vna ganancia a otra, y hallaras ser 20. los quales sera particion. Mira por el semejante la diferècia que ay de vn precio a otro que sera de 6. a ocho, y hallaras ser 2. los quales seran partidor. Parte 20. a dos y vèdràn 10. Y tãtas cabras comprò. Y el precio de cada vna fueron dos reales: y assi se haran las semejantes.

¶ Vno comprò cien pieças, entre perdizes y conejos por 94. reales. Demando, valiendo cada perdiz 32. maravedis y medio, y vn conejo 30. quantos conejos cõprò. Esta y sus semejãtes se hazen proponiendo que las 100. pieças eran todos conejos, que en este exemplo es lo que vale menos: los quales valièdo cada vno 30. maravedis, montaran 3000. Estos 3000. redzelos a reales, y seran 88. reales, y $\frac{4}{17}$ abos de real. Resta los de 94. reales que se gastaron en todo, y restaran 5. reales y $\frac{13}{17}$ abos. Mira agora la diferècia que ay del precio de vn conejo al de la perdiz, y halla-

ras ser 2. marauedis y medio: por los quales par-
 tiras los marauedis q̄ valē los 5. reales, y $\frac{7}{77}$ abos
 de real, y vendra al quociente 78. y 2. quintos, y
 tantas fueron las perdizes, y lo que falta hasta
 100. que son 22. y 3. quintos, fuerō los conejos.
 ¶ Vno fue a la plaça, y hallò 3. fuertes de aues,
 conuiene a saber, paxaros a blanca, zorçales a 3.
 blancas, charlas a 5. blâcas. y cōprò 24. aues por
 24. marauedis, pide se quãtas cōprò de cada fuer-
 te? Para esta y las semejãtes pondras por exēplo
 q̄ todas erã paxaros, q̄ valen a blâca (q̄ es el mas
 baxo precio) y asì gastò 12. m̄s, los quales res-
 tados de los 24. q̄ gastò, quedaron otros 12. He-
 cho esto, mira quanto cuesta mas vn zorçal, q̄ vn
 paxaro, y hallaras dos blancas: asì mismo mira
 quanto cuesta mas vna charla q̄ vn paxaro, y ha-
 llaras 4. blancas, reduce los 12. marauedis q̄ fal-
 tan por gastar a blancas, y seran 24. blâcas. Diui-
 de estas 24. blâcas en tales 2. partes, que la vna se
 pueda partir por dos, q̄ es lo q̄ vale mas vn zor-
 çal, que vn paxaro, y la otra por quatro, que es lo
 q̄ cuesta mas vna charla que vn paxaro, y porque
 estos 24. se pueden diuidir en muchas parte sde
 partes, q̄ la vna se pueda partir por 2. y la otra por
 4. por tãto diras, q̄ esta demanda tiene muchas
 respuestas. Pues pò por exemplo q̄ te agrada di-
 uidirlos 24. en 16. y en 8. parte aora los 8. por
 4. y vendran dos. Y estos denota, q̄ se comprarã
 dos charlas, que vale cada vna 5. blancas. Parte

mas los 16. por los 2. que es lo q̄ cuesta mas el zorçal que el paxaro, y vendra 8. y tãtos zorçales comprò: y así diras q̄ comprò dos charlas a 5. blancas cada vna, y 8. zorçales a 3. blancas, y las demas aues que faltan hasta 24. que son catorze, fueron paxaros de los que valen a blanca

¶ Dame 2 numeros, q̄ el quadrado del vno exceda al del otro en doze, o en lo q̄ quisieres. Diuidelos doze, en 2. partes tales, q̄ la diferēcia dela vna a la otra sea vno, así como 5. y 2' y 6. 2' y estos seran los dos numeros, que sus quadrados excederan en doze, y así haras las semejantes.

¶ Vno comprò perdizes a razõ cada 5. perdizes de 4. reales, y oluido se quãtas auia cõprado, y quãtos reales auia gastado, solamēte se acordaua q̄ fumando las perdizes q̄ comprò, cõ los reales q̄ gastò en cõprarlas môtauã 36. Pidesse quantos reales gastò, y quãtas fueron las perdizes cõpradas? Para hazer esta, jũta las 5. perdizes cõ su precio q̄ es 4. y seran 9. Di por regla de 3. si 9. vienē de 5. de do vendrà 36. Multiplica 5. por 36, y serã 180. parte por 9. y vendrà 20. por las perdizes. Para saber lo que gastò di. Si nueue vienē de quatro de do vendran treynta y seys. Siguiendo la regla vendran diez y seys por los reales que gastò, y así haras las semejantes.

¶ Dame 3. numeros que los quadrados de los 2. menores juntos hagan tãto como el quadrado del mayor. Toma 8. o otro qualquiera numero, y

CAPITULO XXIII.

211

partelo por medio, y sera 4. y este 4. sera el vn numero para hallar el segundo, quadra este 4. q̄ es el primero, y sera 16. quita vno, y quedaran quinze, faca la mitad q̄ son 7. $\frac{1}{2}$ y este sera el segundo. Para hallar el tercero, añade al segundo vn punto, y sera 8. $\frac{1}{2}$ y este sera el tercero. Nota, si al principio tomares numero impar, assi como siete el mismo numero impar sera el primero.

¶ Tiene vn platero dos copas, y vna sobrecopa que vale 20. ducados, y si pone la sobrecopa a la copa mayor, vale 5. vezes tãto como la copa menor, y poniendo la sobrecopa sobre la copa menor, vale 3. vezes tanto como la mayor: pide se quanto vale cada copa? Para hazer esta, y sus semejãtes, multiplicaras las 5. vezes, que dize vna vez mas por las 3. que dize otra vez, y seran 15. quita vno, y quedaran 14. los quales guarda por partidior. Hecho esto, multiplicaras los 20. ducados, que dize que vale la sobrecopa por el 3. que dize vna vez que ha de ser mas, y montaran 60. A estos 60. junta los mismos 20. y seran 80. parte 80. por los 14. y vendra 5. y 5. septimos, y tantos ducados vale la menor. Para saber lo que vale la mayor, multiplica 20. ducados, que vale la sobrecopa por los 5. que dize, que ha de ser tãto como la menor, y seran 100. añade los mismos veynte, y seran ciento y veynte parte por los 14. y vendran 8. y quatro septimos, y tantos ducados vale la mayor.

¶ Vendi de vna pieça de lienço 12. varas, y quedaronme por vender la mitad, y $\frac{1}{5}$ de toda la pieça. Demando quantas varas tenia la pieça? Para hazer esta, y sus semejantes, sumaras el 2 y 5 y seran siete decimos. Mira quanto falta para vn entero, y faltaran 3. decimos. Pues parte las doze varas que dize que vendio, por estos 3. decimos, y lo que viniere, que es 40. seran las varas de la pieça.

¶ Vendi de vna pieça la mitad, y vn quinto, y mas 7. quedaronme por vender 5. varas. Pido q̄ tan larga era? Suma 2 y 5 y serã 7. decimos. Mira de 7. decimos, q̄ falta para vn entero, y seran 3. decimos. Estos 3. decimos sera partidor, suma las 7. varas que vendio mas con las 5. q̄ le quedarõ, y serã 12. Estos es particion. Parte 12. a tresdecimos, y vendran 40. y tantas varas tenia la pieça.

¶ Vendi la mitad de vna pieça menos 3. y quedo me por vender los dos quintos, y mas 7. varas. Pido quantas tenia? Resta los dos quintos de la mitad, y quedara vn decimo, este te sera partidor. Resta mas los 3. menos de los 7. mas, y quedaran 4. Estos serã particion. Parte aora estos quatro por el decimo, y vendra al quociente quarenta, y tantas varas tendra la pieça.

¶ Vno vendio ciertas varas de paño, y dize q̄ si vendiera la quarta parte, mas de las q̄ vendio, q̄ fueran tantas varas mas de 40. como son las varas que vendio menos de 41. Añade a 2. vn quar-

to, y seran 2. y vn quarto, y esto sera partidor. Iúta quarenta con 41. y seran 81. Esto sera particiõ Parte 81. por 2. y vn quarto y vendrá al quocien te, 36. y tantas varas, diras que vendio.

¶ Vno comprò 6. pares de guantes, por tãomas de 16. reales, quanto 7. pares de guantes costarian menos de 23. reales, demando q̄ costo cada par de guantes? Por quanto dize 6. mas y 7. menos, suma vno con otro, y seran 13. los quales se ran partidor. Y suma mas el precio, como son 16. con 23. y seran 39. lo qual sera particion. Parre 39. por 13. y vendra a la particion 3. y tanto di ras que costo cada par de guantes. La prueua es que multiplicando 3. por los 7. montará 21. que son 2. menos de 23. y multiplicando 3. por los 6. pares, montará 18. que son 2. mas de 16. y así ha ras las semejantes.

¶ Vno comprò 3. limones menos 4. marauedis, por 8. marauedis menos 3. limones. Pídesse a co mo es el precio de cada limon? Para hazer esta y las semejantes, fumaras los limones, como son 3. y 3. y hallará 6. los quales será partidor. Suma así mesmo los marauedis vnos por otros, como son 4. y 8. y haran 12. los quales seran particion parte 12. a 6. y védran 2. Y tanto diras q̄ es el pre cio de cada limon. Prueua 3. limones cada vno a 2. costaron 6. que quitando dellos los 4. mara uedis (que costaron menos) quedan 2. y por el se mejante, quitando de 8. marauedis el precio de

los tres limones, que son 6. quedan dos, que es tanto como lo otro.

¶ Vno fue a vender carneros, y preguntole otro quantos carneros vendiste? Respondio diziendo. Si védi era la quarta parte mas de los carneros q̄ védi fueran tãtos carneros mas de 53. como son los que vendi menos de 64. Pregunto, quantos carneros vendio? Respuesta. Pon por caso, q̄ vendio vn carnero, al qual juntaras el quarto, y sera vno y vn quarto. A esto añadiras vno por regla general, y será 2. y vn quarto, los quales serán partidor. Ahora suma 53. con 64. y serán 117. parte 117. a dos, y vn quarto, y vendra a la particiõ 52. y tantos carneros son los que vendio. La prueba es, que de 25. que fuerõ los vendidos para 64. faltan doze, y juntando a los 52. su quarta parte (que son treze) serán otros doze mas de 53.

¶ Vno cóprõ ciertas peras, y no sabe a como cada vna mas acuerdase, q̄ tanto le costaron 4. peras mas de 7. marauedis, quanto le costauã 5. peras mas de 15. marauedis. Demando quãto es el precio de cada pera. La qual se hara restãdo vnã peras de otras, y sera partidor, y restãdo vnos marauedis de otros, sera particiõ. Pues resta 4. de 5. y quedara vno restãdo 7. de 15. restan 8. parte 8. a vno, y vendra 8. y tantos marauedis diras q̄ costo cada pera. Y es cosa euidente: porq̄ 4. peras cada vna a 8. môtan 32. que pasan de 7. 25. pues 5. peras a 8. son 40. q̄ sobrepujan de 15. otros 25.

¶ Dame

¶ Dame 3. numeros quadrados, q̄ la suma de todos 3. hagan numero quadrado. Para hazer esta y sus semejātes: tomaras vn qualquiera numero quadrado impar, afsi como 9, o 25. o otro qualquiera. Y pongo por caso, q̄ te agrada tomar vn 15. del qual quitaras vno por regla general, y quedarán 24. de estos 24. la mitad es 12. quadra estos 12. la qual se haze multiplicandolos por otro tãto, y seran 144. este sera el segundo numero quadrado, y afsi tendras ya hallados dos q̄ el vno es 25. y el otro 144. para buscar el tercero: suma los dos hallados, como son 15. y 144. y mōtaran 169. de esto quita 1. y quedarā 168. la mitad q̄ son 84. quadra los 84. multiplicando por otros 84. y montara 7056. este sera el tercero numero: y afsi auras respondido a lo que se pide, porque todos 3. cada vno por si son quadrados, y la suma de todos, que es 7215. tambien es numero quadrado, como la demanda pide. ¶ Dame vn numero, que añadiendole ocho haga numero quadrado, y quitandole los mismos 8. q̄ de numero quadrado. Para hazer esta, y las semejātes, quadra el numero que has de quitar, y ayuntar, y porque en este exemplo es ocho el que quieres juntar: y quitar, quadra 8. lo qual se hara multiplicando por otro tanto, diziendo 8. vezes 8. son sesenta y quatro, a estos 64. añadeles siempre por regla general quatro, y seran 68. parte 68. por quatro siempre, y vēdra a la particiō 17. este 17. es el numero,

mero, del qual si quitas 8. quedan 9. que es numero quadrado, y si le añades ocho, hazen veynte y cinco, que tambien es numero quadrado. ¶ Dame vn numero, q̄ quitádole 7. quede numero quadrado, y añadiédole 10. haga numero quadrado. En esta, y las semejâtes, sumaras los 2. numeros q̄ has de jutar, y quitar, como son 7. y 10. en este exemplo, y seran 17. A estos añade vno por regla general, y serã 18. destos faca la mitad q̄ son 9. quadra este 9. multiplicando lo por otro 9. y seran 81. Destos 81. quitaras la cãtidad que quisieres ayutar (q̄ en este exẽplo son 10.) y quedarã 71. Este 71. es el numero, q̄ si le quitas siete quedarã 64. que es numero quadrado, y si le ayuntas 10. haze 81. que tambien es numero quadrado. ¶ Haz de 15. dos partes, que se aya la vna cõ la otra en sexquialtera proporcion, Busca 2. numeros en proporcion sexquialtera, como 3. y 2. (o otros qualesquiera) y suma los ambos vno con otro, y seran 5. di por regla de tres: si 5. dan 3. quedarã 15. Sigue la regla multiplicando 3. por 15. y partiendo por 5. y saldã 9. El qual 9. sera la vna parte, y la otra sera lo que falta de 9. a 15. que son 6. ¶ Dame vn numero que se aya cõ doze, en sexquitercia proporcion. Toma 2. numeros q̄ este el vno cõ el otro en la proporcion, q̄ aqui se haze mencion, q̄ sera como 4. a 3. y di por regla de 3. si 4. dan 3. quedarã 12. Multiplica 3. por 12. y parte por 4. y vendra 9. y asì di

ras que 9. estara con 12. en la proporcion que se demanda. Y desta suerte haras en otro qualquiera genero de proporcion. Y assi doy fin a este segundo libro, auisando, que el que quisiere ver la razon de la operacion destas questiones, lea el 7. libro del compendio de la cosa.

LIBRO TERCERO.

TRATA DE
LA REGLA DEL TRES, Y
compañias, y testamentos, o partijas, y
finezas de oro, y otras cosas to-
cantes al arte, que dizen

Menor.

CAPITVLO PRIMERO.

Trata de la regla (que dizen de tres) simple, o sin tiempo.

DIZESE regla de 3. porque en ella ocurre 3. numeros cõtinuos proporciolales. Y toda su platica es para hallar vn otro quarto numero ignoto, q̃ se aya en tal proporciõ cõ eltercero como en el segũdo con el primero. Lo qual muestra Euclides en la 16. del sexto, a do dize. Dadas 3. cãtidades cõti

O 5 nuas

LIBRO TERCERO.

mas proporcionales, para hallar la quarta, multiplicaras la següda por la tercera, y partiras por la primera. Tambien se hallara partiëdo la següda cantidad por la primera, y multiplicando lo que viniere por la tercera: o partiëdo la tercera por la primera, y multiplicando lo q saliere por la segunda. La razon de lo qual consta dela decimanona del septimo de Euclides.

¶ En estos quatro numeros proporcionales, la proporcion que ay del primero al segundo, ay del tercero al quarto, y al contrario: y partiendo el primero por el següdo, lo que saliere, es igual a la particion del tercero por el quarto, y al contrario, la proporcion del primero en el tercero es la misma, que la del segundo al quarto. Y tanto haze multiplicado el primero por el quarto, como el segundo por el tercero.

¶ Entendido esto, resta dar la ordë que se ha de tener en saber aplicar esta regla de proporcion a las cosas tocantes a los tratos de la vida. Para lo qual ay necesidad de saber qual es primera cantidad, y qual ha de ser segunda, y qual tercera. Lo qual se sabra, teniendo auiso, que delas 3. cantidades la que tuviere notorio, y cierto su valor, o precio, o ser, esta tal sera primero numero. Y el precio, o su valor, o ganancia, o perdida del segundo, y la tercera sera vn numero, cuyo valor, y ser, o ganancia, o perdida esta por saber.

Exemplo. Si 20. Cidras me costaron doze reales,

les, pregunto 30. q̄ me costaran al mismo res-
 to? En esta demanda los 20. es el numero prime-
 ro, su valor que es 12. es el segundo, las 30. q̄ es
 lo que quieres saber que valdran, es el tercero.
 Pues la regla es. Multiplicar el segundo nume-
 ro (que en este exemplo es doze) por el tercero,
 q̄ es 30. y montara 360. Parte 360. por el nume-
 ro primero, q̄ es 20. y vendra a la particion 18.
 Los quales es la respuesta dela demanda, y es el
 quarto numero proporcional, y así aura 4. nu-
 meros desta suerte 20. 12. 30. 18. en los quales se
 puede prouar todo lo dicho: y hallaras ser tanto
 la proporcion del 20. a 12. como de 30. a 18. q̄ la
 vna, y la otra es superbiepartienstercias. Y par-
 tiendo los 20. por el doze es tanto como partir
 el 30. por el 18. que de vna y otra suerte viene
 vno, y dos tercios, que es la denominacion dela
 proporcion dicha, y al contrario. Y la propor-
 cion de 20. a 30. es la misma que de doze a diez
 y ocho, q̄ la vna y la otra es subfesimaltera. Y tã-
 to haze multiplicando los 20. por los 18. como
 las 12. por los 30. q̄ de vna y otra suerte montan
 360. Pues la regla de 3. que tuuiere estas propie-
 dades, puedes dezir que esta bien prouada.

*La re-
 gla ge-
 neral de
 la regla
 de tres.*

¶ Entẽdido qual sea el primero numero, y qual
 segundo: y qual tercero, ay necesidad de saber
 ciertas concordancias que se han de guardar en
 esta regla, antes que se declare su operacion.

*Concor-
 dancias
 dela re-
 gla de
 tres.*

¶ La primera es, que el numero primero, y terce-

ro han de ser de vna especie, aunque no en cantidad, ni en valor. Quiero dezir, que si el primero numero es dineros, o tiempo, el tercero lo sea tambien.

La segunda es, que quando multiplicares el segundo numero por el tercero, lo q̄ viniere, es del especie del segundo numero, y no del tercero.

La tercera es, que el quarto numero que buscamos en esta regla, siempre es del especie de la moneda, o cosa que fuere el segundo.

Exemplo y practica.

Exem- plo de la regla de 3. ¶ Si con 8. ducados gané 4. reales, con 5000. maravedis que ganare? Por quanto el numero primero es ducados, y el tercero es maravedis, ay necesidad de reduzir los 8. ducados a maravedis, o los 5000. maravedis a ducados, porq̄ el primero y tercero seã de vna especie, como hemos dicho. Pues porque 5000. no son ducados justos mejor sera que los 8. ducados sean reducidos a maravedis, y assi seran 3000. maravedis. Aora diras. Si cõ 3000. maravedis, q̄ es el valor de los 8. ducados que primero pusiste, se ganaron 4. reales pido con 5000. que se ganaran? Sigue la regla multiplicando los 5000. que es el numero tercero por los 4. reales (que es el segundo) y montaran 20000. Estos 20000. en quanto al proposito q̄ en esta regla es menester, son de especie del segundo, quiero dez. r. q̄ porq̄ el segundo numero,

es reales, estos veynte mil son de especie de reales. Profigue partiendo los 20000, por el numero primero, que es 3000. y vendra al quociente 6. y dos tercio. Porque no se dude, si son ducados, o marauedis, o otra cosa, se tendra cuenta, q̄ esto sera del especie del segundo numero, y porque el segundo numero es reales por tanto estos 6. y dos tercios diras que son reales.

¶ Nota acerca desto, q̄ quando el numero primero, y segundo son de vna especie: el tercero y quarto, puedē ser de otra, y no ay necesidad de reduzir, segun hemos dicho, porque reduziendo, y sin reduzir, viene lo mismo saluo que sino reduzieses el 4. numero, sera del especie del 3. Exēplo. Si con 90. marauedis se ganaron, o perdierō 30. marauedis, con 12. reales, quanto se ganara, o perderas? Sigue la regla, y vendra 4. reales. El quarto numero en este exemplo, cōcierta en especie con el tercero. Nota que si alguna vez vieren mas de 3. diferencias de numeros, como muchas vezes vēdran, reducir las has a 3. aunq̄ sean muchas. Exēplo. Si 6. hanegas de trigo valē 18. reales y 15. maragedis, quāto valdran 9. hanegas y 4. celemines? Reduze los 18. reales a marauedis, y jūta cō ellos los 15. m̄rs, y montaran 627. Reduze mas las 9. hanegas a celemines, y junta con ellos los 4. celemines, y montará 112. celemines. Reduze mas las 6. hanegas a celemines, y seran 72. y así quedara la regla desta fuer

te. Si 72. celemines valen 627. marauedis, pido ciento y doze celemines, que valdran? Sigue la regla como se ha mostrado, y hallaras lo que es. ¶ Nota mas, que por causa de breuedad, puedes abreuiar el numero primero, y següdo, como hazes quando abreuias quebrados a menor denominaciõ. Exéplo. Si 10. varas de paño valen 10. ducados: pido 15. varas q̄ valdran? Abreuias los diez, y los 20. y quedara el 10. en vno, y el 20. en dos: sigue aora la regla diziendo? Si vno vale 2. que valdran quínze. Prosigue la regla, y vendra lo mismo que te viniera sin abreuiar.

*Exemplos
de esta
regla de
tres.*

¶ Ya que he puesto hasta aqui los preceptos de la regla de 3. resta dar exemplo para que sea mejor entendida. Cuestame vn aposento por tiempo de vn mes dos ducados: pido por 20. dias que lo he tenido quanto deuo? Ordena la regla, diziendo. Si 30. dias que tiene vn mes, me cuesta 750. marauedis, que es valor de los dos ducados, 20. dias que me costaran? Multiplica los 20. dias (q̄ es el numero) cuyo precio buscas por los 750. marauedis (que es el precio del primero numero) y montaran 15000. estos 15000. partiras por los 30. dias, y vendran 500. y este es el valor de los veynte dias. Y assi diras, que si vn mes costara vna posada dos ducados, por veynte dias costara quiniētos marauedis, y desta suerte sabras aueriguar cuētas de moços, y pupilajes, y otras cosas que comunmente tratamos.

¶ Es vn guadamaci, o paño que tiene diez alnas de largo, y 5. de cayda, y colto veynte ducados: demando de otro paño dela misma hechura y fineza, que tiene onze alnas de largo, y 7. de cayda, quanto valdra? Esta y las semejantes se haze multiplicando la largura de cada paño por su anchura. Pues multiplica diez alnas, que tiene el mas pequeño dela largura, por sus 5. que tiene de cayda y seran 50. y tantas alnas quadradadas tendra. Haz lo mismo en el paño mayor, y tendra 77. Di aora por la regla. Si 50, alnas valé veynte ducados, que valdran 77? Multiplica 20. por 77. y montaran 1540. parte 1540. por 50. y vendran 30. enteros, y quatro quintos de vn entero por el valor del paño mayor.

¶ Vna pieça costò 40. ducados, de la qual pieça me dieron 8. varas por 5. ducados: demãdo si la pieça costara 50. ducados, por quanto me dierã 9. varas? Esta y sus semejantes haras multiplicãdo primero las 8. varas de la primera pieça por el precio que costò la pieça, que fueron quarenta, y montaran 320. Afsi mismo multiplicaras las 9. varas de la segunda pieça por su precio, que es 50. y montara 450. Despues seguiras tu regla diziendo. Si de 320, vienen cinco ducados, de 450. quantos ducados vendran? Multiplica 430. por cinco, y montará 1250. parte por treziētos y veinte, y vendran 7. enteros, y vn 23, abos de entero: y por tanto te daran 9, varas de
la fe-

la segunda pieça, que costò cincuenta ducados.

¶ Si la pieça costasse 50. ducados, dandome 8. varas por 19. ducados: de mado, si costara 40. ducados quantas varas me dieran por los mismos 19. ducados? Lo qual haras diziendo. Si quarenta ducados fuesen 50. ducados 8. varas q̄ seran? Multiplica 50. por 8. y montaran 400. parte por 40. y vendran 10. y tantas varas diras q̄ te daran por los 19. ducados de la pieça, que cuesta 40. ducados, y asì haran las semejantes.

¶ Si en el tiempo q̄ vale la hanega de trigo 4. reales, me dan 16. onças de pan por dos marauedis demando, aora q̄ vale la hanega 10. reales quantas onças me darã por los mismos dos marauedis? La qual se hara diziendo. Si 10. fuesen 4. reales 16. onças q̄ seran? Multiplica 4. por 16. y montaran 64. Parte por 10. y vendran 6. enteros, y 2. quintos, y tantas onças daran de pan por 2. marauedis, del trigo que vale la hanega a 10. reales. De otra manera puedes hazer esta regla, diziendo. Si quando vale la hanega quatro reales por dos marauedis dan 16. onças de pan pido aora que vale la hanega diez reales, quantas onças me daran por los mismos dos marauedis? Multiplica el primero numero que es 4. por el tercero, que es 16. y seran 64. Estos 64. multiplicas otra vez por el quinto numero, q̄ es 2. y sera 128. esto sera partiçiõ. Aora multiplica el segũdo numero (que en este exemplo es 2.) Por el 4. que

quarto, que es diez, y seran veynte, esto sera partidior. Parte aora los 128. por estos 20. y vendran feys, y dos quintos, como por la otra via. Y assi te regiras en las semejantes.

¶ Si de vna hanega de trigo, q̄ cuesta doze reales dan por vn marauedi 16. onças de pan : de otra hanega q̄ cueste diez reales, quãtas onças de pã daran por 8. marauedis ? Lo qual se hara en esta manera, que multipliques las 16. onças por los doze reales q̄ cuesta la hanega, y montaran 192 los quales multiplicaras otra vez por los 8. marauedis, y montara 1536. Parte estos 1536. por diez, que son los reales que cuesta la otra hanega, y vendrà al quociente 153. y tres quintos. Y tantas onças te daran por ocho marauedis.

¶ Puedes ordenar esta regla, diziendo. Si quãdo la hanega vale doze reales por vn marauedi dà 16. onças de pan, aora q̄ la hanega vale diez reales, quantas onças daran por 8. marauedis ? De estos 5. numeros multiplicaras como van por orden: el primero por el tercero, y lo que saliere, multiplicalo otra vez por el quinto, y montara 1536. lo qual te sera particion. Assi mismo multiplicaras el segundo numero, que es vno, por el quarto, que es diez, y seran 10. los quales te seran partidior. Parte pues mil y quiniẽtos y treinta y seis, por diez, y vendran ciento y cinquenta y tres, y tres quintos, como por la otra via, y assi se ordenaran, y haran las semejantes.

Auifo ¶ Nota vn auifo para quando te dieren alguna
para la question, y no entendieres lo que has de hazer.
reglade Digo, que a imitacion de la misma demãda que
tres de te dieren, ordenes otra con numeros conoci-
qual- dos, y en ellos traçaras, hasta que faques por re-
quiera gla lo que de memoria sabes, que ha de ser, y de
suerte la suerte que hizieres la facil, haras la dificil.
que vè Exemplo. Pongo por caso que piden. Si siete ofi-
ga. ciales hazen vna obra en nueue dias: quantos la
 haran en dos dias? Ponganse los numeros co-
 mo parecen.

7—9—2

¶ Para saber en esta demanda lo que has de ha-
 zer, ordenaras otra a imitacion que sea clara, y
 que tu entendimiento sin regla perciba lo q̄ ha
 de ser, y sera desta manera, q̄ diras dos hombres
 hazē cierta obra en 9. dias, pido para que se ha-
 ga en 3. quantos hombres son menester? En esta
 claro està, que si dos hombres hazē en seis dias
 cierta obra, que para que se hagan 3. (que en la
 mitad del tiempo menos) sera menester añadir
 otros tantos hombres que ayuden, y asì queda
 entendido, q̄ son menester quatro hombres pa-
 ra acabar la obra en 3. dias. Ya que tienes visto
 q̄ han de venir quatro hombres, pon los nume-
 ros desta pregunta que pusiste, que dize, si dos
 hazen algo en 6. para hazerlo en 3. quantos?

2—6—3

¶ Veamos si multiplicando 6. por 3. y partien-
 do

do por 2. vienen 4, y hallaras que no, luego en esta demanda, no quiere que se multiplique el segundo numero por el tercero, y se parta por el primero (como la regla general manda.) Muda- la de otra suerte, multiplicando el primero nu- mero por el tercero, y partiendo por el de enme- dio, y tampoco saldran los 4. que quisiera. Pues mira si sale multiplicando el primero por el se- gundo, y partiendo por tercero, y hallaras ser ver- dad. Ya que has hallado regla, haz la demanda que te dieron que dize. Si siete oficiales hazen cierta obra en 9. dias, para que se acabe en dos dias, quantos seran menester? Multiplica el numero primero, que es 7. por el segundo que es 9. y montarán 63 parte por el tercero numero q̄ es 2. y vendran 31. y medio, por los hombres que seran menester. Nota este auiso de inuestigar en lo cierto, para regirte por similitud en lo que fue- re a tu entendimiento incierto. ¶ Nota. Puedes responder con facilidad en las questiones que te fueren dadas desta regla de tres teniendo auiso que la proporcion que huuiere del numero pri- mero al segúdo, ha de auer del tercero al quarto (que es lo q̄ desseas saber.) Exemplo, si en 7. dias gasto vno 14. reales, en 9. dias que gastara? Mira la proporcion que ay de 7. que es el numero pri- mero, a los 14. que es el segundo, hallaras ser subdupla (como se muestra en el capitulo quarto del lib. v.) pues passa al tercero numero que en

*Hazer
la regla
de 3. con
facili-
dad por
propor-
cion.*

este exemplo es 9. y ponle adelante vn tal numero que este el 9. cō el en subdupla, que es lo mismo que doblar los 9. y fera 18. y assi responderas, que si en 7. dias gasta vno catorze, en 9. dias gastara 18. Otro exemplo. Si 8. varas de lino valen dos ducados, doze varas que valdran? Mira

Nota aqui q̄ la misma proporciō que buuiere del primero al tercero aura del segundo al quarto.

la proporcion que ay de ocho, que es primero numero al segundo que es 2. y hallaras ser quadrupla, pues passa al tercero numero que en este exemplo es 12. y ponle adelante vn numero, que se aya el mismo 12. con el en quadrupla proporcion, que es lo mismo que ponervn numero, que sea la quarta parte del doze, que es 3. y assi responderas, que si 8. varas valen dos ducados doze varas al mismo precio valdran 3. y assi te seguiras, con los demas generos de proporcion.

¶ Nota si destas quatro cantidades que ocurre en la regla de dos, la primera se perdiesse, multiplicaras la segunda cãtidad por la tercera, y partiras por la quarta, y el quociente fera la primera: y si la segunda se perdiesse, multiplica la primera por la quarta, y partiras por la tercera, y el quociente dara el valor de la dos, y si la tercera fuesse perdida, multiplicando la quarta por la primera, y partiendo por la segunda, te vëdra la tercera.

Regla de tres, por quebrados, o rotos.

¶ Ya que he declarado la regla que dizen de 3. simple, o sin tiempo, por enteros, resta poner algun

gun exemplo por quebrados, Exemplo prime- *Regla*
 ro. Si 2. tercios de vara cuestā 4. septimos de du *de tres,*
 cado, pido vn $\frac{1}{3}$ de la misma cosa q̄ costara? Mul *por que*
 tiplica los $\frac{4}{7}$ por vn $\frac{1}{3}$ y montaran $\frac{4}{21}$ abos. Parte *brados,*
 $\frac{4}{21}$ por 2. tercios, y vendra a la particion dos sep- *070tos.*
 timos de vn ducado, y tanto diras que valdra el
 vn $\frac{1}{3}$ de vara de paño, segun la demanda pide.
 Haz: se esto mejor, y mas breuemente, de esta
 fuerte, que declare en el mismo exemplo, que di
 ze, Si dos tercios de vara valen $\frac{4}{7}$ que valdra vn
 $\frac{1}{3}$? Ponganse todos los quebrados cō sus lineas,
 como parece figurado

$$\begin{array}{r} 2 \times 4 \text{---} 1 \\ 3 \times 7 \text{---} 3 \end{array}$$

¶ Y multiplica, segun guian las lineas el tres de
 los dos tercios, por el quatro que esta arriba, y
 montara doze. Estos doze multiplicaras otra
 vez por el vno, que es numerador del $\frac{1}{3}$ y mon-
 taran doze, los quales doze, pondras sobre la ra-
 ya, que esta adelante, y quedara la figura como
 parece.

$$\begin{array}{r} 2 \times 4 \text{---} 1 \quad | \quad 2 \\ 3 \times 7 \text{---} 3 \quad | \quad \text{---} \end{array}$$

¶ Multiplica mas el dos de los dos tercios por
 el 7. y por el 3. que son denominadores, dizen-
 do, dos vezes 7. hazen catorze, y 14. vezes 3. son
 42. Estos quarenta y dos pondras debaxo de los
 doze, que pusiste sobre la raya, desta manera.

$$\begin{array}{r|l} 2 \times 4 = 1 & 12 \\ 3 \times 7 = 3 & 42 \end{array}$$

¶ Y así auras dado fin a tu regla de 3. y responderas que si dos tercios valen quatro septimos vn vale $\frac{7}{4}$ abos, q̄ abreviado a menor denominacion es dos septimos, como por la otra via sacaste. Otro exemplo. Si tres varas y 2' de paño valen 6. ducados, quanto valen 7. varas? Pon los tres numeros, como parece figurado, reduziendo primero las 3. varas, en el especie de su quebrado, que sera a medios, juntando mas el 2' y seran 7. medios y a los enteros ponles la vnidad debaxo, que es su denominador, como se mostro en el X. capitulo del segundo libro.

$$\begin{array}{r|l} 7 \times 6 = 7 & 84 \\ 2 \times 1 = 1 & 7 \end{array}$$

¶ Y multiplicando, segun se mostro en el exemplo precedente, y segun las lineas muestran, védra por numerador 84. y por denominador 7. y así diras, que si 3 varas y 2' valen 6. ducados 7. varas al mismo precio valdran ochenta y quatro septimos, que hechos entos son doze.

[*Exemplo de la regla de tres, que dizen mixta, o con tiempo.*]

¶ Si 100. ducados en 12. meses ganan 10. ducados

dos, demando 80 ducados en 5. meses, quantos ducados ganaran? En esta y en las semejantes, multiplicaras la cantidad de la moneda con el tiempo que siruio, o ha de seruir, y luego seguir la regla de 3. simple, o multiplicar los 3. numeros vltimos, y partir por la multiplicación de los dos primeros. Pues multiplica los 100. ducados por su tiempo, que son doze meses, y montaran 1200. este sera el numero primero, y el segundo seran los diez ducados, que se ganaron. Multiplica mas los 80. ducados por sus 5. meses, y montaran 400. este sera el tercero numero. Ahora sigue la regla de tres simple, diziendo. Si 1200. ganan diez, que ganará 400.? Multiplica 10. por 400. y parte por 1200. y vendra tres enteros, y vn $\frac{1}{3}$ y tantos ducados diras que ganan los 80. en cinco meses a razon que ciento ganan en vn año diez.

¶ Otro exemplo. Vn hombre en vn dia, có vna bestia gano tres reales, dos hōbres, en dos dias con dos bestias que ganaran?

1 — 1 — 1 — 3 — 2 — 2 — 2

¶ Esta y sus semejantes tienen 2. entendimientos, y segun esto, autan de tener dos respuestas.

¶ Quanto al primer entendimiento, digo que cada hombre de los 2. podran llevar dos bestias, y si esto es assi, no ay que hazer, sino multiplicar los tres numeros del principio, que son vnidades, los vnos por los otros, y montara 1. este vno

sera el primero numero. El segundo seran los 3. que son los reales, que se le dieron al hombre en vn dia con su bestia. Despues de esto multiplicas los 3. doses, vnos por orros, diziendo. Dos vezes dos son 4. y quatro vezes 2. son 8. Estos ocho es el tercer numero. Ahora ordena de nuevo otra regla detres, diziendo. Si vno gana 3. ¿ganaran ocho? Sigue la regla, y vendra 24. por la respuesta de la demanda.

¶ Quãto al segundo entendimiento podra vno dezir, que entre los dos hombres segundos lleuan dos bestias, de arte que cada vno lleua la suya, en tal caso si esto se ha de entender assi podras dezir, no estar bien ordenada la demanda, porque auia de dezir. Si vn hombre en vn dia, con vna bestia gana tres reales, dos hõbres con vna bestia (entiendese cada vno la suya) en dos dias quanto ganaran? Si la regla como arriba se hizo, y vendran 12. segun este segundo entendimiento.

¶ Si 12. ducadis en 4. meses a razon de 10. ducados por ciento, ganan 8. ducados demando 30. ducados en 5. meses a razon de 14. por ciento quanto ganaran? Multiplica los ducados, con el tiempo que siruieron, y luego lo que gana por ciento. Pues multiplicando 12. por quatro, montã 48. multiplica estos 48. por 10. que ganan por 100. y seran 480. multiplica assi mesmo los 30. ducados por sus 5. meses y seran 150. los cuales multi-

multiplicaras por los 14. que ganan por 100. y seran 2100. Ordena vna regla, diziendo. Si 480. ganan 8. q̄ ganaran 2100. Sigue la regla de 3. y vendran treynta y cinco enteros, por loque pi de la demanda.

¶ Si 10. ducados en 2. meses ganan quatro ducados, pido en quanto tiempo 12. ducados ganará tres ducados? Di por regla de tres si 4 son ganados con 10. en dos meses tres ducados con quanto, y en que tiempo se ganará? Multiplica 10. ducados por sus dos meses, y seran veinte, estos 20. multiplicalos por tres, y seran 60. los quales partiras por 4. y vendran quinze y con 15. ducados, y meses, se ganará los dichos tres ducados. Para saber el tiempo, parta quinze por doze, y védra vno y vn quatro, y en tantos meses ganará doze ducados 3 ducados a razon, que 10. en 2. meses ganaron quatro. A esta regla llaman algunos regla de 5. numeros.

Cap. II. Trata de la regla de compañia, que dizen simple, o sin tiempo.

EN las compañias no ay que hazer otra cosa sino lo que se ha hecho en la regla de 3. porq̄ despues de auer fumado todo lo que los compañeros pusieron, diras. Si tanto (que es todo lo que los compañeros pusieron) ganaron, o perdieron tãto, que se ganara, o perdera, con tanto que

que puso el primero? Y luego por el consiguien-
 te proseguiras con los demas, haziendo tantas
 reglas de tres quantos fueren los compañeros.
 ¶ Exemplo. Dos hizierõ compañia, el primero,
 puso 9. ducados, el segundo 7. ganaron 64. demã
 do que viene a cada vno, segun lo que puso. Su-
 ma los 9. que puso el primero, con los siete del
 segundo, y montaran 16. Ordena vna regla de 3.
 diziendo. Si diez y seys (que es lo que pusieron
 ambos) ganaron 64. que ganará 9. que es lo que
 el primero puso?) Multiplica 64. por 9. y monta-
 ran 376. Parte por 16. y vendran 36. ytanto es lo
 que viene al que puso 9. Ordena otra regla para
 saber lo que viene al segundo, diziendo. Si 16. ga-
 naron 64. que ganaran 7. Multiplica 64 por 7. y
 montara 448. parte por diez y seys, y vendrá 28.
 y tanto es lo que cabe al segundo. Y assi respon-
 deras que al que puso nueue ducados le vendrá
 de los 64. que ganaron 36. y al otro que puso 7.
 le vienen veynte y ocho, y desta fuerre haras las
 semejantes de qualquiera cantidad de ganan-
 cia, o perdida, y compañeros pocos, o muchos.
 ¶ Hazese de otro modo, mirando la proporció
 que ay de 16. que es lo que pusieron a 64. que ga-
 naron, y hallaras ser subquadrupla. Pues ya que
 sabes que la postura de todos esta cõ toda la ga-
 nãcia en subquadrupla proporció la postura de
 cada vno estara cõ la ganãcia q̄ le ha devenir en
 la misma proporcion. Pues da a lo que cada vno
 puso

*La ra-
 zõ des-
 ta se co-
 lige de
 la duo-
 decima
 del ser-
 timde
 Eucli-
 des.*

puso vna cantidad, que quede la misma postura en subquadrupla: lo qual se hara, multiplicando la postura por vn 4. que es la denominacion, de la proporcion, que en este exemplo vino, y saldra lo mismo que por la primer regla.

¶ Hazese mas facilmente partiendo los 64, que ganaron por los 16. que pusieron, y vendran 4. Multiplica lo que puso cada vno por estos quatro, y los productos seran lo que les viene.

¶ Hazese asimismo, multiplicado los 64. que ganaron por los 9. que puso el primero, y partiēdo por diez y seys que es lo que todos pusieron, y lo que viniere al quociente sera lo que cabe al primero, que puso 9. Y de la manera que has hecho para saber lo que viene al que puso 9. haras para los demas.

¶ Hazese asimismo, diuidiendo, o haziendola ganancia, o perdida, tãtas partes iguales, como montare lo que todos juntos pusieron, y dando despues tantas partes destas a cada vno, quãtas vnidades huuiere, en lo que pusiere: q̄ en el exemplo puesto sera hazer los 64. ducados que ganaron 16. partes iguales, que se haze partiendo sesenta y quatro por 16. y vendra a cada parte quatro. Agora daras al primero, porque puso nueue vnidades 9. quattros, que son 36. y al que puso 7. daras 7. quattros, que son 28. que es lo mismo que por las otras vias. Aunque he puesto 5. modos para operacion desta regla, todos se fundan en

vna misma razon, y son vn semejante precepto. Nota lo que en este exemplo se ha hecho con dos compañeros, porque afsi haras con mas, y con otras qualesquiera posturas, y ganancias, y perdidas.

¶ Nota que si las posturas de cada vno fuerē de monedas diferentes, como si vno pusiese reales, otro coronas, otro ducados, &c. en semejante caso primero que en otra cosa se entienda, reduziras las monedas a vna comun, como todas a reales, o todas a coronas, o la que se pudiere, o te agradare, y despues haras lo que mada la regla.

Exemplo de la regla de compañia, que dizen mixta, o con tiempo

Regla de compañia mixta, o cō tiempo.

¶ En estos exemplos de compañia con tiempo has de multiplicar primero el tiempo de cada vno con su dinero, y despues hazer con los productos, lo mismo q̄ hiziste en la simple, o sin tiempo. Exemplo, dos hizieron cōpañia, el primero, puso diez ducados, y 8. meses, el segundo dio 14 ducados, y 12. meses: ganaron con esse dinero, y tiempo 744. reales: pide se, q̄ vendra a cada vno de la ganancia, segun el tiempo, y dinero que puso? Multiplica primero los 10. ducados del primero por sus 8. meses, que puso, y montaran 80. guarda estos 80. Afsi mismo multiplicaras los 14 ducados del segundo, por sus 12. meses, y montaran

zaran 168. Aora di 2. hazen cōpañia, el primero puso 80. entre dineros y tiempo. El segundo puso 168. ganaron 744. demando, que viene a cada vno? Sigue la regla de compañía simple, segun hemos mostrado, y vendra al primero 240. y al segundo 504. y porque todo se reduce a la regla de tres en esto no quiero ser prolixo.

¶ Otro exemplo. 2. hazen compañía, el primero puso 10. ducados, y firuio 4. meses, y de la ganancia ha de auer a razon de 5. por 100. el segundo puso 20. ducados, y firuio 2. meses, y de la ganancia ha de auer a razon de 3. por 100. ganaron 50 ducados, demando quanto viene a cada vno? En esta y las semejâtes multiplicaras la postura de cada vno por su tiempo que firuio, y despues cō lo que ganare, por 100. Pues multiplica los 10. ducados del primero por los 4. meses, y montaran 40. los cuales multiplicaras por los 5. que gana por 100. y serã 200. y tanto diras que puso el primero. Multiplica 20. que puso el segundo por 2. meses que firuio, y montarã 40. Estos mltiplica con los 3. que gana por 100. y montara 120. tanto puso el segundo. Ordena vna regla diciendo dos hazen cōpañia, el primero puso 200 el segundo 120. ganaron 50. ducados: demando, que viene a cada vno? Sigue la regla de compañía sin tiempo, y vendra al primero 31. ducados, y vn quarto, y al segundo diez y ocho, y 3. quartos, y asì se haran las semejantes.

La razón de esto de la 5. del 8 de Euclides se colige.

¶ Dos hizieron compañia por cierto tiempo, y començo desde principio de mayo, y el primero puso 40. ducados el primero dia de Junio, y sacò 9. y primero dia de Setiembre, puso otra vez 30. El segundo puso 6. ducados en començado, y primero dia de Junio puso mas otros 12. y primero dia de Agosto sacò 14. ganarò 100. pidefe que viene a cada vno? La regla es, que multipiques lo que pusiere cada vno con el tiempo que estuviere y ponerlo a parte, y si pusiere mas dineros, siempre se multiplicaran por el tiempo que estuieren, y juntarlo con lo que està a parte y si sacare dineros, multiplicarlos por el tiempo que no estuieron, y restarlo de lo que està a parte, y hecho esto con todos, sigue con lo que quedare la regla de compañia sin tiempo: segun se ha mostrado en los capitulos precedentes.

¶ Otro exemplo. Dos hizierò compañia, el vno puso tres ducados y cierto tiempo: el otro puso diez y ocho meses y ciertos ducados ganarò entre ambos 96. ducados, de los quales vino al primero de ganancia por sus tres ducados, y su tiempo 24. ducados, y al segundo q̄ puso 18. meses, y no se sabe su dinero, le vino 72. pidefe que tiempo puso el primero, y que dinero puso el segundo? Para hazer estas questiones que callan tiempo, o dinero, miraras en que proporcion estan 72. ducados que cupo al vno, con los 24. que cupieron al otro, y hallaras ser tripla: pues la mis-

ma proporcion ha de auer del producto que se causare de la multiplicacion del dinero que el primero puso con su tiempo, al producto del dinero del segundo por su tiempo : pues procura de poner tãto tiempo al primero que puso tres ducados, y tantos ducados al segundo que puso diez y ocho meses, que multiplicando el tiempo, y dinero del primero por si, y el tiempo y dinero del segundo por si, los dos productos esten en tripla proporcion, como los estã sus mismas ganancias en este exemplo. Lo qual haras por la regla de la cosa del septimo libro, y hallaras que el primero puso tres ducados, y quatro meses, el segundo dos ducados, y 18. meses.

Cap. III. Trata algunas questiones que cada dia se ofrecen para diuision de las tentas Ecclesiasticas, y aueriguacion de algunos contractos, y leyes que consisten en cuenta.

TRes companeros se ofrecieron a dar 78. ducados por vna deheffa, y el contracto, q̄ entre todos hizieron, fue que el vno se obligò a pagar a razò de la mitad de todos los 78. ducados el segundo se obligò a razon de la tercera parte de los dichos 78, el tercero a razon de la quarta parte,

parte, pide se: quãto dara cada vno segun su obligacion, y contracto, para que entre todos paguẽ los 68. ducados, que la heredad les cuesta? Para hazer esta, y las semejantes, buscaras vn numero qualquiera que sea, de pequeña, o grande cantidad, porque no importa mas vno que otro, con tal condicion, que el numero de que te siruieres tenga mitad y tercia, y quarta parte justamente, fin que se quiebre la vnidad, el qual numero se hallara assentado el vn medio, y el vn tercio, y el vn quarto, como parece.

I I I

2 3 4

¶ Y multiplicãdo los denominadores vnos por otros (que en este exemplo son dos, y tres, y 4.) diziẽdo. Dos vezes 3. son 6. seys vezes 4. son 24. estos 24. es el numero que tiene mitad, y tercio, y quarto justamente. Pues mira aora de 24. quãto es la mitad, y hallaras ser doze. Assi mismo mira quãto es la tercia parte de los mismos 24. y hallaras ser 8. mira mas quanto es la quarta, y seran 6. Ordena vna regla de cõpañia, diziendo. Tres hazen compaña, el primero pone doze el segundo 8. el tercero 6. ganaron 78. (que son los ducados, que cuesta la heredad) pide se, que vendra a cada vno? Sigue la regla de compaña, sumando lo q̄ todos ponen (que en este exemplo, son 12. y 8. y 6.) y montaran 26. y di por la regla de

de 3. Si 26. q̄ es lo q̄ todos pusieron, ganaron, o perdieron 78. q̄ vendra de ganancia, o perdida al que puso 12. Sigue la regla, y lo que viniere a los 12. (que seran 36.) tanto dara de los setenta, y ocho ducados el que se obliga a dar la mitad. La razon es, porque pusiste 12. por la mitad. Y profiguiendo de la misma suerte con los demas, vendra a los 8. (que pusiste por el vn tercio) 24. y tanto cabe al del tercio: y al que puso 6. (que es del quarto) le vendra 18. Y assi quedarã partidos los 78. ducados, segun la obligacion: y respõderas, q̄ el que se obligò a pagar razon de la mitad de los 78. ducados, dara 36. y el del tercio, dara 24. y el del quarto, dara 18. La suma de lo qual montaran los 78. ducados, que todos 3. se obligarò a pagar. Puedes hazer esta regla despues q̄ entiẽdas que el primero puso 12. y el segundo 8. y el tercero 6. partiẽdo, o haziendo los 78. ducados que deuen 26. parte yguales por razon, que monta tanto lo que todos pusieron (como manda el vltimo modo de hazer regla de compaõia, que se puso en el cap. ij. deste tercero libro.) Pues haziendo los 78. ducados 26. partes yguales (q̄ se haze partiẽdo 78. por 26.) vendra al quociente 3. y tanto sera cada parte. Aora que sabes que sale a cada parte 3. toma 12. treses, para el primero pues q̄ puso 12. y montaran 36. y porq̄ el segundo q̄ se obligò a dar el tercio tiene 8. tomaras 8. treses que son 24. Y porque el del quarto

*Pjr oã
tromon-
do.*

tiene 6. toma 6. treses, que son 18. que es lo mismo que por la otra via auiamos dicho.

*Duda
de sta 2
questiõ*

¶ Podria alguno dudar, diziẽdo. Dixiste al principio, que para hazer esta question se ha de buscar vn numero qualquiera que nos agradare, con tal que tenga mitad y tercio, y quarto justamente, que son los numeros que en el contrato deste exemplo vienen, y numeros que tengan esta propiedad ay muchos, asi como 12. 48. 60. y otros: pues si yo tomasse el 12. y me aprouechasse del, como dize del veynte y quatro, como puede ser que venga lo mismo por vna via, q̄ por la otra: pues el vno es mitad menos q̄ el otro? A esto se responde, que los numeros que se acrecentaren, o disminuyeren por vna semejante proporcion, son de vn mismo valor: como mejor entenderas la razon en el lib. v. cap. iiii. que trata de proporcion. Por aora baste verlo por experiencia, prouandolo por el mismo exemplo, que precedio: y pues dizes que 12. tiene mitad y tercio, y quarto, haz con el lo que hiziste con 24. que fue el numero que hallaste por la regla general, que sera sacar la mitad del doze, que son seys, y el tertio que son quatro, y el quarto, que son 3. y ordenaras la regla, dizeado. Tres hazen compania, el primero pone 6. el segundo 4. el tercero 3. ganaron 78. (q̄ son los ducados a que se obligaron) pido que viene a cada vno. Sgue le regla de compania q̄ te agradare, y vendra a los 6. que pasi-

pusiste por la mitad 36. y al que puso 4. que es el tercio, vendra 24. y al que puso 3. que es la quarta parte, vendra 18. que es lo mismo que lo que alio quando te seruiste de los 24. O porque la suma de lo q̄ todos pusieron monta 78. (segun este segundo numero que tomaste) diuidiendo los 78. ducados en treze partes iguales, y dando al vno las 6. al otro las 4. y al otro las 3. (como manda el vltimo modo de hazer la regla de compañia, que se puso en el segundo capitulo de este tercero libro) vendra lo mismo que has visto. Desto se sigue, q̄ qualquiera numero q̄ tomares, teniendo las partes que en la demanda vinieren, no importa ser grande ni pequeño, q̄ lo mismo verna con vno, que con otro. Saluo que mientras menor fuere el numero, se hara con mas breuedad, y menor embaraço.

Quiero partir 483. ducados a 19. personas, de tal suerte, q̄ las diez dellas ayã de llevar las partes y guales, y las 3. han de llevar la mitad de lo que lleuare cada vno de los diez, y los 5. han de llevar vn tercio de lo q̄ lleuare cada vno de los diez: y vno ha de llevar a razon de la quarta parte de lo que lleuare cada vno de los diez. Esta y sus semejantes haras buscando vn numero (como en la precedẽte) que tenga mitad y tercio, y quarto (que son las partes que en este exemplo vienẽ) el qual numero es doze (como se moitrò en el libro ij. capit. xiiij. diferencia 6. de redu-

zir quebrados (estos doze, toma diez vezes para los diez que dizen que han de auer partes y guales q̄ seran 120. Assi mismo destos doze, saca 3. mitades para los 3. que han de llevar a razón de la mitad, y porq̄ vna mitad de 12. es 6. tres seran 18. saca mas 5. tercios de doze por razon de los 5. que han de llevar la tercia parte, que seran 20. porque vn tercio de 12. es 4. saca mas de la quarta parte de 12. (q̄ son 3.) para el otro que ha de llevar el quarto. Hecho esto ordenaras vna regla diziendo. Quatro hazon cõpañia (y esto por las quatro diferencias de gente que ay.) El primero puso 120. el segundo 18. el tercero 20. el quarto 3. ganaron 483. demando q̄ viene a cada vno? Sigue la orden de compañia q̄ quisieres, y vèdrã para los 10. q̄ hã de auer partes enteras, en iguales 306. q̄ partidos entre todos 10. y vendra a cada vno 36. y a los 3. q̄ hã de auer la mitad, les viene 54. ducados q̄ sale a cada vno a 18. A los 5. q̄ han de auer a razón de la tercia parte, les cabe 60 ducados, q̄ a cada vno les sale a 12. Al vltimo q̄ ha de auer la quarta parte le vienẽ 9. Y assi auras dado fin a la demanda, y tendras regla para hazer las semejantes.

¶ Parte 88. ducados a dos compañeros, q̄ el vno lleva razon de 2. tercios, y el otro a razon de los 4. quintos. Sigue la regla q̄ se ha dado en los exẽplos precedentes, en q̄ bulcaras vn numero q̄ tẽga 3. y quinto, q̄ son los numeros de que en esta question

questiõ se haze mencion, y hallaras (como se ha
mostrado) q̄ multiplicãdo el 3. del tercio, cõ el 5
del quinto, mõta 5. estos 15. es el numero q̄ tiene
tercio justamente, y quinto, aunque aora otros
muchos q̄ tendran tercio y quinto, como trey n
ta, sesenta, &c. mas como ya esta prouado, q̄ no
importa tomar vno mas que otro, sino es q̄ por
causa de la breuedad se buscara el mas pequeño,
por tanto seruir te has de los 15. sacãdo los dos
tercios de 15. (por q̄ dize que el vno ha de auer a
razon de los dos tercios) q̄ seran 10. porque vn
tercio de 15. es 5. pues si vn tercio es 5. 2. serã 10.
Asi mesmo, por q̄ el otro ha de auer de los 88.
ducados a razon de los 4. quintos, por tãto mira
q̄ tãto es vn quinto de 15. y hallaras ser 3. Pues
si vn quinto de 15. es 3. 4. quintos, serã 4. treses q̄
son 12. Ya sabes q̄ los 2. tercios de 15. fuerõ 10. y
los 4. quintos fuerõ 12. ordena vna regla diziẽ
do. Dos hazẽ compaõia, el primero puso 10. el
segundo 32. ganaron 88. pido que viene a cada
vno? Sigue la regla de cõpaõia sin tiempo, que
se puso en el cap. ij deste iij. lib.) y lo q̄ viniere
a los 10. q̄ seran 40. tanto diras que le daran de
los 88. ducados al que ha de auer a razon de los
2. tercios, y lo q̄ viniere a los 12. que seran 48.
sera lo que cabe al q̄ ha de auer a razon de los 4
quintos. Y assi se haran las semejantes.

Parte 79. ducados a 3. hõbrs desta suerte. Que
el vno ayavna cierta quãtidad, y el segũdo el du

plo del primero menos 3. El tercero el triplo de lo q̄ al 2. viniere de prima instãcia, antes que le quitẽ los 3. y mas 5. Para hazer esta y sus semejãtes, siempre que dixere la demãda algo menos: lo que fuere de menos, se ha de juntar a lo que se huuiere de partir: y lo que dixere de mas, se ha de restar. Pues aña de 3. q̄ dize q̄ ha de venir al vno menos, cõ los 79. y seran 82. quita de 82. los 5. q̄ dize q̄ ha de venir al otro de mas, y quedarã 77. estos guardaras para partir, hecho esto, põ por caso q̄ al primero le viene 1. a este respetto al segundo le vendran 2. y al tercero 6. ordena de nuevo vna regla diziẽdo. Tres hazen compaõia, el primero puso 1. el segundo puso 2. el tercero 6. han de partir 77. demando q̄ viene a cada vno, segun lo q̄ puso? Sigue la regla de cõpaõia sin tiẽpo, y vendra al primero q̄ puso 1. 8. y 5. nouenes, al segundo 17. y vn nouen, al tercero 51. y tres nouenes. Quita ahora de los 17. y vn nouen, que cabe al segundo los 3. que le han de venir menos: y quedarle han 14. y vn nouen, asì mesmo porq̄ al tercero le auia de venir 5. mas que el triplo del segundo aña de 5. a los 51. y 3. nouenes, y serã 56. y tres nouenes. De arte q̄ al principio juntaras los menos con lo q̄ se parte, y despues de partido se ha de quitar de lo q̄ cupiere, y asì como al Principio restare los meses, al fin se aña den.

Parte 10. a 3. que el primero aya eltercio mas,
 que

que el segundo, y el segundo, el quatro mas q̄ el tercero busca vn numero que tēga tercio, y quarto (que es 12.) p̄o por exemplo, que al tercero hōbre le vienen 12. y porque el segundo ha de auer la quarta parte mas que el tercero, saca el quarto de 12. q̄ son 3. y juntalos con 12. y serā 15 y tanto pondras al segundo, y porque el primero ha de auer el tercio mas q̄ el segundo, junta con los 15. del mesmo segundo su tercio (q̄ son 5.) y serā 20. y tãto pondras por el primero. Hecho esto, ordenaras vna regla, diziendo. Tres hazen cōpañia el primero puso 20. el segundo 15. el tercero 12. quieren partir 10. demandando, que viene a cada vno? Sigue la regla, y vendra al primero 4. y $\frac{2}{3}$ abos, y al segūdo 3. y nueue $\frac{1}{3}$ abos, y al tercero 2. y veynte y feys 47. abos.

Para declaracion de lo q̄ se trata en las demãdas siguientes, es necesario saber, que a toda herencia, o hazienda, llama el legista, As. Este As, se puede diuidir en tantas partes quãtas el testador quisiere, pero comunmente los Iuriconsultos antiguos le diuidieron en doze partes, como se colige de la ley, Interdum. §. pater. ff. de dæ redibus instituen. y de sus concordantes, de la l. 16. titulo 3. parti. 6. La razō de lo qual es, porque doze es el mas comodo numero que se puede hallar, porque siendo pequeño, tiene muchas partes aliquotas (que los legistas dizen quota parta) necessarias a las diuisiones y son

Las partes de As.

tantas, que no le falta sino vna, para tener tãtas partes aliquotas como su mitad: lo que no se hallara en orro numero mayor que diez (como en el V. libro entenderas). Boluendo a las partes de, As, digo que la primera se dize sescuns, que quiere tanto dezir, como onça, y media de las 12. A la segunda parte llaman, sextans, que es tãto como dezir sexta parte de 12. que son 2. onças. La tercera quadrans, q̄ es tanto como quarta parte de 12. que son 3. onças. La quarta triēs, que es vn tercio de 12. que son 4. onças. La quinta se dize quincuns, que es tanto como 5. onças. Y la sexta semis, sis, o semis, is, que es mitad, o 6. onças. La septima septuns, que es 7. onças. La octaua llaman besis, sis, o bes, sis, que es tãto como 2. tercios dellas, q̄ son 8. onças. Y a la nouena drodās, q̄ vale 9. onças. A la decima dextans, que es tãto como 10. onças. Y la onzena deunx, que es por onze onças. Y la vltima, o dezena llaman As, en que se cõprehenden todas 12. Otros 2. nõbres ayen cada vno, en los quales se encieran todas estas partes, que son libra, o pondus, como parece por la I. 19. tit. 3. partida 6.

¶ Vn testador dexando su muger en dias de parir, mãdo que si pariesse hijo, que huuiesse las 8. onças de toda su herencia, y del restante hizo heredera a su muger. Quiso mas, que si hija le naciesse, heredasse el triente (que son las 4. onças) y la muger fuesse heredera en lo demas. Pario la

*Exem-
plo de
refla-
mentos*

muger, hijo, y hija, pide se de 1400. ducados que se estima ala herencia, quãto vendra a la madre y a cada vno de los hijos, segun lo que el testador mandò? Para hazer esta cuenta pondras 3. numeros qualesquiera, que te pareciere, que se excedã eu dupla proporciõ, como 1. 2. 4. 6. 2. 4. 8. y otros afsi. Por razon que la voluntad del testador (como se colige del jurifconsulto) fue que la madre huuiesse de la herencia doblado que la hija, y el hijo doblado que la madre. Y porque he dicho que los menores numeros seran menosembaraçosos para tratar con ellos: por tãto toma 1. y 2. y 4. y ordena vna regla, diziendo.

¶ Tres hazen compaõia: el primero puso 1. el segundo 2. el tercero 4. han de partir 1400. que es la herencia, pido que viene a cada vno? Sigue la regla de compaõias sin tiempo, que maste agrade, y vendra a la hija dozientos, y a la madre 400. y al hijo 800. Y porque para hazer la regla de cõpaõia por los quatro modos primeros de los 5. q̄ puse en el segũdo capitulo deste III. libro requieren muchas reglas, los jurifconsultos procurando toda breuedad, mandaron diuidir, o hazer la herẽcia 7. partes iguales: porque los numeros de que siruen el hijo, y madre, y hija montan 7. y despues de hechas 7. partes, dan las quatro al hijo, y las dos a la madre, y la vna a la hija, como cõsta por tal. Si ita scriptum fit, ff. de libe. & posth. que es lo mismo que yo declare

en el quinto modo de hazer la regla de cõpañia en este libro tercero, capitulo segundo. Pues divide los 1400. ducados (que es la estimaciõ de la herencia) en siete partes (lo qual se haze partiẽdo por siete) y vendra a valer cada parte 200. ducados. Ahora porque al hijo le pusilte vn 4. to ma 4. partes, que son 800. y a la madre, porque tiene vn 2. dale 2. partes, que son 400. y a la hija, porque tiene vna, dale vna parte (que son 200. que es lo mismo, que puede salir por qualquiera regla de compaõias. Y si como dixo que se hizicssen 7. partes y iguales, por razon que los numeros de que en este exemplo te sirues montan 7. si pusieras a la hija 2. y a la madre 4. y al hijo 3. se auia de hazer la herencia catorze partes, y dar dellas al hijo las 8. y a la madre las 4. y a la hija las 2. y por esso vendran mas, ni menos de lo que esta dicho. Y desta fuerre se pudieran diuidir en quantas mas partes quisieras: como el proceder de los numeros sea en dupla proporcion.

Y no dize en su testamento, mi hija fulana me sea heredera, y si algun hijo varon me naciere, o hijos, sean me herederos en la mitad y quarta parte, que es razon de nueue onças (que es tanto como los tres quartos) y si hija me naciere, o hijas, ayan a razon de la quarta parte, que son 3 onças. Poniendo exemplo, que la herencia fuese 315. ducados: como partiran esta hazienda la

primera hija, y el 2. hijo si naciesse? La qual haras ordenando vna regla, diciendo. Dos hazen cõpañia, el no puso 12. que son las 12. onças de la hija, y el otro nueue que son las del hijo, ganaron 3. 5. que es la herencia pido que viene a cada vno? Sigue la regla de compañia sin tiempo, y vendra a la hija 180. ducados, y al hijo 135. O diuide la herencia en 21. partes y iguales, porq̃ 12. y 9. son 21. y destas 21. vendran las doze a la hija, y las 9. al hijo, y fera lo mesmo. O diuide la hazienda en 7. partes, y da las quatro a la hija, y las 3. al hijo, porque la proporcion q̃ ay de 4. a tres la mesma ay de 12. a 9. que es sexquitercia (como se muestra en el v. libro, capitulo iiij.) partese assi: porque dādo el testador a la primera hija el As, y al hijo las 9, onças, parece auer querido q̃ la hija huiesse 3. onças mas q̃ el hijo (como se colige de la letra de la ley.) Prosiguiendo cõ la duda, si vltra del hijo pariesse otra hija, ordenaras otra regla de cõpañia, diziendo. Tres hazen compañia, el primero, que es la primera hija puso doze, que son las doze onças, en q̃ fue instituyda el segundo puso nueue, q̃ es el hijo, el tercero puso tres, que es la segunda hija, sea la hazienda 2400. ducados, pido que viene a cada vno? Sigue la regla de compañia por la via que te agrada, y vendra a la hija primera 1200. ducados, y al hijo 900. y a la segunda hija 300. do parece claro ser la intencion del testador

dor, q̄ la primera hija lleuasse tãto como sus dos
 hermanos. Puedes asì mesmo hazer la heren-
 cia 24. partes yguales, porq̄ la suma de las onças
 de todos tres montaran 24. y vèdra a cada par-
 te ciêto, toma doze para la heredera principal,
 y nueue para el hijo, y tres para la segūda hija.
 O mira en que exceden las onças de vnos here-
 deros a las de otras, y hallaras que el hijo lleva
 tres tanto: que la segunda hija, y la hija primera
 (que es la heredera que estaua nacida) lleva qua-
 tro tanto, q̄ la heredera segunda, por tanto pon-
 dras vno a la segūda hija, y tres al hijo, y quatro
 a la heredera que estaua nacida. Suma ahora
 estos numeros como son 7. y 3. y 4. y môtaran 8.
 pues lo mesmo sera diuidir la herècia en 8. par-
 tes yguales, y dar a la hija heredera principal las
 4. y al hijo las 3. y a la segūda hija la vna, y ven-
 dra lo mesmo por esta via q̄ por la otra, porq̄ la
 proporcion q̄ ay de 12. a 9. y de 9. a 3. la mesma
 ay de 4. a 3. y de 3. a vno, q̄ la primera es sexqui-
 tertia, y la otra es tripla, como mejor entèderas
 en el libro v. cap. iij. Asì mesmo si pariesse hija
 sola, y no hijo, partirã las dos hermanas la herè-
 cia desta manera. Por razon q̄ la prima ha de lle-
 uar doze onças, y la segunda tres, que es quatro
 doblado vna que la otra, diuide la herencia en
 cinco partes, y de las quatro a la hija primera, y
 la vna a la otra. O diuidela en 15. partes, por ra-
 zõ q̄ las onças de ambas montã 15. y de las 12. a
 la

la vna, y a las 3. a la otra. O ordena vna regla, diziendo. Dos hazen compañía, el vno pone 2. el otro 3. ganaron tanto, pido que viene a cada vno Siguiendo la regla, védra lo mismo por vna via que por otra. Todo esto se saca de la ley. Si ita scriptum fuerit, ff. de heredibus instituend. Mira lo que ha hecho en estos dos casos porq̄ por ellos entenderas otras muchas, especialmēte la l. Interdum §. sed si ea cesserit de heredib. instit. ff. l. Marcellus, l. Qui quandringtona, ff. ad Trebel. l. Si quis testamento, §. 1. de legar. primo l. Iulianus, y la ley siguiente, ff. de hered. instit. l. Qui non multiabat. ff. del propio titulo, y quantas diuisiones trataren.

¶ Pues quando entre dos, el vno fuesse mejorado en el tertio de toda la herencia, sacaras (como se ha dicho) el tertio primero, y lo que queda re partelo entre ambos, y llevara doblado el vno que el otro. O diuide la herencia en 3. partes, y da la vna al vno, y las dos al otro, que es lo mismo. O pon dos numeros qualesquiera en dupla proporcion, como 2, y 4. ò 6. y 12. y ordena reglas como se ha mostrado, diziendo. Dos hazen compañía, el vno pone seys, el otro doze, ganaron tanto (aqui se pondra la estimacion de la herencia) pido q̄ viene a cada vno? Siguiendo la regla que te agradare de compañía, vendra lo mismo que lo que se ha dicho. Y si fueren 3. ò mas, sacaras el tertio primero de la herencia, par
tien-

riendo por tres (como mostre libro primero capitulo 10. diferencia primera, de partir por numero digito) y lo que cupiere, restarlo has de la herencia, para ver lo que queda, y lo que quedare partirlo entre los herederos muchos, o pocos, los que fueren, y dar lo que cupiere con el tercio, q̄ al principio se sacò al mejorado. E exemplo. Sea la herencia sesenta ducados, y los herederos cinco, el vno de los quales sea el mejorado. Saca pues de sesenta el tercio, partiéndolo por 3. y vendran veynete: estos veynete es el tercio, el qual se pondra a parte, para darlo al mejorado. Para ver lo que queda, resta 20. de 60. por la regla que se puso en el octauo capitulo del libro primero, quedaran quarenta, partanse estos quarenta a los cinco herederos, y vèdra a cada vno 8. y asì lleuara el mejorado 28. y los otros quatro herederos a 8.

*Responde
sta a la
duda se
gunda.*

Si quisieres diuidir la herencia entre dos, y que el vno lleue la tercia parte, no de la herencia, sino de lo q̄ cupiere al otro: si s̄o 2. o 3. o mas por cada vno pòdras vn 3. ponese 3. por razõ q̄ se haze menciõ de tercio (aunque puede poner otro qualquiera numero, que tenga tercio) y miraras quãto es el tercio de 3. de hallaras ser vno el qual vno juntaras al tres del mejorado: y despues ordenaras la regla de compaõia (como mejor entenderas en el exemplo) Pon por caso, que es vna herencia de setenta ducados, y que ay dos here-

herederos: y el vno ha de llevar tantos ducados mas, quanto fuere el tercio de los ducados que llevar el otro. Pues porque son dos, pon dos treses desta manera 3.3. Agora saca el tercio del vn tres, y fera vno, junta este vno con el vn tres, y fera 4. estos 4. seran para el mejorado, y el vn tres sera para el otro, ordena vna regla, diziendo. Dos hazen compañia, el vno pone quatro, el otro 3. ganaron 70. ducados (que es la herencia) pido que viene a cada vno? Sigue la regla de compañia sin tiempo, que te agradare, o partelos 70 en siete partes y guales, porque es la suma de los numeros, que si fueren, y vendra a cada parte diez de estos toma 4. que valen 40. para el vno y 3. que son 30. para el otro, assi lleuara el vno diez ducados mas, que es tercio de los 30. que lleva el que no fue mejorado.

¶ Otro exemplo. Sean tres herederos, y el vno aya de llevar tantos ducados mas, quanto fuere el tercio de lo que cupiere a vno de los otros, y sea la herencia cinquenta ducados. Sigue la regla poniendo 3. treses, porque son 3. los compañeros desta manera 3.3.3. Carga sobre el que te pareciere la tertia parte del vn 3. que es 1. y juntalo sobre el vn 3. y quedaron todos tres numeros de esta manera 3.3.4. ordena vna regla, diziendo. Tres hazen compañia: el primero puso 3. el otro otros 3. el otro 4. Ganaron 50. pido, &c. Sigue la regla como en las precedentes, y lo q viniere a los

4. que

4. que seran 20. es lo q̄ viene al mejorado, y lo q̄ viene al vn 3. fera lo que cabe a cada vno de los otros 2. q̄ vendran a 15. y assi se harã entre mas. Y assi diuidiras el As, en la ley Interdum §. pa- ter familias, ff. de hered. instituen. versiculo. Sed et si duos, porque como dize que se haga 20. partes, lo podras hazer 10. y dara vno 4. y a los otros a tercio. Mira lo q̄ has hecho con el 3. quando se trata del tercio, q̄ lo mismo haras cõ el 5. si se tratare de quinto, y con 4. si se tratare de quarto, &c. Y si huulere mejorero de tercio y quinto juntamente, aunq̄ segun la cuenta, tanto monta sacar primero el tercio, y de lo que quedare el quinto, o al contrario sacar primero el quinto, y de lo q̄ quedare el tercio, como lo puedes probar en este numero de treynta, que de vna fuerte y otra vendra al tercio y quinto catorze. Cõ todo esto sacaras primero el 5. de toda la herencia partiendo por 5. y de lo que quedare saca el tercio, como lo manda la ley 214. del estilo, y des pues de sacado el quinto, y tercio, y entregado al mejorado, lo que quedare, partirlo has entre los herederos que fueren, y lo q̄ cupiere a cada vno daras su parte al mejorado, como a los otros. Exẽplo. Sean 4. herederos, y el vno dellos mejorado en tercio, y remanente del quinto, y sea la hazienda 30. sigue la regla, sacãdo de treynta el quinto, q̄ son seys quedaran 24. saca de 24 el tercio q̄ son ocho, y quedaran 16. ta seys

Como se saca tercio y quinto

(que

(que es quinto) con 8. (q̄ es tercio) y seran 14. esto es para el mejorado aora los 16. ducados q̄ quedaron, partelos por los 4. herederos, y vendran a cada vno 4. ducados, y asfi daras al mejorado otros quatro, y lleuara el mejorado en tercio, y quinto, de treynta ducados los 18. y a cada vno de los otros tres, les vendra a 4. Puedese sacar mas breuemente tercio y quinto de qualquiera herencia; diuidiendo la herencia en 15. partes yguales; y dando las 7. dellas al mejorado en tercio y quinto, y las 8. q̄ quedaren partir las entre todos, asfi al mejorado, como a los otros. Pues parte los 30. (que fue la estima de la herencia propuesta) en 5. partes, y vendra a valer cada parte 6. da 7. dellas, q̄ valē 14. al mejorado, y las 8. q̄ quedan, que valen 16. partáse entre los 4. herederos, que se ponen por exēplo, y vendran quatro a cada vno, q̄ es lo mismo, que por la otra via se auia dicho. Nota destas 7. partes de las 15. que digo, que es tercio y quinto, las 4. es el tercio, y las 3. el quinto. Nota quádolas mãdas excederē al quinto y tercio, q̄ es lo que vn testador puede dispensar, sacaras el quinto, y el tercio de la herencia, y guardarlahas, como si fuesse ganancia, y ordenaras vna regla de compañía, fingiendo que cada vno puso tanto quanto fue la manda, y que la ganancia es lo que mōtare el quinto y tercio de lo que heredaron.

Soy en esto breue, porque el q̄ caresciere de

principios, no lo entendiera mejor, por mucho que yo me alargue, y el que lo tuuiere, bastarle ha lo dicho.

Cap. IIII. trata de pujas de rentas.

ESta vna renta en 365. ducados, hanle dado tres pujas: vna de tercio, y otra de quinto, y otra de tres diezmos: pide se enq se aura subido? Para esto buscaras vn numeroq tenga tercio y quinto y diezmo justamente (como se mostrò en el cap. Xij. del lib. ij.) y sera 30. añadele a estos 30. su tercio y seran 40. añade a estos 40. su quinto q es 8. seran 48. añade a estos 48. sus tres diezmos que son 12. y 2. quintos seran 62. y dos quintos. Ordenavna regla diziendo si 30. se sube en 62. y dos quintos, pido 365. a que se subiran? Sigue la regla de 3. y vendrà 759. y vn quinto, y en tanto aura subido la dicha renta, que primero estaua en 365. ducados.

Es vna renta que le han dado puja de tercio, y quinto, y diezmo, y monta todo mil ducados, pido en quanto estaua primero? busca vn numero q tēga tercio y quinto, y diezmo justamēte sin q la vanidad se quebre, y este numero sera 30. mira quanto es su tercio, y seran 10. jútasele, y seã 40. Mira aora quanto es el quinto destos 40. y jútasele, y seran 48. mira de 48. quanto es el diezmo y jútasele, y vendra a ser 52. y 4. quintos, di por regla de 3. si 52. y quatro quintos vienē de 30

de donde vendran 1000. Sigue la orden de la regla de 3. vendran 568. y en tantos ducados esta-ua primero la renta.

Cap. V. Trata la regla que dizen de baratar, o trocar.

Estas reglas de baratar vienen en 3. maneras, conuiene a saber: baratar simple, barata cõpuesta, y barata con tiempo.

Exemplo de la primera diferencia de baratar, que dizen simple.

¶ Dos mercaderes quierẽ trocar ciertos paños el vno tiene vna pieça de terciopelo de 30. varas y vale la vara 700. mrs, el otro tiene contray, q̄ vale la vara a 750, marauedis, demando quantas varas de contray se darã por las 30. de terciopelo? Esta se haze, y sus semejantes, multiplicãdo las 30. varas de terciopelo por 700. que es el precio de vna vara y montaran 21000. los quales partiras por el precio q̄ vale la vna vara de contray, que es 750. y vendra a la particion 27. y tantas varas daran de contray por las 30. de terciopelo. La prueua es, que tanto montan 28. varas de contray a 750. la vara: como las 30. varas de terciopelo a 700. marauedis.

¶ Dos quieren baratar açafran, y canela, yel de la canela, pone la libra a 20. reales fiada, porque al cõtado no vale sino a 12. el açafra del otro va-

le al cõtado 38. reales. Demando, a como pòdra la libra fiada, a razon de la canela del primero, para que esta barata sea sin fraude? La qual se de ue hazer diziendo. Si 12. que es el precio de la libra de cauala en contado, se pone en veynte reales fiada, demando 38. que vale la libra de açafrañ en contado, a como se pondra fiada? Si gue la regla de 3. y vendra 63. y vn tercio, y en tãtos reales pondra la libra de açafrañ.

Exemplo de la segunda regla, que dizen barata compuesta.

¶ Barata cõpuesta, es quando el vno de los mercaderes vltra del precio en q̄ pone la mercaderia, quiere algunos dineros en cõtando, y la resta en mercaderia, como por los exẽplos mejor entenderas. Dos quieren baratar arroz, y trigo, el arroba del arroz vale en contado onze reales, y en fiado ponese a 16. y quiere la quarta parte en dinero, y lo demas en trigo. El otro pone la carga del trigo, al contado a 24. reales, demãdo a como se pondra fiado, dãdo la quarta parte en dineros, y los 3. quartos en trigo? La qual se haze, y sus semejantes sacando la quarta parte de los precios del q̄ quiere la quarta parte en dinero. Pues saca la quarta parte de los 16. q̄ es el precio del arroz fiado, y seran 4. y quedaran 12. hecho esto toma los quatro q̄ sacaste por la quarta parte, y restalos del 11. que es el precio del arroz
en con.

en contado, y quedarán. 7. reales. Ahora diras por regla de 3. Si 7. reales se pujan a 12. del arroz, demandando 24. reales que es el precio de la carga de trigo en contado, en que se pujara? Sigue la regla de 3. vendra 41. y vn septimo, y tantos reales diras, que ha de poner la carga de trigo fiado, para que sea este contrato sin fraude.

¶ La vltima diferēcia de baratar se dize con tiēpo, y es quando los que fian, y recibē fiado pidē algun tiempo para pagarlo que tienē de dar, de lo que reciben fiado. Exēplo. Dos quieren baratar, el vno tiene cera, que vale el quintal a 24. ducados en contado, y fiado a 30. y quiere 5. meses de tiēpo. El otro tiene açucar, y quiere poner el quintal a razon de 12. ducados fiado, y al cōrado no vale sino 8. ducados. Demando quanto tiempo tiene de poner este del açucar para que la barata sea licita, y igual? La qual se dene hazer mirando lo que cada vno de estos gana en su fiado, y hallaras que el vno gana 6. ducados en 5. meses, y el otro gana 4. sabido esto, mira el que gana 6. ducados en 5. meses a como le sale el ducado cada mes, lo qual sabras, diziēdo por la regla de 3. Si 24. ducados en 5. meses ganan 6. demando vn ducado por si quāto ganara en vn mes? Sigue la regla de 3. mixta, y vendra a vn veyntabo, y tātō gana cada ducado cada mes. Hecho esto, mira quē meses dene tener el q̄ da el quintal de açucar a 12. ducados fiado, valiēdo al contado 8. y qual

se haze multiplicando los 8. que vale al contado con vn 20. abo, que es lo que gana el ducado por mes, y montara dos quintos. Pues di aora por regla de 3. Si dos quintos vienen de vn mes, demãdo quatro ducados que gano el segundo, de dõde vendran? Sigue la regla de 3. y vendra 6. y tantos meses deue poner este del açucar, para que en el contrato no aya fraude.

Cap. VI. De la regla que dizen de Ancajes.

A Neaje toma denominacion de ana (que es vn genero de medida en Flandes) que es menor que la vara Castellana vn quinto. Y es de saber, q̄ de vnos lienços dan 142. anas por 100. varas de Castilla, y de otros 150. o 160. o 140. lo qual entendido segun el contrato se hiziere, si quieres ver de qualquiera cãtidad de anas, quantas varas son Castellanas, tẽdras la ordẽ, q̄ en este exemplo se declarara. Cõpro 320. anas de bretaña, y dãmelas a razõ de 160. por 100. varas, pido quantas varas seran las dichas 320. Di por regla de 3. Si 160. anas valẽ 100. varas, pido 320. anas, q̄ valdrã? Multiplica 100. por 320. y parte por 160 y lo q̄ viniere, q̄ es 200. seran las varas que valẽ las 320. anas. Has de saber mas, q̄ los lienços tienẽ ciertos dineros de ley, y estos dineros suben, y abaxã su valor, segũ se conciertan en el valor de la libra (que dizen de grueso) la qual libra vale
 veynte

veynete sueldos, y cada sueldo 12. dineros (que
 segun esta cuenta la libravale 240. dineros.) Por
 que todo esto sea bien entendido: pongamos
 por exemplo que vno comprò vn fardel de cier
 ra fuerte de lienço, que tiene 50. anas de 6. dine
 ros de ley, a razon que la libra de grueso costaf
 se 1200. mrs. Para saber quantos marauedis vale
 este fardel, multiplicaras las 50. anas por sus 6.
 dineros de ley, y montaran 300. los quales serã
 dineros. Agora para saber quantos mrs. vale el di
 nero, a razón q̄ la libra vale 1200. marauedis par
 tiras 1200. por 240. dineros, que vale la libra, y
 vèdra al quociente 5 y tãtos marauedis vale ca
 da dinero. Pues multiplica los 300. dineros, que
 montã las 50. anas por 5. marauedis q̄ vale cada
 vno, y montarã 1500. y tãtos marauedis vale es
 te fardel, q̄ tiene 50. anas de 6. dineros de ley va
 liendo 1200. mrs. la libra de grueso. Puedese ha
 zer esta cuèta de otra manera. Exemplo. Cõpro
 200. anas de lienço a razon de 7. dineros de ley
 y 1200. mrs. la libra de grueso. Demando quan
 tos mrs. valen? Multiplica las 200. anas por sus
 dineros de ley q̄ s̄ 7. y môtará 1400. estos 1400.
 multiplicaras otra vez por 1200. q̄ vale la libra
 de grueso, y môtará 1680000. Esto partiras por
 240. q̄ son los dineros q̄ vale la libra, y vendra al
 quociente 7000. y tantos marauedis valen las
 anas: y sabido esto, facilmente se sabra como sa
 le la ana: y lo que mas quisieres.

Cap. VII. Trata de la regla que dizen de vna, y dos falsas posiciones.

DIzese regla de vna falsa posicion, no porq̄ nos muestre cosa falsa, sino porque de falso numero, sacamos vn verdadero para fin de absoluer alguna duda demandada. Ya ssi digo q̄ quando te demandaran alguna demanda: presupondras vn qualquiera numero por respuesta de la demanda, con el qual numero haras lo que la demanda pudiere, como quien quisiessse hazer la prueua, y sino viniere lo que quisieres, proporcionaras el numero que te viniere cō el que quisieras que viniere, y siguiédo la regla de 3. hallaras el numero verdadero, como por exemplo en tenderas.

Dame vn numero, que juntandole su quinto, ytercio monte 6. La qual se hara, proponiendo, que sea este numero que demanda quinze porque tiene tercio, y quinto, (aunque pudieras poner otro qualquiera.) Pues haz con este quinze la prueua juntádole su tercio que sō 5. y su quinto, que son 3. como la demanda pide, y nfontara 23. y porq̄ no quisieras sino 6. ordenaras vna regla diziendo. Si 23. me vinierō de 15. demando seys que es lo que yo quiero: de donde vendra? Multiplica 15. por 6. y montara nouenta, parte 90. por 23. y vendra al quociente tres enteros, y

21. veynte y tres abos, por el numero demandado, Prueuolo juntandole su tercio, que es 7. y siete, veynte y tres abos, y su quinto, que es 18. veynte, y tres abos, montara todo 6. como pide la demanda.

Exemplo de dos falsas posiciones.

Dizefe regla de dos falsas posiciones, porque despues de auer puesto vn numero, que no quadrare, con lo que la demanda pidiere, tomaras de nuevo otro mayor, o menor segun te pareciere, sin que el vno al otro le busques respeto, sino fuere de desigualdad. Y porque quando tomares el primero numero, puede ser mayor, o menos de lo que se pretende, y quando tomares el segundo tambien puede ser mayor, o menor, o porque el primero numero puede ser mayor, y el segundo mayor, por tanto pueden venir en vna de quatro maneras, para lo qual se encomendara a la memoria las dictiones comprehendidas en los versos siguientes.

Plus, & plus atque minus subcedere debes,

Sed minus, & plus iungere plusque minus.

Quiere dezir. Mas, y mas. O menos, y menos, se resta. Mas, y menos, O menos, y mas se suma.

Para declaracion destos n6bres has de saber, q̄ quãdo dize mas, y mas es restar, quiere dezir que quando en ambos los 2. numeros falsos, que
pre-

que supones, te viniere mas de lo que la manda pide, dize que restaras.

¶ Menos y menos es quando en ambos los numeros falsos q̄ presupones, viniere menos de lo que quisieras que viniera, y se haze de la misma suerte que mas y mas.

¶ Mas y menos quiere dezir, quando el numero que propusieres, primero fue mas, y en el segundo menos de lo q̄ quisieres. En tal caso sumaras las multiplicaciones de los numeros falsos en sus contrarias diferencias, y sera particion, y sumando las diferencias de los tales numeros, sera partidor.

¶ Menos, y mas es, quando con el numero primero viene menos de lo que la demanda pide, y con el segundo sale mas de lo que pide, y esto se haze sumando como en el tercero genero.

¶ Nota todas las reglas que se hazen por vna posicion, se pueden hazer por esta regla, y no al contrario, y las que se hizieren por esta, o otra qualquiera delas del arte menor, se haran por las igualaciones simples, y no al contrario. Como en el septimo libro del compendio de la cosa veras.

*Exemplo
de esta re
gla.*

¶ Exemplo, y platica declaratiua de todo lo dicho. Dame vn numero, q̄ añadiéndole su mitad, y 3. y más 9. monte 60. Nota, q̄ assi como dize q̄ añadiéndole su mitad y 3. y más 9. podia dezir otra cosa de mayor, o menor cantidad, y como dize q̄ monte sesenta puede dezir lo que quisieres.

Para

¶ Para declaraci6n de lo que esta demanda pide pon por caso, q̄ el numero sea 30. (o lo q̄ quisieres (añade a estos 30. su mitad, que son 15. y su tercio, q̄ son 10. y 9. mas, y montara todo 64. y porque no quisieras sino 60. p6dras los 30. q̄ tomaste por numero falso, y adelãte los 4 q̄ vienē mas de los 60. q̄ quisieras desta manera—30. mas 4.

¶ Ya que no acertaste c6 el treynta porque, fue grãde, tomaras otro, y sea qualquiera asfi como 36. añadele su mitad, q̄ son 18. y su tercio q̄ son 12. y mas 9. (como pide la demanda) y montara todo 75. y porque no quisieras sino 60. pondras el 36. que tomaste, y adelante los 15. que salē de mas, que es la diferencia que ay del 60. hasta 75 como parece figurado.

30 mas 4
36 mas 15

¶ Hecho esto multiplicaras los numeros falsos con sus diferencias contrarias, conuiene saber los 30. que es el numero falso por las quinze, q̄ es lo que en el segundo vino demas, y montara 40. Multiplica asfi mismo los 36. que es el segundo numero falso por 4. que es la diferencia del primero, y montara 144. las quales multiplicaciones pondras delante como parece.

mas
30 X 4 ——— 144
36 X 15 ——— 460
mas

Hecho

¶ Hecho esto restaras las 2. multiplicaciones, la menor de la mayor, como son 144. de 450. y la resta sera particion. Resta mas la vna diferencia, que es quatro, de la otra, que es 15. y lo que quedare sera partidior. Pues restando 144. que es la vna multiplicacion, de los 450. que es la otra, quedan 306. resta mas la vna diferencia, que es 4. de la otra, que es 15. y quedaran 11. (esto es lo q̄ quiere dezir, mas, y mas es restar (parte aora 306. por 11. y vendra al quociente 27. y 9. onzabos, y este sera el numero, que si le juntas su mitad, y tercio, y 9. mas montara 60. como la demanda pide.

¶ El mismo exemplo, por la segunda diferencia, que dize menos, y menos. Pon por caso, que no sabes, que numero es este, que la demanda pide. Para saberlo, pon que parece ser 12. añadiendole su mitad, que son 6. y su tercio, que son 4. y mas 9. montara todo 31. y tu quisieras que montara 60. do parece claro venir menos de lo que quisieras 29. Pues asienta el 12. que pusiste por numero falso, y adelante los 29. que vienen menos, como parece figurado 12. menos 29.

¶ Pon por el segundo numero 24. su mitad es 12. su tercio 8. y mas 9. todo junto montara 53. y porque quisieras que salieran 60. y no vienen sino 53. asienta los 24. que fue el numero supuesto, y adelante los 7. que vinieron menos, como parece figurado.

menos

12 ~~X~~ menos — 2724 ~~X~~ menos — 7

menos

Hecho esto multiplica en cruz. (como hiziste en elexemplo primero) los números falsos por sus diferencias, o errores contrarios, como son 24. por 29. y montaran 696. y 12. por 7. y montaran 84. Ponganse estas multiplicaciones adelante desta manera.

12	29 — 696
----	----------

24	7 — 84
----	--------

Y luego restaras la multiplicacion menor, q es 84. de la mayor que es 696. y quedaran 612. lo qual te sera particiõ. Resta mas las diferencias, o errores vno de otro, como son 7. de 29. y quedaran 22. lo qual sera partidõ, parte aora 612. por 22. y vendra al quociente 27. enteros, y nueue onzabos, y este es el numero demandado, como por la primera diferencia viste.

Vno fue a comprar carneros, y vistos los carneros que auia menester, y los dineros q lleuaua, hallo que si compraui cada carnero a 20, reales, le faltauan diez ducados, si los cópraui a 18 reales le sobranan seys ducados, pide se quantos eran los carneros que auia menester, y quantos ducados lleuaua? Pon por caso q los carneros que quiere comprar fuessẽ cincuenta, los quales

a 20. reales seran 1000. reales, y porque este precio le faltaron diez ducados, resta 110. reales, q̄ son los 10. ducados, de los 1000. reales, que valia todos, y restarã 890. reales, los quales guardaras. Asì mismo, si los carneros cõprara a 18. reales montarã 900. y porque a este precio dize que le sobrauan 66. reales, que son 6. ducados, junta- los con 900. y seran 966. reales. Pues si fuera ver- dad, que los carneros eran 50. esta suma auia de ser tanto como los 890. reales q̄ guardaste, an- tes parece que 966. que vienen a razon del se- gundo precio es 76. reales mas que el primero, pues por tanto pondras los 50. que tomaste por numero falso, y adelante los 76. que vienen de mas. Ya que no acertaste, pon otro numero fin- giendo, que los carneros fuesen 100. que paga- dos a veynte reales montan 2000. quitando los 110. reales por los diez ducados, que a este pre- cio dize que le faltauan, quedaran 1890. Pues si los compraste a 18. reales montarã 1800. y mas 66. reales, que le auian de sobrar serian 1866. y porque esta suma del segũdo precio no es igual con la suma del primer precio, antes es menor 24 por tanto pondras los 100. que tomaste por segundo numero falso, y adelante los 24. que sa- len menos de lo que quisieras, y quedara la figu- ra desta manera.

50	mas	76—7600
100	menos	24—1200

Hecho

Hecho esto multiplica en cruz los 100. por 76. y los 50. por 24. y fumaras las dos multiplicaciones, y montaran 880. la qual sera particion. Suma mas los errores, como son 76. y 24. y ferã 100. esto sera partidior, esto es lo que quiere dezir, mas y menoses fumar. Pues parte aora 8800 a 100. y vendran 88. por los carneros, que auia de comprar. Sabido esto, facil cosa es saber los dineros que lleuaua.

Vno hizo tres viages, en el primero doblò el dinero q̄ sacò de su casa. y gasto 12. ducados en el segundo tresdoblo, y gasto 7. ducados: en el tercero doblo lo que le auia quedado de los primeros viages, y gasto 9. al fin de todos 3. viages hizo cuenta que dinero tenia, y hallose con tres ducados, pidese, quanto sacò de su casa? Pon por caso que sacò 8. ducados, y porque en el primero viage, dize que doblo, luego hizo 16. gastò. 12. quedarleyan 4. con estos 4. passo al segundo viage a do tres doblo, luego hizo 12. gastò 7 que daronle 5. fue con estos 5. al tercero y doblo, hizo 10. gastò 9. quedole 1. y porque quisiera que le quedarán 3. parece claro venirle menos 2. de lo que quisiera. Pues asienta los 8. que se pusieron por numero falso, y delante los 2. que le fallan menos, como parece.

8. menos 2.

Prosigue con la regla, poniendo por caso que salio con 10. los quales doblandolos en el primero

meroviage hizo 20. gastó. 12. quedarley an 8. fue con 8. al segundo viage, a do dize, que tres do-
 blos laego hizo 24. gasto 7. luego quedaróle 17.
 fue con estos 17. al tercero viage, en el qual do-
 blo, y hizo 34. sacando 9. que dize que gasto, que
 daronle 25. y porque pide la demanda que le a-
 uian de quedar sino 3. luego sobranle 22. pues
 ponlos 10. que al principio tomaste, y adelante
 los 22. que salen mas, y multiplica en cruz (se-
 como en las precedentes has hecho) y quedara la
 figura desta suerte.

10 menos 2 — 20

22 mas 22 — 196

Suma agora las dos multiplicaciones, como
 son 20. y 196. y montaran 196. esto sera partiçio
 Suma mas los dos errores, como son 2. y 22. y fe-
 ran 24. estos 24. seran partidor (y esto es lo que
 quiere dezir menos y mas, es fumar) parte 196.
 a 24. y vendra 8. y vn sexto, y tantos ducados sa-
 co de su casa, como lo puedes prouar.

Tres tienen dineros, y dixo el vno a los dos:
 dadme la mitad de vuestros dineros, y con los
 que yo tengo tendre 20. ducados: el segundo pi-
 dio a los otros el tercio, y con los que el tenia,
 haria otros véynte ducados: el tercero pidio a
 los otros la quarta parte, y con los q̄ tenia haria
 otros 20. ducados, pido quãto tenia cada vno?
 Pó por caso q̄ el primero tenia quatro ducados,
 y porq̄ este pedia la mitad a los dos, para que co-
 los

los suyos hiziesse 20. sera menester, q̄ entre los dos tuuiesse 32. ducados, porque dando los medios, que son diez y seys, con sus 4. haga 20. Sabido que entre los dos tenia treynta y los ducados hemos de tener auiso, en partarlos entre estos 2. de tal suerte, que el segundo tambien haga numero justo, segun lo q̄ la demanda pidiere. Quiero dezir, que destes treynta y dos, pongamos, q̄ el segundo tiene 12. y el tercero los 20. porque el segundo pide la terea parte a los dos: ya este respetto, el tercero tiene 20. y el primero 4. juntos son 24. y el tercio es ocho, dandofelos al segundo, q̄ tiene 12. tambien hazeveynte como el primero. Y es auiso se ha de tener siempre, que si los compañeros faeron dos, el primero se ha de contentar: y si tres, como en este exemplo, el primero y segundo: y si quatro, los tres primeros, &c.

Boluiendo al proposito, si el primero, que tiene quatro, y el segundo, que tiene 12. (que entre ambos hazen 16.) dá la quarta parte, que son 4. al tercero, que tiene 20. haran 24. donde parece q̄ le sobrá 4. Pues porque no quiere mas de 20 como sus compañeros hizieren, por tanto assiéta lo que tiene cada vno destes tres, y adelante los 4. que salieron mas de la suerte que parece figurado.

4 12 20 mas 4

¶ Pues con estos numeros no acertaste, pon que el primero tuuiesse 8. y el segundo 14. y el tercero

S ro

ro 10. porque assi quedarã los dos primeros cõ-
tentos: porque si el segundo tiene 14. y el terce-
ro 10. entrambos hazen 24. donde la mitad, que
son 12. al primero que tiene 8. haze 20. como di-
ze el thema: assi mismo entre el primero y terce-
ro que tienen 18. dan el tercio, que son 6. al segũ-
do que tiene 14. hara tambien 10. Mas si el pri-
mero y segundo, que entre ambos tienen 22. dã
la quarta parte al tercero, q̄ son 5. y medio, y sus
10. que tiene, hara 15. y medio: y porque auia de
tener 20. como sus compañeros pondras los 3.
numeros, y adelante 4. y medio, que falta al ter-
cero de la suerte que parece.

4	12	20	mas	4
8	14	10	menos	4 ¹ / ₂

¶ Y por que vino quebrado, por euitarlo redu-
ze los 4. (que vinieron primero mas) en medios
y seran 8. Assi mismo reduce los 4. y el medio, to-
dos a medios, y seran 9. pon este 8. y el 6. en lu-
gar del 4. y del 4. y medio, como parece, y vsa de
ellos como si fue s̄en enteros.

4	12	20	mas	8
---	----	----	-----	---

8	14	10.	menos	9
---	----	-----	-------	---

Hecho

¶ Hecho esto, si quisieres ver lo que tiene el primero; multiplica el 4. y el 8. (que son los dos números falsos, que pusiste por el primero) por los 8. y 9. que fue lo que vna vez vino de mas y otra menos: como si estuuiessen solos, y lo que hallares, sera lo que el primero tenia. Assi mismo haras con los del segundo, y cō los del tercero, para saber lo que viene a cada vno, de arte que se hazen 3. multiplicaciones, assi como si fueren 3. falsas posiciones. Y hallaras, que tenia el primero 5. y $\frac{15}{27}$. abos, y el segundo 12. y $\frac{15}{27}$. abos, y el tercero 15. cinco y 7. abos, como se puede probar, segun lo que la demanda pide: y desta suerte haras las semejantes. Nota esta fuerza de estos dos numeros, y como siendo falsos se saca la verdad: a lo qual allude lo que dize Aristoteles. *Ex falsis sequitur verum: & ex veris nihil nisi verum.*

Capitulo XIII. Trata de finezas de oro, y plata, y sus aleaciones.

¶ Antes que se entienda la fineza, o ley de los metales, se ha de tener cuenta con el marco, y las demas pesas que en el se incluyen. Y assi digo, que vn marco pesa 8. onças, ò 64. ochauas, o 400. tomines, o 4800. granos. Otros diuiden las pesas desta manera.

Vn marco tiene ocho onças.

Vna onça tiene quatro quartas.

Vna quarta vale quatro ariencos.

Vnarienço treynta y dos granos.

¶ Estos pesos son comunes a la plata, y oro, saluo que en la plata no se tiene cuenta con castellanos, sino con el marco, y en el oro con todo, assi con marco, como con castellano, y las demas pesas.

¶ Vn marco de oro de 24. quilates, vale 23800. marauedis, que vale el castellano deste oro fino 516. marauedis. Y vn tomin 64. marauedis y medio, vn quilate 21. marauedis y medio, y el grano 5. marauedis y 3. ochauos de marauedi.

¶ El castellano de oro de 22. quilates vale 473. marauedis. El tomin 59. marauedis y vn ochauo El grano 4. marauedis y $\frac{1}{3}$. Y assi se podra saber de los demas oros.

¶ Ay en vn marco 288. granos de plata fina de 12. dineros de ley, y de plata de 11. dineros y 4. granos 268. de ley, que es lo mismo que 11. dineros y quatro granos.

¶ Salen de vn marco 67. reales, de ley de 11. dineros y 4. granos, como se fabra al presente, que son 268. granos.

¶ Vale vn marco de plata de 11. dineros, y 4. granos 2210. marauedis.

¶ Vale vn marco de plata fina de doze dineros 2374. marauedis, y $\frac{6}{3}$, abos de marauedi.

¶ Este fabir y baxar del valor del marco, procede, de fer la vna plata de menos dineros q̄ otra. Y assi digo, que mientras menos dineros vna
plata

plata tuuiere, menos valdra, y al contrario. Pe-
zo el dinero en qualquiera plata que se halle val-
dra lo mismo. Quiero dezir, que tanto valdra en
la plata fina, como en la mas baxa.

¶ Entēdido esto de los pesos, y sus valores, ante
que se den reglas, segun lo que se pretēde, decla-
rarse ha que cosa es oro fino, o plata fina, y que
quiere dezir oro de tantos quilates de ley, y pla-
ta de tantos dineros de ley. Para lo qual es de sa-
ber, que quilate, y dinero van a vn mismo fin, si-
no que el vno sirue al oro, y el otro a la plata. Di-
ziendo oro de tantos quilates de ley, que quiere
dezir oro de tātos quilates de fineza: y plata de
tantos dineros de ley. Y porque mejor sea entē-
dido, es de saber, que la fineza del oro esta assen-
tada sobre quilates, y el mas fino oro es de 24.
quilates, y la mas fina plata, es de 12. dineros: y
de esta suerte, quādo dizen oro de 24. quilates de
ley, has de presuponer, q̄ si el tal oro se diuidies-
se en 24. partes iguales, todas ellas es oro fino,
sin liga de plata, ni de otra cosa. De suerte, que si
vno dize tēgo 100. castellanos de oro de 24. qui-
lates de ley quiere dezir, que si diuides, o hazes
los ciē castellanos 24. partes iguales, todas ellas
seran de oro fino: y si dizen. Tengo cien castella-
nos, o otra qualquier cantidad de oro de 22. qui-
lates, quiere dezir, que si diuidieses los cien
castellanos en veynte y quatro partes iguales
las 2. dellas es de oro fino, y las dos q̄ faltā para

hasta veynte y quatro, es plata, o cobre, que es laliga, que al oro se acostumbra echar lo mismo se ha de entender en la plata. Si vno dize que tiene 20. marcos, o lo que quisieres, de plata de 12. dineros de ley, as de entender, que si latal cántidad de plata se hiziesse doze partes yguales, todas ellas sera plata fina. Y quando dizen plata de 7. dineros, entēderas q̄sila tal cantidad de plata (poca, o mucha la que fuere) se hiziesse 12 partes yguales, las 7. dellas sera plata fina, y las 5. que faltan de 7. hasta 12. seran cobre, que es la liga que con la plata se fuele mezclar.

Articulo I. De este Capitulo VIII. Trata de mezclar vnos oros diferentes con otros

¶ Vno tiene quatromarauedis de oro de 19. quilates de ley, y seys marcos de diez y seys quilates de ley, tiene mas doze marcos de veynte y dos quilates. Pido, si estastres diferēcias de oro se mezclassen en vno, a quantos quilates de ley vendra el marco. La qual se haze y sus semejantes, multiplicando cada diferencia de marcos por sus quilates. Conuienesaber, multiplicando los quatro marcos del primero oro por sus 19. quilates, que cada marco tiene de ley, y montaran 76. Afsi mesmo multiplica los seys marcos por sus 16. quilates, y montaran 96. Multiplica afsi mesmo los 12. marcos por sus 22. quilates, y monta-

montaran 264. Hecho esto, suma todas 3. multiplicaciones, como son 76.96. y 264. y montaran 436. los quales son los quilates q̄ valen los marcos de estos 3. otros. Suma aora los marcos como son 4.6. y doze, y montaran 22. por los quales partiras los 46. quilates, y vendra al cociente 29. quilates, y $\frac{2}{11}$. de quilate, y de tantos quilates diras que saldra el marco de ley de la dicha mezcla. Otro exēplo. ¶ Vno tiene 5. marcos y seys onças de oro de 24. quilates y 3. marcos, y 7. tomines de 22. quilates, tiene mas vn marco, y 2. onças y 4. ochauos, y 5. tomines, y tres granos de oro de diez y ocho quilates, hundiēdo todas estas tres diferencias de oro, en que quilates vēdra cada marco? La qual se hara y sus semejantes, reduziendo primero las pesas en granos, q̄ es la mas baxa pesa, de que en este exemplo se haze mencion: quiero dezir, que quando viniēron muchos pesos diferentes, que se reduzgan todos en el especie del menor peso, que viniere sea lo q̄ fuere. Pues porque en este exemplo la mas baxa pesa es granos, por tanto se reduzira todo el peso de estas tres diferencias de oros a granos. Pues reduce los 5. marcos, y seys onças del primero, multiplicādo los cinco marcos por 4800. que son los granos que vale vn marco, y montaran 24000. reduce mas las 6. onças a granos multiplicando por 600. que vale vna onça, y mōtarā 3600. los quales juntaras cō los 24000

que montaron los 5. marcos, y sera todo 27600 lo qual guardaras. Assi mismo reduziras lostres marcos y 7. tomines del oro segundo todo agranos: segun hizille en lo primero, y sera 14484. granos. Reduze mas el vn marco, y 2. onças, y 4 ochauos, y 5. tomines, y 3. granos todo agranos segun se ha hecho en lo de arriba, y sera 6363. granos. Y desta manera auras reduzido el pelo de todos 3. oros a granos. Hecho esto multiplicaras los granos de cada diferencia por sus quilates (quero dezir) q̄ multipliques los 27600. granos del oro primero por 14. que es los quilates que tiene, y montara 662400. lo qual guardaras. Multiplica assi mesmo los 14484. granos del segundo oro, por sus 22. quilates, y montara 318648. multiplica mas los 6363. granos del tercer diferencia de oro por 28. quilates, y montara 178164. suma aora estas 3. multiplicaciones, y montaran 1095582. lo qual sera particiõ. Suma mas los granos de todos tres oros, y montará 48447. y sera partidõ. Pues parte 1095582 à 48447. y cabran 22. enteros, y mas 8. $\frac{216}{49}$ abos. Y de tantos quilates saldran cada marco desta mezcla de los tres oros susodichos.

¶ Y no tiene diez Castellanos de oro de 14. quilates, y quiere sacar 3. Castellanos de oro de 24. quilates, pido quantos quilates quedaren en los Castellanos que quedaran? La qual haras, y sus semejantes, multiplicando los 10. Castellanos por

por sus quilates que son 14. y mōtaran 140. quilates. Assi mismo multiplicaras los 3. Castellanos que quisieres sacar, para la fineça que hã de tener que es veynte y quatro, y montara setenta y dos quilates. Pues resta 72. quilates de los 140. y quedaran setenta y ocho, los cuales quilates que quedan, partiras por siete Castellanos que quedaron, y vendran nueue quilates y cinco septimos. Y de tantos quilates sera el Castellano de los que quedaron.

¶ Vno tiene 15. castellanos de oro de 16. quilates y mezcla con ellos 11. castellanos de cobre. Pido de quãtos quilates sera la tal liga? La qual haras multiplicando los 15. castellanos por sus 16. quilates q̄ tienen de fineza, y montaran 240 parte 240. por la suma de todo el peso que son 26. castellanos, y vendran a la particion nueue, y tres 13. abos, y de tantos quilates quedara la mezcla de los 26. castellanos.

¶ Vno tiene 14. castellanos de oro, y no sabe de que ley son, y juntando con ellos doze castellanos de oro de veynte quilates, se tornò todo de diez y ocho quilates y 2. tercios de quilate. Pido de quantos quilates eran primero los dichos 14. castellanos? La qual se hara y sus semejãtes, sumando todos los castellanos que son catorze y 12. y montaran 26. los quales 26. se multiplicaran por la fineça que tienẽ que son 18. quilates, y dos tercios, y montara 485. y vn tercio. Assi

mismo multiplicaras los 12. castellanos que juntamente por su fineza, que fueron 20. quilates, y montarán 240, los quales restaras de los 485. y vn tercio, y quedarán 245. y vn tercio, y estos son los quilates que tenían primero los 14. castellanos que no se sabia de que ley eran. Para saber los quilates de cada castellano, parte 245. y vn tercio q̄ tienen todos catorze por los mismos catorze, y vendra a la particion 17. y 11. dozabos y de tantos quilates diras que eran de primero los catorze castellanos.

¶ Vno tiene 20. castellanos de oro de 17. quilates, demando quantos castellanos tiene de mezcla? Esta y sus semejantes se haze, mirando la diferencia que ay de 17. quilates para 24. que son 7. Sabido esto formarás vna regla de 3. diziendo Si vn castellano tiene siete quilates de cobre, ve ynte que tendran? Sigue la regla, y vendran 140 y estos son los quilates que ay de cobre, los quales partidos por veinte y quatro, que son los quilates que ay en vn castellano, vendra 5. y 30. dozabos, y tantos castellanos ay de cobre en los dichos ve ynte castellanos, y lo que faltare desto para ve ynte, que son 14. y 2. dozabos: es oro fino de ve ynte y quatro quilates.

¶ Vno tiene diez castellanos de oro, y no sabe de que ley son, mas poniendolos al fuego, se le tornaron en 8. castellanos de 20. quilates de ley demando que quilates tenía primero? Esta y sus semejantes

semejantes se hazen multiplicando los ocho castellanos en que se conuirtieron, por sus veynte quilates que sacaron de ley, y montará 160. parte por 10. castellanos que eran de primero, y védran 16. y tantos quilates eran primero, y tanto valen ocho castellanos de veynte quilates de ley como diez castellanos de 16. quilates.

¶ Vn platero puso al fuego 22. castellanos de oro de 14. quilates, y tornaronsele en 16. castellanos demando de que ley seran? Multiplica 22. castellanos por la fineza que tenian de primero que es 14. y montaran 308. parte por 16. castellanos vendra 19. y vn quarto, y de tantos quilates de ley diras que quedaron.

Articulo II. Deste VIII. Capitulo Muestra subir vn otro baxo, con oro mas alto en quilates.

¶ Vno tiene doze castellanos de acatorze quilates de ley, quiere subirlo a veynte y dos quilates con oro de veynte y quatro, demando quanto oro de veynte y quatro juntara con los doze castellanos de catorze quilates para que la liga valga veynte y dos: Esta y sus semejantes se hazen poniendo los doze castellanos y su ley que es catorze quilates, y adelante los veynte y dos, que es la ley que quieres hazer, y mas adelante los veynte y quatro, que es la ley de oro

oro cō que se ha de subir, como parece figurado

12

14

22

24

¶ Hecho esto, mira la diferencia q̄ ay de la ley que quieres subir, que es catorze, a la ley q̄ quieres hazer, que es veynte ydos, la qual diferencia es 8. Multiplica los doze Castellanos por este ocho, y seran 96. esto es partició. Mira mas la diferencia que ay del 22. que es la ley que quieres hazer a 24. que es la ley del oro con que has de subir, y sera dos: los quales te serā partidior. Parte 96. por dos, y vendra a la particion 48. y tantos castellanos de oro de 24. quilates mezclaras con los doze castellanos de catorze quilates, y quedara vna liga de 60. castellanos de 22. quilates. Y la prueua es clara, porque tanto valen 60. castellanos de 22. quilates, como 48. castellanos de a 24. y 12. de a 14.

¶ Otro exemplo. Vn platero tiene dos marcos y vna onça y tres ochauas, y 2. tomines, y quatro granos de oro de 15. quilates de ley, quiere subir lo a veynte y dos quilates con oro de 24. Pido quāto oro de 24. mezclara. Reduze primeramente los dos marcos y vna onça, y todo lo demas a granos, y montará 11353. granos, los quales pōdras en figura, poniendo adelāte sus 15. quilates de ley. Hecho esto mira la diferencia que ay de 15. quilates a 22. q̄ es la ley q̄ quieres hazer, y hallaras ser siete, por los quales multiplicaras los 11353. granos, y montará 79471. y serā particion.

cion mira mas la diferencia que ay de 22. a 24. que es la ley del oro con que has de ligar, y hallaras ser dos, los cuales te seran partidos: pues parte los 79471. por 2. y vendra al cociente 39735. y medio: y assi diras, que sera menester mezclar 39735. granos y medio de oro de 24. quilates.

*Artic. III. deste VIII. cap. Muestra baxar oro al-
to con mas baxo, o con liga.*

¶ Vno tiene 48. marcos de oro de 24. quilates quiere baxarlo a ley de 22. con oro de 14. quilates. Pido quantos marcos de oro de 14. quilates mezclara con los 48. marcos de 24. quilates, para que la liga que quedare sea de 22. La qual se haze y sus semejantes, mirando la diferencia q̄ ay del oro de 24. que quieres baxar al oro de 22. que quieres hazer, y sera 2. los cuales multiplicaras por los 48. marcos de oro q̄ quieres mezclar y montara 96. estos seran particion. Miramas, que diferencia ay de 22. q̄ son los quilates de la ley que quieres hazer a catorze quilates, q̄ es el oro con q̄ has de mezclar, y sera 8, estos seran partidior? Pues parte 96. que dixes que guardasses por 8. y vendra al cociente doze, y tantos marcos de oro de catorze quilates mezclaras con los 48. marcos, para que queden todos ellos de veinte y dos quilates. En lo demas haz como en articulo precedente, pues este es su contrario.

Vno

¶ Vno tiene 19. marcos de oro de 24. quilates: y quiere baxarlo a 22. quilates con liga (que es cobre) Pido quantos marcos de cobre pondra con los diez y nueue de oro de veinte y quatro. para que la mezcla que quedare tenga 22. quilates de ley? Sigue la regla en que saques la diferencia q̄ ay de veynete y quatro, que es la ley del oro que quieres baxar a los veynete y dos, que es la ley q̄ procuras hazer, y sera dos: los quales multiplicaras por los 19. marcos, y montara 37. esto sera particion. Mira mas que diferencia ay de veynete y dos, que es la ley que quieres hazer a la ley del cobre con que has de mezclar, y porque el cobre no tiene ninguna ley, diras. La diferencia de 22. a zero es veynete y dos, por los quales 22. partiras los 38. y vendra a la particion 1. y 8. onzabos, y tantos marcos de cobre, o liga, pondra con los 19. marcos de oro de veinte y quatro, para la mezcla que quedare, sea de 22. quilates.

Art. IIII. deste VIII. cap. Muestra bazer de muchos oros diferentes, cierta ley y cierto peso.

¶ Exemplo. Vno tiene liga, y cinco diferencias de oros: conuiene saber oro de doze quilates, oro de 16. y de diez y ocho, y de veynete y dos, y veynete y quatro, y quiere tomar de cada oro, y dela liga tanta cántidad, q̄ pueda hazer 110. castellanos de 15. quilates de ley, pido quánto se toma

ra de la liga, y quanto de cada diferēcia de oros
 La qual se haze poniendo la ley de la liga, que
 o, que quiere dezir, ninguna cosa, y adelante las
 otras leyes de los de mas oros, y encima de to-
 do los 170. castellanos, q̄ quieres sacar, y sus 15.
 quitales, que han de tener debaxo, como adelá-
 te parecera figurado.

¶ Mira aora la diferencia q̄ ay de la ley de la li-
 ga que es 0, a la ley que quieres que salga, que
 es quinze, y seran los mismos quinze, los quales
 quinze pondras sobre el oro de veynte y quatro
 Y lo mismo se hara con los demas oros. Quiero
 dezir 12. que se cotejen sus leyes, con los quinze
 q̄ es la ley que quieres hazer, y ponerlas todas
 sobre el 24. q̄ es la ley del oro mas alto. Nota,
 oro alto llamo al q̄ tiene mas quilates, q̄ el oro
 que pretendes hazer, y baxo es aquel, que tiene
 menos quilates que la ley que pretendes hazer.
 Entendido esto, mira la diferencia q̄ ay del oro
 mas alto, que es veynte y quatro quilates, al oro
 que quieres hazer, que es quinze, y seran nueue,
 los quales nueue pondras sobre la liga, que es el
 zero, y desta manera aura trocado la liga su dife-
 rencia con el oro mas alto, y al contrario, el oro
 alto con la liga. En lo qual siempre tendras au-
 so, que si el oro alto trocare con el baxo, el mis-
 mo baxo ha de trocar con el alto.

¶ Prosigue, mirando la diferencia q̄ ay de la ley
 del primero oro que es 12. quilates, a la ley que
 quie-

quieres hazer que es 15. y fera 3. los quales 3. pōdras sobre la ley del 21. Afsi mismo mira la diferencia de 21. a 15. y hallaras ser 6. los quales pondras sobre el oro de 12. Y assi auran trocado diferencias el oro de 12. con el oro de 21. Passa al segundo oro. q̄ tiene 16. quilates, y mira su diferencia con el oro de 15. que quieres hazer, y fera 1. el qual vno lo puedes poner sobre la liga, o sobre el oro que quisieres de los mas baxos, por razon que este oro de 16. es mas alto que la ley q̄ quieres hazer, y por tanto se ha de cargar su diferencia al oro que sea mas baxo que la ley que quieres hazer, ya sea oro, o liga, con tal que la liga, o oro trueque su diferencia con el, como hemos dicho. Pues en este exemplo, yo la quiero cargar a lá liga, mira que diferencia ay de la ley de la liga, que es zero, a los quinze que quieres hazer, que son los mismos 15. y ponlos sobre el oro de 16. y assi auran trocado la liga con el oro de 16. y el mismo de 16. con la liga. Y assi te passaras al tercero oro. q̄ su ley es 13. y miraras q̄ diferencia ay de 13. a 15. que quieres hazer, y hallaras ser 3. y porque es oro alto pōdras estos 3. sobre el oro mas baxo, que es 12. quilates (aũ que tãbien lo podras añadir sobre la liga) Mira la difencia de 12. para 15. q̄ es el oro que quieres hazer, que tambien es 3. y ponla sobre el oro de 12. Y assi auran trocado todos los oros vnos con otros, como parece figurado.

110.

1. 3.

9. 6. 15. 3. 3. 15.

Leyes. 9. 12. 16. 18. 21. 24.

15.

¶ Hecho esto, sumaras lo que tiene cada ley en cima de si, y porque sobre el oro de 24. ay 15. y sobre el de 21. ay 3. y sobre el de 18. otros 3. y sobre el 16. ay 15. y sobre el oro de 12. ay 9. y sobre la liga ay 10. Ordenaras vna regla, diziendo. Seys hazen compania (que los 5. oros, y la liga) el vno que es la liga pone 10. el otro (que es el oro de 12. quilates) pone 9. el tercero (que es oro de 16 pone 15. el quarto y quinto que son los dos otros el vno de 18. el otro de 21. cada vno dellos pone 3. el sexto (que es oro de 24) pone 15. ganaron 110. que es el peso de los castellanos, que quieren hazer, pido, &c. Sigue la regla, y lo que viniere a cada vno por ganancia, sera la cantidad de castellanos, q̄ se han de tomar del mismo oro, y assi hallaras, q̄ de la liga se tomaran 20. castellanos, y del oro de 12. quilates 18. castellanos, y del oro de 16. treynta castellanos, y del oro de 18 seys castellanos, y del oro de 21. otros seys castellanos, y del oro de 24. treynta castellanos, y de esta suerte se haran las semejâtes, porq̄ como dize el conmetador del Pphilosopho, *Fruita sit per plara, quod potest fieri per pauciora.*

T

Arti-

Articulo V. de ste VIII. cap. Trata las aleaciones de la plata.

¶ Las mismas reglas y auisos, que se han dado en las ligas del oro, se tendra en la plata. Porque en otra ninguna cosa difiere lo vno de lo otro, sino q̄ en el oro dezimos quilates de fineza, aqui diremos dineros. En el oro se tiene cuenta con castellanos y marcos, y onças, aqui con marco, y onça, &c.

¶ Nota bellon dizen a vna mezcla q̄ hazen mezclando con vn marco de cobre, cinco granos y medio de plata de onze dineros, y quatro granos de ley hazen desta los quartos y blancas.

Art. VI. de ste VIII. cap. Muestra mezclar mercaderias, de la suerte que se baze en el oro.

¶ Dela misma suerte que hemos mostrado mezclar oros, se puede hazer en vinos, ceras, lanas, trigo, y otras cosas que se vsan mezclar, como en la platica deste exemplo se entendera.

¶ Vno tiene cera que vale 80. m̄s la libra, y otra que vale a 50. marauedis, quiere mezclar ciertas libras de la vna y de la otra, y que valga a sesenta cada libra. Pido quanta cantidad tomara de cada suerte? La qual se haze desta manera. Que mires que diferencia ay de 50. marauedis, que vale vna libra de la vna suerte, a los 60. que quieres que valga, y fera 10, los quales

CAPITULO VIII.

291

pondras sobre el 80. Mira mas, que diferencia ay de 80. que es el precio de la otra ceta a los 60 que es el precio que quieres hazer, y sera 20. los quales pondras sobre los 60. y desta manera aurã trocado diferencias el 50. con el 80. y al contrario. Y assi entenderas, que mezclando 10. libras de la de 80. con 20. de la de 50. se hara vna mezcla de 30. libras que valdra a 60. cada libra. Y la prueua es, que tanto valdran 30. libras a 60. mtrauedis, como las 10. a 80. y como las 20. a 50.

20		10
50	60	80

¶ Otro exemplo. Vno tiene 4. diferencias de las, conuiene saber, vna suerte que vale el arroba a 12. reales, y otra que vale a 21. otra a 24. otra a 27. quiere destas 4. diferencias mezclar de vnã y otras, y haze 200. arrobas, q̄ valga cada arroba a 19. reales. Pido q̄ cantidad ha de tomar de cada suerte? La qual haras y sus semejantes por la regla, q̄ dimos en el oro, arti. 4. de hazer cierta ley y peso, q̄ es assentar los valores o precios destas 4. suertes de lana, poniendo encima los 200. q̄ son las arrobas, q̄ quieres hazer, y debaxo dos 19. reales (q̄ es el precio q̄ ha de valer cada arroba) como parece.

	200			
12	21	24	27	
	19			

¶ Ahora mira la diferencia, que ay de 12. reales que

que vale la mas baxa, a los 19. que es el precio, q̄
 quieres hazer, y sera 7. los quales cargaras a los
 27. q̄ es el precio de lamas alta lana. Assi mismo
 mira que diferencia ay de los 27. a los 19. y ha-
 llaras ser 8. los quales pondras encima de los 12
 porque truequen diferencias los precios mayo-
 res con los menores. Mira mas, que diferēcia ay
 de 21. que es el precio de la segūda lana, a los 19
 q̄ es el precio de la lana, q̄ quieres hazer, y seran
 2. los quales pondras sobre los 12. q̄ es el precio
 mas baxo, y los 7. que ay de diferēcia de 12. à 19
 ponlos al 21. Assi mismo mira la diferencia q̄ ay
 de 24. (que es precio de la tercera lana) a los
 10, que quieres hazer y sera 5. las quales carga-
 ras tãbien sobre el 12. y los 5. q̄ ay de diferencia
 de 12. à 19. ponse los al 24. y desta manera auran
 trocado los precios mayores, cō el precio menor
 y precio menor cō todos los mayores. Aqui lla-
 mo precio menor el que es menos que 19. (que
 es lo que quieres hazer) y mayor al que es ma-
 yor, como mejor se declarò en las reglas precia-
 dentes, y quedara la figura desta manera.

5		200		
2				
8	7	7	7	
12	21	14	27	
		19		

Después de hecho esto ordenaras vna regla de
 cōpañia diziēdo. Quatro hazē cōpañia, por razō
 q̄ son 4. diferēcias de lanas, el primero pone 15. q̄
 es todo lo q̄ está sobre el 12. y los otros 3. ponē a
 7. cada vno, como en la figura parece, hã de par-
 tir 200. (q̄ son las arrovas, q̄ quieres hazer,) Pi-
 do q̄ le viene a cada vno? Sigue la regla de cōpa-
 ñia sin tiēpo, y lo q̄ viniere a los 15. serã las arro-
 bas q̄ se hã de tomar de lana de 12. reales, y lo q̄
 viniere a cada vno de los otros, serã de las arro-
 bas q̄ se hã de tomar de cada vna diferēcia de las
 otras y hallaras, q̄ salē a los 15. 38. ²/₃ y tãtas arro-
 uas tomaras de lana de 12. reales. Y de cada vna
 de las otras diferēcias se hã de tomar 38. ⁸/₉ y su-
 madas todas las arrobas q̄ se tomarē destas 4. di-
 ferēcias, mōtarã 200. y valdrã a 19. reales la arro-
 ua. Y la prueua esclara, porq̄ tãto valē 200. arro-
 uas a 19. reales, como 38. arrovas, y 1. tercio a 12
 reales, y como 83. y 8. nouenes arrobas a 21. rea-
 les, y como 38. ²/₃ arrovas a 24. y como otras. 38.
⁸/₉ arrovas a 27. porq̄ lo vno, y otro mōtarã 3800.
 reales. Y desta manera mezclaras y haras de o-
 tras qualesquiera mercadurias. Otro exemplo,
 vno tiene 3. açumbres de miel q̄ vale el açũbre
 a 100. marauedis, tiene mas otras tres açumbres
 de otra miel, q̄ vale a 50. marauedis, tiene otras
 4. açumbres, que valē a setenta y 5. marauedis.
 Junto toda esta miel en vna, de suerte que hi-

zo de todas diez açumbres, pidefe a que precio valdra el açumbre desta mezcla, segun loque cada vna valia primero ? La qual haras como se mostrò en el articulo primero de mezclar oros. En que multiplicaras las açumbres por sus precios, quiero dezir las tres açumbres que valian primero a cien marauedis, y montaran trecientos, y las otras tres açumbres a cinquenta cada vna valdran ciento cinquenta, y las quarto açumbres a setenta y cinco marauedis valdran 300. suma aora estostres precios, como son 300 y 150. y 300. montara todo siete cientos cinquenta los quales partiras por las diez açumbres q̄ son todas juntas, y vendran a la particion 75. y a tantos marauedis valdra el açumbre de la dicha mezcla. Nota lo que has hecho en miel, que lo mismo haras en otras cosas, como vinos, azeytes, &c. ¶ Y por esta orden podras saber todo medicamento en que grados es frio, o calido, segun la cantidad de su peso, y grados de los simples de que se hizo. Y assi acabo, quanto a este terçero libro.

Fin del terçero libro.

TRATA ALGVNAS REGLAS
de Geometria practica, necessarias
para el medir de las here-
dades.

Para entendimiento de lo que en este libro se
trata, es menester tener noticia del quarto
capitulo del libro septimo.

CAPITVLO PRIMERO.

Define la Geometria.

GEOMETRIA (vna de las ar-
tes Matematicas) es ciēcia, que
trata dela medida dela tierra (co-
mo la Ethymologia de su nōbre
declara) sus primeros inuētores
(como Herodoto, y Pōponio re-
fieren) (fueron los Egypcianos, por la necesi-
dad que estos tuvieron a causa de las crecientes
del Rio Nilo. Su fundamento es punto, linea, su
perficie, y cuerpo.

¶ Punto es vna cosa imaginaria, que no ocupa
lugar: finalmente punto es vna cosa tan peque-
ña, que no se puede diuidir en partes. De flu-
xo deste punto, que corre de vna parte a otra,
se haze la linea, que en Español dezimos raya, y
es vna cosa tan pequeña: porque vltra de que es
T 4 larga,

larga no ay cosa por delicada que sea, que no tēga mayor grosseza, y latitud. Sus extremos son dos puntos. Esta linea se diuide en recta, y curua linea: recta es la que va por mas breue camino de vn termino a otro, o de vn ponto a otro. Linea curua es la que no va por el mas breue camino. Del fluxo de la linea, que va de vna parte a otra, de traues, resulta la superficie, que es la haz o lado del cuerpo, muy mas sutil que pan de oro batido, porque la superficie, no tiene mas de ser ancha, y larga, sin profundidad, sus extremos son las lineas. Esta superficie es en 3. maneras, plana, concaua, y conuexa. Superficie plana es vna breuissima extension de vna linea a otra, quedādo las lineas por sus extremos. Figurate assi.

¶ La concaua, y conuexa, se declara en esta figura por la parte do està la A. se dize conuexa, por do està la B. concaua.

¶ Del fluxo de la superficie, que cerre de lo alto abaxo, o de abaxo al alto, resulta la figura que llamamos cuerpo: porque entonces es largo y ancho y profundo sus extremos es la superficie. Figurate assi.

Cap. II. De las figuras Geometricas.

¶ Figura de Geometria, es vna cosa, que es contenida de vno, o mas terminos. Termino dezimos el fin de qualquiera cosa. Dize contenida de vn termino el por circulo.

¶ Circulo es vna figura llana, hecha de vna linea la qual se dize circunferencia, en medio del qual está vn punto, que se dize centro del circulo, del qual todas quantas lineas fueren echadas hasta la circunferencia, son yguales.

¶ Nota, que la linea redonda con que se demuestra el circulo, se dize circunferencia, que se declara con a. b. e. f. Y la area, o superficie que abraça esta linea, es el circulo, que se denota por la c. d. El circulo es la primera de las figuras Geometricas, y mas noble y capaz.

Vide
Ari. li.
2. de cos
lo
mudo.

¶ Diametro se dize la linea recta, que passa por el centro del circulo, y tocando a la circunferencia de vna parte y otra, diuide el circulo en dos partes iguales como por la figura parece, y declarase por la a.b.

¶ Semicirculo es vna figura llana cōtenida del diametro de vn circulo, y la mitad de la circunferencia.

Semi

circulo.

¶ Portio circuli dezimos a vna parte del circulo mayor, o menor, que la figura que dezimos micirculo. La que fuere mayor, se dize portio maior, y la que fuere menor, portio minor.

Portio
maior. Portio
minor.

¶ Figus

¶ Figuras rectilíneas, son aquellas que constan de líneas rectas, de las quales vnas son dichas triangulos, porque son cōtenidas de tres líneas. Otras son dichas quadrilateras: porque tienen 4. líneas. Otras se dizen Multilateras: porque tienen mas de 4. líneas.

¶ De las figuras de 3. lados, vnas son de yguales lados, otras de dos yguales, y vno desigual, otras son todas desiguales.

¶ Destas figuras de 3. lados, vnas son dichas Orthogonias: las quales tienen vn angulo recto otros se dizen Ambligonias, y tienen vn angulo obtuso. Otros se dize Oxygonias, las quales tienen tres angulos acutos.

¶ De

¶ De las figuras de 4. la dos, vna se dize quadra
do, y es vna figura de 4. lados yguales, y sus an-
gulos son rectos.

¶ Otra figura se dize Tetragonus, o Paralelogra-
mo, porque sus angulos son yguales, y los lados
desiguales.

¶ Otra se dize Helmuayn, es vna figura de ygua-
les lados, y desiguales angulos.

¶ Otras figuras ay semejantes ala que dezimos
Helmuayn, que sus angulos y lados son desigua-
les y los angulos opositos son yguales.

¶ Ultra destas figuras de quatro lados, todas las demas q̄ fueren semejantes a ellas, se diran. Helmarife. Como dize Euclides enel primero

¶ Nota a cerca destas figuras, que la que mas se allegare a la circular es mas capaz, que la que se apartare, y de aqui viene a dezirse, que la figura redonda es muy capaz. Puede se prouar esto romando quatro tablas de caxero, q̄ sean yguales en latitud y longitud, digo que si vna destas tablas se hiziere vna caxa de 3. esquinas, como el triangulo, y de otra vna de quatro, y de la tercera vna de 5. y de la vltima vna redonda, si se midelo que cada vna cabe, hallaras caber mas la de 4. esquinas, que la de 3. y mas las de 5. que la de 4. y mas la redonda que otra alguna.

¶ Línea perpendicular, es aquella, que cayendo sobre otra linea, los angulos que causare con la otra son yguales.

Capitulo III. Muestra la orden de medir tierras.

¶ Es vna tierra redonda, la qual tiene de circunferencia 44. varas: Demando, que tendra de diametro? Para saber esta, y sus semejantes, tédras por regla general, que la proporcion de la circunferencia a su diametro es tripla sexquiseptima, y al contrario del diametro a su circunferencia, es subtripla sexquiseptima. Entendido esto, tomaras dos numeros (qualesquiera que
qui-

quisieres que se aya el vno con el otro en la misma proporción, ssi como 22. es 7. Di por regla de 3. Si 22. dan 7. quedarán 44. (que es la circunferencia desta tierra.) Multiplica 7. por 44. y montarán 308. parte por 22. vendrá 14. y tanto tendrá esta tierra por diametro. Los quales 14. están con los 44. en proporción subtripla sexquiseptima, como está 7. con 22.

¶ Y al contrario, si por el diametro quisieres saber la circunferencia, como si dixessen, es vna tierra redonda, la qual tiene por diametro 14. pido que tendrá de circunferencia? Di por regla de 3. Si 7. dan 22. quedarán 14. multiplica 22. por 14. y montarán 308. Parte 308. a 7. y vendrán 44. (que es la circunferencia, como arriba dixé) y así sabrás los ladrillos que tiene vn arco sabiendo los de su diametro, y al contrario. ¶ Es vna tierra redonda, la qual tiene 88. varas de circunferencia, y 28. de diametro, pido quantas varas vendrá quadradas toda esta tierra. Toma la mitad de la circunferencia (que son 44.) y la mitad del diametro (que son 14.) multiplica 44. por catorze, y vendrá al producto 616. y tantas varas quadradas

das aura en la tierra. O multiplica la circunferencia por su diametro, y del producto saca la quarta parte, y esta quarta parte sera la quadratura del redondo, y si quisieres reducirlo a vn quadrado de toda la area, y lo que viniere sera el lado del quadrado.

¶ Es vna tierra en figura que dicen Paralelogramo, que tiene quatro varas por vna parte y 9. por la otra, como parece. Pido quantas varas tendra

su area? Multiplica vn lado contrario por otro, como son 4. por 9. y el producto sera la area. Nota si desta figura quisieres hazer quadrado para saber quanto ha de tener por cada lado sacaras la rayz quadrada de toda la area, y lo que viniere sera el lado del quadrado, que se puede de la tal figura hazer.

¶ Es vna tierra triangular, sus 3. lados son notos, porque por vna parte tiene 7. tamaños, y por la

nota

oro 10. y por la otra 14. pide se, quanto tendra toda la tierra? Para hazer esto cō facilidad, has de saber. La linea perpendicular q̄ demuestra a. b.

¶ Y la regla que se ha de tener para la perpendicular (como muestra Euclides en la 13. del segundo) es multiplicar los lados del triangulo por si y montaran 241 , 100 , 196 . Despues suma las dos multiplicaciones mayores, como son 100 . 196 . y seran 296 . destos quita la menor (que es 49 .) y quedaran 247 . destos 247 . saca la mitad, que son 123 . y medio, y partelo por el basis del triangulo quiero dezir por el lado mayor (que es 14 .) y vendra 8 . y tanto tiene la linea b. e. Y lo que falta de 8 . y 23 . 28 . abos, para hasta 14 . que tiene el lado mayor) que es 5 . y 5 . 28 . abos, es lo q̄ tiene la linea b. d. Ahora para saber la linea a. b. que es la perpendicular, multiplica 5 . y 5 . 28 . abos por si, y montaran 26 . 641 . 784 . abos. Despues multiplica por si 7 . y serā 49 . Resta la mayor de lo menor, como son 26 . y 641 . 784 . abos de 49 . y quedaran 22 . y 143 . 784 . abos La rayz quadrada destos 2 . y 143 . 784 . abos es la longitud de la perpendicular. La qual sabida multiplicada por la mitad del lado

mayor, fabras la area del triangulo. Tambien se puede medir el triangulo, siendo notos sus lados sin perpendicular: como si dixessen, es vn triangulo, que por vn lado tiene 26. y por otro 30. y por otro 28. como parece: pregunto que tẽdra por area?

Geome
tria nõ
suppo-
nit fal-
sa Ari-
thmet.
libr. 1.
poste-
riori.

¶ Suma los 3. lados: y montaran 84. toma la mitad (que es 42.) destos 42. quita los lados cada vno por si, quiero dezir, que de 42. quites 26. y quedaran diez y seis, y quitando 28. quedan 14. quitando 30. quedan 12. estas tres restas, como son 16. 14. 12. multiplicaras vnas por otras, diciendo 16. vezes 14. montará 224. otra vez multiplica 224. por 12. y seran 2688. Multiplica otra vez por la mitad de la suma de todos los tres lados, que son 42. y montará 112896. Saca la rayz quadrada, que son 336. y tanto tiene de area este triangulo.

¶ Nota si quisieres hallar la perpendicular de vn triángulo equilatero, saca de la potencia de vn lado, la potencia de la mitad del mismo lado, y la rayz quadrada de la resta es la perpendicular. Si quisieres despues que has sabido la perpendicular

Lee el
4.º. del
7.º. lib.

lar devn triägulo equilatero, saber por lamisma perpendicular el lado del triangulo, multiplica el perpendicular por si mismo, y añadele la tercera parte del mismo producto, y la rayz quadra da de todo sera el lado del triangulo.

¶ Entédida la ordé del medir circulo, yquadrado, y triangulo: resta dar exemplo de medir vna heredad. Para lo qual pongo por caso q̄ estuuief se envna tierra a do 500. estadales quadrados hiziesēvna hanega de sēbradura, yel estadal fuef se de 9. quartas de largo, yq̄ quieres medir vn pedaço de tierra, el qual tiene 100. estadales de largo, y 40. de ancho, para saber quātas fanegas de sembradura cabe. Multiplicaras los 100. por los 40. y mōtaran 4000. ytātos estadales quadrados tendra la tal tierra. Parte aora estos 4000. por 500. que son los estadales quadrados dela hanega, y vendran al quociente 8. y tantas hanegas de sembradura tendra esta tierra. Nota en qualquiera tierra, te informaras que estadales quadrados ocupa vna hanega de sembradura.

¶ Nota de qualquiera suerte, o figura que fuere la heredad q̄ huieres de medir, procuraras reduzirla aquadrados, pocos, omuchos, diuidiēdo la en partes grandes, o pequeñas, como mas te agradare, o a triangulos, y despues sigue la regla de la figura que hizieres.

¶ Puedes medir alturas por la sombra. Como si dixessen, es vna torre, q̄ haze de sombra 10. varas

en cierto tiempo, demando quántas tédra de altura? Para saberlo, tomaras vna vara pequeña, o grã de, segun quisieres, con tal que tégas cierto que tanto tiene de largura, y pongo por caso, que fuesse de vna vara, hincala en el suelo, y mira q̄ cantidad de sombra causa el Sol en la vara: põgo por exemplo q̄ haze 3. palmos de sombra, ya que sabes la sombra desta vara, y su altura, mira en que proporcion està la sombra con la misma vara, y hallaras que espropotcio n subsexquitercia, pues la misma proporcion estara la sombra de la torre con el altura dela torre. Mas sino supieres proporcionar los numeros, hazla por la regla de 3. diziendo. Si 3. palmos de sombra vienen de 4. de altura que tiene la vara, demando 40. palmos (que son las diez varas de sombra de esta torre) de do vendrà? Multiplica 4. por 40. y seran 160. parte por 3. y vendran 53. y vn tercio. Y tantos palmos de altura tendra la torre, y assi se mediran otras qualesquiera alturas.

¶ Para saber la anchura de vn rio, tomaras vna vara de tu altura, y miraras desde la vna orilla a la otra estãdo en pie por encima de lo alto dela vara, y baxãdo el bonete sobre los ojos, de arte q̄ no puedas ver mas tierra q̄ la otra orilla, y quando assi huuiere seuilado lo mejor q̄ pudieres bolueras el cuerpo, arrimandote al baltõ, o vara sin alçar los ojos, ni menear la cabeça, y echaras ojos en la planura de la tierra q̄ estuuiere desta

parte del rio, ytãto como nauiere desde tus pies a la tierra q̄vite, tãto sera la anchura del tal rio.

¶ Es vna sala, que tiene de largo 14. pies, y de ancho 10. ha se de enladrillar cõ vnas piedras, o ladrillos, q̄ cada vno tiene de largo 2. tercios, de pie, y de ancho medio pie. Pidese quãtos seran menester? Multiplica los 14. q̄ son los pies de largo por sus diez del ancho, y seran 140. y tantos pies quadrados aura en toda la sala. Afsi mismo quadraras el ladrillo, multiplicando el largo que es 2. tercios por su anchor, q̄es medio y montara vn tercio, y tanto sera la quadratura de cada ladrillo. Aora parte 140. a vn tercio, y v̄dra al quociente 420. ytãtos ladrillos, o piedras de su tamaño seran menester para toda la sala.

¶ Vno quiere hazer vna pared de veynte varas en largo, y de alto nueue, y de grueso dos, y ha se de hazer con ladrillos, o piedras iguales, que cada vna tenga de largo 3. quattos de vara y de ancho media, y de grosseza vn quinto de vara.

Pido quantas piedras seran menester para toda la pared? Multiplica el largo, y anchor, y grosor de la pared, vno por otro, diziendo 20. vezes 9. son 180. otra vez 180. vezes 2. son 360. y tantas varas quadradas aura en toda la pared. Afsi mismo multiplicaras el largo, y anchor y grosseza de vna piedra vna por otra, diziendo 3. quattas vezes medio mont an tres ochauos, multiplica 3. ochauos por vn quinto, y seran 3. quarentabos

bos. Parte ahora los 36. por 3. quarentabos, y vendran al quociente 4800. y tantas piedras seran menester para la pared.

¶ Porque hemos impresso libros, que tratá cūplidamente de Geometria, no dezimos aqui mas desto, que pertenece al medir tierras.

LIBRO QVINTO,
T R A T A D E
 ARISMETICA ESPE-
 culatiua.

¶ Para mayor inteligencia de lo que en este libro se trata, lee el tercero, y quarto, y quinto, y septimo, y nono, y quinzeno capitulo del libro septimo.

CAPITVLO PRIMERO.
Divide, y define lo que este libro trata.

E las cantidades vna es continua, que es dicha magnitudo. Otra discreta, que se dize numero, o multitud. De la magnitudo, vna se dize immobilis, de la qual trata la Geometria, otra mobilis, de la qual trata la Astrologia. De los numeros, o multi-

multitudo, de lo qual trata el Arismetica, ay dos partes. La vna se dize practica. La otra especulatiua, o theorica. La practica muestra la inuencion de los numeros en las cosas contadas, como se tratò en los tres primeros libros deste volumen. Theorica, o especulatiua, trata la naturaleza del numero, y de su definicion, y diuision y comparacion. De todo lo qual se ha de tratar aqui.

Articulo I. Del numero par.

EL numero generalmente se diuide en par, y impar. Numero par es, vn numero q̄ se puede diuidir en 2. partes iguales, sin fraction de la vni-
dad. Assi como diez, que se diuide en dos cin-
cos. Otros lo difinen, diziendo. Numero par es
el que se puede diuidir en partes pares, y en im-
pares. Assi como diez se diuide en siete. y 3. o. 9.
y vno. o. 6. y 4. o. 8. y 2. De las quales definicio-
nes carece el numero impar. Como en su lugar
se dira. Deste numero que dezimos par, ay tres
especies conuiene saber, pariter par, pariter im-
par, impariter par. Numero pariter par, es todo
numero, que se puede diuidir en dos pares par-
tes, y cada vna destas partes en otras dos pares,
cada vna destas segundas en otras dos, hasta lle-
gar a la vni-
dad. Assi como diez y seys, que se di-
uiden en ocho, y ocho, y cada vna destas en qua-
tro, y quatro, y estas en dos, y dos, estas tercias,
en vno, y vno.

¶ Estos tales numeros se engendran, començãdo de la vnidad, y procediendo augmentando en dupla proporcion. Afsi como 1. 2. 4. 8. &c. Cada vno destos, excepto la vnidad, se dize numero pariter par. Estos numeros tienē ciertas propiedades. La primera. Todas sus partes aliquotas son numeros pariter pares, sacando la vnidad. Exēplo, 16. es numero pariter par, sus partes aliquotas, q̄ son 8. y 4. tambien lo son, y aun sus mismas denominaciones, porque 8. diezma do dos vezes, haze diez y feys, el dos es denominaciō, y es pariter par. Afsi mismo, 4. es quarta parte de 16. la denominacion dela qual, q̄ es quatro es numero pariter par. Parte aliquota es numero q̄ tomãdo algunas vezes haze justamēte su todo, que es el numero de do la tal parte se nombrare ser parte aliquota. Exemplo 10. tiene por parte aliquota al dos, porque tomãdo estos dos cinco vezes, hazen diez, tiene mas por parte aliquota al cinco, porq̄ dos cincos hazē 10. Tiene la vnidad, porque a ningun numero falto de ser parte aliquota, y no rendra al tres, porque ningunas vezes se podra tomar, que haga diez juntamente. La segūda propiedad es, que pueftos algunos numeros, començãdo de la vnidad afsi como 1. 2. 4. 8. 16. La suma delos primeros numeros es menor, que la del numero que se sigue en vna vnidad. Quiero dezir, que la suma de los dos primeros, como estan pueftos por or-

*Prime
ra pro-
piedad.*

*Parte
aliquo-
ta que
es.*

*Segun-
da pro-
piedad.*

den monta tres, estos tres menos que el tercero numero en orden en vno. Afsi mismo la suma de los tres primeros numeros es 7. la qual di fiere en vn punto al quarto numero, que es 8. y afsi en infinito. La tercera propriedad es, q̄ pue stos algunos numeros por la orden susodicha, la multiplicacion de los estremos, es y gual a la del numero, o numeros de en medio. Exemplo en estos 1. 2. 4. 8. 16. En este exemplo el numero medial es 4. multiplicado por si, haze 16. lo mismo hara el vno, que es el vn estremo, multiplicado por el 16. q̄ es el otro, o los 2. por los ocho. Exemplo para quando aya 2. numeros mediales. Afsi como 1. 2. 4. 8. 16. 32. Los de en medio son 4. y 8. La multiplicaciõ de vno en el otro es 32, la misma sera la de los estremos.

¶ Numero pariter impar, es vn numero que se puede diuidir en dos partes yguales, mas cada parte destas no se podra diuidir en partes yguales, sin fraction de la vnidad. Afsi como 2. 6. 10. 14. 18. Cada vno se diuide en partes yguales, pero cada parte sera numero impar, y no se podra diuidir en partes yguales sin que se quiebre la vnidad. Engendranse del duplo de numeros impares. La primera propiedad destes numeros es, que la diferencia de vno a otra, comenzando del numero binario es 4. vnidades. La razon es, porque proceden del duplo de numeros impares, y porque la diferencia de vn

nume-

*Terce-
ra pro-
piedad.*

*Prime-
ra pro-
piedad.*

numero impar a la de su siguiente es dos. La segunda propiedad es, que si la parte aliquota de estos numeros es impar, su denominacion sera par. Exemplo 18. tiene por parte aliquota al nueue, el qual nueue es impar, pues la denominacion suya, que es mitad, es par, y al contrario si la parte aliquota es par, su denominacion sera impar. Exemplo. Seys es parte aliquota de diez y ocho, y es par, su denominacion que es tercio, es impar. La tercera propiedad. Puestos algunos numeros por orden, la suma de los extremos, sera tanto como el duplo del numero de enmedio, o de la suma de los dos de enmedio, si fueren 2. Exemplo de lo primero en estos numero 2. 6. 10. 14. 18. La suma de 2. y 18. q̄ son extremos, es 20. La misma es de la 6. cō 14. y 10. q̄ es el de enmedio, es mitad. Exemplo de lo segūdo en estos 2. 6. 10. 14. 18. 22. La suma de 2. y 22. es 24. la misma es de 6. y 18. ò de 10. cō 14.

¶ Numero impariter par, es todo numero que se puede diuidir en dos partes yguales, sin fracion de la vnidad, y cada vna destas dos en oras dos, mas no hasta llegar a la vnidad. Como diximos del numero pariter par. Afsi como 12. 20. 24. Engēdrā se estos numeros de las multiplicaciones de numeros pariter pares (dexada la vnidad) por numeros pariter impares, dexādo el numero binario. Exēplo. Pōgāse numeros pariter pares, dexada la vnidad, afsi como 2. 4. 8. 16. Pōganse

Segunda propiedad.

Tercera propiedad.

se assi mismo numeros pariter impares dexando al binario, assi como 6. 10. 14. 18. Digo que si con el 2. que es numero pariter par, multiplicares los 6. y los 10. y los demas numeros cada vno por si, los productos seran numeros impariter pares, y al contrario. Y como multiplicaste con el 2. assi multiplicaras con los quatro, o cō cada vno de los demas numeros pariter impares. Y assi con los ocho, y con diez y seys, y con otros qualesquiera. Las propiedades destos numeros algunas son como las del numero pariter par, y en algunas difiere del mismo, y en otras parece al numero pariter impar, y en otras difiere del mismo pariter impar. Como el curioso lo podra bien especular.

Articulo II. Trata del numero impar.

¶ Numero impar es el que no se puede diuidir en dos partes iguales, sin fraction de la vnidad. Otros lo definen, diziendo. Numero impar es, q̄ diuidido en qualesquiera partes, la vna sera par, y la otra impar. Assi como 7. se diuide en 6. y 1. o en 4. y 3. o en 2. y 5. A diferencia de lo que el primero articulo dize del numero par. Difiere el numero impar del numero par en vna vnidad porque añadida al impar, se haze par, y quitada o añadida al par, se haze impar. Destos numeros ay dos especies. La primera de las quales es de
 nume-

numeros dichos, primeros incópositos. Y estos son vnos numeros impares, que no tienen otra parte aliquota, sino la vnidad. Assi como 5. y 7. son dichos numeros primos incompositos, porque otro numero ninguno los puede medir, o diuidir, sino la vnidad. Como en el lib. 1. c. 5. diximos. La segunda especie de numeros impares, de numeros dichos segundos incompositos: y son vnos numeros q̄ vltra de la vnidad, tienen otro numero, o otros, por parte, o partes aliquotas. Assi como 9. q̄ sus partes aliquotas s̄o 1. 3. y assi como 15. q̄ tiene por partes aliquotas. 1. 3. 5

Cap. II. Trata del numero superfluo, y diminuto, y perfecto.

EL numero en general se puede diuidir en otras 3. especies, porque vnos se dizen superfluos, o superantes, otros diminutos, otros perfectos. Numero superfluo, o superante, es todo numero que es excedido de la suma de sus partes aliquotas. Assi como doze, que tiene por partes aliquotas 1. 2. 3. 4. 6. La suma de las quales es diez y seys. Pues porque los diez y seis sobrepujan al todo (que en este exemplo fue 12.) por tanto diras, q̄ el 12. y los que tuuieren su propiedad, seran numeros superantes, o superfluos.

¶ Numero diminuto es aquel, que la suma de sus partes aliquotas no se iguala, ni llega al tal numero. Assi como ocho, que sus partes aliquotas

tas son 1.2.4. La suma de las quales es 7. que porque no llega a su todo, que fue 8. diras ser el ocho, y los que su propiedad tuuieren, numeros diminutos.

¶ Numero perfecto es aquel, que la suma de sus partes aliquotas es igual a sus mismos numeros. Assi como seis que tiene por partes aliquotas 1.2.3. La suma de las quales es seis, que es tanto como su todo, que en este exemplo fue 6. pues los numeros que semejante propiedad tuuieren, se diran perfectos. La regla del origen destes numeros es, assentar numeros pariter pares. Assi como 1.2.4.8.16.32. Y juntaras los dos primeros, cõtando la vnidad, y montaran tres: estos tres, que es numero primero incompõsito, multiplicaras por el mayor numero de los numeros pariter pares, que sumaste, que es dos, y seran 6. este 6. es el numero primero de los perfectos. Semejantemente suma los tres numeros primeros de los pariter pares, y montaran.7. el qual es numero primo incompõsito, y por esto le multiplicaras por el mayor numero de los 3 numeros pariter pares, que sumaste, que es 4. y montaran veynte y ocho, este es el segundo numero de los perfectos. Assi mismo si quisieres sacar otro numero perfecto que sea el tercero en orden, suma quatro numeros de los primeros, de los pariter pares, que estan puestos en la figura por exemplo, que son 1.2.4.8. y montaran

*Mus-
tra es-
to Eu-
clid. en
la 3.9.
del 9.*

ran quinze, el qual quinze, porque no es numero primo incomposito, añadiras otro numero siguiente a los quatro que sumaste, que sera diez y seys, y montara 31. el qual treynta y vno, porq̄ es numero primero incomposito, le multiplicaras por el mayor numero de los pariter pares, q̄ sumaste, que es diez y seys, y montaran 496. y este sera el tercero numero perfeto en orden. Y desta manera procederas, y no cessara la procreacion de los perfectos, segun en los otros exemplos se ha visto por ser el proceder de los numeros en infinito. Nota todo numero que fuere diuidido por las denominaciones de las partes aliquotas de numero perfeto, la suma de los quocientes hara siempre el numero q̄ se diuidiere.

Cap. III. Trata de otras diferencias, o generos de numeros.

Articulo I. Trata de numero superficial.

Segun Geometria, ay otra diuision de numeros, porq̄ vnos numeros son dichos superficiales: y son aquellos que son procreados de la multiplicaciõ de otros dos numeros. Afsi como 48. q̄ procede de la multiplicacion de 6. por 8. y afsi como 6. que procede de la multiplicacion del 2. en el 3. son dichos superficiales, o lineales, a diferencia del quadrilatero, o quadrado. Y diferen-

del

del quadrado, en que el superficial puede proceder de la multiplicacion de dos numeros iguales, o desiguales, y el quadrado siempre de iguales. Como en el quarto articulo deste capitulo se declarará.

Articulo II. Deste III. Cap. Trata del numero solido.

¶ Numero solido es aquel, que es contenido de la multiplicacion de 3. numeros. Afsi como multiplicando vn 2. por vn 3. haze 6. este 6. se dize numero superficial. El qual multiplicado otra vez por 2. haze 12. y si se multiplica por el 3. haze 18. qualquiera destes 12. o 18. se dize numero solido. Difiere este numero, del numero cubico (como en el quinto articulo veras) en que el solido es contenido de la multiplicacion de 3. numeros diferentes, o semejantes, y el cubico siempre de 3. semejantes.

Articulo III. Deste III. Cap. Trata de numeros triangulares.

¶ Otros numeros ay, que se dizen triangulares: y son numeros, que començando de la vnidad, y poniendo numeros que se excedan vnosa otros en vna vnidad, harian triangulo perfecto equilatero, aunque el proceder fuesse en infinito, como parece en la figura.

*Articulo IIII. Deste III. Cap. Trata de numero-
ro quadrado.*

¶ Otros numeros son dichos numeros quadrados, y son aquellos, que proceden de la multiplicacion de dos numeros iguales. Afsi como si el 3. se multiplica por otro tres haze nueue estos 9 es quadrado, y el vno de los 3. es su rayz quadrada, o lado, como mejor entenderas en el cap. i. del septimo libro, y como parece figurado.

¶ De lo dicho se sigue, que todo numero quadrado, es numero superficial, y no todo numero superficial sera quadrado, como se dixo en el articulo primero deste capitulo.

Articulo V. Deste III. Cap. Trata de numero cubo, o cubico.

¶ Otros numeros son dichos cubos, o cubicos y son aquellos, q̄ proceden de la multiplicacion de vn numero multiplicado por otro semejante

te dos vezes. O por mejor dezir, es vn numero que procede de la multiplicacion de tres numeros yguales, en cantidad, y genero. Afsi como 2. 2.4. Multiplicando el vno por otro haze 4. Estos 4. por el otro 2. haze 8. Este 8, se dize numero cubo, o cubico, y el vno de los doses, se dize rayz cubica: como mejor y mas amplamente se trata en el libro septimo, capitulo quinto. Difiere el numero cubico del solido, en que el solido es procreado de multiplicacion de tres numeros yguales, ò desiguales, como se dixo en el segundo articulo deste capitulo tercero. Y el cubo siempre procede de 3. numeros yguales, de do se sigue que todo numero cubico se puede llamar solido, y el solido no se dira cubico.

Articulo sexto deste III. Capitulo. Trata de numeros dichos circulares.

¶ Otros numeros son dichos circulares por cierta similitud en que se semejan al circulo. Porque afsi como el circulo fenecce en el punto que comienza, afsi estos numeros comiençan y fenecen en vn semejante termino. Destos numeros ay solos dos, que son 5. y 6. Exemplo. Cinco multiplicado por si, haze 25. començò en 5. y fenecio en 5. Afsi mismo si se multiplican estos 25. por el 5. haze 125. Y afsi procederia en infinito, q̄ no cessaria de ponerse cinco al principio de los productos, y lo mismo haria el 6. q̄ siempre feneceria en 6.

Capitulo III. Trata de proporcionalidad.

Articulo primero de la diuision y definicion de la proporcion, y de sus cinco generos.

Proporcion dezimos a vna comparacion entre dos cantidades de vna especie, como numero a numero, linea, a linea. Diuidese en proporcion ygal, y inygal. Proporcion ygal es quando se ygalan dos cantidades yguales en especie y valor, como 4. a 4. 5. a 5. de la qual no ay en ella otra cosa que dezir, sino que es proporcion ygal.

La proporcion inygal si es quando se comparan dos cantidades de vna especie desyguales afsi como 4. a 2. r. 5. a 5. &c. Esta proporcion inygal se diuide en dos partes: conuiene a saber en proporcion mayor inygal, y proporcion menor inygal.

La proporcion menor inygal es quando la cantidad menor se compara a la mayor. Afsi 2. a 4. 3. a 9. &c.

La proporcion mayor inygal es, quando la cantidad mayor se compara a la menor: como 6. a 49. a 3. de cada vna destas dos se pondran 5 generos, y primeramente de la proporcion, que dizen mayor inygal. Los generos son. Multi-

plex Superparticularis. Superparties. Multiplex
superparticularis, Multiplex superpartiens.

Multiplex.

¶ Multiplex es, quando el numero mayor cõtine en si al menor dos, o mas vezes, quantas fueren justamente: y assi digo, que si el numero mayor contuuiere al menor 2. vezes es dupla, y si 3 fera tripla: y si 4. quadrupla. Exemplo de 8. a 4. q̄ proporcion ay? Parte 8. por 4. y vendran 2. pues di que es dupla. De 6. a 2. parte 6. por 2. y vendran 3. di que es tripla. De suerte, que partiẽdo el numero mayor por el menor, lo que cuquiere fera la denominacion de la proporcion de los tales numeros, ya sea por numeros que dizen enteros, ya sea por quebrados.

Superparticularis.

¶ El segundo genero se dize Superparticularis, y es quando el numero, o cantidad mayor contiene en si al menor vna sola vez, y mas vna sola parte del numero menor, como si vn numero contiene a otro vna vez y media, dize se proporcion sexquialtera. Si le contiene vna vez y vn tercio, se dize sexquitercia. Exẽplo. De 3. a 2. q̄ por porciõ ay? Parte 3. por 2. y vẽdrã vno y medio: pues respõde q̄ es sexquialtera. De 4. a 3. parte 4. por tres y vendra vno y vn tercio, por tanto se dira que es sexquitercia. De 5. a 4. es sexquiquarta

quarta, porque partiendo 5. por 4. viene vno, y vn quarto: de suerte que por el contener vn numero a otro vna sola vez, siempre dezimos sexqui al principio, y al fin se añade altera, o tertia, segun la parte que se tomare del numero menor.

Superpartiens.

¶ El tercero genero se dize Superpartiens, y es quando el numero mayor contiene en si al menor vna sola vez, y mas algunas partes del numero menor: como si vn numero contiene a otro vna vez y dos tercios, o vna vez, y 3. quartos: vna vez y dos quintos, o 3. quintos, o 4. quintos. Como si dizen de 5. a 3. que proporcion ay? Parte 5. por 3. y vendra 1. y 2. tercios, que es vna vez entera y 2. partes del numero menor, y assi le diras, superbipartiens tercias. De 7. a 4. q̄ proporcion ay? Parte 7. por 4. y vedra vno, y 3. quartos por tanto diras supertripartiens quartas: de manera que lo primero deste genero es, super, y lo segundo es añadir bi, si sobrá 2. y si sobrá 3. trisi 4. quadri. Y lo tercero poner partiens, y lo quarto, añadir por denominacion el numero menor. Exemplo. De 10. a 7. que proporcion ay? Parte diez por siete, y vendra 1. y 3. septimos. Pues responde diziendo supertri, por razon que sobraró tres (vltra de contener el mayor numero al menor vna sola vez) y añade partiens, y tédras tres dictiones, q̄ dizé supertripartiens, y al cabo añá

diras septimas , por razon que los tres que sobran son septimos , o porque el numero menor de estos dos que en este exemplo comparas es siete.

Multiplex super particularis.

¶ El quarto genero se dize Multiplex superparticularis. Está compuesto del genero primero q̄ se dize multiplex, y del segundo que se dize superparticularis : y es quando el numero mayor cõtiene en si al menor mas de vna vez, y mas vna sola parte del numero menor, como si vn numero contuuiesse a otro dos vezes y media, o tres vezes y vn tercio, o dos vezes y vn quarto, &c. Como mejor por exemplos entēderas. De 15. a 6. que proporcion ay? Parte 15. por 6. y vendran 2. y sobran tres, los quales son tres sextos, q̄ es tãto como medio. Luego dos vezes y media diras que cõtiene el 15. a el 6. por el dos diras dupla y por el medio, sexquialtera: de fuerte que la proporciõ de 15. a 6. es dupla sexquialtera. Otro exemplo. De diez a tres que proporcion ay? Parte diez por tres, y vendran tres y vn tercio, pues di que es tripla sexquitercia. De fuerte que este genero trae 3. dictiones, o terminos. El primero se engendra de lo que cabe enteramēte: quieroz dezir , que si partiendo el vn numero por el otro cupiere dos vezes, por el dos diras dupla: y si tres tripla, y si quatro quadrupla. El segundo termino

termino siempre es sexqui. El vltimo se toma del numero menor. Exēplo. De 27. a cinco q̄ porcion ay? Parte 27. por cinco y vendran 4. y vn quinto. Paes por los quatro di quadrupla, y añade el segundo termino (que es sexqui) a esto añadiras quinta, porque sobro vn quinto, y quedara vna oracion de tres dictiones: desta suerte, quadrupla sexquiquinta. Y esto haras en los demas. Quiero dezir, que afsi como en este exēplo dixiste quinta, porque cupo vn quinto, afsi si te viniera vn tercio, dixeras tercia, y si medio dixeras altera, y si vn quarto dixeras quarta.

Multiplex superpartiens.

¶ El quinto, y vltimo genero se dize Multiplex superpartiens. Cōponese del primero genero, que es Nultiplex, y del tercero, que se dize partiens: y afsi digo q̄ Multiplex superpartiens, es quādo el numero mayor cōtiene en si al menor mas que vna sola vez, y mas de vna parte del numero menor, como si vn numero cōtiene a otro dos vezes, y dos tercios, o dos vezes y tres quartos, o tres vezes, y dos quintos. Exēmplo. De 14 a tres que proporcion ay? Parte 14. por 3. y vendran. 4. y dos tercios. Pues di que es proporcion quadrupla superbipartiēs tercias. De 13. a 5. parte 13. por 5. y vendran dos, y tres quintos, luego es proporcion dupla supertripartiens quintas. De suerte q̄ en este genero ocurren 5. terminos,

o dictiones. El primero se causa de lo que cabe en la particion enteramente, y adelante destos se añade super, y lo tercero el nombre de lo que sobra, y lo quarto es añadir partiens, y lo quinto es la denominacion del numero menor. Exemplo. De 23. a 6. que proporcion ay (Parte 23. a 6. y vendran a la particion. 3. y 5. sextos, pues por los 3. enteros que cupieren, diras tripla, y añade super, por el 5. que sobro, di quin, juntamente con partiens, y sesmas, porque son sextos los 5, que sobraron, y aura cinco dictiones desta suerte, tripla super quinpartiens sesmas. Quiere dezir, que el numero mayor contiene en si al menor tres vezes, y mas cinco sextos de otra vez.

¶ La proporcion menor iniguales, quando la cantidad menor se compara a la mayor: como si dixessen de tres a nueue, o quatro a siete, &c. Tiene otros cinco generos, y no difiere cosa alguna, salvo que como en la proporcion mayor inigual se compara el mayor al menor: aqui comparan el menor al mayor, y no ay otra cosa que saber, sino seguir la orden de lo que se ha dicho, y añadir al principio sub. Exemplo 3. a 6. que proporcion ay? Di que subdupla. Quiere dezir que esta el 3. con el 6. debaxo de doblada proporcion. De tres a quatro que proporció ay? Parte quatro por tres, y vendra vno, y vn tercio. Pues di subsequitercia. Y assi en los demas generos segun has visto.

Articulo II. Deste IIII. Cap. Trata de la proporcion de numeros rotos.

¶ De la suerte que en los enteros conoces la proporcion que ay de vn numero a otro, diuidiendo el mayor por el menor: por la misma via conoceras la de los quebrados, partiendo siempre el mayor por el menor: como hemos hecho por entero, y el quociente dira la denominación de la proporcion. Así como si quisieses saber qué proporció ay de vn medio a vn quarto, parte el medio por vn quarto, y vendran 2. por lo qual diras ser dupla. Y si comparas el quarto al medio, fera subdupla, que es del primer genero, que se dize Multiplex, y así de los de mas generos.

Articulo III. Deste IIII. Cap. Muestra regla para aumentar numeros en vna qualquiera continua proporcion.

¶ Puestos dos numeros en qualquier proporció que fueren: si quieres hallar otro numero tercero, que se aya con el segundo, como el segundo con el primero, multiplicas el segundo por si mismo, y partiras el producto por el primero, y lo que saliere al quociéte, fera el tal numero. Exemplo. Quiero buscar vn tercero numero en la misma proporció, que se ha 1. con 2. (que es dupla) multiplica el segundo por si mismo, y seran 4. parte por 1. y vendran 4. el qual sera tercero numero de-

sta proporción, y la proporción que ay de 1. a 2. a 2. esta ay de 2. a 4. Y así facaras el quarto, y otro qualquiera multiplicando el vltimo por sí, y partiendo por el penultimo (quiero dezir) multiplicando el postrero, y mayor numero por sí mismo, y partiendo por el que le antecede. Nota toda proporción es igual a otra, que tiene igual la denominación: y mayor quando mayor, y menor quando menor. Quiero dezir, que vna tripla es mayor que vna dupla, porque la denominación de vna tripla es tres, y la de vna dupla es dos, y así como tres es mayor que dos, así vna tripla es mayor que vna dupla, y por esta orden mayor es la quadrupla que no la tripla. Mas has de considerar, que esto se entiende en el genero de proporción, que se dize multiplex, mas en los demas generos de proporciones aquella proporción sera mayor, que menor denominación tuviere, y aquella sera menor, que tuviere mayor denominación, quiero dezir, que mayor es sexquialtera, que sexquiquarta. Y así como es mas vn tercio que vn quarto, así es mayor vna proporción sexquitercia, que vna sexquiquarta, y por el semejante de las otras proporciones.

Articulo IIII. De ste IIII. Cap. Muestra sumar proporciones.

¶ Auiendo tratado lo que me parece ser necesario para entendimiento de los 5. generos de pro-

proporcion, resta mostrar y declarar la orden q̄ se ha de tener para sumar, restar, multiplicar, y partir proporciones. Y assi digo, que sumar 2.0 mas proporciones, no es, ni quiere dezir otra cosa, sino buscar otros numeros proporcionales q̄ abracen la vna proporcion y otra : assi como si quisieses sumar vna dupla (que es como de dos a vno) con vna sexquialtera (que es como de 3. a dos) lo qual se haze assentando las proporciones como si fuesen quebrados, poniédo los menores numeros debaxo, como parece.

$$2 \text{ --- } 3$$

$$1 \text{ --- } 2$$

¶ Y multiplicando como las lineas muestran vno por dos, y poniendo lo que montare debaxo. Assi mismo multiplicaras los dos que estan arriba por los tres, y seran seys, pon seys sobre la raya, como parece.

6

$$2 \text{ --- } 3$$

$$1 \text{ --- } 2$$

2

¶ Mira agora que proporcion ay de 6. a 2. y hallaras ser tripla, y tanto diras que haze, sumando vna dupla, con vna sexquialtera. Tambiē las podras sumar multiplicando dos que es de nominacion de la dupla, por vno y medio que es denominacion de la sexquialtera, y montara 3. que es denominacion de la tripla, y desta ma-

X 5

nera

330 LIBRO QUINTO.
nera sumaras tres, o mas proporciones, de qual-
quiera genero que fueren.

*Articulo V. Deste IIII. Cap. Muestra restar
proporciones.*

Vide ¶ El restar proporciones se haze como el partir
Clau- de quebrados. Exemplo. Resta de vna dupla (q̄
dium es como 2. a vno) vna sexquitercia (que es como
Prole- de 4. a tres) poniendo la dupla a la mano sinief-
meum tra, y la sexquitercia (que es la que quieres res-
l. i. ma tar) a la diestra, o como te pareciere, y quedara
gnæ cõ- la figura desta fuerte.
positio
nis.

$$\begin{array}{r} 2 \\ \times 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

¶ Multiplica en Cruz como se haze para partir
quebrados, y vendran a ponerse arriba 6. y de-
baxo 4. Pues la proporcion que ay de 6. a 4. que
es sexquialtera, sera la resta que queda, quitan-
do vna sexquitercia de vna dupla.

*Articulo VI. Deste IIII. Cap. Muestra multipli-
car proporciones.*

¶ De la misma manera que el fumar, se haze el
multiplicar. Exemplo. Multiplica vna sexquial-
tera (que es como 3. a 2.) por vna sexquitercia
(que es como de 4. a 3.) pondras las 2. propor-
ciones como se hizo en el fumar, y multiplica-
ras como las rayas muestran, y montara vna du-
pla (que es assi como de dos a vno).

12

3—4

2—3

6

¶ Mira la decima definicion del 5. de Euclides para contra los que dicen que no se vsa multiplicar, ni partir proporcion.

Articulo VII. Deste IIII. Cap. Muestra partir proporciones.

¶ El partir se haze como el restar, mas ha se de saber otro punto mas, y es, q̄ partir vna proporcion por otra, no es mas de buscar vn numero, que puesto entre el partidor y particion, haga tal proporcion con vno de los dos exemplos, como fuere el partidor. Como si dicen, parte vna proporcion dupla (que es como seys a tres) por vna sexquitercia (que es como quatro a tres, quiere dezir, que busques vn numero, que puesto entre estos. 2, extremos. 6. y 3. haga cō el tres proporciō sexquitercia, como el partidor, pues el numero que estara con el 2. en sexquitercia es 4. y assi quedara partida esta proporcion dupla en dos proporciones, cōuiene saber, en sexquialtera, q̄ es como de 6. 4. y en sexquitercia, que es como de 4. a 3.

¶ De lo dicho se sigue, que mediante esta interposicion, la proporcion se puede diuidir en dos,

o en mas quantas proporciones tu quifieres, segun los terminos que entrepusieres, assi como en el exemplo desta proporcion se decupla (que es como de 16.a 1.) entre la qual si se pusiesse vn solo termino, como 8. quedara 16.8.1. en los quales ay dos proporciones, la vna dupla, como de 16.a 8. y la otra octupla, como de 8.a 1. E si se endarían, 1986.1. y quedara diuisa en vna sextupla que es como de 6.a 1. y en vn sexquitercia, que es como de ocho a feys, y en vna dupla, que es como de 16.a 8. E desta suerte podras diuidir qualquiera proporcion en otras quantas quisieres, desta suerte, que si entre vn extremo, y otro de vna qualquiera proporcion se pusiere vn numero, la tal proporcion quedara parecida en dos proporciones, y si pusieres dos numeros, quedara partida en tres proporciones, & si tres, quedara en quatro. Y si se suman todas, vendran los 2. extremos de la proporcion principal que partieres, que es su prueua, porque sumar y multiplicar proporciones, se haze de vn mismo modo.

¶ Nota, assi como restas vna proporción de otra puedes partir vna por otra.

¶ La prueua de sumar proporciones es restar, y la del restar, sumar, y la de multiplicar partir, y la del partir multiplicar.

Articulo VIII. Deste III. Cap. Trata de la proporcionalidad.

¶ Proporcionalidad es vna similitud de proporciones: porque afsi como en los numeros se cõpara vno a otro de vn genero, afsi en la proporcionalidad se compara vna proporcion a otra, de su proprio genero. Como vna dupla a otra, vna tripla a otra tripla. Por donde parece, que en la proporcionalidad ha de auer de necesidad proporcion, y no al contrario, en la proporcion no ay proporcionalidad, afsi como de 6. a 2. ay proporcion que dizeu tripla, y no ay proporcionalidad, por la proporcionalidad de necesidad abraça a lo menos dos proporciones, como en su definicion parece. Esta proporcionalidad se diuide en tres especies, conuiene saber, Harmonica, Arithmetica, Geometrica.

Proporcionalidad Harmonica.

¶ Proporcionalidad Harmonica es q̄ la proporcion de los extremos, ha de ser como la de los dos excessos o diferencias q̄ ay de los extremos al medio. Exẽplo. Sea la proporcionalidad 6. 4. 3. la proporcion de los dos extremos, que son 6. y 3. es dupla, el exceso del mayor (que es 6.) al medio (que es 4.) es 2. y el exceso del medio (q̄ es 4) al menor (q̄ es 3) es 1. hallaras ser la misma proporcion de 2. a 1. que son los excessos que de

Sacar
medio
Har-
moni-
so.

6. a tres que son los extremos. Entendido esto, si quisiesse hallar el medio Harmonico entre dos extremos: multiplicaras los extremos vno por otro, y el duplo deste producto, partirlo has por la suma de los dos extremos, y el quociente sera el medio. Exemplo. Entre 12. y 4. qual sera el medio Harmonico? Multiplica 12. por 4. y seran 48. dobla 48. y seran 96. suma 12. con 4. que son los extremos, y seran 16. parte 96. por 16. y vendran 6. este 6. diras ser el medio Harmonico entre 12. y 4. y assi quedara vna proporcionalidad de dos proporciones. La vna es tripla, como de 12. a 4. La otra es como de 6. a 2. que son los excessos, que tambien es tripla.

Proporcionalidad Arifmetica.

¶ La proporcionalidad Arifmetica, se diuide en continua y discontinua. La continua es, quando tanto excede vn numero a otro, como el tal numero excedido de otro. Assi como 1. 2. 3. en los quales tanto excede el segundo numero al primero, quanto el segundo es excedido del tercero, y entre ellos ay dos proporciones, la vna es de 1. a 2. La segunda de 2. a 3. y el exceso de cada vna es 1. La proporcionalidad Arifmetica discontinua, es contenida por lo menos de dos proporciones iguales. Assi como se han 4. a 7. assi se han 9. a 12. La vna y otra es subsupertripartiens quartas, y el exceso de cada vna es 3. y todos son 4. terminos

minos, o numeros 4. 7. 9. 12. y tanto monta sumãdo 4. con 12. q̄ son los extremos, como 7. con 9. que son los medios. Para sacar vn medio Arifmetico entre dos extremos, sumaras los extremos, y la mitad del conjunto sera el medio Arifmetico. Exemplo. Entre 10. y 4. qual sera el medio Arifmetico? Suma 10. con 4. y seran 14. saca la mitad de 14. que son 7. y este 7. es medio Arifmetico entre 10. y 4. y asì quedara vna proporcionalidad de dos proporciones. La primera de 10. a 7. Y la segunda de 7. a 4. porque el diez excede al 7. en tres, y el siete al quatro en otros tres. Y tanto monta sumando diez con 4. que son los extremos, como doblando el siete que es el medio.

Sacar
medio
Arith-
metico.

Proporcionalidad Geometrica.

¶ La proporcionalidad Geometrica, se diuide como la Arifmetica en continua, y discontinua. La continua es cõtenida de tres terminos, a lo menos: asì como 4. 2. 1. Las cuales son dos proporciones semejantes, porque la proporciõ que ay de 4. a 2. la misma ay de 2. a 1. q̄ la vna y otra son duplas, y la proporcion que ay del primero extremo y mayor al medio, ay del medio al menor extremo, y tanto monta multiplicar el medio por si mismo, como los extremos vno por otro. La proporcionalidad discontinua Geometrica.

metrica es contenida de quatro numeros, a lo menos: aysi como diez a 5. aysi 6. a 3. ambas son proporciones yguales. Y dize se proporcionalidad discontinua: porque no ay el mismo esceso del primer numero al segundo, como del segundo al tercero, y la proporció que ay del primero al tercero ay del segundo al quarto, y la proporción que ay del primero al segundo, ay del tercero al quarto. Y tanto haze multiplicar el primero por el quarto, como el segundo por el tercero, y la proporción que ay del primero y segundo, al segundo ay del tercero y quarto, al quarto para hallar vn medio Geometrico entre dos extremos, multiplicaras los extremos vno por otro, y la rayz quadrada deste producto sera el medio Geometrico. Exemplo. Entre 20. y 5. qual sera el medio Geometrico. Multiplica 20. por 5. y seran 100. la rayz quadrada de 100. es 10. este 10. es el medio entre 20. y 5. y asy quedaravna proporcionalidad de dos proporciones yguales a la vna es de 20. a 10. La otra de 10. a 5. Y la proporción que ay de 10. q̄ es el medio, al menor extremo que es 5. la misma ay del 20. que es mayor extremo, al 10. que es el medio q̄ vna y otra es dupla Otro exemplo. Entre 4. y 3. qual sera el medio Geometrico? Multiplica 4. por 3. q̄ son los extremos, y montaran 12. la R. de 12. es el medio entre 4. y 3. (como se puede mostrar en potencia) porque tanto haze multipli-

*Sacar
medio
Geome-
trico.*

*Entēde-
ras, que
searayz
quadrada
en el
c. 4. del
7. libro*

triplicar los extremos, como R. de 12. por si mis-
 ma, que es el medio: y la proporción que ay de
 R. de doze a 3. ay de 4. a R. de 12. Para hallar 2.
 medios Geometricos entre qualesquiera nume-
 ros: multiplicaras el extremo mayor, por el qua-
 drado del extremo menor: y la rayz cubica de
 este producto, sera el vn medio y menor. Y para
 hallar el otro, multiplica el menor extremo, por
 el quadrado del mayor: y la rayz cubica de este
 producto sera el otro medio y mayor. Exemplo
 para buscar entre 3. y veynte y quatro, dos me-
 dios proporcionales Geometricos. Multiplica-
 ras el tres por si mismo, y seran 9. este 9. que es
 la potècia, o quadrado del extremo menor, mul-
 tipicalo por los 24. que es el extremo mayor, y
 montara 216. saca la rayz cubica como muestra
 el 5. cap. del lib. 7. de 216. (que es 6) este 6. es el
 vno de los dos medios que buscas. Ya que has
 hallado el vno, para hallar el otro por otra ordè
 de la que tengo declarada: multiplicaras el 6. q̄
 es el medio que has hallado por si mismo: y mō-
 tara 36. parte estos 36. por el extremo menor, q̄
 es 3. y vendra al quociente doze, estos doze se-
 ra el otro medio, y asi auras hecho quatro nu-
 meros, o terminos desta suerte 3. 6. 12. 24. los
 quales estan en proporción subdupla, y haz
 proporciones: la vna de 3. a 6. la otra de
 Los quales tienen todas las propiedades que
 en las precedentes hemos declarado.

*Sacar 2
 medios
 Geome-
 tricos.*

*Lee el
 4. y 5. c.
 del 7.
 lib.*

Artic. IX. Deste IIII. Cap. Muestra buscar partes proporcionales entre tres, o quatro, o mas cantidades proporcionales.

*Lee el
4. cap.
del 7. li
bro.*

1. ¶ Si fueren tres cantidades cōtinuas proporcionales, y que la primera, y tercera fuessen conocidas, para hallar la segunda, multiplicaras la primera por tercera, y la rayz, quadrada del producto sera la segunda. Exemplo, Sea la primera cantidad tres, y la tercera doze, multiplicando tres por doze hazen 36. la rayz quadrada de 36 es 6. este 6, es la segunda: y assi quedaran 3. 6. 12 las quales estan en proporcion continua dupla. O parte la segunda por la menor, y del quociente la rayz multiplicada por la menor, el producto sera la segunda.

2. ¶ Si fueren quatro cātidades continuas proporcionales, q̄ la primera, y quarta sean manifestas: como si la primera fuesse dos, y la quarta 16. para hallar la segunda, multiplicaras la primera por si: y despues este producto por la 4, y la RRR. deste segundo producto sera la segunda cantidad. Y para hallar la tercera, multiplica la quarta por si, y despues por la primera, y faca la rayz cubica del segundo producto, y vendra la tercera.

3. ¶ Si fuessen quatro cantidades como estas 2. 4. 8. 16. si se perdiessse dellas la primera, quadra la segunda, q̄ es 4. y sera 16. parte la primera. Si que es 8. y vendra dos, y tãto sera por la tercera se

se perdiessse la segunda, quadra la tercera que es, 3. sera 64. parte sesenta y quatro, por la quarta, q̄ es 16. y vendran quatro, que es la segunda. Y si se perdiessse la tercera, multiplica la segunda que es quatro, por la quarta que es 6. y montara 64. la R. que es 8. sera la tercera. Si se perdiessse la quarta, quadra la tercera que es 8. en este exemplo, y seran 64. parte por la segunda q̄ es 4, y vendran 16. y tanto sera la quarta. O multiplica la segunda por la tercera y parte por la primera. O parte la tercera por la primera: y el quociente, multiplicalo por la segunda. O parte la segunda por la primera, y multiplica el quociente por la tercera, y de qualquiera destas fuertes vendra la quarta, como quien haze regla de tres.

4. ¶ Si fueren 5. qs. continuas proporcionales, y fuessen la primera y quinta conocidas, para hallar la segunda, y tercera, y quarta haras afsi. Sea la primera 1. y la quinta 16. multiplica vna por otra, y seran 16. la rayz quadrada de 16. que es 4 y este 4. sera la tercera. Para hallar la segunda, multiplica la primera que es 1. y sera 1. multiplica este 1. por la quinta que es 16. y seran 16. saca la R.R. de 16. (que es 2.) este 2. sera la segunda. Y afsi tendras ya la primera y segunda y tercera, y quinta. Para hallar la quarta, quadra la tercera, que es 4. y sera 16. parte estos 16. por la segunda que es 2. y vendran 8. por la quarta. Y seran todas 1. 2. 4. 8. 16. Y afsi haras de 6. 7. o mas cantidades.

Articulo X. Deste IIII. Cap. En el qual se ponen algunas propiedades de cantidades continuas proporcionales.

¶ Nota, superficies en este articulo se toma por lo que dezimos producto. Lee la plana cincuenta, verso 24.

1. ¶ Si fueren tres cantidades cōtinuas proporcionales, tanto montaran multiplicadas todas tres vnas por otras, como cubicando la segunda. Sean las qs. 1. 4. 16. La multiplicacion de todas es 64. el cubo de la segunda (que es quatro) montara otros sesenta y quatro.

2. ¶ Si fueren tres cantidades continuas proporcionales, y q̄ por ellas se huuiesse de partir otra cantidad, sumados los tres aduenimientos serã iguales a la suma de las tres cantidades, en semejante caso la vna de las tres ha de ser R. de la otra q. q̄ por las tres haviere de ser partida por las mismas tres cantidades. De lo qual se sigue, que partiendo la dicha q. por la primera de las tres, el aduenimiento ha de hazer la tercera: y al contrario partiendo por la tercera vendra la primera, y si todos tres aduenimiētos sumares, sera tanto como la suma de todas tres cantidades. Exemplo: Pon que las tres cantidad sean qualquiera, y que la cãtidad que por cada vna dellas se ha de partir es 36. Pues digo, q̄ la vna de

las tres ha de ser R. de 36, que dezimos ser la q. que se ha de partir, y esta siempre sera la segúda. Agora las otras dos que faltan se pueden tomar en qualquier proporcion que te parezca, de arte que sean extremos del 6. Pues pon antes del 6, 3, y despues 9, y assi quedaran tres cantidades que proceden en subsexqualtera proporció, como 4, 6, 9. Agora si partes los 36, que es la cantidad que se ha de partir por la tercera q̄ es nueue, vendran 4, que es la primera. Y si partes por la primera, que es 4, vendrá 9, que es la tercera, y si partes por la segunda, que es 6, vendrá la misma segunda. De donde queda claro, que si los quociētes son las mismas partes proporcionales que môtara tanto la suma dellas, como la de las mismas tres partes, que vnas y otras montã 19. Lee el 12. articulo deste 4. capitulo.

3. ¶ Si fueren tres cantidades, y se multiplicarē vnas por otras, si este producto se partiere por qualquiera de las 3. qs. el quociēte sera tanto como el producto de las otras dos. Y si el producto de todas 3. se partiere por el producto de las 2. el quociēte sera la otra q. Y esto no tan solamente es assi en 3. qs. mas aun en otras muchas, seran las qs. 3, 6, 12, multiplicadas todas 3, diziēdo 3. vezes 6. son 18. otravez 18, vezes 12. son 216. Si estos 216. partes por la primera q. (q̄ es 3) vendran 72. que es tanto como multiplicado 6, por 12. q̄ son las otras 2, y al contrario partiēdo 216

Y 3 por

por doze vienen ocho, que es la superficie dela primera y segunda.

4. ¶ Si fueren en vna qualquiera proporcion 3. qs. y en la misma proporcion otras 2. digo, que tanto montara multiplicar la suma de las mayores de las tres por la menor delas 2. como la mayor de las 2. cō las menores delas 3. Exēplo. Seā las 3. qs. 3. 6. 12. y las 2. 4. 8. de arte que todas son duplas, digo, que sumando las 2. mayores de las tres, mōtan 18. y multiplicandola por la menor delas dos, q̄ es 4. montan 72. lo mismo haras si multiplicas la suma delas 2. dos menores de las tres q̄ montan 9. por la mayor delas dos q̄ es 8.

5. ¶ Si tres qs. continuas proporcionales se multiplicaren cada vna por las otras dos, y se sumaren los tres productos, digo, q̄ si se parte esta suma por el duplo de la suma de las mismas tres qs. lo que viniere al quociente sera la segūda q. Exēplo. Sean las qs. 2. 4. 8. si multiplicas la segunda y tercera por la primera, diziendo dos vezes 4. son 8. y 2. vezes 8. (q̄ es de lo dela tercera) son 16. sumadas montan 24. Afsi mismo si multiplicas la primera (q̄ es dos) y la tercera (que es 8.) por la segunda (que es 4.) montaran 40. Y si multiplicas la primera y segunda por la tercera, mōtaran 48. Sumadas todas tres sumas, como son 24. 40. y 48. montaran 112. Si estos 112. se partē por 28. que es el duplo dela suma de las tres qs. yendra la quociente 4. q̄ es la segunda q. de las tres

tres proporcionales q̄ en este exemplo se pusieron. Aora q̄ tienes hallado la segunda, si quisieres buscar las otras 2. haras como si quisiesse hazer de 10. que es la suma dellas, dos partes tales, que multiplicando la vna por la otra monta 16. Sigue la orden de la primera demanda del articulo decimotercio deste capitulo quarto, y vendra dos, y ocho por la primera y tercera.

6. ¶ Si fueren 3. qs. continuas proporcionales. Digo, que la proporcion que huuiere de la primera a la tercera, aura del quadrado de la primera, al de la segunda. Exemplo. Sean las qs. 3. 6. 12. la primera esta con la tercera en proporció subquadrupla, pues el quadrado de la primera, que es 9. esta al de la segunda, que es treynta y feys en la primera proporcion.

7. ¶ Si fueren quatro qs. proporcionales, digo, que la proporcion que huuiere de la suma de la segunda y tercera a todas quatro, aura de la segunda a la suma de la primera y tercera. Exemplo. Sean las qs. 1. 2. 4. 8. la suma de la segunda y tercera (que es feys) esta con la suma de todas quatro, que es quinze en subdupla sexquialtera. Pues la misma ay de la segunda, que es dos, a la suma de la primera y tercera, que es 5. que tambien es subdupla sexquialtera.

8. ¶ Si fuerē 4. qs. cōtinuas proporcionales, digo q̄ la proporció q̄ huuiere de la suma de la primera y segunda a la de la tercera y quarta, la misma

aura de la primera a la tercera. Exéplo. Serán las qs. 3. 6. 12. 24. La suma de las dos primeras (que es 9) esta con las de las postreras (que es 36) en proporcion subquadrupla. Pues la misma ay de la primera q. (que es 3) a la tercera (que es 12) 9. ¶ Si fueren 4. qs. continuas proporcionales, digo que la proporcion que huuiere de la suma de la primera, y tercera, a la suma dela segunda, y quarta, la misma aura dela primera a la segunda. Exemplo. Sean las 4. qs. 1. 2. 4. 8. la suma dela primera, y tercera (que es 5) esta con la suma de la segunda, y quarta (que es 10) en subdupla, pues la misma ay dela primera (que es 1) a la segunda que en este exemplo es dos.

10. ¶ Si fueren 4. qs. continuas proporcionales, como estas. R. 10. R. 40. 2. 4. digo, que las sumas de los quadrados dela tercera, y quarta, hazen tanto como multiplicando la primera por la segunda, y multiplicando los quadrados de las dos primeras, que es cincuenta, por la superficie de la tercera y quarta, que es 8. montara 400. que la R. de 400. es tanto como la suma de los dos quadrados de la tercera y quarta. Afsi mismo multiplicando ocho (que es la superficie de las dos vltimas) por los cincuenta, que es la suma de los dos quadrados de las primeras montaran R. 400. que es lo mismo que multiplicando las dos primeras, vna por otra.

11. ¶ Si son 4. qs. continuas proporcionales, afsi como

Lee el
s. 4. del
7. lib.

si como 36. 12. 24. tanto montara multiplicado las todas quatro, vnas por otras, como multiplicando el producto de la primera y quarta, por el producto de la segunda y tercera, que de vna, y otra suerte montan 5184. Y tanto monta multiplicar la primera por la quarta, como la segunda por la tercera.

12. ¶ Si fueren 4. qs. continuas proporcionales, siempre el quadrado de la suma de todas 4. es tanto como el quadrado de las dichas qs. juntos con las mismas multiplicaciones de cada vno por las otras. 3. Exemplo. Sean las qs. 1. 3. 4. 8. el quadrado de la suma de todas quatro, es 225. guardalo. Ahora multiplica el vno (que es la primera) por las otras tres, y suma todas tres multiplicaciones, y montaran 14. Afsi mismo multiplica por el 2. (que es la segunda) por todas las otras 3. qs. y montaran 26. Afsi mismo multiplica cō la tercera, que es quatro, las otras tres cada vna por si, y montaran quarenta y quatro. Multiplica mas con la quarta (que es 8) todas las otras tres, y montaran 56. Suma ahora estos quatro aduenimiētos, como son 14. 26. 44. 56. y montara todo 140. Con estos 140 juntaras los quadrados de todas quatro, como son 1. 4. 16. sesenta y quatro, y sera todo doziētos y veinte y cinco, que es igual al quadrado de la suma de todas quatro eantidades, y lo mismo viene en mas, o menos qs.

Lee el
4.º del
7. lib.

*Artic. XI. Deste IIII. Cap. Trata del efecto de la
proporcion, en las cantidades simples binomina-
les. Y nuestra ballar numeros comu-
nicantes.*

¶ Nota, que en este articulo, y en el siguiente, vna P. quiere dezir mas, y vna R. rayz quadrada, y vna q. cantidad, qs. quantidades, y vna N. dize numero.

¶ En este articulo se pone regla, para que si la suma de tres qs. fuere partida por cada vna de las dichas qs. los tres aduenimientos tendrá la misma proporcion que tenian primero las qs. como se dixo en la segunda propiedad de las qs. proporcionales, en el articulo X. que precedio, y sumados los tres aduenimientos, y partiendo la suma por cada vno de los mismos aduenimientos, los segundos quocientes seran tanto como los primeros, y en la misma proporcion. Y si 1000. vezes se partiessen las sumas de los quocientes, por los mismos quocientes, siempre vendra la misma q. y en la misma proporcion: y multiplicando el quociente mayor por el vltimo y menor, la multiplicacion es la suma de todos los quocientes. Exemplo. En estas tres qs. 2. 6. 18. que estan en subtripla proporcion: la suma de todas tres es 26. parte ahora veynte y feys, por dos, y vendran 13. parte mas por feys, y vendran quatro, y vn tercio: parte mas por diez y ocho, y vendra vno, y quatro nueues, suma estos

tres quocientes, y montará 18, y 7. nouenes, aora multiplica 13 (que es el primer producto, y mayor) por el vno, y quatro nouenes (que es el vltimo y menor) y montara 18. y 7. nouenes, que es tanto como la suma de los tres quocientes. Digo mas, q̄ si estos 18. y 7. nouenes fuesſen partidos por 13. y por quatro vn tercio, y por vno, y quatro nouenes, la suma de los tres aduenimiētos ſeran 18. y 7. nouenes, como lo primero, y en la miſma proporción. Otro exemplo en cantidades binominales. Sean quatro qs. La primera 9. P. R. 75. La ſegunda 3. P. R. 3. La tercera 3. M. R. 3. La quarta 9. M. R. 75. La ſuma de todas quatro (como ſe muestra en el cap. 9. art. 6. del 7. lib.) montan veynte y quatro. La qual ſuma ſi ſe parte por cada vna deſtas qs (como ſe muestra en el articulo nono del capitulo nono del 7. lib.) los aduenimientos tendran las condiciones q̄ hemos dicho en las ſimples qs, pues partiendo veynte y quatro, por cada vna parte deſtas 4. viene al primero quociente 36. P. R. 1200 Y por el ſegúdo 12. P. R. 48. Y por el tercero 12. M. R. 48. Y por el vltimo 36. M. R. 1200. Que la ſuma de todos 4. es 96. Pues aora digo, que ſi ſe parten eſtos 96. por ſus partes, o quocientes ſu mando los ſegundos aduenimientos, ſerá otros 96. y multiplicando el primero por el quarto, también ſera 69. Y multiplicando el ſegundo por el tercero, ſera también 96. y aſi podras hazer de

*Lee el
c. 9. del
7. lib.*

mas

mas cátidades, como aqui has hecho de quatro.
 ¶ Para hallar quantas qs. binominales propor-
 cionales quisieres: que la suma dellas partida
 por sus partes, la suma de los aduenimientos
 sean simples qs. como 6.8. tendras por regla ge-
 neral, que si quisieres hallar tres qs. de tomar
 vna qualquiera q. que te parezca, y multiplicar
 la has por vn binomio qualquieses, y la multi-
 plicacion que saliere, y su disjuncto, ya q. simple
 que tomaras, seran las tres cantidades que bus-
 cas. Exemplo. Pon por simple q. 12. y por el bi-
 nomio dos P.R. Aora multiplica doze por dos
 P.R. 3. y seran 24. P.R. 432. toma su disjuncto, q̄
 es 24. M.R. 432. Ahora digo, que estos 24. P.R.
 432. es la mayor q. y la mediana sea el 12. (q̄ fue
 la q. que tomaste) y el menor sea el disjuncto de
 24. P.R. 432. que es 24. M.R. 432. como lo pue-
 des prouar, porque la suma de todas tres es 60.
 q̄ es q. simple: y partiendo 60. por 24. P.R. 432. y
 por 12. y por 24. M.R. 432. como se muestra en
 el artic. 9. del c. 7. del 9. lib. seran los quocientes
 10. M.R. 75. P. 5. y 10. P. R. 75. la suma de dos 3,
 es 25. los quales quocientes son de tal condició
 que partidos los 25. por cada vno dellos, la suma
 de todos tres quocientes sera 25. y multiplicã-
 do el primero por el vltimo haran 25. &c. Y si co-
 mo has buscado 3. q. quisieres buscar 4. tomaras
 vn binomio con su disjuncto, y sea el que quisie-
 res como 3. P.R. 3. y su disjuncto, q̄ es 3, M, R, 3.

Aora

Aora mira la diferencia del vno al otro. Quiero dezir que busques la denominaciõ de la proporcion que ay de 3. p. r. 3. a 3. m. r. 3, Partiendo el binomio por su disjuncto (como muestra el c. quarto. Artic. 3. del lib. 5.) y hallaras siguiendo la regla del partir binomios (que se pone el 9. articulo del cap. 9. del lib. 7) que es 2. p. r. 3. Aora multiplica 3. p. r. 3. y 3. m. r. 3. por 2. p. r. 3. y vendra 9. p. r. 75. y 9. m. r. 75. y estas seran las 2. qs. continuas proporcionales , y las otras 2. seran el binomio, y su disjuncto que al principio tomaste, que fue 3. p. r. 3. y 3. m. r. 3. y assi ditas q las 4. qs. que buscas, son 9. p. r. 75. y 9. m. r. 75. y tres, p. r. 3. y 3. m. r. 3. que suman 24, y partiendo 24, por cada vna dellas vienẽ, los 4. quociẽtes siguientes 36, m. r. 1200, y doze m. r. 48. y doze p. r. 48. y 36, p. r. 1200. que sumados montan 96, los quales quociẽtes son de tal condicion, que si partes 96, por cada vno dellos, la suma de los quatro aduenimientos sera 96. Y si quisieres hallar 5. qs. q tengan las condiciones dichas, multiplicas 24. p. r. 432. y 24. m. r. 432. por 24. p. r. 3. y q dara 1 con los 12, que tomaste a do buscaste 3. qs. 5. qs. que la suma sera simple q. mas 1. Y si quisieres hallar 6. qs. multiplica 9. m. r. 75. y 9. p. r. 75 que son las dos de las 4, que buscaste por 2. p. r. 3 que fue la denominacion de la proporcion que ay de 3. p. r. a 3. m. r. 3. q fue el binomio, y disjuncto que tomaste para hallar 4. qs. Y la multiplicacion

cacion del binomio fera la mayor parte, y la del disjuncto la menor, y las otras quatro, ya estan conocidas.

¶ Para partir 1. q. en tantas partes binominales continuas proporcionales quantas quifieres, de tal fuerte, que partida la tal q. por sus partes, la suma de los aduenimientos haga la misma q. como has visto en los 96. tendras la ordeu siguiente. Pon que es 12. la q. que se ha de diuidir, y por evitar prolixidad busca vn n. congruo q̄ se parte en partes proporcionales, con las condiciones dichas, y fera 96. Agora mira que parte es 12. de 96. y fera vn octauo, toma la ochaua parte de aquellas partes proporcionales que se sacaron de 96. como se hallaran en el precedente exemplo. Que la primera es 36. m. r. 1200. La segunda 12. M. r. 48. La tercera 12. P. r. 48. La quarta 36. P. R. 1200. Y vendra por la primera quatro y medio M. R. 8. y tres quartos. Y por la segunda 1. y medio M. R. 3. quartos. Y por la tercera 1. y medio M. R. 3. quartos. Y por la quarta quatro y medio P. R. 18. y tres quartos. Y estas seran las partes que has hecho del 12. las quales sumadas hazen 12. Y partidos los 12. por cada vna, y sumando los aduenimientos, hazē 12. y está en la misma proporcion. Nota si el numero que quifieres partir fuere mayor que 96. como si fueren 100. poner los has en partes proporcionales de 95. poniendo los 100. sobre los 96. será 100. nouenta

noventa y feys abos, q̄ en menor denominació son 25. veinte y quatrabos. Pues saca 25, veinte y quatrabos delas partes delos 96, q̄ es numero congruo, y vendrá las partes que la suma dellas haga 100. y tendran las propiedades, ycondiciones q̄ las partes de 96. Nota como tomaste 96. pudieras tomar otro numero q̄ tuuiera sus propiedades : y de la suerte que diuidiste el 12. en 4. partes le pudieras diuidir en 50. mas guardádo lo q̄ en las demandas precedêtes se ha dicho. Nota lo dicho, porque es cosa importante para responder a muchas questiones dificultosas.

Artic. XII. Deste IIII. Cap. En el qual se ponẽ algunas demandas proporcionales.

1, Si quisieres partir alguna q. en dos partes, tales q̄ multiplicádo la vna por la otra, hagavn cierto numero. Digo q̄ si tomares la mitad de la q, y la quadrares, y del quadrado quitares el cierto numero la R. dela resta junta con la mitad de la q. fera la vna parte, y quitada fera la otra, có tal que el cierto numero no sea mayor, que el quadrado de la mitad de la dicha q. porque si es mayor la demãda, no es posible. Exemplo. Diuide 10. en dos partes, que multiplicada la vna por la otra môte 16. Toma la mitad de 10. q̄ es 5. quadrala y feran 25. quita los 16. y quedaran 9. la r. de 9. es 3. jũtalos cõ 5. q̄ es la mitad delos 10. y feran 8. esta es la vna parte. Quita los mismos tres
de

de los 5. y quedaran 2. por la otra. Nota si 9. no tuuiera R. discreta, dixeras que la vna parte era 5. p. r. d. 9. y la otra 5. m. r. de 9.

2. ¶ Si quisieres partir 1. q. en dos partes, q̄ sus quadrados hagan vn cierto numero, digo que si del quadrado de la dicha q. se quitare el cierto numero y dela resta se tomare la mitad, y la restares del quadrado de la mitad de la dicha q. y la R. dela resta juntada y quitada de la mitad de la dicha q. sera la vna y otra parte. Pero siẽpre el cierto numero ha de ser menor que el quadrado de la q. Exemplo. Haz de 10. dos partes, que la suma de sus quadrados sea 58. quadra los 10. y seran 100. de los quales quita 58 (q̄ es el cierto numero) y restaran 42. saca la mitad de 42. y sera 21. los quales quitaras de 25 (que es el quadrado de la mitad de la q. (que fue en este exemplo 10) y restaran quatro que su R. es 2. estos 2. quitados, y juntados a la mitad de la q. que es 10. hazen 3. y 7. por las partes demandadas. Nota si 4. no tuuiera R. discreta respondieras que serian las partes 5. p. r. de 4. y 5. m. r. de 4.

3. ¶ Si quisieres partir vna q. en dos partes, que multiplicando la mayor por la menor, sea quatro tanto q̄ partiẽdo la mayor por la menor? Diras q̄ la menor es R. 4. y si dixeras 5. tanto seria R. 5. Exẽplo. Sea 12. la q. la parte menor sera R. 4. q̄ es 2. la mayor sera todos los 12. m. r. 4. q̄ es 10.

4. ¶ Si quisieres hallar vn par de numeros, que la

la suma de sus quadrados haga vn cierto numero, y multiplicando el vno por otro, haga otro cierto numero. Digo, que quitando la mitad de la suma de los quadrados: y multiplicandola por si misma, y despues quadrando el producto, que quisieres que haga el vno por el otro, y deste quadrado restando el quadrado de la mitad la suma de los dos quadrados, la R. de la resta ayuntada, y quitada de la mitad de la suma de los quadrados, la R.V. de la suma y resta seran los dos numeros. Exemplo. Dame dos numeros que sus quadrados sean 68. y la multiplicacion del vno por el otro sea 16. Saca la mitad de 68, y sera 34. quadrala, y seran 1156. Deste quita el quadrado de 16. que es 256. y quedaran 900. la R. es R. 900. juntala con 34. que es la mitad de la suma de los dos quadrados, y seran 34 P. R. 900. que su R. V. sera R. V. 3. 4. P. R. 900. por el numero mayor, y R. V. 34. M. R. 900. por el menor. Los quales abreuiados, son ocho, y 2. por los numeros demandados.

5. ¶ Si quisieres hallar 2. numeros, que multiplicando el vno por el otro, haga vna cierta q. y la diferencia de sus quadrados sea otra cierta q. Digo, que tomando la mitad de la diferencia de los quadrados, y multiplicada en si, y junta da con la diferencia, la R. deste con junto sera el vn numero y mayor, y el menor sera la R. del quadrado del producto, y de la mitad de la di-

feréncia, sacada la mitad de la diferéncia, y la R. de la resta. Exemplo. Dame 3. numeros que multiplicando el vno por el otro, hagã 16. y la diferéncia de los dos quadrados sea 60. Toma la mitad de 60 (que es la diferencia) y sera 30. quadrada, y seran 900. despues quadra los 16 (que es el producto del vno en el otro) y será 256. los quales junta con 900. y seran 1156. Saca desto la R. que es 34. los quales junta con la mitad de la diferencia de los quadrados, que es 30. y seran 64. Saca la R. que es 8. y tanto es el numero mayor. Y para hallar el menor, quitaras los 30. (que es la mitad de la diferencia de los quadrados) de los 34. y quedaran 4. Tomã la R. que es dos, y tanto sera el menor.

6. ¶ Si quisieres buscar dos numeros que el vno sea en vna cierta q. mayor que el otro, y multiplicãdo el vno por el otro monta otra cierta q. Digo, que si tomas la mitad de la q. que el vno ha de ser mas que el otro, y la quadras, y sobre este quadrado pusieres la cierta q. la R. de la suma mas la mitad de la dicha q. sera el mayor numero. Y para hallar el menor quitaras la mitad de la q. de la R. de la suma. Exemplo. Dame dos numeros q̄ el vno sea 8. y 8. nouenes, mas que el otro, y multiplicando el vno por el otro, môte 1. Toma la mitad de 8. y 8. nouenes, que es 4. y quatro nouenes quadrados, y seran 19. y sesenta y vno 81. abos junta vno (que es la cierta q) y será

20. y sesenta y vno 81. abos, saca desto la R. q̄ es 4. y cinco nouenes, y juntalos con 4. y quatro nouenes (que es la mitad de la q.) y seran 9. y tãto es el numero mayor para hallar el numero, quita 4. y 4. nouenes de 4. y 5. nouenes) que fue la R. de la suma) y quedara vn nouen, y tanto sera el menor.

7. ¶ Si quisieres partir vna q. en dos partes, que la suma de sus quadrados monte cierta q. mas que el producto de la vna parte en la otra. Tomaras la mitad de la dicha q. y quadrarla has, y del quadrado restaras lo que quisieres q̄ monte mas, y la resta partirla has por tres, y la R. del quociente restada de la mitad de la q. es la vna parte, y la otra sera la mitad de la misma q. mas la R. del dicho quociente. Exemplo. Dame 2. numeros, que sumados hagan 10. y sus quadrados 28. mas q̄ el producto de la vna parte en la otra. Toma la mitad de 10. que es 5. quadrala, y seran 25. restalos de 28. y quedaran tres. Estos tres partelos. siempre por tres, y vendra 1. saca la R. y sera vno. Este vno juntaras, y quitaras de la mitad de los veynte (que es 5.) y vendran 6. y 4. por las partes que la demanda pide.

8. ¶ Si quisieres hazer la 1. q. dos partes tales, q̄ el quadrado de la vna haga vn cierto numero, mas que el quadrado de la otra. Quadraras la q. y del quadrado restaras el cierto n. y la resta partirla has por el duplo de la dicha q. y el quociete

sera la parte menor, y la otra sera la que falta para cumplimiento de toda la q. Exemplo. Haz de 10. dos partes tales, que el quadrado de la vna sea 60. mas que el de la otra. **Quadra** los 10. y seran 100. quita los 60. y quedaran 40. los quales parte por 20. (que es duplo de la q.) y vendrá 2. por la vna parte y la otra sera lo que falta de 2. para hasta los diez, que es la q) y sera 8.

9. ¶ Si quisieres diuidir 1. q. en dos partes, q̄ juntos sus quadrados con el producto de la vna parte en la otra haga vn cierto numero. **Quitaras** el cierto numero del quadrado de toda la q. y la resta siempre sera tãto como el producto de la vna parte en la otra. Exemplo. Haz de 10. dos partes, que juntos sus quadrados con el producto de la vna parte en la otra monte 84. **Quadra** 10 y seran 100. quita 84. y quedaran 16. Y tanto es el producto de la vna parte en la otra. **Aora** diras, haz de 16. dos partes tales, que multiplicando la vna por la otra hagan diez y feys. Sigue la regla de la primera conclusion deste mismo articulo, y vendran dos y ocho, por las partes que la demanda pide.

10. ¶ Si quisieres partir vna q. en dos partes, que en el producto de la vna en la otra, junto con la diferencia de la vna y de la otra hagan vn cierto numero, tendras la regla desta demanda. Haz de 12. dos partes tales, que multiplicadas la vna por la otra, y a esta multiplicaciõ jũt ada la dife-

rencia de las dos partes, sea la suma 36. Quita
 12. de 36. y quedaran 24. guardalos: despues 12.
 quita 2. y quedará 10. Saca la mitad de 10. q̄ son
 5. los quales quadra, y seran 25. Quita deste qua
 drado los 24. q̄ guardaste, y quedara 1. la R. de 1
 (q̄ es 1.) quita la de 5. (q̄ es mitad de 10. quedará
 4. esta es la vna parte: y la otra sera todos los 12.
 p. r. 1. menos 5. q̄ es la mitad de los 10. que son 8
 11. ¶ Si quisieres partir vna cantidad en dos par
 tes, que la primera se aya en proporción a vn
 cierto numero, como el cierto numero con la se
 gūda. Tomaras la mitad de la q, y quadrarla has
 y del quadrado quitaras el quadrado del cierto
 numero, y la R. de la resta quitada de la mitad
 de la dicha q. sera la menor. Y la mayor sera la
 misma R. y mas la mitad de la q. Exemplo. Haz
 de 25. dos partes, que la primera se aya en tal
 proporción con 10. como el 10. con la segunda.
 Digo que la primera sea cinco y la segunda 20.
 porq̄ assi como 5. es mitad de 10, assi 10. es mi
 tad de 20. Agora para hallar estas dos partes, sa
 ca la mitad de 25. que son doze y medio, y qua
 dralos y será 156. y vn quarto. Desto quita el qua
 drado de 10. que es 100. y quedaran 56. y vn
 quatro. Saca desto la R. que es 7. y medio, y la
 qual restaras de 12. y medio (que es la mitad de
 veynte y cinco) y restaran 5. por la vna parte, y
 la otra sera siete y medio, que dizes ser la R. mas
 12. y medio, que es la mitad de 25. que es 20.

12. ¶ Si quisieres partir vna q. en dos partes que multiplicada la R. de la vna por la R. de la otra haga vn cierto N. Digo, q̄ si quitas el quadrado del cierto N. del quadrado de la mitad de la dicha q. y la R. de la resta quitada de la mitad de la dicha q. lo que quedare sera la parte menor, y la mayor sera la R. junta con la mitad de la q. Exēplo. Parte 13. en dos partes, tales, que multiplicādo la R. de la vna por la de la otra monte 6. Toma la mitad de 13. que son 6. y medio, y quadralos y seran 42. y vn quarto: desto saca el quadrado de 6. (que es el cierto numero) y restaran 6. y vn quarto, q̄ su R. (que es dos y medio) quitada de la mitad de la q. q̄ es seys y medio, quedaran 4. y tanto es la primera parte. Y la otra sera 6. y medio, que es la mitad de la q. y mas los dos, y medio, que fue la R. que seran 9.

13. ¶ Si quisieres partir 1. q. en dos partes, q̄ multiplicada la vna por la otra hagavn cierto numero, y mas R. del mismo cierto n. Sacaras la mitad de la q. y quadrarla has, y del quadrado restaras el cierto n. y de la resta quita la R. del dicho n. y despues esta resta sacada de la mitad de la dicha q. sera la menor parte, y la mayor sera la misma resta, junta con la mitad de la q. Exemplo, Parte 12. en dos partes, que multiplicada la vna por la otra el producto sea 10. p. r. de 16. Digo, que tomes la mitad de 12. q̄ son 6. y quadrala y seran 36. desto quita 16. p. r. 16. y restará 20, m. r. 16. La

r.v. deste binomio, menos la mitad de la q. que es 6. es el menor numero. Y el otro sera la mitad dela cantidad P. la R.v. del dicho binomio, y assi seran las dos partes 6. m. r. v. 20. m. r. 16. Y 6, p. r. v. 20. m. r. 16. que abreuiados son 2. y 10.

14. Si quisieres partir 1. q. en dos partes, q̄ quitada la R. dela vna dela R. dela otra, la resta sera vncierto n. Restaras el quadrado dela mitad del cierto n. dela mitad dela q. y multiplicaras la R. de la resta por el cierto n. y el producto restar lo has dela mitad dela q. y lo q̄ q̄dare sera la parte menor, y la mayor sera la mitad dela q. mas la dicha resta. Exēplo. Haz de 10. 2. partes, q̄ sacada la R. dela vna dela R. dela otra q̄ den 2. quadra 2. y seran 4. saca los de 10. y restarā 6. toma la mitad q̄ son 3. quadralos, y serā 9. quitelos de 25. (q̄ es el quadrado dela mitad de 10.) y q̄ daran 16. la R. dela 16. sacada, y ayuntada a la mitad de 10. vendran 1. y 9. por las partes que la demanda pide.

15. Si quisieres partir 1. q. por las partes, tales, q̄ tal parte sea la menor dela mayor, como la mayor de toda la q. Digo, que juntando al quadrado de la q. la mitad del quadrado dela misma q. la R. de la suma, menos la mitad de la dicha q. sera la mayor, y la menor sera la suma de la q. con su mitad, menos la R. de la suma de los dos quadrados de la q. y de su mitad. Exemplo. Haz de 6. dos partes tales, que tal parte sea la menor dela mayor como la mayor de todos los 6. Qua

dra 6. y sera 36. quadra la mitad de 6. que son tres, y seran 9. Junta 9. con 36. y seran 45. de los quales toma la R. y sera R. 45. de esto quita la otra mitad de los 6. que son tres, y quedara R. 45. M. 3. y esta sera la parte mayor para hallar la menor, juntaras la mitad de los 6. con los mismos 6. y seran 9. de estos quita la R. de la suma de los cuadrados de 6. y tres que es la q. y su mitad, y quedaran nueue M. R. 45. y tanto sera la parte menor, y assi haras las semejantes.

¶ Si vna cantidad fuere partida entres partes, que el quadrado de la primera sea como la suma de los quadrados de las otras 2. Digo q̄ si tomas la mitad del quadrado de la primera, y del restas el quadrado de la mitad de las otras dos, y de la resta tomares la R. y la juntares con la mitad de las 2. la suma sera la segunda parte, y la dicha R. quitada de la dicha mitad, la resta sera la tercera. Exemplo, Pon que la cantidad es doze, las partes sean 5. 4. 3. que el quadrado de la primera es tanto como la suma de los dos quadrados de las otras 2. Agora toma la mitad de 25. (que es el quadrado de la primera) que son doze y medio, y quita dellos el quadrado de 3. (q̄ es la mitad de los otros 2) y seran 12. y vn quarto, y restara vn quarto, que su R. es medio, el qual sumaras con tres y medio, y seran 4. y esta es la segunda parte. Quita medio de los 3. y medio, y quedara 3. por la tercera. Y por consiguiente 5. por la primera

mera. 17. ¶ Si quisieres partir vna q. en quatro partes, que la suma de los quadrados de las dos primeras, sea el duplo de los quadrados de las otras dos. Digo, que siempre sera la menor la diferencia de las dos partes, que son medias entre la primera y quarta. Exemplo, Sea la q. 22. y las dos partes primeras 8. y 6. y las segundas 7. y vno. Los quadrados de las primeras montan 100. y los de las vltimas cincuenta, como pide la demanda. Y assi haras de otras, teniendo cuidado que la tercera, y quarta han de ser tanto como la primera, y la tercera mayor que la segunda, en tanta q. como la quarta.

18. ¶ Si 1. q. fuere partida en 4. partes, que la suma de los quadrados de las dos primeras, sea el quarto de los quadrados de las postreras. Digo que si de la q. hizieres dos partes que la vna sea el vn tercio, y la otra los dos tercios, y aquellas dos partes subdiuidieres cada vna en otras 2. partes que la vna sea los dos quintos, y la otra los tres quintos, las dos menores seran la primera segunda, y las dos mayores la tercera y quarta, Exemplo sea la q. 15. el tercio es 5. y los dos tercios 10. Aora diuide 5. en dos quintos, y en tres quintos, y vendran 2. y 3. por las primeras partes. Diuide semejantemente los 10. en dos quintos, y en 3. quintos, y vendran 4. y 6. por las otras dos, y seran todas 2. 3. 4. 6. las quales tendran la propiedad que la demanda pide.

Cap.V. Trata de las consonancias dissonancias de musica, y de sus definiciones.

Despues que en los capitulos precedêtes declaramos la proporcion, resta en este capitulo mostrar, y declarar las proporciones de las consonancias de musica. Para entendimiento de lo qual sera necessario definir primero, que cosa sea consonancia. Y assi digo, que consonancia (segun musicos) es vn ayuntamiento de vn sonido q̄ se causa de dos, o mas voces en vna de las 12. consonancias, o especies de musica, porque no siêdo de vna dellas, aunque fuesse de muchas voces, no seria consonancia, sino dissonancia. Las quales se han de dar, y herir juntas a la par en principio del golpe del compas. A cerca de lo qual es de saber, que toda cosa sonora, es en vna de tres maneras. Sonancia, consonancia, dissonancia. Sonancia es, quando alguna cosa suena sola sin compania de otra. Assi como el sonido da vna campana, o de otra qualquiera cosa sonora. Consonancia es, quando dos, o mas cosas suenan juntas, y concertadamente, y deleytan el oydo. Dissonancia se dize lo que no es agradable al oydo. porque suena mal.

¶ Las consonancias de musicas son 12. conuiene saber quatro simples, quatro compuestas, y quatro mixtas, que los musicos dizen de compuestas. Las simples, son vnisonus, tercera, quita,
sex-

sexta. Destas quatro, el vnisonus, y quinta se dicen perfectas. Tercera y sexta imperfectas. De do se sigue, que las que se compusieren de las 2. perfectas se diran compuestas perfectas, como en el articulo siguiente mejor se entendera.

¶ Las consonancias q̄ dicen imperfectas, vnas vezes son mayores, y otras son menores. Y de aqui toman denominacion de llamarse imperfectas, porque no tienen cierta medida, mas de que si sobre vna perfecta menor compusieres alguna consonancia, la tal compuesta, que resulta re, se dira compuesta menor, y al contrario la q̄ se compusiere de imperfecta mayor, se dira compuesta mayor. Exemplo. Si sobre tercera menor que es como de re, a fa, añades siete puntos, hara dezena, y nombrarse ha dezena menor. Y si sobre tercera mayor, que es assi como de vt, a mi, añades siete, haras dezena mayor.

¶ Las quatro consonancias compuestas son octaua, dezena, dozena, trezena.

¶ Las compuestas, o mixtas son quinzena, dezi setena, dezi nouena, veyntena. Y desta suerte se pueden componer en infinito: diziendoveynte dosena, veyntequatrena, veyntesetena, &c. hasta do se pudiere formar voz.

Articulo I. De este V. Cap. Declara la composicion, y descomposicion de las consonancias de musica.

¶ La

¶ La orden que estas consonancias lleuan en su composicion, procede desta manera. Que si añades sobre qualquiera consonancia simple siete puntos, quedara compuesta, y nombrarse ha segun el numero que hizieren. Exemplo. Si sobre vnifonus añades 7. puntos, haze ocho, y dirase octaua, y si sobre octaua añades otros 7. puntos hara 15. y nóbrarse ha quinzena, y así en las demas. Nota quãdo quisieres ayuntar, o poner vna qualquiera consonancia con otra semejante, o desemejante, siempre el conjuncto has de entender ser vn punto menos de lo que pareciere, por que se cuenta exclusiue. Exemplo. Añadiendo vna quinta, con vna octaua, monta treze, pues quita vno de 13. y quedaran doze, y así se dira dozena, y no trezena. Mas por euitar este quitar de vno he dado por regla añadir siete por vna octaua. Y porque mejor sea entendido, se notará dos cosas. La primera, que quitado siete puntos de qualquier consonancia que pudieres, la tal consonancia que quedare, sera de donde se compuso de la que quitaste el siete. Exemplo. Si de ocho, que es octaua, quitas siete, queda vno que es vnifonus. Pues deste vnifonus diras auer sido compuesta la octaua que descompusiste. De lo qual se sigue, que tantas quantas vezes pudieres quitar siete de vna consonancia, tantas vezes diras ser compuesta la tal consonancia. Exemplo.

¶ Vna dezifetena, pregunto de quien està compuesta, y quantas vezes se compuso? Primeramente quita siete y quedara dezena. Y diras que la dezifetena estaua compuesta de la dezena. Quitata mas desta dezena otros 7. y quedarã tres que es terrcera. Y assi diras, que la dezena està compuesta dela tercera. Y assi quedara entendido, q̄ vna deziferena estaua compuesta de otra compuesta. Nota sino pudieres quitar siete de alguna consonancia, sera simple y no compuesta. De do se entendera, que la primera compuesta, es la octaua, y las demas de sus sequentes, subiendo para arriba.

¶ Nota, que si sobre octaua se añade vna vez 7. puntos, la que resultare se dira segunda vez compuesta, y añadiendo mas otros 7. sera terceravez compuesta. Y assi en infinito. Exemplo. Si sobre octauo añades 7. haze quinzena, y sera segunda compuesta, y si sobre quinzena añades siete hara veyntedofena. La qual veyntedofena sera tercera compuesta, y assi en las demas.

Articulo segundo deste V. Capitulo. Trata la proporción de las consonancias simples de musica.

¶ Las consonancias y dissonancias, son 15. conuiene saber siete simples, y ocho dissonancias. Las consonancias simples, son vnifonus, tercera mayor, tercera menor, quarta, quinta, sexta mayor, sexta

sexta menor. Las dissonancias son segunda mayor, segunda menor, tritono, quarta menor, quinta mayor, quinta menor, septima mayor, y septima menor. La coma no se cuenta en el numero de las consonancias, ni dissonancias, porq̄ no es otra cosa, sino la diferencia que ay entre semitono menor cantable, y el semitono mayor incantable. Entendido esto, es de saber, que Pythagoras oyendo la harmonia, que en casa de vn herrero se causaua de los golpes de quatro martillos que herian a la par, el vno de los quales pesaua doze libras, otro nueue, otro ocho, otro seys. El de doze cotejado con el de 6. hallo ser proporció dupla, y esta es la proporció del Diapason, que es la que dizen octaua. Y cotejado con el de nueue, hallo estar en sexquitertia. Y esta es la proporcion del Diatesaron, q̄ es la que dizen quarta perfecta. Así mismo cotejo el de 9. libras con el de seys, y hallo ser proporcion sexquialtera, y esta es la proporcion del Diapente, que es lo que llaman los Musicos quinta perfecta. Así mismo la proporcion del de nueue libras con el de ocho, es sexquioctaua. Y esta es la proporcion del tono. De las quales quatro proporciones, se deriuau, y nacen todas las proporciones de las consonancias simples y compuestas, como adelante mejor se entendera.

¶ La proporcion del vnisonus, es yqual. Así como de 2. a dos la qual no excede, ni es excedida,

da, que en musica es afsi, como quien dize, vt, vt
re, re.

¶ La proporcion del tono es, como de 9. a 8. como arriba diximos. Componefe 'de semitono mayor incantable, y semitono menor cantable, o de nueue comas, que en musica es afsi como de vn punto a otro, como, vt, re.

¶ La proporcion del semitono mayor incantable es como de 2187. a 2048. que en musica es 4. comas.

¶ La proporcion del semitono menor cantable es como de 255. a 243. es en musica como de mi a fa, que son cinco comas.

¶ La proporcion de la diferencia del semitono mayor incantable, al semitono menor cãtable, que es vna coma, o nouena parte del tono, es afsi como de 531441. a 524288.

¶ La proporcion del semitono, es de 1304. a 1944. que en musica es como de re a fa. Componefe de vn tono, y semitono menor cantable, que los Musicos llaman tercera menor. Dezir que se compone de vn tono, y semitono, mayor, es falso. Como lo prueua el Padre Fray Bernardo Zorrilla. El qual error procede de auerse algunos persuadido, que el semitono mayor, es al que tiene mayor denominacion. Y al contrario teniendo por menor al que tiene menor denominacion. Y esto es al contrario, porque mientras mayor fuere la denominacion de

vna cōsa, tanto, sera menor, y quanto fuere menor tanto sera mayor (como se prueua por la 5. concepcion de 7. del Euclides) como no sea en proporcion multiplex.

¶ La proporcion del ditono, es como de 81. a 64. que en musica es como de vt, a mi, componese de dos tonos, llamanle los Musicos tercera mayor.

¶ La proporcion del Diatessaron, es sexquitercia. Como de quatro a tres, que en musica es como de vt, a fa. Componese de quatro puntos, y de dos tonos, y de vn semitono menor cantable llaman la quarta perfecta.

¶ La proporcion de la quarta mayor, que se dize tritono, es como de 729. a 512. Como se puede prouar, sumando 3. tonos, de los quales se compone (como se muestra en este lib. cap. 4. arti. 5. de sumar proporcionaciones) Difiere del Diatessaron en que esta tiene 3. tonos, y el Diatessaron tiene 2. y vn semitono menor cantable. Llamase quarta mayor, componese de quatro puntos, y es disonancia de 4. voces, y en musica es como del fa de fefaut, al mi de befabemi.

¶ La proporcion de la quarta menores, como de 8192. a 6561. que en musica es, como del sustituydo de fefaut, hasta el fa de fefaut no sustituydo. Componese de 4. puntos, y de vn tono, y dos semitonos menores cantables. Difiere del Diatessaron, que es la que dizen quarta perfecta

en vn semitono mayor incantable. La qual si se resta de la sexquitercia, que es la proporcion del Diatesaron, o quarta perfecta, quedara la misma proporcion que hemos dicho.

¶ La proporcion del Diapente, que se dize quinta perfecta, es sexquialtera. Como de 3. a 2. Compone se de 5. puntos, o de tres tonos, y vn semitono menor. En musica es como de vt, a sol.

¶ La proporcion de la quinta menor, que por otro nombre se dize remissa, es como de 3072. a 2187. Cõpone se de 5. puntos, y de 2. tonos, y 2. semitonos menores cantables. Difere del tritono q̄ la quarta mayor, en vna coma, difiere asimismo de la quinta perfecta en vn semitono mayor incantable. En musica es como del mi de besabemi hasta el fa de fefaut agudo.

¶ La proporcion de la quarta mayor imperfecta es como de 6561. a 4006. Compone se de cinco puntos, y de 4. tonos. Difere de la quinta perfecta en vn semitono mayor incantable. En musica es como del fa de fefaut, hasta el fastinuydo de cesolfaut.

¶ La proporcion de la sexta mayor, es como de 27. a 16. que en musica, es como de vt, a la. Compone se de 6. puntos, y de 4. de tonos, y vn semitono menor cantable.

¶ La proporcion de la sexta menor, es como de 768. a 486. Cõpone se de 6. puntos, y de 3. tonos y 2. semitonos menores cantables. Que en musica

es como de elami hasta el fa de cesolfaut.

¶ La proporcion de la septima mayor, es como de 243.a 128. Y componese de 7.puntos, y 5. tonos, y vn semitono menor cantable, que es mas vn tono que la sexta mayor. En musica, es como de cesfaut hasta el mi de besabemi.

¶ La proporcion de la septima menor, es como de 16.a 9. Componese de 7.puntos, y de quatro tantos, y dos semitonos menores cantables, y es mayor vn tono que la sexta menor. Y en musica es como de cesfaut al fa de besabemi.

Articulo III. Deste V. Cap. De la proporcion de las consonancias compuestas, y de sumar las proporciones unas con otras.

¶ Para saber la proporcion de toda consonancia compuesta, sumaras las proporciones de las simples consonancias que compusierē la tal cōpuesta, como se mostrò en el cap. IIII. artic. V. de sumar proporciones, y la suma sera la proporcion de la tal compuesta. Y tendras auiso, que assi como diximos, que añadiendo 7. puntos a vna qualquiera consonancia la que resultasse seria compuesta, assi quando quisieres saber la proporción de alguna primera compuesta, doblaras la proporcion dela simple, sumandola con otro tanto, por la regla del articulo arriba alegado, y lo que montare, sera la proporcion dela tal cōpuesta

puesta primera. Exemplo. Si sobre quinta se aña de 7. puntos haze dozena. Para saber la proporcion desta dozena, miraras la proporcion de la consonancia simple, que la compone, q̄ es quinta, que su proporcion es sexquialtera. Afsi como de 3. a 2. Como en el tercero capitulo diximos. La qual proporcion sexquialtera, la doblaras sumandola con otra sexquialtera, y montara proporcion dupla sexquiquarta. Como de 9. a quatro. Y afsi diras que la proporcion de la dozena, es como de nueue a quatro. Otro exemplo. La proporcion de la onzena que sera? Mira la proporcion de la consonancia de que se compone la onzena, lo qual fabras quitando siete puntos de onze, y quedaran quatro, que denota quarta: pues la proporcion de la quarta ya se sabe que es sexquitercia, afsi como de quatro a tres, como hemos dicho en el capitulo tercero. Pues dobla esta proporcion, sumandola con otro tanto, y montara proporcion super septempartiens nonas, que es como de diez y seys a nueue, y tanto es la proporcion de la onzena. Y afsi se sabra la proporcion de otra qualquiera consonancia compuesta.

*Articulo IIII. Deste V. Cap. Muestra sumas las
proporciones de unas consonancias con otras
simples, o compuestas.*

¶ Exemplo, si dixessen suma las proporciones de vna octaua, y del tono. Mira las proporciones de la octaua, que es dupla, assi como de dos a 1. y la de vn tono, que es sexquioctaua, como de nueue a ocho, y suma la vna con la otra (de la manera que se mostrò en el cap. IIII. articulo V. de sumar proporciones) y montará dupla sexquiquarta. Assi como de nueue a quatro, y tanto fera la proporcion de la composicion de la octaua con vn tono. Otro exemplo. Suma có el Diapasson, que su proporcion es dupla, como de dos a vno, con vna quinta perfecta, que es lo que dizen Diapente, que su proporcion es sexquialtera, como de 3. a dos, segun la regla dada de sumar proporciones manda, y môtará tripla: Assi como de 6. a 2. A cerca de lo qual es de notar, q̄ sumar vna qualquiera consonancia con otra, no es por otro fin, sino para saber la proporcion que auran quando ambas se juntaren. Nota de la manera que sumas dos consonancias, assi sumaras tres y quatro, y quantas mas quisieres, por la regla de sumar muchos numeros proporcionales del libro, y capitulo arriba alegado.

¶ Nota que algunos pueden dudar que origen fue, o por do se supo que la proporcion del semi tono menor fuesse como de 256. a 243. y no de otro ningun numero fuera desta obediencia de proporcion. Y por el semejante en los numeros
de las

de las demas cõsonãcias, queda la misma duda. A esto se responde como al principio dixẽ, que todas las consonancias se engendran, y traen su origen de las proporciones de los quatro martillos de Pythagoras, y mediante las diferẽcias en que vnas de otras difieren, se conoce la proporcion de cada vna. Exemplo. La proporcion del Diatessaron, es sexquitercia. Y componese de dos tonos, y de vn semitono menor. Pues si quieres ver, que proporcion es la del semitono menor, resta la proporcion de los dos tonos, que es como de 81. a 64. como se mostrò en este libro 5. c. 4. artic. VI. Y lo que quedare seran los numeros proporcionales del semitono menor. O al contrario resta la proporcion del semitono de la misma sexquitercia, y quedaran los numeros proporcionales de los dos tonos. Y si quisieres saber la proporcion del semitono mayor, y menor, ya se ha dicho, que de dos semitonos, cõuiene saber, del mayor y menor, se compone el tono. Pues restãdo de sexquioctaua, que es la proporcion del tono, la proporcion del semitono menor, lo que quedare sera el mayor, y al contrario, quitando la del mayor quedara la del menor. Afsi mismo si quisieres saber la proporcion de la coma, resta la proporciõ del semitono mayor dela del menor, y lo que quedare, sera la proporcion de la coma: y esto es, porque la coma es la diferencia que ay del vno al otro,

porque el tono (como en su lugar se dixo) se cõpone de 9, comas. De manera, que vna coma es vna de 9. partes del tono, y assi el semitono que diximos menor, tiene las 5. comas destas nueue y el semitono, que dizen mayor tiene las 4. que faltan. Y la proporciõ de vna coma es, como de 531441. a 524288. De do queda claro que el semitono que dezimos menor, es mayor en cantidad por razon que es menor en denominaciõ, y el que dizen mayor, es menor en cantidad, y mayor en denominacion. Y desta manera se fabrica la proporcion de toda consonancia, sacando por las de vnas las de otras.

Cap. VI. En que se declara la Rithmimachia (que dizen) Pythagorica, para exercicio de la Arismetica Especulatiua.

Pelea, o con-tienda de numeros. **D**ize se Rithmimachia de Rithmos mu, q̄ significa numeros, y machias as, q̄ es pugna, id est, numerorum pugna. Para hallar los numeros que son necesarios para esta pelea. Notaras que ha de auer dos classes, o hazes en vn campo de 10. casas, o espacios de longitud, y 8. de latitud. La vna classe es de numeros pares, y la otra de impares.

¶ En la classe de los numeros pares ay 12. proporciones, cõuiene saber 4. Multiplices en los calculos redondos, q̄ son dupla, como de 4. a 2.

Quadru-

Quadrupla, como de 8. a 2. Sextupla, como de 36
 a 6. Y octupla, como de 64. a 8. En los calculos
 triangulares, ay otras 4. proporciones, que son
 sexquialtera, como 9. a 6. Sexquiquarta, como de
 25. a 20. Sexquifexta, como de 49. a 42. Sexqui-
 octaua, como de 81. a 72. En los calculos qua-
 drados, y Pyramides ay otros 4. conuiene saber.
 Superbipartiēs tertias, afsi como de 25. a 15. Su-
 perquadruparties quintas, q̄ es como de 81. a 45.
 Y supersexpartiens septimas, como de 196. a 91.
 Superoctipartiens nonas, como de 289. a 153.
 Las quales 12. proporciones son incluydas, y se
 abraçan en los 3. primeros generos simples de
 proporción q̄ dizen multiplex, super particula-
 ris, superparties, tomãdo de cada genero 4. pro-
 porciones. La classe de los impares, toma las mis-
 mas proporciones por numeros impares, afsi co-
 mo tripla, como de 9. a tres. Quintupla como de
 25. a 5. Septupla como de 49. a 7. Nonucupla, co-
 mo de 81. a 9. Otras 4. del genero q̄ dizen super-
 particularis, como sexquitertia, como de 16. a
 12. Sexquiquinta, como de 36. a 30. Sexquisepti-
 ma, como de 64. a 56. Sexquinona, como 100. a
 90. Las otras 4. del genero de superpartiens son
 supertriparties quartas, como de 49. a 28. Super-
 quinparties sextas, como de 121. a 66. Supersep-
 tempartiens octauas, como 225. a 121. Superno-
 uempartiens decimas, como de 351. a 90. En-
 tendido esto, notaras como ay dux, y a comes.

Dux es todo numero mayor, y comes es el menor. Los quales numeros se han de poner gradatim siguiendo los mayores a los menores.

Articulo I. Deste VI. Cap. Muestra como se mueven estos numeros, y se prenden unos a otros.

LOS calculos circulares, o redondos andan vna casa adelante y atras, y hazia la diestra, y siniestra, como quiera que quisieres. Los triangulares, saltan a tres casas hazia do quisieren, como no sea gulariter. Los quadrados, y Pyramidas quatro casas y retiranse otras tantas, y menos lo que quisieres. Su prender es hazia delante, y no angulariter. La Pyramis de los numeros pares se dize perfecta. Componese de los primeros 6. quadrados, comenzando de la vni-
dad que son 1.4.9.36.25.26. La suma de los quales es 91. La Pyramis de los impares se dize truncata. Componese de los primeros cinco numeros quadrados siguientes al noueno numero quadrado, que son 16.25.36.49.64. que la suma de todos es 190.

¶ *Vltra desto es de saber, que ay maxima harmonia, y minima harmonia. Maxima harmonia es quando vno pone 3. piezas de su classe con alguna otra pieza del contrario de modo que todos 4. calculos hagan la proporcion que hazen estos*

estos numeros 2. 3. 4. 6. de los quales el dos es
 con el tres, como el 4. con el 6. que es sexquial-
 tera proporcion, y el tres es medio Arifmetico
 entre 2. y 4. y el 4. es medio Harmonico entre 6.
 y 3. Quando esto afsi aconteciere, es como en el

*Lee el
 9. arti.
 del 6. 6.
 deste 5.
 lib.*

axedrez mate de peon. Minima Harmonica es
 quando en los quatro calculos tres devna classe
 y vno de la otra contraria no ay fino dos me-
 dios qualesquiera que sean, afsi como 5. 15. 25.
 45. El 25. es medio Arifmetico entre 5. y 45. y
 15. es medio Geometrico entre 5. y 45. quando
 esto afsi se haze, aunque gana, no con tanta hõ-
 ra, como quando se haze maxima Harmonia.
 Nota si los quatro calculos que estan en la classe
 de los pares que tienen estos numeros 2. 9. 16.
 72. los pudieses llegar a la classe de los impa-
 res, haria maxima Harmonia.

¶ Nota quando batallando dixere alguno. Este
 calculo pongo aqui para hazer maxima Harmo-
 nia el contrario es obligado a dexallo estar, y
 no prendelle, aunque pueda.

¶ Nota mas, si para hazer Harmonia menor fal-
 tare calculo, para hazer medio Harmonico, lo
 puede poner el que le huuiere menester de los
 numeros que su contrario le huuiere prendido.

*Articulo II. Deste VI. Cap. Muestra reglas para
 saber como vn calculo prende a otro.*

¶ Primera regla. Vn numero igual prede a otro igual en derecho, y no faltando angulariter.

¶ Segunda regla. Si dos numeros de vna classe cercaren a otro de la otra, y los puntos de los numeros de los dos calculos igualaren con el numero de la classe contraria, los dos prenden al vno, si primero no se retirasse el vno por jurar de mano.

¶ Tercera. Si la multiplicacion del numero de vn calculo por el del otro se igualasse con el numero de otro calculo del contrario, los dos prenden al vno, si no se retira.

¶ Quarta. Si algun numero menor fuere multiplicado por los espacios, o casas que huuiere entre el mismo menor, y otro mayor, el menor se passara a do esta el mayor, y lo prendera.

¶ Quando tres calculos cercaren a otro, de arte que no tenga por do salir, qualquiera de los tres prende al ahogado.

¶ Si vn numero mayor fuere diuidido por las casas vacuas que huuiere entre el mismo, y otro menor, si el quociente fuere duplo del menor, el mayor prende al menor. Lo mismo es, si lo que sobrare de la tal diuision fuere el duplo del menor. O si la rayz quadrada, o cubica del quociente fuere tanto como el menor de qualquiera manera destas prende el mayor al menor.

¶ El basis, o fundamento de la Pyramis de los pares es 36. y de los impates 64. Pues si alguna

guna de las dos bases 36. o 64. mouiendose de-
rechamente encontrare alguna de las dos Pyra-
midas delas que dellas se componen, que de 91
o 64. la prenden.

¶ Si vn numero fuere multiplicado por los espa-
cios, o casaf vacuas que huuiere entre el y la Py-
ramis contraria : si la tal multiplicacion fuere
igual a la maxfima basis de la tal Pyramis, pren-
dera el numero a la Pyramis.

¶ Si las bases menores hallaren a la Pyramis
en su recto curso la toman, y al contrario, segun
el que acometiere primero.

¶ Si vn numero de vna classe fuere multiplica-
do por los campos intermedios entre el y la Py-
ramis contraria, si la multiplicaci6n fuere igual
a alguna de las 6. o 5. bases de las Pyramis, el
numero quita la Pyramis.

¶ Si entre la Pyramis y algun numero de la par-
te contraria los cãpos entremedios fuerẽ, igua-
les a la rzyz quadrada de algunas bases de las
Pyramides, la Pyramis prendera a la basis.

¶ Qualesquiera numeros q̄ fueren multiplica-
dos por los campos intermedios, si hizieren las
bases de las Pyramidas, prenden a las Pyrami-
das, y aun a la basis que en su lugar toparen.

¶ Todo numero q̄ inmediatamente recto calle
topare con otro contrario, y hiziere con el tal
numero proporcion, qual el haze con otro de su
figura, en su misma classe, le prende. Inmediata-
mente

380 LIBRO QUINTO.
mente quiere dezir, que no aya casa vazia entre
vno y otro.

¶ Ha de auer gran cuydado en no perder
los numeros con que se puede hazer maxima
harmonia , y procurar que el contrario los
pierda.

¶ Quando las bases de la tu Pyramida se
mueuen de la parte del contrario , siempre mi-
raras a tu Pyramis no este el lugar a do reciba
peligro.

¶ Quando el contrario constituyere algun
numero para hazer maxima Harmonia (pues
hemos dicho que no se puede tomar) procura-
ras cercalle con tus numeros de modo que no
pueda hazella : en lo demas que auria mucho
que dezir remitome al axedrez. Lo que en
este libro se ha tratado se en-
tendera mejor en
el septie-
mo.

Fin del Quinto Libro.

TRATA

TRATA RE- GLAS PARA CONTAR SIN pluma, y de reduzir vnas mone- das Castellanas en otras.

REGLA PARA REDVZIR *ducados a maravedis.*

PARA Hazer ducados marauedis, quitaras la mitad, y quarta parte de los ducados, y lo que quedare seran millares de marauedis.

¶ Exemplo. Diez y seys ducados, quantos mil marauedis seran? Quita la mitad de diez y seys que son ocho, y destos ocho la quarta parte que son dos, y quedaran 6. Estos 6. son millares. Y assi responderas que 16. ducados, son 6. mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Cien ducados quantos marauedis seran: Saca (como la regla manda) la mitad, que son cinquenta: y destos 50. la quarta parte, que son 12. y medio. Pues quien quita doze y medio, de cinquenta, quedan treynta y siete y medio. Pues di que son treynta y siete mil y quinientos.

¶ Nota si se te haze trabajoso saber quanto es la quarta parte, saca la mitad de la mitad de la cantidad

tidad. Exemplo. La quarta parte de 50. que se-
 ra? La mitad de 50. son 25. y de veynte y cinco-
 la otra mitad son 12. y medio, pues estos 12. y
 medio diras ser la quarta parte de cincuenta.
 ¶ Nota, por quanto la regla manda que se sa-
 que mitad, y quarta parte: por tanto ay necesi-
 dad, que la suma de los ducados, que quisieres
 reduzir a marauedis, sean quartos cabales, para
 que mas facilmete pueda vno que no sabe que-
 brados, sacar mitad, y quarto enteramete. Pues
 quando viniere alguna suma de ducados, que no
 sea compuesta de quatro cabales, quitaras vn
 ducado, o dos, o tree, y de lo que quedare haras
 lo que la regla manda (porque no se dara nume-
 ro, o suma de ducados, que apartando vno, o dos
 o tres, no queden quatro cabales) Y a la tal su-
 ma añadiras el valor de aquel ducado, o de los
 dos, o tres q̄ apartares, como por los exemplos
 mejor entenderas. Nueue ducados quantos ma-
 rauedis seran? Quita vn ducado, y quedà ocho:
 de los quales se hara segun manda la regla, pues
 que de 8. facilmete se puede sacar mitad, y quar-
 to, y hallaras que montan tres mil marauedis.
 Con los quales tres mil marauedis juntaras los
 marauedis, que vale el ducado que apartaste, q̄
 son trezientos y setenta y cinco, y monta todo
 tres mil y trezientos y setenta y cinco marauedis.
 Y tanto diras que valen los dichos ducados.

¶ Otro exemplo. Treynta ducados quantos maruedis son? Por quanto treynta no son quatro cabales, aparta 2. ducados, y no curaras dellos y haras la regla de los veynte y ocho (pues son quatro justos) sacando la mitad, que son catorze, y de catorze la quarta parte que son 3. y medio, y quedaran diez y medio. Y assi diras, que los veynte y ocho ducados, son diez mil y quinientos. Cō lo qual juntaras los maruedis que valen los dos ducados que apartaste, que son setecientos y cinquenta y montaran todos los 30, ducados, onze mil y dozientos y cinquenta maruedis.

¶ Otro exemplo. Siete ducados, quantos maruedis seran? Aparta tres ducados de los siete, y quedaran quatro. Haz la cuenta de los quatro, (como la regla manda) diziendo. La mitad de quatro son dos. Y la quarta parte de dos es medio. Pues quitando medio de los dos, quedara vno y medio, que es mil y quiniētos. Ya que sabes que los quatro ducados son mil y quinientos junta con ellos, mil y ciento y veynte y cinco (que es el valor de los tres ducados que apartaste) y seran dos mil y seyscientos y veynte y cinco, y tanto mōtan los dichos siete ducados. De suerte, que si preguntan vn ducado quantos maruedis son? No curaras de regla sino dezir: que es trezientos y setenta y cinco maruedis. Si dixeres dos ducados, diras que setecientos y cin-

cinquenta. Y si tres mil y ciento y veinte y cinco. Y si quatro, haras loque la regla manda, pues es quatro cabal. Si cinco dexar vno a parte: y hazer de los quatro por la regla, y a lo que saliere, añadir los marauedis del vno que apartares. Si dixerē seys, apartaras dos: y haras de los quatro. Y añadiras al valor de los quatro, los marauedis de los dos, que a partares. Y si siete quitaras tres como se ha dicho. Si dixeren ocho, haras de todos: pues son quatro justos. Y assi proseguiras con otra qualquiere suma, de grande, o pequeña cantidad, guardando la regla, que en la practica de los exemplos precedentes hemos dicho.

¶ Nota mas, que si la suma de los ducados fuere grande, que despues de auer sacado la mitad, y quarta parte quedaren millares. En tal caso tantos quantos fueren los millares, tãto scüotos tomarás. Exemplo. Ocho mil ducados quantos marauedis seran? Quita la mitad de ocho mil que son quatro mil: y de quatro mil, la quarta parte, que son mil, y quedaran tres mil. Pues por cada vn mil destos toma vn cuento, y assi diras, q̄ son tres cuentos los ocho mil ducados.

¶ Nota, que el que supiere quebrados, no tēdra necesidad de apartar vn ducado, ni dos, ni tres mas juntamente de qualquiera suma los reducirá a marauedis: haziendo lo que la regla manda. Exemplo. Diez ducados quantos marauedis seran?

seran? Saca la mitad de diez, que son cinco: y de cinco la quarta parte, que es vno y vn quarto, y quedaran tres, y tres quartos. Y assi diras que son tres mil, y mas tres quartos de mil marauedis. Y porque vn quarto de mil marauedis son doziientos y cinquenta, los tres quartos seran setecientos y cinquenta. Y assi se hara de otra qualquiera suma, porque el dexar a parte vn ducado, y dos y tres, se haze para facilidad de los que son nueuos en esta arte.

¶ La misma regla por otra manera. Para hazer ducados marauedis, quitaras la quarta parte de los ducados, y la mitad de lo que quedare, seran millares. Exemplo. Veynte ducados quantos marauedis son? Quita la quarta parte de veynte, que son cinco, y quedaran quinze. De quinze la mitad son siete y medio, los quales son millares. Y assi responderas, que los veynte ducados montan siete mil y quinientos marauedis. Acerca del apartar vn ducado, o dos, o tres, sino se puede sacar quarta parte enteramente, haga se segun en la precedente regla se dixo.

Regla para reduzir marauedis a ducados.

¶ Para hazer de marauedis ducados, quitaras la tercia parte de dos millares. Y lo que quedare, quatro doblandolo seran ducados. Exemplo. Nueue mil marauedis quantos ducados seran?

Saca la tertia parte de los nueues, que son tres, y quedaran seys. Estos seys quatro doblaras diziendo. Quatro vezes seys son veynte y quatro. Pues di que son veynte y quatro ducados los nueue mil marauedis.

Otro exemplo. Veynte y vn mil marauedis quantos ducados seran? Saca la tertia parte de veynte y vno, que son siete, y quedaran catorze. Quatro dobla los catorze, y seran cinquenta y seys. Y si se haze cosa obscura desta suerte, tenga se cuenta de doblar dos vezes lo que quedare, despues de auer sacado el tercio, como en el exemplo puesto, de veynte y vn mil marauedis, q̄ sacado el tercio, que son siete, quedan catorze. Dobla catorze dos vezes diziendo. Catorze y catorze son veynte y ocho. Otra vez veynte y ocho, y veynte y ocho son cinquenta y seys, que de vna manera, o de otra son cinquenta, y seys ducados, los dichos veynte vn mil marauedis.

Nota que por quanto la regla manda que se sa que la tertia parte de los millares, que quando viniere alguna suma de millares, que no se pueda enteramente sacar el tercio sin que algun millar se quiebre, dexaras a parte vn millar, o dos, y obraras con lo demas, segun la regla manda. Y a los ducados que montare, añadiras los ducados del mil, o dos mil que apartares. Mil marauedis son dos ducados y siete reales, y doze marauedis. Y dos mil marauedis son cinco ducados

cados, y 3. reales, y 23. marauedis. Y esto basta: porque ningun numero aura, que dexa, de tener tercia parte justamente, quitandole vno, ò dos. Exemplo. Diez mil marauedis quantos ducados seraa? Por quanto en diez no ay tercia parte, sin que se quiebre la vnidad, quitaras de los diez mil vn millar: y quedaran nueue. Mira aora primero, quantos ducados seran los nueue mil: y hallaras que son 24. ducados. Iunta con estos los ducados que vale el millar, que dexaste aparte: que son dos ducados y siete reales, y doze marauedis. Y sera por todo, veynte y seys ducados y siete reales y doze marauedis, y tanto montan los diez mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Diez y siete mil marauedis, quantos ducados son? Porque la tercia parte de 17. son cinco, y sobran dos, por tanto dexaras dos mil a parte: y haras la regla de los quinze mil. Y a la suma de ducados que montare los quinze mil: añadiras los ducados que valieren los dos mil que apartaste. Pues (segun la regla) los quinze mil marauedis montan quarenta ducados, y los dos mil ya se ha dicho que son cinco ducados, y tres reales y veynte y tres marauedis, juntese todo, y montara quarenta y cinco ducados y tres reales y 25. marauedis. Tantos ducados responderas que valé los diez y siete mil marauedis. Y assi se ha de otra qualquiera suma de millares.

¶ Nota, que sabiendo que obrados no ay para q̄ dexar aparte mil, ni dos mil, sino hazer de todo junto. Exemplo. Cien mil marauedis quãtos ducados son? Quita el tercio de ciento, q̄ son treynta y tres, y vn tercio, y quedaran sesenta y seys, y dos tercios. Dobla dos vezes, diziendo. Sesenta y seys y dos tercios: y sesenta y seys y dos tercios son ciẽto y treynta y tres, y vn tercio. Otra vez ciento y treynta y tres, y vn tercio, y ciento y treynta y tres, y vn tercio, son docientos y sesenta y seys, y dos tercios. Y assi responderas, q̄ valẽ los cien mil marauedis 166. ducados, y dos tercios de ducado: que son docientos y cinquenta marauedis. Porque cada tercio de ducados es 125. marauedis.

¶ Nota mas, que si la suma de los millares que quisieres reduzir a ducados, fuere tan grande, q̄ vengan cuentos, por cada cuẽto que viniere, despues de auer hecho lo que la regla manda tomaras mil ducados. Exemplo. Seys cuentos de marauedis, quantos ducados seran? Saca el tercio de seys cuentos, que son dos: y quedaran quatro cuentos. Dobla estos quatro cuentos dos vezes, diziendo. Quatro cuentos, y quatro cuẽtos, son ocho cuentos. Otra vez ocho, y ocho, son diez y seys cuentos. Pues por cada vn cuento destos diez y seys, tomaras mil ducados. Y assi responderas, que diez y seys cuentos son diez y seys mil ducados. Vn cuento es diez vezes cien mil mara

marauedis. Y vn cuerto de marauedis es dos mil y seyscientos y sesenta y seys ducados y siete reales y doze marauedis.

La misma regla por otra manera.

¶ Para hazer de marauedis ducados doblaras los millares, y al doblo añadiras su mismo tercio, y seran ducados. Exemplo. Seys mil marauedis, quantos ducados son? Dobla los seys y seran doze. Añade a los doze su mismo tercio, que son 4. y montaran 16. y tantos ducados son los dichos seys mil marauedis. Y así se hara de otra qualquiera cantidad de millares.

Otra diferencia de reducir marauedis a ducados, por la pluma sin partir.

¶ Para reducir qualquiera suma de marauedis a ducados, quitaras de la suma tres letras las primeras dela mano derecha, y las letras que quedaren hazia la mano yzquierda, doblarse han, y añadirseha el tercio del mismo doblo, y quedaran hechos ducados, y mas los marauedis que montaren las 3. letras que quitares. Exemplo. 15234. marauedis quantos ducados son. Quita las 3. letras primeras de hazia la mano derecha que son estas 234. y quedaran 15. Dobla estos 15. y seran 30. Saca el tercio de treynta, que son diez, y juntalos con los mismos 30. y seran 40.

los quales son ducados, que juntos con los 2347 marauedis, que montan las tres letras que quitaste, seran quarenta ducados, y mas doziétos y treynta y quatro marauedis. Y tanto diras que montan los dichos 15234 marauedis. Nota que si quando sacares el tercio sobrare vno, este vno es tercio de ducado, que vale 125 marauedis, y si sobraren dos, seran dos tercios que valen 250 marauedis, los quales marauedis se juntará con la suma de las tres letras que quitares. Y si de ello se pudiere hazer algun ducado, o ducados, haganse, y sino dexallos estar en marauedis. Exemplo. 22317. marauedis, quantos ducados son. Quita las tres primeras letras q̄ son estas 317. y quedaran veynte y dos, las quales veynte y dos doblaras, y seran 44. el tercio de quarenta y quatro, es 14. y sobran dos. Pues junta catorze con 44. y será 58. Los quales son ducados. Y los dos que sobraron, son dos tercios de ducados, que valen 250. Los quales juntaras con los 317. marauedis, que son las letras que apartaste, y montaran 567. marauedis. Haz dellos vn ducado, y quedaran ciento y nouenta y dos marauedis. Y el ducado que hiziste juntalo con los 58. que tenias, y seran 59. Y assi responderemos, que 22317. marauedis montan 59. ducados, y 192. marauedis.

¶ Otro exemplo. 5000. marauedis, quantos ducados son? Quitemos las tres primeras letras, q̄ son

son estas 000. y quedara vn cinco, el qual doblaras, y seran diez. La tercera parte de diez, son tres, y sobra vno. Pues junta tres con los diez, y seran treze, los quales son ducados, y por el que sobró tomaras vn tercio de ducados, que son 125. marauedis, y tanto montan los dichos cinco mil. Y afsi se hara de otra qualquiera cantidad.

¶ Nota mas, que afsi como hemos hecho por la pluma a imitacion de lo que se haze, quando o la suma de los marauedis son millares caballes, afsi haras de qualquiera suma de otra moneda, teniendo en la memoria la regla de la tal moneda. O de otro modo, despues de quitadas las tres figuras como se ha dicho, haz lo que en este exemplo 30000. Parte los 30. que quedan despues de quitadas tres letras, por tres cabran a diez, dobla estos 10. y multiplica siempre por quatro, y seran 80. si sobrare 1. en la particion es, 1000. marauedis, y si dos, dos mil. Ya he dicho lo que valen. Si las tres letras que quitas al principio valieren algun ducado, añadelo.

El valor de las monedas Castellanas.

VN ducado es 375. marauedis, y reales onze, y vn marauedi.

Vn doblon 750. marauedis, y reales 22. y dos marauedis.

Vna corona, o escudo vale 400. marauedis, y reales 11. y 26. marauedis.

Vna dobla Zaena. 450. marauedis, y reales 13. y ocho marauedis.

Vn Castellano 544. marauedis, y reales 16.

Vn florin 275. marauedis, y reales 7. y 27. marauedis.

Vn real es 34. marauedis.

Vn real de a dos 68. marauedis.

Vn real de a tres 102. marauedis.

Vn real de a quatro 136. marauedis.

Vn real de a ocho 272. marauedis.

Medio real 17. marauedis.

Vn quartillo ocho marauedis y medio.

Ay tarjas de a veynte, y de a nueue, y de a 4.

Ay ochauillos que dizen medios quartos, que cada vno vale dos marauedis.

Vn quarto es quatro marauedis.

Vn ardite tres marauedis.

Vn dinero tres blancas.

Vn marauedi es dos blancas, porque no ay en Castilla pieça senzilla que valga marauedi.

Vna blanca vale dos cornados, y en algunas partes tres: y esta es la mas baxa moneda de todas.

Vn cruzado Portugues vale 400. marauedis.

¶ Regla general para reduzir marauedis todo genero de moneda, como el numero, o suma de la tal moneda sea de millares cabales. Exem-

plo. Mil reales quantos marauedis son. Por quãto quieres saber mil reales, mira los marauedis que vn real vale. Y tantos quantos marauedis valiere vn real, tantos mil marauedis seran mil reales. Pues vn real vale treynta y quatro marauedis. Pues di que son treynta y quatro mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Quatro mil reales quãtos marauedis seran? Por que dizen quatro mil reales, mira quanto montan quatro reales. Y hallaras que ciento y treynta y seys. Pues responde, que son ciento y treynta y seys mil marauedis. De suerte, que si preguntan, quanto es siete mil reales? Diras que tantos mil marauedis, quantos marauedis valẽ los siete reales. Y asì se hara de otra qualquiera moneda. Nota, que no tan solamente sirue esta regla en las monedas, mas aun en qualquiera cosa que se comprare, o vendiere como la suma dela tal cosa sea de millares cabales. Exempla. Tres mil hanegas de trigo, a dos reales y medio cada vno, quantos marauedis seran? Mira quantos marauedis montan 3. hanegas, a razon cada vna de 2. reales y medio, y hallaras que dozientos y cincuenta y cinco. Pues di que todas las tres mil hanegas, valdran dozientos y cincuenta y cinco mil marauedis.

¶ Nota, que si la suma de la moneda fuere de tan gran cantidad, que vengan algunos millares, por cada vn millar tomaras vn cuento.

Exemplo. Ocho mil ducados, quantos marauedis seran? Por quanto dizen ocho mil ducados, mira quanto valen ocho ducados, y hallaras que tres mil marauedis. Pues toma por cada vno destos mil vn cuento. Y afsi seran tres cuentos de marauedis los dichos ocho mil ducados.

¶ Si la cosa que comprares, o vendieres fuere cientos juntos, tendras la regla que en los exemplos siguientes se dira. Cien reales quantos marauedis seran? Por quanto dizen. Cien reales, mira quantos marauedis tiene vn real, y hallaras que treynta y quatro. Pues la regla sera que las unidades se hagã cientos, y los diezes millares, &c. Guardando siempre la orden del numerar, que al principio començares. Y afsi diras a los quatro del treynta y quatro, quatrocientos. Y a los treynta, tres mil. De suerte, que cien reales son tres mil y quatrocientos. O añade a los treynta y quatro dos zeros, desta manera. 3400. y quedara figurado el valor.

¶ Otro exemplo. Quatrocientas tarjas de a nueue, quantos marauedis seran? Porque dizen quatrocientas, mira quanto es quatro tarjas, y hallaras, que treynta y seys. Pues al seys hazle cientos, y seran seyscientos. Y el tres del treynta hagase millares, y seran tres mil. Y afsi diras, que quatrocientas tarjas son, tres mil y seyscientos. O añade a los treynta y seys 2. zeros, desta
man-

manera. 3600. como en el exemplo precedente diximos.

¶ Si la suma de la moneda que quisiéremos reducir, o multiplicar fuere de diezés justos, despues de auer sabido el valor de vna pieza, o de dos, o de tres, &c. segun en las dos reglas passadas se ha visto, la vnidad diras dezena, y a la dezena centena, &c. o añadiras vn zero. Exemplo. Diez ducados, quãtos marauedis seran? Porque dicen diez ducados, mira quanto es vn ducado, o si dixeren 20. miraras quantos son dos, &c. hasta 90. Pues bolviendo al proposito, vn ducado es 375. marauedis. Pues en el cinco diras dezena. Quiero dezir, que le hagas diezés, y seran cincuenta. Y al 7. diras centena: y sera setecientos, y al 3. diras millar, que seran tres mil, y assi responderas, que diez ducados, son tres mil y setecientos y cincuenta marauedis. O añade a los 375. vn zero desta manera 3750. y quedara el valor de los dichos diez ducados. Y si fueren centenas, a las vnidades diras centena, o añadiras dos zeros, y si fueren millares, a la vnidad diras millar, o añade tres zeros, y assi en infinito.

Regla para reducir doblones a marauedis.

¶ Para hazer de doblones marauedis, sacaras la quarta parte de la suma de los doblones, y lo que quedare seran millares de marauedis.

Exem-

Exemplo. Ocho doblones quantos marauedis seran. Quita la quarta parte de ocho, que son 2. y quedaran seys. Estos 6. seran millares. Y assi responderemos, que ocho doblones son 6. mil marauedis.

Vn doblon es 750. marauedis.

Dos son mil y quinientos.

Tres son 2250.

¶ Digo esto, porque si alguno no supiere sacar quarta parte de los doblones enteramente, para q̄ dexe vno, o dos aparte, segun se hizo en los ducados. Mas el q̄ quisiere sacar quarta parte de todo numero, no tiene necesidad de apartar ninguna cosa. Exemplo. Nueue doblones quantos marauedis seran? La quarta parte de nueue es 2. y vn quarto. Pues de nueue quitando dos y vn quarto, quedaran seys y tres quartos. Pues di, q̄ son seys mil, y mas tres quartos de mil marauedis, que valen 750. marauedis: porque vna quarta parte de mil es 250. Y assi haras de otra qualquier suma.

¶ Nota mas, q̄ si la suma de los doblones fuere de tan gran cantidad, que lo q̄ quedare despues de sacada la quarta parte, sean millares: por cada vn millar tomaras vn cuento. Exemplo. Doze mil doblones quantos marauedis seran? Quita la quarta parte de doze mil, q̄ son tres mil, y quedaran nueue mil. Pues toma (como la regla manda) vn cuento por cada vn millar. Y assi res-
pon-

ponderas que doze mil doblones, son nueue
cuentos de marauedis.

Regla para reduzir marauedis a doblones.

¶ Para hazer marauedis doblones, quitaras la
tercia parte de los millares de marauedis, y lo
que quedare, doblarlo has vna vez, y seran doblo
nes. Exemplo. Quinze mil marauedis, quantos
doblonnes seran? Saca la tertia parte de quinze,
que son cinco, y quedaran diez. Dobla estos diez
vna vez, y seran veynte. Y tantos doblones res
ponderas que son los dichos quinze mil mara
uedis.

¶ Nota, q̄ sino pudieres sacar la tertia parte en
teramente de la suma de los millares, en tal caso
dexaras a parte vn millar, o dos (como lo hizo
en la regla de reduzir marauedis a ducados.)
Exemplo. Siete mil marauedis quantos doblo
nes seran? Porque en siete no ay tertia parte en
teramente, dexa vn millar, y haras cuenta de los
seys mil, como la regla manda. Y a lo que mon
taren los seys mil, añadiras vn doblon, y docien
tos y cinquenta marauedis, que monta el millar
que apartaste. Dos mil marauedis valen dos do
blones, y quinientos marauedis.

¶ El que supiere sacar tertia parte por quebra
dos, no tiene para que apartar ninguna cosa, si
no juntamente hazer de qualquiera suma de

millares que quisiere. Exemplo. Diez mil marauedis, quantos doblones son? Quita el tercio de diez, que es tres y vn tercio, y quedaran seys y dos tercios. Dobla estos seys, y dos tercios, y montaran treze y vn tercio, los quales seran doblones. Y assi responderas, que diez mil marauedis montan treze doblones, y vn tercio de doblon, que es dozientos y cinquenta marauedis.

¶ Nota mas, que si la suma de los millares fuere tan grande, que vengan cuentos, por cada vn cuento contaras mil doblones. Exemplo. Quinze cuentos de marauedis, quantos doblones seran? Quita la tercia parte de quinze cuentos, q̄ es cinco cuentos, y quedaran diez cuentos. Dobla estos diez cuentos, y seran veynte cuentos. Pues por cada vno de estos veynte cuentos, toma mil doblones. Y assi responderas, que quinze cuentos de marauedis, montan veynte mil doblones. En lo demas, mira lo que se dixo en las reglas de los ducados. Pues el doblon es de doblado valor que el ducado.

Regla para reduzir doblas Zaenes a marauedis.

¶ Para hazer de doblas Zaenes marauedis, quitaras la mitad, y el diezmo de la suma de las doblas, y lo que quedare seran millares. Exemplo. Quarenta doblas quantos marauedis serã? Quita la

ta la mitad de quarenta, que son veynte, y de veynte quita el diezmo, que son dos, y quedaran diez y ocho. Estos diez y ocho son millares. Y afsi responderas, que quarenta doblas Zaenes, montan diez y ocho mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Diez y ocho doblas, quantos marauedis seran? La mitad de diez y ocho, son nueue, y de nueue el diezmo, es nueue decimos. Pues quitádo de nueue enteros, nueue decimos, quedaran ocho y vn dezimo. Pues di, que son ocho mil marauedis, y mas vna decima parte de mil, que es cien marauedis. Y afsi haras de otra qualquiera suma de doblas.

*Regla para reduzir marauedis a doblas
Zaenes.*

¶ Para hazer de millares de marauedis doblas Zaenes, iuntaras a la suma de los millares su nouena parte, y el doblo del tal conjuncto sera doblas. Exemplo Diez y ocho mil marauedis quantas doblas seran? La nouena parte de diez y ocho es dos, juntos con los mismos diez y ocho, hazen veynte. Dobla estos veynte, y seran quarenta, y tantas doblas diras que son los dichos diez y ocho mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Quatro mil marauedis, quantas doblas seran? Saca la nouena parte de quatro, q̄ son quatro enteros, y quatro nouenes. Do-
bla

biados hazen ocho, y ocho nouenes. Y assi responderemos que quatro mil marauedis montã ocho doblas, y mas ocho nouenes de vna dobla que valen quatrocientos marauedis. Porque vna nouena parte de dobla, es cincuenta marauedis

Regla para reduzir reales de a treynta y quatro marauedis.

¶ Para hazer de reales marauedis, fácaras la tercia parte de la suma de los reales, y hazer la hascientos, y lo que quedare seran marauedis, y juntallo has con los mismos cientos. Exemplo Doze reales, quantos marauedis seran? Saca el tercio de doze, que son quatro, y quedarã ocho. Pues los quatro haras cientos, y seran quatrocientos, y los 8. que quedaron (que son los dos tercios) seran marauedis. Y assidiras que doze reales montan quatrocientos y ocho marauedis. Si viniere alguna suma de reales. q̄ no se pueda facar tercia parte enteramente, dexaras a parte vn real, o dos, y añadirse ha despues el valor de aquel real, o dos que dexares. Exemplo. Veynte y dos reales quantos marauedis son? Porque en veynte y dos no ay tercio enteramente, apartaras vn real, y quedarã veynte y vno, de los quales haras la regla. Y a lo que montarẽ estos veynte y vno, añade treynta y quatro marauedis (que es el valor del real que apartaste) Y
della

deſta manera no aura ſuma que quitando vno, o dos no tenga tercia. Pues de 21. el tercio es ſiete, los quales haras cientos, y ſeran 700. Y los otros dos tercios que quedaron, que ſon catorze, añadirſe han con los 700. y ſeran 714. y tanto es el valor de 22. reales. Añade aora 34. marauedis (que es el valor del real que apartaſte) y montara ſete cientos y quarenta y ocho. Y tantos marauedis reſpòderas que ſon los veynte y dos reales. Otro exemplo. Onze reales quantos marauedis ſeran. Por quanto en onze no ay tercio, quita dos reales, y quedaran 9. Haz de los nueue lo que manda la regla, y a la ſuma de los nueue añadiras los marauedis que valen los 2. reales que dexaſte a parte. Y aſi ſe harà de otra qualquiera ſuma de reales. El que ſupiere ſacar tercio de todo numero cõ fraction, o ſin fraction de la vnidad, no tendrà neceſſidad de apartar nada. Exemplo. Siete reales quantos marauedis ſeran? Saca el tercio de ſiete, que ſon dos, y vn tercio. Pues por los dos toma dozientos, y por el tercio toma la tercia parte de ciento, que ſon treynta y tres marauedis, y vn tercio de marauedi, que juntos con los dozientos, ſeran 233. y vn tercio. Junta aora los otros dos tercios del ſiete, que ſon quatro marauedis, y 2. tercios, con los 233. y vn tercio, y montara todo dozientos y treynta y ocho marauedis. Y tanto montã los dichos ſiete reales.

¶ Nota, que por la misma ordē que reduzimos reales de treynta y quatro a marauedis, se reduziran los reales de a dos, presuponiendo ser sencillos, y lo que viniere por la regla doblarlo. E si el real es de a tres, tresdoblar, y si de a quatro, quatrodoblar, y si de a ocho, ochodoblar, y si fue de medios reales, tomar la mitad. Y si son quartillos, tomar la quarta parte, o reducir primero qualquiera especie de reales a reales sencillos, y despues seguir su regla.

La misma regla de otra suerte.

¶ Si quisieres hazer de reales marauedis, tendras la regla, que en el exemplo siguiente se declara. Veynte y dos reales quantos marauedis son? Assienta los 22. desta manera 22. y doblalos, y seran 44. Dobla otra vez estos 44. y seran 88. assienta los diezēs de los 88. enfrente de las vnidades de los dos renglones altos, y los ocho mas adelante. Y fumaras todas las tres sumas, como estan, y montaran 748. y tantos marauedis valen los dichos veynte y dos reales, como parece figurado.

2	2	.
4	4	
	8	8

7	4	8
---	---	---

*Regla para repuzir marauedis a reales de
a treynta y quatro.*

¶ Si quisieres hazer de marauedis reales, toma ras tantas vnidades como cientos huuiere en la suma de los marauedis, que quisierdes reduzir a reales, y tresdoblar los has. Y el tal tresdoblo fera reales, menos tantos marauedis, como fuere el doblo de las vnidades q̄ tomar es por los ciētos. Exēplo. Quinientos marauedis quantos reales seran? Porq̄ en quinientos ay cinco cientos, tomaras cinco vnidades, y trasdoblar los has y seran quinze. Estos quinze son reales, de los quales restarastantos marauedis, como fuere el doblo de los cinco (que son diez.) Y afsi responderas que quinientos marauedis, son quinze reales menos diez marauedis, q̄ seran catorze reales, y veynte y quatro marauedis.

¶ Otro exemplo. Mil y sete cientos marauedis quantos reales son? Porque en mil siete cientos ay diez y siete cientos, toma diez y siete vnos y trasdoblalos, y seran cinquenta y vno. Estos cinquēta y vno seran reales. Dobla los mismos diez y siete yna vez, y seran 34 los quales son marauedis, y se han de restar de los cinquenta y vn reales, que tenias. Pues quitado de los cinquenta y vn reales treynta y quatro marauedis, quedan cinquenta reales, y tanto montan los mil y setecientos marauedis.

¶ Otro exemplo. Quatrocientos y cincuenta y tres marauedis quãtos reales ferã? No cures de los 53. porque de ciẽto abaxo facil cosa es de saber los reales q̄ son, sino haz cuenta de los 400. segun la regla mãda, y hallaras ser 12. reales, menos 8. marauedis. Pues dexa estar 12. reales enteros, y los ocho marauedis que auias de sacar, restarse han de los cincuenta y tres marauedis, que dexaste aparte, y quedaran 45. marauedis, que es vn real y onze marauedis, que juntos cõ los 12. reales, fera por todo 13. reales, y onze marauedis. Y tanto responderas que montã los dichos 453. marauedis. Y assi reduziras a reales otra qualquiera suma de marauedis de mayor, o menor cantidad.

¶ Lo mismo fera, si se quitaren de la suma de marauedis que quisieres hazer reales, dos letras las primiras que estuieren hazia la mano derecha y de las que quedaren obrar segun manda la regla, y despues añadir el valor de las dos letras, q̄ quitares. Exemplo. 3499. marauedis, quãtos reales son? Quita las 2. primeras letras q̄ estan a la mano derecha, q̄ seran los dos nueues, y quedaran 34. Estos 34. multiplicalos por 3. o tresdobra los, y ferã 102. los quales son reales. Dobla vna vez los mismos 34, y seran 68. los quales son marauedis. Y se hã de restar de los 102. reales. Mas pues ay 99. marauedis, que son las dos letras q̄ al principio quitaste, restense dellas, y quedaran

31. marauedis, los quales juntaras con los 102. reales, y seran 102. reales, y 31. marauedis, y tanto montan los dichos 3499. marauedis.

Regla para reduzir marauedis a quartillos.

¶ Para hazer de marauedis quartillos, haras lo que en declaracion del exemplo figuiente se vera. Treientos marauedis, quantos quartillos seran? Porque en treientos ay tres vezes ciento, tomaras tres vnos, y multiplicarlos has por doze, diziendo, tres vezes 12. hazen treynta y seys. Estos son quartillos. Dobla los mismos 3. vna vez y seran 6. estos 6. son marauedis, y se han de restar de los 36. quartillos, y quedaran 35. quartillos y dos marauedis y medio. Y tantos quartillos son los dichos treientos marauedis. Y assi se hara de otra qualquiera suma, como sean cientos justos. O quita dos letras, y haz la regla segun diximos en el vltimo exemplo de reduzir marauedis reales, y vendra lo mismo.

Regla para reduzir marauedis, a medios reales.

¶ Exemplo y pratica. Quatrocientos marauedis, quantos medios reales seran? Tomo quatro vnos porque en quatrocientos ay quatro vezes ciento. 6. doblalos diziendo. Quatro vezes 6. hazen 24. Estos 24. seran medios reales. Dobla el 4. que

tomaste por los 400. y seran ocho. Estos ocho son marauedis, y se han de restar de los 24. medios reales. Pues de veynte y quatro medios reales quien saca ocho marauedis, quedan 23. medios reales, y nueue marauedis. Y assi se hara de lo de mas. O quinta dos letras, y obra segun la regla manda, y añade despues el valor de las dos letras que se quitaren, y vendra lo mismo.

Regla para reduzir marauedis a reales de a dos.

¶ Si quisieres hazer de marauedis reales de a dos, sacaras de la suma de los marauedis la mitad, y de lo que restare por cada vn ciento, tomaras vna vnidad, y resdoblarse an, y seran reales. Y quatro doblaras otra vez las mismas vnidades, y seran marauedis, las quales se restaran de los reales. Exemplo. Ocho cientos marauedis quantos reales de a dos seran? Quita la mitad de ochocientos, y quedara 400. Pos estos 400. tomaremos quatro vnidades, y tres doblarlas has, y seran doze. Estos doze son reales. Toma otra vez el 4. y quatro doblalo, y seran 16. Estos son marauedis, y se han de restar de los doze reales. Pues sacando diez y seys marauedis de doze reales, quedan onze reales de a dos, y mas cinquenta y dos marauedis, y tantos reales valen los dichos ochocientos marauedis. Tambien se puede hazer esto, como manda la regla de reduzir marauedis a reales sencillos, y la mitad de lo

de lo que viniere seran reales de a dos. Oquitan do dos letras de la mitad de los marauedis, como en las precedentes se ha hecho.

Regla para reduzir marauedis a reales de a tres

¶ Si quisieres hazer de marauedis reales de a tres, no ay que hazer otra cosa, sino tomar tantos reales, quantos cientos huuiere en la suma de los marauedis, y doblar los mismos reales y seran marauedis, y restar se han de los reales. Exemplo 600. marauedis quãtos reales son? Por que en 600. ay seys vezes cinco, toma seys reales, y dobla los, y seran doze, estos doze son marauedis, y se han de sacar de los seys reales. Y assi responderemos, que seyscientos marauedis, son 6. reales de a tres, menos 12. marauedis, que son cinco reales y nouenta marauedis. O quita de 600. dos letras, y dobla con lo que quedare, como manda la regla, y como se ha hecho de los precedentes.

Regla para reduzir marauedis a reales de a quatro, y de a ocho.

¶ Si quisieres hazer de marauedis reales de a 4. reduce primero los marauedis a reales sçzillos, como por regla se mostrò, y de la que viniere la quarta parte, sera reales de a quatro, y la octaua parte, sera reales de a ocho. Y porque no se pidè

mucho estas reglas, no me detengo, por no vsar de prolixidad sin utilidad.

Reducir tarjas, que dizen de a veynte a marauedis.

¶ Si quisieres hazer de tarjas marauedis, doblas la suma de las tarjas, y añadirles has vn zero adelante, y quedara vna suma de marauedis. Exemplo 214. tarjas, quantos marauedis son? Dobra 214. y seran 428. añade vn zero a los 428 desta manera 4280. y quedaran quatro figuras, q̄ valen quatro mil y docientos y ochenta y tantos marauedis responderas que valen las dichas 214. tarjas de a veynte.

Para reducir marauedis, a tarjas de a veynte.

¶ Quitaras de la suma de los marauedis dos letras, las primeras que estuieren hazia la mano derecha, que son los diez y vnidades, y multiplicaras lo que quedare por vn cinco (que es lo mismo que 5. doblar) y seran tarjas, y lo que montaren las dos letras, que se quitaren, seran marauedis. Exemplo 2509. marauedis, quantas tarjas seran? Quita dos letras, que seran estas 09. y quedaran 25. Multiplica 25. por cinco, y montaran 125. los quales seran tarjas. Y assi responderas, que 2509. marauedis montan ciento y veynte y

te y cinco tarjas de a veynte, y mas nueue marauedis, que ay en las dos letras, que al principio se quitaron.

Para reduzir marauedis, a tarjas de a nueue.

¶ Para hazer de marauedis tarjas de a nueue, fa-
 caras vn diezmo de otro de la suma de los ma-
 rauedis, todas las vezes que ser pudiere, hasta tã
 to que la suma del vltimo diezmo sea numero
 (que dizen) Dígito. Y la suma de todos los diez-
 mos seran tarjas, y mas tantos marauedis quã-
 to fuere el diezmo vltimo que se sacare. Exem-
 plo. Dos mil marauedis quantas tarjas de a nue-
 ue serã? Saca el diezmo, diziendo. El diezmo de
 dos mil es dozientos. Y de dozientos, es 20. Y
 de 20. son dos. En fiendo el diezmo numero di-
 gito, no se saque mas (como poco antes dixi-
 mos.) Suma agora estos tres diezmos, que has
 sacado, que son 200. y 20. y 2. y montara 222. los
 quales son tarjas, y mas tantos marauedis, co-
 mo fue el vltimo diezmo, que sacaste que fue 2.
 Y asì responderas, que dos mil marauedis son
 222. tarjas de a nueue, y mas dos marauedis. Y
 asì se hara de otro numero de marauedis, de
 mayor, o menor cantidad.

*Regla para reduzir tarjas, o quãrtos, que dizen de
 a quatro, a marauedis.*

¶ Para hazer marauedis de tarjas de a quatro, doblaras la suma de las tarjas, o quartos dos vezes, y el vltimo doblo sera marauedis. Exemplo. Treynta y quatro tarjas, quantos marauedis seran. Dobla treynta y quatro y quatro dos vezes, diziendo 34. y 34. son 68. otra vez 68, y 68 hazen 136. y tantos marauedis montā las treynta y quatro tarjas, o quartos.

Para reduzir marauedis a tarjas, a quartos de a quatro.

¶ Digo, que la quarta parte de la suma de marauedis, que quisieres reduzir seran tarjas. Exemplo 200. marauedis quantas tarjas seran? La quarta parte de 200. son 50. Pues di que son 50. tarjas, o quartos de a quatro. Y afsi sehara de otra qualquiera suma de marauedis.

Para reduzir ardites, a marauedis.

¶ Para hazer ardites marauedis, tresdoblaras la suma de los ardites, y quedaran hechos marauedis. Exemplo. Veynte arditer quantos marauedis son. Tresdobra veynte, y seran scfenta y tantos marauedis diras que valen los dichos veynte ardites.

Para reduzir marauedis a ardites.

¶ Para reduzir marauedis en ardites tomara la tercia parte de la suma de los marauedis, y seran ardites. Exemplo. Treynta marauedis quātos

ros ardites son? La tercera parte de treynta es 10. Pues estos 10. son ardites.

¶ Para reduzir marauedis a quartos (que dizē) de a dos, doblaras la suma de los quartos, y seran marauedis. Y para marauedis hazer quartos de a dos, toma la mitad de los marauedis y seran quartos.

¶ Para reduzir dineros a marauedis, añadiras a los mismos dineros su mitad, y seran marauedis. Exemplo. Veynte dineros quantos marauedis son? La mitad de veynte es diez, juntados a los mismos veynte hazen treynta y tantos marauedis diras ser los dichos veynte dineros.

¶ Para reduzir marauedis a dineros, quitaras la tercia parte de los marauedis, y lo que quedare serã dineros. Exemplo. Treynta marauedis quantos dineros son? Quita el tercio de treynta que son 10, y quedaran veynte, y tantos dineros serã.

¶ Para hazer de marauedis blancas, doblaras la suma de los marauedis, y seran blancas. Y al contrario si quisiéremos de blancas hazer marauedis, tomaras la mitad de las blancas, y seran marauedis.

¶ Para hazer de marauedis cornados, si el marauedi valiere seys cornados, seys doblaras el numero de los marauedis. Y si valiere quatro, quatro doblaras, y seran cornados. Y al cõtrario para de cornados hazer marauedis, si el marauedi valiere seys cornados tomaras la sexta parte de los

los cornados, y seran marauedis. Y si valiere quatro cornados el marauedi, sacaras la quarta parte.

¶ Para hazer de blãcas cornados, si la blanca vale 3. cornados, tres doblaras las blancas, y si valiere dos, doblaras, y quedarã liechos cornados. Y para de cornados hazer blancas, si la blãca valiere tres cornados, la tercia parte de los cornados seran blancas, y si vale dos, la mitad, &c.

Regla general para reduzir todo genero de moneda, a otra qualquiera.

¶ Ya que hemos dado reglas para reduzir la mayor parte de las monedas Castellanas a marauedis, y al contrario resta dar la orden que se ha de tener, para reduzir qualquiera moneda a otra, como si dixessen. Cien ducados (o lo que te pareciere) quantas coronas seran? Reduziras primero la moneda que quisieres reduzir en otra a marauedis, y despues reduzir los marauedis en la moneda que te pareciere, como por los preceptos de las reglas precedentes hemos mostrado. Exemplo. Ochenta ducados quantas coronas son? Mira primero quantos marauedis valen los ochenta ducados (por la regla de reduzir ducados a marauedis) y hallaras valer treynta mil. Reduze agora estos treynta mil marauedis a coronas (por la regla de reduzir marauedis a coronas) y hallaras que son ochentay cinco

q
p
y
1.

cinco coronas, y dozi entos y cincuenta marauedis. Y tantas coronas responderas que valen los dichos 80. ducados. Y assi haras de otras monedas.

Regla general para multiplicar.

¶ Siguese vna regla, por la qual no tan solamente podras reduzir qualquiera moneda a otra menor, mas aũ podras saber el precio de qualquiera cosa que se comprare, o vendiere de 10. en adelante. Y es la regla q̄ sacaras vn diezmo de otros diezmos, todas las vezes q̄ ser pudiere, hasta tanto q̄ no se pueda sacar diezmo enteramente dela moneda que quisieres reduzir, o dela cosa que quisieres multiplicar. Y las pieçtas que viniere al vltimo diezmo, reducir las has a la moneda que te pareciere, y aãadiras a la tal reducciõ, tantos zeros quãtas vezes se sacare el diezmo, y la cantidad que viniere aãadiendo los zeros sera el produçto, o valor de lo que huuiere multiplicado, o reduzido. Exemplo. Cien reales quantos marauedis montan? Saca el diezmo de los cien reales, todas las vezes que ser pudiere enteramente diziendo. El diezmo de ciẽto es diez, y diez es vno. Pues quando al diez no te venga vno, o dos, o tres &c. hasta nueue, no cures de sacar mas el diezmo, sino mirar que valen en otra mas baxa moneda estas pieçtas, que al vltimo diezmo vienẽ. Pues por quãto en este

exem.

exemplo de los cien reales vino vn real al vltimo diezmo, por tanto assentaras el valor de vn real en otra moneda, que sera en treynta y quatro marauedis, a los quales treynta y quatro añadiras dos zeros, por causa que no se facò dos vezes el diezmo, desta manera 3400. Y assi quedaran figurados tres mil y quatrocientos, y tantos marauedis diras que valen los dichos cien reales.

¶ Otro exemplo. Treientos florines quantos marauedis seran. Saca el diezmo de los treientos todas las vezes que pudieres, diziendo. De treientos el diezmo es treynta, y de treynta el diezmo son tres. Mira lo que valen tres florines pues sabes que vno es docientos y sesenta y cinco marauedis, y hallaras que montan setecientos y nouenta y cinco, a los quales añadiras dos zeros, por causa que sacaste dos vezes el diezmo desta manera 79500. y quedaran figurados, setenta y nueue mil, y quinientos y tantos marauedis, y tãtos montan los dichos treientos florines.

¶ Otro exéplo. Diez mil hanegas de trigo a 2, reales y medio, cada vna quãtos marauedis montan? Saca el diezmo de las hanegas, diz édo. El diezmo de diez mil es mil, y de mil es ciento, y de ciento es diez, y de diez es vno. Mira quantos marauedis vale estahanega (que vino al vltimo diezmo) y hallaras valor dos reales y medio que

que son 85. marauedis, a los quales 85. añdiras quatro zeros, por causa que se sacò quatro vezes el diezmo, desta manera 850000. Y assi quedaran figurados ochocientos y cincuenta mil marauedis por el valor de las 10. mil hanegas, cada vna a dos reales y medio.

¶ Nota, que si en el valor del vltimo diezmo viniere medio, por el tal medio pondras vn cinco, y al añadir de los zeros, quitar se ha vn zero. Quiero dezir, que añadiras tantos zeros, como vezes sacaras el diezmo, vno menos. Exemplo. Cien quartillos quantos marauedis montan? Saca el diezmo, diziendo. El diezmo de cien quartillos es 10. y de 10. es vno. Vn quartillo vale ocho marauedis y medio. Pues afsienta ocho, y por el medio vn cinco adelante del ocho, desta manera 85. a los quales se auia de añadir 2. zeros por causa que sacaste dos vezes el diezmo (como la regla manda) mas porque la regla dizze, que quando viniere medio se quite vn zero, por tanto en este exemplo no añadiras mas de vno, desta manera 850. y quedaran figurados ochocientos y cincuenta, y tantos marauedis montan los cien quartillos.

¶ Nota, q̄ esta regla se puede hazer por los dedos de la mano, quando no tuuieres con q̄ escribir. Exemplo. Diez reales quãtos marauedis valen? Saca el diezmo de 10. reales, que es vno y vn real es treynta y quatro, los quales treynta y

quatro assentarás (equivalentemente) en los dedos de la mano yzquierda, començado del dedo Pollex (que es el dedo, que dizen pulgar) poniendo en el los tres de los 34. con el entendimiento. Y en el otro dedo siguiente, pôdras los quatro, y adelante vn zero, por causa que se facò vna vez el diezmo, como parece en la figura de la mano.

Y assi quedaran figurados trezientos y quarenta, y tantos maravedis valen los diez reales.
 ¶ Otro exemplo, Mil perdizes a catorze maravedis y medio cada vna, quantos mrs montan? Sigue la regla (segun he mostrado) diciendo. El diezmo de mil es ciento, y de ciento es diez, y de diez es vna. Y vna perdiz vale catorze maravedis, y medio, pues assienta los catorze en los
 dedos,

dedos, y por el medio pondras vn cinco, y en los demas dedos se pondran tantos zeros, quantas vezes se facò el diezmo, menos vno, por causa q̄ vino medio, y por quanto en este exemplo se facò tres vezes el diezmo, por tanto pondras dos zeros, y quedaran en la mano figurados 14500 como parece.

¶ Nota, que si fuesse tan grande la suma de lo que reduzieses, que no bastan los cinco dedos de la mano para assentar todas las figuras, en tal caso seruirte has de las junturas de los dedos. Exemplo. Cien libras de lo que quisieres a 524. maravedis cada libra, quanto montan? Sigue la regla, diziendo. El diezmo de cien mil es diez mil, y de diez mil es mil, y de mil es ciento, y de ciento es diez, y de diez es vna. *Aquí se muestra el valor de cada dígito en la mano.*

de esta libra (que es 524.) comenzando del dedo grueso, y porque se sacò cinco vezes el diezmo, assentaras adelante por las junturas de los dedos cinco zeros, como parece.

¶ Y assi quedaran en la mano figurados cinquenta y dos cuetos, y 400. mil maravedis por el valor de las dichas cien mil libras. Y assi haras de otra qualquiera cosa, o moneda que quisieres.

¶ Nota, si quisieses saber mil, y dozietas y treinta y tantas pieças de moneda, &c. quanto es. En tal caso no cures saberlo juntamente, sino poco a poco haziendo primero cuenta de lo mas, y despues de los otros numeros, y juntando lo q̄ montare lo vno con lo otro, y assi vèdras en perfecto entendimiento, porq̄ si de todo junto quisieses

siesses faberlo de vna vez, sera gran confusion, y trabajosa de hazer. Exemplo. Ciento y veynte hanegas de trigo a nouenta y tres marauedis, quanto montan, Haz primero cuenta delas ciento (como la regla manda) y hallaras que valen nueue mil y trezientos marauedis, y despues de las 20. Y montaran 1860. Suma agora lo vno con lo otro, y montara onze mil y ciento y sesenta. Y tanto montan las dichas 120. hanegas, y assi se hara en lo demas. Si quisieres estudiar, para saber responder con breuedad a qualquiera cosa que preguntaren de reducciones de monedas, procura encomendar a la memoria, de todas las monedas, quanto vale vna, y dos, y tres, &c. Hasta 9. y 10. y 20. y 30. &c. hasta 90. Assi mismo sabe quanto valen ciento, y dozientas, &c. Hasta nouecientas (como parece en los numeros siguientes) y responderas con facilidad.

Siguense ciertos auisos para comprar panes, y para saber de los partidos que se dan a criados, quanto sale al mes, dia, y hora.

¶ Tengo vn criado, doyle de partido 30000. marauedis por año, pido a como sale al mes. Saca el tercio de 30000. que son 10000. destos. 20000. saca la quarta parte, y vendra 2500. y tanto sale al mes. La razon porque manda sacar tercio, y luego quarto, es por saber quanto sea la

dozaua parte por los doze meses que tiene el año, y la misma es en lo que se sigue.

¶ Nota, que no importa mas sacar primero el quarto, y del quarto el tercio, que sacar el tercio y del tercio el quarto, ya que se sabe que sale al mes a 2500. Si quisieres saber a como sale al dia, sacaras el quinto destos 2500. que es 500. destos 500. saca el sexto (que son 83. y vn tercio) y a tanto sale al dia. Si quisieres ver a como sale a la hora, saca la quarta parte de lo que viniere al dia, y del quarto saca el sexto, o al contrario sacaras primero el sexto, y del sexto el quarto.

¶ Nota que en esta cuenta presuponemos que los meses tengan treynta dias.

¶ Nota la contraria. Dize vno que tiene tres marauedis de renta cada hora. Para saber quanto sale al dia, y al mes, y año. Procederas multiplicando por los mismos numeros que en la precedente hiziste partiendo.

Numero. Reales. Florines. Escudos. Ducados.

1	34	265	400	375
2	68	530	800	750
3	102	795	1200	1125
4	136	1060	1600	1500
5	170	1325	2000	1875
6	204	1590	2400	2250
7	238	1855	2800	2625
8	272	2120	3200	3000
9	306	2385	3600	3375
10	340	2650	4000	3750
20	680	5300	8000	7500
30	1020	7950	12000	11250
40	1360	10600	16000	15000
50	1700	13250	20000	18750
60	2040	15900	24000	22500
70	2380	18550	28000	26250
80	2720	21200	32000	30000
90	3050	23850	36000	33750
100	3400	26500	40000	37500
200	6800	53000	80000	75000
300	10200	79500	120000	112500
400	13600	106000	160000	150000
500	17000	132500	200000	187500
600	20400	159000	240000	225000
700	23800	185000	280000	262500
800	27000	212000	320000	300000
900	30500	2385000	360000	337500

Num. dobla zaen, Castellan. doblõc. cruza. por,

1	450	544	750	400
2	900	1088	1500	800
3	1350	1632	2250	1200
4	1800	2176	3000	1600
5	2250	2720	3750	2000
6	2700	3264	4500	2400
7	3150	3808	5250	2800
8	3600	4352	6000	3200
9	4050	4896	6750	3600
10	4500	5440	7500	4000
20	9000	10880	15000	8000
30	13500	16320	22500	12000
40	18000	21760	30000	16000
50	22500	28200	37500	20000
60	27000	32640	45000	24000
70	31500	38080	52500	28000
80	36000	43520	60000	32000
90	40500	48960	67500	360000
100	45000	54400	75000	40000
200	90000	108800	150000	80000
300	135000	163200	225000	120000
400	180000	217600	300000	160000
500	225000	272000	375000	200000
600	270000	326400	450000	240000
700	315000	380800	525000	280000
800	350000	435200	600000	230000
900	405000	489600	675000	360000

Vno compra vna pieça de lienço que tiene doze varas, y media, por tres mil marauedis. Demando a como sale la vara? Toma tantos diezes, como millares costare la pieça, y ocho doblalos, y sera el precio de vna vara. Pues porque en el exemplo presente dezimos, que colto la pieça 3. mil marauedis, tomaras tres diezes, que son treynta. Y ocho doblalos, y seran dozientos y quarenta. Y afsi responderas, que sale la vara a dozientos y quarenta marauedis.

Si la pieça tuuiere veynte y cinco varas, quatro doblaras tantos diezes, quantos millares costare toda la pieça, y lo que montare el quatro-doblo, sera el precio de vna vara. Exemplo. Cõpro vn paño que tiene 25. varas, por quinze mil marauedis. Demãdo, a como sale la vara? Toma 15. diezes (por causa que cuesta 15. mil) que son 15. o marauedis, y quatro doblalos, y montaran feyscientos. Y afsi responderas, que si vn paño, o pieça de 25. varas costasse quinze mil marauedis, la vara vale feyscientos marauedis. Nota q̃ afsi como por vn millar se toma diez, que por vn ciento tomaras vno, y por cada diez vn decimo de vno. Exemplo. Compro vn paño de 25. varas por 4575. marauedis. Demando a como sale la vara. Haz segun la regla mãda, en que miraras primero como sale, a razon de quatro mil y hallaras, que a ciento y sesenta. Agora mira a como sale, a razõ delos quinientos, lo qual se haz

rato

ra tomando de cada vn ciento vno. Luego por
 quinientos tomaras cinco, los quales quatro do
 blaras y seran veynte. Y a tanto sale la vara a ra
 zó de quinientos todo el paño. Pues junta estos
 veinte, que salen de los quinientos, con los ciē
 to y setenta que salieron de los quatro mil, y
 montaran ciento y ochenta. Para saber a como
 sale por los setenta y cinco, tomaras vn diezmo
 por cada diez. Luego por los setenta y cinco, to
 ma siete diezmos y medio de vn entero, y qua
 tro doblarlos has, y sera por todo treynta diez
 mos, que hechos enteros, hazen tres. Pues jun
 ta estos tres, que sale a cada vara, a razon de se
 setenta y cinco todo el paño, con los ciento y o
 chenta. Y montara por todo 185. marauedis. Y
 assi responderas, que comprando vn paño de
 veynte y cinco varas, por precio de quatro mil
 y quiniētos y setenta y cinco marauedis, sale la
 vara a ciento y ochenta y tres marauedis. Nota
 esto, porq̄ muchos paños tienē a veynte y cinco
 varas, y si a caso tuuiesse mas, o menos de veinte
 y cinco varas, por la misma regla se puede sa
 ber (poco mas, o menos) a como sale la vara, pa
 ra que vn mercader haga su cuēta de memoria,
 quando comprare, y pueda juzgar si le conuie
 ne, o no, entrar en la tal mercaderia. Si la pieça
 tuuiere cinquenta varas, el doblo de tantos die
 zes quantos millares costare, sera el precio dela
 vara. Exemplo. Compro vna pieça de angeo, q̄
 tie-

ne por dos mil marauedis, demando a como fale la vara? Pues porq̄ dezimos que la pieça cuesta 2. mil marauedis, tomaras 2. diezes (que son 20.) doblalos, y seran quarenta. Y a tantos marauedis responderas que fale la vara. Y desta manera puede el que fuere curioso imaginar y ampliar esta regla guardando la proporcion de 25. cõforme a lo que hemos declarado, profiguendo por su acrecentamiento, o disminucion.

Regla para reduzir cruzados, o coronas, que dezimos escudos, a marauedis.

¶ Nota a lo que el Castellano llama marauedi, dize el Portugues rees, o reaes.

¶ Para reduzir cruzados Portugueses a marauedis, quitaras la mitad y quinto dela suma de los cruzados, y lo q̄ quedare seran millares de marauedis. Exemplo. Veynte cruzados quantos marauedis seran? Saca la mitad de veynte, que son diez, y destes diez la quinta parte que son dos, y quedaran ocho. Estos ocho son millares. Y assi responderas, que veynte cruzados son ocho mil marauedis.

¶ Otro exemplo. Doze cruzados quantos marauedis son? La mitad de doze son seys, y el quinto de seys es vno y vn quinto. Pues de seys quitando vno y vn quinto, quedan quatro y quatro quintos. Pues responde que todos doze montan

quatro mil y quatro quintos de mil marauedis, son 800. mas. Y porque lo que en Castilla, dize corona, o escudos, vale tanto el cruzado Portugues, por esto seruira esta regla para ambas monedas.

*Regla para reduzir marauedis a cruzados,
o a escudos.*

¶ Si quisiere hazer de millares de marauedis, cruzados, doblaras los millares, y añadiras la quarta parte deste doblo, y sera todo cruzados. Exemplo. Veynte mil marauedis quantos cruzados seran? Dobla los veynte, y seran quarenta. Añade a estos quarenta su misma quarta parte (que son diez) y seran cinquenta. Y assi responderas que veynte mil marauedis valen cinquenta cruzados.

¶ Otro exemplo. Siete mil marauedis quantos cruzados son? Dobla los siete del siete mil, y seran catorze, de los quales facaras la quarta parte, que son tres y medio, y juntar se han con los mismos catorze, y seran 17. y medio. Y tantos cruzados diras que son los dichos siete mil marauedis. Y assi acabo, quanto a esto, auisando que se pueden hazer estas reglas por infinitos modos.

Fin del Sexto Libro.

EN QVE SE PONE VN COM-
pendio de la regla de la cosa, o ar-
te mayor.

DOMINICVS C, APAT A FOS.
scens ad lectorem.

QVæque leges, nullo sunt tempore visa,
Quid pendes animi? pauca referte iuuat
Pauca iuuat tecum, possit quis dicere multa
Tempore tam curto? comodocunque loqui?
Nestoreos quanquam, permittat Iupiter annos
Ista licet paucaas, posse subire negem.
Artem maiorem numerorum, sæpè petitam
Nullus adhuc vidit, Moya dat ecce tibi.
Hanc tibi Moya libens donat, tam front e serēs
Quam pius est animo, religione pius.
Cuius fama volat, cuius per sydera laudes.
Ire, sacros guadent atque videre choros.
Hunc meritò canter veneans Hispania, nullus
Inuideat factis, deprecor omnem eat.
Hunc meritò canter, dica nt Satyrique Salaces
Et nymphæ, & Fauni, deprecor omnem eat.
Et Portus Diui Stephani, nam patria nostro est
(Vt perhibent, Moyæ) deprecor omnem eat.
Atque meis adsit votis, dum computat annos,
Qui superos cautè, se sua terga videt.
Poltremo Triton medio religatus in orbe
Serpentis

Serpentis tubicen talia voce ferat.
 Regi nec domino nec cui sit sordida vestis.
 Viuere perpetuo tu mihi crede, datur.
 Xerte, sed ante tuos cernes properare liquores
 Retro, quàm Moyæ fama perire quæat.

*El Licenciado Francisco Sanchez Cathedratieo de
 Rechorica, en la vniuersidad de Salamanca,
 al Lector S.*

DE tal manera, curioso Lector, los Pythagoricos reduxerõ a numeros todas las cosas, que aun nuestra anima rational quisieron que de numeros fuesse cõpuesta: y estos numeros del animo eran 4. que contados desde vno hazen diez, y perfecto triangulo. Y assi el mayor juramento que hazian eran por el numero quaternario, de que el anima constaua. Lo qual todo aunque parece ridiculo, no carece de buen fundamento. Porq̃ en el anima hallauan ellos auer quatro cosas, de las quales toda ciencia y arte, y los hombres racionales eran constituydos. Estas son. Entendimiento, ciencia, opinion, sentido. Al entendimiento por ser diuino, llamauan vnidad, que no es diuisible. Ppues por el entendemos todos los hombres (aunque infinitos sean) no ser mas de vno, cuyo semejante no ay otro. Y assi de los cauallos

uallos y otras cosas, aunque con el sentido juzgemos ser muchos, con el entendimiento solo vno entendemos. A la ciencia, llamauan dos, porque toda demostracion, y verdad que probar queremos, ha de tener fundamento sobre otra cosa sabida y cierta, que los Griegos llamã Axioma: y la comprehension destas dos cosas, se llama ciencia, o doctrina. La opinion es comparada al numero ternario, porque Ter en Griego, y Latin, y aun en otras lenguas, quiere dezir muchas vezes, y afsi se comparo a la opinion que es muy varia. El quarto, porq̃ amplifica sobre el tres, como aquello del Poeta. Oterq; quaterq; beati, y porque tiene al numero de 10. que es toda la cuenta, dezian ser como el sentido por proceder en infinito, que de vn solo hõbre que entiende el entendimiento, el sentido haze innumerables hombres, y afsi en las otras cosas. Esto he traydo, para que en vn solo exemplo, pudiendose traer otros muchos, te entienda la dignidad de los numeros, pues q̃ no auia cosa, que aquellos Filosofos, y Platon despues dellos, principalmẽte en el Timeo, no reduxessen a numero y proporcion, y tambien porque algunos dexan esta ciencia por inutil vnos diciendo que no tienen que contar, otros q̃ basta lo que naturalmente se sabe, que es contar hasta diez por los dedos, y de alli tornar a las vnidades. A los quales se puede responder por la diuision

sion ya dicha, que no se gobiernan por entendi-
 miento, o ciencia, sino por opinion, o sentido.
La opinion no la admitiã los Pythagoricos, por
 ser tan varia: el sentido tampoco le deuemos no
 sotros admitir, porq̃ muchas vezes se engaña, y
 al fin es comun con los otros animales. Y si de
 naturaleza tenemos el contar, esso no es mas de
 vn axioma sobre que se ha de fundar la ciencia,
 pues esclaro que naturaleza, aunque para todas
 las cosas nos infúdio principios, y fundamētos,
 no nos dio en ellas la perfeccion, baste que nos
 aya dado tan sublimado don como es el entēdi-
 miento, con el qual auiendo fundamētos se pue-
 den fabricar muchas y muy altas cosas. Y así el
 arte en semejantes cosas, es perfección de la natu-
 raleza, aunque en otras cosas, es imitadora y dis-
 cipula, por dōde el que con solo lo que natura-
 leza le dio se contenta, este tal no derechamen-
 te se llama racional, sino numero, que así llama-
 uan los antiguos a los que no auian nacido, sino
 para comer el pan. Así que pues la cuenta tiene
 tantos misterios, quantos en breue no se puedē
 fumar, y quantos aquellos sabios antiguos en-
 tendieron, mucha razon es que con ella se tēga
 mucha cuenta, y que piense cada vno que tiene
 obligacion a saberla. Principalmente teniendo
 tan abierto el camino, que nadie puede preten-
 der ignorancia, pues el Bachiller Iuan Perez de
 Moya tanto ha trabajado en esta arte, para q̃ na-
 die

die tenga trabajo en saberla: el qual despues de
 auer publicado libros que bastantemente ense-
 ñauan las reglas, no se contétò con esto: sino tra-
 bajar en darnos vn libro que de hartos curiosos
 era desseado por auer leydo mencion del en o-
 tras lenguas y ser tan alabado de grandes auto-
 res. Yo en algunas obras del bachiller Moya, q̄
 por mandado del señor Prouisor he examinado
 gran doctrina en las artes Matematicas he ha-
 llado: mas este libro de la cosa dexa atras todo
 loor: porque es en nuestra lenga cosa nueua, y
 muy ingeniosa: y por no gastar palabras, es vn li-
 bro donde se da razón de todas las questiones o
 sciencias que se fundan en numero y proporció
 cosa que todo hõbre tiene natural en querer sa-
 ber la razon de las cosas: y no se contéta hasta q̄
 la alcança. De manera q̄ en los otros libros de
 Arithmetica, assi del autor, como agenos, vnos
 mejor q̄ otros enseñan el arte: pero este ensena
 por demostracion y euidencia y causas por don-
 de el que quisiere llegar al cabo (si caba se pue-
 de dezir en las sciencias) esta arte, y saber siẽpre
 la razon de lo que le fuere pedido, si es posible
 darse, no puede dexar de tener en mucho esta
 obra. Y porque el curioso della podra ver y alcã-
 çar mucho mas de lo que yo aqui podre dezir:
 no porne aqui otro loor, sino solo rogar a los le-
 ctõres que vean el libro, y se aprouechen de su
 doctrina,

CAPITULO PRIMERO.

*De la denominacion desta regla de la
cosa.*

Diuersos nombres tiene esta regla acerca de varios autores. Vnos la llaman regla de algebra, que quiere dezir, restauratio, o almucabala, que quiere dezir oposicion, o absolucio: porque por ella se hazen y absueluen infinitas questiones (y las que son impossibles nos las demuestra.) Asimismo de Arismetica, como de Geometria, como de las demas artes, que dizen Mathematicas. Otros la nombran regla de la cosa, porq' obuiando con sus preceptos cõ qualquier caracter, o caracteres q' se prepusiere, siempre sale el valor de vna cosa. Otros reglas reales, o arte mayor. Llame se como cada vno quisiere: su fin no es otro, sino mostrar hallar algun numero proporcional dudoso demandado.

*Cap. II. En el qual se ponen algunos caracteres, que
siruen por cantidades proporcionales.*

EN este capitulo se ponen algunos caracteres, dando a cada vno el nombre y valor que le conuiene. Los quales son inuētados por causa de breuedad, yes de saber, que no es de necesidad, q' estos y no otros ayan de ser, porque cada vno puede vsar de los q' quisiere, y inuentar
mu-

muchos mas, procediendo con la proporcion q̄ le pareciere. Los caracteres son estos.

$\mathfrak{z} . \mathfrak{d} . \mathfrak{z}\mathfrak{z} . \mathfrak{R} . \mathfrak{z}\mathfrak{d} . \mathfrak{R} . \mathfrak{z}\mathfrak{z}\mathfrak{z} . \mathfrak{O}$

¶ El primero quiere dezir numero, es tomado en esta regla, como la vnidad en estos numeros: quiero dezir, que assi como multiplicando con el, no haze crecer, ni partiendo menguar, y assi como vno es numero, assi (1) no se toma por caracter proporcional: su valor siempre es conocido, como si dizen 4. (1) reales, diras claramente son 4. reales.

¶ El segundo se dize cosa. Es rayz, o lado de vn numero quadrado: y este es el primero de los numeros, de vna continua proporcion. Su valor es variable: porque assi como si auiendo de poner algunos numeros proporcionales, puede el primero ser vnas veces vna cantidad, y otras vezes otra, assi esta cosa no tendra proprio valor, antes tendra el que le quisieres dar: assi por enteros, como por quebrados.

¶ El tercero se dize cēso. Denota vn numero quadrado, procede de la multiplicacion de la cosa por si misma. Como si pones por exēplo q̄ la cosa vale 2. el censo valdra 4. Y la cosa vale tres el censo valdra 9. y assi procederas en infinito. De lo qual se entiende ser la cosa rayz del censo.

¶ El quarto se dize cubo. Denota vn numero cubico. Procede multiplicando el censo por la cosa.

la de suerte, que si ponemos por exemplo, que la cosa vale cinco a este respecto el cēso vale 25. y el cubo 125.

¶ El quinto quiere dezir censo, de censo denota vn numero q̄ ha sido dos vezes quadrado, quiere dezir q̄ es vn numero, del qual se podra sacar dos vezes rayz quadrada, asfi como 16. q̄ la primera rayz quadrada es 4. y de 4. la segunda es 2. procede de la multiplicacion del cēso por si mismo, o de la cosa por el cubo, como si la cosa vale tres, el censo vale 9. el cubo 27. y el censo de censo 81. Este 81. se dize numero dos vezes quadrado, por razon que se puede del sacar otras tantas vezes rayz quadrada.

¶ El sexto se dize primero relato, o fursolidum. Denota vn numero que no tiene rayz quadrada ni cubica, solamente tiene rayz relata, como se declara en el cap. 3. procede de la multiplicaciō del valor de la cosa por el del censo de censo, o el censo por el cubo. Como si la cosa valiesse dos el censo valdra quatro, el cubo ocho, el censo de censo 16. el primero relato 32.

¶ El septimo se dize, censo y cubo. Denota vn numero quadrado cubicado, o vn cubo quadrado, finalmente es vn numero, del qual se puede sacar rayz quadrada, y de la quadrada, rayz cubica. Y al contrario, asfi como 64. del qual la rayz quadrada es 8. y destos 8. la cubica es dos, o de sesenta y quatro la rayz cubica es 4. y del 4

la quadrada es 2. Procede multiplicando el valor de la cosa por el primero relato, o el censo, por el censo de censo, o multiplicando el cubo por si mismo, o cubicando el censo. Como si la cosa vale dos, el censo valdra quatro, el cubo 8. el censo de censo 16. el primero relato 32. el censo cubi sesenta y quatro.

¶ El octauo se dize segundo relato, o biffursolidum, es vn numero de la propiedad, q̄ diximos ser el sexto: porq̄ no tiene rayz quadrada, ni cubica. Procede multiplicando el valor de la cosa por el censo y cubo, o el primero relato, con censo. O censo de censo por cubo: Y si la cosa vale dos el segundo relato valdra 128.

¶ El nono se dize, censo de censo de censo. Denota vn numero tres vezes quadrado, del qual se podra sacar otras tãtas vezes rayz quadrada. Assi como 256. de los quales la primera rayz quadrada es 16. la segunda 4. y destos quatro la tercera es dos. Procede multiplicando el valor de la cosa por el segundo relato. O el censo cubo, por el censo, O el primero relato concubo. O multiplicando el censo de censo por si mismo.

¶ El decimo se dize cubo de cubo. Denota vn numero dos vezes cubicado, del qual se podra sacar dos vezes rayz cubica. Assi como 512. de los quales la primera rayz cubica es ocho, y de 8. es 2. Procede multiplicãdo la cosa por el censo de censo de censo de censo, o el segnndo rela

to por el censo, o el censo, y cubo por cubo, o el primero relato por censo de censo, o cubicando el cubo. De lo que se ha dicho en estos caracteres queda claro, que si la cosa vale dos el valor de los de mas caracteres procedera en dupla proporcion. Y si valiesse la cosa tres procedera en tripla. Y si 4. en quadrupla. De fuerte, que sabido el valor de la cosa, el de los de mas caracteres es notorio.

¶ Nota, que el caracter qualquiera que sea, no se ha de tomar por cãtidad simple, sino por grado de vna continua proporcion, o cantidad, de los quales el primero grado es la cosa, el segundo el censo, el tercero el cubo, el censo de censo el quarto, y el primero relato es el quinto. Y assi de los demas.

¶ Nota, assi como se presupone, que vna cosa valga dos, ò tres, ò mas, puedes dezir, que valga medio y a este respecto el censo valdra vn quarto, y el cubo vn ochauo. Y assi les daras otros qualesquiera valores que te agradaren, assi por enteros, como por rotos.

Cap. III. En el qual se declaran algunos caracteres que yo uso por no auer en la estampa otros

POR los diez caracteres que en el precedente capitulo se pusieron, uso estos. Por el que dizen numero. n. por la cosa, co. por el censo. ce. por cubo cu. por censo de censo, cce. por el primero

mero relato, R. Por el censo, y cubo, cc. cu. por segundo relato. RR. por censo de censo de censo cccc. por cubo de cubo, ccu. Esta figura, R, quiere dezir rayz quadrada. Esta figura, RR, denota rayz quadrada de rayz quadrada. Estas rrr, denota rayz cubica. Destos 2. caracteres, P. M. notas, que la P. quiere dezir mas, y la M. menos, el vno es copulatiuo, el otro disunctiuo. Siruen para sumar, y restar cantidades diferentes. Como adelante mejor entenderas. Quando despues de R. se pone, u. denota rayz quadrada vniuersal. Y assi rru. rayz de rayz quadrada vniuersal. Y de esta suerte, rrru, rayz cubica vniuersal. Esta figura, ig. quiere dezir igual. Esta q. denota cantidad: y assi, qs. quantidades, estos caracteres me ha parecido poner, porque no auia otros en la Empronta. Tu podras vsar quando hagas demãdas de los que se pusieron en el II. cap. porq̃ son mas breues. En lo demas todos son de vna cõdicion.

Cap. IIII. Trata de quatro reglas, sumar, restar, multiplicar, partir de numeros quadrados.

Artic. I. En el qual se define, y declara, que cosa sea numero quadrado.

NVmero quadrado es (segun define Euclides) vn numero superficial de iguales lados. Quiero dezir, que es vn numero que procede de la multiplicacion de dos numeros igua-

les en cantidad y genero, como 5. y 5. multiplicados el vno por el otro, hazen 25. este 25. se dice numero quadrado, y el 5. rayz quadrada.

¶ Y la proporcion que ay de la vnidad a la rayz de vn qualquier numero, la misma aura de la rayz a su quadrado, de do se infiere, que buscar la rayz quadrada de vn numero, no es otra cosa, sino buscar vna cantidad media, proporcional, entre la vnidad, y el tal numero propuesto.

¶ Nota, que todo numero podra ser rayz de otro, y no todo numero tendra rayz quadrada perfecta. Acerca de lo qual es de saber, que los numeros quadrados son en tres modos. Racionales, irracionales, comunicantes. Numero racional, es vn numero que tiene rayz discreta, quiero dezir, justa. Assi con 0.4.9. 16. que sus rayzes son 2. 3. 4. Numeros irracionales son vnos numeros, que no tienen rayz discreta, como 10. 12. y otros semejantes. Destos numeros jamas por practica se podra dar su rayz discreta, sino fuesse por via de linea, como se prueua por la nouena proposicion del sexto de Euclides. Numeros comunicantes, son dos numeros, que cada vno por si no tiene rayz discreta, y abreuiados a menor denominacion la tienen. Assi como 8. 18. los quales no tienen rayz quadrada, mas abreuiados quedaran en quatro, y nueue, que son numeros racionales, cuyas ray-

zes

*Euclides 9.
del 6.*

zes son dos y tres. Y la proporcion que ay de quatro a nueue, es como de ocho a diez y ocho. Assi mismo multiplicando 8. por diez y ocho, montan ciento y quarenta y quatro, que su rayz quadrada es doze. Y multiplicando, o partiendo, 4. por 9. haze numero quadrado racional, lo qual no acontece con los irracionales, porque aunque se abreuien, o acrecienten a menor, o a mayor denominacion, nunca haran numero racional, y aunque se multiplique vno por otro, el producto no fera racional. Llamanse numeros comunicantes, porque se comunica el vno con el otro en tal proporcion como numero quadrado con otro quadrado, como arriba se ha dicho.

¶ Nota, tantas quãtas vnidades tuuiere la rayz de vn numero quadrado de tantos numeros impares (començando de la vnidad) fera compuesto el tal numero quadrado. Exemplo. La rayz de 25. es 5. pues de cinco numeros impares fera compuesto el 25. Assi como 1. 3. 5. 7. 9. todos juntos hazen veynte y cinco.

¶ Nota, quando de algun numero quisieres sacar rayz quadrada, y fenecièr en vna destas figuras siguientes 2. 3. 7. 8. no le busques rayz discreta, porque no la tendra, y si fenecièr en alguna destas 1. 4. 5. 6. 9. fera cosa contingible tenerla, o no.

Articulo II. Deste IIII. Cap. Muestra sacar rayz quadrada de todo numero.

¶ Entendido q̄ cosa es rayz quadrada, resta dar regla para saberla sacar de qualquiera numero, que a la mano te viniere. Lo qual se haze, poniendo el numero del qual quisieres sacar su rayz, ala larga, assentando adelante vna raya, como se haze en el partir. Como si quisieres sacar rayz de 524176. Lo qual no es, ni quiere dezir otra cosa sino buscar vn numero, que multiplicado por si mismo, haga los mismos 524176. Pues diuide estas 6. figuras, poniendo vn punto debaxo de los 6. que es la primera letra, que esta a la mano no derecha, y otro debaxo del 2. de arte que vna figura tenga punto, y otra no. Como parece.

5 2 4 1 7 6

Destos puntos entenderas, q̄ tantos quãtos fuerẽ de tãras figuras, o letras sera la rayz, mas por saber que figuras seran, començaras de la mano siniestra, tomãdo la letra q̄ està sobre el primero punto, y la otra q̄ no tiene, q̄ son 52. destos 52. sacaras la rayz quadrada. Lo qual se haze, buscãdo vn numero, que multiplicado por si mismo haga los 52. y no mas, o se llegue a ellos lo mas q̄ pudiere, que sera 7. porque 7. vezes 7. son 49. resta 49. de los 52. y quedaran 3. pon los 7. que te vinieron por rayz, vna vez en el primero punto, y otra sobre la raya, que està adelante del numero,

ro, de que facas rayz, y esto se haze para denotar que se multiplica el 7. por 7. que es por si mismo y los 3. que sobraron ponerlos has sobre los 52. como parece figurado.

0 3

$$\begin{array}{r} 524176 \mid 7 \\ \hline \end{array}$$

7

¶ Y assi diras, que la rayz de cincuenta y dos, es siete, y sobran tres. Prosigue para facar la rayz de los tres que sobraron, y de los quatro que estan entre los dos puntos, lo qual haras doblandolos siete, que te han venido por rayz. Como muestra Euclides en la quarta del segundo, que son catorze, pon estos catorze debaxo de los treynta y quatro, como si fueren los catorze algun partidor, y no cures del siete, que pusiste en el punto primero, como parece.

0 3

$$\begin{array}{r} 524176 \mid 7 \\ \hline \end{array}$$

7 4

1

Aora partiras los 34. que estan sobre los 14. por los mismos 14. diziendo 3. partidos a vno, cabẽ a 2. este 2. pondras en el segundo punto vnavez, y otra sobre la raya, que esta adelante del numero de que saca rayz, como parece.

Ec 5

Aora

$$\begin{array}{r}
 03 \\
 524176 \quad | \quad 72 \\
 \hline
 742 \\
 1
 \end{array}$$

Hecho esto, multiplicaras 142. q̄ estan debaxo
 cada letra por si, por el 2. q̄ pusiste por rayz desta
 segunda ordē, y lo q̄ môtaren las multiplicacio-
 nes. restarlo hasde lo q̄ estuuiere arriba: como si
 fuesse partir. Diciēdo 2. vezes 1. son 2. quiē los re-
 sta de 3. queda vno, pō este 1. sobre los 3. y profi-
 gue multiplicádolas otras letras, q̄ son 4. y 2. por
 el mismo 4. diciēdo 2. vezes 4. son 8. resta 8. de
 14. y quedan 6. pōlos encima, como hazesen las
 particiones restando algo, y prosigue adelante,
 multiplicando 2. por 2. y ferā 4. quita estos 4. de
 los 61. que estan arriba, y quedaran 57. los qua-
 les pondras sobre los mismos 61. como parece.

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 15 \\
 0367 \\
 524176 \quad | \quad 72 \\
 \hline
 742 \\
 1
 \end{array}$$

Aora para sacar la tercera figura doblaras los
 72. que monta la rayz que ha venido hasta aho-
 ra, y montara 144. pon estos 144. como si fuesse
 partidor, començando de vna letra mas adelâte
 de

de aquellas con que huieres tratado, que sera desde el catorze, desta manera,

$$\begin{array}{r}
 15 \\
 0367 \\
 524176 \quad | \quad 72 \\
 7424 \\
 \hline
 114
 \end{array}$$

¶ Comiença aora a partir los 577. q̄ estan arriba por los 144. que estan abaxo, de tal suerte, q̄ sobre despues para poder facar el quadrado de la letra que cupiere. Pues comenzando a partir con el 1. que es la primera figura de los 144. los 5, que es la primera letra de los 577. diziendo 5. a 1. caben 4. vezes, y sobra 1. pon los 4. que dizes caben vna vez en el punto que esta debaxo del 6. y otro adelante de los 72. que te han salido por rayz, desta suerte que parece.

$$\begin{array}{r}
 15 \\
 0367 \\
 524176 \quad | \quad 724 \\
 74244 \\
 \hline
 114
 \end{array}$$

¶ Aora multiplica los 1444. que estan debaxo, por los 4. que salieron por rayz, multiplicando cada letra por si, y restando las multiplicaciones de lo de arriba, ni mas, ni menos, q̄ como se haze quando partes, diziendo 4. vezes 1. son 4. restados

tados de 5. que estan encima, queda 1. pon 1. sobre el 5. y prosigue multiplicando los tres quatro que estan debaxo, por los 4. que vinieron por rayz, y restando las multiplicaciones de lo que huuiere arriba, no sobrara ninguna cosa, como parece figurado.

$$\begin{array}{r}
 \circ \\
 \circ \ 1 \ \circ \\
 \bullet \ 3 \ 6 \ 7 \ \circ \ \circ \ | \ 7 \ 2 \ 4 \\
 5 \ 2 \ 4 \ 1 \ 7 \ 6 \ | \ \text{-----} \\
 7 \ 4 \ 2 \ 4 \ 4 \\
 1 \ 1 \ 4
 \end{array}$$

¶ Y assi auras acabado, y responderas, q̄ la rayz quadrada de 524176. es 724. como lo puedes probar multiplicando 724. por otro tanto, y haran 524176. y la proporcion, que ay de 724. a vno, ay de 524176. a 724. y por q̄ no te sobro ninguna cosa, diras ser rayz discreta, o perfecta, o racional.

Sacar rayz quadrada de otra manera.

¶ Diuide las figuras de dos en dos, comenzando de la mano derecha, poniendo 52 | 41 | 76 vna raya, como parece la misma cantidad del exemplo precedente.

¶ Hecho esto, comenzaras de los 52. que estan apartados con vna raya, y buscaras vn numero, que multiplicado por si mismo, haga los 52. o se llegue lo mas que pudiere, el qual numero sera 7. porque 7. vezes 7. son 49. resta 49. de 52. y quedaran 3. pon vno sobre los cinco, y tres sobre el

y el siete, que vino por rayz, afsientale debaxo de los dos, desta suerte que parece.

$$\begin{array}{r} 03 \\ 52 \quad | \quad 41 \quad | \quad 76 \\ \hline \end{array}$$

7

¶ Hecho esto, para saber qual sera la rayz q̄ se sigue en la segunda orden, doblaras el 7. y seran 14. a los cuales 14. añadiras vna letra, y sera la q̄ te pareciere, y multiplicaras la suma por la misma que añadireres, y si el producto fuere tanto, o la mayor parte, como la suma que ay en la segunda orden, y en lo que sobró de la primera, la letra que añadiste sera la rayz de la segunda orden, y si es mas, quita, y fino llega, añade (orden llamò aqui los apartamientos de las rayas) pues porque esto sea entendido. Pongo por exemplo, que a los catorze, que es el doble del siete que vino por rayz de la primera orden, les añadiste tres, poniendo se los delante por vniidad, montara 143. Agora multiplica los mismos 143. por 3. (que es la misma letra, que añadiste) y montara 429. y porque tu quisieras, que vinieran 341. y vienen mas, entenderas ser el tres muchos, pues si tres es mucho, pôgo que añades 1. como hemos dicho a los 14. y môtaran 141. multiplica estos 141. por el mismo vno que añadiste, y montara lo mismo, y por quanto tu quisieras que fueran 341. esta multiplicacion no es

mas de 141. entenderas ser poco 1. Ya que sabes que 3. es mucho, y que 1. es poco, añade 2. a los 14. y será 142. multiplicalos por los mismos 2. y montara 284. los quales restaras de 341. y quedaran 57. pon los 2. que vinieron por rayz debaxo del 1. que esta en la segunda orden, o apartamiento, y los 37. que sobraron pongãsse sobre los 41. que estan en la segunda orden como parece.

$$\begin{array}{r}
 0 \\
 0 \ 3 \ 5 \ 7 \\
 \underline{5 \ 2} \ | \ \underline{4 \ 1} \ | \ \underline{7 \ 6} \\
 \hline
 7 \ \quad 2
 \end{array}$$

¶ Ya que has sacado r. de las dos ordenes primeras para sacarla r. de la tercera doblaras los 72. q̄ hasta aora te han venido por r. y montara 144. a los quales añadiras vna letra como hemos mostrãdo, y si multiplicando el cõjuncto por la misma letra q̄ añadieses fuere tanto como lo q̄ sobro en la segunda ordẽ, y cõ lo q̄ ay en la tercera q̄ todo es 5776. o la mayor parte dello, aquella tal letra sera la r. de la tal ordẽ. Pues añade a los 134. vn 4. y môtara 1444. Lo qual multiplicaras por el mismo 4. que añadiste, y montara justamẽte 5776. lo qual restaras de los 5776. que estan sobre la raya que es de do facas rayz, y no quedara nada, afsienta los 4. que viene por vno desta tercera orden enfrente de los 6. como parece.

000

035700

52141176

 7 2 4

Y assi auras dado fin a lo q buscas, y diras q la r. de 524176. es 704. como por la otra via se dixo.

¶ Nota, que si a caso quando diuidieres las figuras de dos en dos, como esta regla manda si que dare vna sola a la parte yzquierda sacaras della la r. y luego procederas doblando, y añadiendo para sacarlo de la segunda orden, y luego doblaras la r. de la primera y segunda ordē para sacar la r. de la tercera, y assi procederas doblando siē pre las rayzes que en todos las ordenes huuiere venido para sacar cada vna de las por venir, como has hecho en el exemplo precedente.

¶ Nota, quando el primer modo de sacar rayz quisieres partir lo que sobra por el doblo de la rayz, y no cupiere nada, en tal caso pondras zero en lugar del numero que auia de venir por rayz. Lo mismo haras en este segundo modo, q si añadiendo algo al duplo de la r. fuere mas que lo que estā en las ordenes de do sacares r. en tal caso la letra que buscares sera zero, y no aura q hazer sino proseguir adelante.

Articulo 3. deste IIII. Capitulo. Muestra saca r. de numeros sordos.

¶ Quan-

¶ Quando auiendo sacado rayz de algun numero sobrate algo, pondras lo que sobrate sobre vna raya, y doblaras la rayz de tal numero, y aña dele vno, y ponerlo has debaxo por denominador. Exemplo. La rayz de 27. es 5. y sobrarian dos, pon los dos que sobran sobre vna raya, y dobla los 5. que viniéron por rayz, y aña deles vno y seran 11. los quales pondras debaxo de los dos y assi diras que la rayz quadrada imperfecta, o irracional de 27. es 5. y dos onzenes.

¶ Nota, que no puede sobrar tanto como el duplo de la rayz y mas vno, la razon dello pone Euclides en la octaua del noueno.

Otra diferencia de aproximar.

¶ Para declaracion desta orden de aproximar, se ha de presuponer, que ay dos maneras de progresiones, la vna por augmentacion, assi como medio dos tertios, tres quartos, quatro quintos, &c. La otra por diminucion, assi como medio, vn tertio, vn quarto, vn quinto. Entendido esto por caso q̄ quieres sacar la rayz de 5. la qual si dizes ser 2 es poco, y si dizes ser 3 es. mucho. Pues porque dos es poco, y tres es mucho, suma 2. y 3. seran 5. de lo qual tomaras la mitad que es 2. y medio: estos dos y medio si los multiplicas por si montan seys y vn quatto, que es vno y vn quarto mas de lo que quisieras: pues por tanto tomaras vn tercio procediêdo por la progresion de diminucion, y juntarlo has cõ el 2. y se-

ran 2. y vn tercio, los quales multiplicados por si serã 5. y quatro nouenes, que es quatro nouenes mas q̄ 5. pues aora ay necesidad de jútar cõ los 2. vn quarto, y seran 2. y vn quarto, multiplicado por si es 5. y vn 16. abo, en que es mas vn 16. abo pues es mucho toda via 2. y vn quarto, pon 2. y vn quinto, y montara su quadrado 4. y 21. veinte y cinco abos, pues por quanto vn quarto es mucho, y vn quinto es poco, es menester tomar vn medio entre vn quarto, y vn quinto, q̄ sea menos que vn quarto, y mas que vn quinto, lo qual se hara sumando los numeradores llanamente vno por otro, y denominadores con denominadores, y mōtarã 2. nouenes: los quales es menos que vn quarto, y mas que vn quinto, junta estos dos nouenes con los 2. enteros, y seran dos y 2. nouenes, que quadrados es 4. y 768. abos, y porq̄ es menos q̄ 5. conuiene hallar otro medio entre vn quarto, y 2. nouenes dela manera que hemos dicho, y seran 3. trezabos: a los quales junta los 2. enteros, que es rayz de 5. y seran 2. y 3. trezabos, que su quadrado es 4. y $\frac{106}{100}$ cientos, y sefentra y nueueabos, y desta manera procederas hasta que llegues, o passes casi al punto, mas a perfeccion no llegaras, porque como te he dicho, de la rayz sorda no se puede dar precisamente, porque si se pudiera dar, no seria sorda, y por tãto se llaman sordas, o imperfectas, porque es tra bajar en balde buscarles perfeccion.

Otra manera de proximar.

Di q̄ lo q̄ sobró no importa. ¶ Pon, que quieres sacar la rayz de 40. y porque de 40. no se puede sacar rayz discreta, multiplicaras 100. por si, y seran 10000. los quales se multiplicaran por los 40. y montaran 400000. saca la rayz quadrada q̄ es 632. estos 632. son ciē abos que valen seys enteros, y treynta y dos ciē abos, que en menor numero es ocho veynte y y cinco abos, afsi diras, que la de quarenta es 6. y ocho veynte y cinco abos.

¶ Nota, que lo que aqui vino fueron centabos, por razon que multiplicaste por 100. mas si multiplicas por 10. seran dezimos, y si por 1000. seran millarios, y afsi de otras partes. Porque mejor sea entendido, pongo otro exemplo. Sacar rayz de 9 presuponiendo, q̄ 9. no la tuuiesse discreta: pues toma vn 10. y multiplicalo por si y seran 100. Multiplica agora a el 9. por 100. y seran 900. saca la rayz de 900. q̄ son 30. los quales 30. son decimos: pues 30. decimos son 3. enteros, q̄ es la rayz de 9. Y afsi haras en otro qual quiera numero racional, o irracional.

Articulo III. deste IIII. Capitulo. Muestra sacar rayz quadrada de los quebrados.

¶ Para sacar la rayz quadrada de los numeros que quebrados, sacaras la rayz del numerador por si y luego del denominador si ser pudiere, como hazes en enteros, y si el quebrado tuuiere rayz quadrada-

quadrada en su numerador, y denominador, el tal quebrado sera quadrado, y fino la tuuiere en ambas partes, sera sordo. Exemplo.

¶ La rayz quadrada de 25. treynta y seys abos que sera? Saca la rayz del namerador que es cinco, y luego la del denominador que es 6. y pon la rayz que te salio del numerador encima de la que salio del denominador, y así diras que la rayz quadrada de 25. treynta y seys abos es cinco sextos. Y la prouea es, que multiplicando cinco sextos por otros cinco sextos vendran veynete y cinco treynta y seys abos, que es el numero de do sacaste la rayz. Otro exemplo.

¶ La rayz de nueue veynete abos quanto es? Por que no tiene rayz el denominador, que es 20. de xallo has, porque es sorda y no se podra sacar.

¶ Nota, quando quisieres sacar rayz de algun quebrado, y te pareciere que no la tiene, procura traer el tal quebrado a menor denominación, porque hallaras muchos quebrados, que parezcan no tener rayz, y abreuiandolos la tienen, como onze quarenta y quatro abos, en el qual si se abreuia a menor denominacion es vn quarto, que su rayz quadrada es medio, y así haras de otras semejantes.

Artic.V. Deste IIII. Cap. Muestra sacar rayz quebrada de entero, y quebrado.

¶ Quando quisieres sacar rayz de entero, y quebrado,

brado, ay necesidad de reduzir el entero en el especie de su quebrado, y despues sacar la rayz del numerador, y del denominador como enteros. Exemplo: La rayz de 6. y vn quarto, q̄ sera? Reduze los 6. y vn quarto todos a quartos, y seran 25. quartos, saca aora la rayz de 25. que es 5. y ponla sobre vna raya, saca mas la rayz del denominador, que es 4. y vendran dos, ponlos debaxo de los cinco, y assi diras q̄ la rayz de 6. y vn quarto es cinco medios, que son dos y medio.

¶ Nota, que si despues de auer reduzido el entero en la especie de su quebrado si en el numerador, y denominador no huuiere rayz, el tal numero diras ser irracional, o sordo. Quiero dezir que no terna rayz doble. Exemplo: La rayz de quatro y vn nouen que sera? Reduze los quatro y vn nouen a nouenes, y seran 37. nouabos, aunque el denominador deste quebrado tiene rayz por ser nueue, porque el numerador que es 37. no la tiene, por tanto diras que la rayz es sorda. Y no tendras cuenta en q̄ el entero la tiene por si, y el quebrado tambien por si: porque quando sacares rayz de entero, y quebrado como quiera que vengan, de necesidad se ha de reduzir el entero en el especie de su quebrado.

Artic. VI. Deste IIII. Cap. En el qual se ponen algunos anifos necessarios, para operacion de numeros quebrados.

¶ Enten-

¶ Entēdida que cosa sea rayz quadrada, y como se ha de sacar, notaras los auisos siguientes. Si vuieres de sacar r, de algū numero, y el tal numero no la tuuere discreta, no te fatigues, ni cures de aproximaciones, sino responderas diziendo ser rayz del tal numero. Exemplo: Pon q̄ te pidē la r, de 12. di que es r, 12. Acerca de esto has de notar, que quando te piden que saques rayz de vna qualquiera q, entenderas q̄ la tal q, es vn quadrado, y q̄ quieres saber su rayz por saber su lado, o principio de donde el tal quadrado procedio, y si como pidieron r, dixera rrr, entenderas ser la tal q, cubo, y assi de otras rayzes.

¶ Segundo auiso: Quando te pidieren que quads vn numero, no te piden otra cosa, sino que le multipliques por si mismo. Exemplo: Dame el quebrado de 7. multiplica 7 por si mismo diziendo 7. vezes 7. hazen 49. este 49. se dice potencia, o quadrado del 7. y si como dicen dame la potencia quadrada de vn numero, dizesen cubica, no te piden sino que cubiques el tal numero. Exemplo. Dame la potencia cuba de 3. cubica 3. diziendo 3. vezes 3. son 9. otra vez 9. vezes 3. son 27. este 27. se dice cubo, o potencia cubica del tres. Lo mismo entenderas de otro qualquiera genero de rayzes.

¶ Auiso tercero. Si quisieres doblar vn numero quadrado, o cubo, o otro qualquiera numero q̄ fuere, tomaras el 2. y quadrarle has, o cubicarle has

lehas de tal suerte, q̄ quede del especie del numero que huieres de doblar, y despues multiplicas por ello el quadrado, o cubo, o la cosa q̄ quifieres doblar. Exēplo: Doblame este quadrado 9. toma el 2. (con el qual se doblan las cosas que no son quadradas) y quadralo como se mostrò en el segndo auiso de este articulo I, y montara 4. despues multiplica el nueue) que es el quadrado que quieres doblar) por esto 4. seran 36. y assi diras, que doblando este quadrado 9. monta vn quadrado 36. Si quifieres doblar algun numero cubo, cubiertas primero el dos, y seran 8. multiplica por este 8. el tal cubo, y lo que viniere sera el duplo.

¶ Si quifieres doblar algun numero quadrado, de quadrado, quadra dos vezes el dos diziendo 2. vezes 2. son 4. otra vez quatro vezes 4. son 16, pues por estos 16. multiplicaras el rr. que huieres de doblar. Nota lo que hazes con el dos para doblar, que lo mismo haras con el tres para tres doblar, y con quatro para quatro doblar, y con cinco, para cinco doblar.

¶ Auiso quarto: Si huieres de sacar mitad de algun quadrado, quadras el dos, como heziste en el segundo auiso para doblar, y partiras el tal quadrado por el. Exemplo. Saca la mitad deste quadrado 36. quadra el dos, y sera quatro, como se mostrò en el segūdo auiso deste articulo. Parte agora 36. a quatro, y veran 9. y assi diras, que

la mitad deste quadrado 36. es otro quadrado 9.
 Si quisieres sacar mitad de algun cubo parte el
 tal cubo por 8. que es el cubo del dos, y lo que
 viniere sera la mitad, y para sacar mitad de algũ
 quadrado de quadrado, quadra el dos dos vezes
 y seran 16. parte por 16. Mira lo que hazes con
 el dos para sacar mitad destos numeros, que lo
 mismo haras con el tres para sacar el tercio, y
 con el quatro para sacar la quarta parte, y con
 el cinco para sacar el quinto, &c.

¶ Nota, numero simple llamo vn qualquiera nu-
 mero que no se aya quadrado.

*Artic. VII. Deste IIII. Cap. Muestra sumar r, de
 numeros quadrados, de qualquiera manera
 que vengam.*

¶ Entendido lo que se ha tratado en los capitu-
 los precedentes, resta mostrar sumar numeros
 quadrados. Para lo qual es de saber, que la regla
 general que se ha de tener para sumar dos qua-
 drados racionales, o irracionales, o comunican-
 tes de qualquier suerte que fueren es sumar vno
 con otro llanamente, y luego multiplicar al vno
 por el otro, y del producto sacar la r. y doblarla
 llanamente, y juntarla con la suma de los dos
 numeros que al principio se sumaron, la r. des-
 te conjuncto sera la suma de las rayzes de los
 quadrados que sumares, como mejor se enten-
 dera por la pratica de los exemplos siguientes.

Quiero sumar r. 9. con r. 4. suma 9. cō quatro, y se
 rã 13. guarda estos 13. luego multiplica el 9. por
 el 4. y seran 36. sacar r. de 36. que es 6. doblalos,
 y seran 12. los quales juntaras con los 13. que
 guardaste y seran 25. y assi diras que r. de 25. es
 tanto como r. de 9. y r. de 4. Ser verdad parecee
 claro, porque la r. de 9. es 3. y la de 4. es 2. juntos,
 3. y 2. hazē 5. pues r. de 25. que dezimos fer la su
 ma es otros, 5. Exemplo de sumar r. de nume
 ros sordos. Suma r. 5. con r. 3. suma los numeros
 como son 5. y 3. y sean 8. luego multiplica el vno
 por el otro, y montaran 15. saca la r. y porq̄ no la
 tiene, diras q̄ es r. 15 (como se mostrara en el au
 so primero del VI. artic. deste cap. IIII. Pues as
 si como auias de doblar la r. si la haueria dobla
 esta r. 15. y porque es quadrado multiplica por
 quatro (como se mostrò en este IIII. cap. artic.
 VI. auiso tercero) y montara r. 60. la qual r. 60.
 juntaras con los 8. que es la suma de los dos nu
 meros, que pretendes sumar desta manera r. de
 8. p. r. 60. quiere dezir rayz quadrada vniuersal
 de 8. mas r. de 60. que sacando r. deste binomio
 (como adelante en el cap. IX. artic. IIII. mejor
 se entendera) vendra r. de 5. p. r. de 3. y segun prã
 ctica quiero dezir, que sacãdo la rayz quadrada
 de 60. si la tuuiera, y juntandola llanamente con
 los 8. r. deste conjunto, es tanto como la r. de 3,
 y de r. 5. Y porque mejor sea entendido pon por
 exemplo, que quieres sumar r. 4. con r. 9. como si
 fuessen

fuesfen fordos. Pues sigue la regla sumando 4. cõ
 9. y seran 13. guarda los. Afsi mismo multiplica
 el vn numero por el otro, diziendo, 4. vezes 9.
 son 36. pon por caso, que 36. no tiene r. por tanto
 dobla r. 36. multiplicando por quatro, y seran r.
 144. juntar r. 144. con los 13. que guardaste, desta
 manera rv. 13. p, r. 144. quiere dezir, que monta
 rayz quadrada vniuersal de 13. mas rayz de 144
 lo qual se entendera desta suerte, q̄ faques la r.
 de 144 (pues se puede en este exemplo hazer) y
 seran 12. junta estos doze con los 13. y seran 25.
 r, de 25. es la suma de r. quatro, y de r. nueue.

¶ Nota, con mayor breuedad puedes sumar es-
 tos numeros fordos. Exemplo: Suma r. 5. con R.
 3. di que monta r. 5. pr. tres.

¶ Nota, si a caso te dieren que sumes numeros
 que no fueren quadrados, con otros que lo fue-
 ron, quadraras primero el que no lo fuere, y des-
 pues seguiras la regla que te agradare de las que
 se han dado. Exemplo. Suma 5. con r. 16. prime-
 ramẽte quadraras el 5 (como se mostrò en el au-
 so segundo artic. VI. deste III. cap.) y monta-
 ra 25. sigueffe la regla, diziendo, que quieres su-
 mar r. 25. con r. 16. y montara r. 81.

¶ Nota mas, si los quadrados q̄ huieres de su-
 mar fueren mas que dos, sumaras primero los, 2
 y con la suma destos juntaras la de otro, siguiẽ-
 do los auisos, y reglas dadas, y afsi hasta acabar
 con todos. Y si fueren fordos suma con el p.

¶ Nota, si huuieres de fumar algunos quadra-
dos que traxeren quebrados, reduziras (por cau-
sa de breuedad) los numeros enteros en el espe-
cie de sus quebrados, y despues procederas con
los numeradores, como si fuesen enteros, y la
suma que saliere partirla has por la denomina-
cion del quebrado. Exemplo: Quiero fumar $r.2.$
y vn quarto con $r.6.$ y vn quarto, reduce el nume-
ro, y el otro a quattros, y vendran $9.$ quattros, y 25
quattros, dexa los quattros, y prosigue la regla co-
mo si dixeran que fumaras $9.r.$ con $r.25.$ y mon-
taran $r.64.$ parte estos $64.$ por quatro, que es el
comun denominador destes quadradados, y ven-
dran $r.16.$ y tanto diras que monta $r.2.$ y vn quar-
to con $r.6.$ y vn quarto.

¶ Si huuieres de fumar dos quadradados iguales
en cantidad y genero, multiplicando el vno por
quatro, lo que viniere sera la suma de ambos.

*Artic. VIII. Deste IIII. Cap. Muestra restar nu-
meros quadradados de numeros quadradados.*

¶ Lo mismo se haze en el restar que en el su-
mar, solamente difiere, en que en el sumar se su-
ma el duplo de la $r.$ del producto (del vn nume-
ro con el otro) con la suma de los dos nume-
ros quadradados, aqui lo restaras si pudieres, y si-
no, restaras con el menos, como el sumar suma-
ste con el mas. Exemplo. Quiero restar $R.4.$ de
 $R.16.$ primeramente suma quatro con $16.$ y se-
ran

ran 20. guardalos. Despues multiplica 4. por 16. y seran 64. la r. de 64. es 8. doblala, y seran 16. estos 16. se quitaran de los 20. que guardaste, y que daran 4. Y assi: diras q̄ restando r, 4. de r, 16. queda r, 4. y es cosa clara, por q̄ r, de 4. es 2. y r. de 16. es 4. pues si de 4. quitas 2. quedan otros 2. pues la r. de 4. que dizes ser en este exemplo la resta es 2. Otro exēplo: restar r, 5. de r, 8. prosigue sumando el 5. con el 8. y seran 13. guardalos. Luego multiplica el vno por el otro, diziendo 5. vezes 8. y seran 40. saca la r. y porque no la tiene discreta, diras ser r, de 40. (como se mostrò en el artic. VI. auiso primero deste quarto capitulo) dobla esta r, 40. multiplicando por 4. porque es quadrado (como se mostrò en el articulo sexto, auiso primero, y tercero deste quarto capitulo) y montara r. 160. lo qual quitaras de los treze, que guardaste desta suerte rv, 13. m, r, 160. y quedara figurado rayz quadrada vniuersal de 13. menos r, de 160. Quiere dezir, que sacando la r. de 160. si pudiere ser, y restandola de los 13. la r. de lo que quedare es lo q̄ resta. Declarolo por numeros racionales, como si fuesen sordos. Quieres restar r, de 9. de r, 25. suma nueue con 25. y seran 34. guardalos, multiplica 9. por r, 25. y seran 225. saca la r. de 225. y presupon, que no la tiene, y responde, diziendo, que es r, 225. Dobla estos 225. multiplicando por 4. como arriba se hizo, y môtara r, 900. esta r. de 900. se ha de restar de los

34. q̄ guardaste desta fuerte rv 24. m. r. 900. Quiere dezir, q̄ sacando la de 900. q̄ son 30. y restandolos de los 34. quedaran 4. pues r. de 4. que es 2 es lo q̄ resta sacando r. 9. de r. 25. como cada vno lo puede prouar. Y este es el intento desta rayz vniuersal en el restar. Nota, q̄ en estas restas de numeros sordos, lo mas facil es restar con la diction del menos. Exēplo. Resta r. 5. de r. 12. respondieras que queda r. 12. m. r. de 5. Si huieres de restar algun numero simple de algun quadrado, o al contrario, quadraras primero el numero simple, y despues seguiras la regla. En lo demas las mismas notas, y auisos que se dixeron en el sumar, aplicarás en el restar.

Art. IX. deste IIII. Cap. Muestra multiplicar numeros quadrados, por numeros quadrados.

¶ El multiplicar es cosa clara, porque no ay necesidad de mirar, si los quebrados que se hã de multiplicar son racionales, o irracionales, antes no curaras de otra cosa, sino multiplicar el vno por el otro, como si fuesen numeros simples. Quiero dezir numeros no quadrados, ya seã enteros, ya sean quebrados, y del producto si pudieres sacar r. sacarla has, y sino la tuuiere, diras ser r, del tal producto. En esto puedes notar, que el producto, que tuuiere r, dable, es señal que procedio de numeros racionales, o comunicantes: y si no tuuiere r, dable, de irracionales. Exemplo:

plo: Quiero multiplicar r, 9. por r, 4. multiplica
 9. por 4. y seran 36. responde que multiplicando
 r, de 9. por r, de 4. môtara r, de 36. y estos es cosa
 euidente, porque multiplicar r, de 9. por r, de 4.
 es lo mismo que multiplicar 3. por 2. que hazen
 6. pues r, de 36. que dezimos ser el producto es 6
 Otro exemplo, Multiplica r, 2. por r, 8. y môtara
 r, de 16. porq̄ 2. vezes 8. hazē 16. abreniados ha
 zen 4. Otro exēplo: Multiplicando r, de 5. por r,
 de 3. môtara r, de 15. porq̄ 5. vezes 3. hazē 15. Mul
 tiplica r, de medio por r, de 2. tercios, multiplica
 como quebrados, y môtara r, de 2. sextos. Nota
 si huieres de multiplicar algũ numero quadra
 do por algun numero simple, quadra primero el
 numero simple, y despues seguira la regla. Nota
 multiplicando vna r, de vn quadrado igual por
 otro, el vno quedara por r, del producto (por cau
 sa de breuedad). Exēplo: Multiplica r, de 9. por
 r, de 9. diras q̄ monta 9. q̄ es tanto como rayz de
 81. que por la regla general te vendran.

*Artic. X. Deste III. Cap. Muestra partir numeros
quadrados, a numeros quadrados.*

¶ El partir, se haze partiendo llanamēte vn nu
 mero por otro, sin tener ninguna consideracion
 si son discretos, o sordos, saluo que del quocien
 te sacaras la r, si la tuuiere, y sino la tuuiere, diras
 ser el quociēte r, del mismo quociente. Exēplo:
 Parte r, 144. por r, 9. parte 144. por 9. y vendran
 16. pues

16, pues di que partiendo r. 144. a r. 9. cabe a r. 16. Otro exemplo: Parte r. 15. a r. 7. parte 15. a 7. y cabra 2. y vn septimo, y assi diras, que partiendo r, 15. a 7. caber 2, y vn septimo. Si partieres algun numero simple por algun quadrado, o al contrario, quadraras primero el que no lo fuere, y despues haras como en los exemplos deste articulo has visto.

Capit.V. Trata del numero cubico, y de sus quatro reglas generales.

Artis.I. De la definicion, y composicion del numero cubo.

¶ Numero cubo es (segun Euclides en la segunda del septimo) vn numero que procede de la multiplicacion de tres numeros iguales en cantidad y genero. Assi como 2.2. multiplicados vnos por otros, diziendo 2, vezes 2. son 4. y 4. vezes 2. son 8. este 8. se dize numero cubo, y el vno de los tres doses, se dize rayz cubica, finalmete el numero cubo es vn cuerpo de iguales lados. Quiero dezir, que su altura, y anchura y largura son iguales, y la rayz de tal cubo es vn lado. La composicion destos numeros, procede de la suma de numeros impares, diuididos en partes iguales, comenzando de la vnidad. Exemplo. En estos numeros, 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. si los diuides en partes, siendo la prime

Lee la
17. del
8. de
Euclides.

ra el 1. y la segunda 3. y 5. la tercera 7. 9. 11. y así en infinito añadiendo vn numero mas a cada apartamiento, la suma de qualquiera destas diuisiones hara numero cubo. Acerca de lo qual notarás, q̄ tantas quãtas vnidades tuuiere la rayza cubica de vn cubo, de tantos numeros impares sera compuesto el tal cubo. Exemplo 27. es numero cubo. Si quisieres saber de quantos numeros impares se compone, se mira quanto es la rayza cubica de 27. y hallaras ser 3. (como adelante diremos.) Pues de tres numeros impares, diras ser cõpuesto el 27. Y así mismo entenderas por ser la rrr. de 27. 3. que es el tercero numero cubo, començando de vno. Si quisieres saber quales son estos tres numeros impares, q̄ cõpufieron al 27. Digo, q̄ el quadrado de la rayza de vn qualquiera numero cubo, es el numero q̄ esta en medio de los impares que al tal cubo compusieron, con tal que la rayza del cubo sea impar, pues en este 27. su rrr. es 3. el qual es impar, por tanto quadra el tres (como se mostrò en el segundo auiso del articulo sexto del quarto capitulo,) y seran nueue: pues este nueue es el vn numero de los tres impares que componen al 27. y el de en medio: pues si el 9. es el impar que ha de estar en medio, facil cosa sera de poner vn onze que le sea antecedente, que sera siete, y otro que le sea conseqüente, que sea onze: y así diras, q̄ los numeros que compusieron al 27. son 7. 9. 11. porq̄

la suma de todos tres, monta 27. y si la rrr. del cubo fuere par, su quadrado sera la mitad de la suma de los numeros de los extremos, o de los 2. numeros de en medio. Exemplo: En este cubo 64. su rrr. es quatro, su poténcia, o quadrado de 4. es 16. Digo, que estos 16. es la mitad de los numeros impares de los extremos: y pues sabemos que el exceso de los numeros impares es 2. a este 16. q̄ es la mitad, añade la mitad del exceso, que es 1. y seran 17. Afsi mismo quita del 16. la otra mitad del exceso, que es vno, y quedarán 15. y estos dos numeros son los de en medio. Aora busca el antecedente de 15. que es 13. y el conseqente de 17. que es 19. y afsi diras, que los quatro numeros impares que componen a este cubo 64. son 13. 15. 17. 19. la suma de todos quatro es 64. Engédrase el numero cubico de la multiplicacion de la rayz quadrada por su mismo quadrado. Exemplo: 9. es numero quadrado porque su r. es 3. Pues multiplicando 3. por 9. haze 27. Este 27. es numero cubico, y su rrr. es tres y tanto es 27. como tres vezes 9. que son tres numeros iguales. Estos numeros cubos, son en tres modos, como diximos en los quadrados. Conuiene saber, racionales, irracionales, comunitante. Numero cubo racional, es vn numero, del qual se puede sacar rrr. justamente. Afsi como 8, 27. cuyas rayzes son 2. y 3. Numero fordo cubico en vn numero del qual no es posible sa-

car rrr. ni por aproximacion, ni augmentacion. Asi como 40.60.7.&c. Numeros cubicos comunicantes, son aquellos que abreuados a menor denominacion, cada vno por si tiene rrr. y si se multiplica el vno por el otro, el producto tambien la tendra. Y si se parte por el semejante haze numero cubico. Exemplo. En estos diez y seys, y cincuenta y quatro abreuados en ocho, y veynte y siete, como se muestra en el segundo libro, capitulo sexto, cada vno por si tiene rrr. y multiplicando ocho por veynte y siete, monta dozientos y diez y seys, que tambien es numero cubico: y si se parte el vno por el otro, haze lo mismo.

Articulo II. Deste V. Cap. Muestra sacar rrr. de los numeros cubicos.

¶ Presupuesto y entendido lo dicho, para sacar la rayz cubica de todo numero cubico, assentaras el numero del qual quieres sacar la rayz como heziste en la rayz quadrada: saluo q̄ despues que huieres puesto el primero punto enfrente de la vuidad, dexaras entre punto y punto dos figuras, assi como en la quadrada dexalte vna, como parece en esta figura. 3 1 1 6 6 5 7 5 2.

La razon de lo qual demue
 fra Euclides en la octaua
 del noueno.

Gg

Hecho

¶ Hecho esto , comiença del primero punto, que esta a la mano yzquierda, y mira que letra aura que cubicada haga tã to como los 312. que estan sobre el primero punto, o la mayor parte , y hallaras que es 6. el qual 6. se pondra en el primero punto, desta manera , que parece.

$$\begin{array}{r} 311665752 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline \end{array}$$

¶ Despues quadraras el 6. que vino por rayz , y montara 36. los quales 36. pondras debaxo del mismo seys, y multiplicaras la rayz que es seys por su quadrado, que es 36. y las multiplicaciones restarse han de los 311. que estan arriba , y despues el mismo seys por si, y quedaran 95. como parece figura-

$$\begin{array}{r} 09 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 135 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 311665752 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline \end{array}$$

¶ Agora para facer la rayz de la segunda orden, triplaras la rayz que es seys, y seran 18. estos 18. multiplicaras vna vez por la mesma rayz, y montara 108. los quales asentaras debaxo de la rayz, començando de vna casa mas adelante como parece.

$$\begin{array}{r} 36. \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline \end{array}$$

¶ Y partiras los 9. que so-
 braron, diciendo 9. parti-
 dos a vno, caben a 7. porq̄
 quede de que sacar las mul-
 tiplicaciones que se hizie-
 ren con las otras letras.

09
135
311665752

6 . .

Pues pon 7. en el segundo
 punto, y multiplica los 7.
 por todos los 108. y las multiplicaciones de ca-
 da vna letra yr se han restado de lo de arriba,
 diciendo, vna vez 7. son 7.
 quien los quita de 9. que-
 dan dos pon 2. sobre el 9.
 y prosigue multiplicando
 con las demas, y quitando
 de lo de arriba y quedara
 la figura desta manera.

36
108
2
090
1350
311665752

6 7

¶ Ya que has multiplicado
 vna vez con la multiplica-
 cion del triplo de la rayz
 por la misma rayz, sacaras de nuevo otro multi-
 plicador, multiplicando el triplo de la rayz q̄ es
 18. por el 7. que fue la letra q̄ se añadio por rayz
 de la segunda orden, y montaran 126. los quales
 se pondran debaxo, y se multiplicarã cada letra
 por el 7. que es rayz, y las multiplicaciones de
 cada vna letra yr se han restado de lo que huie

re arriba, diziendo desta manera 1. vez. 7. son 7.
 quitados de 20. que ay enci
 ma quedan 13. y prosiguien
 do assi con las demas que-
 dara la figura como pare-
 ce.

11
232
0906
13502
311665752

¶ Hecho esto, sacaras otro
 tercero multiplicador qua-
 drando el 7. q̄ vino por rayz
 desta segunda orden, y mon-
 taran 49. los cuales assenta-
 ras poniendo el 9, enfrente
 del mismo 7. y el 4. vna ca-
 sa mas atras, por los cuales
 49. multiplicaras el mismo
 7. cada letra por si, o junta-
 mente, segun que mejor te
 pareciere, y restaras la multi-
 plicacion de lo de arriba, y
 quedara la figura desta ma-
 nera que parece.

6	7
3686	
102	
1	
08	
119	
2328	
09064	
135022	
311665752	

¶ Si se ha notado entende-
 ras, q̄ hazes 3. multiplicado-
 res para sacar la rayz de ca-
 da orden. El primero se saca
 del triplo de la rayz, multi-
 plicada por la misma rayz. El segúdo multiplicá-
 do el triplo de la rayz q̄ huuiere por la letra que

6	7
36869	
1024	
1	

se po-

se pone por rayz, como mejor se entendera en el sacar la rayz de la tercera orden que falta, para lo qual triplaras primeramente toda la rayz que te ha venido en las ordenes precedentes, q̄ son 67. y montara 201. estos 201. multiplicarse han por toda la rayz, que es 67. y môtara 13467. ponganse debaxo por partidor, començando a poner la vnidad deste partidor enfrente de la primera letra, que huuiere adelante de la vltima figura que te huuiere venido por rayz, como en la figura se puede ver. Ya que tienes puesto tu partidor, comiença sacar la rayz, que buscas de la orden tercera, diziendo, vno que esta en el partidor quantas vezes entra en diez que ay arriba? Y hallaras que cabe ocho vezes, pon ocho en el punto que esta entre las dos rayas, y multiplica todas las figuras que ay en el partidor que es 13497. por el ocho, y resta de lo que estuuiere arriba, y quedara la figura desta manera que parece.

$$\begin{array}{r}
 11 \\
 240 \\
 0081 \\
 1196 \\
 23289 \\
 090644 \\
 1550221 \\
 311665752 \\
 \hline
 6 \quad 7 \quad 8 \\
 \hline
 368697 \\
 10246 \\
 134 \\
 1
 \end{array}$$

¶ Hecho esto busca otro segun lo multiplicador, el qual hallaras multiplicando los 201. que

es el triplo de los 67. q̄ es la
 rayz de las dos ordenes pri
 meras por el 8. q̄ es la rayz
 dela tercera, y môtara. 1608
 los quales assentaras deba
 xo, y multiplicandolos por
 el mism ocho, q̄ es la rayz
 y las multiplicaciones restã
 do las de lo alto, quedara as
 si la figura.

110	
242	
00811	
23289	
0906445	
12502212	
311675752	
6	7
3686978	

Aora para buscar el terce
 ro multiplicador, quadraras
 el ocho que vino por rayz
 en esta tercera orden, y mō
 tara 64. estos 64. assentaras
 dabaxo de los 8. como en la
 figura parece, y multiplicar
 se han cada una de las letras
 del 7. por el 8. que es rayz
 y las multiplicaciones sacar
 se han de los 512. que ay
 arriba, y no sobrara nada,
 y quedara la figura desta
 suerte.

1024		
1	60	
1346		
1		
00		
112		
240		
00810		
11961		
232890		
09064450		
135022111		
311665752		
6	7	8
36869784		

Y assi auras acabado, y di
 ras que la rayz cubica de
 311665752. es 678. como pa
 rece entre las dos lineas, y
 assi se haran las semejantes

Nota

¶ Nota, tantos quantos puntos pusiéres quâdo diuidieres la cantidad de do se ha de sacar rayz tantas letras, o figuras tendra la raya.

Otro modo de sacar rayz cubica.

Exemplo.

¶ La rayz cubica de 19683. que sera pongase en figura, y diuide de tres en tres las letras como parece.

$$\begin{array}{r|l} 19 & 683 \\ \hline & \end{array}$$

¶ Luego sacaras la rayz cubica dela primera orden, que en este exemplo es 19. lo qual se hara buscando vn numero que cubicado haga 19. ò lo mas que pudiere, el qual numero sera 1. pues cubicando el 2. montara 8. quitados de los 19. quedan 11. assienta 2. que te vieron por rayz de la primera orden debaxo de los 9. y ponganse sobre los 19. los 11. que sobraron, y quedara la figura desta manera.

$$\begin{array}{r|l} 11 & 1 \\ 19 & 683 \\ \hline 2 & \end{array}$$

¶ Hecho esto, para saber que letra sera rayz de la orden siguiéte, sacaras a parte la rayz que ha venido hasta aora q̄ es dos, y añadirle has vna letra la que te pareciere que sera buena, y pongo que añades vn 7. y seran 27. estos 27. se multiplicaran vna vez por el triplo dela rayz q̄ hauiere, y porque aora no ha venido mas de dos por rayz, su triplo sera 6. cõ los quales multiplicaras

los 27. y montaran 162. estos 162. se multiplicaran por la letra que añadieres a la rayz, y por que en este exemplo añadiste 7. multiplica por 7. y montaran 1134. hecho esto, toma el mismo 7. que añadiste, y cubicalo, y seran 343. los quales añadiras a los 1134. q̄ guardaste, poniendo la vnidad de los 343. adelante de la vnidad de los 1134. que guardaste, desta suerte, que parece, lo qual sumado montò

$$\begin{array}{r}
 1134 \\
 343 \\
 \hline
 11683 \\
 \hline
 \end{array}$$

¶ Pues si esto que monta esta suma fuere tanto, o la mayor parte que lo que sobrò en las ordenes precedentes, junto con lo que tuuiere la orden cuya rayz estuuieres sacando, digo que la tal letra sera rayz de la orden cuya rayz buscaras, pues porque en este exemplo añadiendo 7. y multiplicando como se ha dicho, monta tanto como la suma de las ordenes de do se saca rayz, por tanto diras que la rayz de la segunda orden es 7. y restandolo vno de lo otro no queda nada. Y assi auras dado fin a esta rayz, y diras que la rayz de 19683. es veynte y siete, como se ha visto.

¶ Nota, si la suma que hizieres fuere mayor que lo que huuiere sobre las ordenes, en tal caso es menester poner otra menor, y si fuere menor, pòdras otra mayor.

*Artic. III. Deste V. Cap. Muestra lo que se haze
bazer con lo que sobrare en los numeros cubi-
cos sordos.*

¶ Nota, si auiendo sacado rayz cubica de algun numero te sobrare algo, pon lo que sobrare encima de vna raya, y añade vno a la rayz q̄ huuiere salido, y multiplicala por el triplo dela misma rayz añadiendo vno a la multiplicacion, y p̄lo todo debaxo a manera de quebrado. Exemplo.

¶ La rayz cubica de 29. es 3. y sobran 2. añade al 3. q̄ fue la rayz, vno, y seran 4. multiplica estos 4. por el triplo del 3. que fue la rayz, q̄ sera por 9, y montaran 35. a los quales añadiras vno, y será 37. pon 37. debaxo de los dos, q̄ sobraron, y así responderás, que la rayz de 29. es tres y dos 37. abos. En las demas aproximaciones haras lo que hiziste en la rayz quadrada.

*Artic. IIII. Deste V. Cap. Muestra sacar rrr. de
numeros quebrados.*

¶ Para sacar de los quebrados rayz cubica, haras lo mismo, q̄ lo que se hizo en la rayz quadrada, en que sacaras la rayz cubica por si del numerador, y despues del denominador. Exemplo.

¶ La rayz de ocho veynte y siete abos es 2. tercios, porque del 8. es dos, y de los veynte si siete es 3. Otro exemplo. La rayz cubica de 8. treinta abos, o de nueue 64. abos? Diras que ninguno de ellos la tiene, porque el que tiene rayz en su nu-

merador le falta en su denominador, y al contrario.

¶ Nota que ay quebrados, que parece no tener rayz cubica, y si los reduces a menor denominacion, o lo acrecientas la tienen. Exemplo.

¶ Diez y seys cincuenta y quatro abos no tienen rayz, y si los diminuyes a ocho veynte y siete abos, q̄ es lo mismo la tiene (q̄ es 2. tercios) Afsi mismo quatro treynta y dos abos parece no tener rayz cubica, pero si le subes a 8. sesenta y quatro abos, la tendra, que es medio.

Artic. V. deste V. Cap. Muestra sacar rrr. de enteros y quebrados.

¶ Si huieres de sacar rayz cubica de entero y quebrado, reduziras primero el entero en el especie del quebrado q̄ traxere consigo, y despues seguiras la orden que en los quebrados se ha dicho. Exemplo.

¶ La rayz cubica de tres y tres ochabos q̄ sera? Reduze primero los tres enteros a ochabos, y jūta cō ellos los tres ochabos, y sera todo veynte y siete ochabos, saca la rayz de los 27. q̄ es numerador y sera tres, y luego del denominador q̄ es ocho y vendran dos, y afsi diras que la rayz de tres y tres ochabos es tres medios q̄ por otra denominacion es vno y medio. Nota que si despues de auer reducido el entero en el especie de su quebrado no se pudiere sacar rayz cubica del
 nume

numerador, y denominador, la tal rayz fera for-
da, y dexarla has, y diras es rayz cubica de tanto

Nota, que el reduzir el entero en el especie de
su quebrado se ha de hazer de necesidad, aun-
que del entero se pudiesse sacar rrr. por si, y del
quebrado tambien.

*Articulo VI. de ste V. Capitulo. Muestra sumar
numeros cubicos.*

¶ Para sumar rrr. de algun cubo racional, par-
tiras el mayor numero por el menor, y del quo-
ciente sacares la rrr. y añadir le has r. cubica el
conjunto, y multiplicar lo has por el menor nu-
mero rrr. de los 2. cubos q̄ sumares, y la rrr. de ste
producto fera la suma de las tales rayzes. Exē-
plo, Suma rrr. de 64. con rrr. de 8. sigue la regla
partiendo 64. q̄ es la mayor por el 8 q̄ es la me-
nor, y vendran al quociente 8. saca la rrr. destos
8. que es 2. añadele vno y seran 3. Cubica este 3.
(como se mostrò en el auiso segundo artiaulo
sexto del capitulo quarto) y seran 27. multipli-
ca 27. por la menor rrr. destos dos que sumas q̄
fera en este exemplo por 8. y montara 216. rrr.
destos 216. en la suma destos dos rrr. que en es-
te exemplo se pretende sumar, y tanto monta
la rrr. de 216. que es feys, como sumando la rrr.
de 64. que es 4. con la rrr. de ocho que es dos.
Aunque en estos numeros racionales, lo mas
breue es sacar rrr. de cada numero por si, y las
rayzes sumarlas llanamente, y despues cubi-
carlas

carlas si quisieres responder por cubo. Exemplo.
 Suma rrr. de 8. con rrr. de 27. saca las rrr. de estos
 dos numeros cubos, y seran dos, y tres, sumalas,
 y seran 5. cubica estos cinco (por el segundo auiso
 del articulo sexto, del quarto capitulo, y sera
 125. pues rrr. de 125. es la suma. Exemplo de sumar
 numeros comunicantes. Suma rrr. de 54.
 con rrr. 16. sigue la regla partiendo 54. a 16. y
 vendran tres, y tres ochauos, saca la rrr. de estos
 tres, y tres ochauos, y seran vno y medio, junta
 le 1. y seran dos y medio, cubica estos 2. y medio
 (como se mostrò en el capitulo quarto, auiso 2.
 del articulo sexto) y montara 125. ochabos, mul-
 tipicalos por la rrr. 16. que es la menor de estos
 dos numeros q̄ sumas, y montara 250. y assi di-
 ras q̄ sumando rrr. de 16. con rrr. de 54. monta
 rrr. de 250. Exemplo de sumar rrr. de numeros
 irracionales. Si las rrr. que huieres de sumar
 fueren de numeros irracionales no haras otra
 cosa, sino sumar con la diçtion del mas. Exem-
 plo. Suma rrr. de 7. con rrr. de cinco, suma con
 el P. y montaran rrr. de 7, mas rrr. de 5. Nota, si
 huieres de sumar rrr. con algun numero sim-
 ple, redaze primeramēte lo vno en el especie de
 lo otro, y sigue despues la regla. Exemplo. Suma
 3. con rrr. de 8. cubica primero el tres, y sera 27.
 Ahora di, que quieres sumar rrr. de 27. con rrr. de
 8. Sigue la regla que mas te agradare, y montara
 rrr. de 125. Si huieres de sumar algun par de
 nume-

numeros cubos iguales en cantidad y genero, multiplicando el vno por 8. lo que viniere sera la suma de ambos. Los demas auisos que se dieron en el sumar de r. en el art. VII. del IIII. cap. aplicaras en esta rrr.

Artic. VII. Deste V. Cap. Muestra restar rrr.

¶ El restar se haze como el sumar, solaméte di-
fiere que el vno q̄ se añade en el sumar con la rrr
del quociente del numero mayor por el menor,
en el restar se ha de quitar. Y assi como en el su-
mar se suma la rrr. de numero cubos irraciona-
les con el mas, aqui restaras con el menos. Exē-
pio: Resta rrr. de 8. con rrr. de 216. Parte 216. a
8. y vendra al quociéte 27. saca la rrr. destos 27.
que es tres, de los quales quitaras vno, y queda-
ran 2. cubica estos 2. como se mostrò en el segū-
do auiso del artic. VI. capitulo quarto, y seran
8. multiplica estos 8. por la rrr. 8. que es lo q̄ re-
stas de rrr. 216. y montara rrr. 64. y assi respon-
deras, que restando rrr. de 8. de rrr. de 216. que-
da rrr. de 64. Lo mas facil en estas rrr. raciona-
les es sacar la rrr. de los cubos, assi del que quie-
res restar como del otro de quien se huuiere de
restar, y despues restar llanamente vna rrr. de
otra, y lo que quedare cubicarlo, como se hizo
en el sumar. Si alguno de los numeros q̄ huie-
res de restar fuere sordo, o al contrario, restaras
con la diction del menos. Exemplo. Resta rrr. 7
de rrr. 27. responde diziendo, que queda rrr. 27.

m.rrr.7. Si huieres de restar rrr. de numeros cubos, con otra cosa que no fuesse de su genero, reduce primero el vno en la especie, o genero del otro, y despues seguiras la orden de la regla que mas a los tales numeros quadrare.

Artic.VIII. Deste V. Cap. Muestra multiplicar numeros cubicos.

¶ El multiplicar se haze llanamente, multiplicãdo vn cubo por otro, sin consideracion si son sortos, o racionales, y si del producto se pudiere sacar rrr. sacar la has, y sino diras ser rrr. del tal producto. Exemplo. Multiplicando rrr. 8. por rrr. 27 que monta? Multiplica los 8. por 27. y montará. 216. la rrr. de 216. que es 6. diras que môta multiplicando rrr. 8. por rrr. de 27. Otro exemplo. Multiplicando rrr. de 5. por rrr. de 7. que môta? multiplica 7. por 5. y seran 35. pues responde q̄ môta rrr. de 35. Si huieres de multiplicar alguna rrr. por algũ numero simple: quiero dezir por algun numero que no fuere cubo, cubicaras el q̄ no lo fuere, y seguiras la regla. Exemplo. Multiplicando rrr. 8. por 3. que monta? Cubica primero los tres (como se mostrò en el segundo auiso del artic. VI. cap. IIII.) y montara 27. Ahora di, que quieres multiplicar rrr. de 8. por rrr. 27. sigue la regla, y montara rrr. de 216.

Artic.IX. Deste V. Cap. Muestra partir numeros cubos.

El partir se haze partiendo el vn numero por el otro, como sean de vn genero, y no importa que sean racionales, o irracionales, o comunicantes, y si del quociente de la diuision del vno por el otro pudieres sacar rrr. sacar la has, y sino diras ser el quociente rrr. de tal quociente. Exemplo. Parte rrr. de 64. por rrr. de 8. sigue lo que la regla manda, que es partir 64. por 8. y veddra al quociente 8. y assi responderas que partiendo rrr. de 64. por rrr. de ocho cabe a rrr. de otros 8. Otro exemplo. Parte rrr. de 8. por rrr. de 27. parte 8. a 27. y cabran rrr. de 8. veynte y siete abos. En las demas particularidades tendras el auiso que se ha dado en las precedentes, acerca de lo que dize, que el partidor, y particiõ sean de vna especie.

Cap. VI. Trata la orden de sumar, restar, multiplicar, partir de numeros quadrados, y cubicos.

Artic. I. Muestra sumar.

SI te vinieren algunas rayzes de diuersos generos, y las quisieres sumar, restar, o hazer de ellas alguna otra cosa, tendras auiso de reduzir las a vn genero, y despues seguiras la regla que fuere, como por los exemplos siguientes mejor entenderas. Pongo por caso, que quieres sumar r. de 16. con rrr. de ocho reduzlas a vna especie, lo qual

lo qual se haze cubicádo la r. y quadrando la rrr
 Pues cubica r. 16. (como se mostrò en el segúdo
 auiso del artic. VI. cap. III.) y sera r. y rrr. de
 4096. Y quadra por el mismo auiso la rrr. 8. y se-
 ran rrr. y r. de 64. hecho esto para sumar partiras
 4096. por los 64. y vendran al quociente 64. de
 estos 64. faca la r. y rrr. quiero dezir, que la ques
 la r. y de la r, la rrr. o al contrario sacar primero
 de la rrr. la r. que de vno y otro modo seran dos,
 a estos dos añade vno, y será tres, estos tres qua-
 draras, y despues el quadrado cubica le has, y si
 no cubica le primero, y despues quadra el cubo
 (como se mostrò en el auiso segundo del VI. ar-
 ticulo, cap. III) y montara 729. los quales 729
 multiplicaras por la menor raya destas dos que
 sumas, q̄ sera por 64. y mōtara 46656. de lo qual
 facaras el censiculo, quiero dezir sacando la r. y
 de la r. la rrr. o al contrario sacar primero la rrr.
 y de la rrr. la r. (como se mostrò en el capitulo
 quarto y quinto, articulo segundo) y vendra 6. y
 assi diras que sumando r. de 16. (que es quarto)
 con rrr. de 8. (que es dos) monta seys.

*Artic. II. Deste VI. Cap. Muestra restar quadra-
 do, de cubos, o al contrario.*

¶ El restar se haze como el sumar, y no difiere
 en otra cosa, sino que el vno que se añade en el
 sumar, se ha de quitar en el restar.

Articulo

Art. III. deste VI. Cap. Muestra multiplicar numeros cubicos por numeros quadrados.

¶ En el multiplicar no se haze otra cosa, despues de auer reduzido las rayzes a vna especie sino multiplicar vna por otra, y la rrr. de la r. del producto, o la r. de la rrr. del mismo producto es lo que monea. Exemplo. Pon que quieres multiplicar r. 4. por rrr. 8. cubica la r. 4. (como se mostrò en el auiso segundo articulo 6. capitulo 4.) y môtara 64. y afsi quedara vn quadrado cubicado, o vn cubo quadrado. Afsi mismo quadrara la rrr. 8. por el auiso susodicho, y sera 64. y afsi q̄ dara vn cubo quadrado, o al contrario. Ya q̄ la vna y la otra estan reduzidas a vna especie, multipliquese lo vno por lo otro, como son 64. por 64. y montara 4096. desto el cubo, y del cubo el quadrado, o al contrario que es 4. es lo que monta multiplicando r. 4. por rrr. 8.

Art. IIII. deste VI. Cap. Muestra partir numeros quadrados por cubicos, y al contrario.

¶ Para el partir se han de reduzir las rayzes como se ha hecho en las reglas precedentes: y despues partir lo vno por lo otro llanamente, y la r. del cubo, o el cubo del quadrado del quociente sera el mismo quociete. Exemplo. Parte r. 16. a rrr. 8. cubica la r. 16. diziendo 6. vezes 16. son 256. Otra vez 256. vezes 16. montan 4096. Quadrara la rrr. de 8. diziendo 8. vez 8, son 64. parte

aora 4096. a 64, y vendran otros 64. Pues la $\sqrt[3]{4096}$ del cubo de 64, o el cubo de la r, de 64, que de vna y otra suerte monta 2. es el quociente. Mira lo que has hecho en este capitulo, porque a imitacion te aproueches en otras rayzes.

Cap. VII. Muestra las reglas generales de numeros quadrados de quadrados, dichos por otro nombre numeros mediales.

Artic. I. De la definicion, y diuision de los numeros mediales.

¶ Por numero medial entendemos vn numero cuya potencia es. de numero no quadrado. Asi como si dezimos rr. 7. quiere dezir r. de rayz quadrada de 7. su potēcia es r. de 7, el qual 7. no tiene r, racional: y porq̄ se entienda mejor, pongo que es vn quadrado q̄ tiene de arca, o superficie r, de 7. el lado, o rayz del tal quadrado sera rr 7. Llamase superficie, o numero medial, porque es medio proporcional entre 2. superficies quadradas proporcionales. Sean por exēplo 8. y 12. el medio proporcional destos dos numeros, sera r. 96. como se muestra en el c. 16. del lib. V, las quales son 3. superficies en continua proporción, porque la proporción que ay de 8. a r, 96, ay de r, 96, a 12. Estos numeros mediales son en 4. modos. Los primeros se dizen incommensurables en potēcia. Y son aquellos q̄ sus quadrados no son comu-

comunicantes, ni entre ellos ay proporción como de numero quadrado a numero quadrado. Porque partiendo el vn quadrado por el otro, el quociente no tendrá r, racional como rr. 10, y rr. 12, sus quadrados, o potências, son r, 10. y r. doze. Estos quadrados no se han el vno al otro, como numero quadrado a numero quadrado. La segunda diferencia de numeros mediales, son aquellos que tan solamente son comunicantes en potencia, de tal manera q̄ de la multiplicacion del vno por el otro, procede numero racional, y partiendo la potència, o quadrado del vno por el del otro, el quociente tendrá rayz racional. Exemplo. En estos dos numeros rr. 8. y rr. 2. multiplicando el vno por el otro, monta rr. 16. que es racional, porq̄ sus rr. es 2. Assi mismo la potència, o quadrado de rr. 8. y rr. 2. q̄ es r. 8. y r. 2. partiendo lo vno por lo otro, viene r. 4. que es 2. Estos tales puedes dezir que se han en proporción, como numero quadrado a numero quadrado. La tercera diferencia, son aquellos que tan solamente en potencia son comunicantes: y multiplicando el vno por el otro, procede numero quadrado, que su r. es numero irracional: y partiendo sus quadrados, o potências la vna por la otra procede numero racional. Assi como rr. 18. y rrr. 8. multiplicadas, hazen 144. que su r, es 12. el qual r. no es numero racional, porque no tiene r. dable. Assi mismo partiendo los quadrados, o po-

tencias, que son r. 18. y r. 8. viene al quociente 2. y un quarto que es numero racional: porque su r. es r. y medio, estas dos potencias, o cuadrados se han como numero quadrado a numero quadrado. La quarta y vltima diferencia de numeros mediales, son aquellos que son comunicantes en longitud, y potencia: porque ellos y sus cuadrados se han en proporcion, como numero quadrado a numero quadrado: y partiendo el vno por el otro, el quociente tendra r. dable, y multiplicando el vno por el otro, vendra r. y z de numero quadrado. Exemplo. En estos numeros r. 2. y r. 32. el vno con el otro estan en dupla proporcion, y sus potencias, que la vna es r. 2. y la otra r. 32. estan en quadupla, y partiendo r. 32 por r. 2. viene r. 16. los quales 16. tienē r. racional, que es 2. y multiplicando el vno por el otro monta r. 64. que tambien tiene r. discreta como hemos dicho. Para entender biē esto que dize, q̄ la r. 2. esta con r. 32. en dupla proporcion, lee el tercero auiso del articulo sexto., capitulo quarto. Y para entender todo este capitulo, lee el cap. I. del V. lib. que trata de proporcion.

Artic. II. Deste VII. Cap. Muestra sumar, y restar numeros quadrados de quadrados, con otros quadrados de quadrados del genero de la primera diferencia.

¶ Auiendo de sumar dos numeros que no sean comunicantes en potencia, haras lo que mejor

CAPITULO VII.

485

mejor te pareciere de dos reglas que pondre.
 Pongo que quiero sumar rr. de 10. con rr. de 12.
 bien puedes responder, diziendo, que monta rr.
 de 10. P. rr. de 12. y assi se sumaran las demas
 diferencias. Mas siguiendo la quarta propo-
 sicion del segundo de Euclides la orden de sumar
 los numeros mediales de la primera diferencia
 sera desta manera. Sumaras las potencias de rr.
 10. y RR. 12. vna con otra, que son R. 10. & r. 12.
 y seran R. 12. P. r. 10. Luego multiplicaras rr. 10
 por rr. 12. y sera rr. 120. Dobra esta rr. 120. multi-
 plicando por 16. como se mostro en el auiso ter-
 cero, articulo sexto del capitulo quarto) y mon-
 tara rr. 1920. ello juntaras con R. 12. P. R. 10. y
 sera todo R. 12. P. R. 10. P. rr. 1920. Y assi diras q
 fumando rr. 10. cō rr. 12. mōta ru. de r. 12. p. r. de
 10. mastr. de 1920. Si hubieres de restar rr. 10. de
 rr. 12. lo mismo hizieras, salvo que las rr. 1920.
 añadite en el sumar por el duplo del producto
 del vn numero por el otro, se ha de quitar en el
 restar con la diction del menos, y assi diras
 que restando rr. de 10. de rr. de 12. queda ru.
 de r. de 12. p. r. de 10. m. rr. de 1920. Exemplo de
 sumar y restar numeros mediales de la segun-
 da diferencia, los quales son comunicantes en
 potencia, como si dixessen suma rr. de 8. con rr.
 de 2. toma sus dos potencias (como se dixo en
 el articulo primero deste capitulo septimo) que
 son r. 8. y r. 2. y suma la vna con la otra, y mon-
 tara

tara r, de 18. (sumando como se mostro en el septimo articulo del capitulu quarto q̄ muestra fumar numeros quadrados) la qual r, 18, guardaras, despues multiplica rr, 8. rr, 2. la vna por la otra, y védra rr, 16. q̄ son 2. porque de 16. la primera r, es 4, y de 4. la segunda es 2. dobla estos 2. y seran 4. los quales juntaras con la r. 18. q̄ guardaste, y quedara vn bino mio de r. 18. p. 4. Y assi diras que sumando rr, 8. con rr. 2. monta tãto como larayz quadrada de 18. mas quatro. Si huuias de restar la rr. 2. de rr, 8. lo mismo hizieras, si no q̄ los 4. añades a la r, 18, (que es el duplo de la r, del producto de la vna por la otra) le auia de restar de la r, 18, y assi responderas, que está do rr. 2. de rr, 8, queda r, de 18. menos 4. Exemplo de sumar y restar rr, con rr, de la tercera diferencia de numeros mediales, como si dixessen, suma rr, 18, con rr, 8, toma sus dos potencias que son r, 18. y r. 8, suma la vna con la otra (como se mostro en el septimo articulo, capitulu quarto (de sumar) y montara r, 50, guardala. Despues multiplica rr. 18. por rr, 8, y montara rr, 144. que estáto como r, de r, dobla esta r, 12. (como se mostro en el auiso tercero del articulo sexto, del quarto capitulu) y môtara r. 48. junta esta r 40. con la r, 50, que guardaste, y môtara r. 50. p. r. 48. Y assi diras, q̄ sumando rr, 18, con rr, 8, môtar rv, de r, 50, p. r, de 48, Si fuere restar, restaras con el menos, como has hecho en las precedentes.

Quiero dezir, que assi como juntaſſer, 48. cō la r, 50. con la diction del p, en el reſtar las diſjūta ras con la diction del menos diziendo, quien de r, 50. quitaſſe r, 48. quedan rv. de r, 50. m. r, de 48. Exemplo de ſumar rr, con rr, de la quarta dife rencia, como ſi dixeſſen. Suma rr, 32, con rr, 2. to ma ſus potencias, que ſon r, 32. y r, 2. y ſuma la vna con la otra (como ſe moſtrō en el articulo ſeptimo del quarto capitulo de ſuma r, r.) y mō tara r, 50. guarda la, deſpues multiplicaras rr, 32 con rr, 2. y mōtara rr, 64. q̄ ſu rr, es r, de 8. dobla eſta r, 8. multiplicando por 4. como ſe moſtro en el auifo tercero del articulo ſexto capitulo 4. y montara r, 32. eſta r, 32. ſumaras con la r. 50. que guardaſte, como quien ſuma r, con r. (ſegun ſe moſtro en el articulo ſeptimo del quarto capitulo) y mōtara r, 16. la r, deſta r, 162. que es rr, 162 es lo que monta ſumando r, 32. con rr, 2. Si quie ſieres reſtar rr, 2. de rr, 32, quitaras r, 32, de la r, 50. como quien reſta r, de r. (ſegun ſe moſtro en el octauo articulo del quarto capitulo) y queda ra r, 2. pues r, de r, de 2. que es rr, fera. lo que que da, quitando rr, 2, de rr, 32.

Artic. III. deſte V. II. capitulo. Mueſtra ſumar, y reſtar numeros mediales de otra ſuerte.

¶ Porque para los principiantes es coſa dificul toſa lo que ſe ha tratado en los articulos prece dentes deſte capitulo, quiero poner aqui otra or

dende sumar, y restar destos numeros quadrados dos vezes. Para lo qual se ha de notar, q̄ por numero dos vezes quadrado entendemos (dexada a parte la difinicion al principio deste capitulo declarada) vn numero, del qual se puede sacar dos vezes r. assi como 81. porque la primera r. es 9. y de 9. la segunda es 3. este 3. se dize rr. de 81. y el 81. se dize numero quadrado dos vezes. Entendido esto, pon por exemplo que quieres sumar la rr. de 81. con rr. de 16. parte 81. a 16 y porpue partiendo 81. por 16. no sale particion integral, quiero dezir: que sobra algo, haz como en quebrados, y di que cabe a 81. diez y seys abos, saca la rr. como de quebrado, y vendra vno y medio, añade vno siempre por regla general, y montara dos y medio, quadra estos dos y medio dos vezes, diziendo 2. y medio vezes 2. y medio, monta 6. y vn quarto, otra vez seys y vn quarto vezes 6. y vn quarto. monta 625. diez y seys abos. Multiplica esto por la menor q. de estas dos que sumas, que sera por vn r, 16. y montara 625. enteros, pues rr. de 625. que es 5. sera lo que móta sumando rr. de 81. que es 3. con rrr. de 16. que es 2. Nota que para sumar estos numeros, si fueren racionales, lo mas facil es sacar la rr. de cada parte, y sumar la vna con la otra, llanamente, y despues quadrar la suma dos vezes si quisieres. Exemplo. Suma rr. 16. con r. 81. saca la rr. 16. que es dos, y la rr. 81. que es tres, sumá

agora 2. cõ 3. y seran 5. Di, que mōta 5. ò quadra los 5. dos vezes, diciendo 5. vezes 5. son 25. otra vez 25. vezes 25. son 625, y assi diras que montar. de 625. Y si los numeros fuerẽ sordos, de qual quier fuerte que fueren, suma con la diction del p. Exemplo. Sumá rr. 7. con rr. 5. di, que monta rr. 7. p. rr. de 5. En lo que toca al restar haras lo mismo que en el sumar, porque no difiere en otra cosa, sino que el 1. que en el sumar se añade a la rr. del quociete (que sale quando se parte la mayor q. por la menor) en el restar se ha de quitar. Assi mesmo si hauieres de restar vna cosa diferente de otra, reduce primero la vna a la especie de la otra: y despues seguiras las reglas dadas. Si quisieres restar vna rr. sorda de otra, resta con la diction del menos, assi como en el sumar suma este con el mas. En las de mas particularidades, nota lo que se dixo en el sumar.

Arõiculo IIII. deste VII. Capitulo. Muestra multiplicar rr. por rr.

¶ El multiplicar se haze como en la r, y rrr. multiplicado. Manamete la vna por la otra, y la rr. del producto serà el mismo producto. Exemplo. Multiplica rr. 16. por rr. 81. multiplica 81. por 16. y mōtara 1296. pues rr. de 1296. q̄ es 6. es el producto. Otro exemplo rr. 2. multiplicala por rr. 18. Multiplica 18. por dos y vendran rr. 36. que es r de 6. Otro exemplo. Multiplicando rr. 5. por rr. 7. monta rr. 35.

¶ Si huieres de multiplicar algun numero simple por rr . reduce primero el vno en el especie del otro, y despues seguiras las reglas. Exemplo. Multiplica 3, por rr , y reduce el 3. a rr , lo qual haras quadrandolo dos veces, diziendo 3. veces 3, son 9. otra vez 9. vezes 9, son 81. Ahora di que quieres multiplicar rr 8. por rr 5. haz lo que se ha hecho en otros exemplos, y montara rr , de 405.

¶ Si huieres de multiplicar vna rr . y gualen cantidad y genero, la vna dellas hecha r , sera el producto de ambas.

Artic. V. deste VII. Muestra partir de rr .

¶ En el partir haras lo mismo que heziste en la r , y rrr . Quiero dezir q̄ partiras la mayor q̄ por la menor, como la demãda te pidiere, y la rr , deste quociente sera lo que cabe. Exemplo. Parte rr , 256, a rr , 16. parte los 256. a 16, y vendran otros 16. pues di q̄ cabe a rr , 16. Parte rr , 7. a rr , 12. parte 7 a 12. y cabrà 7. dozabos. Si el partidor o partició no fuere de vna especie, reduce primero el vno en la especie del otro, y despues sigue la regla. En lo demas guarda los auisos de la r , y rrr , articulo quinto, capitulo quarto, y articulo quinto del capitulo quinto.

¶ Nota las prueuas de las quatro reglas de r , y rrr , y rr , se hazen cada vno por su cõtraria. Quiero dezir, el sumar se prueua por el restar, y el restar por el sumar, el multiplicar por el partir, y el partir por el multiplicar.

Cap.VIII.Trata de las quatro reglas genera
les de caracteres.

Art.I.Muestra sumar caracteres.

¶ Como los caracteres no sean otra cosa sino vnas cantidades proporcionales inciertas, o por mejor dezir variables, pues se varian, segun el valor de la cosa (como por el capitulo segundo mejor se puede entender) no podriamos sumar vnos con otros llanamente, como se haze en cosas de vn especie sin reduzir, sino es con la dición delmas: porq̄ assi como si quisiessemos sumar 2.reales con 4.ducados, no diras, q̄ môtã 6.reales, ni seys ducados, puedese responder muy bien, sin reduzir vno ni otro: diziendo, que monta 2.reales mas 4.ducados, ò 4.ducados, mos 2.reales, y esto es por causa que el valor de los reales es diferente del ducado. Pues semejantemente te has de auer en estos caracteres, q̄ si quisieres sumar vnos diferentes con otros, como 2.co, con 2.c.diras, que monta 2, co.p.2, ce. ò 2. ce p.2.co. Mas si los caracteres que huieres de sumar fueren de vna especie, en tal caso llanamente sumaras lo vno con lo otro, como si dizê fuma 5.co.cõ 3.co, porque la vna y otra q. son co sumaras 5.con 3.y montaran 8.los quales diras ser cosas.

¶ Entendido esto, si quisieres sumar dos, o mas partidas de caracteres cõpuestas de p, y m, siẽpre

pre fumaras cosas semejantes con otras, así como cu. con cu. ce. con ce. R. con R. y el caracter, o caracteres que no tuieren otro semejante con quien poderse fumar, asentarse han como estuieren, poniendoles la señal del p. ò m. que traxeren, como por la practica de los exemplos siguientes mejor entenderas.

¶ Nota quando fumaras p. con p. fumaras y podrás P. y fumar M. con M. fumaras, y podrás M.
 ¶ Sumando P. con M. ò M. con P. restaras la menor q. de la mayor, y pondras el caracter de P. ò M. que viniere con la mayor q. Y si fi.eren iguales las cantidades, pondras vn zero, y el caracter de P. ò menos, que viniere arriba, porque es necesario para hazer la prueua q̄ dizē Real. Y porque esto sea bien entendido, pon por exemplo, que piden que sumes 9. R. P. 5. ccc. M. 9. cu. M. 3. ce. P. 8. co. M. 6. N. y por otra parte 7. R. P. 4. ccc. M. 7. cu. p. 5. cem. 9. co. P. 6. N. Pon estas dos partidas en figura asentando N. enfrente de N. y ce. enfrente de ce. y así de los mas caracteres: y comienza a fumar de la parte q̄ quiferes, no se me da mas de la mano diestra; que de la siniestra, pues comienza de las figuras que estan a la siniestra, que son 9. R. y 7. R. y fumar se han, juntado nueue con siete, y seran 16. los quales pondras debaxo de la raya enfrente de las figuras mismas, poniendo delante el caracter que tienen, que es R. y así passaras a fumar los
 censos

censos de censos, diciendo 5. y 4. hazen 9. pon 9.
 y porque sumas p, con p. pondras p. antes de los
 9. y adelante cce. porque lo que sumas son cen-
 sos de censos. Profigue passando a sumar los cv.
 como son por vna parte M. 9. cv. y por otra M.
 7. cu. Pues sumando M. con M. suma, y pon M. y
 seran M. 16. cu. Y asì passaras a sumar los cen-
 sos, y hallaras que ay en la partida de arriba m.
 3. ce. y en la de abaxo P. 5. ce. y porque dize la
 regla, que sumando P. con M. o M. con P. (que es
 lo mismo) se ha de restar la menor q. de la ma-
 yor, y poner el p. o M. q̄ estuviere con la misma
 mayor, resta los 3. de los 5. y quedaran 2. ce. y p̄
 P. porque es la figura que trae la mayor q. y asì
 diras que sumando M. 3. ce. con P. 5. ce. monta P.
 2. ce. porque de los 5. se sacan los 3. que estauan
 M. arriba. Profigue sumando P. 8. co. con M. 9.
 co. como heziste en los ce. restando los 8. de los
 9. y quedara vna cosa, a la qual le pondras m. por
 que està con la parte mayor, y asì diras que su-
 mando m. 9. co. con p. 8. co. monta m. 1. co. Passa
 los numeros, y restalos m. 6. de los p. 6. como mã
 da la regla, y porq̄ no queda nada, o porq̄ las qs,
 son iguales, no pongas nada, y asì auras dado fin
 a tu suma, y quedara como parece figurado.

9. R. P. 5. cce. M. 9. cv. M. 3. ce. P. 8. co. M. 6. N,
 7. R. P. 4. cce. M. 7. cv. P. 5. ce. M. 9. co. P. 6. N.

16. R. P. 9. cce. M. 16. cv. P. 2. ce. M. 1. co.

¶ Nota las primeras figuras de la mano sinie-
stra, aunque no tengan señal de p. como no ten-
gan la del menos, siempre entenderas ser p.

¶ Nota aſi como ſumaste 2. partidas, ſumaras
tres, o quantas mas quifieres, teniendo auiso de
juntar las partidas de los mases a vna parte, y
de los menos a otra.

*Artic. II. deſte VIII. Cap. Mueſtra reſtar
caracteres.*

¶ Reſtádo p, de p, ſi la q, de arriba fuere mayor
que la de abaxo, reſtaras, y pondras p. Reſtendo
m. de m. ſi la q, de arriba fuere mayor, que la de
abaxo, reſtaras, y pondras m. Reſtando p, de p. ſi
la q, de abaxo fuere mayor q̄ la de arriba, reſta-
ras la menor dela mayor, y pondras m. Reſtádo
m, de m, ſi la q. de abaxo fuere mayor que la de
arriba, reſtaras la vna dela otra, y a lo que queda
re pondras p. Y de qualquiera manera que ſea, ſi
las qs, fueren iguales no pondras nada. Reſtan-
do P. de m, ò al contrario m, de P. ſumaras, y a la
tal ſuma pondras la ſeñal de arriba, ya ſea p. ya
ſea m. como quiera que fuere, la que eſtuyere
alta pondras.

¶ Entendidoſeſtos preceptos, pon por exemplo
q̄ quieres reſtar 5. cccc. p. 3. RR. m. 4. cccv. p. 7.
R. m, 10. ccc, m. 1. cv. P. 3. cc. De 7. cccc. P, 5. RR.
m. 6, cccv, P. 3, R, m: 9. ccc. p. 7. cv. m. 6, ce. Pon las
partidas la vna debaxo de la otra, poniendo la q,
q̄ quiere reſtar debaxo de la otra de do ſe huic-
re de

re de restar, y siguiendo la orden de las reglas
destos preceptos de restar, hallaras que restan 2.
ccc. m. 2. ccu. m. 4. R. P. 1. ccc. p. 8. cv. m. 9. ce.
como parece figurado.

7. cccc. P. 3. RR. m. 6. ccu. p. 3. Rm. 9. ccc. P. 7. cv. m. 6. ce
5. cccc. P. 3. RRm. 4. ccv. P. 7. Rm. 10. ccem. 1. cv. P. 9. ce

2. cccc. m. 2. ccv. m. 4. R. p. 1. ccc. p. 8. cv. m. 9. ce,

¶ Nota, si viniere algun caracter, y no hallares
otro semejante de do restarle, si este tal caracter
viniere con la mayor q. ponerle hac abaxo por
resta con la señal del p. ò m, qualquiera dellos q̄
traxere, y si este tal caracter viniere con la me-
nor q, ponerle has por resta cõ contraria señal de
la q̄ traxere. Quiero dezir, que si estuviere cõ p.
le pondras m. y si con m, le pondras p.

¶ Nota quando huieres de restar vn caracter
diferente de otro, resta por la diction del m. Exé
plo. Saca de 2. co. 1. ce. di que queda 3. co. m. 1,
ce. y afsi haras de otro qualquiera que a la ma-
no te viniere.

*Artic. III. deste VIII. Cap. Muestra multipli-
car caracteres.*

¶ En esta regla se ha de tener cuenta con 3. co-
sas. La primera con las dos dictiones del p. y m,
La següda, saber q̄ caracteres resulta multiplicã
do co. por ce, o otros qualesquier caracteres. Lo
tercero, tener auiso de multiplicar las qs. que vi-
nieren con los caracteres vnas por otras.

¶ Quanto

¶ Quanto a lo primero tendras por regla general, que multiplicando p. por p. ò. m. por m. monta p. Y multiplicando p por m. ò. m. por p. monta m. Para lo segundo se tendra cuenta con la tabla siguiente.

o.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
n.	co.	ce.	cv.	ccc.	R.cccv.	RR.	cccc.	ccv.	

¶ Desta figura has de notar, que quando multiplicares en qualquiera destos caracteres por otro, sumaras los numeros que los tales caracteres tuieren sobre si, y lo que montare mira sobre que caracter està otro tãto, porque aquel tal caracter sera el producto de los dos multiplicados. Exemplo. Pò, que quieres multiplicar la co. por si misma, mira quãto tiene la co. sobre si, y si hallas 1. este 1. juntale con otro que tendra la mesma co. pues ha de ser multiplicanda por si misma, y serã 2. mira sobre que caracter de los 10. està 2. y hallaras, que sobre el ce. pues assi diras que multiplicando la co. por si misma, monta ce. Otro exemplo multiplicando ce. por cv. que caracter haran? Suma los dos que tiene el ce. sobre si, con los tres del cv. y seran 5. Mira q̄ caracter ay que tenga 5. encima de si, y hallaras que el R. pues assi diras, que multiplicando ce. por cv. haze R. Otro exemplo. Multiplicando n. por ccc. que hara. Junta lo que tiene el n. sobre si que es o. con lo que tiene el ccc. que son 4. y montaran 4. Mira que caracter tiene 4. diras q̄ el ccc.

el cce. luego multiplicando n. por cce. mōta cce de arte que de aqui se entendera, que qualquiera character q̄ fuere multiplicado por el n. montara el mismo character, porq̄ el numero sirue a qui, como la vnidad en los numeros, y assi como qualquiera numero que fuere multiplicado por 1. no le acreciēta, assi qualquiera character que se multiplicare por el n. quedara el mismo character. Y por que esto es cosa muy importante, para que mejor sea entendido, se ha de tener en la memoria lo que dixe en el segundo capitulo, en el qual se trato como estos characteres denotan cantidades proporcionales, segun el valor le quisieres dar a la co. Pues pon por exemplo, que la co, valiesse 2. a este respeto el ce. valdra 4. porque se engēdra dela multiplicacion de la co, por si misma, y el cv valdra 8. y el cce. 16. y el R. 32. y el cccv. 64. y el RR. 128. y el ecce. 256 y el ccv. 513. (como en el capitulo segūdo se puede ver) Ahora podras prouar si es verdad, q̄ multiplicando ce. por cv. haze R. desta suerte. El valor del ce, es 4. y el del cv. 8. Pues multiplicando 4. por 8. hazen 32. que es la suma del R. Otro exemplo. Multiplicando cv, por cccv, siguiendo la orden dela tablilla, hallaras que montan ccv. Prueualo por los valores. Multiplica 8. que tiene el cubo sobre si por 64. q̄ tiene el cccv, y montara 512. que es tanto como lo que tiene el ccv. y assi te satisfaras de los demas. Entendidas estas dos

cosas, lo tercero se entédera en la practica de los exéplos siguientes. Pon por caso, q̄ quieres multiplicar 7. ce. por 4. co. Multiplica los 7. por los 4. y seran 28. Multiplica agora los caracteres, diziédo ce. multiplicado por co. monta cv. como por la tablilla deste art. III. se puede ver, y afsi diras, que multiplicando 7. ce. por 4. co. monta 28. cu. Otro exemplo. Multiplica 4. cu. m. 2. co. por 3. co. m. 5. n. Pon la multiplicacion, y multiplicador en figura, como parece.

4 cv. m. 2 co.

3 co. m. 5 n.

¶ Y multiplica con cada caracter de los de abaxo todos los de arriba, diziédo m. 5. n. multiplicados por m. 2. co, monta p. 10. co. La razón desto es, porque multiplicando n. por co. monta co, y multiplicando 5. por 2, monta 10. y multiplicando m. por m, monta P (como se dixo en la primera cosa de las tres que se auian de tener cuéta en esta regla) Y afsi passaras adelante multiplicando los 4. cv. por los m. 5. n. y montara m. 20. cu. porque multiplicando 4. por 5, montan 20. y multiplicando n, por cv. monta cv. y multiplicando m. con p. es m. Ya que con los m, 5, n, se ha multiplicado todo lo de arriba, toma las 3. co, y multiplica de nuevo todo lo de arriba, diziédo 3, co. multiplicadas por m, 2, co, que estan arriba, montan m, 6, ce, porque co, multiplicada por co. mónta

ta ce. y 3. multiplicados por 2. môtan 6. y p. multiplicado por m. monta m. Y si aquí durare alguno a do esta el p. pues estan las 3. co. solas. A esto se responde, que las figuras que no estuviereñ señaladas cõ la diction del m. siempre se entendiende p. aunque no se ponga. Prosigue multiplicando con las 3. co. los 4. cu. de arriba, y montara 12. ccc. porque cu. multiplicado por co. haze cce, y 4. multiplicado por 3. monta 12. Y assi aurás dado fin a tu multiplicacion, y no faltará sino sumar lo que estuviere entre las rayas, guardando lo que dize la regla de sumar caracteres, articulo primero, deste octauo capitulo, y montara 12. ccc. m. 25. cu. p. 10. co. como parece figurado.

4.	cv.	m.	2.	co.
3.	co.	m.	5.	n.

m.	20.	cv.	p.	10.	co.
12.	ccc.	m.	6.	ce.	

m. 20. cv. p. 12. ccc. m. 6. ce. p. 10. co.

Y Nota assi como hazes vn renglon cõ cada vna cantidad de las del multiplicador, podrias lo q se pusiere en dos, o en mas renglones, poner lo en vno. Y assi mismo como començaste a multiplicar de la mano diestra, procediêdo hazia la izquierda, puedes començar al contrario, que de vna y otra manera te vendra lo mismo. Y assi

no ay en esto que de tenernos, sino que cada vno haga lo que mas le agradare.

¶ Nota alguno puede dudar, y preguntar diziendo. Aueys dicho que para multiplicar vn caracter por otro, juntaremos lo que los tales caracteres tuieren encima, y el producto sera el caracter que tuiere sobre si otro tanto. pues si yo quiero multiplicar vn ccc. por vn ccu. sumando 4. que tiene el ccc. con 9. que tiene el ccu. hazen 13. y en toda la tabla no ay caracter que monte tanto, luego que caracter diremos que monta?

A lo qual respódo, que no te fatigues por saber que caracter sera, porque (como he dicho) estos caracteres se ponē por vna cantidad, o d gñidad proporcional. Y desta fuerte multiplicar ccc. por ccu. no es otra cosa, sino multiplicar vna 4. cantidad proporcional, por vna otra nouena de la misma proporcion, que sumando llanamente vna con otra monta 13. que no es otra cosa si no dezirnos que viene vna trezena cantidad en la misma proporcion. Y porque mas cumplidamente pueda vno dar razon desto tendras auiso, que si sumando lo que tuieren los dos caracteres q quisieres multiplicar, la suma fuere numero impar incompuello, assi como 5. 7. 11. sacado el 3. (porq aunq es impar siempre denota la tercera cantidad proporcional, y sera siempre numero cubo) todos seran numeros, o cantidades irracionales. Quiero dezir, q el 5. denota primero

mero relato. El 7. segundo relato. El 11. tercero relato, &c. Los quales numeros no tendran r. ni rrr. Y afsi estos treze q̄ en la multiplicacion de arriba hallaste: diras ser el 4. relato: quiero dezir q̄ sera el 4. numero irracional en vna qualquiera continua proporcion. Mas si del conjunto resultare numero par, nunca denotaran ningun relato, sino qs. que tendran r. o rrr. o rrr.

¶ Nota, si quieres saber que qs. proporcionales componen a otra alguna. Como si dezimos, vna octaua cantidad de vna continua proporcion de que qs. se compone. Partiras 8. en dos partes aliquotas, de tal arte, que multiplicando la vna por la otra, haga 8. afsi como en 2. y quatro suma agora 2. y 4. y seran 8. y afsi podras responder, q̄ la octaua se compone de la segunda, y 6. Quiero dezir que multiplicando la segunda, q̄ es ce. por la 6. que es ce. haran la octaua, que es cece.

¶ Nota, toda cantidad proporcional que tuuiere mitad, tendra r. y la tal mitad sera la misma r. Exemplo 16. tiene mitad, que es 8. pues la 8. cantidad proporcional sera la r. de la 16. cantidad proporcional. Afsi mismo si tuuiere tercio, la cantidad tendra rrr. y el mismo tercio sera la rrr. Exemplo. La 6. cantidad tiene tercio, que son 2. pues di que la segunda cantidad, que es ce. sera rrr. de la sexta cantidad proporcional, que es cece.

*Artic. IIII. de este VIII. Cap. Trata del partir
caracteres.*

¶ Para partir caracteres ay necesidad de traer a la memoria la tablilla que se puso en el articulo precedente del multiplicar, porque assi como para multiplicar diximos que se auian de sumar las sumas de los caracteres que multiplicares, por razon de saber que caracter se procreaua, en esta regla se ha de restar, como se entendera por los exemplos siguientes. Pon por caso, que quieres partir cu. par co. mira en la tabla del articulo arriba alegado, quanto tiene sobre si el cu. que es el caracter que quieres partir, y hallaras tener 3. Assi mismo mira quãto tiene la co. q̄ es el partidor, y hallaras tener 1. Pues resta este 1. del partidor de los 3. de la particion, y quedará 2. mira sobre que caracter ay 2. y hallar lo has sobre el ce. pues este ce. es el quociente, y assi diras que partiendo cu. por co. viene ce. Otro exemplo. Partiendo RR. por cecu. que viene. Resta los 6. que estan sobre el cecu. de los 7. que estan sobre el RR. y queda 1. Mira que caracter tiene 1. y hallaras que la co. pues esta cosa es el quociente, y assi diras que partiendo RR. por cecu. viene co. Otro exemplo. Partiendo cu. por n. que vendra. Mira quanto tiene el n. que es el partidor sobre si, y hallaras tener 0. que es nada, pues quitando nada de los 3. que estan sobre el cu. quedaran los mismos 2. luego quedando el

3. el character que tiene 3. que es el mismo cv. fera lo que viene al cociente. Esto has de notar, porque afsi como en el multiplicar diximos, q̄ todo character que fuere multiplicado por el n. montara el mismo character, afsi mismo todo character que fuere partido por el n. el cociente fera el mismo character.

¶ Nota, todo lo que auemos dicho en estos exēplos de l partir, puedes prouar como en el articulo tercero, que precedio prouaste la multiplicacion: porque si pones por exemplo que la co. valiesse 2. el ce. valdra 4. y el cv 8. y el cce, 16, pues partiendo los 8. que dizes que vale el cv. por los 2. que dizes que vale la co. vendra el cociente 4. que es tanto como el valor del ce. y por esto queda, que partieddo cv. por co. vendra ce.

¶ Entédido esto tendras por regla general, que partiendo p. por p. om. por m. viene al cociēte p. Y partiēdo m. por p. o p. por m. viene m. Como mejor se entendera en los exēplos siguientes. Parte 6. cv. por 3. co. parte primeramēte las cantidades vna por otra, como son 6. por 3. y vēdrā 2. Agora para saber que serā estos 2. parte el cv. por la co. (como se ha mostrado) y vendra ce. Y afsi diras, que partiendo 6. cv. a 3. co. viene al cociente 2. ce. Otro exemplo. Parte 16. cce. m. 7. cv. m. 8. ce. por 8. ce. pon la particion y partidor de la suerte que parece.

16. cce. m. 7. cv. m. 8. ce.

8. ce.

¶ Yhallaras, que partiédo 16. cce. a 8. ce. salen a 2 ce. porque 16. partidos por 8. cabé 2. cce. partido por ce. viene ce (como siguiendo la orden de la tablilla podras ver) prosigue partiendolos m, 7. cv. por 8. ce. que es el partidor, y así procedas de carácter en carácter (aunque aya infinitos) pues partiendo 6, a 8, cabé 7. ochauos. Así mismo partiendo cv. por ce. viene co. y porq los 7, q partes es m, por tãto lo q cupo tãbiẽ sera m, por la regla que dize. Partiendo m. por p. es m. y así diras que partiendo m. por 7. cv. por 8. ce. viene m, 7. ochauos cosa. Prosigue partiendolos m, 8. ce. que estan en la particion, por los 8, del partidor, diziendo 8. partidos por 8, caben vno, y porque es m, a este 1. le pôdras m. Así mismo partiendo ce. por ce. viene n. Luego partiendo, m, 8. ce. por 8, ce. cabe m, 1. n. y así auras dado fin a tu particion, y responderas que partiendo 16. censos de censos menos 7. cubos, menos 3. censos, por 8. censos, cabe a 2, censo, menos 7. ochauos de vna cosa, menos vn numero.

¶ Nota, si el carácter del partidor fuere mayor que de la particion, en tal caso pondras el partidor debaxo de particion, y quedara como quebrado. Exemplo: Parte 4. por 1. n. co. pon 1. co. debaxo

debaxo de los 4. n. desta manera ¶. La mayoria no se entienda por la q. que viniere con el caracter, sino del mismo caracter. Porque mas es ce. que co. por razon que cosa es el primero caracter de vna continua proporcion. Y ce. es el segundo, y cv. es mayor que ce. porque es la tercera, &c. Otro exēplo. Parte 20. co. p. 6. ce, cv. por tres cv. porque el cu. que viene en el partidor, es mayor que la co. que esta en la particion, por tãto no gastarastiēpo, sino pon el partidor debaxo de lo que quieres partir desta suerte: y assi quedara partido. 20. co. p. 6. ce. cu.

¶ Lo mismo has de hazer todas las vezes q̄ el partidor tra. 3 cu. xere mas de vn caracter, como si dixessen, parte 50. cu, a 3. co, p. 4. ce. Põ el partidor debaxo de la particion desta suerte, que parece con su raya por medio como quebrado. Y hazien- 50. cu. dolo assi bastara para lo que por ello se pretende. 3. co. p. 4. c.

¶ Y porque esto sea bien entendido, has de saber que en esta regla ay dos diferēcias de assentar quebrados, los vnos se escriuen con vn caracter adelante de la raya, desta suerte, 2 co. Que quiere dezir, dos quintos del valor de vna cosa, y lo mismo entenderas de otra parte, o partes de otro qualquiera caracter. La segunda diferencia se assienta con dos caracteres, o mas, desta suerte. ¶ Que quiere dezir, q̄ los tres cē-

los que estã sobre la raya hã de ser partidos por dos cubos, que estã debaxo, y asì de las demas.

¶ Las prueuas destas quatro reglas precedetes sean las que dizen reales. Quiero dezir, q̄ el sumar de caracteres que lo prueues por el restar y al contrario el restar por el sumar, y el multiplicar por el partir, y el partir por el multiplicar. Aunque mejor se prueua poniendo valor a los caracteres, como estã dicho.

¶ Nota quando alguna cantidad (sea qualquiera) grande, o pequeña no traxere delante de sialgun caracter de los 10. siempre se entienda n. aunque no le trayga, asì como 20. porque no dize co, ni ce, ni otro ningun caracter, dixas ser 20. numeros.

Articulo.V. deste VIII. Cap. Muestra sacar r. de caracteres.

¶ Queriendo sacar r. de algun trinomio, asì como de 9.ccc.p.12.cv. p. 4.ce. sacaras la r. de los extremos, y si la multiplicacion delas rayzes de los dos extremos hiziere tanto como la mitad del caracter de en medio de los 3. que quisieres sacar r. es el tal trinomio tendra r. y tal r. es la misma r. de los extremos. Pues sacar r. del primer extremo, que es 9.ccc. no es otra cosa, sino buscar vn numero que multiplicado por si haga 9. y buscar vn caracter, que multiplicado por si mismo haga el ccc. el qual sera ce. porq̄ ce. multiplicado por ce. haze ccc. (como se mostrò en el

arti-

art. III. deste VIII. cap. en la tabla de multiplicar caracteres) luego la r. de 9. cce., que es el vn extremo, es 3. ce. Así mismo saca la r. del otro exemplo, que es 4. ce. y sera 2. co. Mira aora si multiplicando 3. ce. por 2. co., que son las rayzes de los extremos, hazen tanto como la mitad de 12. cu. que es el caracter de en medio, y hallaras ser verdad: pues por tãto diras que la r. de 9. cce. p. 12. cu. p. 4. ce. es 3. ce., p. 2. co. como lo puedes prouar multiplicando 3. ce. p. 2. co. por otro tanto (como se mostrò en el articulo tercero, cap. 8. de multiplicar caracteres) y vendra al producto 9. cce. p. 12. cu. p. 4. ce. que es el trinomio de do se ha sacado r.

¶ Si quisieres sacar r. de 16. cecu. p. 24. R. p. 25. cce. p. 12. cu., mas 4. ce. sacaras como arriba r. de los dos extremos, y sera 4. cu. y 2. co. aora si este quinomio tiene r. tanto vendra partiendo el segundo caracter que es 24. R. por la r. del primero extremo q̄ es 4. cu. como partiendo el quarto caracter que es 12. cu. por la r. del vltimo, que es 2. co., que a qualquiera destas particiones salẽ 6. ce. pues la mitad de la vna destas particiones q̄ es 3. ce. añadida a los 4. cu. y a las 2. co. que es la r. de los dos extremos, quedara vn trinomio 4. cu. p. 3. ce. p. 2. co. y tanto sera la r. de todo. Pero aora ha de auer otra concordancia, y es, q̄ multiplicando los extremos deste trinomio, que dezimos ser r., que el vno es 4. cu. y el otro 2. co. el v,

no por el otro hazē 8.ccc.doblado sera 16.ccc. a este añadiendo la potencia del de en medio, quiero dezir, de los 3.cc. que sera 9.ccc. montara todo 25.ccc, q̄ es tanto como el numero, o caracter tercero de los 5. de que has sacado r. que tambien es 25.ccc. y assi se sacara de otros caracteres impares. Porq̄ ningun quadrado de caracteres procreara caracteres pares. Mira la demanda que se puso en la anotacion primera del catorzeno capitulo, y entenderas de que sirve saber esto.

Artic.VI. deste VIII.Cap. Muestra abreuiar caracteres.

¶ Quando no pudieres partir alguna particion por razon de ser mayor caracter el del partidor, que el de la particion (como se tratò al fin del articulo quarto deste oçtauo capitulo) podras abreuiar la q. y caracteres del partidor, y de la particion proporcionadamente, de la fuer te que en este exemplo se hara. Põ por caso, que quieres partir 16.cc. por 8.cu. pues porque cu. es mayor caracter que cc, pondras los 8.cu. que es el partidor debaxo de los 16.cc. con vna raya en medio, como quebrado, abreuiar aora las qs. y caracteres (como se mostrò en el segundo libro capitulo sexto) y vendra a ponerse sobre la raya 2.n. y debaxo 1.co. No me detengo en esto, porque importa tan poco para nuestro proposito, que se puede dexar de saber.

Art. I. De la composicion, y origen del binomio.

¶ Los Matematicos inuētaron 15. cantidades, acerca de las quales emplearon principal estudio. La primera dixeron ser racional en potencia, y longitud, y por esta entendieron todo numero (ya sea entero, ya sea quebrado) q̄ tiene r. discreta, assi como 9. q̄ su r. es 3. y otros semejantes (como se declarò en el art. VI. del 4. cap. La segunda q. dixeron ser racional tan solamente en potencia, y no en longitud, y por esta entendieron todo numero que no tiene r. discreta. A las otras treze cantidades llamaron irracionales: y la primera dellas es simple, y las 12. compuestas. La simple es dicha en práctica linea media, por la qual es entendida rr. la potencia de la qual se dize superficie media (como se trato en el septimo capitulo) De las 12. qs. que diximos irracionales compuestas, las 6. son rayzes de numeros compuestos de dos cantidades, de do toman denominacion los binomios de bis, & nomen, que quiere dezir cosa de dos nombres. Las otras 6. son rayzes incompuestas de los disjunctos, o residuos. Quiero dezir, que assi como los binomios son juntados de dos cantidades con la diction del p. assi los disjunctos son disjuntados por esta diction m. como se entendera, quando singularmente de cada vna se tratare.

Lee el
10. de
Eucli-
des.

¶ El primero binomio se compone de numero y r, de tal suerte, que restado la r. de la potencia del numero, la resta sea numero quadrado, como si el binomio fuesse 4. p. r. 7. El quadrado de 4. es 16, quitando de 16. los 7. quedan 9. que es numero quadrado, y assi digo, que todo binomio que tuviere la condicion que este, se dira binomio primero.

¶ El binomio segundo es compuesto de numero, y r. y que la r, sobrepuja al quadrado del numero en vna q. semejante a la misma r. Como si el binomio fuesse r, 112, p. 7. do parece claro poner los 112. que es la r. a los 49. que es el quadrado del numero en 63. los cuales 63. son semejantes en calidad a los 112. porque la proporcion media entre los 2. es como vna proporcion entre dos numeros quadrados (es a saber) assi como 16. a 9. assi estan 112. con 63. como lo puedes verificar partiendo 63. por 112. vendra 63. ciento ydoze abos, que abrenuiados a menor denominacion son 9. diez y seys abos, que son semejantes a los dos numeros quadrados. Todos los binomios que hizieren este efecto, se diran binomios segundos.

¶ El binomio tercero es compuesto de dos rayzes racionales tan solamente en potencia, y de tal arte, que los quadrados destas rayzes no tengan proporcion como de numero quadrado a numero quadrado, y que la diferencia del quadrado

drado de la vna r, al quadrado de la otra, sea en porcion al quadrado de la mayor r. como de numero quadrado a numero quadrado. Afsi como si el binomio fuesse r. 32. p. r. 14, do parece claro sobrepujar el quadrado de la mayor r, q̄ es 32. al de la menor que es 14, en 18. y la proporcion de 32, a estos 18. es como de numero quadrado a numero quadrado. Como la que diximos de 9. diez y feys abos, porque partiédo 18. por 32. vienen 18. treynta y dos abos, que abreuviados a menor denominacion son 9. diez y seis abos. Este binomio, y los que su propiedad tuuieren, son dichos binomios terceros.

¶ El quarto binomio es compuesto de numero y r, de tal fuerte que la potencia del numero excede a la r, en vn numero que no sea quadrado. Exéplo. Sea el binomio 5, p. r. 12. la potēcia del 5, es 25. pues 25. excede al 12. en 13. el qual 13. es numero sordo. Quiero dezir, q̄ no es quadrado, y esto a diferencia de los binomios primeros.

¶ El quinto se compone de r. y numero, mas la r. es mayor que la quadratura del numero: y de tal fuerte, que la diferencia de la r. a la potencia del numero no es en la proporcion a la r. como de numero quadrado, a numero quadrado, como si el binomio fuesse r. 20. p. 3. el mayor numero es 20. el menor es 3. la diferencia de la r. 20. al quadrado del 3. q̄ es 9. es 11. los quales 11. partidos a 20. son 11. veynta abos: los quales no son

en proporcion como de numero quadrado a numero quadrado, y esto a diferencia del segundo binomio.

¶ El sexto binomio es compuesto de dos r. que la diferencia de la vna a la otra, es vna tal q. que no está en proporcion con la mayor, como numero quadrado a numero quadrado. Como si fuesse el binomio t. 20. p. r. 8. La diferencia destas 2. rayzes es 12. pues la proporcion de 20. que es la mayor a 12. no es como de vn quadrado a otro, y esto a diferencia del tercero binomio.

¶ Nota esto, porque la composicion de la cantidad irracional que es r. forda, no puede venir en otra manera fuera destas seys.

Articulo II. Deste IX. Capitulo. Muestra si ha de preceder en los binomios, la r. al numero, o el numero ala r.

¶ Como se colige del articulo primero, los binomios se causan de vn ajuntamiento de vna cosa diferente con otra. Assi como si quisieses sumar 4. con r. 7. en tal casa porque r. 7. no tiene r. racional, juntaras lo vno con lo otro, con la dición del p. diziendo, q̄ monta 4. p. r. 7. y queda hecho vn binomio y por q̄ si alguno dudasse si se podria dezir, que sumando 4. con r. 7. monta r. 7. p. 4. Tendras este auiso, que quando el numero se huviere de juntar con r. con la dición del p. podras anteponer lo que quisieres, como 4. p. r.

p,4. Quando viniere numero y r, con la diction del m, y el quadrado del numero excede al de la r, precedera el numero a la r, afsi como 4. m. r. 7. Si la potencia de la r, excediere a la del n. anteponerse ha la r, como si dezimos r, 20 M, 4.

¶ Si las dos partes del binomio fueren rayzes, y se juntaren con el P. antepón la que quisiere. Exemplo r, 3. P, r, 5. o r, 5. P. 3.

¶ Si estas rayzes se disjuntaren con el M. antepódras la mayor a la menor, afsi como r. 20. m. r. 14
Art. III. de ste IX. cap. Trata del disjuncto, o residuo, y de su composicion.

¶ Entédido lo que se ha tratado del binomio es facil cosa entender la materia del disjuncto, o residuo, porque no difiere el vno del otro, si no que en los binomios se junta vna linea, o numero cō otro con la diction del P. y en el disjuncto las mismas lineas, o numeros se quitan la vna de la otra, con la diction del M. Porque dos cosas diferentes no se pueden sumar, sino con el P. ni restar, sino con el M. Y es de saber que a cada binomio le corresponde vn disjuncto, ya afsi como hemos dichos, que el primero binomio es 4. P. r, 7, afsi su proprio disjuncto sera 4. m, r, 7, y este se dita disjuncto primero. Y por el configuiente de los demas, el disjuncto del segundo binomio sera disjuncto segundo, &c.

Articulo IIII. de ste IX. cap. Muestra sacar r, de los binomios.

¶ Para sacar la r. de qual quiera binomio, se ha de tener auiso de hazer del numero mayor del tal binomio, dos partes tales, q̄ multiplicada la vna por la otra, mōte la quarta parte del quadrado dela menor q. del binomio, y la r. de la suma destas 2. partes serā las del binomio. Lo qual se sabe por la regla de la tosa: mas porque hasta aqui no se ha tratado, como pōdrevna regla breue. Exēplo. Sea el binomio 68. p. r. 408. quadra 68. y montara 4624. resta desto el numero menor del binomio, que es 4608. y quedara 16. de 16. la quarta parte es 4. la r. destes 4. es dos (guarda estos dos) y diuide los 68. en dos partes yguales, y seran en 34. y 34, añade aora a la vna parte los dos, y seran 36. quita los dos de la otra, y que daran 32. y estas seran las dos partes que buscas Lasquales si las muitiplicas vna por otra haran 1152, q̄ es la quarta parte de 4608. que es la parte menor del binomio. Pues saca aora la r. de cada vna destas dos partes, y vendran de 36. 6. y de las 32. r. 32. junta 6. con r. 32. y montara 6. p. r. 42. y tanto diras ser la r. de 68. p. 4608. Otro Exemplo. Sea el binomio 20. p. r. 240. quadra el 20. y seran 40. Resta de 400. los 240. y quedaran 160. toma la quarta parte de 160. que son 40. saca la r. de 40. y sera r. 40. diuide aora los 20. en dos partes yguales, cōuiene saber en 10. y 10. y losvnos 10. añade r. 40. y serā 10. p. r. 40. al otro, quitale r. 40. y q̄darā 10. m. r. 40. saca aora la r. de cada parte, y

te, y porque no puedes, diras que es $rv. 10. P, R,$
 $40.$ Y de la otra fera $rv, 10. m, r, 40,$ junta lo vno
 con lo otro por la diction del mas, y quedara $rv.$
 $10. p, r, 40. p, rv, 10. m, r, 40.$ El qual quadrinomio
 fera la $r,$ del binomio. Prouarfe ha multiplican-
 do $rv, 10. p, r, 40. p, rv, 10. m, r, 40.$ por otro tâto, y
 vendra al producto $20. p, r, 240.$ que es el bino-
 mio de do decimos, que sacamos rayz. Y porque
 es cosa trabajosa multiplicar $rv, 10. p, r, 40. p. rv,$
 $10. m, r, 40,$ por otro tanto, por razõ de hazer la
 prueua deste binomio del qual dezimos ser esta
 fur, notaras esta orden de multiplicar en esta y
 sus semejantes (la qual muestra Euclides en la
 quarta proposicion del segundo) diziendo. Quã-
 do partieres vna $q.$ en dos partes, de la suerte q̄
 quisieres, juntando a la suma de las potencias
 de las dos partes, el doblo de la multiplicacion
 de la vna por la otra, vendra tanto como multi-
 plicãdo toda la $q,$ por si misma. Exemplo sea la
 $q. 8.$ diuidola en $6.$ y dos sumando los quadra-
 dos destas 2. partes q̄ son $36.$ y $4.$ hazen $40.$ si con
 esto juntares el duplo de la multiplicaciõ del $4.$
 por $2.$ que es $24.$ haze $64.$ que es tanto como mul-
 tiplicando el $8.$ por si mismo. Pues siguiẽdo esta
 misma regla diuide este quadrinomio $rv, 10. p, r$
 $40. p, rv, 10. m, r, 40.$ en dos partes, y sea en $rv, 10$
 $p, r, 40.$ y en $rv, 10. m, r, 40.$ aora toma las potẽcias
 o quadrados de cada vna parte, lo qual se haze
 quitando la $rv.$ de cada parte, o multiplicando

cada parte por otro tanto, y quedara diez, p.R. 40. por la vna, y diez m, r, 40. por la otra. Suma aora la vna con la otra (como muestra el art 6. del cap. IX. de sumar binomios) y montara 20. hecho esto, multiplica las 2. partes como son rv diez, p.r, 40. y rv, 10. m.r. 40. vna por la otra mas porque tambien es trabajoso, mejor sera multiplicar sus potencias como son 10. p, r, 40, y 10. m, r, 40 (como muestra el articulo octauo del capitulo nono) la vna por la otra, y montara 60. r, de esto es tanto como si multiplicaras las dos partes vna por otra, pues saca la r, de 60 y sera r, 60, (como se mostrò en el primer auiso del articulo sexto, capitulo quarto) la qual r, 60. doblaras multiplicando por 4. (como se mostrò en el tercero auiso, articulo sexto del quarto capitulo) y montara r, 240. lo qual sumaras con los 20. que es la suma de las potencias de las 2, partes en q diuidiste esta q, o quadrinomio, y sera todo 20. p.r, 240, como hemos dicho.

¶ Nota, si huieres de multiplicar alguna rayz vniuersal cò algun numero. reduziras el numero primeramente al genero de que fuere la rayz vniuersal, y despues si vitra de la rayz vniuersal huiere otro genero de rayz, haras como en este exemplo. Pon que queres multiplicar rrr, vniuersal de r, de 7. p, r, 3. por 2. Primeramente còuertiras el dos en el genero de la rayz vniuersal, cubicandola, porque dize que es rrrv (como se mo

stro en el segundo auiso del articulo sexto, capitulo quarto (y sera 8. hecho esto, quando fueres a multiplicar la r, 7, y la r 3. has de quadrar estos 8, (como se mostro en el auiso segundo, articulo sexto capitulo 4. y sera 64. multiplica aora r, 7, p. r. 3, por 64. multiplicando los 7, y los 3. de las rayzes, cada vna por si, como se mostro en el articulo nono del capitulo quarto (y montara r, 448, p, r, 192, a lo qual daras el nombre de rrrv, y quedara rrrv. de r. 448, p, r, 192, y así te regiras con otros generos de rayzes vniuersales.

¶ Sacar r. de binomio de otro modo. Resta la vna potècia de la otra, y saca la r. de la diferècia y jùtala al mayor quadrado, y de la suma saca la mitad, la qual mitad sera potencia de la parte mayor, y restandò esta la mitad del quadrado mayor la resta es la potencia de la parte menor y la r, destas potencias sean las dos partes, o r, del tal binomio. Otras muchas vias ay de sacar r, pero estas me parecen menos embaraçosas.

Art. V. De este IX. C. Muestra sacar rrr. de binomios

¶ Para sacar rrr, de algun binomio, quitaras la vna potencia de la otra de las dos partes del binomio, y de la resta sacaras rrr. Despues buscaras vn numero cubico, que su rrr. se allegue lo mas q̄ pudiere a la rrr, de la diferècia q̄ ay de la potècia de la vna parte del binomio a la de la otra, y este numero cubo, restarse ha de la parte mayor del binomio, y esto ha de ser de tal suerte q̄

resta que restare, tenga tercia parte, porque partiendo la tercia parte por la rrr. del cubo que restares lo que saliere al quociente, sera la potēcia de la rrr. dela parte menor del binomio. Quiero dezir, que r, deste quociente sera la rrr. de la parte menor del binomio, la qual sabida, para buscar las rrr, de la parte mayor del binomio, juntaras las potencia de la rrr. de la menor parte que has ya hallado con la rrr. de la diferencia que huuiere del quadrado de la vna parte del binomio al de la otra, y este cōjuncto partido por la rrr. del cubo q̄ restares dela parte mayor lo que viniere al quociente sera rr. de la parte mayor del binomio. Exemplo. Que sera la rrr, deste binomio 88. p, r, 5000? Sigue la regla restādo 5000 del quadrado, o potencia de 88. que es la parte mayor, y restaran 2744. desta diferencia saca la rrr, y sera 14. Hecho esto, busca vn cubo que su rrr, se allegue lo mas que pudiere a estos 14. el qual cubo restado de los 88. que es la parte mayor, lo q̄ quedare, tēga tercia parte. El qual cubo hallaras ser 64. y no otro: porque si tomas otro mayor, passara de los 88. y si tomares otro menor no se allegara tanto su rrr, a los 14. como dize la regla, pues resta aora los 64. de los 88. y quedará 24. la qual resta tiene tercio, que es 8. los quales 8. partiras por la rrr, 64. q̄ es el cubo q̄ buscaste, que sus rrr, es 4. pues partiendo 8, a 4. salen 2. este 2. es la potencia de la rrr, de la vna parte del binomio.

nomio pues si 2. es potencia, su r. que es r. 2. sera la rrr. de la parte menor del binomio. Sabido esto para hallar la rrr. de otra parte del binomio juntaras la potēcia de r. 2. q̄ es 2. con los 14. q̄ es la rrr. de la diferencia de los quadrados de las partes del binomio, y montara 16. parte 16. por la rrr. 64. que es el cubo que restaste de la parte mayor del binomio, que es 4. y vendran 4. esta es la rrr. de la parte mayor, y junta aora 4. con r. 2. y sera todo 4. p. r. 2. y esta es la rrr. deste binomio 88. p. r. 5000. Otros muchos modos ay de sacar rrr. del binomio, mas esto es arto breue para principiantes.

¶ Nota, si el excesso q̄ hizierē los quadrados de las dos partes del binomio, de quiē quisieres sacar rrr. no tuuiere rrr. racional, no trabajes porq̄ el tal binomio tāpoco la tēdra. Afsi mismo quādo la diferencia de los dos quadrados de la rrr. del binomio no fuere tanto como la rrr. de la diferencia de los dos quadrados, o potēcias del dicho binomio, el tal binomio no tēdra rrr. discreta, aunq̄ las diferēcias de los dos quadrados del binomio la tengan, como al principio diximos.

Articulo VI. deste IX. Capitula. Muestra sumar binomios y residuos.

¶ En el sumar binomios, o residuos, no ay que hazer fino sumar cada cosa con su ygual.

¶ Quiero dezir sumar los numeros con numeros, como se suma en numeros, y r. con r. co-

mo se suma la r. y en lo del p. y m. tener en la memoria que se dixo en el art. 1. del VIII. cap. acerca del sumar caracteres con la diction del p. y m. Como si dixessen, suma 5. p. r. 18. con 4. p. r. 8. pónlos en figura, y suma r, 18. con r. 8. (como se mostrò en la r. articulo septimo, capitulo quarto) y montara r. cincuenta, y porque sumas p. con p. pondras p. Así mismo sumaras los numeros, como son cinco, y quatro, y seran nueue, y así diras que sumando 5. p. r. 18. con 4. p. r. 8. monta nueue p. r. cincuenta. Y desta suerte sumaras las figuras siguientes, teniendo auiso del mas, y del menos.

5. P. R. 18. 6. M. R. 30. 4. P. R. 9. 7. M. R. 18. R. 80.
M. 7. 4. P. R. 8. 7. M. r. 5. 3. m. r. 4. 6. P. r. 8. r. 5. m. 2.

9. p. r. 50. 13. m. r. 45. 7. p. r. 1. 13. m. r. 2. r. 12, 5. m. 9

R. 9. M. 2. R. 2. P. 2. R. 36. P. R. 4.

X

2. M. R. 4. 4. P. R. 5. R. 25, M, R, 9.

1. P. R. 1. 8. P. R. 45. 10.

Exemplo de sumar irracionales.

3 P. R. 2. 4 M. R. 7. R. 12. M. 8.

5, P, R, 7. 6. M. R. 3. 15. M, R. 4.

8. p. r. y 9. p. r. 56, 10. M. v, 10. p. r. 84, 4. 7. p. r. v. 16, m. r. 192.

¶ Para

¶ Para entēder estos exemplos de irracionales, has de tener en la memoria lo que se dixo en el IIII. cap. art. VII. del sumar numeros que tienē R. forda.

Art. VII. deste IX. cap. Muestra restar binomios, y residuos.

¶ Enel restar haras como enel sumar, restádo r, de r, (como se mostrò enel articulo octauo, capitulo quarto) y numero de número: y en lo del p, y m. como en el segundo articulo del octauo capitulo del restar caracteres, como parece.

10. P. R. 18. 10. M. R. 18. 10. P. 2. 10. M. R. 2.

5. P, R, 2. 4. M, R. 2. 5. P. R. 18. 5. M. R. 18.

5. P. R, 8. 6, M. R, 8, 5. M, R, 8, 5. P, R, 8.

¶ Y desta suerte proseguiras en lo demas, segú todas las diferencias q̄ con el P. y M. pueden venir.

¶ Nota, si huieres de restar algun caracterer, y no huiere en la partida de arriba otro de su genero para restarla, assentaras la misma cantidad que auias de restar debaxo de la raya por resta, y trocarle has la diction de la P. o M. que truxere. Quiero dezir, que si truxere P. pondras M. y si M, pondras P. Y si viniere arriba alguna q. y no huiere abaxo que quitar della, ponerle has abaxo por resta como arriba estuuiere.

Art. VIII. deste IX. cap. Muestra multiplicar binomios y residuos.

¶ Para multiplicar binomios y residuos, pon vn binomio debaxo del otro, o el residuo debaxo del residuo, o el binomio debaxo del residuo, o el residuo debaxo del binomio, o como quiera que venga, y començaras a la mano que quisieres, y multiplicaras todas las cantidades de arriba con cada vna de las de abaxo, teniendo auiso, que si multiplicares numero por r. has de quadrar el numero primero, antes de multiplicar, por causa de reduzir lo vno al especie del otro, y en lo del p. y m. mira lo q̄ se dixo en el Art. III. de lo octauo cap. de multiplicar caracteres, y des pues q̄ huieres dado fin ala multiplicaciõ, sumaras cada genero con su semejante, segun parece en las figuras de los exemplos siguientes.

5.p.r.4.

7.p.r.9.

r.225.p.r.6.

35.p.r.196.

¶ Suma agora r.225. con r.196. como se ha mostrado, y montaran r.841. suma mas r.841. con r.36. y montaran r.1235. que su r. es 35. n, los quales sumaras con los otros 35. y seran 70. y así diras, que multiplicando 5.p.r.4. por 7.p.r.9. mōta 70. Y si alguno dudare de do procedio la r. 225. digo, q̄ multiplicando la r.9. por el quadrado del 5. de arriba, que son 25. Y los 196. salieron quando se

do se multiplicò el quadrado del 7. que son 49. por el 4. dela r, 4. de arriba, y esto es lo que quiere dezir, que quando multiplicares numero por r, o al còrrario, reduziras el numero en r, lo qual haras quadrado el numero, como se mostrò en el septimo auiso del articulo primero, cap. 4.

¶ Nota, estas multiplicaciones puedes hazer q̄ falgan todas en vn renglon a la larga dela manera que parece en la figura siguiente.

3.P.R.3.

4.M.R.3.

monta 9. P.R. 3. 12. P.R. 48. M.R. 27. M.R. 9.

Art. IX. deste IX. Cap. Muestra partir binomios, y residuos.

¶ El partir de binomios, y residuos, puede venir en vna de quatro maneras.

1ª La primera, quãdo el partidor es numero simple: como si partieses 12. p, r, 40. por 2. o por lo que quisieres. En esta partir asteniendo auiso de quadrar el numero, quando partieres r, y hazien dolo afsi, cabra 26. p, r, 10. porque partiendo los 12. por 2, cabra 6. y partiendo la r, 40, por 4 (q̄ es quadrado del 2) viene 10. En lo del p, y m, nota lo que se dixo en el octauo capitulo, articulo 4. del partir caracteres.

2ª La segunda diferencia es, quãdo el partidor es r, forda, afsi como si partieses r, 210. m, r, 30. por r, 3. Porque todo es r. parte r. 210. m, r, 30. por

r, 3,

r. 3. y vendra r. 70. m. r. 10. Otro exéplo. Parte 12.
p. r. 10. por r. 5. Primeramente quadraras los 12.
(como se mostrò en el auiso segundo, articulo
sexto, capitulo quarto) y seran r. 144. Agora di q̄
quieres partir r. 144. p. r. 10. a r. 5. sigue la regla,
y vendra r. 28. y 4. quintos p r. 2.

3 ¶ La tercera diferencia es, quando el partidor
es residuo, como si quisieses partir 12. p. r. 9. por
4. m. r. 2. En tal caso antes que partas ninguna
cosa multiplicaras el partidor, q̄ es residuo, por
subinomio, q̄ sera 4. q. r. 2. y montara 14. el qual
te sera partidor. Pero antes q̄ partas, has de mul-
tiplicar los 12. p. r. 6. que es la particion, por 4. p.
r. 2. (q̄ es por lo q̄ multiplicaste el partidor) y lo
que viniere se partira por los 14. como se hizo
en la primera diferencia.

4 ¶ La quarta y vltima diferencia es, quando el
partidor faere binomio, como si dixessen: Parte
10. p. r. 4. por 3. p. r. En tal caso haras en el bino-
mio con su residuo, lo que hiziste en la tercera
diferencia en el residuo con el binomio. En que
multiplicaras el binomio q̄ te viniere por parti-
dor, q̄ es 3. p. r. 3. por su residuo (q̄ es 3. m. r. 3.) y
môtara 6. por los quales 6. partiras los 10. p. r. 4.
despues que los huieres multiplicado por los 3.
m. r. 3. con que multiplicaste el partidor.

¶ Nota, alguno podria dezir, para que se multi-
plica quando el partidor es residuo por su bino-
mio, y alcótrario si el binomio, por su residuo? A

esto se responde, que por reduzir, o hazer q̄ sea el partidor sola vna q, porque siendo el partidor binominal, sera imposible poder partir con el ninguna q. Entendido esto, puede quedar otra duda, diziendo para que se multiplica la particion por lo que se multiplica el partidor? Esto esta claro que se haze por acrecentar, o disminuir la particion, con la misma q. que se acrecento el partidor.

¶ Nota, si te viniere algun partidor binominal, q̄ multiplicádole por su cótrario, no se hiziere numero, o r, discreta a la primera vez q̄ multiplicas, en tal caso multiplica el producto q̄ te viniere por su contrario, de todo el producto. Y si esta segunda vez, aun no viniere, haz lo otra, y tantas vezes hasta que véga vn producto que sea numero simple, o r, discreta, teniêdo auiso de multiplicar la particion otras tantas vezes, con lo mismo que multiplicares el partidor.

¶ Nota, las prueuas para prouar estas reglas del binomio, sea cada vna por su contraria. Quiero dezir, que el sumar prouaras restando, y el restar sumando, y el multiplicar partiendo, y el partir multiplicando.

Cap. X. En el qual se ponen auisos para las igualaciones.

¶ Auiendo puesto lo que me ha parecido ser necesario para operacion desta regla de la cosa, resta molstrar y declarar la orden que se ha de

tener para saber hazer, o proponer las demãdas que por ella quisieres absolver, y afsi digo, que para hazer qualquiera demanda por esta regla, has de presuponer, que la tal demanda es ya hecha, y respondida, y que la quieres prouar. Poniendo por exemplo, que la respuesta fuesse vna cosa con la qual procederas, haziendo lo q̄ la demanda pidiere, y lo que te viniere cō la vna co. diras ser ygual a lo que quisieras que viniera. Desto se sigue ser necessarias dos partes en estas yguaciones, la vna la q̄ viniere con la operacion de la co. (segun lo que la demanda pide) y la otra, lo que quisieras que viniera. Destas dos partes, la vna ha de ser semejante a la otra en qualidad, o por mejor dezir, en proporcion. Como si dixessen, dame dos numeros en proporcion tripla, que sumados hagã treinta y seis. Para hazer esta, presupondras que el vn numero es vna cosa (que se figura afsi . 1. co.) El segundo, porque dize que ha de ser tripla proporcion, fera 3. co, los quales dos numeros sumados, montara 4. co, estas 4. co, diras que son yguales a los 36. numeros que quisieras que vinieran, o semejantes. Quiero dezir, que son de la misma consideracion, porque afsi como 36. numeros son considerados q̄ procedieron del ayuntamiento del triplo, cō su subtriplo, afsi las 4. co, son produzidas del ayuntamiẽto de co, con su subtriplo, que son 3. co. Dezir que 4. co, son iguales a 36. numeros,

ros, no es otro, sino que 4. co. valen 36. numeros
 q̄ partidos 36. a 4. viene 9. y este es el valor de vna
 cosa, y el menor numero de los 2. que se buscan.

¶ Nota, estas dos partidas de q̄ se haze la ygua-
 lacion algunas vezes son semejante en caracte-
 res, y en numero: así como si 6. cv. se yguallasen
 a 6. cv. 2. co. a 2. co., &c. En tal caso el valor de la
 cosa, o respuesta de la demanda sera vno. Mas si
 fueren semejantes en caracteres, y diferentes
 en numero, como si 3. co. se yguallasen a 4. co. o
 5. R. a 2. R. en tal caso las demandas que seme-
 jantes y igualaciones tediessen será impossibles
 y no se podran hazer, porque dos reales no pue-
 den ser tanto como 3. siendo todos de vn valor.

¶ Otras vezes son semejantes en numero, y dif-
 similes en caracteres. Como si 8. co. se yguella-
 sen a 8. ce. o 10. co. a 10. n. Esto es señal que la tal
 demanda tiene infinitas respuestas, y no tiene
 vna sola.

¶ Otras vezes son disimiles en numero y cha-
 racteres, como si 5. co. se yguallasen a 8. ce. o 12.
 cce. a 15. cu. &c. esta es señal tener vna sola abso-
 lucion. ¶ Nota esta figura yg. quiere dezir y equal
 (como diximos en el tercero capitulo) lo q̄ tuuie-
 re antes de si, es la vna parte de la y equalacion,
 y lo que tuuiere despues es la otra. Entendido
 esto notarás los auisos siguientes.

1. ¶ Quando en alguna parte de la y equalacion
 viniere alguna cosa de p. lo q̄ viniere de mas lo
 resta-

restaras de la otra. Mira la primera, y segunda demandas del articulo primero, capitulo XIII.

2. ¶ Quando en la vna parte de la igualacion viniere alguna cosa menos, lo que viniere menos se ha de juntar con la otra. Lee la tercera y octava del articulo primero, y tercera del segundo capitulo decimotercio.

3. ¶ Si en vna parte viniere P , y en la otra M , junta el M , con el P , siendo el mas mayor cantidad que el menos.

4. ¶ Quando en la vna y otra parte huviere vnos mismos caracteres, resta los vnos de los otros. Lee la segunda del articulo sexto, y la octava del articulo primero, capitulo decimotercio.

5. ¶ Quando en alguna parte de la igualacion viniere algun genero de rayz, conuerte la otra, multiplicandola segun la propiedad de la tal rayz. Lee la 14. y 15. demandas del articulo primero, capitulo decimotercio.

6. ¶ Quando en la vna, o ambas partes de la igualacion viniere quebrados, se multiplicaran y reduziran a vna comun denominacion, de arte que queda la igualacion como enteros. Exemplo tres co , P , dos ce , son iguales a $\frac{3000}{1000} \frac{n}{co}$ multiplica las $3.co$, P , $2.ce$, por la $1.co$, que esta en la otra parte, y montara $3.ce$, P , $2.cv$. y esto sera igual a los $3000.n$. y assi se euitara el quebrado. Otro exemplo $\frac{16}{8} \frac{n}{o}$ se igualan a $\frac{8}{1} \frac{n}{ce}$ multiplica en cruz la $1.co$, por $8.n$, y los $16.n$, por el $vn ce$, y vendran

vendran 16. ce, a ser yguales a 8. co. Si viniere alguna yguacion desta suerte. $\frac{2}{10}^n$ p, 2. n, yg. $\frac{2}{7}^m$ c. Primeraméte multiplicaras cada vna de las partes por 1. co, y fera la multiplicacion 24. n, p, 2, co. yguales a $\frac{2}{7}^m$ c. Multiplica mas vna parte y otra por si 7. m. 1. y será 168. p. 14. co, m. 24. co, m, 2. ce, yg. a 24. co, yguala dâdo a la otra parte m, 24. co. m. 2. ce. y quedara 168. p. 14. co, yg. 48. co. p. 2. ce. Agora quita 14. co. quea y de mas en la vna parte de las 48. q̄ estan en la otra, y quedaran 168. yg. 34. co. p. 2. ce, por la vltima yguacion. Para declaracion desto, lee la decima sexta. y decima septima demandas del artículo primero, de la primera del sexto artículo capítulo decimo tercio.

¶ Quando en ambas partes de la yguación viniere algo menos, restaras lo vno de otro. Lee la primera demanda del artículo septimo, capítulo decimotercio.

Nota por causa de breuedad puedes en las yguaciones abreniar los caracteres de vna parte y otra. Exemplo. Si viniere vna yguacion de esta suerte 6. cv. yg. 4. ce, parte el cv. y ce. por co. y por los 6. cv. vëdra 6. ce. Y por los 4. ce, vendrà 4. co. y tanto valdra que se ygualen 6, cv, a 4, ce. como 6, ce, a 4, co. Y assi puedes proceder abreniando hasta que no puedas mas (como se mostro en el artículo sexto del oçtauo capítulo.)

De otras muchas fuertes pueden venir las yguaciones

laciones, y de tantas, que es imposible el entendimiento humano poderlas explicar, mas porq̄ encédido esto, facilmete se alcançara lo de mas no me alargo, porque la prolixidad (como dizē es madre de confesion.

¶ Hemos dicho, que para intentar hazer qualquiera demanda, se presupone, que la respuesta dela tal demanda es 1.co. (como adelante en el capitulo decimotercio mejor se entēdera.) Agora digo, que aunque pōgas 2.co, o mas quantas quisieres, siempre te vendra el valor de vna sola. Exemplo. Dame dos numeros en proporciō tripla, que la suma de ambos haga 36. Pon por caso, que el vno destos dos numeros demandado es dos co. el otro sera 6.co. Por razon q̄ esten en tripla proporcion. Suma estos dos numeros, y seran 8.co. las quales diras, que son yguales a los 36. q̄ quisieras q̄ vinierā. Sigue la regla partiēdo 36. por 8. y vēdra al quociente 4. y medio, estos 4. y medio es el valor de vna co. Pues por quanto pusiste por caso, que el primero numero erā dos casos, toma 2. vezes 4. y medio, y sera 9. y este es el vn numero de los dos que buscas, y porque por el segundo se presupusieron 6.co. tomaras 6. vezes 4. y medio, serā 27. Este es el otro numero, los quales estan en tripla proporcion, y la suma de ambos es 36. como pide la demanda.

¶ Así mismo como pones vna co. ò cosas podras

dras poner otro, y otros qualesquiera caracteres y seguir la regla con ellos, como si fuesse como cosas, y lo q viniere sera el valor de f. co. El qual valor se redazira despues en la especie del caracter que pusieres. Quiero dezir, q si pusieres ce. quadraras lo q saliere a la cosa, y si cubo, cubicarlo has, &c. Exemplo. Que numero sera aquel que multiplicado por si mismo, haga 25. Po por caso q el numero demandado es 5. ce. multiplica este ce. por si mismo, y motara 5. ccc. (como se mostro en el articulo III. del cap. 8.) lo qual diras ser igual a los 25. q quisieras, sigue la regla del articulo 4. capitulo decimotercio, partiendo 25. por 5. ccc. y vendra a valer 5. ccc. 25. numeros, de los quales sacaras la rr. q es 5. por el auiso primero del sexto articulo, capit. quarto, y esta 5. es el valor de vna cosa. Y porque al principio presuposiste 5. ce. reduziras esta 5. que dizes ser el valor de vna cosa a la especie del ce. q sera quadrando 5. o multiplicandola por otro tato como se mostro en el segundo auiso del articulo sexto, capitulo quarto, y motara 5. y este es el numero demandado: el qual si se multiplica por si mismo haze 25.

¶ Nota mas: de qualquiera caracter q pusieres por razon de buscar algun numero dudoso demandado, podras quitar, o añadir algun n. y despues de sabido el valor de vna cosa, juntaras lo que añadiste con el caracter: o quitaras lo que

quitéste, y la resta, o la suma sera respuesta de la demãda. Exemplo. Dame dos numeros en proporcion dupla, que la suma de ambos haga 45. Pon por caso que el vno destos numeros q pide es 1.co.p.3, el otro, porque ha de ser en proporcion dupla, sera 2.co.p.6. Suma estos dos numeros (como mostrare en el primero articulo capitulo octauo del sumar caracteres) y seran 3.co.p.9. lo qual diras ser igual a 45. n. que quisieras. Siguiendo la regla que adelante se pondran (en el 13. capitulo) vendra 12. estos 12. es el valor de 1.co. y porq̄ vltra de auer puesto por el numero primero vna cosa pusiste p.3.n. juntar los has y seran 15. este es el primer numero de los dos q buscas. Para hallar el segundo, junta el valor de las dos cosas, y mas los 6. que pusiste por el segundo: pues sabes que vna cosa vale 12. y vendrá 30. Y asi antes hallado los dos numeros, losquales estan en proporcion dupla, y la suma de ambos es 45 como dize la demanda. Lee la quinta demanda del art. I. cap. XIII.

¶ Nota, como añadiste cō el valor de la co. los 3. q pusiste mas, si pusieras de menos los quitaras. Lee el cap. XIII. y trabajando en la practica de tantas demandas como en el hallaras, entenderas mejor lo q̄ en este cap. se ha tratado.

Cap. XI. De las quatro igualaciones simples de dos cantidades.

¶ Los

¶ Los que escriuieron sobre esta regla: vnos dixeron fer las igualaciones 8. otros 10. otros menos. Yo pongo 7. porque se entienda lo que quisieró dezir: y el q quisiere ver mi parecer, lea el capitulo decimoquarto. Destas 7. las quatro son simples de dos cantidades, y las 3. compuestas de tres cantidades.

1. ¶ La primera igualacion, que dizen simple de dos cantidades es, quando se iguala vn caracter a otro, y son igualmente distantes de la misma proporcion y origen. Assi como si la co, se igualasse al n. do claro parece no faltar ningun caracter entre co. yn. como faltaria si se igualasse ce. a n. que seria la co. Y para que esto se entienda, digo, que el primero caracter es n. (aunque por si no denota cantidad proporcional, como denota la cosa: y los demas caracteres.) El segundo es co. El tercero ce, y assi van procediendo en infinito (como se pusieron en el capitulo segundo) Entendido esto si se igualassen dos caracteres el vno al otro (qualesquiera que sean) si entre el vno y otro no faltara caracter de su continuacion, assi como si el ce. iguala a cv. o R. a ce. cv. en tal caso partiras lo que viniere con el menor caracter, por lo que viniere con el mayor, y el cociente sera el valor de la cosa, como mejor se entendera en el articulo primero del cap. III.

2. ¶ La segunda igualacion simple de dos cantidades es, quando entre el vn caracter, y otro

de los dos que se igualarē falta algunos. Como si ce. se igualasse n. do parece claro faltar la co. Otro como si el cv. se igualasse a co. entre los quales falta el ce. y assi de los demas. En tal caso partiras lo que viniere con el caracter menor por lo q̄ viniere con el mayor, y la r. del quociente, sera el valor de la cosa. Como entenderas en el segundo articulo del capitulo decimotercio.

3^o La tercera igualacion de las simples de dos cantidades es, quando entre los dos caracteres que se igualan faltan dos. Como si cv. se igualasse a n. entre los quales falta co. y el ce. O como si ce. se igualasse a la co. entre los quales falta ce. y cv. En tal caso partiras lo que viniere cō el caracter menor, por lo q̄ viniere con el mayor, y la rrr. del cociente sera el valor de la co. Mira el tercero articulo del capitulo decimotercio.

4^o La quarta es, quando faltan tres caracteres entre los dos q̄ se igualarē, como si cce. se igualasse a n. entre los quales faltā co. cv. En tal caso partiras lo q̄ viniere cō el menor caracter por lo que viniere con el mayor, y la rayz quadrada de quadrada, sera el valor dela co. Lee el quarto articulo del cap. XIII.

¶ En esto has de notar, q̄ si faltassen quatro caracteres entre los dos q̄ se igualarē, que despues de auer partido lo q̄ viniere con el caracter menor por lo que viniere con el mayor, sacando la rayz relata del cociente, sera el valor de la cosa,

y si faltaren 5. despues de auer hecho lo que en todas se haze, sacando el ce. cv. y assi puedes proceder en infinito. Como en la demanda tercera del IIII. art. del cap. XIII. mejor entenderas.

Capitulo XII. De las tres ygualizaciones compuestas de tres cantidades.

¶ En estas compuestas de tres qs. siempre se vienen a ygualar dos caracteres a vno, y esto en vno de tres modos, porque vnas vezes se ygualan los dos mayores al menor, otras el mayor y menor al mediano: otras los dos menores al mayor. Y porque mejor se entienda que caractere se dize mediano, y qual se dize mayor, y qual menor: notarás q̄ cada vna destas trae tres terminos, conuie saber. Antecedente. Siguiete. Mediano. Antecedente llamamos, quando vn caracter procede a otro, assi como el n. procede a la co. y la co. al ce. y siempre estos antecedetes son menores que sus siguientes. Siguiete es quando vn caracter se sigue despues del antecedente. Assi como la co. se sigue despues de n. y c. sigue a co. &c. Mediano se dize vn caracter que esta entre dos extremos, vno que le sea mayor, y otro menor. Assi como co. esta entre n. y ce, y el ce. esta entre co. y cu. y assi de los semejantes. Exemplo n. co. ce. El primero que es numero, se dize antecedete, o menor, la co. se dize mediano, o siguiente. El ce. se dize mayor, porq̄

estos caracteres tanto quanto mas se apartarẽ de la co, que es su principio: tanto mayores son, que los que menos se apartaren, y assi digo, que es mas co. que n. y ce. mas que co. y cv. mas q̄ ce. ¶ Entendido esto, la primera y gualacion de las compuestas, es quando vienen tres caracteres igualmente distantes, que y entre ellos no falta otro algun caracter, como n. co. ce. Y assi de o. qualquiera, y que se igualen los dos caracteres mayores al menor. Como si ce. y co. se igualan al n. O como y cv. y ce. se igualã a co. En tal caso partiras lo que viniere con los dos caracteres menores: por lo q̄ viniere con el mayor, y despues saca la mitad del quociẽte del mediano, y muliuplicala por si, y el producto sumarse ha con el quociẽte del menor. La r. deste cõjuncto, menor la otra mitad del quociẽte del mediano, sera el valor de la cosa. Lee el articulo quinto del capitulo. 13.

2. ¶ La segunda es quando vienen tres caracteres y gualmẽte distantes, de suerte que entre medias no falte algun caracter. Assi como si ce. y n. se igualassen a co. O como si cv. y co. se igualassen a ce. y assi de otros qualesquiera caracteres. En tal caso partiras lo q̄ viniere cõ los caracteres menores, por lo que viniere cõ el mayor, y despues sacaras la mitad del cociente del mediano, y multiplicarla has por si, y deste producto restaras el cociente del menor caracter, y la
r. desta

r. desta resta mas, o menos la otra mitad del mediano, es el valor de la cosa. Lee el articulo sexto del capitulo decimotercio.

¶ Nota, porque dize que la r, de la resta p. o' m. la otra mitad del mediano sera el valor de la cosa, se sigue, que las demandas desta igualacion tendrá dos respuestas por la mayor parte, y por que sepas quando sera bien juntar a la r. mitad del mediano, o quitaria, tendras este auiso. Quando la q. q' estuviere con el caracter mediano fuere mayor que la q. que estuviere con el menor, entóces jutaras la r. con la mitad del mediano. Y si fuere al contrario, quiero dezir si la q. del menor fuere mayor que la del mediano, quitaras la r. de la mitad del mediano.

¶ Nota, mas quando el cociente del menor fuere mayor q. q' el quadrado de la mitad del mediano, de fuerte, que puedas bien quitar el cociente del menor, del quadrado de la mitad de la mediana, en tal caso lo sumaras, y la r. del có-juncto p. la mitad del mediano sera el valor de la cosa. Lee el art. VI. del XIII. capitulo.

3. ¶ La tercera igualacion de las compuestas de tres qs. es quando vienen tres caracteres igualmente distantes, de arte que ningun caracter falte entremedias, y que los dos menores igualen al mayor. Assi como n. y co, y g. a. ce. O como si co, y ce. se igualassen a cv, &c. En tal caso partiras lo que viniere con los caracteres menores,

por lo que viniere con el mayor (como has hecho en las precedetes) y despues multiplicaras la mitad del cociente del mediano por si misma y juntarlahas con el cociente del menor, y la r. de toda esta suma y p. la otra mitad del cociente del mediano sera el valor de la co. Lee el articulo septimo del capitulo decimotercio.

¶ Nota, si igualandose 3. caracteres igualmente distantes en medio de cada 2. dellos falte vn caracter, assi como si se igualassen cce. y ce. a n. procederas como manda la primera igualacion de las cõpuestas: y si cce, y n. se igualassen a ce. porq se igualan el mayor y menor al mediano, procederas como la segunda. Y si n. y ce. se igualasse a cce. porq los menores se igualan al mayor, procederas como la tercera. Y lo que viniere en todas sera el valor de vn censo, la r. del qual sera el valor de la co. Y si como en esto falta vn caracter entre cada dos de estos igualados faltassen 2. despues de auer hecho lo que la regla mãda, saldra el valor del cv. y sabido el cv. saca su rrr. y sera el valor dela cosa. Y si faltassẽ 3. saldra al valor del cce. cuya rr. sera la respuesta de la demanda, y valor dela cosa. Y si faltaren 4. vendra el valor del R. cuya rayz relata sera el valor de la cosa. Y si faltassen 5. vendra cecv. cuya rayz cecv. sera el valor de la cosa: y assi podras proceder en infinito, como por los exemplos del octauo articulo del cap. XIII. mejor entenderas.

¶ Nota, si en alguna demanda viniessen, tres, o mas caracteres a igualarse a vno, haras lo que manda la antepenultima anotacion del capitulo decimo quarto.

Cap. XIII. En el qual se ponen demandas para declaracion de todo lo que se ha tratado en los capitulos precedentes.

Art. I. Muestra hazer demãda por la primera igualacion de las simples, de dos cantidades.

¶ Dos tienen dineros, el vno cinco ducados mas que el otro, y multiplicando los ducados del vno por 3. y los del otro por 4. juntas las 2. multiplicaciones, montan 9. ducados. Demando quanto tiene cada vno. Respuesta. Pó que el vno tiene vna co. el otro porque dize la demãda q̄ tiene 5. mas junta 5. con 1. co. (por la regla que se puso en el primero articulo del capitulo octauo de su mar cosas diferentes) y seran 1. co. p. 5. y assi tendras que el primero tiene 1. co. y el segundo 1. co. p. 5. n. Multiplica 1. co. que dizes ser los ducados del primero por 3. y seran 3. co. assi mismo multiplica los ducados del segundo, que son 1. co. p. 5. por 4. (como mãda la regla de multiplicar caracteres, articulo tercero, capitulo octauo) y seran 4. co. p. 20. n. Suma aora 4. co. p. 20. n. que es la vna multiplicacion, con 3. co. que es la otra (por la regla de sumar caracte-

res,

res, artículo I, capítulo octauo) y montara 7. co, d. 20. n. Esto igualaras a 69. n. que quisieras que montara, desta manera 7. co. p. 20. n. yg. a 69. n. Resta los 20. que vienen mas en la vna parte de la igualacion de los 69. que estan a en la otra como muestra la primera anotacion del cap. X. y quedaran 7. co. yg. a 49 n. Parte 49. que vienen con el menor caracter, por los 7. que viene con el mayor, y vendra al quociente 7. Estos 7. es el valor de la cosa, y respuesta dela demanda. Quiero dezir, que este es lo que tiene el vno, y por q̄ por vna cosa salio 7. quando pusiste 1. co. p. 5. por el segundo seran 2. y assi auras respondido a lo que la demanda pide, diziendo, que el vno tiene 7. ducados, el otro 12. de los quales si los del menor que son 7. multiplicas por 3. hazen 21. y los del mayor que son 12. multiplicados por 4. hazē 48. sumadas estas dos multiplicaciones, montā 69. como la demanda pide.

2^o ¶ Vno comprò tres paños por 100. ducados, de los quales el segundo costò tres tanto que el primero, y p. 3. ducados. El tercero costò doblados ducados que el segundo m. 4. pide se que costò cada paño. Pon q̄ el primero costasse vna co. de ducados. Y por q̄ el segundo dize, q̄ costò tres tanto que el primero, y p. 3. ducados, costara a este precio 3. co. p. El tercero dize, que costò doblado que el segundo menos 4. luego costara al respecto de lo que costò el segundo 6. co. p. 3. Su

ma estos 3. precios por la regla de sumar caracte-
res (del cap. VIII. art. I. y montara 10. co. p. 5. Y
porque quisieras que montara 100. que auian
costado todos tres paños, igualaras lo vno a lo
otro desta suerte 10. co. p. 5. yg. a 100. nu. quita
los 5. que vienen mas en la vna parte, y resta los
de la otra (como manda el primero auiso del ca-
pitulo X) y quedaran 10. co. yg. a 95. n. parte 20.
ra 95. que es lo que viene con el caracter menor
por los 10. que vienen con el mayor, y vendra 9.
y medio, y tantos ducados costò el primero. Sa-
bido el primero los otros se sabran segun lo que
la demanda pide.

3^o ¶ Vno comprò 11. paños por 108. ducados, en-
tre los quales ay paños que costauan a 9. ducados,
y otros que costauan a 12. Pídesse quántas pie-
ças ay de cada precio. Pon q̄ de los de a 9. ducados
ay 1. co. y de los de a 12. ducados sean todos
11. m. 1. co. Aora multiplica 1. co. que pusiste a 9.
por sus mismos 9. y será 9. co. Assi mismo multi-
plica 11. m. 1. co. por 12. q̄ dizes que valen y mon-
taran 132. m. 12. co. Suma estas dos multiplica-
ciones. como son 9. co. cõ 132. m. 12. co. (como
manda la regla del sumar caracteres, articulo
primero, cap. octauo) y montará 132 m. 3. co. lo
qual sera igual a los 108. ducados q̄ costaron. Si-
gue la regla passando las m. 3. co. a la otra parte,
y quitando los 108. q̄ estan en la otra de los 132
como los auisos del cap. decimo mandan, y que-
daran

daran 24.n.yg.a 3.co.Parte 24.a 3.y vendran 8.
y tantas pieças eran las de a 9.ducados,y las de
mas que son 3.las que faltan para halta 11.seran
de 12.ducados.

4¶ Vno compró 20.varas de paños diferentes
por 20.ducados, en las quales ay algunas q̄ costa
ron a 3.ducados, otras a 2.otras a vn quarto de
ducados.Pido quantas varas ay de cada precio?
Pon que ay 4.varas de a 3. ducados que valdran
12.ducados, quita los de los 20. que costaron 12
dos,y quedará 8. así mismo quitalas 4. varas de
las 20.y quedaran 16.aora es menester hazer de
16.dos partes tales,q̄ multiplicado la vna por 2.
que es el segundo precio de vara, y la otra por
vn quarto, que es el tercero precio, y sumadas
las dos multiplicaciones monten 8. ducados.
Pues para hazer esto, pon que la vna parte es 1.
co.la otra seran todos los 16.m.1. co. q̄ pusiste
a la primera multiplica aora la vna parte, que es
1.co.por 2.(como se mostrò en el tercero artic.
del octauo capitulo)y seran 2.co. Multiplica la
otra parte que dizes que es 16.m.1. co. por vn
quarto,y montara 4.m.vn quarto co. Suma es-
tas dos multiplicaciones, como son 2.co.y 4.
m.1.quarto de co. por la regla del sumar cara-
cteres,cap.octauo,articulo primero, y montará
4.p.vno y tres quartos co.lo qual igualaras a los
8.ducados, quita los 4.n.de los 8, que estan en la
otra parte,y quedaran yno y 3.quartos co. yg.a
4.n.

4. n. parte 4. por vno y tres quartos, y vendran 2. y dos septimos, y tantas son las varas de ados ducados: y las que faltan para 16. que son 13. y cinco septimos, seran las varas de vn quarto de ducado. Nota estas demandas tienen estas infinitas respuestas, porque como aqui pusistes 4. varas de a 3. ducados por el primero numero pudieras poner mas, o menos de otro qualquier precio.

5. ¶ Dame 3. numeros q̄ se excedan vnos a otros en vno, o en lo que quisiere, y que la suma de todos montò 10. Pon por caso, que el primer numero sea 1. co. p. 1. n. El segundo sera 1. co. p. 2. n. El tercero 1. co. p. 3. n. Sumalos todos 3, y serã 3. co. p. 6. n. esto es ygual a 10. y guala quintando 6. que estan en la vna parte. de los 10. de la otra como manda el primero auiso del dezimo capitulo, y quedaran 3. co. y g. a 4. parte 4. a 3. y vedra vno y vn tercio, por el valor de la cosa, a esto aña de vno que pusiste de mas con la cosa, y seran 2. y vn tercio, y este es el primero numero. Y porq̄ la demanda dize que se han de exceder todos en vno: el segundo sera 3. y vn tercio, y el 3. sera 4. y vn tercio: la suma de todos es 10. como pide la demanda.

6. ¶ Dame 5. numeros q̄ se excedan vnos a otros en vno en tres quartos, y que la suma de todos haga 20. Pon que el primero numero destas cinco que pidē es 1. co. El segundo, porque le ha de

exceder en vno y tres quartos, fera vno co p. 1. y tres quartos, y el tercero vno co p. 3. y medio. El quarto vno co. p. 5. vn quarto. El quinto fera 1 co p. 7. Suma aora todos 5, numeros, y montaran 5 co. p. 17. n. y medio, lo qual y gualaras a los 20. q quisieras, y quita los 17. n. y medio, que en la vna parte vienen p. de los 20, n. que estan en la otra (como manda el auiso primero del capitulo de cimo) y quedaran 5. co, y g. a 2. y medio, sigue la regla partiendo 2. y medio, que es lo que viene con el menor character por los 5. que viene con el mayor, y vendra al quociente medio, y este es el valor de la cosa, y primero numero de los cinco demandados. Los demas son faciles, pues sabes el principio y el exceso.

79 Dame cinco numeros q se excedan los vnos a los otros en vna cierta contidad, y quiero que el primero sea medio, y que la suma de todos haga 20. P. de quanto fera el exceso de vnos a otros. Pon que exceso sea 1, co. y segun esto el primero fera medio, y el segudo otro medio p, 1 co. El tercero otro medio p, 2, co. El quarto, otro medio p. 3, co. El quinto otro medio p. 4. co. Sumese todo y montara 2 y medio n. p, 10. co, lo qual fera y gual a 20. n, que quieras. Resta dos n, y medio que estan en la vna parte de la valança de los 20. q estan en la otra (como manda el auiso quarto del capitulo dezimo) y quedara 10. co yg. a 17. n. y medio. Sigue la regla partiendo, 17. y medio,

medio, q̄ es lo que viene con el menor carácter por los 10. que vienen cō el mayor, y vēdra vno y tres quartos, y este es el exceso que han de tener comenzado sobre medio que fue el primero numero.

8^o Dos tienen dineros, tantos vno como otro, y el primero compro 10. varas de paños, y las pago, y le sobraron ocho ducados. E segundo compro 18. varas, y para pagarlas al mismo precio q̄ el primero le faltaron 22. ducados. Demando quanto tiene cada vno, y a quāto vale la vara de paño. Pon que la vara valia 1. co. y 10. valdrian 10. co. a las quales juntaras 8. ducados q̄ dize le sobrarō, y serā 10. co. p. 8. n. ducados, y esto es lo del primero. El segundo dize, q̄ comprō 18. varas, cada vna a 1. co. de ducados, serā 18. co. y por que dize q̄ le faltaron 22. ducados, quintaras 22. de las 18. co. y restarā 18. co. m. 22. n. ducados, lo qual igualaras a las 10. co. p. 8. n. del primero. De esta manera 18. co. m. 22. n. yg. a 10. co. p. 8. n. Sigue los anifos del decimo capitulo, quitādo 10. cosas que estan en la vna parte de las 18. que estā en la otra (como manda el quarto anifo del decimo capitulo) y quedara la igualacion desta manera 8. co. m. 22. n. yg. a 8. n. Profigue pasando los 22. n. que vienen menos en la vna parte, con los 8. de la otra como mādā el segundo anifo del decimo capitulo, y quedaran 8. co. yg. a 30. n. Ya que no puedes quitar, ni añadir mas, sigue

que la regla partiendo los 30. por los 8. y vendran 3. y tres quintos, y tanto es el valor de vna cosa y precio de cada vara. Lo qual sabido, entēderas q̄ cada vna tenia 45. ducados y medio.

9. ¶ Vno compro vna pieça de paño de tantas varas, que se paga cada vara a 4. ducados, le sobran 6. ducados, y si da 5. ducados por vara, le faltan 20. ducados: demando quantas varas tenia la pieça, y con quātos ducados se hallo. Pō que la pieça tenia 1. co. de varas a 4. ducados la vara montara 4. co. Y porque a este precio le sobaron 6. ducados. Junta 6. ducados con 4. co, y seran 4. co. p. 6. ducados. Prosigue comprando 1. co. de varas a 5. ducados, q̄ es el segundo precio y seran 5. co, y porq̄ a este precio le faltaron 10. ducados, quitaras 10. de 5. co. y quedaran cinco co. m. 10. ducados, y guala este segūdo producto al primero, desta manera 5. co, m, 10, n, y g, a 4. co p. 6. Sigue los auisos dela precedente, y hallaras 16. y tantas varas tenia la pieça. De lo qual sacaras que tenia 70. ducados el mercader.

10. ¶ Vno gastò en clauos y canela 100. ducados a razon la libra de los clauos de los ducados, y vendio la a ducado y medio, y la libra de la canela le costò a tres ducados: y la vendio a quatro y hallo do ganancia 20. ducados pide se quantas libras compro de cada fuerte. Pon por caso, q̄ compro 1. co. de libras de clauos, la qual a 12 ducados seran 2. co. estas 2. co, quitaras de los
100. du.

100. ducados que gastò, y quedarán 100. ducados m. 2. co. Parte aora 100. m. 2. co. por tres ducados, que es el precio de lo que costaua la libra de canela, y vendran 33. y vn tercio m. dos tercios co. y tanto gasto en canela. Aora porque dize que vendio la libra de clauos a ducado y medio, siguese que de vna cosa de libras hizo cofay media de ducados. Multiplica 33. y vn tercio m. dos tercios co. por 4. q̄ son los 2. ducados, por q̄ vendio despues cada libra de canela, y ferá 133. y vn tercio m. dos y 2. tercios de cosa, como se mostrò en el tercero art. del octauo cap. a lo qual juntaras cosa y media que es el precio por q̄ vendio la libra de los clauos, y môtara 133. y vn tercio m. 1. y vn sexto co. (como se mostrò en el art. primero del cap. octauo de sumar caracteres) lo qual igualaras a los 110. ducados que hizo de todas, desta manera 133. y vn tercio m. 1. y vn sexto co. yg. 110. n. Sigue la regla restando 110. que estan en la vna parte de los 133. y vn tercio q̄ està en la otra (como manda el quarto auiso del decimo cap.) y passando vno y vn sexto cosa, que viene menos en la vna parte a la otra (como mãda el segundo auiso, del mismo decimo capit.) y quedarán 23. y vn tercio n. yg. a vno y vn sexto cosa, parte 23. y vn tercio, que es lo que viene con el menor caracter por uno y vn sexto, q̄ viene con el mayor, y vendran al cociente 20. y esto es el valor de la cosa, y las libras que comprò

de cada fuerte de las dos mercaderias sobredichas.

11. ¶ Vno cōpro 4. varas de paño por 12. ducados, y costo lavara tantos ducados como reales y como tarjas, desta manera, q̄ si la vara costo 2 ducados t̄bien costaria dos reales, y otras dos tarjas, demando a como costo la va. r. Pon q̄ la vara costo 1. co. de ducados, y otra cosa de reales, y otra cosa de tarjas. Mira aora vna cosa de real, y otra de tarjas, que parte de 1. co. de ducado, lo qual se haze sumando 34. maranedis que vale el real, con 9, que vale la tarja, y fera 43. p̄ los sobre 375. que son los marauedis del ducado y seran 43. trecientos y setenta y cinco abos, y assi diras q̄ vna cosa de real, y otra cosa de tarja es quarenta y tres 375. abos de vna cosa de ducado. Con lo qual juntaras vna cosa de ducado, sumando (como se mostro en el primer articulo octauo capi.) y mōtaravno y 43. 375. abos de co. lo qual guardaras despues parte 12. ducados que gasto en las 4. varas, por las mismas 4. varas, y vendra al cociente 3, esto y gualaras ala vna cosa y quarenta y tres 375, abos de cosa q̄ guardaste. Sigue la regla partiendo 3, que es lo que viene con el menor character por vno y quarenta y tres 375, abos, que vienen con el mayor y vendran dos y docientos y ochenta y nueue, 418, abos, y tanto es el valor de la cosa: y respuestita de la demanda. Quiero dezir, q̄ cada vara co-

sto a 2. ducados y 289. quatrocientos y diez y ocho abos de ducados, y otros tantos reales, y otras tantas tarjas de a 9. La prueua es: q̄ multiplicando 4. varas a este precio, hazen doze ducados, que es lo que se gasto.

12. ¶ Vno compro 60. hanegas de trigo, y 30. de ceuada por 90. ducados, y la hanega del trigo costo diez por 100. mas que la ceuada. Demádo quanto es el precio de la hanega del trigo, y de la ceuada. Pon que la hanega de ceuada vale 1. co. la del trigo por q̄ dize q̄ vale 10. por 100. mas que es el diezmo valdra vna y vn diezmo cosa. Aora multiplica 30. que son las hanegas de ceuada, por el precio de cada vna que dezimos ser 1. co. y seran 30. co. Multiplica mas 60. hanegas de trigo, por vna y vn diezmo co. (como se mostro en el tercero articulo del octauo capitulo) y montara 66. co. Suma estas dos multiplicaciones, como son 30. co. y 66. co. y seran 96. co las quales ygualaras a los 90. ducados que dize q̄ gasto, desta manera 96. co. yg. a 90. n. Sigue la regla partiendo 90. q̄ es lo q̄ viene cō el menor caracter por 69. que viene con el mayor, y vendran 15. diez y seys abos de ducado: y tanto es el valor de la cosa y precio de vna anega de ceuada. Y porque dize que la hanega de trigo costaua 2. 10. mas por 100. que es el diezmo mas, saca el diezmo de 15. diez y seys abos q̄ es el precio de la hanega de ceuada, y seran tres 32. abos

sumalos con los mismos 15. diez y seys abos, y montara vno y vn 32. abo, y tanto es el precio de la hanega de trigo. Prouaras ser esto verdad, en q̄ si multiplicas 30. hanegas de ceuada a 15. diez y seys abos de ducado, cada vna valdra 28, ducados, y vn ochauo de ducado. Afsi mismo multiplicado 60. hanegas de trigo a ducado, y vn treinta y dos abo de ducado, montã 61. ducados y siete ochauos, q̄ sumadas ambas multiplicaciones monta 90. ducados, que es lo que gasto.

13 ¶ Vno vendio paño por tantos reales la vara como el tercio menos 2. de las varas que vèdio y partiendo los reales que le dieron por la quarta parte de las varas que vendio, vèdra a la particion tanto quanto es el numero de todas las varas. Demando, quantas eran las varas, y quanto fue el precio de cada vara. Pon que vendio 1. co. de varas, la qual multiplicaras por vn tercio co. m. 2. y serã vn tercio ce. m. co. 2. como se mostrò en el tercero articulo del octauo capitulo, y tantos reales fueron los que le dieron. Agora parte vn tercio ce. m. co. por vn quarto co. (como se mostrò en el quarto articulo del octauo capitulo) y vendra vno y vn tercio co. m. 8. n. Lo qual igualaras a vna cosa, q̄ es el numero de todas las varas que dize que vendio, y quedara la igualacion desta manera, vno y vn tercio co. m. 8. yg. a 1. co. Quita 1. co. que esta en la vna parte de vno y vn tercio co. que esta en la otra (como manda

manda el quarto auiso del decimo cap.) y pasa los 8.n. que vienen menos en la vna parte a la otra como muestra el segundo auiso del mismo decimo capitulo, y quedara vn tercio co. yg. a 8.n. 8.n. Sigue la regla partiendo 8. que es lo que viene con el menor caracter, por vn tercio que viene con el mayor, y vendran 24. y tantas fueron las varas que vendio, las quales si las vende a 6. que es el tercio menos 2. de 24. montaran 144. Si partes estos 144. que son los reales que recibio por 6. que es la quarta parte de 24. que son las varas que vendio, vendran otros 24. que es tanto como las varas, como la demanda pide.

14. ¶ Vno comprò tantas varas de paño, que si les añades su tercio y quarto, la suma sera la r. del numero de las varas, demando, cuántas varas compro? Pon que comprò 1. co. de varas, juntado de 7. dozabos, que es tercio y quarto de la misma cosa, montara vno y siete dozabos co. esto igualas a r. de 1. co. que es el numero de las varas. Agora porque en la vna parte de la igualacion ay r. quadraras la otra (como manda el quinto auiso del capitulo dezimo) pues quadrando vno y siete dozabos (como se mostro en el auiso segundo, articulo sexto del capitulo quarto) vendra 361. ciento y quarenta y quatro abos cc. yg. a 1. co. Sigue la regla partiendo r. que viene con el menor caracter por 361. cientos y quarenta y quatro abos, que viene con el mayor, y uendra al co-

ciento ciento y quarenta y quatro 36. abos, por el valor de la cosa, y respuesta de la manda. Quiero dezir, q̄ ciento y quarenta y quatro 361. abos es el numero, q̄ si le añades su tercio y quarto, sera tãto como la r. de si mismo, como pide la demanda.

157 Dame dos numeros, que la mitad del primero sea tanto como el tercio del segũdo, y la sexta parte del segũdo, sea tanto como raya quadrada del primero. Pon por caso, q̄ el primero numero es 1. co. Y porq̄ dize, q̄ la mitad del primero ha de ser tãto como el tercio del segũdo, el segũdo sera cosa y media, saca aora el sexto deste segũdo, q̄ es cosa y media, y sera vn quarto de cosa. Este quarto sera igual a la r. del primero numero, q̄ es 1. co. y q̄ dara la igualaciõ desta manera, vn quarto cosa igual a r. 1. co. Aora porque en la vna parte dela igualacion viene r. quadraras la otra (como manda el quinto auiso del decimo capitu.) pues quadra al quarto dela cosa, multiplicãdolo por otro quarto cosa (como se mostrò en el octauo cap. artic. III.) y montara vn 16. abo de censo. Aora que la vna y la otra igualacion estã reduzidas a vna especie, igual a vn 16. abo censo, a 1. co. y no cures de la r. q̄ primero estaua con la cosa. Sigue la regla partiendo el vno q̄ viene con el menor caracter por el 16. abo que viene con el mayor, y vendra al cõciente 16. estos 16. es el valor de la cosa, y primero numero de los
dos

dos que te demandan. Aora para saber quanto es el segundo, no tienes que hazer otra cosa, sino buscar vn numero q̄ la mitad deste primero sea tanto como su tercio (como quiere la demanda) (el qual numero sera 24. porque de 12. el tercio es 8. el qual 8. es tanto como la mitad de 16. que es el primero. Afsi mismo la sexta parte de 24. que dizes ser el segundo numero es 4. pues otros 4. es la r. del 16. que es el primero.

16. ¶ Parte 16. en dos partes tales, q̄ partiendola mayor por la menor, venga al cobieto 100. Pon q̄ la primera parte es 1. co. La segúda ferá todos los 16. m. 1. co. Parte aora 16. m. 1. co. por 1. co. q̄ es la menor (como se mostrò en el quartito del cap. 8. y vendra 16. ^{om} 1. co. Lo qual igualaras a los 100. q̄ quisieras. Multiplica los 100. por 1. co. (como manda el 6. auiso del decimo capitulo) y vendra 100. co. (las quales igualaras a todos los 16. n. m. 1. co. que estan en la otra parte, desta manera 16. n. m. 1. co. yg. a 100. co. passa la una cosa que en la vna parte viene menos cō las 100 q̄ estan en la otra (como mãda el segundo auiso del decimo capitulo, y quedarã 6. n. yg. 101. co. Sigue la regla desta primera igualacion, partiendo los 16. que vienē con el menor caracter por los 101. que vienen con el mayor, y vendra al cociente 16. ciento y vn abos. y esta es la vna parte, y la otra sera lo q̄ falta de 16. ciento y vn abos, para todos los 16. enteros que partias, q̄

es 15. y ochēta y cinco, ciēto y vn abos. La prueua es, q̄ si partes 15. y 85. ciēto y vn abos (q̄ es la mayor parte) por 16. ciēto y vn abos (q̄ es la menor) vendra al cociente 100. como pide la demāda. 17 ¶ Vno gastò 10. ducados en paño uerde y colorado, y dize q̄ los ducados q̄ gastò en el verde multiplicados por los q̄ gastò en el colorado, y la multiplicacion partida por la diferencia de vno a otro lo que viēre a la particiōn fera tanto como los ducados que gastò en el verde. Pon que gastò en el verde 7. co. de ducados, y en el colorado 10. m. n. 1. co. multiplica 1. co. por 10. n. un co. (como muestra el tercero articu. cap. VIII.) y montara 10. co. m. ce. esto te fera particiōn. Agora quita 7. co. de 10. n. m. 1. co. para ver la diferencia: y quedara 2. co. m. 10. n. parte 10. co. m. 1. ce. por 2. co. m. 10. n. (como se mostrò en el 4. articulo del octauo capitulo) y vendra al cociente ^{10. co. m. 10. n.} _{2. co. m. 10. n.}: lo qual igualaras a 7. co. que es lo que gastò en el verde. Sigue el sexto auiso del capitulo X. y haz lo que la regla manda, y vendra 3. ce. y g. a 20. co. parte 20. por 3. y vendran 6. y dos tercios, por el valor de la cosa, y por lo que gastò en el verde, y lo que falta para 10. que son 3. y vn tercio gastò en el colorado.

18 ¶ Vno comprò diez hanegas de trigo y ceuada y dize, q̄ las hanegas del trigo partidas por 4 vendran 5. vezes tãto como las dela ceuada, partidas por 6. demando quãtas hanegas comprò de

sada

cada fuerte de grano. Pon que comprò 1.co.de hanegas de trigo, las quales parte por quatro, y seran vn quarto cosa: toma desto el quinto, que es vn veynteabo cosa: y multiplicalo por 6. y seran 3. decimos cosa: esto sera lo de la ceuada, Su ma aora 1.co. que es lo del trigo, con tres decimos de cosa q̄ es lo de la ceuada, y sera vna co- y tres decimos. Igualalo a 10. que son todas las hanegas de ambos granos, y parte lo que viniere con el caracter menor, por lo q̄ viniere con el mayor, y uendra 7. y nueue trezabos, y tanto es el valor de la cosa, y hanegas del trigo, y lo q̄ falta para 10. que son 2. y quatro trezabos, serã las hanegas dela ceuada.

Art. II. deste XIII. Cap. En el qual se ponen demã- das de la segunda igualacion.

¶ La segunda igualacion simple, compuesta de dos cantidades, es quando entre los dos caracteres q̄ se igualan falta vno, como si ce. se igualasse a n. entre los quales falta la cosa. O como si cu. se igualasse a co. entre los quales falta ce. y asì de otros qualesquiera. En semejantes demandas, partiras lo que viniere cõ el menor caracter, por lo que viniere con el mayor, y la del cociente sera el valor de la cosa, y respuesta de la demanda, como se declarò en el capitulo vn- decimo.

Exemplo.

2¶ Dame 3. numeros en quadrupla proporcion que multiplicado el primero por el tercero mō

te 144. Pon, que el primero numero deſtos tres que te demandan es 1.co. El ſegundo ſerá 4.co. El tercero 16.co. Agora multiplica el primero q̄ es 1.co, por el tercero q̄ es 16.co. y ſera 16.ce. (como ſe moſtrò en el tercero articulo del 8. capítulo) los quales ygualaras a 144, n. que quifieras q̄ vinieran deſta manera 16. ce. yg. a 144. n. parte como la regla deſta yguacion mãda 144 q̄ es lo que viene con el character menor por 16 viene con el mayor, y vendra al quociente 9. la r. de 9. q̄ es 3. es el valor de la coſa, y primero numero de los 3. que buſcas. Pues ſi a via coſa que puſiſte por el numero primero te vinieron 3. por las 4. coſas del ſegundo te vendran 12. y por los del tercero 48. La prueva es, que multiplicando los 3. del primero por los 48. del tercero, môtara 144. y los numeros ſe excedê en quadrupla por porcion, como la demanda pide. Nota ſi no tuuiera r. diſcreta dixeras ſer el valor de la coſa r. de 9. y tanto ſuera el numero primero. Para ſaber quanto es el ſegundo numero, quatro doblaras r. 9. multiplicando por 16. (como ſe moſtrò en el auifo 3. del art. 6. del 4. cap.) y montara r. 144. y tãto diras q̄ es el ſegundo, para ſaber el tercero, quatro dobla r. 144 multiplicado por otros 16. como arriba dixè, y montara 2304. agora multiplica r. 9. q̄ es el numero primero por r. 2304. q̄ dizes ſer el tercero, y vendra r. 20736. Saca la r. y ſera 144. como pide la demanda.

2. ¶ Dame vn numero, que juntado su quadrado, o potēcia cō el quadrado dela mitad del mismo numero, todo sea numero quadrado. Pon q̄ el numero demandado es r . co. su mitad es media cosa, quadra aora la cosa, y la media cosa ca da vna por (como se mostro en el segundo auiso del articulo sexto del quarto capitulo, y mōtarz vno, y vn quarto de ce. lo qual y gualras a vn qualquiera numero quadrado q̄ te pareciere, como a 25. q̄ es numero quadrado, y quedaran vno y vn quarto ce. yg. a 25. n. parte 25. n. por vno y vn quarto, y vendra al quociente 20. Saca la r. de 20. y porq̄ no la tiene, diras q̄ es de r , 20, y tanto sera el valor de la cosa y numero demandado. Prueuolo. La mitad de 20. (como se mostro en el segundo auiso del sexto articulo del quarto capitulo) es r . 5, agora el quadrado de r . 20. que dezimos ser el numero es 20. y el quadrado de r . 5. que dezimos ser mitad de r . 20. es 5. sumando 20, con 5. que son potencias del numero y de su mitad, hazē 25, el qual 25. es numero quadrado, como pide la demanda.

3. ¶ Que numero. sera aquel q̄ quitandole dos, y por otra parte añadiendole dos, y multiplicado la resta por la suma, mōte 10. p, r , 180. Pō q̄ el numero demādado es r , co. Si le quitas 2, quedara r . co, m , 2. y si le añades 2, sera r , co, p, 2. multiplica agora vna cosa m . 2, por vna cosa mas 2, (como se mostro en el tercero articulo del 3. capitulo)

tulo y montara $1. ce. m. 4. n.$ esto igualaras a $10. p. r. 180.$ q̄ quisieras, desta manera $1. ce. m. 4. yg. a 10. n. p. r. 180.$ Sigue los auisos del decimo capitulo, passando los $4.$ que en la vna parte vienen menos, con los $10.$ de la otra (como manda el segundo auiso) y quedara $1. ce. yg. a 14. n. p. r. 180.$ parte aora como la regla manda $14. n. p. r. 180.$ q̄ es lo q̄ viene con el menor caracter por el vno, que viene con el mayor (como se mostrô en el articulo nono, capitulo 9. de partir binomios, y vendran los mismos $14. n. p. a 180.$ Saca la $r.$ de este binomio $14. p. r. 180$ (como muestra el quarto articulo del nono capitulo) y vendra $3. p. r. 5.$ y tanto es el valor de la cosa, y numero demandado. Porque si a $3. p. r. 5.$ añades $2.$ seran $5. p. r. 5.$ y si quitas $2.$ quedaran $1. p. r. 5.$ multiplicando $5. p. r. 5.$ con $1. p. r. 5.$ que es lo sumado con lo restado (como muestra el octauo articulo del nono capitulo.) montara $10. p. r. 180.$ como pide la demãda.

Art. III. deste XIII. cap. En el qual se ponen demãdas para declaracion dela tercera igualacion simple de dos cantidades.

¶ La tercera igualacion simple de dos cantidades es quando entre el vn caracter y otro de los dos que se igualaren falta dos caracteres, de la continua proporcion que entre ellos ay. Como si cu. se igualasse a n. entre los quales faltan co. y ce. O como si ccc. se igualasse a co. entre los quales

quales falta ce. y cv. en semejante caso partiras la q. q̄ viniere con el character menor, por la q̄ viniere con el mayor, y la rayz cubica del cociente, sera el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda. Como se declaro en el capitulo vndecimo.

Exemplo.

1. ¶ Vno gastó su dinero en pimienta, canela, y clauos, y dize que lo que gasto en la canela es el duplo de lo que gasto en pimienta, y lo q̄ gasto en clauos en el triple de lo que gasto en canela, y multiplicando lo que gasto en la pimienta por lo que gasto en canela, y esta multiplicación multiplicada por lo que gasto en clauos, el vltimo producto es 96. Pon que gastó en pimienta 1. co. de ducados, y en canela 2. co. y en clauos 6 co. Multiplica estas 3, posturas vnas por otras, como se mostro en el tercero articulo del octauo capitulo, y montara 12. cv. los quales ygualaras a 96. n. que quisieras que vinieran, desta manera 1. yg. a 96. n. Parte agora como la regla manda los 66. que vienen con el character menor, por los 12. que vienen con el mayor, y védra al quociente 8. saca la rrr. de 8. que es 2. y táto gastó en pimienta. Y por consiguiente 4. en canela y 12. en clauos como lo puede prouar, haziendo lo que la demanda pide.

2. ¶ Vno gastó sus dineros en paño, y por cada 5. ducados comprò tantas varas como el duplo de los ducados que gasto, y despues védio cada

7. varas por tantos ducados como son la mitad de los ducados que gastò , y recibio por todos 304. ducados y ocho 35. abos de ducado, demandando quantos ducados empleo : y quantas varas comprò? Pon que gasto 1. co. de ducados. Para saber quantas varas compro, diras, si por 5. ducados dan 2. co. de varas, quedara por 1. co. de ducados. Sigue la regla de tres multiplicado y partiendo (como se mostrò en el tercero articulo del octauo capitulo, y vèdran dos quintos ce. de varas. Para saber por quãto las vendio diras, si 7. varas valen media co. que valdran 2. quintos ce. multiplica y parte como arriba heziste, y hallaras vn 35. abos cu. Lo qual igualaras a 304. y ocho 34. abos q̄ quisieras. Sigue la regla partiendo 304. y ocho 35. abos, que es lo que viene cõ el caracter menor, por vn 25. abos que viene con el mayor, y vendran 10648. desto toma la rrr. q̄ es 22. y tantos ducados gasto. Para saber quantas varas comprò diras, si por 5. ducados me dà 44. por 22. que me daran? Sigue la regla de tres, y vendra 193. y tres quintos, y tantas varas cõpro. Para saber por quanto las vendio, diras, si 7. varas valè 11. ducados, que valdran 193. y tres quintos. Multiplica y parte, y vendran 304. y ocho 35. abos de ducados, como pide la demanda. Agora pon por caso, que 10648. no tuuiesse rrr. discreta para saber las varas que compro, diras. Si por 5. ducados dan 44. varas, que me darã
por

por rrr. 10648. Multiplica y parte, como se mostrò en el quarto y quinto articulo del quinto capitulo, y vendrà rrr. 7256313. y ciêto y siete 125 abos por las varas que comprò. Para saber por quanto las vendio, diras, si 7. varas valè 11. ducados, que valdran rrr. 7256313. y ciento y 7. 125. abos. Sigue la regla de tres, multiplicando y partiendo, como arriba se hizo y vedrà rrr. 2815782 y veinte y siete mil , y quarenta y dos 42875. abos, que su rrr. es 304. y ocho 35. abos, como pi de la demanda.

¶ Nota, q̄ ay demandas que no consienten mudar la denominacion del quebrado que saliere al valor de la cosa, para hazer la prueua. Exemplo demanda tres numeros en dupla proporció q̄ multiplicados hagã 1. $\frac{1}{2}$ siguiendo la regla viene a ser el primero numero m. de $\frac{1}{6}$ y el segundo m. 1. de $\frac{2}{3}$, y el tercero m. de $5\frac{2}{3}$, y cõ esto es facil la prueua, y si dixessemos q̄ el 2. numero m. 1. $\frac{1}{2}$ y el tercero 10. $\frac{1}{2}$ no fale la prueua.

Art. IIII. deste XIII. cap. En el qual se ponen demandas dela quarta igualacion simple de dos cantidades.

¶ La quarta igualacion simple de dos cantidades es, quando entre los dos caracteres que se igualan faltã tres caracteres dela continua proporcion que entre ellos se guarda, como si ccc. se igualasse a n, entre los quales faltan tres caracteres. Quiero dezir, q̄ entre n. y ccc. faltan co.

ce.cv. O como si R. se igualasse a co. o al contrario la co. al r. entre losquales falta ce.cv.ccc. En semejantes igualaciones, la regla es, partir la cantidad que viniere con el menor caracter, por la que viniere con el mayor, como en todas las precedentes se ha hecho, y del cociente sacar dos vezes la rayz quadrada, y la vltima r. sera el valor de la co. y respuesta de la demanda, como en el capitulo vndecimo se trato. Exemplo.

¶ Dame 2. numeros en proporcion dupla, que multiplicando el cubo del numero menor, por la mitad del numero mayor, el producto monte 193. mas r. 34848. Pon que el primero numero y menor destos que te piden es 1. co. el mayor por consiguiente sera dos co. cubica 1.co. que es el menor como se mostrò en el auiso segúdo del articulo sexto del quarto capitulo (y montar vn cubo. Multiplica este 1.cu. por la mitad del mayor, q̄ es 1.co. y môtara vn ccc.) como se mostrò en el art. del 8. cap. el qual igualaras a 193. por 34848. desta manera vn ccc. yg. a 193. p. r. 34848 Sigue la regla partiêdo 193. p. r. 4848. q̄ es q̄ viene cõ el menor caracter, por 1. q̄ es lo q̄ viene cõ el mayor y vendra lo mismo al cociente, saca 2. vezes r. destos 193. p. r. 4848 (como se mostrò en el 4. articulo del nono capitulo) y vendra por la primera 11. p. r. 72. Saca mas otra vez la r. de estos mismos 11. p. r. 72. por la misma regla, y vendra 3. p. r. 2. y este es el numero menor de los 2. de
mane

mandados, y el otro sera 6.p.r.8. como lo puedes prouar, haziendo con ellos lo que la demanda pide. Porque el cubo de 3.p.r.2. que dizes ser el numero menor es 3.p. 1682. y la mitad de 6.p.r.8. que dizes ser el mayor es tres p.r.2. Multiplicando agora 45.p.r.1682. por 3.p.r.2. como se mostro en el 8. art. del nono cap. (môtara 193 p.r. 34848. como lo pide la demanda.

2. ¶ Vno compro ciertas varas de paño, las quales repartio a dos criados, dando al vno dobladas varas que al otro. Estos moços vendierõ este paño por tantos ducados la vara como varas recibio su compañero, y multiplicando los ducados q̄ hizo el vno por los del otro, montan 64 demando quantas varas dio a cada vno? Põ por caso que dio al vno vna co. de varas, y al otro 2. co. Y porque dize que cada vno vendiola vara por tantos ducados como varas tenia el otro, multiplica 1. co. de varas del primero, por dos co. q̄ son las varas del segundo, y montará 2. ce. (como se mostro en el tercero articulo, capitulo octauo) y tantos ducados hizo el primero. Assi mismo multiplica dos co. que son las varas del segundo por 1. co. de ducados, por razon q̄ el primero tiene vna cosa de varas, y montara otros 2. ce. y tãtos ducados hizo el segũdo. Agora porq̄ dize la demanda, q̄ multiplicando los ducados q̄ hizo el vno, por los q̄ hizo el otro, monta 64 multiplica 2. ce. que son los ducados

del primero, por otros 2. ce. que son los del segundo, y seran 4. cce. (como se mostrò en el tercero articulo del octauo cap.) los quales 4. cce. iguallaras a los 64. que quisieres q̄ salieran desta manera 4. cce. ig. a 64. n. Sigue la regla desta igualdad, partiendo 64 que es lo q̄ vienen con el menor caracter, por los 4. que vienen con el mayor, y vendra al cociente 16. Saca destos 16. dos vezes la r. como manda la regla, y vendran dos. y tanto es el valor de vna cosa. Y porque pusiste q̄ al primero le dio vna cosa de varas, y has sacado que la cosa vale dos, sigue se que le dio al primero dos, y porque al segundo pusiste dos cosas tomas el valor de dos cosas que son 4. Aora por quanto cada vno vendia cada vara por tãtos ducados, como varas tenia el otro, el primero vendio sus dos varas a 4. ducados, y asì hizo 8. El segundo vèdio sus 4. varas a dos ducados. Porque su compañero tenia dos varas, y asì hizo otros ocho. Y si multiplicas los ocho ducados q̄ hizo el vno por los ocho del otro, montara 64. como pide la demanda.

397 Vno tiene tres reles de plata, que sus leyes estàn en dupla proporcion, y multiplicando la ley del primero por el quadrado dela ley del segundo, y lo q̄ saliere buuelto a multiplicar por el cubo dela ley del tercero: esta vltima multiplicacion monta 186624. pido q̄ ley tiene cada riel? Pon por caso, que el primero riel tiene 1. co. de
dineros,

dineros, y porque las leyes de todos estan en du-
 pla proporcion, el segundo tendra dos co. y el
 tercero 4.co. Aora quadra la ley del segúdo riel
 que es 2.co. como se mostrò en el segundo auiso
 del quarto capitulo, articulo, y en el tercero ar-
 ticulo del octauo capitulo, y seran 4.ce. Afsi mis-
 mo cubica 4.co. que es la ley del tercero, por los
 mismos auisos, y capitulos, alegados, y seran
 64. cu. Aora multiplica 1.co. que es la ley del pri-
 mero riel, por 4.ce. que es el quebrado de la ley
 del segundo (como se mostrò en el tercero artí-
 culo del octauo capit.) y montaran 4.cvr. Mul-
 tiplica mas estos 4. cu. por 64. cu. que es el cubo
 de la ley del tercero riel montara 256. cecu. Lo
 qual igualaras a 186624. n. que quisieras, desta
 manera 256. cecu. yg. a 186624. n. entre los qua-
 les faltan cinco caracteres, que son co. ce. cu.
 cce. r. Sigue la regla como en las precedetes has
 hecho, partiendo 186624. que es lo que viene cõ
 el menor caracter: por 256. que vienẽ c. 4. el ma-
 yor, y vendran al cociente 624. de lo qual saca-
 ras el cecu. Quiero dezir, que saques la r. y de la
 r. la rrr. ò al contrario, saca primero la rrr. y de la
 rrr. la r. y vendran 3. de qualquiera suerte, y tan-
 to es la ley del primero riel, y los del segundo se-
 ran 6. los del tercero 12. Porque afsi estã en pro-
 porciõ dupla, y multiplicando 3. que es la ley de
 primero, por 36. que es el quebrado del segundo
 y lo que saliere buelto a multiplicar por 1718 q̄

es el cubo de la ley del terçero, môtara 186624 como la demâda pide. Esto es lo que quiere dezir la annotacion que se puso al fin del vndecimo capitulo.

Art. V. deste XIII. Cap. En el qual se ponen demâdas para declaracion de la primera y gualacion, compuesta de tres cantidades.

¶ La primera y gualacion de las compuestas de 3. cantidades es, quanto vienen tres caracteres continuos proporcionales, y q̄ entre ellos no falte otro ninguno. Como n. co. ce. O co. ce. cv. Y assi de otros qualesquiera, y que los 2. mayores se y gualen al menor. Como si ce. y co. se y gualasse, n. o cv. y ce. se y gualasse a co. en semejante caso partiras siempre las cantidades que viniere con los caracteres menores por la q̄ viniere con el mayor, y despues sacaras la mitad del cociente del mediano, y quadrarlahas, o multiplicaca por si mesma, y el producto, y potencia juntarseha con el cociente del menor caracter. La r. deste coujuncto, menos la otra mitad del cociente del mediano sera el valor de vna cosa, y respuesta de la demâda, como se trato en el duo decimo capitulo. Exemplo.

1. ¶ Dame vn numero, que juntandole 5. y por otra parte quitandole 2. y multiplicado la suma por la resta, monte 98. Pon que el numero demâdado es 1. co. si le jutas 5. n. sera 1. co, p, 5. n. Si la quitas 2. q̄ dara 1. co. m. 2. n. multiplicado 1. co

p. 5. n. que es la suma, por 1. co. m. 2. q̄ es la resta (como se mostrò en el 3. art. del 8. cap.) monta 1. cc. p. 3. co. m. 10. n. lo qual igualaras a 98. n. que quisieras que vinieran desta manera 1. cc. p. 3. co. m. 10. n. yg a 98. n. passa los 10. n. que vienen menos en la vna parte dela balança a la otra (como manda el segundo auiso del decimo capitulo) y quedara la igualacion desta manera 1. cc. p. 3. co. ig. a 108. n. Sigue la regla partiendo llanamente los tres, y los 108. que es lo que viene cõ los menores caracteres, por 1. que viene con el cc. que en este exemplo es el mayor, y vendra a los cocientes lo mismo: despues faca la mitad del cociente del mediano que es 3. co. y sera vno y medio: quadra vno y medio, y seran dos y vn quarto, juntalo con 108. que es el cociente del menor caracter, y montara 110. y vn quarto, faca la r. y sera diez y medio, quita desto la otra mitad del cociente del mediano, que es vno y medio, y quedaran nueue. Estos nueue es el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda. Porque si le añades cinco haze 14. y si le quitas dos quedan 7. Multiplicando 14. que es la suma, por siete, que es la resta, monta 98. como la demanda pide.

27 Dame dos numeros que el vno sea nueue mayor que el otro: y que el producto del vno por el otro sea 22. Pon que el vno sea 1. co. el otro, por q̄ dize que ha de ser 9. mas sera 1. co. p. 9. n. Multi-

plica el vno por el otro (como se mostrò en el tercero articulo del octauo capitulo) y montara 1. ce. p. 9. cosas. Lo qual ygualaras a 22. n. que quisieras q̄ fuerã. Sigue la regla partiẽdo 9. y 2. q̄ es lo q̄ viene cõ los menores caracteres, por vno q̄ viene cõ el ce. (q̄ en este exẽplo es el mayor) y vẽdra a los cociẽtes lo mismo. Aora faca la mitad del cociẽte del caracter mediano, q̄ es 5. y serã quatro y medio, quadralo y seran 20. y vn quarto, juntalos cõ los 22. q̄ es el cociẽte del menor caracter, y sera todo 42. y vn quarto, faca la 1. que es 6. y medio, dela qual quitaras la otra mitad del cociente del mediano que es 4. y medio, y quedaran 2. Estos dos es el valor de vna cosa: pues porque por el segundo n. presuposiste q̄ era 1. co. p. 9. junta 9. can 2. q̄ vale la cosa, y serã 11. y assi respõderas q̄ el vn num. es 2. y el otro 11. los quales se exc edẽ el vno al otro en 9. y multiplicados haçẽ 22. como pide la demanda.

3. ¶ Dame vn numero que multiplicãdo su potẽcia por 2. y el mismo numero por 7. jũtas ambas multiplicaciones mõte 225. Põ por caso q̄ el num. q̄ se pide es 1. co. multiplicando su potẽcia q̄ es 1. ce. por 2. serã 2. ce. assi mismo multiplicãdo. 1. co. (q̄ dize 5. ser el numero) por 7. serã 7. co. jũtos estos 2. productos q̄ el vno es 2. ce. y el otro 7. co. mõta 2. ce. p. 7. co. lo qual ygualaras a 225. n. q̄ quisieras. Sigue los auisos del X. cap. re f.

restando las 7. co. que en la vna parte estan mas
 de los 225. n. que estan en la otra, y porque vnos
 son numeros, y otros co. restaras con la diction
 del m. y quedara 225. n. m. 7. co. y deste modo
 quedaran yguales 2. ce, a 225, n, m. 7. co. sigue
 la regla partiendo los 225. y los 7. q̄ son las can-
 tidades q̄ vienen con los menores caracteres,
 por los 2. q̄ es la q. que viene con el mayor, y
 vendra por el cociente del menor 112. y medio
 y por el del mediano 3. medio, saca la mitad del
 cociente del mediano q̄ es 3. y medio y sera 7.
 quatro quadra estos 7. quartos (q̄ se haze mul-
 tiplicandolos por otros 7. quartos) y seran 45.
 diez y seys abos, que son 3. enteros y vn diez y
 seys abos, junta estos 3. y vn diez y seys abo, cō
 el cociente del menor caracter q̄ es 112. $\frac{1}{2}$ y mō-
 tara 115. $\frac{9}{16}$. Saca la r. de 15 $\frac{1}{16}$, como se mostrò en
 el 5. arti. del 4. cap. y vendra 10. y tres quartos,
 destos diez y tres quartos quita la otra mitad
 del cociente del mediano caracter que fue 3.
 $\frac{1}{2}$ y sera 1. $\frac{3}{4}$ pues de 10. y tres quartos quitando
 1 3. quartos quedaran 9. y tanto es el valor de la
 cosa y respuesta de la demanda. Quiero dezir, q̄
 9. es el n. que si su potencia q̄ es 81. la multipli-
 cas por 2. sera 162. asì mismo multiplicado el
 mismo 9. por 7. haze 6. juntas estas dos multipli-
 caciones mōta 215. como pide la demãda. y Da
 me 2. numeros en dupla proporciō q̄ la sumade
 ambos jūta cō el producto del vno cō el otro mō

re 44. Pópor ca so q̄ el n. primero es 1. co. el otro por q̄ ha de estar endu pla proporciõ sera 1. co. la suma de ambos 3. co. agora multiplica 1. co. por 2. co. que son vn n. por el otro y sera 2. ce. los quales juntaras cõ los tres. co q̄ es la suma de ambos, que montara 2. ce. p. 3. co. lo qual y gualaras a los 44. n. q̄ quisieras. Sigue la regla partiẽdo lo q̄ viene cõ los menores characteres por lo q̄ viene con el mayor que vendra por el cociẽte del mediano 3. medios, y por el del menor 22. Saca aora la mitad de los 3. medios y seran tres quartos quadra estos tres quartos, y seran 9. diez y seys abos, jantalos con los 22. q̄ es el cociẽte del menor, y mõtara 22. $\frac{2}{3}$. Saca la r. como se mostrò en el 5. art. del c. 4. y sera 4. y 3. quartos: desta r. quita los otros 3. quartos q̄ es la otra mitad del cociẽte del mediano, y quedaran 4. y tanto sera el valor del 1. co. Pues porque por el numero primero pusiste 1. co. y la cosa vale 4. luego el primero numero sera 4. y el segundo, porque pusiste 2. co. toma dos quattos que son 8. y assi diras que los numeros demandados son 4. y ocho, los quales estan en dupla proporcion, y multiplicados vno por otro montan 32. a los quales 32. si juntas la suma de ambos que es 12. montara 44. como la demanda pide.

¶ Dame dos numeros que el vno sea cinco mas q̄ el otro, y que la suma de sus potencias, o quadrados monte 193. Pon por caso, que el vn numero se

ro sea vn co. y porque el otro ha de ser 5. mayor
 sera 1. co. p. 5. n. la potècia de vna co. es ce. Así
 mismo la potencia, o quadrado (como se mostrò
 en los auisos del cap. 4. art. 6.) del segundo nu-
 mero, que es 1. co. p. 5. n. sera 1. ce. p. 10. co. p. 25.
 n. suma estas dos potencias, y serã 2. ce. p. 10. co.
 p. 25. n. lo qual ygualaras a 193. n. que quisieras
 agora sigue los auisos de ygualar del decimo ca.
 quitando los 5. n. que estan en la vna parte de
 los 193. n. que estan en la otra, y quedaran 2. ce.
 p. 10. co. yguales a 168. n. Sigue la regla partien-
 do los 10. y los 168. n. cada vno por si (q̄ es lo q̄
 viene cò los menores caracteres) por el 2. (q̄ es
 lo que viene con el mayor) y vendra al cocien-
 te del mediano 5. y al del menor 84. saca la mi-
 tad de 5. que es el cociente del mediano, y sera
 dos y medio, y quadralos y seran 6. y vn quarto
 como se mostro en el 6. art. del cap. 4. los qua-
 les juntaras con los 84. que es el quociente del
 menor caracter, y môtara 90. enteros y vn quar-
 to sacala r. como se mostro en el quinto articulo
 del 4. capitulo, y vèdra 9. y medio, y destes nue-
 ue medio, quita la otra mitad del cociente del
 caracter mediano, que es dos y medio, y queda-
 ran 7. estos 7. es el valor de la cosa, y el primero
 nu. de los dos que la demanda pide. Sabido esto
 porque el otro ha de ser 5. mas, sigue se que sera
 12. las potencias de los quales juntas q̄ son 49.
 y 144. montaran 193. como la demanda pide.

Art. VI. de este XIII. cap. Trata demandas de la segunda igualacion, compuesta de tres cantidades.

¶ La segunda igualacion compuesta de tres cantidades, es quando vienen tres caracteres igualmente distantes, y que los dos mayor y menor se igualan al mediano (como se mostrò en el duodecimo cap.) pues en tal caso partiras las cantidades que vinieron con los dos menores caracteres por la que viniere cò el mayor, y despues facaras la mitad del cociente del mediano y quadrarla has, y deste quadrado restaras el cociente del caracter menor y la r. dela resta mas, o menos la otra mitad del cociente del mediano, sera el valor de vna cosa, y respuesta dela demanda, como mejor se entendera por la practica de las demandas siguientes.

¶ Haz de 10. tales dos partes, que multiplicado la vna por la otra monte 21. pon por caso que la vna parte sea 1. co. la otra sera todos los 10. n. m. 1. co. multiplicado 1. co. por 10. n. m. 1. co. como se mostrò en el tercero articulo del 8. cap. montara 10. co. m. 1. ce. lo qual sera igual a 21. n. q̄ qui fueras, aora passa el 1. ce. q̄ en la vna parte viene m. a la otra con los 21. n. y quedara 10. co. iguales a 21. n. p. ce. Sigue lo que la regla mada que es partir los 21. y los 10. que son las cantidades, que vienen con los menores caracteres por el 1. que viene con el mayor: y vendran lo mismo

a los

a los cocientes. Saca la mitad de los diez que es cociente del menor, y sera cinco, quadrala como se mostrò en el sexto articulo del 4. cap. y montara 25. de estos 25. resta los 21. que es el cociente del menor, y restaran 4. de estos 4. saca la r. que es 2. estos 2. y mas la otra mitad del cociente del mediano que es cinco será siete, pues el menos aqui no tiene lugar, es el valor de la cosa, y respuesta de la demanda. Pues porque por la primera parte pusiste 1. co. y la cosa sale siete luego la vna parte sera 7. y porque lo que se parte son diez, siguese que la otra sera tres, y así diras q̄ las dos partes del diez son 7. y tres, los quales si se multiplica la vna parte por la otra montara veynete y vno, como la demanda la pide.

¶ Vno repartio 100. varas de terciopelo a 5. factores para que las vendiesen, y cada vno vendio su terciopelo por tantos ducados la vara, como varas vendio, este mercader recibio de todos 3800. ducados, demando quantas varas dio a cada factor? Esta no quiere dezir otra cosa, sino que diuidas ciêto en tres partes, que la suma de sus quadrados sea 3800. pues presupon a tu voluntad que al vno le dieron treinta las quales quita de las 100. y quedaran 70. quadras las 30. y seran 900. resta las de 3800. y quedaran 2900. agora, diuide 70. en dos partes, que la suma de sus quadrados sea 2900. lo qual se hara poniendo por caso que la primera fuesse 1. co. y la otra sera los

70.m.r.co. quadra estas dos partes y sera la primera 1.ce. y la segunda 14900.n.m.140.co.p.1.ce. y el primero quadrado q̄ tenias de 30. q̄ es 900. todo sumado montara 5800.n.m.14.co.p.2.ce. Lo qual ygualaras a 3800. desta manera 5800.n.m.140.co.p.2.ce. yg.a 3800. abreuia la yguacion (como muestra el primero auiso del dezimo capitulo) restando 3800.n.q̄ estan en la vna parte de los 500.n. que estan en la otra (como muestra el quarto auiso del mismo dezimo capitulo) y quedará 100.p.2.ce.yg.a 140.co. Sigue la regla partiendo lo que viene con los dos meoures caracteres, por el 2.ce, que en este exēplo es el mayor, y vendra al cociente del mediano 70. y por el del menor 1000. Saca la mitad del quociente del mediano, que es 35. y quadra los y seran 1225. destos quita el quociente del menor caracter, que es 1000. y restaran 225. Saca la r. q̄ es 15, a lo qual añadiras la otra mitad del quociente del mediano, q̄ es 35. y seran 50. y tantas son las que dio al otro. Pues si de 100. que erā todas, quitas 50. para vno, y 30. q̄ al principio dio al primero, q̄ dara 10. para el tercero. Suma los quadrados destas tres partes, que son 900. 2500. y 400. y montara 3800. como pide la demanda. Tén cuenta con los auisos que se pusieron en el duodécimo capitulo, tratádo sobre esta misma yguacion.

*Art. VII. deste XIII. cap. En el qual se ponen demã
das de la tercera igualacion, compuesta de tres
cantidades.*

¶ La tercera igualacion compuesta de tres cãti-
dades (como declaramos en el duodecimo capi-
tulo) es quando de los tres caracteres se igualã
los dos menores al mayor. Como si n. y co. se
igualasse a ce. O como si ce. y cu. se igualassen a
cce. En tal caso partiras las cantidades q̄ vinie-
ren con los menores caracteres, por la cantidad
que viniere con el mayor (como se ha hecho en
las precedentes) y despues quadraras la mitad
del cociente del mediano, y juntar la mitad del
cociente del menor, y la r. deste conjunto, y mas
la otra mitad del cociete del mediano, sera el va-
lor de la cosa, y respuesta de la demanda, como
por la practica de las demandas siguientes me-
jor se entendera.

¶ Dame dos numeros en dupla proporciõ, que
restando del producto del vno en el otro la suma
de ambos numeros queden 9. pon que el vno
destos numeros es 1. co. El otro sera 2. co. Porq̄
la demanda dize que esten en dupla proporcion
el producto del vno en el otro es 2. ce. destos 2.
ce. resta la suma de ambos que son tres co. y
quedaran 2. ce. m. 3. co. esto es iguala 9. n. q̄ qui-
fieras que quedaran. Sigue los anifos del 10. ca.
sumando las 3. co. que en la vna parte vienem-
menos con los 5. n. que estan en la otra, y queda

ran 2. ce. iguales a 9. n. p. 5. co. Sigue la regla partiendo los 9. y las 3. co. q̄ son las cantidades que vienen con los menores caracteres por los dos que vienen con el mayor, y vendra por el cociente del mediano tres medios, y por el del menor quatro y medio. Saca la mitad de tres medios, y seran tres quartos, quadralos, y montara 9. diez y seys abos, junta esto con el cociente del menor que es 4. y medio, y montara 5. enteros, y vn diez y seys abo, saca la r. como se mostrò en el quinto articulo del quarto cap. y vendra 2. y vn quarto, la qual junta la otra mitad del cociente del mediano, que son tres quartos, y montara todo tres enteros, y tãto es el valor de vna cosa. Pues porque por el numero primero pusiste 1. co. y la cosa en este exemplo vale 3, di q̄ el primero numero es tres, y porque por el segundo pusiste 2. co. toma dos treses q̄ son 6. y estos seran los dos numeros que la demãda pide, porque estan en dupla proporcion, y si del producto del vno en el otro que es 18. quitas la suma de ambos que es nueue, quedaran nueue: como se pide.

2. ¶ Vno comprò ciertas varas de paño, a razon de 4. ducados la vara, el qual las boluio a vender por tantos ducados la vara como varas cõpro, y hallo que auia ganado 21. ducados, demando, quãtas varas comprò. Pon que compro 1. co. de varas, la qual multiplica por 4. y fera . 4 co. jun-

ta cō ellas 21. y seran 4. co. p. 21. n. lo qual ygu a-
 laras 1. ce. que son las varas que compro mu lti-
 plicadas por si desta manera 4. co. p. 21. n. yg. a 1.
 ce. Sigue la regla partiendo las cantidades que
 vienen con los caracteres menores, por la q̄ vie-
 ne con el mayor, y en este exemplo vendrá a los
 cōcientes lo mismo. Saca la mitad del quocien-
 te del mediano, q̄ es 2. y quadralos y seran 4 jū-
 talos con el cociente del menor que es 21. y se-
 ran 25. la r. es 5. Pues junta 5. con la otra mitad
 del cociente del mediano, que es 2, y seran 7.
 y tantas varas compro. Y pagando 4. ducodos
 por vara, todas costaron 28. y vendiendo a 7. du-
 cados cada vara, hizo 49. do parece claramente
 auer ganado 21. como dize la demanda.

*Artic. VIII. deste XIII. Cap. En el qual se ponen
 demandas para declaracion de la ante penul-
 tima anotacion, que se puso al fin del
 capitulo undecimo.*

1. ¶ Dame vn numero q̄ el quadrado de su qua-
 drado junto con el quadrado del mismo nume-
 ro haga 20. Pon que el numero demandado es
 vno co. su quadrado de quadrado (como se mo-
 strò en el segundo aniso del articulo sexto del
 quarto capitulo, y en el tercero articulo del octa-
 uo cap. es 1. cce, y el quadrado del mismo nume-
 ro, s 1. ce. junta 1. cce, co. 1. cce, y sera 1. cce, p. 1
 ce. Lo qual ygualará a los 20. n. que quisieras q̄

vinieran desta manera 1.ccc. p. 1. cc. y g. a 20. n. notoria cosa es, q̄ entre ccc. y cc. falta vn caracter q̄ es el ev. así mismo entre cc. y n. falta otro q̄ es la co. esto es lo q̄ quiere dez r. que entre cada dos falte vn caracter. Pues por q̄ en esta igualdad se igualaron ccc. y cc. que son los mayores a n. que es menor, por tanto, seguiras la regla de la primera y igualdad de las compuestas de tres cantidades, partiendo lo que viene con los dos caracteres menores, por lo que viene con el mayor. Pues parte 1. y 20. que es lo q̄ viene con los menores caracteres por 1. que es lo que viene con el mayor: y vendra lo mismo. Ahora saca la mitad del cociente del mediano que es 1. y sera medio, multiplicalo por si, y sera vn quarto, este quarto juntalo con el cociente del menor, que es 20. y seran 20. y vn quarto. Saca la r. de 20. y vn quarto, y vendra quatro y medio, quita de estos quatro y medio la otra mitad del cociente del mediano, q̄ es medio, y quedaran 4. estos 4. es el valor de vn censo, del qual sacaras r. q̄ sera 2. y tanto vale la cosa, y estos 2. en el numero demandado, como lo puedes prouar haciendo lo que la demanda pide.

2. ¶ Dame vn numero, q̄ juntado 9 al quadrado de su quadrado, sea tanto como si el quadrado del mismo numero le multiplicasse por 10. Pó q̄ el numero demandado es 1. co. su quadrado de quadrado es 1.ccc. porque vna cosa multipli cada

cado por si misma haze 1. cc. este cẽso multipli-
 cado otra vez por otro, haze 1. ccc. (como se
 mostro en el tercero art. del octauo capit. y en
 el segundo quiso del articulo sexto del quarto
 capitulo) a este 1. ccc. juntale 9. n. y sera 1. ccc. p.
 9. n. y porque dize que esto ha deser tanto como
 si multiplicas el quadrado del mismo numero
 por 10. por tãto quadraras la 1. co. que dizes ser
 el numero, y sera 1. cc. multiplica este 1. cc. por
 10. n. como se mostro en el tercero articulo del
 octauo cap. y sera 10. cc. los quales ygualaras a
 1. ccc. q. 9. n. desta manera 1. ccc. p. 9. n. yg. 10. cc.
 Sigue la regla de la segunda ygualacion de las
 cõpuestas de 3. cantidades, partiendo lo que vie-
 ne con los caracteres menores, por loque viene
 con el mayor que sera partir 9. y 10. por vno, y
 vendra por los cocientes lo mismo. Saca la mi-
 tad del cociente del caracter mediano, y sera 5.
 quadra estos 5. y seran 25. destos 25. quita 9. que
 es el cociente del menor, y restaran 16. toma la
 r. de 16. y sera 4. y mas la otra mitad del cocien-
 te del mediano, que es cinco, que todo haze 9.
 es el valor de vn cc. y r. destos 9. que es 3. sera el
 valor de la cosa, y respuesta de la demãda. Quie-
 ro dezir que este 3. es el n. que piden.

¶ Nota en esta ygualacion porq̃ dize la r. de la
 resta p. o. m. de la otra mitad del cociente del me-
 diano sera el valor de la cosa. Bien has visto que
 en la demanda precedente q̃ sacaste nueue del

quociente del mediano de 25. que fue el quadrado de la mitad del cociente del mediano : y te quedaron 16. la r, de 16. fue quatro. Pues si de estos quatro quitas la otra mitad del cociente del mediano, q̄ es cinco como manda la regla, quando dize mas, o menos, no podria ser, antes parece imposible : pero si le juntas la mitad como haziste arriba, viene bien ; por tanto ten auiso quando en esta y gualacion te viniere , de tentar lo vno, y lo otro. . . Quiero dezir, que si no viniere bien, quitando, que la hagas sumado, y las demandas que pudieres quitar y añadir, tendrá muchas respuestas.

3. ¶ Dame vn numero que quadrándole dos vezes haga tanto como añadiendo a su mismo quadrado 22. Pon que el numero que te piden es 1. co. quadrá esta cosa dos vezes, diciendo 1. co vez es 1. co. monta 1. cc. Otra vez 1. cc. vezes vn cc. es 1. ccc (como se mostro en el tercero artic. del octauo capit.) este 1. ccc. ha de ser tanto como el quadrado de 1. co. q̄ es vn cc. y mas 72. n. Pues yguala lo vno a lo otro desta manera 1. ccc. yg. a 1. co p. 72 n. Sigue la regla partiendo lo que viene con los caracteres menores (q̄ en este exemplo) es 1. y 72. por lo que viene con el mayor q̄ es 1. y vendra lo mismo a los cocientes. Saca la mitad del cociente del mediano , q̄ es 1. y sera medio, quadrá este medio (como se mostro en el segundo auiso del sexto arti. del 4. capi.) y sera

vn quarto, jútalos con 72. que es el cociéte del character menor, y sera 72. vn quarto, saca la r. destos, 72. y vn quarto y sera 8. y medio júra cõ estos 8 y medio la otra mitad del quociéte del mediano, que es medio y sera 9. eitos 9. es el vade 1. ce. de lo qual sacaras la r. que es 3. y tanto vale la cosa, y tanto es el numero que la demanda pide. En lo demas remítome a la penultima annotacion del capitulo duodécimo.

Art. IX. deste, XIII. CAPI. Trata de la regla de la segunda cosa o cantidad.

¶ En esta regla por la mayor parte se pone vna cosa por respuesta de la demanda (como se ha visto en los capitulos precedentes) mas ay muchas demandas q̄ para venir a su vltima respuesta es necesario poner otra posicion, y porque la segunda posicion se diferencia de la primera, ponen vna cantidad que se figura desta manera, q. con la qual se procede haziendo lo que la demanda pide, hasta tanto que se haga vna igualacion. Y despues passaras de la vna parte de la igualacion a la otra lo que viniere (siguiendo los auisos del capitulo decimo, hasta que la q. quede igualada a la otra parte, y partiras lo que viniere con los caracteres de la vna parte por lo q̄ en la otra viniere con la q. y lo que viniere a los quociétes sera el valor de vna q. si despues fuere menester otra posicion, pondras otra q. y haras con ella lo que la demanda pidiere, como

mejor entenderas por la practica de las deman-
das siguientes.

12. ¶ Haz de 2. y dos tercios cosa p. 18. n. tales.
dos partes, que quitando 12. dela segunda parte
y añadiendolos a la primera sea la primera el
triplo de lo q̄ quedara a la segunda y mas, 30. Pō
que la vna parte sea 1. q. y la otra sera todas las
2. y 2. tercios cosa, p. 18. n. m. q. quita 12. de los 8.
y juntalos a la primera parte, q̄ es 1. q. y fera 1. q.
p. 12. n. esto es yg. a 2. y dos tercios cosa p. 6. n.
m. 1. q. lo qual multiplicaras por 3. porque dize
q̄ ha de ser el triplo la vna queda otra, y seran 8.
co. p. 18. n. m. 3. qs. con esto junta 3. que ha de ser
mas q̄ el triplo, y fera todo 8. co. p. 21. n. m. 3. q.
ygualalo a 1. q. p. 12. n. v. quedara la ygualación
desta manera 8. co. p. 21. n. m. 3. q. yg. a 1. q. p. 12.
n. Sigue los auisos de ygualar, passando 3 q. q̄ vien
nen menos en la vna parte con la 1. q. de la otra
y quitando 12. que vienen demas en la otra par
te de los 21. desta otra (como manda el segundo
y primero auiso del dezimo capitulo) y quedara
ra la ygualación desta manera 8. co. p. 9. n. yg. a
4. qs. parte lo que viené con la cosa, y con el
numero, por lo que viniere con la cantidad, y ven
dra dos co. p. 2. y vn quarto n. y esto es el valor
de 1. q. Y porque a la primera parte pusiste 1. q.
por tanto diras, q̄ la primera parte es 2. co. mas
2. y vn quarto n. Y la otra parte fera lo que falta
para dos y 2. tercios cosa p. 18. q̄ es dos tercios
cosa

cosa p. 75. y tres quartos n. Agora para hazer la p. ueta, pon que la cosa vale 6. o lo que quisieres segun esto las dos cosas que dizes ser la vna parte, seran doze, con los quales juntaras dos y vn quarto, q̄ vienen mas con las dos cosas, y montara todo 14. y vn quarto. Assi mesmo, porque la segunda parte dizes q̄ es dos tercios de cosa, y mas 15. y tres quartos, toma los dos tercios de 6. (q̄ has presupuesto q̄ vale la co.) y seran 4. juntalos con 15. y tres quartos, y montara 19. y 3. quartos, y tanto diras q̄ es el valor de la seguda. Agora si quitas doze de q̄os 19 y tres quartos, q̄ dizes ser la segunda parte, y los juntas a los 14. y vn quarto (que es valor de la primera parte) sera la primera 26. y vn quarto, y a la segunda quedar le han 7. y tres quartos, y assi hallaras q̄ la primera es el triplo, y mas tres que la seguda como la demanda pide.

2. ¶ Dame tres numeros de tal condicion q̄ sumando el primero y el segundo es la mitad del tercero la suma sea 30. y el segundo tercero con el tercio del primer hagan 30. y el tercero y primero con el quarto del segundo hagan 30. demãdo, &c. Põ, que el tercero numero sea 1. co. del qual toma la mitad que es media cosa, y quitalo de 30. y quedarã 30. m. media co. por los otros 2. Luego los otros 2. seran 30. n. p. media cosa. Agora pon q̄ el segundo numero es 1. q. y los otros 2 seran 30. n. p. media co. m. 1. q. a lo qual

junta vn tercio del primero, que es vn tercio q.
 y fera todo 30.p. media co. m. dos tercios q. y ef
 to fera yg. a 30. que quisieras. Yguala tus partes
 dando dos tercios q. que en la vna vien en me-
 nos a la otra (como mada el segundo auiso del
 dezimo capitulo) y restando 30.n. de los 30. (co
 mo manda el quarto auiso del mismo capitulo
 dezimo) y quedara media co. yg. a dos tercios
 q. Parte la cosa por la q. y vendran 3. quartos co.
 por el numero primero, despues pon, q̄ el segun
 do n. sea 1. q. y los otros seran 30.n.p. media co
 m. 1. q. a los quales junta vn quarto del segundo
 q̄ es 1. y seran 30.n.p. media. co. m. 3. quartos q.
 lo qual yguala a 30. Sigue los auisos del dezimo
 capitulo, como arriba, y vendra media cosa yg.
 a 3. quartos, q. Parte media cosa por 3. quartos
 q. y vendran dos tercios cosa, por el tercero nu
 mero. Suma agora todas las tres partes, y seran
 dos y nueue dozabos cosa yg. a 30.p. media co
 sa. Yguala y parte el numero por la cosa, y ven
 dran 15. y quinze veynte y tres abos, por el ter
 cero numero, y tanto vale la cosa, de lo qual to
 ma los tres quartos, que son 11. y diez y siete 23
 abos por el primero. Y despues de 15. y quinze
 veynte y tres abos, toma los dos tercios (q̄ son
 10. y diez veynte y tres abos) por el segundo,
 como lo puedes prouar.

4. ¶ Dame tres numeros de tal cõdiciõ, q̄ quita
 dos 12. del segundo y tercero, y juntos cõ el pri
 mero,

mero, el primero sea el duplo de los otros dos p. 6. y quitados 13. del tercero y primero, y juntandolos al segundo, el segundo sea el quadruplo de los otros dos p. 2. y quitados 11. del primero y segundo, y juntandolos con el tercero, el tercero sea el triplo de los otros 2. p. 3. Põ q̄ el primero numero sea vno co. al qual junta 11. y sera 1. co. p. 12. quita desto 6. n. y quedara 1. co. p. 6. desto saca la mitad, y sera media co. p. 3. por los otros 2. numeros, y assi todos 3. numeros, seran vna cosa y media p. 15. n. Despues pon por caso, q̄ el segundo numero sea 1. q. a la qual junta 13. y sera 1. q. p. 13. n. desto quita dos y quedara 1. q. p. 11. n. desto toma la quarta parte y seran quarto q. p. 2. y 3. quartos n. Esto y gualaras a vna cosa y media p. 2. m. 1. q. q̄ son los otros 2. numeros m. 13. y guala y sigue los auisos del dezimo cap. y parte lo q̄ viene cõ el n. y la cosa por lo que viene con la q. y vendra vno y vn quinzabo cosa m. tres quintos n. por el segundo numero. Prosigue poniendo por exemplo q̄ el tercero es 1. q. a la qual junta 11. y seran 11. n. p. 1. q. Desto quita tres y quedaran 8. n. p. 1. toma el tercio y sera 2. y dos tercios n. p. vn tercio q. Y gualalo a vna cosa y media p. 4. m. 1. q. q̄ son los otros dos numeros m. 11. Sigue los auisos de ygualar del X. cap. y vendra vna cosa y media mas vnos y vn tercio n., a ygualarse a vno y vn tercio q. Parte el n. y lo q̄ viene cõ la cosa, por

Lo que viene con la q. y vendra r. y vn ochauo co-
 fa p. 1. por el tercero numero. Suma agora los 3
 aduenimientos, y montara 5. y treze quarenta
 abos cosa. p. dos quintos n. Lo qual ygualaras a
 1. cosa y media p. 15. n. Sigue los auisos de igua-
 lar quitando dos quintos q̄ vienē en la vna par-
 te de la ygualacion de los 15. n. que estan en la
 otra (como manda el primero auiso del dēcimo
 capitulo) y quitando vna cosa y media de 3. co-
 sas y treze quarentabos cosa (como manda el
 4. auiso del mismo dezimo capitulo) y quedara
 vna cosa, y treynta y tres quarentabos de cosa
 yguales a 14. y tres quintos n. parte lo que vie-
 ne con el n. por lo que viene con la cosa, y ven-
 dra 10. por el tercero numero, y 9. por el se-
 gundo, y 8. por el primero. Y assi se haran las se-
 mejantes. Omne in consuetum est obscurum, vt
 inquit Philotophus.

*Capit. XIII. En el qual se pone vna breue recopi-
 tacion de todas las ygualaciones.*

¶ Segun se colige del capitulo vndecimo, y duō
 decimo, las ygualaciones, no solamente son 6.
 ni 7. ni 8. ni 10. como frater Lucas, y otros mu-
 chos antiguos y modernos dixerō, antes puede
 ser infinitas. Porque si primera ygualacion dize
 quando entre el vn caracter y otros de los dos
 q̄ se ygualā, co, falta ningun caracter, y segunda
 quando falta vno, y tercera, quando faltan dos,
 &c. si se de esto, q̄ si faltā 20. la ygualacion se-
 ria

riaz i. y assi se podria proceder en infinito cōlas simples de dos cantidades, y lo mismo seria en las compuestas de tres, o mas cãtidades. Por lo qual en este capitu. no tratare otra cosa, sino poner quatro reglas generales q̄ comprehendan y abracen todas qualesquiera igualaciones, aunque procedan en infinito.

¶ La primera regla sea, quando vn caracter se igualare a otro continuo proporcional. Quiero dezir, que no falte grado ninguno de la continuacion proporcional q̄ entre los caracteres se guarda, como si co. se igualasse a ce. O al contrario el ce. a la co. o cv. a ce. o n. a co. &c. En tal caso partiras lo q̄ viniere cō el menor caracter, por lo que viniere con el mayor, y el cociente sera el valor de vna cosa y respuesta de la demãda (como en el articulo primero del decimo tercio capitulo, y vndecimo se tratò) y si entre el vn caracter y otro delos dos q̄ se igualaren, faltare vno como si cẽsose igualasse a n. entre losquales les falta la cosa. O como si cu. se igualasse a co. entre los quales falta ce. &c. Partiras lo q̄ viniere con el menor caracter, por lo que viniere cō el mayor, y el cociente sera el valor de vn ce. y su r. sera el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda, como se declarò en el articulo segundo del decimotercio capitulo. Y si entre los dos caracteres que se igualaren faltassen dos, como si cẽ. se igualasse a co. entre los quales falta ce. y

ce. y cv. O. como si cv. se yqualasse a n. entre los quales falta ce. y co. En tal caso, vendra el valor de vn cubo, cuya rayz cubica sera el valor de la cosa, y respuesta de la demanda, como en el tercero articulo del decimo tercio capitulo se declarò. Y si faltaren tres caracteres, como si ccc. se yqualasse a n. entre los quales falta cv. y ce. y co. Sigue la regla partiendo lo que viniere con el character menor, por lo que viniere con el mayor: y el quociente sera vn ccc. cuya rr. sera el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda, como en el quarto articulo del decimo tercio capitulo se declarò. Y si faltaren quatro caracteres partiendo lo que viniere con el menor character, por lo que viniere cõ el mayor, lo q̄ viniere al quociente, sera el valor de vn relato primero, y su rayz relata sera el valor de la cosa y respuesta de la demanda (como en el quarto articulo del capitulo decimo tercio demanda tercera mejor entenderas) y si faltaren cinco caracteres entre los dos que se yqualaren, parte como en todas hazes lo que viniere con el menor character, por lo que viniere con el mayor, y el quociente sera el valor de vn cccv. del qual sacando r. y de la r. la rrr. o al contrario sacando primero rrr. y de la rrr. la r. vendra el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda, y assi procederás en infinito con los demas caracteres.

2.ª La segunda regla es, q̄ quando de tres caracteres

raçterres ygualmēte distātes, se ygualā los 2. ma-
yores al menor. Afsi como ce. y co. a n. &c. En
femejāre caso haras lo que manda el 12. cap. en
el 5. art. del 13. cap. Y si entre cada vno destos 3
carācteres q̄ se ygualan faltasse 1. Como si cce. y
ce, se ygualasse a n. seguiras la misma regla, y lo
q̄ viniere sera el valor de 1. ce. y su r. sera el valor
de vna cosa, y respuesta de la demanda. Y si en-
tre cada 2. faltassen 2. seguiras la misma regla, y
lo q̄ viniere al cociēte, sera el valor del cubo, y su
rrr. sera el valor de la cosa, y respuesta de la de-
māda. Y afsi procederas en infinito. Mira la an-
notaciō antepenultima del cap. 12. y la primera
demanda del octauo artic. cap. decimotercio.

3. ¶ La tercera regla es, quando de tres caracte-
res ygualmēte distantes, se ygualaren el mayor
y menor al mediano. Como si ce. cv. y cce. se igua-
lassen a R. y desta manera otros qualesquiera, en
tal caso haras lo que manda el capitulo duode-
cimo, y lo q̄ se declaro en el sexto articulo del
dezimotercio capitulo. Y si entre cada dos cara-
cteres destos 3. q̄ se ygualaren faltasse vn chara-
cter, como si cce. y n, se ygualassen a ce. seguiras
la misma regla, y lo que viniere sera el valor de
vn ce. y su r. sera el valor de la cosa, y respuesta de
la demanda. Y si entre cada dos faltassen dos, lo
que viniere al cociēte sera vn cubo, y su rrr. se-
ra el valor de vna cosa, y respuesta de la deman-
da. Y si faltassen tres, lo q̄ viniere sera cce, y su

rr. sera el valor de vna cosa. Mira la ante penultima annotacion del duodecimo capit. y la segunda demanda del octauo articulo deldecimo tercio capitulo.

4. ¶ La vltima regla es, quando de los tres caracteres se ygualaré los 2. menores al mayor. Como si co. y n. se yguallasen a ce. y assi de otros qualesquiera. En tal caso haras lo que manda el duodecimo cap. Y si entre cada dos caracteres de los tres que se ygualaren faltasse vno, seguiras la regla deste mismo duodecimo capitulo, y lo que viniere sera vn ce. y su r. sera el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda, y si faltassen dos vedra cubo, y su rrr. sera el valor de vna cosa, y assi procederas en infinito. Mira la antepenultima annotacion del duodecimo capitulo, y la tercera demanda del articulo octauo, capitulo decimotercio.

¶ Nota en todas las ygualizaciones q̄ se han puesto en las demandas de los capitulos precedentes siempre se ha yguulado vn caracter a otro, o 2. avno, si viniessen tres, o mas a ygualarme a vno, tendras la regla que en la demanda siguiente se pondra. Dos tienen reales, el vno 7. mas que el otro, y cada vno gano con cada real tantos ducados como reales tenia, y multiplicando los ducados que gano el vno por los q̄ gano el otro montan 14400. ducados, pido quantos reales tenia cada vno? Pon que el vno tuuiesse 1. co. de

reales, el otro porque dize q̄ tenia 7. reales mas
 tendrá 1. co. p. 7. y porque dize que cada vno ga
 no con cada real tantos ducados como reales te
 nia (que es lo mismo que si dixera, que gano tá
 tos ducados como el quadrado, o potencia de
 sus reales) toma vna cosa, que es lo que tiene el
 primero, y quadrala, como se mostrò en el ter
 cero articulo del octauo capitulo, y en el segun
 do aniso del articulo sexto capitulo quarto, y se
 ra vn ce. y tanto es lo que gano el primero. Qua
 dra 1. co. p. 7. n. que es lo que tiene el segundo
 y montara 1. ce. p. 11. corp. 49. n. y tátos son los
 ducados que gano el segundo. Agora multi
 plica vna ce. que es la ganancia del primero por
 1. ce. p. 14. co. p. 49. n. (que es la ganancia del
 segundo) montara 1. ccc. p. 4. cv. p. 49. ce. como
 se mostrò en el tercero articulo del octauo capi
 tulo, lo qual ygualaras a 14400. que son los du
 cados que quisieras que vinieran, desta manera
 1. ccc. p. 14. cv. p. 49. ce. yg. a 14400. n. quedarán
 tres caracteres yguales a vno, pues en estas y
 en sus semejantes sacaras la r. de cada parte de
 la ygualacion. Quiero dezir, q̄ sacaras la r. de 1.
 ccc. p. 14. cv. p. 49. ce. como se mostrò en el quin
 to articulo del octauo capitulo, y vèdra 1. ce. p.
 7. co. Saca la r. de 14400. n. q̄ es la otra parte de
 la ygualacion, y sera 120. numeros, yguala a ora
 vn censo, mas siete cosas q̄ es ia r. de la vna par
 te a cièto y veynte numeros, q̄ es la r. de la otra
 desta

deita manera r. ce. p. 7. co. yg. a 120. n. Sigue la primera regla de las ygnalaciones compuestas de tres cantidades, capitulo duodezimo, y vendra 8. por el valor de vna cosa, y respuesta de la demanda, y tantos reales diras que tenia el primero. Y porque al segundo diste vna cosa, mas 7. junta 7. con 8. q vale vna cosa y seran 15. y tantos tenia el segundo, como puedes prouar haziedo lo que la demanda pide.

¶ En algunas questiones sera necessario sacar r. o rr. o rrr. despues de hecho todo lo que la regla manda para saber el valor de la cosa.

¶ Nota, si como pusiste en esta demanda, que el primero tenia vna cosa, y el segundo vna cosa p. 7. pusieras al primero vna cosa m. 2. y al otro 1. co. p. 9. vinieran dos caracteres yguales a vno, y assi se euitera lo dicho.

¶ Nota tambien puedes haze esta demanda, y sus semejâtes, sacâdo r. de 1440. y vendra 120. despues ordenaras vna regla, diziendo. Dos tienen reales 7. el vno mas que el otro, y multiplicando lo del vno por lo del otro, hazen 120. Siguiendo la regla vendran dos caracteres yguales a vno, como por la otra via se hizo.

Cap. XV. Trata de rayzes vniuersales.

¶ Las rayzes vniuersales (como se trato en el septimo y octauo auiso del quarto capitulo) se engendran del sumar, o restar qualesquiera rayzes faldas. Assi como auiedo de sumar r. de 3.

con r. de dos, suma 3. cō 2. y seran 5. despues multiplica 3. por 2. y seran 6. laca la r. de 6. y porque no la tiene discreta diras que es r. de 6. dobla 12 multiplicando por 4. (como se mostrò en el septimo arriculo del quarto capitulo) y seran rr. 4. los quales se juntaran con los 5. que guardastes, desta manera, rv. 5. p. r. 24. Quiero dezir, que mōta rayz quadrada vniuersal de 5. mas r. de 24. lo qual se entiende deste modo, que sacando la r. de 24. si ser pudiesse, y juntandola con los cinco llanamente la r. deste cōjunto sera la suma de r. 3. y r. de 2.

¶ Entendido este presupuesto, la regla general para sumar, restar, multiplicar, partir de rv. es, q̄ en la rv. hara como si fuesse r. y en la r. como si fuesse rr.

Exemplo.

¶ Suma rv. 13. p. r. 144. con rv. 13. p. r. 144. Suma r. 144. con r. 144. como si fuesse rr. y mōtara 2304 como se mostro en el tercero arriculo del septimo capitulo. Afsi mismo suma rv. 13. con rv. 13 como fuesse quadrada, como se mostro en en el septimo arriculo del quarto capitulo, y montara r. 5. junta esta r. 52. con r. de dos mil y treientos y quatro, cō la diction del mas, desta manara rv. 52. p. r. 2304. y tanto monta sumando rv. 13. p. r. ciento y quarenta y quatro, con rv. 13. p. r. ciento y quarenta y quatro. Y afsi sumaras las semejantes. En lo que toca al p. y m. mira el arriculo primero del octaouo capitulo.

¶ La razon porque la rv. se obra como r. y la r. como rr. es porque la r. que viene adelante de la rv. se saca dos vezes, y de la rv. no mas devna: por que quando dezimos rv. 13. p. r. 144. quiere dezir que saques la r. de 144. que es 12. esta es vna vez. Luego juntas estos 12. cō los 13. y hazē 25. La r. de 25. es 5. pues quando de 25. se saca la r. otra vez, dos vezes se ha sacado de los 144. y solo la vna vez de los 13. La misma razon sera para la rrv. para rr.

¶ Exemplo de restar. Pon por caso que quieres restar rv. 5. p. r. 16. de rv. 45. p. r. 1296. Resta r. 16. de r. 1296. como si fuesse si vna y la otra rr. y siguiendo la regla del tercero articulo del capitulo septimo, restara r. 16. Resta mas rv. 5. rv. de rv. 45. como si fuesse rayzes quadradas, como se mostrò en el septimo articulo del quarto capitulo, y quedara rv. 20. Juntese con la r. 16. y sera todo rv. 20. p. r. 16. y assi responderas que restando rv. 5. p. r. 16. de rv. 45. p. r. 1296. quedan ru. 20. p. r. 16. En lo que toca al p. y m. mira el segundo articulo del octavo capitulo.

¶ Exemplo de multiplicar. Multiplica rv. 5. p. r. 16. por rv. 5. p. r. 16. Multiplicar. 16. por r. 16. como si facien rr y montara r. 256. como se mostrò en el quarto articulo del capitulo septimo. Assi mismo multiplica con la misma r. 16. la rv. 5. de arriba, quadrando primero la rv. 5. y seran 25. por razon que dize la regla que la r. es rr. y la

montara r. 400. Ya que has multiplicado con r. 16. multiplica con la rv. 5. quadrandolo 5. para multiplicar la r. 16. que está arriba, y montara r. 400. Multiplica mas rv. 5. por ru. 5. Como si fue r. y montara r. 25. Suma agora la multiplicacion y montara v. 25. p. r. 1600. p. r. 256. Que sacando la r. de 256. que son 16. y de la r. 1600. que es 40. junto todo con 25. montara r. 81. que es nueue. Mira el quarto articulo del nono capitulo. Y en lo que toca al p. y m. el tercero del octauo capi.

¶ Exemplo de partir. Parte rv. 32. p. r. 124. por 2 parte ru. 32. por el dos, como si fuese rr. quadrando primero los 2. y seran 4. agora parte 32. por 4. y vendran 8. parte mas la 1024. por el 2. quadrado dos vezes los 2. (porque la r. 1024. se ha de partir como rr.) y seran 16. parte 1024. por 16. y vendran 4. 64. junta estos con los 8. desta manera, ru. 8. p. 64. y assi diras, q̄ partiēdo ru. 32. p. r. 1024 por dos cabe a rn. 8. p. r. 64. Nota si el partidor fuera residuo, o binomio, haras con el lo que he ziste en la tercera y quarta diferencia del nono articulo del nono capitulo, y despues que ayas reduzido el partidor r. vn sola q. assi como a nmero simple, o algun genero de rayz, partiras teniēdo auiso si el partidor es n. quadrado vna vez quando partieres la rv. y quadrado dos vezes para partir la r. y si el partidor fuere r. parte la rv. por ella llanamente, y quadrando la r. del partidor para partir la r. de la particion. Esto es, por

razon que dize la regla, q̄ en la rv. se ha de obrar como r. y r. como rr. Mira lo que has hecho con la rv. por que si fuere rrrv. vniuersal en la rrrv. sumaras, y restaras, y multiplicaras, y partiras como si fuesse rrr. segun se mostrò en el quinto capitulo, y la r. que viniere con la rrrv. como si fuesse dos vezes rayz cubica. Y si la rayz vniuersal fuere rrv. la rrv. haras cuenta que es rr. como se mostrò en el septimo capitulo, y la r. que viniere con la rrv. como si fuesse dos vezes rr. No me detengo en esto: porque por mucho papel que en declarar lo gaste, los principiantes no lo entenderan mejor.

¶ La razon, y demostracion de lo que en este libro se ha tratado, se pondra en otra parte con el auxilio diuino. Porque (como dize el Philosopho.) *Tunc scimus cum res per causas cognoscimus.*

Lib. 1.
Posteriorum

Tan entanto esto me parece que basta por principio desta regla de la cosa. Diga otro lo que mas quisiere, que con la caridad que nos enseñare, recibiremos el zelo de su

correction.

(†)

Fin del Libro Septimo.

TRATA DE ALGUNOS CARACTERES de cuentas, monedas, y pesos antiguos, juntamente con vnas reglas para sacar las fiestas que dizen mobiles.

CAPITULO PRIMERO.

Trata de diuersos caracteres de numeros que usaron los Romanos.

DIZE Valerio Probo. Libro. De Ponderibus, que si todos los numeros se huieran de representar por la figura de vna raya, huiera necesidad que el numero de diez se escriuiera con diez rayas, y el nueue con nueue, y assi en infinito. Y porque esto fuera gran fastidio, ordenaró (porq̄ con muchas rayas la vista no se engañasse) q̄ los numeros que no llegassen a 5. se representassen, poniendo por vno j. y por dos ij. y por tres iij. y por quatro iiij. y que dos lineas juntas por la parte inferior desta manera V. valiesse 5. y de aqui viene que la X. vale diez, porque es compo

*Filan-
dro so-
bre el
10. de
vitru-
uio. ca.
21.*

ficion de dos V. que cada vna vale cinco. La L. vale cincuenta, porque es mitad de esta figura (que antiguamente valia cinco.) Estas figuras siguientes valen a mil (x). **8** **0** **M.** **P.** **C**. Esta figura IX. vale nueue, y esta XL. quarenta, y afsi XC. nouenta. por vna regla que dize todo numero menor que se antepusiere a otro mayor, se entiende que lo que montare el menor, se ha de quitar de la mayor, como diximos en el c.6. del lib. 1. La C. vale ciento, porque es letra capital deste nombre ciento. Esta figura **U**. vian por mil en la cuenta Castellana, porque es letra final deste nombre mil, que por hazerla de vna buelta, la dexan cerrada por la parte inferior. Esta figura **∞**. denota dozientos la o junta con algun numero haze valer tantos cientos, quãtos el numero a qui se junta, e valiere vuidades. Porque desta manera **II**. denota dozientos, y afsi **V**. quinientos. En algunos moldes antiguos hallaras por 4. esta figura **o**. y por cinco estas **s**. **l**. y por siete **A**. y por diez esta **+**. y por doze esta **+** y por diez y seys **h**, y por diez y siete **l**. esta figura **o** denota quinientos, y esta **+** mil, por la regla, que precedio de juntarse la, o con algun numero, ay otra regla (la qual refiere Valerio Probo) que dize todo num. q̄ sobre si tu uiere raya, denota tantos millares quantos el tal numero valiere vuidades. Quiero dezir,

*Lib. de
Ponde-
ribus,
O. mē-
suris.*

porque

porque vna C. vale ciento, si se pone vna raya sobre ella desta suerte. $\overline{c}$ valdra ciē mil. Y así cō otros numeros. Desta regla nacen tantas diferēcias de figuras quantas ay numeros, y aun muchas mas, porque si deste modo $\overline{c}$ quiere dezir cien mil, así $\overline{1}$ querra dezir diez vezes cien mil que es lo que dezimos cuento. Y así $\overline{c}$ quinientas vezes cien mil, que son cincuenta $\overline{D}$ cuē

*En la
poligra
phia.*

¶ Hemos dicho que esta figura $\overline{CI}$ vale mil agora digo que tantas quantas cees le añadies y igualmente a cada vna y otra parte de la I. tantas vezes se acrecentara su valor en 10. tanta cantidad quanto primero valiere. Quiero dezir, q̄ si desta suerte $\overline{CI}$ vale mil, así $\overline{CCI}$ valdra diez mil, y así $\overline{CCCI}$ cien mil. Segun la opinion de Alciato, y de Pedro Vitorio en la exposicion desta figura $\overline{HS CCCLXXX}$. De la quinta epistola del libro primero de Ciceron ad Atticū. La qual dize que monta ciē mil y treynta sextercios, y que la L. que está entre las cees se hade entender ser I. Mas segun lo que en otros autores hallo, mas se llegan a razon que estas figuras tomen el valor del producto que resultare de la multiplicacion del valor de la vna por el de la otra. Quiero dezir, que porque esta figura $\overline{CCI}$ está compuesta de

*Lib. 10
c25. Pa
rergron*

dos destas CIJ. q̄ por causa de breuedad, o por que es modo de multiplicar en linea no se puso assi CIJ. CIJ. q̄ multiplicaras el valor dela vna que es mil, por el de la otra que tambien es mil diciendo, mil vezes mil: y montara vn cuento, y tanto sera su valor. Por el semejante si a esta CCIJJ. que dezimos que vale vn cuento le jures otra C. a cada parte que con la I. de en medio (que sirue a todas) vale mil, sera lo mismo q̄ multiplicar vn cuento que vale la primera por mil q̄ vale la q̄ se junta q̄ montara mil cueros. Y assi se puede proceder en infinito. A esta razon se llegã muchos caracteres de cuẽta de los Griegos, como parece por esta figura Δ con la qual denotan cinquenta, porque la Δ valen a cerca dellos diez (porque es principio deste nombre Deca, como en el segundo capitulo mejor entenderas) y por estar abraçada con la Π que vale cinco, es tanto como si se multiplicasse el valor de vna por el de la otra. Cada vno tome la opinion que mas le agradere: a mi esta me parece lleuar mas razon. Porque de otra manera se contradizen muchas cuentas, que entre Griegos y Latinos se vsan. Lo qual no es de pensar otra cosa, sino que entre todas naciones aunque con diferentes caracteres de numeros se conformaron para poder entenderse vnos a otros, porque de otra manera no pudieran viuir politicamente.

De aqui viene que esta figura IMI . valga cinco mil: porque hemos de presuponer que está la M que vale mil entre dos rayas cerradas por la parte superior que vale cinco, como se dixa al principio deste capitulo. Y esta M (vale diez mil, porque está la M . que vale mil entre vna.) (y no se puede poner en medio, sino es partiendola) (en dos partes así) (.Cada vna destas figuras siguientes M M (M) vale vn cuento por las reglas dadas de las cees. Estas figuras DM . Q) denotan y valen a medio cuento, q̄ son quinientos mil maravedis. Porque la D . vale quinientos puesta ante de la M . que vale mil, son quinientas mil, y porque la Q . es primera letra desta dición quinientos y la Q . es letra final desta figura (1) que hemos dicho que vale mil, de aqui viene, que quinientas mil se pongan como se ha dicho. Sale de aqui otra regla general, y es, que quando dizen que esta figura (1) vale mil, la media así D . valdra medio mil, que es quinientos. Este es el origen de valer la D . quinientos. Y esta (X .) vale lo mismo, por q̄ es mitad desta figura (X) que vale mil. E si esta ((1)) vale diez mil, o lo que quisieres su mitad desta manera 1)) valdra la mitad del valor que valiere toda. Y si quisieres tomar las mitades de ázia la mano siniestra de alguna figura, así como CCl . ay necesidad que la I . se anteponga a las cees, desta manera ICC . porque se diferencie de docientos y vno

Y por esta misma regla vale esta figura D)) segun la primera opinion cincuenta mil, y segun la segunda, quinientos cuantos, porque es mitad desta figura ((I)) y pense D. por esta I). Esta figura DMI))) vale quinientos cuantos de cuantos. Hallanse estas cuentas a cada passo principalmente en Plinio de natural historia. Y en Ciceron en la oracion Pro Roscio Commodo, y en las epistolas familiares. Y en las de ad Q. Fratrem.

Capitulo II. Trata de las figuras de numeros que usaron los Griegos.

¶ Los Griegos usan de las letras de su alphabeto por numeros de cuenta, y esto en tres modos. El primero, dando a cada letra el numero segun su asiento en que la tal letra estuviere como parece.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A. B. Γ. Δ. E. Z. H. Θ. I. K. Λ. M. N.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Ξ. Ο. Π. Ρ. Σ. Τ. Υ. Φ. Χ. Υ. Ω.

¶ El segundo modo, que ultra de los 24. caracteres que tienen en su alphabeto añaden estos tres **Ξ** **Μ** **Θ** y hazen 27. y dividentos en 3. partes de 9. en 9. en cada parte con las 9. primeras, le notan, y asientan unidades, con las otras 9. siguientes dezenas, y con las terceras denotā las centenas como parece figurado.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

A B. Γ. Δ. E. P. Z. H. O.

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90.

L. k. Λ. M. N. Π. Ϟ. ϟ. Ϡ. ϡ.

100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.

P. Ϝ. T. Y. Ϙ. X. Y. Ω. Ϟ.

¶ Las letras que se añadieron son el character q̄ vale 6. y el que vale 90. y el que vale 900.

¶ Noto, vna duda se puede ofrecer, diziendo, que la Ϝ. segun la primera orden de contar vale 9. porq̄ está en el noueno lugar, y segun esta segunda orden vale 10. Pues siendo esto assi, en q̄ conoceremos si es 9. ò si es 10. y lo mismo se puede dudar en otros characteres. A esto se responde, que la primera orden de contar dando a cada letra el numero de su asiento, no se hallara en cuenta que denote cantidad de moneda. Solamente se sirven della para denotar el numero de algunos libros. Esto usó Homeron en sus obras.

¶ La tercera diferencia y orden de contar con 5. characteres componen, y hazen otros muchos, assi como con las seys figuras dela cuenta (que dizen Castellana) se cõponen otras 21. figuras. Los characteres son estos. ϟ. Δ. H. X. M. la ϟ por cinco porque es principio desta diction. ϟ. quiere dezir cinco. La Δ vale diez, porque es principio desta diction Διξα. que quiere dezir diez. H. se pone por ciento. X, por mil, porque

porque es principio desta diction **XI** mil. que quiere dezir mil **M**. se pone por diez mil, porque es principio desta diction **XX** que quiere dezir diez mil. Esta figura **I** Δ vale 50. La razon es, porque se multiplica Δ la de en medio que vale diez por la **I** que vale 5. y por esta regla vale esta figura. **IFI** quinientos, y esta **IX** cinco mil, como se dixo en el precedente capitulo de las ceas.

¶ **V**ltra desto se da vna regla general, y es que puesta debaxo de qualquiera letra vna virgula la tal figura valdra tantos millares quantos valiere por si vnidades. Quiero dezir que la **A**. vale vno, si le pones vna raya desta suerte **A**. vale mil.

Capitulo III. Trata de las figuras de numeros que usaron los Hebreos, y Chaldeos, y Arabigos.

¶ Los Hebreos contauan como los Griegos con su alphabeto, en esta manera, que 22. letras principales, y cinco que llaman finales las diuiden en tres partes de a. 9. letras cada parte: con las primeras denotan vnidades, con las siguientes los diezes, con las vltimas los cientos, como parece figurado.

9.	8	7.	6	5.	4	3.	2	1.
Ⲛ	Ⲙ	Ⲛ	Ⲙ	Ⲛ	Ⲙ	Ⲛ	Ⲙ	Ⲛ
90	80	70	60	50	40	30	20	10
ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ
900	800	700	600	500	400	300	200	100
ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ	Ⲛ	ϣ

¶ Ultra dello, quando quieren assentar alguna cantidad de millares, vsan de letras que dizen capitales. Quiero dezir, que vna a pequeña vale 1. Si se haze grande vale mil. La misma orden guardan en las demas. Nota algunos en lugar de las letras finales añaden estas.

900	800	700	600	500
Ⲛ	Ⲛ	Ⲛ	Ⲛ	Ⲛ

¶ De la composicion destas letras, o por mejor dezir, juntando vnas con otras vienen a hazer todos los numeros que hã menester para el vso de sus tratos.

¶ Nota para 15. no juntan el caracter que vale 10. con el que vale vno, sino el que vale nueue, con el de 6.

¶ Los Chaldeos, y Arabigos cuentan de misma manera con sus Alphetos.

Cap. IIII. Trata de ciertos caracteres de cuenta, que usaron algunos Astrologos antiguos.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I I I I I I I I I

10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90.

I I I I I I I

100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900.

L L L L L L L L L

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

I I I I I I I I I

¶ Ultra destes números juntado vnos cō otros denotauan la cantidad que querian. Esta figura vale 557. Esta N 7240. Esta 12009. 9000000. Esta 900000000Esta figura vale 9000000000000.*Capit.V. Trata de los caracteres de cuenta que vsaron los Godos.*

¶ Los Godos vsauan los mismos caracteres de cuenta que vsamos nosotros en la cuenta q̄ dezimos. Castellana, o Romana, solamente ay diferencia en el 9. que le ponian asfi viiiij. y el nouenta LXC. porque esta Xc. denota quarenta.

Cap.VI. Trata la orden de contar por los dedos de las manos, y otras partes del cuerpo.

¶ Los antiguos contauan con los dedos de la mano siniestra hasta 99. y con la diestra desde 100. hasta 9900. desta manera, que para denotar vno, doblegauan el dedo mínimo, de arte que toque a la palma de la mano. Y doblegando de

la misma manera el medicus con el minimo de
 nota 2. doblegando el medius cō estos dos deno
 ta 3. leuantando el minimo, y dexando los otros
 cerrados, denota 4. leuātando el dedo medicus
 dexando doblegado el medius denota 5. leuan-
 tando el medius, y doblegando el medicus de-
 nota 6. Desto se entenderá lo q̄ dize Macrobio,
 pidiendo la razon porq̄ se pone la fortija en este
 dedo medicus mas que en otro ninguno, entre
 otras muchas causas dize, porque en este dedo
 se denota el numero de 6. (como hemos mostra-
 do) y porque el 6. es el primero numero de los
 perfectos, a dedo q̄ numero tan excelente deno-
 ta, es razon q̄ se le dé premio y se coronē con la
 fortija. Boluendo al proposito para denotar, 7.
 doblegan el dedo minimo todo lo possible de
 arte que llegue a la rayz de la mano si ser pudie-
 re. Y para ocho, doblegauan de la misma suerte
 el dedo medicus juntamente con el minimo. Pa-
 ra 9. doblegauan el medius con estos dos, y con
 la punta del indice sobre la juntura de en medio
 del pollez 10. El pollez doblado para dentro 20
 juntando la punta del index cō la del pollez 30.
 el pollez sobre el index haziendo cruz 40. Ro-
 deando cō el index la punta del pollez 50. Ro-
 deado el index al pollez por medio 60. Rodean-
 dole mas abaxo quāto mas pudiere 70. Echādo
 el pollez sobre el index 1. hecho cruz, sino muy
 apretados 80. El index doblado hatta la rayz del
 pollez

*En el 7
 de los sa-
 turna-
 les.*

*Lee el
 c. 2. del
 lib.*

lex 90. De aqui passamos a la mano derecha, y donde en la mano yzquierda eran 10. aqui son 100. y donde 20. aqui 200. y assi cōsiguiéteméte hasta 900. y donde en la siniestra eran 10. aora es mil, y dōde 20. 2. mil, &c. hasta 9000. boluiendo a la mano siniestra, la qual arrimada al pecho, y la palma arriba haze 10000. la palma en el pecho 20000. la palma para abaxo 30000. enfréte del obliquo la palma arriba 40000. la palma abaxo 50000. enfrente del muslo siniestro la palma hazia arriba 60000. y puesto abaxo 70000. enfréte de la ingle siniestra la palma azia arriba 80000. la palma abaxo 90000. Passamos otra vez a la diestra, y de la misma manera contamos desde ceē mil hasta nueue ciētos mil. Vn cuēto se seña la cō ambas manos enxeridos los dedos. Haze mencion deste modo de cōtar Iuueual, quando dize Felix nimium qui per tot sacula mortē distulit, atque suos iam dextra computat annos. Y plinio libro 34. capitulo 7. Y Macrobio libro 1. c. 9. tratando del Iano (que era Presidente del año) dize que le figurauan con la mano diestra trecientos, y con la siniestra sesenta y cinco, (que es el numero de los dias de todo el año) pues segun hemos mostrado la estatua de Iano estaua dando vna higa con la mano siniestra que denotaua por ella 65. Y las cabeças del index y pollex juntas en la derecha, con los quales denotauan 300. Haze tambien menciō desta orden

de contar. Erasmo en la espoficion del lib. 1. de S. Hieronymo contra Iouinianum. Y el mismo S. Hieronymo al principio del li. 1. ca. 13. sobre el Enangelio de S. Matheo. Muestra contra así Ifidoio, y Henrico Bandano en la question 12. del feptimo quodlibeto. Y Beda Anglo Saxon en el tratado de natura rerum, y Antonio de Lebrixa en la anotacion 15. de la tercera quinquagena. Los primeros inuentores desta arte de contar no se sabe, mas segun los Egypcianos eran amigos de pocas palabras, como dize Theodoro en el li. q̄ intitula de Cræcatum affectionû curatione, destes deuio salir esta inuencion.

De monedas antiguas. Cap. VII.

¶ Queriendo tratar de moneda no sera fuera de proposito començar del nombre mas comun, y este es pecunia, cuya significacion se estiende no solamente a moneda a moneda, mas aun a qualesquiera bienes muebles y rayzes: como se colige de Salustio quando dize. Mandò que sus bienes se publicassen. En otra manera se entien- *In oratione*
de por qualquiera moneda. Este vocablo pecunia se derriua de pecus, porq̄ los antiguos tenian *Cassaris.*
en solo ganado su caudal, o porque en la moneda hazian escuplir vna figura de algun ganado: *ris.*
aunq̄ Donato, denota, declarâdo a quel verso de *Aneid.*
Vir. Taurino quâtû possent circûdare tergo. Di *lib. 1.*
ze q̄ la primera moneda fue de cuero de buey, o de oueja por mejor dezir. Otros dizê q̄ la prime

1.33.6. ra moneda eran pedaços de metal sin figura, los
 3, quales se dauã por peso, y de ay se llamo stipen
 diũ el suldo q̄ quiere dezir peso de metal. Plinio
 dize q̄ la primera moneda fue señalada con vna
 marca, o señal, có la qual señalauã los ganados.
 Argentũ, no tã folamẽte se toma por el mismo
 metal de plata, mas por todo linage de dinero de
 la misma plata. Plautus Diẽ, aquã solẽ, lunã noc
 tẽ hæc argento nõ emo: cætera, quæ volumus vti

*In Asi
 varia.*

Ca. 55.

Græca mercamur fide. Esaias. Qui nõ habetis
 argẽtũ properate, omite absq; argẽto. Numisma
 es nõbre general para qualquiera moneda. Vi
 desto, porq̄ despues la primera moneda se hizo
 en metal, q̄ en Latin se llama æs ætis, todo gene
 ro de moneda se llama æs. Declara esto Virg. di
 ziẽdo. Ludire securi quibus est æs semper in ar
 ca. Vlpianus. Etiã ibi aureos numos serper æs di
 cimus, de suerte q̄ aunq̄ la moneda sea de plata,
 o de oro se puede llamar por este nombre Aes.
 ætis.

*Epigra
 ma de
 Ludo.
 ff de ver
 sig.*

De As y de sus partes. Cap. VIII

¶ El primer numero q̄ usaron los Romanos era
 de peso de vna libra, como se colige de plinio,
 y esta moneda se llama As, que pesaua 12. onças
 era de metal no labrado, viendo se la republica
 en en necesidad, reduxo el As, a peso de dos on
 ças por ganar las 10. onças. Despues en tiempo
 de Anibal Capitan Carthaginense, se reduxo a
 peso de vna onça despues la hizieron de media
 onça, yes de saber, que aunq̄ huuo diminuciõ en
 el

*li. 33.
 o. 3.*

el peso no le huuo en el valor. Este As segun Budeo, vale quatro marauedis. Somase As portoda la hazienda.

¶ Diuidese en doze partes la primera se llama vncia, q vale 2. cornados, a razõ que 3. cornados hazen vna blanca, y de aqui vendra semiuncia, por vn cornado, o centi Portugues. Dizese vncia, porque es vna parte de doze que tiene el As, Sexcuns, o fescuns, fescuncia por tres cornados (que es parte y media) pesa onça y media, vale tanto como vna blanca.

*Vide
asconiã
Peai-
nũ ubi
tract.
de Mi-
lone.*

¶ Sextans por quatro cornados es peso de dos onças, es la sexta parte del As.

¶ Quadrans, es la quarta parte del As vale 6. cornados, es lo que dezimos ternuncijs, o marauedi nuestro, y es peso de tres onças.

¶ Triens eran 8. cornados, peso de 4. onças, es la tercia parte del As.

¶ Quincuns 10. cornados, peso de 5. onças.

¶ Semis, o semi, es la mitad de qualquiera cosa aqui se entèdera por la mitad del As, es peso de 6. onças vale 12. cornados que son 2. marauedis Septunx 14. cornados, y peso de 7. onças.

Ces, is, o befsis, vale 16. cornados, y es peso de 8. onças, es tanto como 2. trientes.

¶ Dodrans 18. cornados, que es tres marauedis que antiguamente dezian ardite, pesaua 9. onças como se collige de Vatron, es tanto como si se restasse del As el quadrante.

*Lib. 4.
de ling.
Latin.*

¶ Dextans moneda era q̄ valia 20. cornados, peso de 10. onças, es tanto como si se quitasse el sextante del as, como lo dize Festo Pompeio.

Decuns, o deunx 22. cornados, es peso de 11. onças, es tãto como si quitassemos la vncia del As.

As vale 24. cornados, q̄ son 4. marauedis. El As se dize por otra denominaciõ, libella, o p̄do, y haziafe siẽpre de plata, como parece por la autoridad de M. Varrõ en el 4. lib. de ling. lati. en dõde dize ser la libella la decima parte del denario q̄ segun esta cuenta del denario valia 10. asses, q̄ son 10. quartos: figurase en vna destas maneras.

⊕ † X X X La libella, o pondo se figura en vna destas maneras.

LL. como lo muestra Valerio Probo. Difa 3 p̄dius, o dupondius erã lo q̄ dezimos 8. m̄s. Porq̄ p̄do indeclinable

*Lib. de
Pond-
ribus,
& men
juris.*

significa tãto como la libra, pues cõpuesto cõ esta preposiciõ di. o du. q̄ valẽ tãto como duo assiduo p̄do 2. vezes 4. m̄s figurase en vno destos 2. modos.

LL. Nota como dezimos di p̄dius por 2. libras, assi se dize, assip̄diũ, por 1 p̄dio. Notad este nõbreas, se cõponẽ 6. generos de monedas. Semis de la qual arriba tratamos, tresis q̄ vale 12. marauedis Oetussis 8. quartos, decussis 10. quartos Vigesis 20. quartos, q̄ estãto como vntoistõ Portugues, Cētussis 100. quartos.

De sestertio masculino. Cap. IX.

Sestertius en el genero masculino, era moneda harto vsada a cerca de los Romanos Figurase de esta manera HS. Y antiguamente se figuraua

afsi IIS. de dos cantidades, y la S. que denota medio por ser primera letra desta dición semis q̄ quiere dezir mitad. mas por mayor intelligēcia traueffarō la S. cō vna línea q̄ se entendiēse q̄ denotaua mitad, y la passō línea por los dos II y afsi quedo figurado de H. y S. partida denota dos ases y medio, que valen diez maruedis.

De sestertium neutro. Cap. X.

¶ Sestertiu en el genero neutro tiene la misma cōposició q̄ en el masculino, era vn genero de peso q̄ pesaua 2. libellas y media de plata como el otro las pesaua de cobre, vale 10. mil mañs. figurase como el masculino. En este se ha de notar, q̄ a do quiera q̄ se hallare alguna cantidad de sestercios sin subitantiuo, afsi como Ducēta. Tringinta, quadraginta, entiēde se deste sestertio neutro. Y es de saber q̄ porrazō q̄ en algunos casos se terminā como el mascul, no para quitar duda de qual de los 2. sestercios de entiēde, acoñūbra rō añadir alta dición numus para denotar q̄ quādo se pusiesse numus q̄ era masculina. Esta dición numus algunas vezes se toma por qualquiere dinero. Iuuenalis. Quantum quisq; sua nummorum seruat in arca tantum habet, & fidei.

Dei Denario y Victoriatu. Cap. XI.

¶ Denario era vna moneda de plata, la qual se cuñō en tiēpo q̄ Pyarro tomo armas contra Italia, valia tanto como diez asses q̄ son 40. maruedis. Aunque Budeo en el tractado de Aise di-

Lee Valerio li 5. era. 2 Satyra 3.

volusio lib. de asse.

zevaler 10. marauedis. Deste nombre Denarius vino Quinarius de cinco asses, q̄ marauedis. Victoriatuſ vale agora tanto quanto antiguamente Quinarius, q̄ ſon 20. marauedis, hallaſe vnas vezes a cerca de los Latinos en el genero masculino, y neutro de qualquiera genero tiene vn miſmo valor, y no ſe muda como el ſeſtertio.

De auro & didrachmali. Cap. XII.

¶ El auro es vna moneda muy vsada acerca de los eſcriptores, hallaſe en nombre diminutiuo, mayormēte acerca de los Poetas quādo en el verso no pueden poner Aureos ponen Aureolos. Mart. Aureolos vltro quatuor ipſa pecit. Y peſa ua tanto, quanto agora peſan dos reales de los nueſtros. Y por eſta raxon ſe dize por otro nombre Didrachmalis, no porque el valga dos dragmas: mas porque tiene el peſo dellas, ſu valor eran cien nummos, ò ſexterios masculinos, que hazen mil marauedis de nueſtra moneda. Eſto coligio acutiſſimamente Alciato cotejan do dos lugares, el vno de Cornelio Tacito, con otro de Suetonio Tranquillo, que tratauan de la miſma materia.

De ſolido. Cap. XIII.

¶ A ſia otro genero de moneda de oro, al qual llamauan Solido, vale la ſexta parte de vna onça, y de aqui viene que la libra de oro valia 72. ſolidos. Eſta moneda es la q̄ llamamos en Eſpaña Caſtellano, llamaſe ſextale porq̄ tenia 6. onças.

*Lib. 10
Epigr.
73.*

*En las
annota
ciones
ſobre
Cornelio
Tacito.*

CAPITULO XIII. Y XIII 615

cas. Como dize S. Isidro, este solido, o sueldo se *En las*
 diuide en tres partes, y cada vna se llama tres- *Etymo*
 mifsis, partese también en dos partes, y cada vna
 se dize memifsis.

De Siliqua. Cap. XIII.

¶ Ultra de que Siliqua significa la legumbre, o
 vayna, o caxcara de alguna cosa q̄ lleua semilla,
 también se toma por el arbol, o fruta (que en An-
 daluzia dezimos Algarrobo) (pues la semilla de
 este fruto es dura como piedra, pesa 4. granos de
 trigo, y por este peso se toma siliqua a cerca de *Paulus*
 los Latinos. De aqui es, q̄ siliqua se toma por el *AEgi.*
 valor de 4. granos de plata, siliqua auri vale qua *lib. 7.*
 tro granos de oro, o sexta parte de la onza. Di- *c. 26.*
 zese Ceratium por otro nombre.

De drachma. Cap. XV.

¶ Drachma era vna moneda, que pesaua la ocha
 ua parte de vna onça, vale tanto como nuestro
 real de 34. maravedis. Y dezimos didrachmium
 por dos drachmas, que es el real de a dos, tiene
 esta moneda impressa vn buey de vna parte, y de
 aqui vi no el prouerbio que dizen. Bouen habet
 in lingua, dize se por aquellos q̄ son corrôpidos
 con dineros q̄ callen la verdad de lo que les fue *Plutar.*
 re preguntado. Ay otra composicion q̄ dizē Te *in thes.*
 tradrachmium, por 4. drachmas. Esta moneda *sc.*
 tiene estampada vna aue dicha Noctua.

De Obolo. Cap. XVI.

¶ Obolus es la sexta parte de vna moneda, q̄ va

valia tanto como nuestro marauedi. Algunos dizē que valian seys marauedis como el seysen de Aragon. El compuesto deste es diobolus, por 12. marauedis, y triobolus por semidrachmo, q̄ es medio real.

De Mna, o mina, y estater. Cap. 17.

Lib. 21

cap. 24

¶ Mna dizen los Griegos a lo que los Latinos Mina. Era vn genero de moneda q̄ pesaua cien drachmas de plata. Plinius. Mna quā nostri minam vocant pendet drachmas Atticas ceptum. Stater es del mismo valor que Mina, o libra. Auia otro Stater de plata, y valia (segun S. Geronymo) en el capitulo decimo septimo de San Matheo 4. recles. Sater Daricus, Sater Philippius era el que dezimos stater de oro, valia 4. ducados, que son 1500. marauedis.

Julius
Pollux

De talento. Cap. XVIII.

¶ Talentum, aunque no sea moneda, sino peso, tomasse por moneda. El talento Atheniense era endos maneras, vna quando simplemente deziã Talentum, y entōces vale 50. minas que son 60 libras de plata, ò 6000. reales, ò 600. coronas. Nota. Talentum no se entiende de oro, sino se declara expresamente Talentum auri. Ouid. Addita sunt illis auribus quinque talēta. Julius Pollux valebat autem auri talentum tres aureos Atticos argenti, aut 60. Minas Atticas Mina Attica era 100. Drachmas. La segunda, quando viene con adiectiuo, assi como talentū magnum

Episto
la 3.

num, vale 8. mil reales. Talētum Babylonicum
 7000. Drachmas Talentum Syrium 1500. Dra-
 chmas Atticas. Talentum Ægyptum vale 80.
 libras Romanas, ó 120. marcos de plata. Libra
 Romana vale 144. marauedis. Talentum Rho-
 diū (authore Festo.) vale 4500. denarius, que son *Lib. 17*
 180000. quadrantes, o marauedis, Talentū Ry-
 zantium, vale 120. libras Romanas, segun pare-
 cer de Budeo, lib. 2. de Arte, y Agricola, lib. 2. de
 exercitiis ponderibus, y segun esta cuenta vale 12.
 120. drachmas, o 180. marcos de plata de 28. on-
 ças. El peso de los talentos a cerca de los He-
 breos, fue en dos modos vno Talento Sanctue-
 rio, pesauan 100. Minas Hebreas, otro era talen-
 to Congregationis valia 40. Minas. Vna mina
 Hebraea pesaua 60. siclos, valia tanto como 2. li-
 bras Romanas y media, que eran 360. marauedis.
 Auia cerca de los Hebreos vna moneda de *Lib. 23*
 oro, que se dezia Talento, que valia tanto como *de su E*
 vn Sielo. Nota Talentum auri, como se colige *liada*
 de Homero, y lo toca el Comento en el nono,
 significa moneda de pequeño valor.

*De Sielo, Victoriatus, Duella, Scrupulus, Sici-
 licus, Sextula. Cap. XIX.*

¶ Siglo tiene 20. Obolos, vale acerca de los He-
 breos 4 drachmas, segun S. Geronymo. Victoria-
 tus, medio real, o casi 20. marauedis. Duella
 es peso de dos reales, y dos marauedis, y me-
 dio. Scrupulus peso es de onze marauedis y me-

medio poco menos Sicilius peso es, de dos reales. Sextula, es fefma, peso de vn real y cinco marauedis.

De algunas monedas antiguas Españolas. Ca. XX.

¶ El marauedi nuestro se diuide en dos blancas y en seys cornados, y en diez dineros, y en 60. meajas. Marauedi viejo, o moneda vieja, valia 3. blancas, y algo mas: porque 6. marauedis de los viejo se reduzen a 10. de los que agora tratamos Marauedi bueno valio 10. mañs de los de agora, ò 6. de los viejos. La moneda q̄ dicen Pepió era dos meajas. La moneda q̄ se dize Burgales valia. 2 Pepiones. Tornes moneda era de plata, es lo q̄ dizē. Argento Turonense, vale tãto como los 3. quartos de vn real nuestro, q̄ son 25. marauedis y medio sueldo Burgales valio doze dineros Burgaleses de a 4. meajas, q̄ son 8. dineros de los nuestros de a 6. meajas, y este sueldo Burgales fue el que llamaron sueldo bueno. El sueldo menor valio vn dinero y dos meajas que son 8. meajas, y de aqui se llamò ochosen. El marauedi bueno que se yguala al marauedi de oro, valio 180. Pepiones. Afsi mismo valia este marauedi 10. Metales, cada Metal 18. Pepiones, y cõ forme a esta cuenta cada maraue 60. dineros de a 6. meajas, q̄ correspondia a seys marauedis de los nuestros. Vna moneda q̄ se dezia Prieto valia 4. dineros 12. Cinquenes valian vn marauedi y 2. cinquenes vn cornado. Vn nouen valia seys

mea-

meajas. Marauedi blâco valia feys dineros, que es casi vna blanca, y 1. dinero mas. Cruzâdo moneda peqñavalia 2. cornados. La moneda delos Agnus Dei valio primero vn marauedi, despues se labrò de tan baxa ley que valio vn cornado. Doblas Castellanas de nuestro tiempo valian 365. maraedis. Las doblas antiguas entiempo del Rey don Iuâ el primero valian 12. reales en plata amonedada, y en plata quebrada, onça y media, y vna ochaua, esta dobla tenia peso de vn Castellano, llamase por otro nombre, dobla de cabeça. Doblas Moriscas, q̄ dize por otro nombre doblas zaenes, o azenes, pesauan vn Castellano, y algo mas. Huuo medio marauedi de oro deziase meaja de oro. Otros le llamaron tremisfe: pero no era la meaja de oro la mitad del marauedi de oro, sino la tercia parte. Moruies Alfonso era vna moneda, q̄ se dize marauedi de oro, q̄ corria antes del Rey don Alonfo X. valia casi vna sexta parte de vna onça de oro, q̄ es poco menos q̄ vn Castellano. Franco era vna moneda de oro q̄ valia diez reales de plata de los nuestros. Todo lo que se ha dicho en este capitulo. Lo prueua el Doctor Couarruias de Leyua, Obispo de Segonia, en vn tratado que intitula de monetis, cap. 5. & 6.

Cap. XXI. De mensuris.

¶ Pes es la sexta parte del cuerpo humano, tiene semejaça cõ Ar, y cõ libra, potq̄ se parte en 12 onças,

onças, o en diez y feys pulgadas. Sextās por 2. onças, o dos pulgadas, y dos tercias. Quadrans por 3. onças, o 4. pulgadas, q̄ por otro nóbre se llama palmo. Virtu. Pesrelinquitur quatuor palmorumum palmus autem habet quatuor digitos. Triēs 4. onças, o 5. pulgadas. y poco mas de vna tercia. Quicunx 5. onças, o feys pulgadas, y tres quartas. Semis sex vnciā, medio pic, ò 8. pulgadas. Septuix 7. onças, o 9. pulgadas, y vn tercio. Bes, o befsis xeme 8. onças, o 10. pulgadas, y 2. tercios. Dodrans 9. onças, q̄ es el palmo de 12. pulgadas. Dextans 10. onças, o 13. pulgadas, y poco mas de tercia. Deunx, onze onças, ò 14. pulgadas, y dos tercias.

De algunas pesas, o partes de la onça. Cap. XXII.

¶ Duells quiere dezir la tercia parte de vna onça. Scilicet es la quarta parte de la onça. Sextula es la sexta parte. Drachma es la octaua parte de vna onça. Emiscella, es vna dozena parte de onça. Tremissis, es la nouena parte de onça, vale tãto como Drachma. Scrupulus es vna 27. parte de la onça. Obolus es vno 40. y 8. parte de la onça. Bissiliqua, es de 72. partes de vna onça la vna. Cerates, es vna parte de 96. de vna onça. Siliqua, es vna parte de 144. de vna onça. Chalcus es vna parte de 192. de vna onça.

De Cubito. Cap. XXIII.

¶ Cubitus, aut cubitum, se toma en vna de tres maneras. La primera, por vn codo comun contando

contando desde la punta del dedo pulgar, hasta la dobladura del codo, tiene 24. de dos. El segundo es cubito Geometrico, del qual haze mención S. Agustin, lib. 15. de Ciuit. Dei cap. 27. hablando del arca de Noe, es tanto como 6. codos de los nuestros. El tercero se dize codo real, es menor que el codo mediano tres dedos. Deste haze mención Herodoto, a do dize. Murus erat quinquaginta cubitorum, regionum, hablando de Babylonia. Vlna (segun Alciato) es lo mismo que el codo nuestro, y ha se de contar desde la punta del dedo pulgar, hasta la dobladura del codo por la parte de dentro. Tomase vlna por mano, o brazo. S. Lucas cap. 2. Accepit eum in vlnas suas. Vlna segun Seruio, y Antonio Mācinello sobre vn verso de Virg. Treis pateat cæli spatium non amplius vlnas. Es lo mismo que braçada.

Lib. 1.

Lib. 1.

Parer-

gon ca.

18.

Aegl. 3

Del passo. Cap. XXIII.

¶ Passo es el espacio que toma vn hombre de pie a pie quando se passea, y es 2. pies y medio. Ay otro passo, que es quanto los dospies se pueden estender. Columella. Passus habet pedes 5. Los Romanos median por passos, y a do quiera que tratan de medida de tierra, no ponian este nõbre passo, porque se entendia claramete. Horatio. Millia tum prāsi tria repsumus: atq; subimus. Era costumbre de poner vna columna de mil a mil passos, y estas hazian millas. Los Griegos

Lib. 5.

dere ru

sti.

Lib. 1.

ser. su-

tyra. 5.

gos

- Lib. 2.* gos median por estadios, y el estadio tenia 125.
s. 23. passos. Plinio. Stadiū habet passus nostros centū
 vigēti quinque q̄ son 625. pies. Diulus es dobla
 da medida que el estadio como se colige de Vi-
Lib. 1. truuio. Parafanga por la veriacon de los auto-
s. 12. res es incierta su medida, siguiendo a Herodo-
Lib. 2. to es 30. estadios, que son 3750. passos. Los nue-
s. 6. stros vsan Parafanga por espacio de vna legua,
 porque casi se allega mucho a esta medida.

¶ Schænus en Latin quiere dezir foga, o cordela
 da, era medida de Egipto, segun lo dize S. Ge-
 ronymo por Iohel c. 3. tiene 60. estadios. Mansio
 significa la jornada, o camino de vn dia, o la po-
 sada, o aposēto, y assi como no todos caminā en
 vn dia igual jornada, assi no tiene medida cier-
 ta. *De medidas aridas. Cap. XXV.*

- Trophor* ¶ Modius cabe 3. celemines, como se colige de
anione. Donato. De mensio suo serui accipiebant in men-
 sem quaternos modios frumenti. Era tan vsada
 esta medida, que todas las vezes que se expti-
 mia el numero, y se callaua la media se entēdia
 Modius. Horatio Milia frumenti tua niuerit
 area centum. Cabe dos semodios. Sexquimo-
 dius es 4. celemines y medio. El semodius es 8.
Lib. de sextarios. El sextario tiene dos heminas. Pricia
ponde- no. Heminas recipit geminas sextarius vnus.
ribus. Hemina tiene 4. acetabulos. Plin. Cum aceta-
Lib. 21 buli mensura dicitur significat hemine quartam
s. ult. partem. Acetabulo tiene cyathos, y medio. Cyathus

rus cabe 4. ligulas Sathū es tanto como modio,
y medio. Bimodius, media hanega. Trimodius
3. modios, ò 9. celemines. Plan in Menathmi.
De mensum dabo: non modio, aut trimodio, sed
ipso horreo. Medimus era medida Griega, va-
lia modio, y medio. Chœnix, acerca de los Grie-
gos, era de 48. partes de medimnus la vna Pol-
lus, Dedimus capit. chœnicas octo, & quadragin-
ta. Chorus era medida Hebrea, hazia treynta
Modios. S. Hieronymo sobre el propheta Osee
cap. 4. y sobre Ezechiel, cap. 45. chorus tringita
modios habet.

De medidas liquidas acerca los Romanos. Cap. 25.

¶ Culeus, es vna medida hecha de vn cuero de
buey entero, como oy dia hazen en Castilla pa-
ra enuasar el mostro, cabe 20. Amplioras Am-
phora cabe 2. Vrnas, dezian los antiguos por o-
tro nombre. Quadrantal cabia 14. açumbres de
las nuestras. Festo Pópeio. Quadrantal, quã Græ-
ci dicant Amphorã, vas quadraginta octo sexta-
rios capiens. Volusius in libro de asse. Ampho-
ra siue Quadrantal habet Vrnas 2. Vrna haze 4.
congios. Vn congius 6. sextarios. Vn sextario 2. he-
minas. Vna hemina 2. quartarios. Vn quartario
2. acetabulos, ò cinco onças mensurables. Vn
acerabulo Cyatho y medio, o 2. onças y media
mēsurables Cyat° vale 4. ligulas, o cochlearia, li-
gula, o cochlear 3. dracmas, y 1. scrupulo. El 6. q̄
arriba hemos dicho se diuide ē 12 partes. Sextās
congiā

cogia 2. Cyathos. Triés cabe 4. Cyathos, o 6. onças, quadrã 3. Cyathos, o 4. onças y media. Quincúx era vaso de 5. Cyathos. Septúx siete Cyatos Bes, is, o befsis. is 8. Cyathos Modius es lo que dezimos Moyo, cabia 16. sextarios, agora dezimos que cabe 16. arrobas, o cantaras Modiolus era vaso que cabe poco menos que vn açumbre Metreta segun Alciato, libro de ponderibus cabe doze congios. Y esto afirma vn Medico que dizen Meandro, diziêdo que Metreta contiene 72. sextarios, que son 20. açumbres. Dioscorides lib. 5. tratando del vino, pone que vna metreta haze diez Congios Bathus, medida era Hebraea cogita tanto como metreta (segun Erasmo) en el nueuo testamento, sobre el segundo capitulo de San Iuan.

Capitulo XXVII. De los Caracteres que usan los Medicos.

¶ Vna S. quiere dezir Semis, o mitad Scrupulus figuran assi S Es tercia parte de vna drachma pesa veynte granos de trigo. Drachma es nouena parte de onça, pesa sesenta granos, figurase assi tres Vncia es nueue drachmas, pesa 540. granos de trigo, figurase assi Z o assi. Z

Ca. XXVIII. Del peso de algunas medidas liquidas

¶ Ceramiũ, que dizen Italicum, pesa 72 libras de azeyte, y 80. de vino, y 108. de miel.

¶ Congius pesa nueue libras de azeyte, y diez de

de vino, y treze y media de miel.

¶ Sextarius pesa vna libra y feys onças de azeite, y vna libra y ocho onças de vino, y vna libra y treze onzas y media de miel.

¶ Mistrum magnum, pesa tres onças de azeite y tres onças, y ocho scrupulos de vino, y quatro onças y media de miel.

¶ Acetabulū, pesa diez ocho drachmas de azeite, y dos onças y doze scrupulos de vino, y veynre y siete drachmas de miel.

¶ Cyathus, pesa 12. drachmas de azeite, y doze drachmas, y quatro scrupulus de vino, y dos onças, dos drachmas de miel.

¶ Mystrum paruum, pesa 16, drachmas de azeite, y 20. scrupulos de vino, y nueue drachmas de miel.

Capitulo XXIX. De algunas figuras de los pesos y medidas de que se ha tratado en este libro.

¶ Aereolum se figura así Choá, o Cógio así

Chœnicemp por otro nombre cheman

Hemina, o Cotyla.

Obolo.

Obolos.

Vel. Olcá.

Libra.

Rr

Vncia

Vncia.
 Mina.
 Mystrum.
 Medimus.
 Modium.

Xesten, o Sestarius.
 Acerabulo, Xybaphum Grace.
 Hemina.

E E M
 H M
 K 3 200 U

Ceramiū. Sobre estos 3. vltimos capitulos lee a Paulo Aegineta,

lib.7.cap.26. *Cap. XXX. Trata del tiempo.*

¶ Tiempo es la mitad del mouimiento del cielo, y assi fue criado en el punto que fueron criados los cielos, mide se el tiempo, con el mouimiento del Sol, y de la Luna, por ser mas notorios los mouimientos destes planetas a las gentes q̄ los demas cuerpos celestiales: diuidese el tiempo por tener del mas certidūbre, y destinguirle en partes assi como, edades euo, siglo, era, y otras partes. En este tiempo contando desde la creacion del mundo, hasta el año de 1588. han pasado (segun opinion de Eusebio) 6787. años Diuidese en edades. La primera desde el principio del mundo, hasta Noe, que passaron 2242. años. La segunda desde Noe hasta Abrahā, q̄ passaron 942. años, La tercera desde Abraham, hasta Dauid, passaron 941. años. La quatta, desde Dauid, hasta la captiuidad de Babylonia, que passa

ron 485. años. La quinta, desde este tiempo, hasta el aduenimiento de nuestro Señor Iesu Christo, passaron 589. años. La sexta desde el aduenimiento de nuestro Redemptor Iesu Christo, hasta el Iuyzio. La 7. y vltima sera la vida eterna de los celestiales, que es edad perdurable, è infinita. Desta 7. edad haze mención S. Augustin, en el libro 22. cap. 30. de ciuitate Dei. Otros llamã edad, el tiempo que vna cosa dura, desde el principio hasta su fin. Otros dizen edad alguna parte de la vida del hombre, en la qual la complexion, o naturaleza haze alguna mudança, asì como de niño hazerse moço. La edad se diuide en Euo, q̄ en vno significado es espacio de 1000 años. Otros dizen ser vn espacio de tiempo, que tiene principio sino fin, en otro significado se toma por siglo, que es espacio de cinco años.

¶ El Euo quando denota 1000. años se diuide en siglo, q̄ en Latin dizen Sæculum, deriuase de sene, es espacio de cien años edad de viejos, aunque en muchos lugares se tomã por eternidad, o duracion de tiempo sin fin, asì como aquello del Symbolo. Et vitan futuri sæculi.

¶ El siglo se diuide en dictiones, que es espacio de quinze años indiction, quiere dezir mandamiento solemnizado: porque los Romanos tres años antes del Nacimiento de nuestro Señor, despues que sojuzgaron, y señorearon el mundo, repartieron en todas las prouincias vn tri-

Siglo.

*Indi-
ction.*

buto, o pecho en tres pagas de cinco en cinco años la fuya. En los primeros cinco años dauan vn tributo de oro para labrar moneda, para pagar a los hombres de guerra, y para otros gastos necesarios de la Republica. En los otros cinco años segundos, pedian otra paga, la qual era de metal, o cobre para hazer estatutos, o imagines a honra de aquellos que hazian algunos hechos notables en seruicio de la Republica. La vltima paga de los vltimos cinco años, era de hierro, para sacar armas, y otras cosas necesarias para la defensa, y conseruacion de la Republica, y passados los 15. años de todas las tres pagas comẽçaua de nueuo otra diçtion como dicho es.

Lustro

La indiçtion se diuide en lustro, y vn lustro es 4. años, cõtando exclusiue, como se colige de lo q̃ Ouidio dize del bissexto: y contando inclusiue es espacio de 5. años. Dizese lustrũ, alustrando, porq̃ los Romanos de 5. a 5. años quãdo querian elegir Dictador (que era la mas alta dignidad de aquel tiempo) andauan por la ciudad cõ ciricios, o achas encendidas hasta llegar a la plaza dicha Campo Marcio donde se elegian.

*Lib. 3.
Festo.*

*Olim-
pia.*

¶ Olympia dizen ser vn espacio de quatro años entre los Griegos, como Lustrum entre los Romanos. Toma denominacion por vnos juegos de quatro a 4. años se hazian en Olympia que por otro nombre se dezia Pisa ciudad en los confines de Grecia que dizen agora sa Morea.

Arti-

Artic. II. Capitulo. XXX. Trata del año.

¶ Año es el espacio del tiempo que el Sol se de tiene en dar buelta a los doze siglos del Zodiaco, passando por los dos æquinoctios, & Solsticios, y boluiendo al punto do començo, el qual mouimiento cumple en 365. dias, y seys horas, menos dobe minutos, que es vn quinto de hora y segun esto en 5. años es vna hora entera, y en 120. años vn dia natural de error, y assi passara hasta que se remedie. Dizese año desta proposicion Latina, *an*, que significa al rededor por la reuolucion del dicho tiempo. El año es en dos modos, conuiene saber año solar y bissextil. El año solar que por otro nombre se dize comun es de 366. dias, y 6. horas escasas, como se ha dicho. Año bissextil, es de 366. dias. El año tiene dos solsticios, vno hyemal, que es quando el Sol comienza a entrar en el signo de Capricornio, a onze de Deziembre. Otro æstiuual, que es quando el Sol comienza a entrar en Cancro, o Cancrer que es a onze de Junio. Solsticio es vn punto en el Zodiaco adonde mas el Sol se puede llegar o apartar de la æquinoctial. Tiene el año 2. æquinoctios. El vno quando el Sol entra en Aries, q̄ es a diez de Março. El otro quando entra en libra, que es a treze de Setiembre. Y porque en estos tiempos es el dia ygual con la noche, se dize æquinoctio. Assi mismo tiene el año quatro tiempos, conuiene a saber, Verano, Estio, Otoño,

*Año solar, o comun.**Año bissextil Solsticios.**Æquinoctios**Quatro tiempos del año.*

*Lib. 1.
c. 28.*

*Qua-
rto tē-
poras.*

*Año
grande*

y Inuierno, y cada tiempo destes tiene tres me-
ses. Los del Verano (como dize Marco Varró)
son Febrero, Março, Abril. Los del Estio, son
Mayo, Junio, Julio. Los del Otoño, Agosto,
Setiembre, Octubre. Los del Inuierno, Nouié-
bre, Deziembre, Enero. En cada vno destes qua-
tro tiempos celebra la Yglesia quatro vezes ayu-
no, y cada vez tres dias, que son las quatro tem-
poras que dezimos. El primer ayuno es despues
de Pascua de Espiritu Santo. El segundo des-
pues de la Cruz de Setiembre. El tercero des-
pues de la fiesta de Santa Luzia. El quarto la se-
gunda semana de Quaresma. Estas quatro tem-
poras ordenò el Bienauenturado San Calixto
Papa. Otra diferècia ay de años, y es el año que
dizen magnus cyclus Paschalis, o año grande, es
vn espacio de años solares q̄ procede de la mul-
tiplicacion del circulo solar, que es 28. por el cir-
culo lunar, que es 9. Y porque 28. vezes 9. mon-
ta 532. dizen que este año tiene tanto tiempo. Y
en fin de estos 532. años, comienza el Sol, y la Lu-
na a hazer las mismas reuoluciones que al prin-
cipio comenzaron. Y estos con los demas Pla-
netas, segun la mejor opinion, hazen lo mismo
en 49000. años.

*Articulo III. deste cap. XXX. Trata de los me-
ses del año.*

*En el 3.
de su ra-
cional.*

¶ Mes se dize a metiendo. Porque mide el año
(segun Durando) dize se de mēc, que es Luna, y
de

de aqui viene a dezir mes a todo el tiempo que la Luna gasta, apartandose del Sol, hasta que se buelue a juntar con el, feneciendo su Circulo natural. Y estos tales meses se dizen lunares a diferencia del solar, y vsual, como adelante diremos. Del mes lunar, ay 2. diferencias. La primera diferencia se dize mensis peragracionis q̄ es lo que la luna se tarda en dar vna buelta a todo el zodiaco, y es espacio de 27. dias, y ocho horas. La segunda diferencia es mensis coniunctio nis, q̄ es desde que la luna vna vez se junta con el Sol hasta otra vez q̄ se buelua a jutar cō el mismo sol es espacio de 30. dias, y este mes es el q̄ arriba diximos lunar. La tercera diferencia se dize mensis apparitionis, que es el espacio que se detiene desde que vna vez la vemos nueuamente, hasta que otra vez se vee, y este mes casi por la mayor parte es ygal al mes que dizen conjunctionis.

¶ Mes solar es el espacio q̄ el sol tarda en pasar por vno de los doze signos del Zodiaco.

Mes vsual es el espacio de los dias que en el Calendario estan recibidos y autorizados por los antiguos. Los nombres de los meses del año s̄o

† Enero. Febrero † Marzo Abril † Mayo. Junio. † Julio † Agosto. Setiembre † Octubre. Nouiembre † Deziembre. Junio se dize por otro n̄bre.

Quintilis. Agosto. Sextilis. Porque quando el año los antiguos lo començauan de Marzo, Ju

*Mesis
grationis.*

*Mesis
coniunctio
tionis*

*Mesis
apparitionis.*

*Mesis
solaris
mes
vsual.*

*nombres
de los
meses.*

lio es quinto mes en ordē, y Agosto sexto. Estos meses cerca de cada nacion tiene su nōbre particular. Los Romanos pusieron a algunos nombres de los Gentilicos, que honraua, cuya denominacion siguē todos los Latinos. Nota el mes que antes de si tiene esta señal † trae 31. dias los que no la tuuieren, traen 30. Sacando a Febrero que tiene 28. y el año de bisiesto 29. Y estos son los dias del mes que dizen vsual.

Art. IIII. de este cap. XXX. Trata de la semana.

¶ La semana se dice en Latin Hebdomada, o Septima. Dizese Hebdomada de hebdomas q̄ es 7. porque tiene 7. dias Septimana se dice de septem y mane, cosa de 7. mañanas, tomando la parte por el todo. Sabbathum tomò el Publicano por semana, quando dixo: Ieiuno bis in Sabbatho. Tomase otras vezes por qualquiera dia de la semana: assi como prima Sabbathi el Domingo: segunda Sabbathi el Lunes, y assi por orden de los demas. Y segun Syluestro en la rosa aurea en el sermon del Sabado Santo dice, que Sabbathum se deriua de sabbe diçtion Hebrea, o de sabba, que es Siriaco, que significa 7. de donde podemos entender que qualquiera dia de la semana se puede dezir Sabbathum respectiue de toda la semana. Tambien significa acerca de los Hebreos lo mismo que requies, o descanso. Y guardauanse tanto que aun de andar no tenian licencia de salir de mil passos.

Art.

Art. IIII. deste Cap. XXX. Trata del dia.

¶ **Dia** es el espacio que el Sol gasta en dar buelta al mundo, con el mouimiento rapto, o uiolento. Dizese dia de duo q̄ significa dos. Porque el dia natural se diuide en dia artificial, y en noche. O dizese dia a dijs, q̄ significa los Planetas del cielo. Y de aqui viene q̄ el dia toma el nōbre del Planeta que en el tal dia comiença a reynar, y porque la Luna comiença a reynar en la primera hora del Lunes, por esso se nombra este dia Lunes, y assi de los otros. Los Hebreos nōbran los dias con nombres numerales, diziēdo prima Sabbathi al Domingo, y secūda Sabbathi al Lunes, y tertīa Sabbathi, al Martes, y assi de todos los demas. La Yglesia por nō imitar, ni seguir en ninguna cosa los ritos de los Gētilicos, y Indios nombra los dias por ferias diziēdo, al Lunes segūda feria, y al Martes terciā feria, &c. hasta llegar a Sabbathū, y a Dominica dos diferencias ay de dias, vno natural que contiene espacio de veynte y quatro horas, y assi incluye noche y dia. Otro es artificial que es todo el tiēpo que el Sol dura en passar por nuestro hemispherio que es desde que el Sol sale hasta que se pone. El dia le comiençan muchos diferentemēte: porque (como dize Durando en el octauo libro de su Racional) los Aegipcios, y Hebreos le comiençan desde que se pone el Sol, y dura hasta otro dia a la misma hora. Los Persas, y Griegos,

Dia.

Nombres varios de los dias

Dia natural.

Dia artificial

Diferētes comienzos del dia.

gos, y en vulgo le comiēça desde la mañana. Los Romanos desde media noche hasta otra media noche, porque en esta hora nacio el verdadero Sol Christo nuestro Redemptor. Y desta hora se hade comēçar el dia para le guardar. Los Astrologos le comiēzan a medio dia, y esto es el tiempo en que menos se yerra. Y es comienzo para saber el dia de la luna. Los Eclesiasticos comiēzan el dia desde hora de visperas hasta otras visperas. Y deste principio comiēzan las horas para rezar y festejar las festiuidades. Para las treguas comiēzan el dia desde q̄ el Sol sale. Para los cōtratos de medianoche. Para poner demanda ante el juez, de la mañana, hasta puesto el Sol. *Art. VI. Deste Ca. XXX. Trata de la noche.*

Noche:

¶ Noche es sombra de la tierra, o ausencia del Sol de sobre nuestro hemispherio, que es la distancia que el Sol se detiene desde que se pone hasta que sale. Dizese nox deste verbo Griega nitto que significa cubrir. Porq̄ la noche cubre las cosas. Diuidese en muchas partes. A la primera dicen crepusculum, o crepusculū nocturnum: q̄ es quando ni biē es de noche, ni bien es de dia. A esta parte llaman por otro nombre Vesper, y por esto dicen al fin del dia Vesper. Los que dicen que Vesper quiere dezir la mañana, y trae lo del capitulo 28. de San Matheo quando hablando de la Resurreccion de nuestro Señor dize *Vespere autem sabbathi, &c.* Verdad es que

*Partes
de la no
che.*

que

que en este lugar quiere dezir el Domingo por la mañana: mas el que traduxo del texto Griego vfo de Vesper por lucifero; porque el Luzero de la tarde, aunque sea el mismo que el de la mañana, a la tarde se nombra Vesper, y a la mañana lucifer. Otra parte de la noche llaman cōticiniū à conticeo por callar, es al primero sueño Otra parte llaman intempestum, q̄ es a media noche. Otra se dize Gallicinium que es quãdo el gallo canta, siendo el mensagero del dia. Otra parte se dize matutinū, es quãdo ya quiere ser de dia. Luego tras esto viene crepusculum diurnum, o diluculum que es lo que dizen entre dos luzes. Estas partes se dizen por otro nombre vigilijs. Otros dan otras denominaciones a estas partes de la noche, diziendo, prima facula a la hora de encender las lumbres. Concubia, que es quando se van acostar. Pero todas se reduzen a las dichas. Quadrans es la quarta parte del dia natural que es espacio de seys horas.

*Lee a
Pli. li.
1.6.8.*

*Vigi-
lias.*

Art. VII. deste ca. XXX. Trata de horas, y de otras distancias de tiempos menores.

¶ Hora es el espacio del tiempo que el Sol se detiene en passar 15. grados del circulo, o buelta q̄ da cada dia, al moto raptō, o violento del primero mobil, q̄ es vnavigesima quarta parte de todo el circulo, y porque son 360. los grados de cada circulo, y el Sol cō el mouimiento raptō los anda en vn dia natural, de aqui viene a tener el tal dia

Horas

dia 24. horas. Y porq̄ quando el Sol entra en la
 æquinoctial este circulo q̄ el Sol haze con el mo-
 uimiento raptō se parte en dos partes yguales
 el dia natural. De aqui viene, q̄ tãto anda el Sol
 en este tiẽpo sobre nuestro hemispherio, como
 por debaxo, y porque cada dia artificial ascien-
 den en todo tiẽpo 6. signos, y en la noche otros
 seys, y aunque desigualmente todos seys, en este
 tiẽpo ascienden en 12. horas ganando los vnos
 lo que pierden los otros, y al contrario, y porq̄
 en este tiempo del æquinoctio tiene 12. horas el
 dia artificial, y otras doze la noche, los antiguos
 diuidieron el dia artificial en quatro partes, las
 dos antes de medio dia, las otras despues de me-
 dio hasta que el Sol se pone. Y como en el æqui-
 noctio sale el Sol a las seys horas de la mañana
 llaman aquel tiempo primera hora, o hora de
 prima. Pues partidas aora seys horas en dos par-
 tes auia necesidad que ala primera parte llegas-
 se dende las 6. a las 9. y la segunda dende la 6. a
 las 12. Y porque de las 6. alas 9. ay tres horas por
 tanto a hora de las 9. dizen hora de tertia, y por
 que de 6. a 12. ay otras 6. horas, por tanto quan-
 de son las 12. llaman hora de sexta, y desde las
 12. hasta las 3. despues de medio dia llaman ho-
 ra de nona a respecto de las passadas, y tambiẽ
 porq̄ es cierto en el æquinoctio en el qual pũto
 auer 9. horas q̄ el Sol salio sobre nuestro orizõte
 y de las 9. hasta que el Sol se pone, q̄ es desde las

*Sylues-
tro en
la rosa
au. en la
domini
ca de la
septua-
gesima.*

tres de la tarde hasta las 6. ay tres horas, assi se llama aquella hora duodezima. De suerte, que lo dicho se entiende desta manera: que porque a las 6. del dia diximos hora de prima, en tiempo de æquinoctio, todo el tiempo que ay desde las 6. hasta las 9. inclusiue, se llama hora de terciã: y todo el tiempo que ay exclusiue desde las nueue hasta las doze, se llama hora de sexta: y todo el tiempo q̄ ay desde las doze exclusiue hasta las tres inclusiue, se llama hora de nona, y el tiempo que ay desde las tres hasta que se pone el Sol (como està dicho) se llama hora duodecima q̄ es hora de visperas. Y a este respeto estan ordenadas las horas Canonicas que se rezan en la Iglesia. Saluo que por la crescencia de los dias, ay mudança en el tiempo que se dizen: y segun esto queda la hora de prima, y la hora de visperas sin hora de Sol en el æquinoctio, y esto denota el nombre, porque Vesperes vna estrella que sale despues de puesto el Sol, o antes que salga. Lo dicho se entiende en tiempo de æquinoctio, que sale el Sol a las seys. Pero en el solsticio vernal, o en otro qualquiera tiempo. Prima, y terciã, y sexta, y nona, sera en el tiempo en que les cayga el lugar a respecto de las horas que el dia artificial tuuiere de Sol. Otros dan otros nombres a estas horas: diziendo por prima terciã sexta y nona. Primera, segunda, tercera, quarta, quinta, y assi a todas las otras, por razon q̄ se cuenta desde

desde que sale el Sol hasta que se pone. De otra manera declaran algunos las horas. cõtado por las edades del mundo, diziendo, que la hora de prima es desde Adan hasta el diluuió, y la hora de tercia, desde Noe, hasta Abraham: hora de nona, desde este tiempo hasta el aduenimiento de Christo nuestro Señor. Hoarvndecima desde la venida de nuestro Señor hasta la fin del mundo.

¶ Punto en este proposito es vna quarta parte de vna hora.

¶ Momento es la decima parte del punto, o quarta rentena parte de hora.

¶ Vncia, o minuto es vna decima parte del momento.

¶ Atome es $\frac{1}{43}$ abo de la vncia, o minuto, y es lo qno recibe diuissio, assi como el puto en la tinea.

Articulo VIII. Deste Capit. XXX. Trata de Calendas. Nonas, Idus.

¶ Cada mes se diuide en tres partes, o dias señalados, que son en Calenda, Nonas, Idus, y de stos se denominan todos los de mas dias del mes.

¶ La primera parte comieça del primero dia de cada mes, y dize se Calendas, deste verbo Griego Caleo, que significa llamar, porque aquel dia llamauan, o señalauan al pueblo los dias de la feria, para que la gente estrangera viniesse a comprar, o vender.

¶ La segunda parte del mes comieça de las nonas. En este dia se celebrauan las fiestas, y mercados

¶ La tercera parte del mes comienza de l dia de los Idus. Dizese de Idus que significa hermosa, porq̄ está la Luna llena en el tal tiempo. De suerte, que el primero dia de cada mes se nōbra Calendas los de mas dias figuientes se nombra rā de las Nonas, hasta llegar a ellas, las quales en Março, Mayo, Julio, y Octubre entran al septimo dia, y en los demas meses al quinto dia. Desde las Nonas hasta los Idus todos los dias se nōbraran de los Idus que en los 4. meses arriba nōbrados son a 15. dias, y en los de mas meses a 13. Los dias restantes despues de los Idus hasta el fin del mes se nōbrarā de las Calendas del mes que se le figure.

Exemplo.

¶ En el mes de Março, (que es vno de los 4. meses q̄ trae las Nonas a 7. los Idus a 15.) para dezir en Latin primero dia (porq̄ los primeros dias de todos los meses se dizē Calēdas) diras Calēdis Martij. Puede se dezir ad Calēdas martias. Para dezir a 2. de Março, diras postridie Calēdas vel Calēdarū martij. Para dezir a 3. de Março, porq̄ no puedes contar ya por Calendas, mira quātos dias faltā para hasta llegar a las Nonas (q̄ en este mes son a 7. y hallaras faltar 4. añade siēpre ante las Nonas, è idus 1. por el dia de la hecha, y serā 5. por lo qual diras quintos nonas Martij. Nonas se pone agora en actō: porq̄ por elegācia se suple esta preposiciō ante, ya si quiere dezir 5. dias antes de las nonas de Março. Para dezir

dia, mira (como en el exéplo precedente) quãto
 falta de 4. à 7. y seran 3. añade 1. y seran 4. pues
 di quarto nonas Martij. Y por la misma orden
 para dezir a 5. diras tertio nonas. Martij. Y pa-
 ra 6. algunos por la regla dada dizen. Secundo
 Nonas Martij: mas mejor diras, Pridie nonis
 Martij, vel pridie nonarū Martij, para dezir a 7.
 dias de Março, porq̃ es el dia de las nonas en es-
 te mes, diras, Nonis Martij, vel ad nonas Mar-
 tias. Para dezir a 8. dias en este mes y sus 3. cópa-
 ñeros (q̃ arriba nõbramos) diras postridie No-
 nas Martij, vel postridie nonarū Martij. Para de-
 zir a 9. porq̃ ya se acabaró las nonas, cõtaras cõ
 los Idus, mirádo quãto falta de 9. para hasta 15
 (q̃ es el dia de los Idus en este mes) y faltará 6.
 añadele vno por el dia de la fecha, como heziste
 a las nonas, y seran 7. y asì diras, septimo Idus
 Martij Idus está en actõ por esta proposicion, an-
 te, q̃ se suple como hemos dicho, y asì querra de-
 zir 7. dias antes de los Idus de Março, contan-
 do exclusiue. Y por la misma orden para dezir a
 diez, diras sextus Idus Martij. Y para 11, quinto
 idus Martij, y para 12. quarto idus Martij. Para
 13. tertio idus Martij. Para 14, Pridie idus, vel i-
 duū Martij, para 15. diras idib⁹. Que quiere de-
 zir en los idus de Março, q̃ son a 15. en este mes
 Para 16. diras postridie idus Martij, vel postridie
 iduū Martij. Para dezir a 17. porq̃ ya sõ passadas
 las kalédas y nonas, è idus deste mes de quiẽ ha

zes cuenta. Mira quanto falta de 17. para llegar a las Kalendas del mes que se sigue a Março, q̄ serà Abril, y hallaras faltar 14. porq̄ de 17. de Março para su vltimo dia q̄ trae 31. faltan catorze, con los quales juntaras dos dias, el vno por el q̄ se suele añadir por el dia de la hecha, y el otro por el dia de las Kalendas del mes siguiente de quien se cuenta las Kalendas, y seran 16. Pues di decimo sexto kalendas Aprilis. Quiere dezir, diez y seys dias del antes de las Kalendas de Abril, contando inclusiu. Y guardando esta misma orden procederas, diziendo para 18. de Março, de 15. Kalend. Aprilis, y para 19. de Março, decimo quarto Kalend. Aprilis, y para 20. decimo tercio Kalēd. Aprilis. Y para 21. duodecimo kalend. Aprilis. Y para 22. vndecimo kal. Aprilis. Y para 23. decimo kal. Aprilis. Y para 24. nono Ka. Aprilis. Para 25. octauo ka. Aprilis. Para 26. septimo Kalendas Aprilis. Para 27. sexto Kalen. Aprilis. Para 28. quinto kalend. Aprilis. Para 29. quarto kalend. Aprilis. Para 30. tertio kalendas Aprilis. Para 31. Pridie kalendas Aprilis, vel pridie Calendarum Aprilis. Para dezir a vn dia de Abril, començaras del, como has hecho con Março, saluo que se ha de aduertir, q̄ Abril y los de mas meses, sacando los quatro al principio nombrados, traen las Nonas à cinco y los Idus atreze, en los quales contarás por la mesma manera q̄ en los 4. nombrados. Exem-

plo. Para dezir a primero de Abril diras Calendas Aprilis para dezir a dos diras postridie Calendas Aprilis. Para dezir a 3. mira quãto falta de 3. para hasta 5. q̄ son las Nonas deste mes, y faltaran dos: aña de vno y seran tres. Pues di tertio Nonas Aprilis. Para dezir a 4. diras pridie Nonas, vel pridie nonarum Aprilis, para dezir a 5. porq̄ es el mismo dia de las nonas, diras Nonis Aprilis, para dezir seys diras postridie Nonas, o postridie nonarū Apri. para dezir 7. cõtaras por los Idus, quiero dezir q̄ mires de 7. para hasta 13. (que es el dia de los Idus en este mes) quantos dias faltan, y hallaras faltar seys, aña de vno del dia de la fecha y seran siete. Pues di septimo Idus Aprilis. En lo demas mira como hiziste en el mes de Março.

¶ Nota, el año que ay bisiesto que es de quatro en quatro años ay vn dia mas, y juntasse a Febrero, y este tal año tiene 29. dias. Y es de aduertir que este tal año para dezir a 24. de Febrero miraras quantos dias faltan para 28. dias q̄ fue le traer aunq̄ trae 29. y faltaran 4. con los quales 4. juntandolos 2. dias que se añaden antes de las Calendas seran 16. y assi diras sexto Calendas Martij, para dezir este mismo año a 25. mira quanto falta de 25. para 29. (porque aora se han de contar entero todos sus dias) y faltaran 4. y los 2. que se añaden seran 6. pues diras sexto Calendas Martij como para 14. y porque estos años se di-

se dize 2. vezes sexto Calendas, por esto se di
ze bissexto. De 25. adelante para dezir a 26. y a
27. &c. sigue la regla dada contando hasta 29. q̄
trae con el dia que se le añadio.

¶ Entendido lo que se ha dicho para dezir en
Latin los dias de los meses: resta dar ordē para
saber reducir estas tales cuentas en Español. Pa
ra lo qual digo, q̄ quando quiera q̄ vieras alguna
cuenta tratar de Nonas, o Idus quitaras vno del
numero de que se hiziere mencion, y lo que que
date restarlo has de las Nonas, o Idus del tal
mes. Exemplo. Tercio Nonas Ianuarij a quan
tos dias quiere dezir? Quita de 3. vno, por q̄ dize
tercio, y q̄ daran dos. Mira aora Enero a quantos
dias son sus Nonas, y hallaras ser a 5. pues quita
2. de 5. y quedaran 3. por lo qual diras que a 3. de
Enero quierō dezir tertio Nonas Ianuarij. O
tro exemplo. Quinto Idus Ianuarij a quantos
dias quiere dezir. Quita de 5. vno y quedaran 4.
Mira Enero a quantos trae los Idus y hallaras
q̄ los trae a 7. pues quita 4. de 7. y quedaran 3. y
a tantos dias del mes quiere dezir. Y assi haras
en Nonas, &c. Idus con qualquiera otro name
ro. Mas si treatare la cuenta de Calēdas quitaras
2. dias. Exemplo. Dezimoquinto Calendas No
uēbris a quantos dias quiere dezir y de q̄ mes?
Para lo qual notarás, que quando las Calendas
se ponen en acusatiuo sin esta preposiciō, ad no

se contarán los dias, ni se entendera ser del mes de que se nombraren las kalendas sino del que quedare antes. Pues porque en esta cuenta se haze mencion de Nouiembre, entenderas ser los dias que fueren de Octubre, que es el mes que antecede à Nouiembre. Esto entendido, quita dos de quinze, porque dize decimoquinto, y quedaran treze, los quales treze restaras de tres dias que trae Octubre, y quedaran 18. y tantos dias quiere dezir decimoquinto Kalendas Nouembris. Y assi haras en otro qualquiera numero que hiziere mencion de kalendas.

Fin del Octauo Libro.

EN EL

EN EL QV A L S E P O N E

vn razonamiento en forma de Dialo-
go: el argumento del qual es, introducir dos es-
tudiantes, el vno que dize no auer necesidad
de Arismetica, y tiene por opinion que no ay
ninguno, que no sepa contar teniendo dineros.
El otro alaba el Arismetica, y defendelo con-
trario. En la platica destos dos se tocan y tra-
tan algunos auisos agradables y
necessarios.

INTERLOCVTORES.

Antimacho.

Sophronio.

VIEN esta acá? (Sophro-
nio) Entre quienes. O se-
ñor Antimacho, y que bue-
na venida es esta? Dios os
ha encaminado por estas
partes. (Antimac.) Porcier-
to señor Sophronio que co-
mo ha algunos dias que por
allá no os he visto, y yo como descuydado no he
venido por acá: pēse si por vctura estauades ausē-
te, o mal dispuesto: y así quise salir de duda, y cū-
plir con la obligacion que a vuestro seruicio tē-
go. (So.) Es para mi muy gran merced, y q̄ cier-
to no lo merece mi descuydo, en auer hecho

lo que soy obligado, mas en verdad vnas calenturillas han sido el estoruo. Que aqui donde me veys, ha quatro dias que no salgo de casa. Anti. De esso me pesa mucho, y de no lo auer sabido antes. Mas bédito Dios ya deueys estar mejor. Sophronio. Si estoy, que fue el exceso liuiano. Anti. Pues señor en que se entiende? So. En leer este libro de Arithmetica, q̄ tiene muchas sutilezas y muy buenas, y huelgome con el algunos ratos. Anti. O pecador de mi, y con quantas andays embuelto? So. Pues que señor Antimacho, no os parecen bien? Anti. Si por cierto, quando ay muchos dineros que contar: mas por mi vida que entre estudiantes es menester tan poca Arithmetica, que por mi fe q̄ si todos son como yo, que hasta diez que sepan contar les basta. Sophronio. Buen disimular es esse, que reys os hazer pobre manos? Anti. Por cierto no pretendo tal, por q̄ seria perder el casamiento. Mas por vuestra vida que me digays, que gusto o que fruto hallays en esta Arithmetica, que tãto os ocupays en ella? Porque ya otras tres, o quatro vezes os he hallado estudiando en ella. Por dicha pretendeyss assentar por criado de tiéda de algun Ginoues rico? So. No en verdad, porque soy muy varon para seruir: pero las ciéncias (como dize el Philosofo) no se han de aprender por el interesse que dellas se espera, sino por la perfeccion que traen al hombre. Anti.

Yo concedo ser así, mas auame de constar ser la Arísmética ciencia, para que diese por bueno el tiempo que en ella se gastasse. Sophronio. Bueno está esso señor Antimacho, dezir que no es el Arísmética ciencia, pues nos consta estar puesta en el numero de las artes liberales, y no como la menos perfecta, sino como vna de las mas excelentes y necesarias. An. Por cierto q̄ para ponerla en tanta honra, q̄ me parece faltarle muchas partes. Mas sepamos que cosa es Arísmética? que la poneys en el numero de las artes liberales. Soph. Por mi fe que me huelgo de que ayamos caydo en esta disputa, porque ya con otros muchos la he tratado, y nunca hemos llegado al fin. Anti. Por esso estamos aqui los dos solos y bien de espacio, y si vuestra indisposicion no os estorua, podreis muy bié cumplir vuestro desseo. So. Mi mal no es tanto que estorue a mi desseo: y por tanto os quiero dezir, que cosa sea Arísmética, dexando a parte q̄ me negastes no ser arte liberal, lo qual creo que mas fue por gana de disputar, que por ignorarla verdad. Arísmética comunmente se define, que es vna arte que trata de numeros, y de sus passiones, por la qual arte procurauan alcanzar aquellos Filosofos Pythagoricos todas las cosas que querian, y a mi parecer no yuan muy engañados: segun aquella sentencia (que dize) debaxo de tres cosas auer Dios dispuesto todo lo criado, conuie-

*Defini
ciõ del
Aritb-
metica
li. 1. a. a.
11. O
Arist.
libr. 4.
Phy. te.
48.*

por numero de tantos dias, y el de la Luna por el cõfiquiẽte. Determinò el delos demas plane-
 tas en el numero de tantos años. Y generalmen-
 te todas las cosas criadas parece q̄ estan traua-
 das entre si, y se conseruan con el numero. Y aũ
 mas os digo, que es causa no solamente de eui-
 tar mal, mas aun de hazer mucho bien. Y no so-
 lamente aprouecha a las cosas del cuerpo: sino
 que es muy vtil a las del anima. Quẽ quita que
 entre los tratantes de ruyn conciencia, si el vno
 al otro se pudiesse engañar no auiedo cuenta,
 y razon, facilmente se engañarian con apetito
 dañado de llevar el vno al otro lo fuyo? Sino
 fuesse por el Arithmetica, que no lo consiente,
 por ser como es, como vn Cartabou, con que se
 mide la verdad, y la mentira. Donde vemos mu-
 chas vezes, que si alguno carece desta arte, facil-
 mente le engaña quien quiere. Y por esto demi
 consejo, no solamente no la desecharia nadie,
 por menos necessario, mas aun la procurarian
 todos como mas vtil. (Anti.) Por mi fe que vis-
 tas las razones q̄ contra mi opinion auẽys tray-
 do, yo no me atreuo a responderles, consideran-
 do su fuerça, que miradas de improuiso parecẽ
 tener. Mas considerandolo mas de espacio, ha-
 llo que no son tan verdaderas como parecen:
 ni que la Arithmetica es tan necessaria como
 dezis. Porq̄ veamos, si esta arte (que assi la quie-
 ro llamar) fuera tan necessaria mal pudieran

*Sape
 suppu-
 tata ra-
 tio con-
 seruat a
 mititiã*

passar muchas gentes, lasquales no solaméte no
 la deprende, pero aun ninguna noticia della tie
 nen como vemos claramente entre los Indios,
 y Negros, y otras muchas gentes, entre las qua
 les, ni el Arifmetica se halla, ni nadie la procu
 ra hallar. Como dize el Filosofo, muchas des
 tas naciones no saben cõtar de quatro adeláte.
 Y vemos con todo esso, q̄ en sus cõpras y vêtas,
 en sustratos y comercios no auer estos engaños
 que entre nosotros que somos tan grandes con
 tadores. Antes veo q̄ tratan tan senzillaméte, q̄
 todas sus vêtas y cõpras son muy limpias de en
 gaño. Para lo qual dexada la experiencia basta
 ria el testimonio de Homero, que dize auer y do
 Iupiter y todos los demas Dioses a ser combida
 dos de los Ethiopes, como de gēte cuya bõdad
 merecia que los Dioses cõuerfassen con ella. Y
 creo ser la causa desto el no saber Arifmetica. Y
 parece que la razõ lo lleua, porq̄ entre nosotros
 esse està mas aparejado para engañar en qual
 quiera cuenta, que mas desta arte sabe. De fuer
 te que no solamente no es causa de bien, como
 poco antes deziades, antes es aparejo para ma
 yor engaño. Y el arte, cuyo vso està tan dispues
 to a lo malo, y aun mas que no a lo bueno, no tē
 go por sano admitirla en el comun vso, y trato
 de las gentes. Y cierto es comun sentēcia, que el
 bien q̄ igualmente puede traer mal, no es bien.
 Dezisme señor Sophronio, y traeyisme por ar
 gumen-

*En los
 proble-
 mas Se-
 cto. 15
 q. 3.*

*Al prin
 cipio de
 la Ody-
 sea.*

gumento para prouar el valor del Arithmetica que todas las cosas estan dispuestas por numero cosa cierto que me parece hazer muy poco por vuestra parte. Pues que nace de la prouidencia diuina, no ay porque atribuyrlo al arte, pues si es assi, que mas por prouidencia diuina que por industria humana en las cosas ay numero, porq se ha de atribuyr su perfeccion al Arithmetica? y tambie de que sirue llamar arte, lo que vemos ser natural? que hombre se dara en esta vida, por de poco entendimiento que sea, que no sepa contar a lo menos hasta diez? y de ay adelante todo lo q quisiere lo incluy e en solos diez. Por lo qual me parece ser superfluo el tiempo que se gasta, y el trabajo que en ella se emplea, principalmente que la que haze al caso, y la que hemos menester naturaleza nos la dio, y essotra que por acà tanto se estima veo antes ser causa de daño que de prouecho. Pues si es assi que naturaleza comunmente la dio a todos los hombres, para que es llamarla arte ni estimarla: en tanto q parezca antes gracia adquerida por industria q dō de naturaleza? y si Phytagoras, y Aristoteles, Socrates, y Platō tãto por ella alcançarō, mas es de creer auer sido por la natural q por la artificial q comunmente pensamos. Contentadome ha cierto hermano Antimacho la aparēcia de vuestras razones, y el estilo de deshazer las mias, y si como el arte os ayudaua, os ayudara la verdad
por

por demas fuera esperar respuesta. Mas como quiera que yo tambien sea vn poco Sofista, conozco en q̄ se fundá vuestras razones. Y por esto no dexare de respõder algunas delas objectiones opuestas. Dezis que mal pudierã passar algunas gentes que ay sin Arismetica, si fuera tâ necessaria. De donde quereys dar a entēder ser poco prouechosa, pues lostales passã finellas. Quãto en esto os engañays, y quãto poco valga el argumento, aqui lo podeys considerar. Que entre lostales no solamente el Arismetica, que es nada, en comparacion de Dios: mas aun el buẽ conocimiento del mismo Dios, q̄ es el todo, y todo nuestro bien les falta. Y solo esto bastaua por respuesta de la objecion, y el conocer, q̄ estos no tienen perfecto vso de razon: y asì como les falta lo otro, les falta tâbien esto. En lo q̄ dezis que no ignoran la natural, puesto que nos consta ser faltos de razon yo lo concedo, aunque escura y confusa: porque como es notorio, muchas artes ay que son a los hombres naturales, y casi cõgenitas y nacidas cõ ellos mismos: las quales despues con el vso se perfeccionan, y se buelue en arte, como es la Dialectica, y Retorica, y otros semejantes: las quales quiẽ negasse tener su principio en la naturaleza de los hõbres, yria cõtra la comun sentencia de quanto algo saben. Mas no por esto dexamos de conceder su artificio, y de llamarlas artes, y no artes como quiera, sino liberales:

*Arist.
en el li.
1. de la
Retorica.*

rales:

rales: las quales segun sentēcia de Plinio, Tulio, y *Pli. li.*
 otros muchos, por tātō se llamarō liberales: por *4. de la*
 q̄ tan solamēte de hombres nobles, y de gēte li- *natu-*
 bre son dignas. Y assi antiguamente por mucho *ral hi-*
 tiempo (segun dize Cicerō) no se consintio q̄ hō *stori-*
 bre de baxo suelo, ni esclauo alguno las depren *Cic. li.*
 diesse. Assi q̄ poco importa q̄ en algunos sea esta *1. de ora-*
 arte natural: antes esso nos pone en mayor neces *tor. Ci-*
 sidad, y obligaciō dela saber. En lo q̄ dezis q̄ an- *ce. en el*
 tes es causa de mal, porque vemos muchos que *2. li. de*
 con ella hazen grandes engaños. En esto bien *las que*
 veys la poca razon q̄ teney, y como en esto no *stiones*
 solamente cōdenays al Arifmetica, pero junta- *acad.*
 mente a la Rethorica, & Dialectica. Las quales
 presupuesto que sean artes tan nobles, y vemos
 que la vna muchas vezes defiēde illicitas causas,
 persuade con falsas razones, y algunas vezes a
 ojos vistas va contra lo justo y honesto: y la otra
 por el configiēte da tantas reglas para impug-
 nar la verdad como para defendella: y nunca ja
 mas muestra la verdad, que juntamēte con ella
 no muestre la mentira su contraria. Mas no por
 esso hemos de dezir q̄ son malas, por solo que el
 poseedor vse ruynmēte dellas. Que en tal caso
 no ay que imputar al arte, que es como vna fina
 espada, que puesta en manos de vn loco ninguna
 seguridad promete, sino todo dañō y defatino,
 y por el contrario en manos de vn cuerdo es de
 grande vso y prouecho. Assi que hermano Anti
 macho

macho, el vicio del mal cauallero no se hade im-
 putar al buen cauollo. En lo demas, que es dezir
 ser superfluo el trabajo que en ella se gasta, pues
 nos dio naturaleza lo que vio que nos bastaua.
 En esto bien sabemos que natura aunq̄ da a los
 hōbres los principios y fundamētos no es mas
 de vn axioma sobre que se ha de fundar la cien-
 cia. Pues es claro q̄ no da en ellas la perfeccion
 q̄ conuiene. Y assi vemos q̄ no en naciendo lue-
 go tiene el hombre todo el vso de razon que es
 necessario, antes como dize Plinio, en esto se pa-
 rece la miseria humana : que ninguna cosa se
 permitio saber naturaleza, sin arte y doctrina, ni
 aun el comer, ni andar, dos cosas tã necessarias
 para el viuir, sino juntamente con el tiempo, el
 por si lo va alcançando, y se lo van mostrando.
 Siēdo esto assi, no ay porque la Arithmetica na-
 tural nos impida que sepamos la artificial: mas
 antes nos obliga a que con todas fuerças la pro-
 curemos, ayudandonos a ello aquel prouerbio
 que dize. Todo lo sabe el que sabe contar. Y cō
 esto concluyo y acabo, aunque pudiera mucho
 mas dezir en este proposito. Antima. Bien veo
 señor Sopronio, que las razones alegadas con-
 cluyen en parte contra mi opinion, mas cō todo
 esso no dexare de replicar lo que siento, conce-
 diendo lo que es razon de conceder. Yo biē con-
 fiesso que tenga ventaja el Arithmetica artifi-
 cial a otro qualquiera q̄ esta arte nos sepa, en la sa-
 cali-

*En el li-
 7. de la
 historia
 natura*

*Celso
 digini-
 us, l. 22
 ca. 6.*

calidad y presteza de contar, mas quiẽ quita lo q̄ le contare en poco tiempo con sus numeros, no lo quente yo de espacio, si quiera con vnos tantos, o contando con los dedos, o como hazia vna vieja, de quien aun el otro dia me contarõ. Y si todos fuesſen como aquella, poca necesidad auia en el mundo de Arithmetica. Soph. Que hazia por vuestra vida? Acaecio que esta vieja quiso vn dia feriar cierto ganado que tenia, lo qual despues q̄ huuo aueriguado el precio que por cada cabeça le auian de dar, se assentò a la puerta por dõ el ganado auia de salir: y demã daua primeramente le pagassen vna cabeça, y despues que estaua pagada mãdaua que la sacassen. Y luego començaua de nueuo a hazer cuenta de otra, y así en las de mas. Cosa cierto aparatada de todo engaño. Soph. Aun en esso parece que la muger vsaua de arte, mas tal pudiera ser la cuenta que qualquiera hombre por auisado q̄ fuera, sin el ayuda deste arte facilmente pudiera ser engañado. Antimo. Por mi fe q̄ yo se poco contar, mas que no sientto que cuenta me dareys, que ya que no tan facilmente como vn cõtador, si quiera en poco mas tiẽpo no la sacasse So. Quereys ver quan engañado estays en lo q̄ pensays, tened atencion alo que os preguntare, y vereys como por aqui me concedereys lo que por aca me negaste. Dezidme a quien os hiziese creer q̄ seys no es la mitad de doze, que le dirades?

riades: (An.) En tal caso no auria q̄ dezirle, porq̄ quien esso me dixesse, tambien me dira que no foy hombre. (So.) Pues yo no os dire esso, y os prouare estotro. Y para estopido me digays quãto es la mitad y tercia y quarta parte de doze?

(An.) La mitad de doze, digo q̄ son seys, y la tercia parte quatro y la quarta parte tres. So. Pues a esso respondo yo, q̄ seys no es mitad, ni tres es quarta parte, ni quatro la tercia parte de doze. Mas antes que a la cõclusion vengamos quiero ver si concedeys esto? Veamos, qualquiera cosa q̄ se diuidiere en partes pocas, o muchas, juntas despues las tales partes, no se hã de ygualar cõ el todo de do las tales partes salerõ? (An.) Quiẽ

*Totum,
vt Com
menta-
tor dif-
finiti ni
bil aliud
est quã
congre-
gatio
partiũ
li. i. pby
¶ pars
est ma-
teria to-
tius II.
p. 337.*

duda esso? q̄ inferis dello? (So.) Lo q̄ infero es q̄ pues diuidiste el doze en partes, y dezis q̄ 6. es su mitad y 4. su tercio, y 3. su quarto, junta todas tres partes y veamos si hazen 12. que es el numero de do se hizieron. Diciẽdo 6. de la mitad, y 4. de la tercia parte, son 10. y 3. de la quarta parte, son treze. El todo fue doze, como se ha dicho, do parece claro sobrar: vno, luego seys no es buena mitad, ni 4. buen tercio, ni tres buen quarto.

(An.) Pareceme señor Sophõnio, no ser tanta la utilidad que desta regla sophistica se sigue: que no nos podamos passar sin ella, principalmente q̄ no siento para que puede aprouchar al seruicio de la vida. (So.) Biẽ q̄ en general no firuamos, no por esso dexara de aprouchar en parte

para

para algunas cosas. Sino mira el exemplo. Tres arrendaron vna dehesa para apacentar sus ganados, por precio de 26. mil maravedis por año: con esta condic ion, q̄ el vno pague a razon de la mitad de los 26. mil maravedis. El 2.ª razon de la 3.ª parte. El 3.ª a razon de la quarta parte. Pido quanto ha de dar cada vno destos por su parte, segun el cōtrato para pagarla dehesa, q̄ ni sobre, ni falte ninguna cosa? por q̄ segun vuestra opiniõ si el que se obligò a dar la mitad de los 26. mil, da 13. mil. y si el otro por su tercio da 8666. y 2. tercios de maravedis, y el tercero da por su quarta parte 6500. entre dos tres dauan veynte y ocho mil, y ciento y sesenta y seys, y dos tercios de maravedis. Y ellos arrendadores no son obligados a pagar mas de veynte y seys mil, por dõ de claramente parece el agrauio. Pues si en cantidad y cuenta tan pequeña passa esto, que serã en vna grande? (Antima.) Agora bien yo concedo q̄ 6. no es mitad de 12. y lo mismo digo de las otras partes: mas todavia hasta que me deys otra mitad, y tercia, y quarta parte, q̄ sumadas hagan justamente 12. no me facaran de mis cassillas. (So.) A hermano Antimacho, pareceos q̄ la Arithmetica haze al caso? o si es todo contar por dedos? Pues si quereys q̄ os declare esta duda, aueys me lo de pagar. Antimacho. Y aun esto en tal hora es lo malo que tiene esta arte, mira si quiere que paguen vna mala auenturada regilla, que sabe. So. A la fe con los incredulos q̄

*Stnditi
pecunie
est unū
ex d. fi-
derijs
prater
naturā
Cūmen
tator de
Arist.
li. 1. pb
yfico.
La ra-
zon d. f
te diui-
dir en
26. par-
tes sale
de lare-
gla de
compa-
ñia del
li. 3. c. 3
exēplo.
Lee el.
c. 5. del
li. 2.*

tiene opiniones falsas assi es menester, q̄ si qui-
fieren saber algo, que sea acosta de su bolsa, o de
xallos con su necesidad, q̄ es el mayor castigo q̄
a los tales seles puede dar, mas con todo esse os
la quiero dezir, si quiera porque no cōcibays de
mi que soy amigo del dinero. Y es assi, q̄ si qui-
siessemos facar mitad, y tercio, y quarto de doze
o de otro qualquier numero, diuidireys el tal
numero en 26. partes yguales, y las doze sera la
mitad, y las ocho la tercia parte, y las seys la quar-
ta parte. Pues diuidid el 12. en 26. partes yguales,
y sera cada parte doze, veynte y seys abos, q̄
en menor denominacion es seys treze abos, de
vn entero de aquellos doze que diuidieredes.
Anti. Que lenguaje es esse? Hablad Christiano,
y dezidme que cosa es, o quiere dezir seys tre-
ze abos de entero? Sophro. Seys treze abos quie-
re dezir, qualquiera cosa diuidida, o hecha tre-
ze partes yguales, las seys dellas sera el valor de
los seys treze abos, como mejor entēdereys por
las reglas que los Arithmeticos dizen de nume-
ros rotos, o quebrados, y assi hallareys q̄ tomā-
do doze partes, cada vna de seys, treze abos, mō-
taran cinco enteros, y siete treze abos, y tanto
sera la mitad de doze. Assi mismo sumando 8.
partes destas montaran tres enteros, y nueue
treze abos de otro entero, y tanto sera la tercia
parte de doze. Suma mas seys partes y monta-
ran dos enteros, y diez treze abos de otro ente-
ro, y tanto sera la quarta parte de doze que su-
mado

mados todos tres aduenimientos, segun muestran las reglas de rotos, monta doze:

Lee el

14. ca.

¶ Por el semejante diuidireys los veynte y seis mil marauedis de la dehesa, en veynte y seys partes iguales, como se hizo en los doze, y vendra cada parte mil marauedis, sabido el valor de vna parte, el companero que se obligo a pagar a razon de la mitad, dara doze partes que son doze mil marauedis, y el segundo que ha de pagar a razon de la tercia parte dara ocho partes, que montan ocho mil marauedis, y el tercero que ha de pagar a razon de la quarta parte, dara seis partes que valen seys mil marauedis. Y desta suerte cada vno dara lo justo, segun el contrato que hizieron. Y sumando lo que entre todos tres dieron, monta los veynte y seys mil marauedis, que les costaua la dehesa. La causa porque sacando juntamēte mitad y tercio y quarto de doze, vienen a montar mas las partes juntā que todo el doze, es por ser numero que dizen superate. Mas auēys de entender, que si quisieredes sacar de doze, o de otro numero la mitad solamēte en tal caso hecho en tal numero. partes iguales, la vna sera mitad, y hecho tres partes, la vna sera su tercio y quarto, la vna sera el quarto, como poco antes dixistes. Mas auēdo de sacar las tres partes precedentes juntamente, y q̄ la suma de todas hagan tantō como el todo do se sacare las tales partes, en tal caso hareys como os he mostrado. Anti. Que bien, bien, al fin esta es vna

del lib.

3.

Lee el

6. 2. del

5. lib. 2

regla, y si a mano viene no aura otra semejante en toda la arte, por lo qual no tengo en mucho ignorarla. Eſſo dizeis? Pues esperad vn poco, que responderays a eſto que os preguntare, que es caſo que acaecio pocos dias ha por vn moço de vn ſoldado, el qual yendo a comprar prouiſiõ para ſu amo, lleuo a vn labrador q̄ vendia eſparragos, y le dixo. Quanto quereys por los eſparragos que pudiere hatar en eſta cuerda, q̄ tiene vn palmo de largo, en fin ſe concertarõ por medio real, a poco de tiẽpo boluio eſte moço al q̄ vendia eſparragos, diziendo. Hermano bien ſe os acuerda q̄ me diſtes por medio real los eſparragos q̄ hatè en vna cuerda de vn palmo de largo, al preſente quiero cõprar mas, y traygo 1. cuerda de 2. palmos de largo, q̄ es el doblo q̄ la otro da de mela de eſparragos, y pagatos he 1. real, q̄ es a raziõ de como primero nos concertamos. El labrador reſpõdio, q̄ era contento. Pido ſi en eſta cõpra ſe ha hecho algun agrauio, y quien engaño a quien, y en quanto? (Anti.) En eſſo no ſiẽto duda, ni ay agrauio alguno: Por q̄ quien duda q̄ ſi por los eſparragos q̄ ſe atarõ en vna cuerda de vn palmo dieron medio real, q̄ por los que ſe ataren en otra cuerda de 2. palmos, q̄ es al doblo mas larga, le deuriã dar doblado dinero, que ſera vn real. (So.) A vos ninguna duda ſe os ofrece: mas perdonadme por ello, quiẽ poco ſabe de vna coſa, poco duda della: y ſi quereys ver el engaño, tomad vn hilo quã grande quiſieredes, y

hatad

atad con el esparragos, o otra qualquier cosa de las que se acostumbra atar con cuerdas, como leña, alcacer, &c. Y mirad quanto atays, y tomad despues otro hilo largo al dablo que el primero y hallareys, q̄ si en el primero hilo cupieron 10. esparragos, en este otro q̄ es dobl o, cabran 40. q̄ es el quarto tanto q̄ el primero, como lo podeys experimētatar. De donde se sigue, q̄ por los esparragos q̄ ataron en la cuerda de 2. palmos, se auia de dar 2. reales: y por quanto no le dieron sino vno, parece claro el moço auer engañado al labrador en la mitad del justo precio. Y de aqui digo, q̄ si de dos facas, o costales (q̄ cada vno por si cupiesse 5. hanegas, o lo q̄ fuere) hiziesse vn dago q̄ esta vna q̄ de ambas hiziesse, cobra 20. hanegas, q̄ es quatro tanto que qualquiera delas dos, y no hara diez, como parece al juyzio los muchos. El mismo auiso se tendra todas las vezes que se midierē tierras, o alcaceres por cuerdas. Quiero dezir, que si midiessen en quadra, con vna cuerda deciertos estadales de largovna hanega de sembradura, digo que en el quadrado que se cercare en el dablo desta primera cuerda, se podra sembrar quatro tanto trigo que en el primero, como lo muestra Quintiliano. (Antim.) Aun creo señor Sophronio que me auceys de hazer, aunque no quiera ser de vuestra opinion. (So.) Antes creo yo que si otra vez caeys, que de verguença no os auceys de leuātatar. (An.)

A lo menos con ignorar estas cosas, tendre qui-

tadala ocasió de engañar a nadie. (So.) Bien me parece escusar la ignorancia con la santidad, sabiendo que el arte no se da para engañar, sino para escusar el engaño. (An) No se nada, sino que dicen en mi tierra. Quita la ocasion, y quitaras el pecado. Y tambien dize la sagrada Escritura. Quien ama el peligro, perecera en el. (Sophro) Bien parece que soys legista, y lo que alegastes fue de Teologia. (Anti.) Como assi señor Sophronio, que quiere dezir? (So.) Ahora bien, dexemonos desso, responded a otra question q os quiero proponer, veamos el señor legista si fueran a el con esta duda como la sentenciara. An. No que qualquier duda que a mi se me ofreciera, si la sentencio conforme a las leyes, no deo mas. So. Bien está esso: mas tambien sabeis, que dezis allá vosotros, mas negocios ay que leyes, y este caso no está decidido en derecho. Por tanto sepamos como os aprouecharays de vuestra cuenta natural, para lo qual pongo el caso, q vn hombre dio à hazer vn pozo de quatro estados de profundidad, por precio de veynte reales. El oficial despues que huuo hecho dos estados, pidio por merced al dueño del pozo se contetasse con lo que auia trabajado, por quanto no podia trabajar mas: y pidio le pagasse los dos estados que dexaua hechos, rata por cantidad. El señor del pozo respondio que era cõtento de soltalle la obligacion, y de pagalle su trabajo. Pidio quãto merecẽ estos dos estados q quedaron hechos,

*Eu el
Eccle-
siastico
4.3.*

*Cõsul-
tus leg.
4. ff. de
verbis
prescr.*

a razon de q̄ si hiziera los 4 estados le auian de pagar 20. reales? Anti. Mi parecer es, que pues por todos 4. le dauan 20. que por los 2. le den 10 So. Está muy bien respondido, de suerte que no hazey diferencia del trabajo de vn estado al de los otros, siendo como es cosa clara q̄ el primero estado es de menos trauajo q̄ el segúdo, y por el consiguiente el tercero es de mayor trabajo que el segundo, y el 4. mas que el 3. Y assi parece no auer razon para que se paguen por ygal, principalmente que los dos primeros estados que hizo son casi de menos trabajo que ninguno de los que dexo por hazer. An. Dexadme, no se que me dezir, sino que lo juzgara como lo tengo dicho, o hiziera vn hombre del mismo oficio que lo tassara, y pusiera en su parecer mi decreto. So. De suerte que juzgarades conforme a vn oficial mecanico. Y si a caso el tal juez arbitrario cargara la mano de facordado de su conciencia cō codicia q̄ otro le pagassen en la misma moneda, pareceos q̄ fuera bien juzgado del otro y de vos? Pues yo os quiero declarar la orden que se ha de tener para hazer esta cuenta y sus semejâtes. Y assi es q̄ por quanto dizen q̄ el poço auia de ser de 4. estados, assentareys 4. numeros comēçando de la vnidad, y q̄ vnos a otros se excedan en vno, assi como vno, dos, tres quatro. Y sumar los heys, y seran diez. Hecho esto, pondreys de nuevo otros tâtos numeros, como fueron los estados q̄ quedarō hechos por la misma

1

2

3

4

10

forma, y fumar se hã como los otros 4. y môtarã 3.
 Y para esto se notara q̃ los 10. q̃ môtarõ los 4. n.
 primeros, es la suma q̃ môtã los 4. citados q̃ auia
 de hazer, y la proporciõ q̃ qualquiera destos nu-
 meros haze a otras, la misma haze el trabajo del
 vn estado al de los otros. Afsi mismo los 3. es la
 suma de los 2. citados q̃ dexõ hechos. Direis aor-
 ra, si por 10. q̃ es la obra de todo el pozo, me dã
 20. reales por 3. que es la obra q̃ quedõ hecha,
 quanto dara? Multiplicad los 20. por los 30. y
 montaran 60. partid 60. a los diez, q̃ es la suma
 de todo el pozo, y vendran a la particion 6. los
 quales son reales, y es el precio q̃ merece el tra-
 bajo de los dos citados (Anti.) Ora bien señor
 Sophronio que yo me rindo, y me doy por con-
 tento, y connessio la necesidad q̃ deste arte ay: y
 no creays que dudaua tanto quãto os dixẽ, que
 si hasta aqui he negado, mas ha sido por dispu-
 tar, que por pensar ser verdad lo que yo dezia,
 principalmente que he leydo tener todas las de-
 mas d. ciplinas necesidad desta arte, y ella no
 de otra ninguna, y por tanto en pago de la afrẽ-
 ra que passõ en darme por cõcluydo, quiero que
 comuniquen os algunos secretos, que dizen de
 Arismetica. (Soph.) Por mi fe que me huelgo
 de os auer conuertido en tan pequeños mila-
 gros, que h. ziera si fueran mayores? Y por esto
 como a rezien conuertido os quiero instruyr
 bien: mas pareceme que llaman a la puerta,
 aguardad, f. pamos quien es.

*Esta es
 regla q̃
 dixẽ de
 tres, lee
 el ca. 1.
 del 3. l.
 bro.*

AQVI COMIENZA LA SEGUNDA parte del Dialogo, el argumento del qual es, q̄ junta dose otros dos estudiantes con Sophronio, y Antimacho, se prosigue la platica entre todos quatro diziẽdo cada uno las preguntas, o dislates que sabe: assi como se haze quando en las noches de Nauidad se junta a algun numero de gente al rededor del fuego, todo por terminos comunes de Arismetica.

INTERLOCUTORES.

Damon.

Lucilio.

Sophronio.

Antimacho.

Ata. (Sop.) Quiẽ es? (Damo.) Vuestros seruidores y amigo. Soph. O seño res mios, y a que buẽ tiempo, la venida sea en muy buena hora. Damo. En la misma estẽ v. m. que yo no puedo venir sino en buena, viniendo a esta casa, donde tanta merced y fauor suelo recibir. Sophr. Aqui la recibo siẽpre seño con vos, ya ora mayor. Damon. Como assi seño Sophronio? Soph. Porque cierto parece q̄ viene a pique. Hemos estado Antimachoy yo bien vna hora en vna controuersia y disputa, y ha nos faltado quien ponga el baston, o a lo menos terciasse en ella. Damon. Y sobre q̄? Sophronio. Sobre q̄ puede ser, sino sobre esta nuestra facultad de Arismetica? que como no haze a todas fillas, no faltan emulos y detractores de ella. Ha querido hazerme entẽder ser superflua y no necessaria. Lucilio. Es possible? pues entemos alla, q̄ no sera dificultoso hazerle desdezir.

So. Entremos. Anti. A feñor Sophorn, no se pue
 de ya negar, que esta no es junta, y caso pensado
 So. Como afsi feñor Antimacho? Anti. Aun esta
 uamos riñendo nuestra pendencia, y venis abro
 quelado con vuestros amigos Damon y Lucilio
 no poco apasionados desta vuestra arte. Soph.
 Por cierto Antimacho à caso ha sucedido su ve
 nida. An. No lodigo por tâto, végan en hora bue
 na. Si valiesse mi dicho, bien ofaria certificar q̄
 de la puerta aqui vienen sobornados. Da. Para q̄
 feñor Antimacho? Ant. No para mi tanta dissi
 mulacion, quien duda q̄ nuestra cõtienda ya no
 la saben. So. No. No negarè la verdad, yo les he
 contado nuestra porfia ser de Arithmetica, mas
 no en lo q̄ diferimos. An. Agora biẽ, sea afsi, yo
 lo creo. Da. Pues adelante, q̄ por nosotros no es
 razon q̄ question sobre materia tan alta sedexe.
 An. Eflo si decubrir. No cayera mal aqui lo q̄ di
 xo Sempronio. Tan grande es Melibea, q̄ no le
 cabe a nuestro amo en el corazon, q̄ por la boca
 se le sale a borbollones. Agora para cõtra mi po
 casarmas son menester, q̄ yo ya estaua rendido
 con las buenas razones q̄ Sophronio me ha da
 do. Y luego muy mucho de vuestra venida, porq̄
 juntamente con Sophornio me holgare de oyr
 algunas alabanças, y secretos desta arte tan ne
 cessaria a la vida humana. Y si alguna gracia de
 vosotros he de recibir, sera q̄ comiẽce primero
 Sophronio: prosiguiendo la platica q̄ entre no
 otros estaua començada. Lu. De la boca me lo
 quitaf-

quitastes q̄ ya yo q̄ria mouerla, y pedir licencia
 para rogalle q̄ prof. guiesse. So. Trabajoso cargo
 me days, mas dire lo que entendiere, por dos co-
 sas. La vna, porque el dia no se nos passe en di-
 tu, mas digastu: y lo otro, por q̄ mi edad me tiene
 cõcedido este priuilegio. Y por q̄no salgamos del
 juego, quiero poner en platica vna demãda, aũ-
 que muy trillada entre todo genero de gentes.
 ¶ La qual pide, quanto trigo sera menetter para
 todas las 64. casas del axedrez, poniẽdo en la pri-
 mera casa vn grano, y en la segunda 2. y en la ter-
 cera 4. y en la quarta 8. y asì prof. guiẽdo dobiã
 do los granos en cada vna casa, como dizen los
 mercaderes en su lãgua vulgar à la cernina, o ga-
 llerin. Lu. Por mi parte yo huelgo mucho de lle-
 gar a este tiempo: porque es cosa esta q̄ muchas
 vezes he oydo dezir y platicar, y al fin concluyẽ
 diciendo, que no se puede numerar, por ser tan
 gran suma de granos los q̄ son menetter. (Da.)
 Esta es opiniõ del vulgo, mas creedme, que estã
 el negocio en manos de quien nos dara luz de
 ello. (An.) Santa Maria, esto passa asì? por cosa
 increyble lo tengo, y cierto quien a mi me hi-
 ziesse creer que no ay harto con los granos que
 cupieren en vn celemin, odos, lo negro me harã
 entender ser blanco. (Sophro.) Hora bien, que
 pues ami toca esta duda, y nadie se atreue a de-
 claralla, yo quiero dezir lo que della sè, y digo,
 que se haze esta cuenta proponiendo vna pro-
 porcionalidad continua dupla, començando de
 vno,

vno, y feneciendo en sesenta y quatro terminos
 Por quanto las casas del Axedrez son sesenta y
 quatro, y vendran a montar la vltima cosa de to-
 das estas sumas de granos.

92233720.36854775808.

¶ Para saber agora a lo q̄ todas 64. montan, qui-
 tareys del doblo desta vltima la suma de la pri-
 mera, q̄ es vno, y la resta es el numero, y suma de
 los granos q̄ son menester para todas las cosas
 del Axedrez, que es esto que se sigue

18446744073709551615.

Y porque mas facilmente se pueda numerar esta
 suma, la reduzire a otra mas pequeña suma, y q̄
 valga tanto vna como otra, para lo qual pongo
 por caso, q̄ vn quartillo de trigo tenga 30000.
 granos, poco mas, o menos, a este respecto de ce-
 lemin tendra 102000. y la anega vn cuerto y qua-
 trociētos, y quarenta mil granos, y vn cayz (q̄ es
 vna medida q̄ vale 12. hanegas) tédra diez y sie-
 te cuentos, y docientos y ochenta mil granos,
 Afsi mismo pongamos q̄ vn carro lleua 6. cay-
 zes de trigo, q̄ montan estos 103680000. granos
 pues a este respecto, quantos carros llevarán los
 granos de trigo, que montan las sesenta y qua-
 tro casas del Axedrez? Para sabello, partireys
 los granos de todas las casas del Axedrez por
 los granos q̄ montan los 6. cayzes, que lleua vn
 carro, y védra a la particiō cierto y setenta y sey-
 mil y noucientos y diez y nueue cuertos, y nue-
 uecientos, y ochenta y cinco mil, y docientos y

sesenta y ocho carros. Y tantos carros digo q̄
 son menester para llevar los granos del Axedrez, y mas sobran cinco cahizes, y tres quartillos, y veynte y vn mil y feyscientos y quinze granos que rendra bien en que entender otro carro para llevarlos. Cosa cierta que pone admiracion el crecer que haze Damon. Que os parece señor Antimacho? Antimacho. Estoy tã admirado, que tengo por cierto, que la mayor parte de los que lo oyeren, lo tendran por fabula. Principalmente que ay algunos que no creõ sino lo que veen y entienden. Lu. Para estos, el mejor remedio es remitirlos a la pruenta. Sophronio. Amigos ya yo he hecho mi deuer, vaa por orden, y hable el que tras mi ha de hablar, porque examinemos aqui las p̄guntas curiosas de Arithmetica que se ofrecieren, especialmente que nosotros supieremos. Lu. Pareceme que a Damon le viene la mano. Antimas. Esto si comience Damon, que aun yo toda via estoy imaginãdo si puede ser lo de los carros del trigo. Y cierto, que si assi es, que la primera merced q̄ a Dios pido, es vn Axedrez de trigo. Da. Escuchad pues, q̄ lo que yo dire mas facilme lo percibireys, que lo que se ha tratado. ¶ Vno comprò 20. perdices por 8. reales, cada cinco perdices a razon de 2. reales. Este hombre quiere despues tornar a vender las mesmas 20. perdices al mismo precio que las cõpro, y ganar algo por su trabajo: Pides que diligencia se podra

dra tener para ganar algo, reuēdiendo las al precio que las compro? Esta cuenta declarare, pues se me concedio la licencia, desta manera. Las 20. perdizes las diuidireys en dos partes iguales, conuiene a saber en 10. mejores, y en 10. no tales. Hecho esto, vendereys cada par destas 10. perdizes mejores por vn real, y cada 3. perdizes de las otras diez, que no son tales, por otro real. Y desta manera dareys 5. perdizes por dos reales, como al principio se comprarō, y se ganara vna perdiz al parecer en la segunda venta. Porq̄ de las buenas, dādo cada dos por vn real, hareis 5. reales, y de las otras 10. dando cada tres por otro real, se hazen 3. reales, y sobra vna, y assi se sacara el caudal que todas costaron, que fueron 8. reales, y queda vna perdiz de ganancia. Lucilio. Assi parece mirando lo de presto, aunque a la verdad desta cuenta, y de las que por mi parte dire no se seguira mayor vtilidad, que cumplir con nuestra conuersacion, porque a donde esta Sophronio, si algunas delicadezas esta arte tiene, dellas auremos de oyr. ¶ Y pues ninguno puede darlo que no tiene, la mia sera dezir, como vn hombre repartio a tres criados suyos ciento y veynte limones, dando a vno 60. y a otro quarenta, y otro veynte, para que los vendiesen. Y mandō que vendiesse primero el moço, que lleuana sesenta, y que despues vendiesse los otros al mismo precio y respecto, y que traxiesen tantos dineros el vno como el otro. Pídele,

como

como se vendran los sesenta primeros, para que
 vendiendo todos tres al mismo respecto traygã
 tantos dineros vnos como otros? Esta ciẽca de-
 clarare presto porno detenernos en palabras. El
 que lleuo sesenta, dio cada 7. limones por vna
 tarja, y si algunos limones le sobrauã menos de
 siete, daua cada vno por tres tarjas, y desta ma-
 nera dio los cinquẽta y seys, que son ocho sietes
 por ocho tarjas, y los quatro que le quedarõ, dio
 cada vno por tres tarjas, y ansi hizo dellos do-
 ze tarjas, y 8. que auia hecho de los cinquenta y
 seys que auia vendido primero a razon de siete
 limones a tarja, montã veynte tarjas. Y assi res-
 pondereys, que el moço que lleuaua sesenta li-
 mones hizo veynte tarjas. Y al mesmo precio
 vendio el otro moço los quarenta limones que
 su amo le dio, y hizo veynte tarjas. Porque dio
 los treynta y cinco por cinco tarjas, por causa,
 q̃ en treynta y cinco ay cinco sietes, y los otros
 5. que le sobraron diolos por quinze tarjas: por
 que daua cada vno por tres tarjas, como hizo el
 primero, y assi montan veynte. Assi mesmo ven-
 dio el moço que lleuaua veynte limones, dando
 los catorze, que son dos sietes, por dos tarjas, y
 los 6. que le quedaron por 18. dãdo cada vno por
 3. como los primeros hizieron, y assi cumpli-
 ron lo que su seõor les mando, vendiendo todos
 a vn precio, y haziẽdo tanto dinero vno como o-
 tro. Aunq̃ vnos lleuauan mas limones q̃ otros.

¶ El mismo efecto se haze si se reparten nouen-

limones, dando a vno 50. y a otro treynta, y al otro diez, que guardando la orden que se tuuo en la cuenta precedente, lleuara cada vno diez tarjas, y lo mismo es en algunos numeros diuidido en tres partes, y que vnas a otras se excedan en veynte (An.) Esto a buen seguro que no pudo acontecer en el Andaluzia. (So.) No sino en tierra de golofos. (Da.) Profiga el señor Antimacho con la orden. (An.) Señores mal dirá vno sutilezas del arte de q̄ aun no sabe los principios, mas por cumplir cóla orden q̄ lleuamos en dezir, pareceme cōtar vna contienda q̄ passó entre 2. regatonas q̄ vendiã melones, sobre qual de las dos tenia mas sumade melones. Dixo la vna a la otra. Mirad la doña tal q̄ presumpcion por negros 2. meloncillos q̄ tiene, q̄ en mi conciencia q̄ si vno de vuestros melones os comprare tendre doblados melones q̄ vos. Respondio la otra, diziendole. Gracias a Dios, q̄ no deuides vos hablar adogentes h̄ mielle, siendo quié soys. Dos meloncillos dezis q̄ tengo? Pues no teneys vos muchos mas q̄ yo, q̄ cóprado vno de los vuestros tendre tanto como vos. P. d. se, quantos melones tenia cada vna? Digo que la vna tenia siete, y la otra cinco, porque si la que tiene cinco cópra vno a la que tiene siete, cada vna tendra seys, y la q̄ tiene siete e compra se vn a la que tiene cinco, la vna tendra ocho, y la otra quatro y assi tendra doblados melones la vna que la otra. So, ha, ha, ha, ha, bueno por cierto. Es posible

ble aueros podido persuadir, tener cosa tan deli-
cada y tan contra vuestra opinion encubierta?
A. Señor profegui no sean vuestras palabras ex-
clusiuas, como dize. S. No lo dezia por mas: y
pues ha tornado a mi, quiero dezir vna que pa-
rece a las que dixo Lucilio sobre el véder de los
limones. Y es q̄ vno tenia sesenta Cidras, y dio
cincuenta dellas a vn moço, y las diez a otro, y
mandò al que lleuana cinquenta que vendiesse
primero, y que como este vendiesse, afsi hiziesse
el q̄ lleuaua diez, y que truxesse doblados dine-
ros, el que lleuò diez, que el otro de sus cincuen-
ta. Pidese como venderan? Respondese que da-
rán cada siete cidras por vn real, y las que que-
daren que no llegan a siete; cada vna por treze
reales, de fuerte que el que lleuo cinquenta, dio
las 49. por siete reales, por causa que en 49. ay
siete setes, y la vna que le quedo diola por 13. y
afsi hizo 29. reales de todas cinquenta. El que
lleuo diez, dio las 7. por vn real, y las 13. que le
quedaron por 39. reales, a razon cada vna de tre-
ze reales, como el primero hizo. Y desta ma-
nera hizo quarenta reales, que es doblado dine-
ro que lo que el otro hizo de las cinquenta. Y
afsi se inuentaran otras muchas por el semejan-
te. Damon. No siento cosa que de proponer sea
digna y tocante a nuestra platca en compara-
cion de lo que os he oydo. Lu. Por lu que toca a
mi parte digo, que cada vno proponga con fa-
cilidad lo que a la memoria le viniere de cosas

oydas, o vistas, tocantes a esta materia, porque procurar q̄ nuestra platica sea nueva, es por demas. Porque como dize Terçcio: ninguna cosa se dize, q̄ no se aya dicho ya otra vez. Sophron.

*En el
prolog,
Eunus.
cho.*

Bien me parece. An. Por mi se señores q̄ yo juzgo por harto nuevo todo lo q̄ hasta aqui he oido. Da. Hora señores conforme al concierto quiero dezir. Como dos caminantes lleuauan 8. arrobas de vino, y en el camino determinarõ de deshazer la cõpañia, y de apartarse cada vno por su cabo: y auiendo de partir por mitad del vino, hallaron que no tenian sino dos medidas. La vna cabia 3. arrobas, y la otra 5. pide se como partiran con estas 2. medidas diferentes el vino para q̄ cada vno lleue 4. arrobas que le vienẽ de su parte? Esta cuenta hareys llenando primero la medida de 3. arrobas, y vazandola en la de 5. y llenando otra segundavez la medida de tres y vazandola en la de cinco. Y como la de cinco no cabe mas de cinco, quedaravna en la de tres. Agora que esta llena la de cinco, vaciarla heys en el vaso a do està todo el vino: y el arroba q̄ quedò en la medida de tres, echarla heys en la de 5. y llenareys otra tercera vez la de tres, y vaziar se ha tambien en la de cinco, y assi con la vna que tenia dentro, tendra quatro arrobas, y desta suerte partieron su vino en dos partes yguales, y como dize 8. puede dezir 10. arrobas, y las medidas sean vna de tres y otra de 7. Lu. El caso q̄ yo pongo es, q̄ vna muger lleuaua a la plaçavna cesta

cesta de huevos, y llego vn moço con tan gran
 priessa por cóprar antes q̄ otro, que hizo caer la
 cesta en tierra, assi q̄ los huevos todos se quebra-
 ron. La muger pidió que se los pagasse. El mo-
 ço respondió, q̄ era muy contento, y q̄ le dixesse
 quantos eran los huevos q̄ traya? La muger res-
 pondió, q̄ no se acordaua, mas que en su posada
 auia hecho cuenta, q̄ si diera de dos en dos los
 huevos, le sobrara vno: y si los diera de tres en 3
 tãbien le sobrara vno, y de quatro en 4. le sobra-
 ra vno, y de 4. en 4. le sobrara otro, y que lo mis-
 mo hiziera si los diera de 5. en 5. y de seys en 6.
 Mas los diera de siete en 7. vinieran justos, y no
 le sobrara ninguno. Pidesse quantos huevos lle-
 uaua esta muger? Esta regla se haze assentãdo en
 figuras todos aquellos numeros que dixo la mū-
 ger, q̄ si con qualquiera dellos, los huevos se cō-
 taran, sobra vno. Desta manera 2. 3. 4. 5. 6. y mul-
 tiplicarse han vnos por otros, diziendo assi dos
 vezes 3. son 6. y despues 6. vezes 4. son veynte y
 quatro, y veynte y quatro vezes cinco son 125. y
 125. vezes 6. montaran 720. A los quales aña-
 direys vno por razon del que sobraua, y montaran
 setecientos y veynte y vno: y tantos huevos di-
 reys que podia llevar esta muger. Los quales si
 se cuentan de dos en dos, sobrara vno: y de tres
 en tres, sobrara otro, &c. Y si se cuenta de siete
 en siete, vienen justos. Tambien pueden ser tre-
 ciẽtos y vno: porque tienen el mismo efecto. en
 quanto a lo que la demanda pide (Anti.) Señor
 aunq̄ sea atajaros, antes que passays a otro pro-

posito, quiero preguntár, porque no se me olvide vna duda al señor Sophronio. Y es esta. Vn hōbre tomó vna posada por 30. dias, por precio de vn real cada dia este huesped no tenía otro dine-ro, sino 5. piezas de plata, q̄ todas ellas valian 30 reales. Y con estas piezas cada dia pagaua la posada, y no le quedaua a la huespeda deuiendo nada, ni el a ella. Pido cuántos reales valia cada pie-
Lee el
lib. 5.
 ça? y como pagaua cō ella? (So.) Yo os lo dire, porque no ay q̄ hazer otra cosa, sino tomar 5. nu-meros, en proporciō dupla, porq̄ las piezas de-
 zis q̄ son 5. comenzando dela vnidad. Mas el vl-timo numero ha de ser vno menos del dobro, di-
 ziēdo afsi. Vno, dos, quatro, ocho, quinze: y afsi
 responderéis, que la vna pieza valia vn real, y la
 otra dos, y otra 4. y otra ocho, y otra quinze.

Y firmando el precio de todas cinco, montan treinta reales. En lo que pedis os declare, como pagaua cō ellas: digo, que el primero dia dio la pieza que valia vn real, el segundo dia, dio la pie-
 ça de dos reales, y cobró la que auia dado de vn
 real. Y afsi en los demas dias trocando vnas y
 otras, pagaua la posada: y no se restaua deuiē-
 do nada el vno al otro, hasta tanto que en fin de
 los treynta dias se le quedaron todas cinco pie-
 ças a la huespeda por su posada. Y mas os digo, q̄
 guardando la orden que en el valor estas cinco
 piezas precedentes guardan, que es, que vna va
 le el duplo que la otra, fuera de que la mayor va
 le vno menos, se puedē aumentar piezas, y dias.

Quiero

Quiero dezir, que con o r r r s seyspieças, vna que valga vn real, y la segunda dos, y la tercera 4. y la quarta 8. y la quinta 16. y la sexta 31. se puede pagar vna posada, sesenta y dos dias, a razon cada dia de vn real, guardando la orden que có las cinco se guardò. Y assi se añadiran mas, o disminuiran. Y pues he respondido segun me parece a la duda por An. puesta. oydme y dire lamia.

¶ Vn hõbre entrò en vn hospital a visitar quatro enfermos: y llegando al primero le dixo. Hermano doblame el dinero que traygo, y daros he quatro reales. El pobre le doblò el dinero (que era harto poco) y recibio 4. reales. Hecho esto, passò al segundo, y hizo lo mismo que con el primero, y lo mismo hizo con el tercero, y quarto. Este hombre al fin que huuo hecho sus quatro limosnas, quiso ver el dinero que le auia quedado, y hallose sin blanca. Pidesse con quantos dineros entro a visitar, y quanto dio a cada vno de los quatro enfermos. Esta cuenta y las semejantes sehazen desta manera. Que por quãto hizo quatro visitas, y en cada vna doblaua el dinero, y daua quatro reales: por tanto sacareys la mitad dela mitad delos quatro reales, que gastaua tantas vezes como enfermos visitò. Pues por quanto visitò quatro enfermos: por tanto saca quatro vezes la mitad de los quatro reales que gastaua diziendo assi. La mitad de quatro reales es dos, y la mitad de 2. reales es vno. Otra vez, la mitad de vn real es medio, y deste me

dio real, la mitad es vn quartillo. Suma agora es-
 tas 4. mitades, como son dos reales, y vno, y me-
 dio, y vn quartillo, y montara todo tres reales, y
 medio y vn quartillo. Y con tanto dinero digo,
 que entrò este hombre en el hospital. Si quisie-
 redes saber si esto es verdad, y quanto dio a ca-
 da pobre, hareys assi. Con el primero doblò sus
 tres reales y medio, y vn quartillo, y hizo siete
 reales y medio, diole quatro, quedose con tres,
 y medio, do claro parece auer dado vn quartillo
 al primero. Fue con los 3. reales y medio al se-
 gundo y doblolos, y hizo 7. diole 4. quedose cò
 3. Y assi dio a este medio real. Passò con los tres
 reales que le quedaron, del segundo al tercero,
 y doblolos, y hizo 6. dio 4. quedose con dos. Y
 assi dio a este tercero vn real. Fue con esto a dos
 reales que le quedaron del tercero, a visitar al
 quarto enfermo, y doblolos, y hizo quatro: dio-
 felos, y quedose sin blanca, y assi dio a este pos-
 trero enfermo dos reales, y desta suerte se ha-
 ran las semejantes, aunque las visitas sean mu-
 chas, o pocas, y aunque la cantidad que gastare
 sea grande, con tal, que lo que gastare con vno
 gaste con otro. (Da. No es de callar lo q̄ me con-
 taron, que acaecio a vno que vendia lugos: el
 qual teniendo vna sola pesa, que pesaua ciento
 y veynte y vn marauedis de hijos. y viendo que
 no podia pesar por menudo por falta de pe-
 sas pequeñas, tomò tan grande odio con la pesa
 que la tirò a vna pared, y hizose cinco pedaços.

Y a caso se diuidieron, de tal monera, o proporcion, q̄ de alli adelante con los 5. pedaços q̄ de la pesa grande se hizieron, pudo pesar vn marauedi de higos, y 2. y 3. &c. hasta tanto que poniendo en la balança todos los 5. pedaços pesauā los ciento y 21. marauedis, que la pesa grande solia primero pesar, antes q̄ se diuidiera. Pidise quantos marauedis pesaua cada vna de los 5. pedaços. A lo qual se responde, que el vno pesaua vn marauedi, y el segundo tres, y el tercero nueue, y el quarto veynte y siete, y el quinto ochenta y vno. Y desta suerte guardando la proporcion que estos numeros lleuan (que es tripla) puedes acrecer, o disminuir pesas. Quiero dezir que destas cinco pesas quitaredes la vltima que pesa ochenta y vno, quedaran las quatro primeras, con las quales se puede pesar desde vn marauedi hasta 40. que es la suma de todas quatro. Assi mismo si añadiredes a estas cinco pesas otra que sean seys, con tal que guarde la proporcion, que todas guardan, se podra pesar desde vn marauedi hasta trecientos y sesenta y quatro, q̄ es la suma de todas seys piezas: assi de lo de mas. An. Pues sepamos señor Sophronio, ya q̄ es notorio que la pesa se hizo cinco partes, y q̄ la vna pesa vn marauedi, y la otra tres y la tercera nueue, &c. Como con estas siendo cinco, y teniendo cada vna su valor diferente, se puede pesar vn marauedi de higos, y dos, y tres, y quatro &c. Pues que no ay pesa que valga dos maraue-

dis, ni quatro? So. A esso respondo, q̄ para pesar dos marauedis se pondra la pesa de 3. en vna lança, y la de vn maruedi en la otra, a do se han de poner los higos: y desta fuerte se quitavno de los 3. y quedan dos. Pues para pesar 4. marauedis (pues dizes que no ay pesa) pone la pesa de vn maruedi, y la de tres. Y para pesar cinco, ponerse ha la pesa de nueue en vna parte, y con los higos echaran la pesa de vn maruedi, y la de 3. y assi se quitan quatro de 9. y quedan 5. Y desta manera se pesaran cõ estas 5. pesas desde vn maruedi hasta ciento y veynte y vno, como al principio dixẽ. (An.) agora caygo en el negocio, q̄ hasta aqui no os auia entendido. Lu. Señores el que supiera responda a esto. Vn cozinero teniẽdo necesidad de vn par de huevos, fue avna despena por ellos: en la qual hallo tres porteros: y llegando al primero, y demandando los huevos respondió el portero, que entrasse por ellos, con tal condicion, q̄ sacasse tantos huevos que le pudiesse dar los medios, y medio huego mas, sin partir ninguno. El cozinero respondió, que le plazia, y assi se passò al segundo portero, con el qual passò la misma platica q̄ con el primero y lo mismo demandò el tercero. Pidesse quantos huevos sacara para que despues de auer dado a cada portero lo que le prometio le quedendos. (Lu.) A mi parecer esta cuenta se haze desta manera. Que por quanto hade dar a cada vno de los porteros la mitad de los huevos q̄ sacare y me

y me dio mas, y se ha de quedar con dos: por tã to doblaremos los dos hueuos tantas vezes como son los porteros, y cada vez que doblaremos se añadira a vno, por razon del medio hueuo, q̄ se da mas de la mitad. Pues dobla diziẽdo. Dos y dos son 4. añadiendo vno seran 5. Dobla estos 5. otra vez, diziendo. Cinco, y cinco son 10. y 1. mas son 11. Otra vez doblareys estos 11. y seran 22. y vno mas que se ha de añadir seran 23. Y tantos hueuos sacara este cozinero, para cumplir lo que prometio con los porteros, y le quedaran 2. Y pues sabe ya los hueuos que ha de sacar, sepamos como los reparte. Y es desta manera, que dara al primero la mitad de veynte y 3. que son onze y medio. Y por quanto es obligado a dalle medio hueuo mas, vltra de la mitad, por tanto le dara doze, y no partira ninguno, y quedar se ha con onze. Va al segundo portero, con los onze hueuos que le quedaron, y dale los medios que son cinco y medio y medio que le ha de dar mas montan 6. y quedãse con cinco. Fue con estos 5. que sobraron al primero portero, y vltimo a respecto dela salida: y dale los medios que son 2. y medio, y medio q̄ le ha de dar mas, montan 3. Dar se los ha, y quedar se ha con los 2. Y afsi haran las semejantes, doblando como hemos dicho los hueuos que huuiere de sacar tãtas vezes como fuerõ los porteros, y añadiẽdo 1. por cada medio que se huuiere de dar mas dela mitad. (So.) Profigase la platica, pues

en esto no ay mas que responder. (Antim.) Ellas cosas verdaderamente mucho me aplazen, porque facilmente qualquiera juzgara ser afsi: mas las passadas antes desta, del todo me dexarõ atonito, y afsi mismo otras 3. cosas de q̄ vi jactarse a vn Contador. Y la primera dellas es, q̄ sacara por su cuenta, todas quantas tejas tenia vn tejado sin errar ninguna. La segunda, que me esparito fue dezir vna anega de trigo quantos granos tenia. La tercera quantas hormigas mouerân vna cãpana por grande que sea. Y holgaria infinito saber del señor Sophr. en q̄ se funda quien esto promete, o como se puede saber. So. En tan buen proposito no puedo faltar: Principalmente a quien tanto desseo seruir. ¶ Quanto a lo 1. q̄ dezis de saber lastejas que vn tejado tiene, no es cosa de mucha dificultad. Y hazese la cuenta, multiplicando las tejas q̄ tuuiere vna canal, por todas las canales del tejado, y lo q̄ saliere de la tal multiplicacion es el numero de tejas q̄ el tal tejado tiene. Y esto tiene lugar de verdad, quando vnas canales tienen tantastejas como otras y porq̄ no todas estan yguales entejas digo, que no se puede saber quantas ay juntamente: mas mi parecer es, q̄ pues se ha de subir a contar quãtas tejas tiene vna canal, y quantas canales tiene, q̄ las cõteys, vna a vna y no errareys. Anti. En merced se tiene el auiso, porq̄ viene a buen tiempo. So. Quanto a lo segundo, q̄ es saber quãtos granos tiene vna hanega de trigo, dire en q̄ se fan;

Lee el
c. 9. del
li. 1. y el
c. 3. del
4.

fundan: y juzgareys como no es posible saber se. Dizen, q̄ se pese vna anega de trigo muy limpio, y despues q̄ se supiere, si pesa tres, o 4. arrobas, o lo q̄ fuere reduzirseha lo que pesare a onças, o a otra pesa mas pequeña. Y multiplicando despues todas las onças q̄ la hanega pesa, por los granos q̄ hallan q̄ tiene vna onça: y lo q̄ mōta esta multiplicacion seran los granos de la tal hanega. Y no ay duda, sino que si fuessen lōs granos semejātes en peso y cuerpo q̄ seria assi: mas vnos granos son grādes, y pesan poco, otros siendo pequeños pesan mas, y abultā menos por lo qual nose puede saber quātos ay justamēte. ¶ En quanto a lo tercero q̄ dezis de saber las hormigas q̄ moueran vna cāpana, es q̄ pesan la cāpana de trigo, y miran quantos granos tiene todo el trigo, guardādo la orden q̄ en lo q̄ acauamos de dezir se declaró. Y tantos quantos granos hallā tener el trigo, y tantas hormigas infieren q̄ moueran la cāpana. La razon es, porq̄ lleuādo vna hormiga vn grano de trigo, si vna campana pesa 10. mil granos, 10. mil hormigas la lleuaran. En tienda se q̄ lleuarā el peso de la tal cāpana en trigo, mas no en metal. ¶ Que por pequeña q̄ sea la cāpana no la moueran, no digo yo 10. mil hormigas, mas aú todos los hormigones del mūdo An. Esta es mi opinion, ni aun el trigo nose puede saber por lo q̄ auceys dicho dela inigualdad q̄ ay en los granos. Da. Vos nos auceys biē absuelto las dudas propuestas, y a mi juyzio el señor

rimacho deue quedar satisfecho de ellas. Anti.
 Si quedo cierto: y tanto que considerado lo que
 ha dicho me parece que el contador que de se-
 mejantes cosas se alaba da a entender que sabe
 poco desta facultad. Mas pues ay tiempo y lu-
 gar quiero agora hazer del Arithmetico, y pre-
 guntar a Damon. ¶ Si se puede saber por secreto
 de numeros si escondiessen en algú numero de
 gēte vna fortija: quié la tiene, y en q̄ mano y de-
 do, y juntara? Da. Porq̄ lo tengo por bué exerci-
 cio, quiero hazer loq̄ se me manda, en dar mi pa-
 recer en este proposito. Si lo q̄ dixere fuere algo
 cada vno tome lo q̄ quisiere, porq̄ en muy pocas
 palabras dire lo q̄ siento. Y digo, q̄ la orden que
 cerca desto tendreys por regla general es, q̄ des-
 pues q̄ toda la gente estè ordenadamente assen-
 tada al rededor del aposento, y q̄ tenga vno ya
 la fortija puesta ya en el dedo, y jūtara de la ma-
 no q̄ quisiere, hareys lo q̄ los preceptos siguiē-
 tes muestran. Primeramēte mandareys q̄ miren
 quantos hōbres ay, desde el primero q̄ estuuiere
 en el principio del assieto, hasta el que tuuiere
 la fortija, contando inclusiuē, y que los do-
 blen. Dixe inclusiuē, porque se ha de doblar el
 mismo que tuuiere la fortija. Lo segundo al do-
 blo de los hombres añadan cinco. Lo tercero,
 multiplique se todos por otro cinco. Lo quarto
 añadan la mano desta manera. Que si tuuiere la
 fortija en la mano derecha, añadan dos, y si en
 la yzquierda, vno, Lo quinto multiplicaran por
 diez

*Lee el
 3. arti.
 del cap
 20. del
 8. lib.*

diez toda la suma que huieren hecho. Lo sexto añadan la suma de los dedos desta manera. Que si tuuiere la fortija en el dedo grueso, añadiran vno, y si estuuiere en el dedo q̄ dizē index, que es el q̄ esta junto al grueso, añadiran 2. y si en el dedo de en medio, 3. &c. Y assi cōsecutiue hasta el dedo q̄ dizen meñique, q̄ si alli estuuiere, añadiran 5. Lo septimo sera multiplicar todo esto otra vez por 10. Lo octauo añadan se las junturas de esta manera. Que si la fortija estuuiere en la primera juntura del dedo, añadiran vno: y en la segunda dos. &c. hasta 3. porque no ponemos que tenga vn dedo mas de 3. junturas, como es verdad. Lo nono sera sacar de toda la suma 2500. y restará millares, y ciētos, y diezes, y vnos: por los quales numeros vèdreis en conocimiēto de todo lo q̄ la demanda pide, teniēdo cuenta q̄ tātos quātos millares quedarē, a tātos hōbres cōtado desde el primero q̄ estuuiere al principio del año, se hallara la fortija. Y los ciētos denotarā en q̄ mano la tiene, si en la derecha, o yzquierda desta manera. Que si fueren 200. denota la mano derecha, y si 100. denota la yzquierda, y los diezes denotā los dedos. Quiero dezir, q̄ si fuere vn diez, denota el dedo grueso, y si fuere 20. denota el de mas abaxo, q̄ es el q̄ dizen index. Y si 30. el de en medio, &c. y los vnos denotarā las junturas desta manera. Que si fuere vno, denota, q̄ esta en la primera jūtura: y si 2. en la segūda: y si 3. en la tercera. Y porq̄ mejor seā entendida esta

cuēta pōgo por exēplo: q̄ de ciertos hōbres q̄ estā en vn apesento, el q̄ estā assentado en el 6. lugar tiene 1. fortija puesta en la primera jūtura del dedo de enmedio de la mano derecha. Pregūto como se sabra por cuēta, q̄ es este el q̄ tiene la fortija, y todo lo demas q̄ la demanda pide.

Hōbre. Mano derecha. Tercero dedo. Juntara.

	6	2	3	1	
Obremos segun los preceptos destas reglas mandan, doblando los hombres: y serā doze.					12
Añadan cinco.					17
y montaran diez y siete					17
multipliquen estos diez y siete por cinco					85
y montaran ochenta y cinco					85
añadan dos por la mano derecha					87
y montaran ochenta y ciuco					87
multipliquen estos ochenta y siete por diez.					870
y montaran ochocientos y sesenta					870
añadan tres, porque está en el tercero dedo					873
y montaran ochocientos y setenta y tres					873
multipliquen estos 873. por otros diez					8730
y mōtarā ocho mil y setecientos y treynta					8730
añadan a estos 8730. vno, por causa que					8731
estā la fortija en la primera juntura					8731
y montara 8731.					8731
resten destos 8731. dos mil y quinientos					2500
y quedara seys mil y dozientos y treynta y vno					6331
como parece figurado.					6331
¶ Pues por los seys mil entēdereys que tiene la fortija el sexto hombre: y por los docientos, q̄					12

la tiene en la mano derecha. y por los treynta entendereys q̄ está en el tercero dedo, que es el de enmedio, y por el vno entendereys la primera juntura. Y desta manera se hara entre poca, o mucha gente. An. Sepamos señor Damon, estos hombres q̄ dezis, q̄ se doblé, entiendese todos los que estuuiere dentro en el aposento? Da No, sino solamente se entiēde los q̄ huuiere desde el principio, o fin del asiento en que estuuiere asentados hasta el que tuuiere la sortija, cōtando tãbiē el mismo que tiene la sortija. An. De manera, que si el primero que estuuiere en el principio del asiento de àzia la mano derecha o yzquierda, tuuiere la sortija, aquel solo doblaremos, y seran 2. y si la tiene el segundo, doblarlos hemos, y seran 4. &c. Damon. Esto mismo es lo que digo. An. Hazese, mandando doblar los hombres, y añadiendo 5. multiplicando por otros 5. y añadir los dedos y multiplicar por vno o añadir vn zero, luego las juntas, y restas de todo 250. y cada cinco es hombre, y diez vn dedo, y las vnidades jūturas, y afsi nose sabe la mano. O al duplo de los hōbres añadē 7. multipliquē por 5. junte 2. ò 1, por la mano, multipliquē por diez, o añadā vn zero, añadir los dedos, y multiplicar, por otro 10. ò añadir vn zero, añadir las jūturas la resta sea 3500. cada millar denota hōbre, lo de mas, como en la primera se declaró. So. Hora sus, oydme con atēciō, y propōdre vna regla para echar fuerres en cosas de regozijo. D.

daderamente creo, segun la platónica creese, que se-
 ran menester lumbres Lu. Ya que la hemos co-
 mençado, hemos le de dar fin: digo en lo que no
 sotros supieremos, aunq̄ no en lo que en el arte
 se contiene, porque segun dize Aristoteles. Si al-
 guna cosa ay que no tenga fin, es el numero. So-
 Y porque mejor me entendays. Pongo, que 9. ca-
 minantes aportaron vna noche a vna venta. A
 poco espacio de tiempo llego vn negro a la mes-
 ma posada, y despues q̄ todos huieron cenado
 pidio cada vno su cama. El huesped dixo. Seño-
 res no tengo mas de 9. camas. Respondieron los
 9. compañeros q̄ venian juntos, diziendo. Ya té-
 dremos para nosotros. El negro como entendio
 q̄ se aplicauã para si todas 9. camas. dixo. Señor
 huesped, aunq̄ somos negros, gente somos. Yo he-
 menester vna cama. El huesped temiêdo que la
 gente se auia de alborotar, sino se ponía algũ re-
 medio: rogò a todos diez huespedes q̄ echassen
 fuertes en buena amistad, qual dellos se queda-
 ria sin cama. Estos teniendo respeto, q̄ lo que
 el huesped pidia era cosa justa, pusieronlo por o-
 bra, y siendo todos contentos y concordés die-
 ron el corte para echar las fuertes desta manera
 que se assentassen todos diez al rededor dela co-
 zina, y que començassen a contar desde el prime-
 ro q̄ estuuiesse al principio del asiento de siete
 en siete, y en qualquiera dellos q̄ se cumpliesse
 el numero de 7. este tal saliesse y tomasse vna ca-
 ma, y q̄ profiguessen al rededor, asta que salies-
 sen

*En el 3^o
 de los
 phisic.
 Tex 56*

sen tantos que ocupassen todas las 9. camas, y q se quedasse solo, que aquél tal tomasse por cama la zeniça. Pidesse como se pondra esta gente, para que todos los 9. compañeros tengan camas, y el negro se quede sin ella. Y pues ninguno la declara, que la orden que se tendra para hazer esta cuenta y sus semejantes, que assentareys 10. letras del a, b, c, en vn papel, por causa que son diez

los hóbres que echan las fuer-
tes, como aqui parece. Hecho
esto coméçareys a contar des-
de la primera letra, que es A:
diziendo vno, y en la B. 2. y
en la C. 3. y en la D. 4. y en la
E. 5. y en la F. 6. y en la G. 7.

Pues por quáto dixistes siete en la G. darle heys vna raya por medio (como en la figura parece) Y es de saber, que la letra que tuuiere raya, no la aueys de contar mas, porque teneyd de preu- poner, que se quita de alli la letra que pusistes equiualemte, por vno de los hóbres, y q se fue a tomar possession de la cama. Profegui, di- ziendo en la H. vno, y en I. dos, y en la K. tres, y en la A. 4. y en B. 5. y en C. 6. y en la D. siete. A la qual dareys otra raya, como hizistes a la G. en señal que se cumplio el numero de siete, y porq este señalada, porq no se cuente otra vez. Y pro- figuendo assi al rededor, hasta que ayays dado rayas a las nueue letras, hallareys que queda sin raya la nouena letra, que está de f. ues de la A. q

es la I. Por lo qual entendereys, que assi como estas diez letras se contaron al rededor de siete en siete, y se borraron las nueue, por causa que se cumplia en ellas el numero de siete, y se quedo la I. que estaua en el noueno lugar, sin que jamas se cumpliesse en ella el numero de siete. Assi entendereys, que qualquiera destos diez que echan inertes, que se assentare en lugar de la I. se quedara a la postre, por lo qual perdera de dormir por aquella noche encama, segun el con cierto que en este exēplo se dio. Y assi como hemos hecho entre diez, contandolos de 7. en siete, assi se hara en otro qualquiera numero de gente, contandolos de la manera que quisieren. Lu. Mucho me quiere parecer esta cuenta a la que dizen de los treynta hōbres que yuan en la nao que fue necessario echar a fondo los quinze de ellos, por causa que la demasiada carga causara que todos perecieran. Soph. Assi es verdad, que esta es la orden que se ha de tener. Mas porque mejor se entienda, pongo por exemplo, que vna nao lleua treynta cauallos, los quinze eran de vn Capitan del Rey de Tremecē, y los otros 15. de vn Capitan Christiano. Y nauegando sintieron q̄ el peso de los cauallos era grande, determinan por euitar el mayor peligro cō el menor de sacar los cauallos, y ponerlos al rededor de la nao, y contar los de nueue en 9. y en qualquiera cauallo que se cumpliesse el numero de nueue, lo mataissen, y lo echassen en la mar, y q̄ pro-

- liguiesse

guiesse esse cōtar, hasta tāto q̄ huuiessen muerto
 15. cauallos. Pidese, de q̄ modo, o manera se pō-
 dran los cauallos del Capitan Christiano entie
 los del Moro, para q̄ maten todos los del Moro
 y los echen a fondo, y quedē los del Christiano
 solos. Digo, q̄ para hazer esta cuenta, no ay q̄ ha-
 zer otra cosa, sino assentar 30. letras, quales quie-
 ra q̄ os parecieren, y contarlas de nueue en 9 as-
 si como se hizo en el exemplo que precedio de
 los 10. caminantes, y despues q̄ se huuiessen se-
 ñalado 15. letras, por causa que son 15. los cau-
 llos q̄ auian de echar a fondo, parar, y no prose-
 guir adelante con la cuenta. Y en los assētos de
 estas letras q̄ se ñalaredes, hareys poner los ca-
 ualleros que quisiere des q̄ muera, y en los otros
 los que han de quedar, ya sean los del Moro, ya
 sean los del Christiano: y assi prosiguiendo ha-
 llareys que se pondran primero quatro cauallos
 de los del Christiano, y adelante dellos ponerse
 han cinco de los del Moro, luego dos de los del
 Christiano, y mas adelante vno del Moro, luego
 tres de los del Christiano, despues vno del Mo-
 ro, y otro de los del Christiano, y dos del Moro,
 luego dos del Christiano, y 3. de los del Moro,
 y luego vno del Christiano, y dos del Moro, y 2.
 del Christiano, y vno del moro. Y puestos desta
 manera, y contandolos de nueue en nueue, co-
 mençando desde los quatro que se pusieron pri-
 mero de los del Christiano, siempre se vendra a
 cumplir el numero de nueue en los cauallos del

Capitan Moro, y assi se los mataran todos. Mas porque mejor se pueda tener en la memoria la orden como estan puostos estos cauallos, pongo este verso, que con saberlo de coro, se sabra para siempre esta cuenta.

4. 5. 2. 1. 3. 1. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 2. 1.

Po pu lea virga pacem regina ferebat.
 ¶ En este verso hallareys todas cinco letras vocales. Que son a, e, i, o, u. Pues tened cuenta que la a, vale vno, y la c, 2. y la i, 3. y la o, 4. y la u, 5. y esto denotan las letras de guarismo sobre las vocales q̄ en el verso ay. Y assi quãdo comieça este verso, diziẽdo. Po, da en tẽder, q̄ por aquella o, p̄o gays 4. cauallos de los del Capitan Christiano: y por la u. del pu. pondreys 5. cauallos de los del Capitan Moro. Y por la e. 2. de los del Christiano, y por la a. vno de los del Moro, &c. prosiguiẽdo con todas las vocales q̄ tuuiere en todo este verso. Mas nota q̄ por la u, que esta al principio desta diction virga, no pongas cinco, porque en este lugar no es vocal, porque hiere en la i. que se sigue despues. Y desta manera se harã las semejantes cuentas, haziendo vn verso que las vocales de tal verso os declaren la orden del asfentar las tales cosas. Antim. Acuerdome seõor Damon de vna regla que oy dezir pocos dias ha sobre saber el numero que vna persona imagina imagina en su memoria. Dam. Oydo he q̄ sepue de saber de muchas maneras, y dire 2. que al presente me vienen a la memoria. Para declaraciõ
 dela

de la primera, pongo por exemplo. Que vno toma siete marauedis, o loq̄ quisiere. Para saber lo q̄ este tal tomò, hareys q̄ los doble, y seran 14. A estos catorze añadan 5. y seran 19. Estos 19. multiplicalos por 5. y seran 95. Haz multiplicar los mismos nouenta y cinco por diez, y mō taran nouccientos y cinquenta. De los quales restaran docientos y cinquenta y tãtos quantos ciẽtos restaren, tantas vnidades fueron las que al principio tomaron en la memoria. Pues restãdo 250. de 950. quedaran setecientos: y porque en setecientos ay siete vezes ciento, por tanto responderẽys, que fueron siete las vnidades que al principio se tomaron. ¶ La segunda regla es que todo numero que se quedare, y a su quadrado se añadiere el doblo del mismo numero, y 1. mas, digo que la rayz quadrado de todo esto me nos vno, sera el numero que al principio se quadrò. Poned por exẽplo, que vno toma cinco, quadrandolo, seran veynte y cinco, añadan el doblo de los cinco y vno mas, con los mismos veynte y cinco, y serã treynta y seys. Hecho hecho, pregunto quanto monta, y responderan, que 36. Pues saca la rayz quadrada de treynta y seys, q̄ es seys, y destos seys quita vno, y quedaran cinco, y tanto sera el numero que al principio se tomò. Y assi se hara de otro qualquiera numero. (Lu.) A imitacion desso dire seys reglas, que sirven para el mismo efeto. Y sea principio vniuersal para todas seys, Demãdar ante todas co-

sas, que si en la suma, o numero que se imagina-
 re en el entendimiento huuiere medio, se dexa
 a parte, y no se cure de hazer del otra cosa, sino
 añadirlo al fin de la cuenta. Pues con este princi-
 pio pongo por exemplo para la primera regla, q
 vno toma 11. en su memoria. Para saber lo que
 toma, hareys que lo tresdoble, y será 33. Destos
 33. saque se la mitad, q son 16. y medio, este me-
 dio, haz que la haga entero, y seran por todo 17.
 tresdoblen otra vez estos 17. y seran 51. saquen
 otra vez la mitad de 51. q son 25. y medio, y por
 quanto vino medio, hareys q lo hagan entero, y
 seran 26. Despues desto nose hara mas de pregū-
 tar, quantos numeros ay en esta postrera mitad
 q fue 26. y responderos han q ay dos 9. Poes la
 regla, que por cada vn 9. que os respondieren q
 ay, aueys de tomar 4. y assi por los dos nueues, q
 dicen que ay en los 26. contareys dos quattros.
 que son ocho, y porque en esta regla dicen dos
 vezes, que tresdoblen el numero que toma, y
 otras tantas vezes hazen sacar la mitad, por tã-
 to notareys, que si la primera vez que mandare
 des sacar la mitad, huuiere medio, añadirereys 1.
 y por primero q huuiere en la segunda vez, quã-
 do hizieredes sacar otra vez la mitad, añadirereys
 dos. Pues por quãto en este exẽplo os vino me-
 dio en la primera vez, que vale 1. y en la segunda
 q vale 2. por tanto juntareys tres, que montan
 estos medios con los ocho que teneys de los 2.
 nueues, y seran 11. Y este direys que es el nume-

ro que al principio se imaginò. Da. Porque feto
ma 4. de cada 9. la razon es, porque haziendo cõ
vn 4. lo que las reglas mandan, monta 9. Lu. Pro
figa con las demas, que ya que algo no ayomos
entendido, poco a poco, por exemplos lo enten
deremos despues: porque como dize Terencio.
No ay cosa tan dificultosa, que queriendo traba
jar nose alcance. Lu. ¶ La segunda regla es, que
despues q̄ vno huviere tomado en su memoria
el numero, o suma que le pareciere, direys q̄ fa
que 2. vezes la mitad del tal numero, y la añada
al mismo numero. Como si vno toma 7. su mitad
es 3. y medio, juntos con el mismo 7. hazen 10.
y medio. Pues si huviere medio como agora, ha
zed q̄ lo haga entero, y assi seran onze. Y es de
faber, q̄ el medio que viniere la primeravez, quã
do se sacare la mitad del numero q̄ se imaginare
vale vno: el qual se añadira despues con la suma
q̄ tomaredes por los nueues. Hecho esto sacará
otra vez la mitad de los 11. q̄ son 5. y medio, y
juntarlos heys con los mismos 11. y seran 16. y
medio. Dezid, que si ay medio que lo haga ente
ro, y assi seran 17. Mas nota, que assi como dezi
mos que el medio q̄ viniere en la primera vez q̄
se sacare la mitad vale vno: assi digo q̄ el q̄ viniere
en la segunda vez quando se sacare la mitad,
valdra dos. Entendido esto preguntad quantos
nueues ay en los diez y siete, y responderoshan
diziendo, que ay vno, pues por este nueue tome
reys quatro, assi como se hizo en la primera res

gla que precedio. A los quales 4 añadireys 3. de
 los dos medios que vinieron en las dos vezes q̄
 hizilte facar la mitad, y seran 7. que es el nume-
 ro que al principio se percibio. Anti. de otra ma-
 nera como si vno tomasse siete, tresdoblado 7.
 son 21. juntad la mitad deste 21. con los mismos
 21. y seran 32. y medio, despues por cada nueue
 tomar dos, y por el medio que viniere añadir
 vno. Tambien se haze quitando la mitad delo
 que tomaren, y tresdoblar lo que quedare, y
 facar otra vez la mitad deste tresdoblo, y tresdo-
 blarla, y por cada nueue tomar ocho. El medio
 primero si alguno viniere, no vale nada. El se-
 gundo vale vno, y si no viniere el primer medio
 el segundo vale dos, y el tercero quatro. De
 otra manera. Añadan cinco, y multipliquen por
 cinco la suma, añadan diez, multiplica por otro
 diez, añade vn zero, y resten trecientos y cin-
 quenta de todo, y lo que quedare, partenlo por
 ciento, y el duplo del quociente, será el nume-
 ro. Si las reglas declaradas no tuuiessem tan-
 tas retartalillas, no auria mas que pedir, mas
 quien se acordara de tanto. Lucilio. Adrede lo
 haze en poner estas primero: porque las oyese-
 sedes todas, porque si esta que se sigue dixera al
 princio, no tuvierades paciencia para las passa-
 das. Y hazese esta cuenta mas breuemente con
 tres preguntas que se han de proponer a la per-
 sona que toma el numero. ¶ La primera es,
 dezir que saque los treses que pudiere del nu-

numero q̄ tomare, y lo que sobrare: y no se pudie
 re sacar 3. que lo diga. La segunda es, q̄ saque los
 cinco que pudiere del mismo numero q̄ se to-
 mare, y si lo que sobrare, porque no se puede sa-
 car dello ningun 5. lo diga, segun hizo con los
 treses. La tercera es, q̄ saquen los siete del mis-
 mo numero tomado, como por la practica de
 los exemplos mejor entenderes. Poned por ca-
 so que vno toma en su pensamiento 17. Para sa-
 ber quanto tomo por preguntas de numeros, de-
 zid que os diga quanto sobra sacando todos los
 treses juntos que huviere en los 17. que tomo.
 Y responderos ha que sobran 2. porque en diez
 y siete ay cinco treses, que montan quinze, y q̄-
 dan dos, pues por cada vno que sobrare, quando
 hizieredes sacar los treses, tomareys en vuestro
 entendimiento sesenta. Y por quanto en este
 exemplo sobraron dos, por tanto guardareys
 dos setentas, que montan ciento y quatro. Lo
 qual se ha de hazer dissimuladamente sin dar a
 entender ninguna cosa. Hecho esto direys, que
 saquen los cinco que ser pudiere de los mismos
 diez y siete, y que os diga lo que sabra. Pues sa-
 cando los cinco, que ay en diez y siete, sobran
 dos, porque en diez y siete ay 3. cinco, que va-
 len quinze, y quedã dos, como es he dicho, pues
 por cada vno que os respondieren, que sobra,
 quando hizieredes sacar los cinco, aueys de to-
 mar en vuestro entendimiento veynte y vno, y
 pues en este exemplo quedaron 2. quando hizieredes

tes sacar los cinco, por tâto tomareys 2. vezes
 21. que valen 42. y guardarlos heys. Passad a lo
 tercero, que es hazer sacar los siete que huere
 en los mismos 17. y sobraràn 3. porque en 17. ay
 dos siete que montan 14., y quedan 3. Pues por
 cada no que sobra quando mãdaredes sacar los
 siete, tomareys en vuestro entendimiento 15. y
 porque en este exemplo sobraràn 3. quando se sa-
 caron los siete de los 17. que fae el numero que
 se tomo en la memoria, por tanto tomad 3. quin-
 zes, que son 45. Sumad agora estas tres sumas, q̃
 auerays hecho, que son ciento y quarenta, y quarè
 ta y dos, y quarenta y cinco, y montaràn docien-
 tos, y veynte y siete de los quales sacareys por
 regla general todos los cientos que huere, y
 mas vn cinco con cada ciento. Pues de docien-
 tos y veynte y siete, sacâdo los cientos, y mas vn
 cinco con cada vno, quedaràn 17. que es el nume-
 ro que al principio se imaginò en el entendimiè-
 to. Ant. Sino ay mas que hazer passaria, mas por
 mi vida que anda hombre arrastrado con tanto
 añadir, y quitar. Da. No parece sino que misma
 regla se cortò a medida de su apeteito, porque lo
 que queda es casi nada. Luci. Que dezis? No po-
 dia passar esta platica sin sal de murmuracion?
 No passe adelante, antes señores nos vamas,
 pues hecho lo que mandastes. Damon. Teney
 razon, con que nos digays primero, q̃ se ha de ha-
 zer quando en la suma que hizieremos no hu-
 niere cientos que sacar? Luci. En tal caso toda

la suma direys, que es el numero que se percibio en el entendimiento. Exemplo. Si vno toma 30 facando los treses, no sobra ninguna cosa: porq̄ en 30. ay diez treses juntamente. Y pues no sobra ninguna cosa, no ay que tomar nada, passad a la segunda pregunta, que es hazer sacar los 5. y hallareys que no sobra ninguna cosa, por causa que treynta son cinco justos. Pues proseguí, diziendo, que saquen los sietes, y hallareys que sobran dos por causa que en 34. sietes, que montan veynete y ocho, y sobran dos, como ya auemos dicho. Y porq̄ la regla manda, que por cada vno que sobrare, quando hizieredes sacar los sietes, auays de tomar 15. porque en este exemplo os sobraron dos, tomad agora dos quinzes, que valen treynta, de la qual suma se auian de echar fuera todos los ciētos, y cinco que pudieredes. Y por quanto agora no ay ningun ciento que sacar, no curareys de otra cosa alguna, sino dezir luego, que estos treynta es el numero, que al principio se tomo en el entendimiento. Y desta manera hareys de otro qualquiera numero que se iscluyere de ciento abaxo. Antimacho. Desta quiero hazer memoria, porq̄ me parece ser facil. Por lo qual con licencia del señor Dami querria nos pusiessse por exemplo, si vno tomasse vno, o dos en su pensamiento, que se ha de hazer, porque de vno, ni de dos no se pueden sacar treses, ni cinco, &c. Damon. Antes se lo querria yo suplicar que lo dixesse, sino me ganara-

des

des por la mano. Lucilio. A esto, y a todo lo que mas mandaredes respondo, que vna persona tomasse vno en su memoria quando le dixeredes, que saque los treses y cinco, y siete, ha de responder en todas tres preguntas, diziendo: que le sobra vno. Y si tomare dos, ha de dezir, que le quedan dos: porque en esta cuenta no se pregunta, si se puede sacar treses, ni cinco, ni siete, sino q̄ mire qualquiera que tomare el numero, si puede sacar algun tres que lo saque, y diga lo q̄ sobra, si sobrare algo. Y sino pudiere sacar ningun tres del numero q̄ tomare, diga tanto sobra sin dar a entender si pudo, o sino. Y lo mismo se entendera de las otras dos preguntas, conuiene saber, del sacar de los cinco, y siete. Y si me auays entendido, no dire mas acerca desto, por q̄ (como dizen) la prolixidad es madre de confusion. Ant. Cierito no dize a mi esta carta: porque todo tiempo q̄ en oyr declaraciones destas reglas se gastasse, me pareceria breue, y no prolixo. Mas por q̄ confio en las dudas, me hareys gracia de declararmelas otro dia, no quiero poner agora ninguna por no detener a estos señores cō palabras. Principalmente q̄ ha de dezir el señor Sophronio. (Sophronio.) Pues a mi me habuelto la orden, el caso que pongo es. ¶ Que si yo me dexasse sobre vna mesa quarēta reales, o picas de otra qualquiera moneda, y viniesse 2. personas, y las tomassen (arreatando) cada vna lo que mas pudiesse, como sabremos por numeros quan-

Quántos reales tomò cada vno dellos? Lu. Pormi
 palabra que auays propuesto vna cosa q̄ me hol
 gare estrañamente en entenderla. Antim. Sacad
 nos pues vos de duda, y dezidlo de manera q̄ lo
 pueda yo entender, q̄ ya sabeyshasta do llega mi
 lança. So. Quanto mandaredes. La orden que se
 ha de tener por regla general para hazer esta
 cuèta se declara por el exèplo siguiente. Poned
 por cosa q̄ de los 40. reales, vna persona tomo
 los 7. y otra 33. que es lo q̄ falta hasta los 40. q̄
 quedaron sobre la mesa. Agora hazed al q̄ os pa
 reciere destas 2. personas, q̄ doble los reales que
 tomo. Pues poned por caso, q̄ el que esta al prin
 cipio tomò 7. y los doblò, y assi hizo 14. Al otro
 dezid que multiplique sus reales por 40. Pues
 multiplicando 33. por quarenta montan 1320.
 suma ambas a dos multiplicaciones, como son
 14. y 1320. y monraran 1334. lo qual direys que
 resten de 1640. y que digan lo que sobra. Pues
 restando 1334. de 1640. quedaran 306. los qua
 les 306. partireys sin dar a entèder ninguna co
 sa, por vno menos de los reales que quedarò so
 bre la mesa, que sera por treynta y nueue. Pues
 partiendo trecientos y seys (que es la resta que
 en este exemplo quedo) por treynta y nueue vè
 dra a la particion siete, y sobrarà treynta y tres.
 Pues lo que viniere a la particion, siempre sera
 las pieças que tomare la persona q̄ hizieredes,
 que doble los reales que tomè, y los que sobran
 es lo q̄ toma la persona a quien mandays multi
 pli.

plicar sus reales por 40. Y assi direys que el que doblò tomò 7. y el otro tomò 33. Y desta manera se hara de otra qualquiera manera que las pieças se repartan, sino es quando vno tomasse 39. y otro vno, porque en tal caso la regla falta. Da. Por el femejate pongo al señor Lucilio esta demanda. Que si dexassen 30. pieças de moneda, y entre tres personas las tomassen (como dizen, a quien mas pudiesse) como se sabra quantas toma cada persona? Lu. Responded señor por mi, porque para deziros verdad yo no la se. Da. Plazeme. Poned por caso, qvna persona tomò 6. pieças destas 30. y otra catorze, y otra diez. Para saber quãto tomò cada vna, hazed a qualquiera destas tres personas, que doble las pieças q tomò. Y pongo por caso, que doblo el que tomò seis, y assi hizo doze. A otro dezid le que multiplique las pieças q tomò por treinta, y pongo q el que tomò catorze, fue el que multiplico por treynta, y assi hizo quatrocientos y veynte. El rercero hazed q multiplique las diez pieças que tomò por treynta y vno, y montara trezientos y diez. Hecho esto, sumen las tres multiplicaciones, como son doze, y quatrocientos y veinte, y 310. y montaran setecientos y quarenta y dos, lo qual direys que resten de 930. y restaran 188. los quales repartireys por 29. (q es vno menos que las pieças que dexastes sobre la mesa) y vendra a la particion seys: y sobrarian catorze. Pues los se ys que vinierõa la particion, son las

pieças

pieças que tomo la persona que dixistes que do-
 blasse sus pieças, y los catorze que sobaron, son
 las pieças que tomò la persona que multiplicò
 por 30. Sabido lo que tomaron las 2. personas,
 la resta que faltare para hasta 30. sera lo que to-
 mo la tercera persona, que multiplico por 31. y
 assi se hara de otra qualquiera suerte que las pie-
 ças fueré diuididas. De otra manera hareys pa-
 ra si se diuidieren entre quatro personas quales-
 quiera numeros digitos, doblando el numero
 del primero, y añadiendo al duplo vn 5. y multi-
 plicar la suma por otro 5. añadir diez, y el nume-
 ro del segundo, y multiplicar por diez añadir el
 numero del tercero, y multiplicar por 10. y aña-
 dir el numero del 4. y restando de todo 3500. y
 lo que quedare cada 1000. denota 1. del numero
 primero, y cada 100. otro del numero del segun-
 do, y cada 10. denota otro del numero del terce-
 ro, y las vnidades denotâ el numero del quarto.
 Lu. Cierro q̄ auays respondido bien, y si atenció
 se me concede propondre vna question, y es q̄.
 ¶ Si dixassemos sobre vna mesa tres pieças, o
 joyas diferentes, y las tomassen secretamête 3.
 personas: tomando cada vna la suya, como se sa-
 bra que joya tomò cada persona? Dam. Quanto
 mandaredes oyremos de buena gana. Luc. Pues
 para hazer esta cuenta, auays de repartir prime-
 ramente a las personas estos tres numeros si-
 guientes 2. 5. 7. dando a la persona que os pare-
 ciere el 2. y a otra el cinco, y a otra el siete. Da. Si.

pues poned por caso que las pieças q̄ dexais fue-
ron medio real, y vn real, y vn ducado: y q̄ cada
vna destas 3. personas, a quien se han repartido
estos numeros, tiene vna pieça, y no se sabe q̄ pie-
ça. Quiero dezir, q̄ no sabemos qual dellas tiene
el ducado, o qual tiene el real, o qual tiene el me-
dio real. Pues para saber q̄ pieça tomó cada per-
sona, començareys por la pieça mas baxa, diziẽ-
do quiẽ tuuiere el medio real doble el numero q̄
le di. Despues desto profeguireys diziẽdo. Quiẽ
tuuiere el real, q̄ es la pieça mediana, multipli-
que el numero q̄ le di por 14. Y al otro q̄ tuuiere
el ducado, q̄ es la pieça mayor multiplique su nu-
mero por 15. Hecho esto, direis q̄ sumẽ todas 3.
multiplicaciones y restarse han de 210. y lo q̄ di-
xeren q̄ resta partilloheys por 13. y lo q̄ a la par-
ticiõ viniere ha de ser vno de los 3. numeros de
aquellos que al principio repartieredes. Pues la
persona q̄ tuuiere el numero que a la particion
viniere, ella tal tendra el maravedi, q̄ es la pieça
menor, y lo q̄ sobrare en la particion, sera otro
de los 3. numeros repartidos, y la persona q̄ tu-
uiere este numero q̄ sobra tendra el real, que es la
pieça mediana, y sabidas las dos pieças, el terce-
ro tendra la otra pieça mayor, que en este exem-
plo sera el ducado. Sol. y Cõ vos se ñor Antima-
cho quiero tratar vna reglilla: q̄ algunas vezes
aueys visto hazer, y a prima vista parece algo, y
considerada es cosa facil, y de reyr, la qual cuẽta
se haze diziẽdo a vna persona q̄ tome en su ma-

no algunas pieças de moneda, o de lo q̄ le pareciere secretamente de manera q̄ ninguno de los que presentes estuieren pueda juzgar quantas pieças toma y despues que lo huviere tomado direys q̄ diga a quantas piedras quiere q̄ se las cūplan, y quando se respōdiere diziendo. Cumplidme las tantas piedras, os mastrara esta regla saber tomar tãtas piedras q̄ podays cō ellas cūplir, con las q̄ la tal persona tuuiere, al numero q̄ os dixere, y q̄ os queden otras tantas como al principio la tal persona tomare, sin faltar ninguna de mas, ni de menos, y hazese tomando en vuestra mano tantas piedras, como las que os dixeren que las cūplays, y tendreys auiso de fingir al tomar de las piedras q̄ se haze por ciento de peso, contrapesando la mano en q̄ la tal persona tuuiere las piedras con la vuestra. An. Por mi señor Sophronio que no entiendo ninguna cosa si por otros terminos mas comunes no lo dezis So. Tan claro es esto como lo que hemos dicho sino que no mequereys escuchar bien. Antima. Pues agora lo hare, digalo, porq̄ voy tomando gusto en la platica. Sop. Plazeme por cierto, por que creed q̄ ninguna cosa alegra el animo mas al que enseña, que ver que lo van entendiendo los que le oyen, y al contrario, sino lo entienden y para entender esto, tomad destos tantos que sobre esta mesa estan los que os parecen. Anxi. Yalos tēgo. So. Pues dezidme a quãtos quereys los

que los cumpla? An. A 15. So. Pues entended q̄ tomando yo agora 15. piedras en mi mano cumplire, contando sobre las que vos teneys a 15. y me quedaran a mi tantas quantas agora en vuestra mano ay An. Por mi fe que es graciosa. So. Ora sus, yo tomo 15. Dezi dme quãtos teneys? An. Tengo 10. Sop. Pues si yo os doy 5. de los mios con los 10. que vos teneys seran 15. y a mi me quedaran 10. que son tantos como los q̄ tomastes al principio. An. Es assi, de suerte, q̄ la regla es, q̄ si me dixessen: cūplidme sobre las piedras que tengo en mi mano a 20. tomarè 20. secretamente, sin que entiendan que tomo 20. y en hazer esto no faltara. So. Esto mismo es lo que digo. Da. Por q̄ el señor Antim. no diga que no le comunico algo, quiero proponerle esta questió. Da. Tomad en vuestra memoria el numero que os pareciere. An. Ya lo ha tomado. Da. Tomad otro tanto por Lucilio. An. Ya està tomado. Da. Por mi tomad 6. y juntad todas 3. sumas. Anti. Ya se ha hecho. Da. Dad la mitad de todo esto a pobres. An. Ya està dado. Da. Bolued a Lucilio lo que tomaste por el Ant. Ya lo bolui. Da. Que digo, quanto os queda. An. Està me parece buena si se haze sin preguntar algo. Da. Lo que preguntare sera dezir, que os quedaron 3. An. Verdad es, mas deuiolo dezir atiento. Dam. Agora lo vereys. La regla para hazer esta cuenta es que todas las vezes q̄ hizierdes lo q̄ se ha visto en este

este exemplo que precedio, siempre quedara la mitad de lo que yo dixere, que tomeys por mi, aunque los otros numeros sean de menor, o mayor cantidad, y porque en este exemplo tomastes por mi 6. por tanto supe q̄ auian quedado 3. que es la mitad de los 6. Anti. Yo he entendido esta cuenta, y la recibo por gran merced: por tanto prosiga la platica, pues le viene el señor Lucilio. Lu. ¶ Pues a mi ha buuelto la mano quiero dezir como sabremos, si vna persona multiplicasse vn numero secretamente, por otros numeros, pocos, o muchos, y si la vltima multiplicación partiese por el primero numero q̄ tomare quanto vendra a la partición. Responda a esta cuenta quiẽ la supiere. Da. Por mi digo, q̄ no la he oydo jamas, ni tampoco estos señores la entiendẽ, sino me engaño. Lu. Pues sepan q̄ qualquiera numero q̄ fuere multiplicado por otros numeros pocos, o muchos, si la vltima multiplicacion se partiere por el primero numero, q̄ al principio se tomare vëdra la partición igual cõ la multiplicación de los numeros, con q̄ se multiplicare el tal numero q̄ al principio se tomare, vnospor otros

Exemplo. Poned q̄ vn 6. se multiplica por 2. y hará 12. Estos 12. multiplicádolos otra vez por 5. seran 60. Digo, que si estos sesenta se partieren por el seys, que es el numero que se puso primero vendra a la particion diez, que es tanto como la multiplicacion del dos por el cinco, que

Lee el principio del c. 4. del lib. 1.

son los numeros, con los quales se multiplico el
 feys. Y desta manera se puede multiplicar otro
 qualquiera numero, por otros numeros pocos,
 o muchos Antimacho. ¶ Dezieme señor Sofro
 nio, si entre 3. personas repartiessen 3. pieças, o
 joyas, como se sabria que joya tomò cada perso
 na, por terminos q̄ no interuengan estas multi
 plicaciones, ni particiones, q̄ en las reglas pre
 cedentes ocurrê? Soph. A cerca desso q̄ dezis di
 re mi parecer, y para q̄ mejor entendays, poned
 por caso que las joyas, o pieças son vnos guan
 tes, y vnas horas, y vn pañizuelo. Pues si estas 3.
 pieças las reparten a 3. personas, para saber que
 pieça tomò cada vna: hareys traer 24. piedras,
 o tantos, de los quales dareys a vna de las 3. per
 sonas (que hã de tomar las pieças) vn tanto, y a
 otra 2. y a la otra 3. y los 18. tantos que queda
 ren dexallos heys estar sobre la mesa a do estan
 las pieças. Hecho esto, salir os heys del apo
 sento, porque no veays tomar las pieças: pre
 suponed en vuestra memoria, ser la vna pieça
 mayor, y la otra mediana, y la otra menor, y no
 importa mas vna que otra: lo qual imagina
 reys, segun el peso, o valor, o cuerpo de las tales
 cosas. Pues por quanto en este exemplo, las pie
 ças son vnos guantes, y vn pañizuelo, y vnasho
 ras, por tanto presuponed que las horas sea
 la mayor, y los guantes, la mediana, y el pañi
 zuelo la menor: lo qual se ha de hazer sin dar
 a enten-

a entender ninguna cosa a los que presentes estuuiere. Despues ya que entre las tres personas a quien repartistes las seys piedras, huuieren escondido sus joyas, tomãdo cada vno la suya, començareys por la pieça, q̄ presuposistes ser mayor, q̄ en este exemplo se ha dicho ser las horas y direys: quien tuuiere las horas tome otras tantas piedras como tuuiere, quando el q̄ haze esta cuenta dize esto, miran las tres personas, qual dellas tiene las horas, y si a caso el que las tuuiere se hallare con vna piedra, tomara otra: y si se hallare con dos tomara dos, y si con tres 3. &c. Y quando esto estuuiere hecho responderan diziendo. Ya se ha hecho. Y assi passareys a la pieça mediana (que al presente los guantes) diziendo. Quié tuuiere los guantes, tome dos vezes tantas piedras como tuuiere. Quiero dezir: q̄ si la persona que tomò los guantes, tuuiere vna piedra, tomara dos de las q̄ estan sobre la mesa: y si tuuiere dos tomara 4. y si tuuiere tres tomara 6. Y despues que las huuieren tomado, profeguireis diziendo. Quien tuuiere el pañizuelo (que en este exemplo es la menor pieça) tome quatro vezes tantas piedras como tuuiere. De suerte, que si el del pañizuelo tuuiere vna piedra tomara quatro, que son quatro tantas, y si tuuiere dos tome ocho, y si tres, tome doze. Despues de todo esto, el q̄ hiziere esta cuenta, se puede entrar al aposento a donde estan las personas q̄ tienen

las pieças, y mirara quantas piedras sobran sobre la mesa (que a mas sobrarian 7. y dende abaxo) porque por ellas se sabra que pieça toma cada persona, mas es necessario para saberlo encomendar a la memoria las 7. diciones siguientes. Aperi. Præmati. Magister. Nihil. Fœmina. Vispane. Vispena. (O otras qualesquiera que guarden la orden en las vocales que estas guardan.) Pues la ordẽ que se ha de tener para aprouecharos destas diciones es esta. Que si sobrare 1. piedra os aprouechareys de la primera dicion, q̄ es Aperi. Y si sobraren 2. piedras, de la segunda, q̄ es Præmati. Y si sobrare 3. seruir os heys de Magister. Quatro jamas no sobrarian, por lo qual puse Nihil, en esta quarta dicion porq̄ la etymologia del vocablo lo manifestasse. Y si sobraren 5. piedras, seruiros heys de Fœmina. Si sobrare 7. seruirá la setima dición q̄ se dize. Vispena. Entẽdido esto, es de saber, como cada vna destas diciones tiene 3. vocales q̄ son A. E. I. sacando la quarta dición q̄ no entra en cuenta, porq̄ no sirve de otra cosa, sino de cumplir con la continuaciõ del numero. Es de notar mas, q̄ la A. siempre doquiera q̄ estuviere, denota la mayor pieça. La E. denota la mediana, y la I. la menor. Afsi mismo es de saber q̄ lo q̄ significare la primera sylaba de qualquiera dición, siẽpre se pidirá a la persona q̄ le dieredes al principio vna piedra. Lo q̄ denotare la segunda silaba, pidase a la persona q̄

que

se dieredes dos piedras. Y lo que significare la tercera silaba, pidase a la persona que le dieron tres piedras, como si auiedo hecho vn exemplo sobrasen 5. piedras, para saber quien tiene cada pieça, tomareys la quinta dición (porq̄ sobaron 5.) q̄ se dize Femina, y hallareys q̄ la primera vocal es E, y segúda I, y la tercera A. Pues por quanto he dicho q̄ la E. denota la pieça mediana, y porq̄ viene primero, pedirse há los guãtes, q̄ fue lo q̄ heziste mediana, a la persona q̄ al principio le distes vna piedra, sea quien fuere.

La segunda vocal (desta misma dición) es I. y dezimos que la I. denota la pieça menor (q̄ en este exemplo es el pañiçuelo) porque viene el segundo lugar, por tanto pedireys el pañiçuelo a la persona que distes las dos piedras. La tercera vocal es A. y la A, sirue a la mayor: y porque viene en el tercero lugar, por tanto pedireys las ho- ras q̄ es la pieça mayor a la persona q̄ distes 3. piedras, y assi como os a reys seguido por esta dición, assi os seguireys con las de mas. Anti- cho. Esta señor Sophronio, yo la pogo en el numero de las q̄ nunca oy. Sop. Como assi? Anti. Porque descuydandome, que notendria tanto q̄ hazer como las precedentes, no puse la diligencia que a sus tart alillas requiere, y assi me quedo ayuno dello. Sophro. Cierta que no es cosa tan dificultosa como la pintays. Mas como dize el comico. Ninguna cosa estan facil que

no se dificultosa, si se haze de mala gana: por tanto estadme atento y entenderlo heys. Antima. Otro dia aura mas de focupacion para ello solamente pido me declareys si se puede saber.

¶ Si vno echasse tres dados sobre vna mesa quã tospùtos pinta cada dado. So. Estacueta se haze por preguntas semejantes a las que dizen para saber quien tiene vna sortija, quando entre algũ numero de gente la esconden, y dire como se haze, porno dexaros con desseo. Poned por caso, q̃ vno de los dos dados pintò 3. y otro 2, y el seys, para saber esto por cuenta direys quien os pareciere, que doble los puntos de vno de los dados qualquiera dellos: poned assi mismo por exemplo, que doblan los puntos del dado que pintò 2. y seran 4. A estos 4 direys que añadan cinco, y seran 9. Estos nueue multipliquenlos por otro 5 y seran quarenta y cinco. A estos quarenta y cinco añadan los puntos de otro dado de los dos: y pongò que añadieron los puntos del dado que pintò tres, y seran quarenta y ocho. Estos 48. multiplicarse han por diez: y montaran quatrocientos y ochenta. Añadan los seys puntos del otro dado, y seran 486. de los quales direys que resten docientos y cinquenta, y digan lo q̃ restare. Pues restando de 486. dozientos y cinquenta quedaran 236. Pues tantas quantas vezes cientos restaren, tantos puntos pintò el vno dado, y assi por los docientos tomareys dos pũ

tos, y tanto pintò el vno. Y por cada diez toma reys vn punto: y assi por los treynta tomareys tres, y tantos pintò el otro dado, y los 6. seran los de otro, y desta manera respondereys, diziédo. Que el vn dado pintò 2. y otro 3. y otro 6. &c. Dam. ¶ Pues hezimos mencion de dados, quiero dezir vna cosa q̄ me acuerdo, a cerca de ellos, y es. Que si vno echasse los tres dados, y juntassen los puntos q̄ pintaré todos 3. con los puntos que qualquiera de los dos dados pintasse por debaxo, y despues tornasse a echarlos estos mismos dos, y juntaffe los puntos, que pintassen con los otros puntos que hasta allí se huuiesen contado, y alcançasse el vno, y juntaffe lo que tuuere debaxo con los demas puntos que ha contado y boluiesse a echar este dado, y juntaffe lo q̄ pintasse con lo demas, saber por cuenta quantos puntos ha contado esta tal persona que echaua los dados. sin preguntar ninguna cosa, solamente cõ ver los puntos que los 3. dados tienen figurado como los dexare el q̄ los echare, la qual se haze añadiendo 2. a los puntos q̄ los dados q̄ estuuieren sobre la mesa muestrã, y no faltara. An. Sepamos, los dados puedo los yo echar quãtas vezes quisiere, y como quisiere? Da. No, sino es de la suerte q̄ os he dicho. An. Pues si nõ es mas de esto, aca nos lo sabiamos, y si hasta aqui os he oydo, mas ha sido por pensar que dexaredes alguna nouedad para mi, porq̄ yo se q̄ si vno echasse los dados, para saber quãtos puntos tienẽ de-

xolostales dados, sin alcáçarlos, ni tocar a ellos
 mirareys sobre los puntos q̄ pintaren en lo alto
 quantos faltan para 21. y tantos quantos falta-
 ren tãtos puntos tendran debaxo. La razon des-
 to es, porq̄ los puntos de vn lado de qualquiera
 dado juntos con los puntos del otro lado hazen
 7. y de aqui viene a tener respecto los puntos q̄
 los dados pintaren por lo alto, a los que pintaré
 por debaxo a 21. porq̄ 3. sieteshazen 21. De fuer-
 a: q̄ de qualquiera manera que los dados se echē
 si juntays los puntos que todos 3. dados pinta-
 ren en lo alto con los q̄ pintaren por debaxo, siē-
 pre haran 21. ¶ De do se sigue, que si vno echas-
 se los dados dos , o tres , mas quantas vezes
 quisiere: y cōrate los puntos que los dados pin-
 taren, en todas las vezes que lo echare en los
 dos lados: y despues los echare otra vez, y los
 dexare estar; claro esta que añadiendo a los pun-
 tos que esta vltima vez pintaron por lo alto tan-
 tas vezes 21. como vezes los dados se contaron
 por ambas partes, q̄ sera los p̄tos que latal per-
 sona q̄ los dados echare aura contado. Y esta es
 la causa porq̄ en vuestra cuenta dixistes, q̄ aña-
 diessen 21. porque alçan tres dados para juntar
 lo que pintan por lo alto, con lo que pintan por
 debaxo. Y no quiero dezir mas desto, no porque
 os los quiero encubrir, sino porque quiero guar-
 dar algo que poder dezir quando otro dia bol-
 uieremos a la platica començada. So. ¶ Agora
 señor

señor Antimacho, tomad en vuestra memoria las tarjas de a 20. q̄ os pareciere. Anti. Ya las he tomado. So. Tomad mas 5. marauedis por cada tarja. An. Ya los he tomado. Comprad de perdices todas las tarjas a 20. que tomastes: a razon la perdiz de tantos marauedis, quanto montarẽ los cinco q̄ tomastes por cada vna tarja. An. Ya lo he hecho. So. Que digo quantas perdices comprastes. An. Dezildo sin preguntar ninguna cosa. So. Si hare: vos señor comprastes 4. An. Es verdad, porque yo tome 3. tarjas de a 20. que valen 60. marauedis, y los compre de perdizes, a razõ cada vna de 15. marauedis, que montan los tres cinco que tomè por las tres tarjas, porque 4. perdizes a 15. marauedis montan 60. Mas dezid señor, como lo adevinastes? So. La cuenta es, q̄ todas las vezes q̄ dixeredes a vna persona q̄ tome los reales, o ducados, o otra qualquiera moneda que quisiere, despues si tomarẽ 5. o los marauedis que quisiere para saber quantas perdices se compraron, partireys vna pieça de moneda de aquellas que hizieredes tomar por los marauedis que despues dixeredes que tomen por cada pieça, y tantas quantas vnidades vinieren ala particion, tantas fueron las cosas que se compraron. Y por esta razon quando os dixere q̄ tomassedes tarjas de a 20. y despues por cada vna tarja 5. marauedis, supe yo que auia des de comprar quatro, porque partiendo los veynte mara-

marauedis q̄ valevna tarja, por los 5. que toma-
 ftes por cada vna, vino a la particion 4. que son
 las perdizes que comprastes. Antim. Verdad es
 por mi fee, mas la duda q̄ me queda es, q̄ si vna
 persona tomasse gran cãtidad de pieças, podria
 errarse el contador. Sophr. No tengays duda en
 esto, porque la misma proporciõ se guarda, que
 tome pocas, o que tome muchas. Por tâto diga
 el señor Lucilio, que ha gran rato que no habla.
 Lucilio. ¶ Señores, lo que dire sera proponer
 vna cuenta que me acuerdo auer visto hazer
 dias ha. En que vno dezia, que contaßen sobre
 vna mesa vn montoncillo de reales, y acerta-
 ua quantos reales auia sin preguntar ninguna
 cosa, y no erraua ninguno. Y no se puede dezir
 quan bien parecio a todos, principalmente, que
 ninguno entendio su fundamento. Dam. Sepa-
 mos señor Lucilio como apartauan effos dine-
 ros? Luci. Tomauan vn real, y echauanlo en vn
 guante, luego dos afsi doblando siempre, y des-
 pues que auian echado los reales que les pare-
 cia, vaziauau los sobre la mesa, y entraua aquel
 hombre, y en viendo el bulto de los reales, sin
 tocar a ellos dezia tantos reales ay. Da. Cier-
 to es cosa, que no la he oydo en mi vida, y tengo
 por entendido, que si es posible, que el señor
 Sophronio nos quitara de duda. Soph. No se si-
 gue por ser posible, que yo la aya de saber, por-
 que ciertamente, estimaria mas la menor parte
 de lo

de lo que desta arte ignoro, que la mayor q̄ della
 se, aunque toda via entiēdo, en que consiste esta
 cuenta. Y digo, q̄ se haze sabiendo de quātos rea-
 les comiēcan a echar al principio en el guante,
 orq̄ sabido esto, lo q̄ fueren sobre ello echādo
 na de proceder en proporciō dupla. Quiero de-
 zir, q̄ van siempre doblando, asī como 1.2.4.8.
 &c. Pues si yo veo vn bulto de reales, sabiendo
 del principio, y fundamēto, en que el tal bulto
 se començò a hazer: facilmente se parece, yēdo
 yo en mi memoria i imaginando numeros delos
 mismos duplos, hasta tāto q̄ cotejādo si aura en
 el bulto de los reales, tantos como en el numero
 que en la memoria propusiere, y quando viere a
 clara, q̄ es mayor el numero q̄ los reales, qui-
 to la mitad del tal numero, y dela mitad, tantas
 pieças como los reales que echaron primero en
 el guante, y lo que quedare es el numero de los
 reales, o pieças del tal monton que sobre la me-
 sa huuierē. Como si pusiessēmos por exemplo q̄
 estan sobre vna mesa ciertos reales, y al parecer
 del bulto parece auer mas de 8. reales, y que no
 passan de 20. a mas mas, para saber quantos rea-
 les ay sin errar ninguno, preguntareys q̄ reales
 echaron primero en el guante, y si no lo quisiere
 preguntar, diga el que esta cuenta haziere antes
 que salga del aposento, para que entiēda lo q̄ se
 quiere, q̄ sobre vn real, o dos, o tres, o quantos qui-
 zere q̄ dexa en el guante, que se echen, mas con
 tal

tal que los q̄ echare no seã doblados de lo
 xo primero, y desta manera yo presupong
 este exẽplo propuesto se començò de vno
 para saber por este principio quantos rea
 tomareys doblòs q̄ procedan del vno, viz
 assi. 2. 4. 8. 16. 32. y por quanto hemos dicho
 nos parece en el bulo de los reales que
 sobre la mesa que no passan de veynte, n
 cedereys adelante, pues en treynta y dos
 Del qual numero tomareys la mitad q̄ se
 y seys, y destos diez y seys, quitareys vno
 daran quinze, y tantos reales direys que
 mōtoncillo que sobre la mesa esta, segun
 plo presupuesto. La causa porque se qu
 de la mitad de los treynta y dos, es po
 cuenta començo de vno, y si començara
 quitara de dos, y si de tres, tres, porque
 mo mãda la regla (que dizen de sumar p
 siones duplas) que del doblo de la vltim
 que la primera, y la resta sera la suma d
 los terminos de la tal progression. Assi
 ta se saca de la mitad del numero que p
 nemos las pieças, o reales en que come
 tal cuenta, segun hemos dicho Anti. S
 zidme, porque razon en este exemplo
 mas la mitad de treynta y dos, que del
 4. y del ocho, y diez y seys, que estaua
 ró? Por vêtura es que nos hemos de apr
 del vltimo doblo? Soplí. Yo os lo dire

*Lee el
 cap. 11
 del li-
 bro 1.*

os de lo
efupong
de vno
tos rea
vno, v
nos dich
ales qu
ynte, n
ta ydos
idad q̄ se
eys vne
eys que
a, segun
ue se qu
, espo
ençara
porque
sumar p
la vltim
suma d
on. Afsi
o que p
e come
Anti. S
xemplo
que del
e estaua
s de apr
lo dire

By Order of the Secretary
W.B. Hazen, Chief Signal

UNITED STATES OF

45
129

5.305