

Admisiones a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de drogas. Castilla y León, 2000-2013



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades
Gerencia de Servicios Sociales
Comisionado Regional para la Droga




Servicios Sociales
de Castilla y León

Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Indicador Tratamiento

- Número de personas admitidas a tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas en una comunidad autónoma y en un año dado. Sólo se considera la primera admisión de ese año.
 - *Tratamiento*: cualquier intervención realizada por profesionales cualificados para eliminar, reducir o controlar el consumo de drogas.
 - *Ambulatorio*: el paciente no pernocta en el centro. Este criterio no se aplica a los centros penitenciarios.



Indicador Tratamiento

- Sustancias psicoactivas
- Drogas ilegales
- Alcohol



Sustancias psicoactivas


Evolución Indicador Tratamiento

**Tabla 1. Número de admitidos a tratamiento por abuso de sustancias psicoactivas.
Castilla y León, 2000-2013**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sustancias psicoactivas (drogas ilegales y alcohol)														
Hombre	2.030	2.019	1.712	2.228	2.436	2.414	1.945	2.134	2.264	1.973	2.170	2.027	1.942	1.658
Mujer	388	394	327	398	425	407	380	346	389	361	371	376	344	315
Total	2.426	2.417	2.070	2.638	2.876	2.841	2.342	2.495	2.661	2.339	2.556	2.411	2.286	1.979
Drogas ilegales														
Hombre	1.589	1.564	1.312	1.626	1.898	1.879	1.459	1.600	1.721	1.470	1.541	1.335	1.281	1.112
Mujer	319	303	246	281	312	310	272	248	286	245	251	214	199	186
Total	1.914	1.868	1.589	1.918	2.221	2.208	1.746	1.862	2.013	1.720	1.804	1.553	1.480	1.302
Alcohol														
Hombre	441	455	400	602	538	535	486	534	543	503	629	692	661	546
Mujer	69	91	81	117	113	97	108	98	103	116	120	162	145	129
Total	512	549	481	720	655	633	596	633	648	619	752	858	806	677


Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 1. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso de sustancias psicoactivas. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 2. Lugar de nacimiento de los admitidos a tratamiento por abuso de sustancias psicoactivas. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 3. Sustancia psicoactiva que motiva un primer tratamiento por una sustancia determinada. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 4. Sustancia psicoactiva que motiva la admisión, en pacientes con un tratamiento previo por la misma droga. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)



Drogas ilegales


Evolución Indicador Tratamiento

Figura 5. Tasa de admitidos a tratamiento, residentes en la Comunidad Autónoma, por abuso de drogas ilegales por 100.000 habitantes. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 6. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales por sexo. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 7. Edad media de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2000-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)


Figura 8. Lugar donde ha vivido en los 30 días previos a la admisión a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
— Casa, piso, apartamento	70,0	70,9	70,4	71,2	74,9	76,4	77,7	78,1	76,8	78,4	82,3
— Prisión, centro para menores	17,7	18,0	16,3	15,8	14,7	14,1	14,4	12,1	14,3	11,8	10,1
— Alojamiento inestable/precario	3,7	3,1	3,4	2,3	2,3	2,8	1,9	2,7	2,6	2,2	1,8
— Otro lugar	7,6	9,2	5,5	5,7	4,8	3,9	4,9	5,5	5,4	6,0	4,4
— Desconocido	1,0	1,7	4,5	5,0	2,6	2,3	1,2	1,6	0,9	1,5	1,4


Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 9. Situación laboral de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 10. Nivel de estudios completado de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 11. Droga principal que motiva el tratamiento. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 12. Vía principal de administración de la heroína de los admitidos a tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 13. Vía principal de administración de la mezcla heroína-cocaína de los admitidos a tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2003-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 14. Vía principal de administración de la cocaína de los admitidos a tratamiento por abuso de dicha droga. Castilla y León, 2000-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)


Figura 15. Utilización de la vía inyectada de los admitidos a tratamiento, por primera vez, por una droga determinada. Castilla y León, 2000-2013



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
—◆— Nunca	65,5	66,0	73,7	76,5	77,5	74,3	74,5	77,6	84,6	87,4	88,5	86,4	88,1	91,7
—■— Reciente (menos de 6 meses)	17,3	15,2	8,4	8,3	7,9	9,2	5,4	4,7	3,2	3,2	1,8	1,8	2,2	0,7
—▲— Antigua (más de 6 meses)	10,9	9,0	10,5	11,6	10,5	10,4	9,3	9,9	7,3	6,8	6,6	6,8	5,2	3,3
—×— Desconocido	6,2	9,8	7,4	3,6	4,1	6,1	10,8	7,8	4,9	2,6	3,1	5,0	4,5	4,3


Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 16. Consumo múltiple de sustancias psicoactivas de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 17. Marcadores de infección de hepatitis B de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 18. Marcadores de infección de hepatitis C de los admitidos a tratamiento por abuso de drogas ilegales. Castilla y León, 2003-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)



Alcohol


Evolución Indicador Tratamiento

Figura 19. Evolución del porcentaje de admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 20. Lugar de nacimiento de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)


Figura 21. Lugar donde ha vivido en los 30 días previos a la admisión a tratamiento por abuso alcohol. Castilla y León, 2003-2013



—♦— Casa, piso, apartamento	86,8	86,7	81,8	82,5	84,2	81,6	83,9	86,0	86,8	86,1	86,4
—■— Prisión, centro para menores	0,8	0,9	0,9	1,8	1,6	2,0	2,7	1,7	2,1	3,3	2,8
—▲— Alojamiento inestable/precario	2,6	2,4	2,8	2,0	1,9	3,9	3,2	2,8	1,4	1,7	2,7
—×— Otro lugar	8,5	8,2	11,0	11,7	11,2	11,0	9,4	8,9	9,5	7,9	8,0
—*— Desconocido	1,3	1,8	3,5	2,0	1,1	1,5	0,8	0,5	0,2	0,9	0,1


Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 22. Situación laboral de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 23. Nivel de estudios completado de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

**Figura 24. Edad media de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol.
Castilla y León, 2000-2013**




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 25. Edad media al inicio del consumo de alcohol de los admitidos a tratamiento por abuso de dicha sustancia. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 26. Edad media al inicio del consumo problemático de alcohol de los admitidos a tratamiento por abuso de dicha sustancia. Castilla y León, 2003-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 27. Número medio de años de consumo de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 28. Número de drogas consumidas de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2000-2013




Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 29. Patología orgánica asociada al alcoholismo en los admitidos a tratamiento. Castilla y León, 2003-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Figura 30. Trastornos mentales en los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol. Castilla y León, 2003-2013



Fuente: Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León (SAITCyL)

Indicador Tratamiento. Conclusiones I

Sustancias psicoactivas

- La media de pacientes que inician tratamiento ambulatorio por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas es 2.453 admitidos/año.
- Se observa una tendencia descendente en el porcentaje de admitidos por abuso de drogas ilegales.
- En su mayoría son hombres, 8 de cada 10, tanto en las admisiones por abuso de drogas ilegales como por alcohol .
- La sustancia principal que motiva el primer tratamiento por una sustancia determinada, a partir de 2002, es alcohol junto con cocaína. La heroína presenta una línea descendente desde el 2000. El cannabis supera a la heroína en 2009 y a cocaína en 2013.
- En los pacientes que han tenido algún tratamiento previo por la misma droga, la heroína ocupa el primer lugar como droga principal, con una tendencia descendente. Tanto alcohol como cocaína y cannabis presentan una línea ascendente.

Indicador Tratamiento. Conclusiones II

Drogas ilegales

- La tasa de admitidos a tratamiento, residentes en la Comunidad Autónoma, por abuso de drogas ilegales en el grupo de 15-44 años duplica a la total.
- La edad media de los admitidos a tratamiento aumenta 3 años en el hombre y 5 años en la mujer; situándose, en 2013, en 34 años en ambos sexos.
- Se observa un aumento de los que viven en una casa, piso o apartamento, 8 de cada 10 drogodependientes.
- El desempleo es la situación laboral más frecuente, con un aumento a partir de 2007. Trabajan, de media, 3 de cada 10 drogodependientes.
- El máximo nivel de estudios completado con más frecuencia es el secundario. De media, lo refieren 5 de cada 10 drogodependientes.

Indicador Tratamiento. Conclusiones III

Drogas ilegales

- La droga principal que motiva el tratamiento con más frecuencia es la heroína. Presenta una tendencia descendente y es superada por la cocaína en 2011. El cannabis se mantiene en tercer lugar, con una trayectoria ascendente.
- La vía principal de administración de la heroína es la fumada/ inhalada, seguida de la inyectada que desciende; para cocaína, la vía principal es la esnifada, que asciende, seguida de la fumada/ inhalada que desciende.
- En los admitidos a tratamiento la primera vez por una droga determinada, la proporción de los que nunca utilizaron la vía inyectada asciende.
- En el consumo múltiple de drogas, se mantiene el consumo de cocaína y alcohol y disminuye el consumo de heroína y cocaína y el de 3 o más drogas.
- Los marcadores de infección de hepatitis B y C presentan una línea descendente, disminuyendo también en ambos el porcentaje de desconocidos.

Indicador Tratamiento. Conclusiones IV

Alcohol

- Se observa un aumento en la proporción de pacientes admitidos a tratamiento por abuso o dependencia de alcohol. La proporción de mujeres se sitúa entre el 13% y el 19%.
- La proporción de españoles es de 9 de cada 10 admitidos.
- Las admitidos a tratamiento por abuso de alcohol, viven en una casa, piso o apartamento, 8 de cada 10.
- La situación laboral de desempleo supera a los que trabajan a partir de 2008.
- El nivel de estudios completado más frecuente, a partir de 2005, es el de los estudios secundarios que desplazan a los primarios.
- La edad media de los admitidos a tratamiento por abuso de alcohol aumenta 1 año en el hombre y 2 años en la mujer y se acerca a los 45 años en ambos sexos.

Indicador Tratamiento. Conclusiones V

Alcohol

- La edad media al inicio del consumo es menor en el hombre (16 años) que en la mujer (19 años) y desciende en los dos sexos.
- La edad media al inicio del consumo problemático, asciende en ambos sexos y se sitúa en torno a los 10 años del inicio del consumo.
- El número medio de años de consumo asciende lentamente.
- El consumo de 2 y 3 o más drogas, en el abuso de alcohol, presenta una trayectoria ascendente.
- La patología orgánica asociada al alcoholismo se mantiene, con un aumento en 2012 y 2013 y cifras altas de desconocidos.
- Los trastornos mentales se mantienen, aunque todavía con cifras altas de desconocidos.