

Bruckner - Paz Alvarez,

Medicina

Homeopática.

61

16861




207

24


24

267



MEDICINA

HOMEOPÁTICA.



gl

MEDICINA

HOMEOPÁTICA

DOMÉSTICA

POR EL

D^r. TH. BRUCKNER,
MÉDICO HOMEÓPATA DE BASILEA.



TRADUCIDA AL FRANCÉS CON AUTORIZACION DEL AUTOR,

CON UN PRÓLOGO DEL D^r. E. SCHAEGLER.

TRADUCIDA AL ESPAÑOL, CORREGIDA Y NOTABLEMENTE
AUMENTADA,

POR EL D^r. PAZ ALVAREZ, DE MADRID.

LEIPSIK,
DR. WILLMAR SCHWABE, EDITOR.

1874.

PHYSIOLOGY

HOMEOPATHY

BY

DR. J. C. BRIGGS

OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN

ANN ARBOR, MICHIGAN

1881

—

1881

ANN ARBOR, MICHIGAN

1881

À nuestros lectores.

Invitados por el Dr. Willmar Schwabe, distinguido farmacéutico homeópata de Leipsik, á traducir al español la obra de medicina homeopática doméstica del Dr. Bruckner, de Basilea, de cuya obra es editor, asi como á corregirla y aumentarla todo lo posible, con objeto de ponerla á la altura de las mejores de su clase, hemos aceptado gustosos este trabajo, que no dudamos contribuirá á la propagacion de la homeopatia asi en España como en la América española, y obtendrá el mismo éxito que en Alemania, donde ya se ha publicado la tercera edicion.

Accediendo á los deseos del Dr. Schwabe, hemos aumentado considerablemente con indicaciones hijas de nuestra práctica y de los mejores autores homeopatas, la inmensa mayoria de las enfermedades que contiene la obra del Dr. Bruckner, siendo casi en su totalidad originales nuestros los artículos siguientes:

Apoplegia. — *Blenorragia.* — *Bronchitis.* —
Cabellos. — *Cólera.* — *Coriza.* — *Crup.* —

Disenteria. — *Dispepsia.* — *Divieso.* — *Enfriamiento.* — *Erisipela.* — *Escarlatina.* — *Escrófulas.* — *Grietas.* — *Grippe.* — *Hemorroides.* — *Lombrices.* — *Mercurio.* — *Metritis.* — *Panadizo.* — *Quemaduras.* — *Sarampion.* — *Urticaria.* — *Verrugas.* —

Ademas, hemos añadido á la obra un número respetable de enfermedades de que carece el original aleman, y son las siguientes:

Alcanfor. — *Amaurosis.* — *Arsénico.* — *Asfixia.* — *Azufre.*

Baños. — *Bazo.* — *Boca.* — *Bubon.*

Café. — *Cantáridas.* — *Carbunclo.* — *Conmoción traumática.* — *Contusiones y equimosis.*

Debilidad. — *Dilatacion y gases en la matriz.* — *Dolor de costado.* —

Edema de los párpados. — *Escorbuto.* — *Escoriacion.* — *Estaño.* — *Estrabismo.* — *Estrangulacion de los intestinos.*

Fiebre amarilla. — *Fiebre puerperal.* — *Fiebre traumática.* — *Fístula, tumor y obstruccion lagrimales.* — *Flatulencia.* — *Flemones.* — *Fluxion en la cara.* — *Fósforo.* —

Gastrorragia. —

Hemeralopia. — *Heridas.* — *Herpes anular.* — *Hierro.* — *Hipo.*

Insectos (picaduras de). — *Iodo.*

Lamparones y muermo. — *Laringe.* — *Licopodio.* — *Lobanillos y Lipomas.* —

Magnesia. — *Melancolia.* — *Metralgia.* — *Mordeduras de animales venenosos.* —

Nariz. — *Neuralgia ocular.* — *Nictalopia.* —

Olor fétido de la boca. — *Opio.* — *Orzuelo.* —

Ovarios. —

Parálisis de los parpados. — *Pescados venenosos.* —

Pirosis. — *Pituitas.* — *Plétora.* — *Plomo.*

— *Pólipos en la matriz.* — *Polisarcia.* — *Presbicia.*

— *Pústula maligna.* —

Quinina. —

Rectorragia. —

Saburra gástrica. — *Salivacion.* — *Setas.*

Tabes mesentérica. — *Té.* — *Tiña.* — *Torticolis.* —

Ulceras, opacidad y manchas en la cornea. —

Uretorragia. — *Uñas.* —

Zarzaparilla. —

Destinado este manual popular á las personas afectas á la homeopatía, que tienen que tratarse sus enfermedades, las de sus familias y conocimientos, en ausencia del médico, ya por vivir en el campo, ó por no haber médico homeópata en la localidad, ó mientras este llega en otros casos, les será de gran utilidad por la esposicion clara de las indicaciones clínicas que en él campea; así como también lo será para los médicos homeópatas principiantes, por el rico arsenal de indicaciones eminentemente prácticas que en sus páginas encontrarán. Esto les facilitará, pero no

les dispensará, sin embargo, del estudio de la materia médica pura; porque sin ese estudio detenido y profundo, y el comparativo de los medicamentos, no se puede ser un buen médico homeópata.

Siguiendo el método del Dr. Bruckner, van marcadas con nuestra firma algunas indicaciones especiales, adquiridas á la cabecera de los enfermos, y que la práctica posterior no ha desvirtuado.

Dr. Paz Alvarez.

Prólogo.

La publicación de un nuevo manual de medicina homeopática, no es aprobada por todos los partidarios de la homeopatía. En efecto, cierto número de médicos homeópatas creen, que semejantes publicaciones populares desprestigian la homeopatía, ya bastante desdeñada por sus adversarios.

No participamos de la opinión de esos compañeros, y aun cuando fuera fundada, nos es bastante indiferente el mayor ó menor desden de parte de los médicos alópatas, que acostumbran á juzgar nuestra ciencia sin conocer siquiera sus dogmas fundamentales.

Nuestro objeto es propagar nuestra benéfica doctrina, y aliviar así á la humanidad doliente. I la homeopatía se propagará tanto mas, cuantas mas sean las ocasiones en que el público tenga que recurrir al tratamiento homeopático; sea por la facilidad de dirigirse á médicos homeópatas, sea, á falta de estos, por la facilidad de procurarse buenos manuales, con cuyo auxilio podrá curar por si mismo las numerosas enfermedades, contra las que se ha mostrado impotente la medicina oficial.

Nadie ignora que hay una gran desproporción entre el número considerable de personas que desean disfrutar de los beneficios que proporciona el tratamiento homeopático, y el corto número de médicos que ejercen este sistema. En tanto que los médicos alópatas se curan de su ceguera y se dedican al estudio y práctica de la homeopatía, es de rigurosa necesidad y urgencia que las personas que no tienen médico homeópata en su localidad, puedan tratarse por si mismas consultando buenos manuales populares. Existen ya diferentes obras de este género, y la publicación de este manual parecerá quizás supérfluo. Pero no conocemos ninguno que contenga en tan pocas páginas tantos datos preciosos, y cuyas indicaciones medicamentosas sean tan precisas y fáciles de comprender por personas que no hayan estudiado medicina.

Desde que Hahnemann, el inmortal fundador de la homeopatía, y sus primeros discípulos publicaron sus obras, la homeopatía ha hecho rápidos progresos científicos, y de ellos somos principalmente deudores á los Estados Unidos de la América del Norte. En este país, donde el número de médicos homeópatas llega ya á la respetable cifra de cinco mil, se han establecido varias Facultades de medicina homeopática, en las que se enseñan todas las ramas de la medicina por ilustrados homeópatas. Entre los profesores de estas escuelas y los jóvenes médicos que de ellas salen, reina una extraordinaria actividad científica, á la que debe la homeopatía nuevas experimentaciones, y el conocimiento de un gran número de nuevos medicamentos preciosos. Sin embargo, los manuales publicados hasta el día, han tenido bien poco en cuenta estos nuevos descubrimientos. El del Dr. Bruckner se distingue por el contrario por una notable innovación. Este autor, profundamente versado en la literatura homeopática americana, la ha puesto al servicio del lector de su obra, así es que se encuentran en ella gran número de indicaciones preciosas de todos los medicamentos nuevos, cuya eficacia ha comprobado la experiencia.

El Dr. Bruckner se ha tomado el trabajo de marcar con las iniciales del nombre de los autores respectivos las nuevas recomendaciones é indica-

ciones de los medicamentos, que no se encuentran en los manuales conocidos. De este modo verá el lector estudioso cuan considerable es el número de esas nuevas indicaciones contenidas en el manual del Dr. Bruckner. Bajo este concepto puede ser consultado con fruto este manual doméstico por el médico homeópata instruido.

Hemos creído prestar un buen servicio à la causa de la homeopatia haciendo traducir este manual. Si su publicacion tiene una acogida favorable, y hace necesaria una segunda edicion, haremos todo lo posible porque sea lo mas acabada en su clase.

Berna, Abril de 1873.

Dr. Schaedler.

Indice

de las materias contenidas en esta obra.

Introduccion.

| | Pags. |
|--|--------|
| Que es la homeopatia? | 1 |
| En que se diferencian la alopatia y la homeopatia? | 2 |
| Exito y progreso de la homeopatia. | 4 |
| De la eleccion de los medicamentos homeopáticos | 6 |
| Como debe hacer el médico para investigar los síntomas de la enfermedad y trazar su cuadro | 8 |
| De la manera de administrar los medicamentos homeopáticos. | 12 |
| Reglas generales | 13 |
| De la forma de los medicamentos | 14 |
| Tabla alfabética de los medicamentos homeopáticos mas importantes | 14 |
| Regimen que se debe seguir en el tratamiento homeopático | 18 |
| Reglas generales de dietética durante el tratamiento homeopático | 19 |
| Síntomas característicos generales de los medicamentos homeopáticos mas usuales | 20—33 |
| Indicaciones clinicas | 54—338 |

Apéndice.

| | |
|---|---------|
| Enfermedades de los niños | 338—347 |
| Repertorio de las enfermedades de los niños | 340 |
| Indicaciones especiales para los diversos medicamentos. | 344 |
| Tratamiento profiláctico de las enfermedades de los niños | 346 |
| <i>Indice alfabético</i> | 349 |

Introduccion.

Para tener una idea exacta de la homeopatia asi como de los principios sobre los que se sustenta ; para juzgar con conocimiento el valor de ese sistema médico, es indispensable saber lo que se entiende por homeopatia.

Que es la homeopatia ?

Con este nombre se designa al tratamiento médico descubierto y puesto en práctica por Hahnemann en los primeros años de este siglo. No admite, para la curacion de las enfermedades, otros medicamentos que aquellos cuya accion sobre el organismo humano haya sido anteriormente sometida á un examen detenido, mediante experimentaciones exactas hechas en el hombre sano.

Despues de haber pasado por esas pruebas concienzudas, la aplicacion de los medicamentos se hace segun la ley llamada de los semejantes (*similia similibus*). Es decir, que en cada caso especial de enfermedad, se elige precisamente el medicamento cuya administracion en el hombre sano haya producido una sucesion de síntomas de enfermedad, y que presenten mas analogia con aquellos que se trata de curar. Pero la experiencia ha enseñado que estos medicamentos no pueden darse á dosis ordinarias, como las que el método alopático usa, pues entonces provocarian una agravacion sensible en la enfermedad. Por el contrario, esos mismos medicamentos

administrados en dosis muy pequeñas (llamadas homeopáticas), están precisamente dotados de bastante virtud para excitar la fuerza de reaccion en los órganos enfermos, y mantener en ellos su actividad hasta que el organismo ó la naturaleza por su propia energia, hayan vencido á la enfermedad.

En que se diferencian la alopatia y la homeopatia ?

Si examinamos detenidamente cual es la diferencia que existe entre la alopatia y la homeopatia, nos encontraremos en presencia de principios que establecen entre ambas doctrinas divergencias esenciales, de las que se deduce que el método homeopático aventaja incontestablemente á la alopatia.

1) El médico homeópata, al emplear los medicamentos, no hace mas que aplicar un principio fijo, que ha consagrado la experiencia mil veces; mientras que en la eleccion de los medicamentos asi como en el tratamiento de sus enfermos, el médico alópata no tiene ningun principio fijo. Tiene ante si una multitud de tratamientos diversos, que estan frecuentemente en contradiccion consigo mismos. Por cual se decidirá? Por aquel sin duda en que tenga mas confianza, ó por el que un médico alópata de fama haya honrado con su recomendacion. Un gran número de alópatas de buena fé y penetracion han convenido en esto públicamente; han confesado que la *medicina* (la alopatia) *es impotente para curar*. En efecto, una cosa es seguir las reglas del arte; otra cosa es curar.

2) La homeopatia administra medicamentos que obran directamente, asi como tambien especificamente, sobre los órganos ó partes enfermas. Este es un método curativo directo, mientras que solo por medio de rodeos hace la alopatia sus ensayos de curacion; por ejemplo, por derivativos sobre el canal intestinal por medio de purgantes, ó por revulsiones sobre la piel por medio de vesicatorios, sinapismos, etc. etc. La experiencia nos enseña

tambien que los medicamentos aplicados segun la ley alopatíca *de los contrarios*, no son medicamentos propiamente dichos, sino unicamente paliativos; esto es, que no producen otros efectos mas que hacer desaparecer por algun tiempo los síntomas de la enfermedad sin curarla en realidad; antes por el contrario, al prolongarla la hacen mas rebelde é incurable. Nadie ignora que los purgantes enérgicos no curarán jamas una astriction de vientre crónica de un modo durable; antes bien, el enfermo tendrá que aumentar las dosis de ellos constantemente, con objeto de conseguir evacuaciones de vientre.

3) La homeopatia, como ya se ha dicho, solo administra sus medicamentos en cantidades tan mínimas, que aun cuando su eleccion sea equivocada, no resultará ningun peligro directo para el enfermo por el hecho de una accion demasiado violenta; mientras que los medicamentos alopatícos, aunque sean elegidos con el mayor cuidado, producen muy frecuentemente efectos dañosos, y frecuentemente tambien resultados bastante desastrosos para poner en peligro la vida del enfermo y acelerar su fin.

4) La homeopatia, prescribiendo medicamentos que obran directamente asi como tambien especificamente sobre los órganos enfermos, en las enfermedades agudas y peligrosas, hace sentir su efecto benéfico mas pronto, que por el método terapéutico alopatíco que no obra mas que indirectamente. Si sucede que algunos medicamentos homeopáticos que parecen estar indicados, no han producido alivio alguno en el estado del enfermo, el médico homeópata sabe que debe elegir otro medicamento; mientras que el alópata no sabe de ordinario mas que aumentar sus dosis que con frecuencia no hacen otra cosa que acelerar la muerte del enfermo.

5) Como la homeopatia no prescribe ningun medicamento que debilita ni agota las fuerzas, como hace la alopatia, el enfermo que se cura á favor del tratamiento homeopático, se repone mucho mas pronto y se dedica á su trabajo mucho antes que aquel que, tratado por el

método alopático, vé su estómago y órganos digestivos con frecuencia completamente arruinados por efecto de las abundantes y violentas medicinas á que ha estado sometido.

6) Además, como los medicamentos homeopáticos no tienen ningun sabor pueden administrarse á todos los enfermos con la mayor facilidad; son de una superioridad incontestable en el tratamiento de los niños.

Puede decirse verdaderamente que el método homeopático reúne todas las ventajas que se pueden exigir de un método terapéutico. Verifica las curaciones con seguridad y prontitud, porque los medicamentos que prescribe ejercen su acción saludable de una manera directa y específica sobre las partes enfermas; estos medicamentos son administrados á dosis mínimas, de modo que no pueden ofrecer peligro alguno para la vida del enfermo; y en fin, són tan buenos de tomar, y tan fáciles de administrar, que bajo este punto de vista no dejan nada que desear.

Éxito y progreso de la homeopatía.

Triunfante de todas las persecuciones que se han ejercido contra los médicos homeópatas, desde su proclamación hasta la actualidad, la homeopatía ha seguido su camino y se ha extendido por todo el mundo, merced á sus éxitos incontestables. Príncipes y reyes han reconocido sus ventajas, y han elegido un médico homeópata para su asistencia.

Pero como hasta ahora la homeopatía no se ha enseñado mas que en pocas universidades, al menos en Europa; y los estudiantes, oyen continuamente la repulsión al estudio de la medicina homeopática, tan profunda es la aversión que los profesores la tienen, la escasez de médicos homeópatas hábiles se deja sentir por todas partes, especialmente en Europa.

Con el plausible fin de remediar esa falta, se vienen publicando desde hace treinta y tantos años una multitud

de obras populares, con objeto de instruir al profano, én ausencia de médico, en el uso para si y los suyos del tratamiento homeopático; y hasta para el tratamiento de los animales domésticos se ha publicado mas de una obra instructiva. Estas diversas publicaciones sobre la medicina homeopática doméstica, han favorecido sin duda á la homeopatía, propagándola mas y mas: pero la han perjudicado á la vez por varios conceptos.

En primer lugar, porque varias de esas publicaciones no han tenido otro movíl que la especulacion, encontrándose en ellas una multitud de aserciones aventuradas, que no merecen confianza alguna: en segundo lugar, porque en esas publicaciones se fundan los adversarios para extender la creencia de que la homeopatía no tiene nada de comun con la ciencia, que no exige el mas pequeño estudio. de tal suerte, dicen, que bastan un libro y una caja homeopática, para que cualquiera advenedizo, por insignificantes que sean sus conocimientos en medicina, pueda curar y tratar las enfermedades tan bien como un médico homeópata instruido y experimentado. Esta asercion es completamente falsa. La verdad es todo lo contrario. Seria incomparablemente mucho mas facil á un hombre sin estudios, pero inteligente, adquirir en poco tiempo todo el arsenal de la terapéutica alopática, que familiarizarse con los elementos de la terapéutica homeopática, y conservar en su inteligencia las reglas de la direccion en la eleccion de los medicamentos homeopáticos. Esta es precisamente la dificultad que se presenta en el estudio de los remedios homeopáticos, y que hace retroceder á tantos médicos ante ese trabajo árduo; así es que nadie puede ser buen homeópata práctico sin el conocimiento profundo de la materia médica homeopática. Así es, que como todos los médicos tienen que estudiar á la fuerza la alopátia, y someterse enseguida al examen alopático — al menos en Europa — si quieren obtener el título de médico práctico, es natural que el número de los que mas tarde quieran estudiar la homeopatía será escaso; tanto mas, cuanto que no hay para

el médico homeópata ninguna probabilidad de obtener una posición oficial retribuida por el Estado.

De la elección de los medicamentos homeopáticos.

Acabamos de consignar que, según los preceptos de la ciencia, es más fácil tratar un enfermo alopáticamente, que tratarlo concienzudamente según el método homeopático. Con el fin de poner esto al alcance de todas las inteligencias, vamos á someter á un examen profundo á ambos métodos de curación. Para el alópata, como es sabido, el punto esencial reposa en el diagnóstico; es decir, en el conocimiento exacto y en el nombre de la enfermedad. Si el médico está seguro en su diagnóstico, la terapéutica ó el tratamiento se presenta por sí mismo á la vez, poniendo cada uno en práctica las doctrinas de sus profesores ó el sistema más de moda. Si la enfermedad empeora de día en día, gracias al tratamiento empleado; si la muerte es su consecuencia, ninguna censura puede dirigirse al médico alópata, sobre todo si ha adoptado el tratamiento más en boga. Lejos de eso, la autopsia le proporcionará su mayor triunfo. En efecto, apenas la autopsia ha demostrado la verdad de su diagnóstico, queda reputado como un excelente diagnosticador; lo cual es para un alópata llegar á la cúspide de la gloria. Otra cosa sucede con el médico homeópata. Para este, lo principal es la curación del enfermo, y el diagnóstico no ocupa su atención más que para lo que le es precisamente indispensable, y consiste en juzgar con conocimiento de causa la gravedad de la enfermedad, su duración y su término probable.

Además, en la elección de los medicamentos, el médico homeópata no se dejó influir por el nombre de la enfermedad, sino por el conjunto exclusivamente de todos los síntomas, que le suministra el examen del enfermo y los datos que le proporcionan los que le rodean; solo á esos síntomas trata de oponer el medicamento que les corresponde; con la convicción de que bien elegido, producirá pronto un alivio sensible.

El arte de elegir con prontitud é inteligencia los medicamentos y la confianza segurísima que tiene en su virtud, tales son los signos característicos de un médico homeópata inteligente y experimentado. Aquel que cambia constantemente los medicamentos; ó que la cantidad, es decir, dosis mas fuertes pueden suplir à la calidad, à la buena eleccion, segun su modo de ver; aquel que quizás añada aun toda clase de medicamentos alopáticos, ya externos ó internos, esos no son verdaderos *homeópatas*, inteligentes y experimentados.

Habiendo reglas precisas que guian à los homeópatas en la eleccion de los medicamentos, es preciso deducir que suponiendo en todos un conocimiento igual de esos medicamentos é igual talento de observacion, todos debian estar acordes en su eleccion, por lo menos en aquellos casos en que los síntomas de la enfermedad se manifiestan claramente. Los primeros discipulos de Hahnemann no tenian à su disposicion mas que medicamentos en corto número pero experimentados perfectamente y repetidas veces: asi los conocian con mas perfeccion y exactitud en general que se los conoce en el dia, y està fuera de duda que se hallaban mas unánimes en las elecciones que de ellos hacian.

La riqueza de nuestra materia médica es inmensa, puesto que abraza ya mas de trescientos medicamentos de los reinos animal, vegetal y mineral; asi es que cada médico homeópata conoce naturalmente mejor ciertos medicamentos que ha tenido ocasion de emplear con mas frecuencia, que no otros que nunca ó raras veces ha administrado; y su eleccion se limitará al circulo menos extenso de los medicamentos que mejor posee.

Sin embargo, hoy, nuestros mejores médicos homeópatas estan acordes admirablemente en la eleccion de los medicamentos, desde que la fisionomia de la enfermedad en cuestion se haya caracterizado con esa precision que exige la homeopatia.

Como debe hacer el médico para investigar los síntomas de la enfermedad y trazar su cuadro.

La buena eleccion del medicamento y el exito del tratamiento homeopático, dependen en gran parte del arte de reunir con inteligencia los diversos síntomas de la enfermedad en un cuadro.

Es necesario, pues, hablar de esto muy especialmente, tanto mas cuanto que el diagnóstico que es lo único que basta al alópata, satisfará muy rara vez al homeópata, puesto que este debe elegir el medicamento segun los preceptos de la homeopatia. Es preciso ante todo establecer una distincion esencial entre las enfermedades agudas y crónicas.

En los casos en que un hombre en estado de salud se ve acometido de una enfermedad súbita por cualquiera influencia funesta, la eleccion del medicamento presenta ordinariamente menos dificultades que en las enfermedades crónicas.

Entiéndese por *enfermedades agudas* las que se presentan súbitamente y siguen su camino en un periodo de tiempo breve y determinado, y terminan con ó sin medicacion, por la curacion ó por la muerte.

Las *enfermedades crónicas*, por el contrario, son las que no tienen periodos determinados, pero que pueden prolongarse durante años y aun durante toda la vida. No es raro ver una enfermedad aguda en su origen, pasar al estado crónico, y en una enfermedad crónica presentarse con frecuencia ataques de caracter agudo. Puede decirse tambien que hay enfermedades crónicas que no son otra cosa mas que la consecuencia ó continuacion de ataques agudos, como la epilepsia.

Las enfermedades agudas se dividen en dos categorias principales: *esporádicas* y *epidémicas*.

Se llaman *esporádicas* las que reinan en cualquiera época del año y son efecto de influencias perniciosas à las que se ha expuesto una persona aisladamente; como por ejemplo, por haberse mojado, por haberse fati-

gado mas de lo conveniente, por haber comido demasiado, etc. etc.

Se llaman *epidémicas*, las enfermedades agudas contagiosas para la mayor parte de los habitantes de una localidad ó varias, que dominan allí en ciertas épocas y durante un tiempo mas ó menos largo, para de — saparecer enseguida de repente durante una serie de años; tales son el cólera asiático, la viruela, la peste, la fiebre amarilla, etc. etc.

En las enfermedades agudas es menester ante todo buscar con el mayor cuidado la causa que las ha producido; porque encerrado el mal en su origen sin haberse aun de — sarrollado, podrá el medicamento homeopático correspondiente á la causa productora de la dolencia, destruiral ó por lo menos disminiurla, hasta el punto de hacer que se curso y terminacion sean mucho mas benignos. Nuestra materia médica presenta una multitud de indicaciones que todo médico homeópata, y cualquiera otro que quiera dedicarse al ejercicio de la homeopatia debe conocer à fondo, si desea obtener algun resultado del tratamiento homeopático. Asi por ejemplo, en los casos de una caida, de un golpe, de una contusion, se dará *Arnica*; cuando el cuerpo estando sudando se ha mojado, *Rhus*; contra las malas consecuencias de un arrebato, de una cólera, *Chamomilla* ó *acon.*, ó *nux vom.*, etc. etc. En los casos en que no sea posible averiguar la causa ocasional, es preciso poner un gran cuidado en la investigacion de los sintomas de la enfermedad, y dirigirse por ellos para la eleccion del medicamento.

En las enfermedades epidémicas es frecuentemente muy difícil al médico, cuando se presentan los primeros casos, elegir medicamentos específicos, propios del caracter de la enfermedad; porque los sintomas de la mayor parte de las enfermedades agudas de este género son, al principio, de una naturaleza tan poco determinada y tan genérica, que no es admisible la certidumbre en la eleccion del medicamento ó medicamentos.

Pero una vez que el médico homeópata haya tratado varios casos y aprendido à conocer los medicamentos que hayan demostrado su eficacia en las enfermedades mas adelantadas, en que los sintomas estan bastante pronunciados para que sea posible elegir un medicamento con seguridad, el hombre de la ciencia està autorizado al principio de esta clase de enfermedades, aun cuando los sintomas no estén bastante precisados, à prescribir aquellos mismos medicamentos que se han mostrado eficaces en las enfermedades ya avanzadas. Está comprobado por la experiencia que las epidemias que se creen idénticas, cambian frecuentemente de caracter; de tal modo, que los medicamentos que han sido excelentes en una primera epidemia, no obran ya en la segunda; asi es que el médico estudioso debe, por medio del cuadro de sintomas generales de la enfermedad epidémica, descubrir los medicamentos que corresponden al caracter de la dolencia que tiene que combatir.

Hé aqui lo mas esencial sobre las enfermedades agudas, de las que hablan con bastantes de talles los buenos manuales de medicina homeopática doméstica; en todos se encontrarán mas bien útiles avisos sobre las enfermedades agudas que sobre las crónicas. Estas son mucho mas dificiles de tratar con éxito; todos los médicos homeopatas lo reconocen.

Acabamos de exponer los puntos que deben ser el objeto de las cuidadosas investigaciones de todo médico solidamente instruido, y esto, con el objeto de establecer con seguridad el diagnóstico y pronóstico, — como por ejemplo, las enfermedades de familia hereditarias, las resultantes de ciertos géneros de vida ó de ocupaciones, los medicamentos, las curaciones de aguas de que se haya hecho uso, etc. etc. — Hay ademas otros varios puntos sobre los que debe fijar la atencion el médico homeópata. Tales investigaciones parecerán ridiculas, por decirlo asi, al médico alópata, que quiera ser lógico con sus principios. No haremos mas que mencionarlos brevemente, con el objeto de que el homeópata pueda al

principio de sus estudios, ver la diferencia que separa à la alopatía de la homeopatía, bajo el punto de vista de la fisonomía de la enfermedad.

El médico homeópata dedicará sus esfuerzos ante todo à darse una cuenta exacta y detallada de la constitucion del enfermo, de su temperamento, de las disposiciones de su espíritu y de su humor. Considerará sus rasgos, su tez, en una palabra, todas las particularidades apreciables. Tendrá cuidado de inquerir las disposiciones, morbíficas del sugeto enfermo, asi como todas las particularidades que à ellas se puedan referir. Estos detalles, que se afirman reiteradas veces al práctico, como indicaciones características del medicamento que se ha de elegir, se presentan en tal número en nuestra materia médica, que frecuentemente el sintoma menos aparente es el que determina la preferencia por tal ó cual medicamento; suponiendo ademas que los sintomas especiales de la enfermedad, confirmen la eleccion del medicamento ya indicado por las particularidades generales, constitucionales del enfermo.

Es preciso tambien que el enfermo explique el género ó clase de malestar y dolor que experimente en una parte ó varias del cuerpo, en un órgano cualquiera; debe notar con cuidado à que *hora del día empeora* su dolencia, y si *la acompañan otros sufrimientos*. Es de gran interés que observe *cuales son las influencias externas que ocasionan sus dolores ó los agravan, lo que puede disminuirlos ó hacerlos desaparecer por completo*.

En la parte especial de esta obra demostraremos hasta que punto deben tenerse en cuenta estas consideraciones, para la eleccion de los medicamentos.

De la manera de administrar los medicamentos homeopáticos.

Los médicos homeópatas no estan acordes en la actualidad sobre las dosis de los medicamentos, y su repeticion mas ó menos frecuente. Unos dan solo las atenuaciones

y trituraciones bajas, que repiten con frecuencia, mientras que otros solo administran y pretenden ser mas afortunados con las atenuaciones mas altas, que repiten con poca frecuencia. Si se comparan las estadísticas que nos suministran unos y otros, es preciso confesar que los últimos obtienen resultados mucho mas brillantes y extraordinarios, sobre todo en las enfermedades crónicas.

Ademas, la mayor parte de los partidarios de las atenuaciones bajas, no ocultan que en las enfermedades crónicas producen mas efecto las altas que las bajas.

Es natural que la mayor parte de los alópatas convertidos à la homeopatia, no sean amigos de las altas atenuaciones. Esto se explica por las razones que les arguye su teoria. Debe suceder lo mismo en aquellos que practican la homeopatia, sin haber estudiado medicina. Sería de desear que los admiradores de las bajas atenuaciones hiciesen por lo menos algunos ensayos con las atenuaciones mas elevadas, siguiendo sin embargo estrictamente las reglas de Hahnemann. Nosotros, puestos en un término medio, propondríamos de la 6^a à la 12^a atenuación centesimal en las sustancias vegetales; y de la 12^a à la 30^a para las minerales. Estas son las atenuaciones que emplea con gran éxito la gran mayoría de los médicos homeópatas franceses. Los médicos homeópatas españoles, sobre todo los que siguen las doctrinas y la práctica del venerable Dr. Marques de Nuñez, Presidente de la *Sociedad Hahnemanniana Matritense*, usan con gran éxito las atenuaciones altísimas, de la 200^a arriba, sin que por eso degen de recurrir à las bajas; empleando estas en las enfermedades crónicas, en que la fuerza vital gastada y postrada ofrece pocas reacciones, y necesita mayor estímulo medicamentoso; y las altísimas, en todas las enfermedades agudas, y las crónicas en que haya gran excitacion, gran sensibilidad, y haya que solicitar una reaccion suave de la fuerza vital; y en los niños.

Por regla general, los homeópatas que usan *las bajas*

y las altas, emplean las primeras en personas exentas de irritacion, poco sensibles, tórpidas; sírvense de ellas en las enfermedades cuya sensibilidad está disminuida, ó parece casi aniquilada. Por el contrario, usan las altas en las personas muy irritables y sensibles (mujeres y niños), y en las enfermedades en que la sensibilidad está muy exitada.

Reglas generales.

1^o) Cuando se emplean las atenuaciones ó diluciones bajas en personas que no son irritables; cuando se las emplea en enfermedades en las que la reaccion ó la fuerza vital son escasas, en las que son muy graves, que se desarrollan rápidamente, es preciso repetir las dosis con mucha frecuencia, hasta que se advierta un alivio efectivo. *En los casos gravísimos, como por ejemplo: en el cólera, hay à veces necesidad de repetir las dosis cada cinco minutos; pero en las enfermedades agudas ordinarias, basta repetir las dosis cada tres ó cuatro horas. Si se declara un alivio visible, no se debe dar mas medicamento; pero tan pronto como el alivio cesa, debe darse de nuevo medicamento. Si los caracteres de la enfermedad se modifican, elijase un medicamento mas apropiado al cambio sobrevenido.*

2^o) *Si se emplean las atenuaciones elevadas, ó altas potencias, como les llaman algunos, ya se trate una enfermedad crónica ó enfermos muy sensibles è irritables, no es permitido repetir las dosis à intervalos cortos ó muy aproximados. Se administra en estos casos el medicamento disuelto en agua, ya dando una cucharada de él mañana y tarde, durante 3 ó 9 dias, y descansando despues; ó bien dando una cucharada todas las noches, antes de acostarse, durante 10 ó 14 dias (método de Boenninghausen, recomendado sobre todo para los enfermos que no quieren ó no pueden soportar una dieta rigurosa); sea, en fin, dando una sola dosis (disuelta en dos cucharadas de agua, ó en seco sobre la lengua) cada 24 ó 48*

horas, cada ocho ó quince dias; despues de administrada una, dos ó mas dosis de este modo, se descansa el tiempo que se crea conveniente, esperando el efecto producido por ellas, para obrar en vista del resultado de las mismas.

De la forma de los medicamentos.

Atenuaciones. Cuando haya necesidad de usar los medicamentos en esta forma, como en el cólera y crup, à veces, etc., etc., se pone ó hecha una gota en un terron de azucar de leche, Ø en una cucharada de agua pura. Para los niños y personas muy sensibles, es preferible hechar una gota en medio ó un vaso de agua pura; y de esta solucion se da al enfermo, por cucharadas de las de café ó sopa.

Trituraciones.— Se dan 9 centigramos (lo que puede llevar la punta de un cortaplumas), ya disueltos en dos cucharadas de agua, ya en seco sobre la lengua.

Glóbulos.— Esta es la forma mas comun de administrar los medicamentos homeopáticos. Se ponen de 4 à 6 sobre la lengua (à los niños 1 ó 2), ó se disuelven en dos cucharadas de agua, para tomarlos de una vez; ó en medio vaso de agua, para tomar una cucharada cada tres ó cuatro horas; ó bien à intervalos mas ó menos cortos.

Notas.— Si los homeópatas dan algunas veces polvos de azucar de leche, es porque no es facil dar los glóbulos sin mezclarlos con el azucar; porque no solo se pierden al transportarse, sino que pierden à la vez facilmente su virtud, no estando mezclados con el azucar de leche.

Tabla alfabética de los medicamentos homeopáticos mas importantes.

Creemos que los cuarenta medicamentos siguientes, son los mas importantes. El que desee una farmacia

mas pequeña, puede contentarse con los veinticuatro medicamentos señalados con un asterisco.

Las cifras de la última columna de la tabla, indican los grados de atenuacion que aconsejamos, sobre todo à aquellos que no tienen confianza en la 30ª atenuacion aconsejada por Hahnemann. El que prefiera atenuaciones mas bajas, puede adoptar la forma líquida; el que prefiera las altas, los glóbulos.

En cuanto à las trituraciones bajas, indicadas en algunos casos, pueden elegirse des — de la 3ª à la 6ª.

| Abreviaturas. | Nombre latino. | Nombre español. | Atenuaciones. |
|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| *1. Acon. | Aconitum Napellus | Aconito napelo | De la 6ª à la 12ª |
| *2. Apis | Apis mellifica | Veneno de las abejas | - 6ª - 12ª |
| *3. Arnic. | Arnica montana | Arnica de las montañas | - 6ª - 12ª |
| *4. Arsen. | Arsenicum album | Arsénico | - 12ª - 30ª |
| *5. Bell. | Belladonna (Atropa) | Belladona | - 12ª - 30ª |
| *6. Bry. | Bryonia alba | Bryonia | - 6ª - 12ª |
| *7. Calc. c. | Calcarea carbonica | Carbonato de cal | - 12ª - 30ª |
| *8. Cham. | Chamomilla vulgaris | Manzanilla vulgar | - 6ª - 12ª |
| 9. Carb. v. | Carbo vegetabilis | Carbon vegetal | - 12ª - 30ª |
| 10. Caust. | Causticum | Caústico | - 12ª - 30ª |
| *11. Chin. | China regia | Quina | - 6ª - 12ª |
| 12. Cina. | Artemisia contra | Semen contra | - 6ª - 12ª |
| 13. Cocc. | Menispermum Cocculus | Cáscara de Levante (Coca) | - 6ª - 12ª |
| *14. Coff. | Coffea arabica | Café | - 6ª - 12ª |
| 15. Coloc. | Cucumis Colocynthis | Coloquintida | - 6ª - 12ª |
| 16. Côn. | Conium maculatum | Cicuta mayor | - 12ª - 30ª |
| 17. Dros. | Drosera rotundifolia | Drosera de hojas redondas | - 12ª - 30ª |
| 18. Dulc. | Solanum Dulcamara | Dulcamara | - 6ª - 12ª |

| Abreviaturas. | Nombre latino. | Nombre español. | Atenuaciones. |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| *19. Hep. | Hepar sulphuris calcarea | Hígado de azufre | De la 12 ^a à la 30 ^a |
| 20. Hyosc. | Hyoscyamus niger | Beleño | - 6 ^a - 12 ^a |
| *21. Ign. | Ignatia amara | Haba de S. Ignacio | - 6 ^a - 12 ^a |
| *22. Ipec. | Cephaelis Ipecacuanha | Ipecacuana | - 6 ^a - 12 ^a |
| 23. Lach. | Trigonocephalus Lachesis | Trigonocéfalo | - 12 ^a - 30 ^a |
| 24. Lyc. | Lycopodium clavatum | Licopodio | - 12 ^a - 30 ^a |
| *25. Merc. | Mercurius solubilis Hahnemannis | Mercurio soluble de Hahnemann | - 12 ^a - 30 ^a |
| 26. Natr. m. | Natrum muraticum | Muriato de sosa, Sal comun | - 12 ^a - 30 ^a |
| *27. Nux vom. | Nux vomica | Nuez vómica | - 12 ^a - 30 ^a |
| 28. Op. | Opium | Opio | - 12 ^a - 30 ^a |
| 29. Phos. | Phosphorus | Fósforo | - 12 ^a - 30 ^a |
| *30. Phos. ac. | Phosphori acidum | Acido fosfórico | - 12 ^a - 30 ^a |
| *31. Puls. | Pulsatilla nigricans | Anémone de los prados | - 12 ^a - 30 ^a |
| *32. Rhus. | Rhus toxicodendron | Zumaque venenoso | - 6 ^a - 12 ^a |
| 33. Samb. | Sambucus nigra | Sahuco | - 6 ^a - 12 ^a |
| *34. Sep. | Sepiae Succus | Sepia | - 12 ^a - 30 ^a |
| *35. Silic. | Silicea | Sílíce | - 12 ^a - 30 ^a |
| *36. Spig. | Spigelia | Espigelia anti-helmíntica | - 12 ^a - 30 ^a |
| 37. Spong. | Spongia tosta | Esponja tostada | - 12 ^a - 30 ^a |
| *38. Sulph. | Sulphur | Azufre | - 12 ^a - 30 ^a |
| *39. Thuj. | Thuja occidentalis | Tuya del Canadá | - 12 ^a - 30 ^a |
| *40. Veratr. | Veratrum album | Heléboro blanco | - 6 ^a - 12 ^a |

El que desee proseed una farmacia mas completa,
se procurará una

Caja de 60 medicamentos.

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Aconitum. | 31. Ignatia. |
| 2. Antim. crud. | 32. Ipecacuanha. |
| 3. Antim. tart. | 33. Kali bichrom. |
| 4. Apis. | 34. Kreosot. |
| 5. Arnica. | 35. Laches. |
| 6. Arsen. | 36. Lycop. |
| 7. Belladonna. | 37. Mercur. sol. Hahn. |
| 8. Borax. | 38. Merc. subl. corros. |
| 9. Bryonia. | 39. Natr. mur. |
| 10. Calcarea carb. | 40. Nux moschata. |
| 11. Capsicum. | 41. Nux vom. |
| 12. Carb. veg. | 42. Opium. |
| 13. Causticum. | 43. Phosphorus. |
| 14. Chamomilla. | 44. Phosph. ac. |
| 15. China. | 45. Platina. |
| 16. Cina. | 46. Podophyllum. |
| 17. Cocculus. | 47. Pulsatilla. |
| 18. Coffea. | 48. Rheum. |
| 19. Colocynth. | 49. Rhus tox. |
| 20. Conium. | 50. Sambucus. |
| 21. Crocus sat. | 51. Secale. |
| 22. Croton Tigl. | 52. Sepia. |
| 23. Cuprum acet. | 53. Silicea. |
| 24. Drosera. | 54. Spigelia. |
| 25. Dulcamara. | 55. Spongia. |
| 26. Euphrasia. | 56. Stannum. |
| 27. Ferrum. | 57. Staphysagria. |
| 28. Glonoin. | 58. Sulphur. |
| 29. Hepar s. c. | 59. Thuja. |
| 30. Hyoseyamus. | 60. Veratrum. |

Cajas para los niños.

Ademas de los 24 medicamentos principales, deberán
contener los siguientes :

Aethus cynap. — Argent. nitric. — Borax. — Brom. —
Camphor. — Cina. — Corall. — Droser. — Jalapp. —
Lycop. — Natr. mur. — Petrol. — Podophyll. —

Senna.—Rheum.—Stann.—Tarantula.—Variolin
ó Vaccinim.

Los precios de las diferentes cajas se encontrarán
en el apéndice.

Régimen que se debe seguir en el tratamiento homeopático.

En lo relativo á la necesidad de una dieta mas ó
menos severa durante el tratamiento homeopático, están
divididos los médicos. Es un hecho incontestable, que
Hahnemann y sus primeros discípulos no atribuían efecto
alguno á las atenuaciones, si no se observaba la dieta
homeopática mas estricta. Prohibían enteramente no
solo el té y café, toda bebida alcohólica, toda clase de
tabaco, sino que pretendían que hasta la aspiracion ca-
sual del humo de tabaco ó del perfume de las flores,
podía perturbar el efecto de los medicamentos, y aun
anularlo.

La experiencia nos ha enseñado felizmente, que el
efecto de los medicamentos homeopáticos no está sugeto
á ser tan facilmente alterado ó neutralizado, y que aun
se pueden obtener buenas curaciones siguiendo una dieta
poco severa.

Asi es que muchos médicos homeópatas no dan á
sus enfermos casi ningun precepto dietético, lo que cons-
tituye una tolerancia tan censurable, como el excesivo
rigor de los primeros discípulos de Hahnemann.

En las *enfermedades agudas* el apetito es ordinaria-
mente nulo; es apenas necesario en muchos casos pres-
cribir una dieta exacta. Pero si el enfermo tenia la
costumbre de usar los espirituosos ó el café muy negro,
será importante para el médico saber si ha continuado
durante el curso de la enfermedad aguda usando aquellos
estimulantes habituales.

En las *enfermedades crónicas* es menester inquerir ante
todo, si la enfermedad no ha sido ocasionada, ó está al
menos sostenida por un régimen anormal. En este caso

es absolutamente necesario que el médico prescriba una dieta severa (homeopática), y que hasta dege de visitar al enfermo, si no consiente en seguir la dieta, tal como se la ha prescrito. En las afecciones crónicas, en que el regimen no tiene nada que ver con la causa ocasional de la enfermedad, y en las agravaciones temporales que se presentan, se podrá suavizar el rigor de la dieta. Pero ante todo, *debe proporcionarse á la constitucion del enfermo. Es preciso rehusar al hombre enfermo lo que no soportaria estando sano. Sin embargo, si el enfermo experimentase un deseo irresistible por un alimento, una bebida cualquiera, debe satisfacerse en lo que sea posible, aunque prudentemente, ese instinto natural. En general, nunca debe obligarse á un enfermo á tomar un alimento que le repugne.*

Reglas generales de dietética durante el tratamiento homeopático.

Alimentos prohibidos: el café, el té, el vino y demas bebidas alcohólicas, todo alimento ácido, muy salado ó grasiento, toda clase de especia fuerte y hierbas aromáticas.

Alimentos permitidos: todos los alimentos ordinarios, el café homeopático de salud, el cacao, el chocolate sin canela y la buena cerveza. El que no pueda abstenerse del café, té, vino, etc., debe usarlos muy sobriamente, y tomarlos con mucha mas agua ó leche que de ordinario.

Cosas totalmente prohibidas: el uso simultáneo que se haga de otros medicamentos y aguas minerales; todos los polvos y aguas dentrificas, todos los olores fuertes de tocador y toda clase de esencias.

Está probado que los mejores polvos dentrificos, son los del Dr. W. Schwabe. Toda persona que quiera usar una agua dentrificica, debe tomar el ácido láctico puro (recomendado por Hering y Jahr); se pone una gota en soo de alcohol: se vende en la farmacia homeopática del Dr. W. Schwabe.

Sintomas característicos generales

de los medicamentos homeopáticos mas usuales.

Los mejores médicos homeópatas, apoyados en la experiencia, dicen que las circunstancias que se relacionan con las diversas épocas del día, y aquellas especialmente que se refieren á la moral, y por las que tambien se aumentan ó disminuyen los dolores, constituyen indicaciones muy importantes para la eleccion de los medicamentos. Siendo de la misma opinion, vamos á indicar en los medicamentos mas usuales las circunstancias principales que agravan ó disminuyen la enfermedad.

Abreviaturas de nombres propios.

B. = de Boenninghansen.

G. = Guernsey, de Filadelfia.

Hg. = Hering, de Filadelfia.

J. = Jahr, de Paris.

L. = Lippe, de Filadelfia.

N. = Nuñez, de Madrid.

R. = Raue, de Filadelfia.

* 1. Aconitum.

Medicamento principal al principio de todas las enfermedades inflamatorias y acompañadas de fiebre, con escalofríos seguidos de calor seco y urente, fuerte sed, agitacion, impaciencia, miedo y deseo de desnudarse. El acónito es tan bien bueno en los casos siguientes: Sudor continuo general, pero sobre todo de las partes cubiertas. — Temor

y aversion á las reuniones numerosas. (G.) — *Sensacion de angustia* (en las mugeres embarazadas).

Cólera, acompañado sobre todo de miedo. *Enfriamiento durante un tiempo seco* (ó por corrientes de aire), particularmente en invierno bajó la influencia de los vientos del Este y Norte.

Los sufrimientos que el aconito calma, se agravan ordinariamente durante la noche, sobre todo á media noche, cuando se vuelve en la cama ó se levanta, cuando respira fuertemente, ó se acuesta sobre el lado (dolorido).

Dosis: 4 ó 6 glóbulos ó una gota, disueltos en ocho ó diez cucharadas de agua, administrándose segun la gravedad del caso, una cucharada cada dos, tres ó cuatro horas (á los niños se les dará con cuchara pequeña, de las de café).

Antidotos: el vino y los ácidos vegetales. Despues de aconito se da á voluntad: *Arn., bell., bry., cham., merc., nux vom., rhus, sep., sulph.*

Nota. Todos los medicamentos que tienen afinidades entre si, se dan perfectamente uno despues de otro, y pueden administrarse como antidotos, contra los efectos primitivos demasiado fuertes de las dosis homeopáticas, cuando los sintomas no se opongán.

2. *Aethusa Cynapium.*

Medicamento recomendado principalmente contra los vómitos de leche de los niños; y contra la oftalmia de los recién nacidos.

Antidotos: los ácidos vegetales.

3. *Alumina.*

Está recomendado el *Aluminium met.* en la tabes dorsal (B.). Además, *alumina* se ha mostrado muy eficaz en los cólicos de plomo y en la astriccion de vientre.

Antidotos: *Bryon., cham., ipec.*

4. Ammonium carbonicum.

Recomendado en la difteria (R.), en la escarlatina (L.), y en el constipado crónico (Compárese: Constipado).

Antídotos: Arn., camph., hepar, ó calc., phos.

5. Antimonium crudum.

Desarreglos del estómago y diversas afecciones de la piel.

Agravaciones: con el vino ágrico (ó el vinagre); despues de haberse bañado o lavado; al calor del sol, ó despues de haberse calentado demasiado en la habitacion ó al aire libre.

* 6. Apis mellífica.

El veneno de las abejas es un *medicamento importante* en diversas afecciones del tegumento cutáneo, con inflamacion y dolores urentes y lancinantes.

Agravacion: por la tarde y noche (diarrea por la mañana); con el calor, sobre todo el de la habitacion.

Alivio: el dolor de cabeza disminuye si se tiene la cabeza oprimida.

7. Argentum nitricum.

Los médicos alópatas usan frecuentemente el nitrato de plata como caústico. Si antes del tratamiento homeopático ha abusado el enfermo de este medicamento, será necesario antidotarlo, antes de emplear los preparados homeopáticos. El antídoto por excelencia, en este caso, es *natrum muriaticum*.

* 8. Arnica montana.

Medicamento principal en todas las afecciones ocasionadas por lesiones mecánicas, caídas, golpes, conmociones ó contusiones.

El arnica está sobre todo indicada en los casos de

caídas, golpes, conmociones en donde hay un *derrame de sangre*, sea en las partes externas, sea en los órganos internos. También lo está en los casos de rozaduras, grietas de los pechos, forúnculos (cuando son pequeños y muy dolorosos). Después de las operaciones quirúrgicas y partos laboriosos. Entre los dolores que indican el arnica como medicamento, se encuentran, la *sensación que se experimenta de ser hecho pedazos*; lo cual sucede después de una contusión; ó la de *torcedura, magullamiento y hormigueo* en las partes enfermas. Es pues el arnica un remedio específico para este clase de padecimientos.

Los padecimientos en que está indicado el arnica se *agranan generalmente desde la tarde á media noche*, con el cansancio del *cuerpo y espíritu*, con el *movimiento, el ruido*, con una respiración fuerte, *al sonarse*, etc. (en los niños después de haber gritado y llorado). Los dolores son frecuentemente tan violentos, que el enfermo se pone casi loco; rasca, por ejemplo, la pared ó su cama, ó se entrega á otros actos irrazonables (G.); ó bien el enfermo trata de buscar otra posición, apesar de los dolores que siente en la parte enferma, porque le parece que su cama es muy dura (Hg.). Los dolores cambian con frecuencia de sitio, dirigiéndose rápidamente á otro sitio, ó á otro órgano del cuerpo.

Modo de usarlo: en las lesiones externas se usa la tintura de arnica, poniendo ocho ó diez gotas en un vaso de agua fresca; se agita bien la mezcla, y luego se empanan en ella compresas, con las que se cubren las partes enfermas. Como la piel es muy sensible y tierna, es preciso no emplear la tintura pura, porque se corre el riesgo de provocar inflamaciones erisipelatosas, sobre todo cuando hay heridas abiertas, ó partes desprovistas de piel.

Dosis: de 4 á 6 glóbulos, ó una gota, disueltos en medio vaso de agua, para tomar una cucharada cada 2, 3, 4, 6 ó 12 horas. En las inflamaciones acompañadas de mucha fiebre, se darán antes algunas dosis de aco-

nito, hasta que la inflamacion y la fiebre hayan perdido su intensidad.

Antidotos: *Camph.*, *ignat.*, *coccul.* (El vino agrava los sufrimentos). Se pueden dar antes ó despues de arnica: *Acon.*, *ars.*, *china*, *ignat.*, *ipec.*, *puls.*, *sulph. ac.*

*9. Arsenicum album.

Este medicamento heroico está indicado raras veces al principio de las enfermedades agudas; sino mas bien en los casos descuidados, en donde se teme una terminacion funesta, y en las enfermedades crónicas.

Los sintomas característicos para el empleo de este medicamento, son: *Dolores urentes* muy intensos, semejantes á los que producirian carbones ardientes ó el fuego. (Todas las secreciones son acres y urentes; las erupciones y las úlceras van ordinariamente acompañadas de los mismos dolores.)

Ansiedad é inquietud escesivas; el enfermo tiene la *sensacion de estar en la agonía* ó de haber cometido un crimen (Palpitaciones, vómitos, dolores de estómago, etc.).

Gran debilidad, cansancio, caída súbita de las fuerzas; colapso; y frecuentemente gran demacracion, cara hundida (cara hipocrática).

Gran sed: el enfermo pide de beber con frecuencia, pero bebe poco de cada vez, porque mucha agua le causa malestar (Vómitos, dolores de estómago, frio).

Los sintomas que exigen arsénico, *aumentan por la noche*, *poco despues de media noche*, y *durante el reposo*, sobre todo despues de un movimiento prévio; *el calor exterior y el movimiento* los calman.

Dosis: es preciso esperar siempre todo lo posible los efectos de las dosis, es decir, todo el tiempo que dure un alivio evidente; no se pueden repetir las dosis sino despues de algunas horas, y eso en los casos graves.

Antidotos: despues del uso de las fuertes dosis alopáticas, el oxido de hierro hidratado; contra dosis escesivas homeopáticas: *Ipec.* ó *chin.*, ó bien: *Ferr.*, *hep.*, *lyc.*, *merc.*, *nux v.*, *sulph.*

* 10. Aurum metallicum.

Diferentes enfermedades mentales, sobre todo las que predisponen al suicidio; enfermedades sifilíticas, de los huesos, complicadas con el uso del mercurio (ozena sifilítico); palpitaciones de corazón con congestiones.

Agravacion: por la mañana; enfriándose; durante el reposo.

Alivio: con el movimiento, andando y calentándose.

11. Baryta carbonica.

Este medicamento conviene á las personas de edad, así como á los niños enfermizos, mal alimentados (atrofiados), y á las personas que á consecuencia de un enfriamiento, se ven facilmente atacadas de una angina con infarto y supuracion de las amígdalas.

Agravacion: estando de pié ó acostado sobre el lado dolorido; pensando en la enfermedad que se padece.

Alivio: paseándose por la calle ó el campo.

* 12. Belladonna.

La belladona conviene especialmente á los *enfermos de constitucion sanguínea*, á quienes se les arrebatá pronto la sangre á la cabeza; en los dolores de cabeza que hacen creer que el cráneo va á estallar; cuando los ojos centellean, salen de sus órbitas, y la mirada es fija y feroz; en las pulsaciones de las carótidas visibles y sensibles. Se emplea cuando, á consecuencia de congestiones sanguíneas cerebrales, sobrevienen *graves delirios, furor ó una rabia* que lleva al enfermo á morder, pegar y desgarrar todo; cuando, á consecuencia de la misma causa, se presentan *calambres ó convulsiones* que se renuevan facilmente con el mas *leve tacto*, ó por una *luz demasiado viva*.

Segun Guernsey, se nota en todas las enfermedades que exigen *bell.*, cierta precipitacion en los movimientos y actos del enfermo; los dolores se presentan y desaparecen repentinamente. Los niños por ejemplo, se ponen

á gritar de repente, sin que se sepa porque, y cesan en sus gritos instantáneamente (G.). El Dr. Nuñez dice, que en las enfermedades inflamatorias en que está indicada, los síntomas nerviosos predominan sobre los inflamatorios (N.).

La *bell.* se emplea especialmente en los casos siguientes: Afecciones de la matriz de diferentes clases, acompañadas de presión sobre los órganos genitales, como si todo fuera á salir por abajo; dolores dorsales como si la espalda fuera á romperse; neuralgias que provienen de congestiones, sobre todo en el lado derecho, fuerte enfriamiento, principalmente de la cabeza (después de cortarse el pelo), *grande sensibilidad á las corrientes del aire.* (Por esto, al usar la *bell.* es menester preservarse cuidadosamente de todo enfriamiento y corriente de aire.)

Estas enfermedades se agravan ordinariamente por la tarde (á las tres), y *después de media noche*, con el movimiento y el contacto, con las bebidas, el viento y las corrientes de aire, la luz viva y objetos brillantes. Se alivian con el reposo.

Modo de usarla: en las enfermedades agudas, cada tres ó cuatro horas, y en las crónicas, una, dos ó tres veces al día, ó cada segundo ó mas días de una sola vez.

Dosis: de cuatro á seis glóbulos, ó una gota, disueltos en agua y administrados á cucharadas.

Antídotos: el café y el vino (el vinagre agrava los síntomas); ó bien: *Acon.*, *calc.*, *hep.*, *hyosc.*, *laches.*, *nux v.*, *puls.*, *sep.*, que (como todos los antídotos), se emplean ventajosamente después de *bell.*

13. Borax (Natrium boracicum).

Es un medicamento que es preciso tenerlo muy en cuenta para las enfermedades de los niños.

Agravación: con el tiempo frío y húmedo. Bajando (una montaña) en coche. Comiendo fruta. Después de las reglas.

Antídotos: *Cham.*, *coff.*, ó *calc.*, *silic.*

* 14. *Bryonia alba.*

Medicamento indispensable en las afecciones inflamatorias de las membranas serosas y fibrosas. — Medicamento principal en el *reumatismo agudo* con hinchazon y rubicundez erisipelatosa de las articulaciones. — Pleuresia. Inflamacion del higado — Catarro pulmonar. — Sarampion dificil de brotar.

Agravacion: por la tarde y noche (despues de las nueve). *Con el mas leve movimiento.* Comiendo ó bebiendo; respirando fuertemente. Cuando se sienta en la cama sobrevienen náuseas y congojas.

Alivio: con el reposo. — Acostándose del lado dolorido.

Antidotos: *Acon., cham., ign., nux v., rhus t.*

* 15. *Calcarea carbonica.*

Medicamento principal en el *raquitismo*, en las diversas *enfermedades de las glándulas y la piel.* *Calc.* conviene sobre todo á las personas de una *constitucion linfática;* á las *mujeres cuya menstruacion es demasiado frecuente, abundante y de larga duracion;* asi como á los niños escrofulosos y propensos á la hinchazon de las glándulas, á las erupciones húmedas y al raquitismo, asi como á padecer lombrices; estos niños tienen ordinariamente la denticion retrasada y dificil, y tardan mucho en andar; las fontanelas tardan mucho tiempo en cerrarse.

Segun Guernsey, *calc. carb.* está indicada cuando la *cabeza de los niños suda de tal modo durante la noche, que la almohada se empapa en sudor.* Segun Hering, cuando los niños se rascan fuertemente la cabeza al despertar.

Los síntomas *se agravan* sobre todo con los *trabajos que se hacen en el agua, en la legia ó colada, con un tiempo húmedo,* asi como por la mañana despues de despertar (en ayunas), con los trabajos intelectuales, cuando se llevan vestidos demasiado pesados, ó cuando se dejan inclinadas las partes enfermas.

Se alivian: despues de desayunarse, de levantarse, soltando los vestidos (muy apretados), y manteniendo los miembros enfermos elevados y aproximados al cuerpo.

Antidotos: *Camph.*, *nitr.*, *spir. nitr. dulc.*, *sulph.* Antes y despues de *calc.* se da á voluntad: *Bell.*, *ipec.*, *lyc.*, *nitr. ac.*, *nux v.*, *puls.*, *sil.*, *sulph.*

NB. *Calc. carb.* es un medicamento cuyos efectos son muy lentos; por esto es preciso esperarlos el mayor tiempo posible. Aun cuando *calc.* produzca excelentes efectos, no se aconseja repetirla, aun despues de semanas y meses, sin haber intercalado antes otros medicamentos.

16. Camphora.

El alcanfor merece ser mencionado sobre todo, porque disminuye ó anula los efectos de la mayor parte de los medicamentos del reino vegetal; por esto se le emplea con frecuencia como antidoto; es el antidoto principal del envenenamiento por las cantáridas (*Comp.*: *Orinas*).

Hahnemann, es el primero que lo recomendó para el cólera.

Antidotos: *op.*, *spir. nitr. dulcis.* — El café y el vino aumentan sus virtudes.

17. Cantharis.

Hé aquí un medicamento que se emplea con frecuencia por los médicos alópatas como vegigatorio. Con bastante frecuencia, aun empleándolo exteriormente, produce sintomas de una irritacion inflamatoria en las vias urinarias, tales como miccion dolorosa, miccion de sangre, de — seo continuo é inutil de orinar, etc. Asi es, que si un enfermo tiene tales sufrimientos, es menester investigar ante todo, si ha hecho uso de vegigatorios (ú otros medicamentos que hayan irritado las vias urinarias). En este caso se recomiendan como *antidotos*: *Camph.*, ó *acon.*, *pulsat.*, etc.

18. Capsicum.

El pimiento conviene principalmente á las personas que tienen un temperamento flemático, como á las que son muy sensibles al aire fresco (sobre todo á las corrientes de aire).

Los síntomas que indican especialmente *capsicum*, son: nostalgia ó amor al país, con rubicundez de las mejillas. — Fiebre intermitente. — Cólicos flatulentos con respiración difícil. — Disenteria, con deposiciones sanguinolentas y mucosas con tenesmo. — Diarrea nocturna con ardor en el ano. — Hemorroides (que sangran y acusan quemazon). Gonorrea con flujo blanco como la leche, etc.

Agravacion: despues de haber bebido y comido. Al principio de cada movimiento.

Alivio: con el movimiento continuo.

Antidotos: *Camph.*, *sulph.*

19. Carbo vegetabilis.

Medicamento indispensable en varias enfermedades, cuando hay falta completa de la fuerza de reaccion con síntomas de parálisis pulmonar y aliento frío, ó con síntomas de disolucion de la sangre.

Agravacion: desde la tarde hasta media noche; con el movimiento; enfriándose; pasando del calor al frío. — Al aire frío y húmedo.

20. Causticum.

Conviene especialmente á las personas cuyos cabellos son negros y duros (en oposicion á *calc. carb.*). Parálisis, retracciones de las aponeurosis, epilepsia y reumatismo crónico.

Agravacion: desde el oscurecer (hasta media noche). Enfriándose (sobre todo con el frío seco), con las corrientes de aire.

Alivio: con el calor de la cama (reumatismo). Con

un trago de agua fria (dolores de estómago y neurálgicos).

21. Ceba.

El Dr. Hering es el primero que ha experimentado este medicamento. Ha visto que es muy eficaz en los sufrimientos catarrales y gástricos, sobre todo si los últimos van acompañados de flatos (*Comp.*: constipado y cólicos).

* 22. Chamomilla vulgaris.

Medicamento principal en los niños y mugeres cuyo sistema nervioso está sobrescitado.

Cham. conviene sobre todo á los enfermos que, acometidos de insoportables dolores, gimen, gritan, se retuercen en la cama ó corren como fuera de sí, á través de la habitacion; tambien á los enfermos en quienes principia la dolencia con dolores, sintomas de debilidad y desfallecimiento. El enfermo está de ordinario tan impaciente é irritable, que le es difícil dar, aun al médico, una respuesta conveniente. (G.) *Los niños gritan continuamente, y no se les puede callar mas que pasándolos.* — Hay otras indicaciones, como son: *transpiracion caliente en los cabellos y frente, y rubicundez en la megilla de un solo lado; aversion á la música.*

Los sufrimientos que corresponden á *cham.* aumentan ordinariamente por la noche, con el mal humor y la cólera, cuando se come, toma café, habla, y cuando el tiempo está frio y sobre todo ventoso. Disminuyen estando en ayunas, dejando inclinada la cabeza y despues de sudar.

Antídotos: Acon., coec., coff., ign., nux v., puls. Antes ó despues de *cham.* convienen: *Ars., bell., chin., cina, ipec., rheum y sulph.*

* 23. China.

Medicamento principal en los estados de debilidad y agotamiento de fuerzas; despues de enfermedades graves,

de grandes pérdidas de sangre, sudores ó diarreas, sangrias y cualquiera otra causa debilitante. Está indicado en los casos de debilidad y sobrecitacion del *sistema nervioso* á con — secuencia de pérdidas de humores, y en los dolores en que el mas ligero contracto los provoca y aumenta; conviene á las personas que sudan muy facilmente, y en los casos de cólicos flatulentos, sobra todo cuando estos cólicos no disminuyen, aun cuando los gases salgan por arriba ó abajo. (G.)

Los sintomas se agravan durante la noche, á cada corriente de aire, bebiendo (especialmente leche), con el tacto mas leve (mientras que disminuyen frecuentemente con una fuerte presion).

Los medicamentos principales contra el abuso tan frecuente de las grandes dosis (alopáticas de quinina ó de quina) son: *Ars.*, *carb. veg.*, *ipéc.*, *natr. m.*, *puls.*; ademas: *apis*, *arn.*, *bell.*, *calc.*, *cina*, *ferr.*, *lach.*, *phosph. ac.*, *sep.*, *sulph.*, *veratr.*

Antes ó despues de *china* se puede dar: *arn.*, *ars.*, *bell.*, *carb. v.*, *ferr.*, *ipéc.*, *lach.*, *merc.*, *puls.*, *veratr.*

24. Cina.

Medicamento principal para los niños que sufren lombrices (comp.: enfermedades de los niños), y tos ferina ó coqueluche.

Agravacion: por la noche. Con la presion exterior y mirando muy fijamente.

25. Cocculus.

Este medicamento se asemeja mucho á *ignat.* y *nux v.*, pero conviene principalmente á las personas que tienen un temperamento flemático.

Agravacion: al aire libre (aun al aire caliente). Bebiendo y comiendo, yendo en carruage, durmiendo y hablando.

Antidotos: *camph.*, *nux v.*

*26. Coffea cruda.

Medicamento principal en la sobrecitacion del sistema nervioso, si no proviene del abuso del café. *Coff.* ha sido recomendado particularmente en las consecuencias funestas de una gran alegría, y si la sensibilidad (en las mugeres y niños) está tan sobrecitada, que los mas pequeños dolores ponen á los enfermos como locos (Comp. : enfermedades de los niños y dolores).

Despues del abuso del café conviene dar: *Cham., coloc., ign., nux v., puls.*

27. Colocynthis.

La coloquintida está indicada en diversas enfermedades muy dolorosas, como en las neuralgias y gota (Cólicos, ciática, neuralgia facial).

Agravacion: con la quietud y en la cama (Varios sintomas se aumentan tambien con el movimiento).

Alivio: con el movimiento; el café y el humo del tabaco alivian muchos sintomas, pero no calman todos.

28. Conium.

Conviene sobre todo á las personas ancianas, á las hipocondriacas, histéricas, á consecuencia excesos sexuales ó deseos contenidos. Se le emplea tambien en la induracion de las glándulas, consecuencia de lesiones mecánicas.

Agravacion: comiendo, estando de pié, estando acosado (tos), durante el reposo (sobre todo por la noche).

Alivio: con la obscuridad y el movimiento.

29. Crocus.

Conviene principalmente á las mugeres de humor caprichoso, en las que una alegría excesiva alterna con una profunda tristeza. Hemorragias de sangre negra, viscosa y coagulada.

Agravacion: por la mañana temprano (en ayunas), y en la habitacion.

30. Croton Tiglium.

Medicamento muy eficaz en ciertas diarreas violentas, especialmente cuando se declaran inmediatamente despues de haber comido y bebido. (Comp.: diarrea y sobreparto). Recomendado tambien muy eficazmente contra el eezema.

31. Cuprum.

(Hahnemann prefiere *cuprum metallicum*, otros médicos prefieren *cuprum aceticum*.)

El cobre tiene su importancia en diversas afecciones espasmódicas, si se presentan periódicamente y por grupos (Hahnemann). Además, este metal es un medicamento muy precioso en el cólera y en la *coqueluche* ó tos ferina.

Antídotos: Bell., chän., coccul., dulc., hep., ipec., merc., nux v.. ó puls., veratr.

32. Drosera rotundifolia.

Hahnemann fué el primero que empleó esta planta contra la *coqueluche*, y durante mucho tiempo la han considerado los médicos homeópatas y empleado, como remedio específico de esta enfermedad. Pero la experiencia nos ha enseñado que no hay medicamentos específicos contra los nombres de las enfermedades, y que en la *coqueluche*, como en cualquiera otra enfermedad (esporádica ó epidémica), es preciso estudiar cuidadosamente los sintomas de cada enfermedad, y de la epidemia reinante, para elegir bien los remedios eficaces. Sin embargo, *dros.* es siempre un medicamento que no se debe desdeñar, no solo en la *coqueluche*, sino tambien en otras afecciones de los órganos respiratorios, y sobre todo en la ronquera crónica, en la tos espasmódica despues del sarampion y en el crup.

Antídotos: Camph.. ó spong., veratr.

33. Dulcamara.

Medicamento importante en diversas afecciones dependientes de un enfriamiento, ó cuando despues de una erupcion repercutida, sobrevienen escreciones mucosas abundantes (Diarreas y vómitos mucosos, salivacion ó catarro de la vegiga).

Agravacion: durante la noche y el reposo: con el frio y la humedad: con las erupciones repercutidas.

Alivio: entregándose al movimiento y andando con aire caliente.

34. Euphrasia officinalis.

Medicamento que merece no ser olvidado en *diferentes afecciones de los ojos*, y el *coriza* ó constipado fluyente.

Antidotos: *camph.*, *puls.*

35. Ferrum metallicum.

El hierro es muy eficaz en los diversos sufrimientos causados por el abuso de la quinina, té y bebidas alcohólicas. — Debilidad general despues de pérdidas de humores. — Hidropesia.

Cuando un enfermo ha tomado hierro en exceso, en dosis alopáticas, dése: *puls.*, ó *china* ó *hepar, sulph.*

(*Puls.* ó *china* ó *hep.* están principalmente indicados en los casos en que el médico alópata haya abusado del hierro.)

Agravacion: á la noche (ó hacia el amanecer); en el reposo, especialmente estando sentado tranquilamente.

Alivio: con el movimiento suave.

36. Glonoin.

Excelente medicamento para las congestiones repentinias de la cabeza, pulmones y corazon. con grande aceleracion del pulso, pulsacion de las arterias, jaqueca. Se emplea tambien en las neuralgias dependientes de congestiones.

Los dolores de cabeza *aumentan* sacudiendo la cabeza, en-corbándose, subiendo una escalera; se *alivian* comprimiendo la cabeza, teniéndola descubierta, y paseándose al aire libre.

* 37. Hepar sulphuris.

Medicamento principal contra las malas consecuencias del abuso del mercurio y del yodo. Obra especialmente sobre la piel, sobre las membranas mucosas y las glándulas. — Súfrimientos escrofulosos. — Ulceras. — Ronquera crónica. — Tisis laringea.

Agravacion: desde el oscurecer hasta media noche. Exponiéndose al frío, enfriándose un miembro; bebiendo ó comiendo cosas frías. Con el viento frío (del este ó del norte). Echándose del lado dolorido, oprimiéndolo exteriormente, ó rozando las partes enfermas. Al deglutir. Durante el sueño.

Alivio: con el calor, y vistiéndose al lado del fuego.

38. Hyoscyamus.

El beleño se parece mucho á la belladona; es muy ventajoso en los casos en que belladona no produce efecto ó no hace mas que agravar la enfermedad; y tambien en los sufrimientos ocasionados por los celos.

Agravacion: por la noche, sobre todo despues de media noche. Guardando el reposo, y estando acostado (tos). — Comiendo y sobre todo bebiendo. — Con el tiempo frío y enfriándose. — Durante el sueño.

Alivio: bajándose (dolores de cabeza y pecho).

* 39. Ignatia amara.

Este medicamento conviene á las personas sensibles (principalmente á las mugeres), que tienen el *temperamento nervioso*, el *humor muy variable*, y que son *inclinadas á concentrar en si los pesares que experimentan*. Se le emplea sobre todo contra los sufrimientos que provienen de una *aficcion*, de un *pesar*, de un *amor desgraciado*,

contra la melancolia acompañada de muchos suspiros involuntarios, de una sensación de vacuidad y debilidad en el estómago, y de inclinación por la soledad.

Las convulsiones y calambres (histéricos y epilépticos), ocasionados por lo anteriormente dicho, son también característicos de *ignatia*.

Los síntomas *se-agravan* con el *café*, el *tabaco*, el *aguardiente*, *después de la comida*, *por la noche después de acostarse*, y *por la mañana después de despertar*; son *menos intensos* si se acuesta el enfermo de espaldas ó sobre el lado dolorido, y en general, si se cambia de posición.

Ignat. no produce efectos de larga duración; es bueno por lo tanto repetir con frecuencia las dosis, si la primera no ha sido bastante eficaz. Según Hahnemann, lo mejor es administrar *ignatia* por la mañana (*nux v.* por la noche).

Antídotos: *Arn.*, *camph.*, *cham.*, *coccul.*, *coff.*, *nux v.*, *puls.*, *zinc.*, que se pueden dar antes ó después de *ignatia*.

*40. Ipecacuanha.

La ipecacuana es muy estimada contra las malas consecuencias del abuso de la quinina y del opio. — Repugnancia á toda clase de alimento y náuseas continuas. — Sensación de debilidad. — Hemorragias, vómitos de alimentos, de bilis, de agua. — Dolores en el ombligo.

Este medicamento se emplea con grande éxito, principalmente en las enfermedades de las mugeres y niños.

(Agravación y alivio: no ofrecen nada de particular.)

41. Jodium.

Aunque el yodo (y sus preparados) son en general muy poco empleados, no podemos dejar de hablar de ellos; porque el médico homeópata tiene que tratar con

frecuencia enfermedades, contra las que desde hace bastante tiempo (al interior y al exterior) se ha hecho uso del yodo en dosis alopáticas. Tales enfermedades se curan difícilmente, porque las malas consecuencias del abuso del yodo ó de un envenenamiento por el mismo, no se tratan y combaten facilmente. Se han recomendado contra las malas consecuencias del abuso del yodo : *Hep. (B.)* ó *bell. ó phosph.*

NB. Algunos médicos homeópatas recomiendan mucho el yodo en la *pulmonia* (Kafka); así como en el *crup* avanzado.

42. Kali bichromicum.

El Dr. Lippe recomienda mucho este medicamento en el *sarampion*, cuando pedazos de moco endurecido, verde y nauseabundo salen de la nariz. — *Crup* ó *coqueluche*, con mucosidades viscosas: — Flujo por la nariz; dolores de cabeza, á consecuencia de la supresion de dicho flujo. — Sufrimientos causados por una indigestion, ó enfermedades de los bebedores. — Sífilis secundaria con úlceras en la faringe. — *Disenteria* con lengua rogiza, lisa ó resquebrajada.

Agravacion: con el frío. Al aire libre y frío.

Alivio: con el calor y con los eructos. Con el aire caliente.

43. Kalmia latifolia.

Medicamento nuevo que es muy eficaz en las enfermedades del corazon, que alternan con reumatismos ó que son su consecuencia. Los dolores reumáticos que exigen *Kalmia* afectan de preferencia el antebrazo y la pierna; se dirigen de arriba abajo, ó cambian rápidamente de sitio (*Puls.*).

44. Kreosotum.

Medicamento que se recomienda sobre todo en la denticion difícil de los niños (Teste). Además, contra

las flores blancas abundantes, debilitantes, ó malignas y corrosivas, que dependen de un cancer de la matriz.

45. Lachesis.

El Dr. Hering es el primero que ha experimentado este medicamento que es muy importante y eficaz. (Es preciso asegurarse bien de que su preparacion es la verdadera y segura). Muchas enfermedades epidémicas, tales como la difteria, la fiebre tifoidea, la fiebre intermitente, etc., encuentran en *lach.* su remedio específico, así como cierta clase de anginas, la supresion de las reglas, las palpitaciones de corazon, los sufrimientos de la edad critica en las mugeres, etc.

Agravacion: por la tarde ó periódicamente, p. e. cada quince dias, ó todas las primaveras. Despues del sueño. Despues de haber comido cosas ácidas ó haber bebido aguardiente.

Antidotos: *Ars.*, *bell.*, *carb. v.*, *hep.*, *merc.*, y *Apis* segun algunos. (Los ácidos y el vino.)

46. Lycopodium.

Este medicamento tan importante conviene á los niños (Vease: enfermedades de los niños) y personas de edad avanzada; se le administra con ventaja despues de *Calc. carb.* (ó *Bry.*, *op.* ó *puls.*). (Segun L. no conviene nunca empezar á tratar una enfermedad crónica con *Lyc.*)

Agravacion: desde las 4 á las ocho de la tarde. — Despues de haber comido; comiendo y bebiendo cosas frias; con las cataplasmas (calientes), con los vestidos pesados, con los olores fuertes, al orinar.

Alivio: enfriándose y descubriéndose, levantándose del asiento y paseándose, bebiendo y comiendo cosas calientes.

47. Magnesia muriatica.

Este medicamento, aunque bien experimentado, es

generalmente poco empleado. Sin embargo, debe mencionarse muy especialmente para los variados sufrimientos histéricos y la astringencia de vientre.

* 48. Mercurius.

Debe emplearse el mercurio con mucha circunspección. Si el enfermo ha hecho uso de él (en dosis alopáticas), es mejor empezar el tratamiento por un antidoto, como *hep.*, *chin.*, *lach*, *nitri ac.* etc. (Véase: abuso del mercurio.)

Agravación: por la noche. Con el calor de la cama. Al dormirse. Con la luz (de la vela), con el movimiento y el cansancio; al transpirar.

Alivio: por la mañana: conservando la quietud y estando acostado.

49. Mercurius sublimatus.

El mercurio sublimado corrosivo produce efectos mucho más intensos, que las demás preparaciones mercuriales. Se emplea principalmente en los casos más graves y dolorosos de *disenteria*.

50. Mezereum.

Este medicamento es muy ventajoso en diversas enfermedades de la piel (erupciones de la cabeza sobre todo), así como en las neuralgias de la cara, en los dolores de muelas, afecciones de los huesos producidas por el abuso del mercurio, en el flujo blanco rebelde, etc.

Antídotos: *Camph.*, *merc.*

51. Natrum muriaticum.

La sal que se emplea ordinariamente en la cocina, demuestra admirablemente que las atenuaciones homeopáticas pueden cambiar y aumentar la esfera de actividad y la virtud de los medicamentos, sobre todo de las sustancias minerales. En sus altas atenuaciones, produce

la sal los efectos mas innegables en las enfermedades (crónicas) mas variadas; especialmente en la fiebre intermitente, el *escorbuto*, la astriccion de vientre, los dolores de cabeza, etc.

Agravacion: durante la mañana (á las 10), por la noche, con el movimiento. Acostándose del lado izquierdo (palpitaciones de corazon). Hablando (debilidad). Leyendo ó escribiendo.

Alivio: en ayunas. Acostándose (del lado derecho ó de espaldas).

Antidotos: *Ars.*, *camph.*, *nitri ac.* ó *apis* (L.).

52. Nitri acidum.

El acido nítrico conviene á las personas de cabellos oscuros, de tez morena (pecas de color obscuro), con ojeras oscuras; — en los enfermos que han abusado del mercurio (sífilis secundaria).

Agravacion: por la tarde y noche. Al despertarse. levantándose despues de haber estado sentado, y tocando las partes enfermas.

Alivio: yendo en carruage, y eructando.

Antidotos: *Calc.*, *camph.*, *con.*, *hep.*, *mez.*, *petr.*, *sulph.*

53. Nux moschata.

La nuez moscada conviene sobre todo á las mugeres y niños, asi como á las personas cuya piel fria y seca es muy sensible al aire fresco. Está indicada en los casos en que los dolores van acompañados de sopor ó desmayos.

Agravacion: con el tiempo frio y húmedo. Acostándose sobre el lado dolorido, comiendo cosas frias, tomando bebidas alcohólicas, yendo en carruage, con el tiempo variable y tempestuoso.

Alivio: en la habitacion; al aire caliente, vistiéndose con ropa caliente.

* 54. Nux vomica.

La nuez vomica conviene principalmente á las *personas de temperamento vivo, bilioso, muy inclinadas á la cólera, que tienen los ojos y los cabellos negros, ó morenos* (y estatura alta, delgadas). Conviene tambien á las personas que comen y beben bien, que tienen una vida sedentaria, y como consecuencia, sugetas á afecciones hemorroidales, á la hipocondria y melancolia. Será util para las mugeres que tienen las reglas adelantadas y abundantes en demasía.

Agravacion: con el café, el tabaco y bebidas alcohólicas; con la vida sedentaria, los trabajos intelectuales, con el movimiento y el tacto mas pequeño (mientras que hay alivio con la presión fuerte).

Los síntomas se agravan de preferencia por la mañana temprano, despues de despertar, y despues de comer.

Nux v. es uno de los mejores antídotos de los venenos narcóticos; es muy util despues de los purgantes fuertes y en general despues de todos los medicamentos alopatícos dados con esceso (Hg., L.).

Antídotos: el alcanfor y el café, el vino y el alcohol; además: *Acon.*, *cham.*, *coccul.* y *puls.* Antes y despues de *nux v.* convienen sobre todo: *Ars.*, *bell.*, *calc.*, *ipéc.*, *lyc.*, *op.*, *phosph.*, *rhus* (y los antídotos espresados).

Desde las cinco de la tarde á las diez de la noche, es la época mejor para administrar este medicamento, cuando se da á dosis única.

55. Opium.

La alopatía emplea muy frecuentemente el opio como remedio calmante, soporífero y narcótico; tambien lo usa en los casos de diarrea y vómitos. En todas estas enfermedades (y principalmente en las enfermedades crónicas) nunca produce el opio una curación duradera;

por el contrario, las enfermedades crónicas se hacen mas rebeldes, y su curacion es mucho mas dificil.

En homeopatia se usa menos frecuentemente el opio. En los casos en que está indicado, es un medicamento muy eficaz é indispensable, y consigue un alivio pronto en los casos mas graves. Conviene especialmente en los casos siguientes :

Soñolencia con ronquidos y boca abierta (por ej., en un ataque de apoplejia, en las fiebres tifoideas, etc.), Astringencia de vientre rebelde, con excrementos que salen en forma de grandes bolas duras (Vólvulo ó miserere, y astringencia á causa de la intoxicacion por el plomo). Malas consecuencias de un susto. — Enfermedades de los viejos y bebedores. — Vómitos biliosos rebeldísimos. Falta de reaccion vital.

Si el enfermo ha abusado del opio en dosis alopáticas, dése: vino, café ó alcanfor; ó bien: *bell.*, *ipéc.*, *merc.*, *nux v.*, *plumb.*

La agravacion y el alivio no ofrecen nada de particular.

56. Phosphorus.

Este importante medicamento egeree una gran accion sobre el cuerpo humano; debe emplearse con circunspeccion, sobre todo cuando se trata de personas débiles y nerviosas. Conviene principalmente á las delgadas y demacradas (constitucion tísica).

Agravacion: por la tarde y noche, sobre todo antes de media noche; despues del desayuno, comiendo cosas calientes, con la soledad, al aire libre y frio, con el tiempo variable y tempestuoso.

Alivio: despues del sueño; comiendo y bebiendo frio; con la obscuridad.

*57. Phosphori acidum.

El acido forfórico es muy ventajoso contra las malas consecuencias de una inquietud, de un amor desgraciado;

en los casos de debilidad dependientes de una pérdida considerable de humores y de un crecimiento rápido en demasía; sobre todo en las personas de cabellos grises ó color de lino.

Agravacion: los dolores son ordinariamente mas fuertes en el reposo.

Alivio: con el movimiento, la presion (los dolores nocturnos).

58. Platina.

Medicamento indicado principalmente en las enfermedades de las mugeres, cuando las afecciones morales y fisicas alternan entre si; cuando las unas se manifiestan, las otras desaparecen (*y vice versa*). — Los dolores aumentan poco á poco y disminuyen lo mismo.

Agravacion: por la tarde; en la habitacion; durante el reposo.

Alivio: con el movimiento, al aire libre.

59. Plumbum metallicum (ó aceticum).

El plomo produce sintomas de envenenamiento muy particulares, que se caracterizan por una astriccion de vientre muy tenaz, y por violentos cólicos con fuerte contraccion del vientre.

En los casos en que semejantes sintomas se encuentran en un enfermo, sin ser ocasionados por una intoxicacion de plomo, este metal (*plumbum*) será un medicamento excelente. Ha sido tambien recomendado contra las parálisis de la lengua y faringe, y ultimamente contra la difteria. (Comp.: angina y astriccion de vientre).

60. Podophyllum peltatum.

Este medicamento es conocido desde hace mucho tiempo en la América del norte, y se da con gran exito en los casos de diarrea de cierta clase, caída del ano, asi como en diversas enfermedades de los niños.

* 61. Pulsatilla.

Este medicamento conviene principalmente à las personas de un caracter dulce y temperamento flemático, de ojos azules y cabellos rubios; à las mugeres que tienen las reglas tardías ó irregulares y escasas, acompañadas de calambres en el bajo vientre. Los sufrimientos van acompañados de escalofrios y falta de sed, de una gran inclinación à la tristeza y lágrimas, de tal suerte que el enfermo no puede contar sus males sin llorar: (G.) tales son los sintomas principales que exigen *pulsat.*; añádase à ellos una disposición à la diarrea con deposiciones mucosas.

Agravacion: por la tarde y antes de media noche. Con el calor, especialmente el de estufa, con los alimentos grasientos, confituras, frutas y helados; guardando quietud, acostándose del lado (no dolorido), y si se tiene la cabeza baja.

Alivio: al aire libre, y fresco: con el movimiento moderado y si se acuesta del lado dolorido.

Antidotos: el café y el vinagre; además: *cham.*, *ign.*, *nux v.* Antes ó despues de *puls.* dénse: *bell.*, *bry.*, *canth.*, *graph.*, *cupr.*, *kali bich.*, *lach.*, *lyc.*, *natr. c.*, *natr. m.*, *sep.*, *sulph.* y *sulph. ac.*

62. Rheum.

El ruibarbo se prescribe principalmente en las diarreas de los niños pequeños, cuando las deposiciones despiden un olor agrio.

Antidotos: *bell.*, *cham.*, *coloc.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*

63. Rhododendron.

Dolores reumáticos y gotosos, sobre todo en el periostio de las extremidades.

Agravacion: por la mañana temprano; durante el reposo y la tempestad; con el tiempo húmedo y frio.

* 64. Rhus toxicodendron.

Obra sobre todo en las *partes tendinosas y fibrosas del cuerpo*, y en la *piel*.

Este medicamento se ha mostrado muy eficaz en las consecuencias de un *enfriamiento* ocasionado por *baños frios*, ó bien cuando uno *se ha mojado por completo* y mucho mas *si el cuerpo estaba sudando*. Se administrará tambien con gran ventaja en las malas consecuencias de una *derrengadura*, *lujacion*, *esfuerzo*, etc., y en las de un gran cansancio, en las *inflamaciones erisipelatosas de la piel con vesículas* — (Erisipela vesiculosa).

Se emplea principalmente *rhus*. en los casos siguientes: *Dolores semejantes á los causados por lujaciones* (especialmente en las articulaciones); *sensacion de insensibilidad ó parálisis* en los miembros, ó *sensacion de dislaceracion de las carnes*, como si se las desprendiese de los *huesos*. En las enfermedades de la piel se advierte un *ardor*, un *picor*, un *escozor* y *areola inflamatoria*, que rodea cada parte de la erupcion.

Agravacion: á la *noche*, sobre todo *despues de media noche*. En el *reposo*, lo que hace que los enfermos no hagan mas que dar vueltas en la cama. — *Enfriándose*, lo que hace que los enfermos se envuelvan y cubran cuidadosamente. — *Antes de una tempestad*.

Alivio: con el *movimiento dulce y continuo* (cuando se levanta de su asiento los primeros movimientos son muy dolorosos). Con el *calor exterior*, ó el de la cama (tambien con este suele haber *agravacion*), *despues de haber sudado*.

Antidotos: el *alcanfor* y el *café*. — *Bry., bell.* (Hg.)
Antes ó despues de *rhus* dénse: *acon., ars., bry., nux v., sep.*

65. Ruta.

La ruda presta buenos servicios cuando la vista está debilitada por trabajos excesivos de los ojos; así

como en las contusiones y lesiones de los huesos y periostio.

Antidotos: Camph.

66. Sabina.

Medicamento muy importante en las hemorragias de la matriz, sobre todo despues de un aborto.

La sabina está recomendada como medicamento principal para impedir el aborto, sobre todo cuando los abortos tienen lugar en el tercer mes del embarazo. Está ademas recomendada como remedio especifico en la gota y podagra.

67. Sambucus.

Este medicamento se emplea principalmente contra una especie de asma (asma Miliar) y los sudores extraordinariamente abundantes y aun los colicuativos.

Antidotos: ars., camph.

68. Secale cornutum.

La alopatia se sirve del cornezuelo para apresurar los dolores del parto. En homeopatia es un medicamento importante en las hemorragias de la matriz de las mugeres caquécticas (G.). Ademas merece una atencion especial en ciertas parálisis y en la gangrena de las extremidades inferiores (gangrena senil), en las reglas acompañadas de calambres, en la diarrea, el cólera, etc.

Agravacion: con el movimiento, el tacto, el calor, el calor de la cama.

Alivio: con el aire fresco ó tomando un refresco; frotando y estirando las estremidades, estando de pie.

Antidotos: camph., op. ó ars., bell., coloc.

* 69. Sepia.

Medicamento importante y muy empleado, sobre todo en las enfermedades de las mugeres con congestion san-

guinea en los órganos del bajo vientre; en las mugeres que han parido mucho y tienen el vientre muy abultado, y para evitar los abortos en cualquiera época del embarazo, y en las mugeres en que el aborto es ya, puede decirse, una costumbre. Se administra especialmente á las de colores vivos, pero que cambian rápidamente de color; tambien á las de manchas amarillas ó morenas en la cara; y cuyos ojos, boca y nariz, estan rodeadas de un círculo amarillo. En las enfermedades de la piel.

Agravacion: por la mañana y la tarde durante el reposo.

Alivio: con un fuerte ejercicio (escepto la equitacion).

* 70. Silicea.

Medicamento principal en todas las enfermedades de los huesos, sobre todo si hay ulceras fistulosas. Ulceras atónicas con carnosidades. El Dr. Goullon prefiere este medicamento á todos los demas para activar la supuracion de los tumores ó abscesos, su abertura espontánea y curacion. La experiencia ha comprobado la práctica del Dr. Goullon. No es menos ventajoso á los niños escrofulosos, en los dolores de muelas, y en los ocasionados por las lombrices en niños flacos, descoloridos y con recargos febriles, y los de una mala vacunacion.

Agravacion: por la noche; al aire libre; con el frio ó un enfriamiento (sobre todo de la cabeza y pies). Comiendo y bebiendo cosas frias, ó comiendo con precipitacion. Con el uso del vino, la presion exterior, acostándose del lado dolorido. Cuando la luna está en su primer cuarto (ó en luna llena), y cuando el tiempo está vario.

Alivio: con el calor, los vestidos calientes, en la habitacion.

* 71. Spigelia anthelmintica.

Medicamento indispensable en diversas neuralgias

(jaqueca, neuralgia facial); afecciones reumáticas (cuando el corazón está á la vez afectado); en las enfermedades del corazón; en las fiebres y cólicos con diarrea, frío y hambre canina, producidos por las lombrices.

Agravacion: lavándose, encorbándose, con la inspiracion, con el mas leve movimiento, el ruido, levantándose de su asiento, tocando las partes enfermas, y paseándose al aire libre.

72. Spongia marina tosta.

Crup. — Enfermedades de la laringe y tráquea. — Endocarditis.

Agravacion: al subir pendientes ó escaleras; fumando; en la habitacion.

Alivio: bajando pendientes ó escaleras, durante el reposo, en la posicion horizontal (á escepcion de los sufrimientos que proceden de la respiracion).

73. Stannum.

El estaño es muy ventajoso en la tos crónica con mucosidades abundantes y viscosas, asi como en ciertas afecciones abdominales de los niños, y en los padecimientos producidos por las lombrices.

Antidotos: puls. ó lach.

74. Staphysagria.

En las malas consecuencias de una contrariedad con despecho é indignacion de las pérdidas de líquidos (sobre todo del onanismo).

Agravacion y alivio: no ofrecen nada de particular.

75. Stramonium.

Este medicamento se parece mucho à bell. é hyoso.; es con frecuencia indispensable en diversas enfermedades del cerebro y del sistema nervioso. — (Delirio con flujo de palabras, mania, delirium tremens, etc.)

Agravacion: Despues del sueño (por la mañana al despertar), con el tacto, transpirando, mirando objetos brillantes, en la oscuridad, en la soledad.

Alivio: con la luz y la sociedad.

* 76. Sulphur.

Medicamento principal en todas las erupciones crónicas (especialmente las secas) de la piel. Sulphur está indicado en la sarna, así como en toda clase de erupción de la piel que ha desaparecido á beneficio de medicamentos externos; ó cuando las inflamaciones erisipelatosas, los forúnculos, panadizos, etc., se presentan con frecuencia, sobre todo cuando el comezon y demas sufrimientos *aumentan con el calor de la cama*. Pero cuando se ha abusado del azufre, sea interiormente, sea exteriormente, en dosis alopáticas, es preciso dar primero un antidoto (principalmente *mercurio*). Si se ha abusado del azufre y mercurio simultáneamente contra las erupciones de la piel, los medicamentos principales son (segun B.): *caust.* y *sep.* En los niños está indicado el azufre, cuando tienen mucho miedo de ser lavados, y cuando las deposiciones de vientre son tan ardientes, que excorían el ano.

El profesor Guernsey da las indicaciones siguientes para el empleo del azufre: ardores frecuentes en todo el cuerpo. Frio continuo en los pies, ó calor en la planta de los pies, tan fuerte, que es preciso sacarlos de la cama, ó ponerlos en un sitio fresco de la misma. Frecuentes accesos de debilidad, ó sensacion de desfallecimiento por la mañana á las 11 y media, de modo que el enfermo sufre mucho mientras llega la hora de comer ó almorzar. Sueño corto y ligero con despertar continuo durante la noche, ó sueño profundo y pesado toda la noche. Tos todas las tardes antes de empezar la menstruacion.

Es tambien un medicamento poderoso en la tabes mesentérica ó tisis del vientre, en el periodo de gravedad

de las fiebres tifoideas, en las fiebres lentas, verminosas, en la astricción de vientre, en las oftalmias crónicas con nubes y úlceras en la córnea, en el primer período de la tisis pulmonal, etc.: dándose generalmente de una vez (en seco sobre la lengua á los niños pequeños), disuelta una dosis de seis glóbulos en dos cucharadas de agua, empleando de preferencia las atenuaciones altísimas, ó la mas elevada de que se pueda disponer (N.).

Agravacion: principalmente por la noche ó despues de *media noche*, durante el *reposo*, al levantarse y con el calor de la cama; ó durante *la luna llena* y *al cambiar el tiempo*, sobre todo si el tiempo es húmedo y frio.

Se *alivian* con el calor, con el tiempo seco y el movimiento.

Antidotos: *acon.*, *camph.*, *cham.*, *chin.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *sep.* Antes ó despues del azufre convienen: *Antim. cr.*, *ars.*, *calc. c.*, *caust.*, *merc.*, *puls.*, *sep.*

77. Sulphuris acidum.

Este medicamento se emplea en los casos en que los dolores aumentan poco á poco y cesan repentinamente; en las mugeres que tienen llamaradas de calor durante su edad crítica; en las aftas de los niños, antes ó despues de *borax*; en las contusiones, golpes, caidas, etc., despues de *arnica*; en las diarreas crónicas, y en los casos en que la comida se agría, y suben eruptos agrios á la garganta, produciendo tos y ardor, y hasta dentera.

78. Tarantula hispanica.

Al Dr. Marques de Nuñez se debe la experimentacion y publicacion de la patogenesia de tan importante medicamento, muy eficaz en varias enfermedades, como son: la corea ó baile de San Vitó; las intermitentes de todos tipos, especialmente tercianas; ninfomania intensa; clorosis; cólicos menstruales; ciática; neuralgias, convulsiones, etc.

Toda forma convulsiva en que hay necesidad de moverse

continuamente, y la periodicidad en los padecimientos, indican la *tarantula*; y el espanto, el terror, el miedo á una muerte proxima, con vértigos y ansiedad precordial, la indican mucho mas.

Las enfermedades de caracter nervioso, asi como las de indole reumática propias de la *tarantula*, se *alivian* con el movimiento, el sudor y el aire libre, y se *agravan* con el reposo y en la cama; se *exasperan* con el tiempo frio y seco, y se *mejoran* con las lluvias. Las afecciones morales se *alivian con la música*, la distraccion y el aire de campo (N.).

Antidotos: el principal es *phosph.*, siéndolo ademas: *acon.*, *baryt. mur.*, *cupr.*, *lyc.*, *magn. c.*, *puls.*, *rhus.*, *spig.*, *sulph.*, *zinc.*

* 79. Thuja.

Segun el Dr. Wolf es el medicamento mas importante en la viruela, en todas las enfermedades que se presentan enseguida ó algun tiempo despues de la vacunacion, y en las sicósicas. La experiencia que se tiene de este medicamento demuestra, que muchas enfermedades crónicas y agudas, que hoy son muy comunes, provienen de una intoxicacion á consecuencia de la vacunacion obligatoria; y segun el Dr. Wolf, el virus de la viruela es idéntico al de la sicosis.

Entre las enfermedades agudas muy communes á consecuencia de la intoxicacion por la vacunacion, citaremos la coqueluche, el catarro, la gripe; ademas, la oftalmia llamada de Egipto y la de los recién nacidos; entre las enfermedades crónicas, la clorosis y diversas enfermedades de la matriz, las escrófulas, etc.

Agravacion: por la tarde y á la noche, ó á las 3 de la mañana y 3 de la tarde (por la mañana temprano es cuando la debilidad es mayor). Con el frío, la humedad y el calor de la cama.

Alivio: con vestidos calientes, eructando y con el constipado con estornudos.

*80. Veratrum album.

Medicamento muy importante en las enfermedades siguientes :

Colera y colerina. — Accesos de dolores que provocan delirios y una locura de corta duracion.— Diarreas. — Lombrices. — Fiebres lentas. — Coqueluche. — Intermitentes. — Diversas enfermedades con frio en la piel, sudores frios, especialmente en la frente, extremidades frias y grande postracion de fuerzas.

Agravacion : con el calor de la cama. Pasando del frio al calor. Con el cambio del tiempo; con el frio y la humedad. Bebiendo y comiendo cosas frias.

Alivio : levantandose y paseándose. (Los vómitos se agravan cuando se levanta.)

81. Zincum.

Es preciso tener en cuenta el zin, sobre todo en las enfermedades de las vias urinarias y los calculos nefríticos, asi como en las convulsiones, epilepsia y diversas afecciones histéricas.

Agravacion : despues de comer y por la noche.

Alivio : al aire libre; comiendo.

Antidotos : *camph.*, *hep.*, *ign.*, ó *arn.*, *baryt. c.*, *merc.* — *Zinc.* es el antidoto de *cham.* y *nux v.*, si estos medicamentos producen agitacion por las noches y astriccion de vientre.

P. S. Los medicamentos vegetales y minerales siguientes tienen, segun Hering, una gran afinidad entre si, y pueden, por decirlo asi, sustituirse. Asi, el medicamento mineral (que se puede sustituir) acabará frecuentemente la curacion, cuando el medicamento vegetal no produzca y a efecto alguno.

Aloë — *Sulphur*.
Cepa — *Phosphor*.
Squilla — *Antim. cr.*
Chamom — *Magnes. c.*
China — *Ferrum*.
Calad. — *Nitri ac.*
Dulc. — *Baryt.*
Mezer. — *Merc.*

Pulsat. — *Sulph. ac.*
Allium. sat. — *Arsen.*
Bellad. — *Calc. carb.*
Ruta. — *Calc. phos.*
Bryon. — *Alumin.*
Ipec. — *Cupr.*
Thuja. — *Silic.*
Lycop. — *Jod.*

Indicaciones clínicas.

Aborto.

(*Mal parto.*)

Cuando hay síntomas precursores de aborto, se recomendará el reposo absoluto y la abstención de toda excitación moral y bebidas escitantes. Para su tratamiento se elegirán principalmente los medicamentos siguientes: *Bell.*, *cham.*, *croc.*, *ipéc.*, *sep.*, *secal.*, *sabin.* (Compárese: *Hemorragias* y *Metrorragia.*) Fígrese especialmente la atención en las causas ocasionales y dénse:

Aconitum: si el accidente es la consecuencia de un susto, terror, miedo, etc.

Arnica: si ha sido provocado por una causa esterna, una caída, un golpe, una contusión, etc.

Chamomilla (*Nux vom.*): si depende de un acceso ó mas bien de una violenta incomodidad, riña, acaloramiento.

China: está indicado para las mugeres débiles y estenuadas por hemorragias abundantes.

Dulcamara: si un enfriamiento cogido en un sitio frio y húmedo es la causa probable del accidente.

Ignatia: si es consecuencia de una pena, tristeza, aflicción, ó de una cólera comprimida.

Rhus: en los casos en que han precedido esfuerzos corporales, tensiones demasiado violentas de los miembros y otros movimientos violentos (Así mismo se dará

Cinnamomum (canela) si un paso en falso ha sido la causa y producido una hemorragia de sangre rojo-clara.

Los medicamentos se administrarán segun la intensidad de los sintomas, de hora en hora, ó de dos en dos horas; desde que principie el alivio se aumentarán las distancias para dar el medicamento.

Para evitar con anticipacion el aborto en las mugeres predisuestas á él, y en las que se ha hecho una costumbre, dese bastante tiempo antes de la época acostumbrada y bastante despues:

Calcarea: en las mugeres pletóricas, de menstruacion muy abundante y adelantada, con disposicion al flujo blanco, congestiones frecuentes á la cabeza, y varices en las partes genitales.

Sabina: si el aborto se verifica en el tercero mes del embarazo. Este medicamento se dará cada quince dias, una dosis por la mañana, hora y media antes del desayuno, en dos cucharadas de agua, desde que principie el embarazo hasta pasado el cuarto mes del mismo.

Sepia: en las mugeres herpéticas, y en las que por causa ya conocida ó desconocida, se verifica el aborto en una época mas ó menos fija de sus embarazos. Este medicamento es el principal que hay que consultar y administrar en estos casos, y debe darse ya como el anterior dos ó mas meses antes de la época en que sobreviene el aborto acostumbrado, ó desde el principio del embarazo, en los casos en que se verifica aquel en los primeros meses de este. (Alvarez.)

Sulphur: en las mugeres en las que la predisposicion á los catarros, hemorroides y otros flujos mucosos, erupciones, y que tienen la menstruacion escasa, son causa del aborto.

. Absceso.

Véase: *Flemones*.

Aftas.

Esta enfermedad de la boca y fauces ataca principalmente á los niños, y exige: *Borax*, *merc.*, ó *nux vom.*, *sulph.*, *sulph. ac.* Véase: *Enfermedades de los niños.*

Alcanfor.

El envenenamiento por el alcanfor, caracterizado por la frialdad de la piel al tacto, afán del enfermo por descubrirse y no querer estar tapado con cubierta alguna, cara azulada y contraída, con aliento, deposiciones y orinas que exhalan un fuerte olor á alcanfor, se combate en los casos agudos y graves haciendo tomar al enfermo tazas de café negro hasta hacerle vomitar. Después se le dará *Opium* en disolución, una cucharada de dos en dos horas, ó á menos intervalos según la necesidad.

Para las consecuencias que á veces suelen quedar, como diarrea, síntomas catarrales, dése: *Dulcam.*, ó *ars.*, *veratr.*

Para los calambres en las pantorrillas, *ars.*, *veratr.*, ó *cupr.*

Para la ansiedad con insomnio: *Bell.*, ó *nux v.*

Angina.

(*Amigdalitis*, inflamación de las amígdalas, dolor de garganta, etc.)

Los medicamentos principales contra esta enfermedad tan frecuente y dolorosa, son:

Aconitum: cuando los síntomas fébriles, con sed, agitación, dolor de cabeza, etc., corresponden al aconito (Véase: *Síntomas característicos generales de los medicamentos*).

Apis: si el enfermo tiene calor sin sed; la lengua y la boca están calientes; la garganta seca; las amígdalas rojas é hinchadas; con ardor, picor y grietas. El en-

fermo no puede estar en una habitacion caliente. Si ha habido anteriormente urticaria con fiebre.

Belladonna: fuerte inflamacion de la garganta con coloracion rojo subida de las partes inflamadas; hinchazon exterior del cuello. El enfermo, al tragar, se ve acometido de calambres y espasmos en la garganta; lo que bebe sale por la nariz. Deseo continuo de tragar. Absceso en la garganta que sobreviene con rapidez y se estiende.

Bryonia: dolor de garganta despues de haber tomado una bebida helada, cuando el cuerpo estaba sofocado ó caliente.

Hepar sulph.: conviene despues de *mercurius* ó *belladonna* (N.), ó en los enfermos que han abusado del mercurio, y cuando hay, sequedad, sensacion de una clavija en la garganta, dolores punzantes como producidos por espinas, *especialmente al tragar, al toser*, al respirar y volver el cuello, y que se estienden á los oidos y glándulas cervicales; deglucion casi imposible, con temor de sofocacion.

Lachesis: si las amigdalas están hinchadas, sobre todo en el lado izquierdo. La garganta se resiente al mas ligero contacto. La deglucion de los liquidos es mucho mas difeíl que la de los sólidos y mas dolorosa. La inflamacion se muestra de preferencia en la úvula ó campanilla, ó bien es alli mas intensa. — Todos estos sintomas se agravan despues del sueño.

Mercurius: está indicado cuando la lengua muestra impresas las huellas de los dientes, y el enfermo tiene una salivacion abundante, con sensacion de un vapor caliente que sube al cuello. Dolor de garganta con abscesos dolorosos y que se forman lentamente. Anginas ulcerosas.

Rhus: dolores de garganta con muchos granos blanquizcos en las amigdalas. Dolores urentes y punzantes ó grietas en las partes enfermas, y á veces hinchazon edematosa del velo del paladar (como en la escarlatina, grippe, etc.). Dr. Dunham.

Si *mercur.* y *hep.* no apresuran la supuración de las amígdalas inflamadas, dése *silic.* de cuatro en cuatro horas.

Contra la predisposición á padecer anginas con frecuencia y con supuración, se recomiendan: *Baryt. c., graph., hep., lyc., sulph.*

Además de los síntomas antedichos, ténganse en cuenta las indicaciones siguientes:

Si la deglución calma los dolores, dése: *Ign., ó alum., caps., lach., nux v., puls.*

Si la deglución de la saliva es muy dolorosa: *Lach., ó baryt., bell., bry., cocc., hep., merc., nux v., puls., rhus., sulph.*

Si la deglución de los sólidos es dolorosa: *Hepar., sulph., ó cham., lach., merc.*

Si la deglución de los líquidos es dolorosa: *Bell., phosph., ó ign., merc.*

Si la deglución de los líquidos disminuye los dolores: *Alum., nux v.*

Si los calma la deglución de bebidas calientes: *Alum., nux v.*

Si los aumenta el hablar: *Acon., alum., baryt., bry., dulc., ign., merc., phos., rhus., sulph.*

Si los disminuye: *Hep.*

Angina lardácea.

Véase: *Difteria.*

Año.

Picor. — El picor en el ano proviene de las almorranas ó de las lombrices.

Prolapso. — (Caida del recto.) — En los casos agudos se dará: *Ignat.*, y si no bastase, *nux v.* En los casos crónicos: *Merc., muriat. acid., podoph., sep., sulph.*

La propensión á padecer esta enfermedad se quita con: *Ars., calc., lyc., ruta., sep., silic.*

Prurigo. — Esta erupción papulosa que suele pre-

sentarse en las márgenes del ano, y cuyo picor es intenso, se combate con: *Merc.*, *nitri ac.*, *sep.*, *sulph.*, *thuja*, *zinc.*

Apetito.

Falta de apetito. — Es la consecuencia por lo comun de un desarreglo de las vias digestivas. Si la *anorexia* está exempta de complicaciones, elijase entre: *China*, *nux v.*, *rhus.*, *sep.*, *silic.*, ó bien: *Antim.*, *ars.*, *arn.*, *calc.*, *ign.*, *merc.*, *puls.*, *sulph.*

Hambre canina. — El apetito excesivo ó hambre canina se corregirá con: *Calc.*, *china*, *cina*, *nux v.*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.* Si no se satisface pronto esta hambre en sus deseos excesivos, se cambia frecuentemente en una debilidad que puede llegar hasta la congoja. En este caso dése: *Calcarea*, *icd.*, *lyc.*, *silic* (B.).

El apetito con deseo ardiente de ciertos alimentos y ciertas bebidas, es un sintoma que nos guía con frecuencia muy utilmente en la eleccion de los medicamentos. Dése, en el caso de que haya deseo por la cerveza: *Acon.*, *bry.*, *merc.*, *nux v.*; por cosas amargas: *Natr. m.*; por el aguardiente: *Ars.*, *hep.*, *nux v.*, *op.*, *sep.*, *sulph.*; por alimentos grasos: *Nux v.*; por cosas dulces: *Chin.*; *rhus.*; por la leche: *Merc.*, *silic.*; por las frutas: *Veratr.*, *ign.*; por los alimentos salados: *Veratr.*, *thuja*; por los alimentos ácidos: *Veratr.*, *antim. cr.*, *arn.*, *ars.*, *bry.*, *cham.*, *hep.*, *phos.*, *sulph.*; por el vino: *sep.*, *sulph.*; por las ostras: *Lach.*; por la miel: *Sabad.*; por el queso: *Ign.*; por el pan duro: *Aur.*; por la manteca: *Merc.*; por los huevos: *Calc.*; por la carne salada: *Caust.*

La falta de apetito ó repugnancia á ciertos alimentos y bebidas que se apetecian mucho ó gustaban en el estado de salud, es tambien un precioso sintoma que nos servirá de guía en la eleccion de los medicamentos. Se da, en los casos en que hay repugnancia á la cerveza: *Nux v.* (*coccul.*); al aguardiente: *Ignat.*; al pan: *Natr. m.*, *nux v.*, *puls.*, *sep.*; á los alimentos grasos:

Petrol., *carb. v.*, *natr. mur.*, *puls.*; á la carne: *Calc.*, *carb.*, *rhus*, *sep.*, *sulph.*, *silic.*; al caldo: *Arn.*; al café: *Bry.*, *calc.*, *cham.*, *coff.*, *nux v.*, *phos.*; á la leche: *Bry.*, *calc.*, *puls.*, *sep.*, *silic.*; á las cosas dulces: *Sulph.*; al agua: *Bell.*, *nux v.*, *stram.*; al vino: *Merc.*

Boenninghausen suministra ademas las indicaciones siguientes: Repugnancia á la ternera: *Calc.*; á los huevos duros cocidos: *Bry.*; al repollo: *Helleb.*; al queso: *Oleand.*; á los arenques: *Phos.*; á la carne de vaca: *Merc.*

Apoplegia.

(*Derrame cerebral.* — *Derrame de sangre cerebral.* — *Hemorragia cerebral.*)

Los medicamentos principales contra esta enfermedad tan peligrosa, son: *Arn.*, *baryt. c.*, *bell.*, *lach.*, *nux v.*, *op.*, *puls.*

Arnica. — Pulso lleno y fuerte, sudores calientes, parálisis del lado viquierdo del cuerpo especialmente; pérdida del conocimiento, ronquidos, evacuacion involuntaria de orinas y escrementos, gemidos, espuma en la boca, y cuando el ataque ha sido á consecuencia de una caida, y se verifica en personas pletóricas.

Baryta carbonica. — Parálisis de la extremidad superior del lado derecho, y de la lengua especialmente, ya completa ó incompleta; soñolencia con ronquidos, y cara muy encendida con sudores muy calientes; evacuacion involuntaria de orinas, y cuando el ataque tiene lugar en personas flemáticas, obesas, que se mueven con lentitud y se duermen con facilidad en cualquiera parte.

Belladonna. — Sopor, pulsacion visible de las arterias del cuello y sienes; las venas de estos sitios estan muy dilatadas, parece se van á romper; pérdida del conocimiento y la palabra; boca paralizada de un lado; parálisis del lado derecho del cuerpo; deglucion difícil ó imposible; cara muy encarnada asi como los ojos; la

saliva fluye de la boca, es de un color verdoso ó azulado, y cae por la barba al cuello; las pupilas estan dilatadas, y el enfermo suspira y gime de vez en cuando.

Lachesis. — Cara azulada ó pálida; temblor de las extremidades con estremecimientos convulsivos; pulso debil y acelerado; parálisis del lado izquierdo del cuerpo; estreñimiento de vientre. Está indicado de preferencia en las mugeres.

Nux vomica. — Parálisis de las extremidades inferiores; boca abierta con la mandíbula inferior pendiente; vómitos y nauseas; ronquidos con salivacion; estreñimiento de vientre; sopor continuo.

Opium. — Mirada fija con ojos muy abiertos; ú ojos cerrados con sopor, ronquidos, cara encarnada, sudor en la cabeza, cara y cuello, salivacion blanquizca, pupilas insensibles y dilatadas; respiracion lenta, estertorosa, con espuma en la boca; tension tetánica de todo el cuerpo, ó bien temblor general; pulso lento, lleno y dilatado. Conviene especialmente á los viejos y bebedores, á los que llevan una vida sedentaria, tienen la cabeza muy grande y se duermen en todas partes, costando trabajo despertarles.

El *aconito* solo se emplea en casos muy raros, y cuando la enfermedad haya sido causada por una fuerte colera, por el miedo ó por una insolacion. Despues de *acon.*, debe darse *bell.*

Los medicamentos deben darse disueltos en agua, una cucharada de media en media hora, ó cada hora, hasta que se note alivio. La parálisis consecutiva á la conclusion del ataque, se domina poco á poco con *Arn.*, *baryt. c.*, *coccul.*, *bell.*, *nux v.*, *laches.*, *zinc.*, dados á dosis únicas, elevadas, y esperando con calma el desarrollo de su accion, sin cambiar con frecuencia de medicamento, cuya práctica es muy mala.

Las sangria es un procedimiento terapéutico de funesto resultados, teniendo entre otros el inconveniente de la necesidad de su repeticion, necesidad que conduce prontamente á la muerte. El tratamiento homeopático,

por el contrario, aun en los casos desesperados, es de una eficacia sorprendente. Entre otros casos citaré tres, de los asistidos por mi, muy graves; y en los que, apesar de los pronósticos funestos de los médicos alópatas, se verificó la curacion.

Arsenico.

Los medios que hay que emplear inmediatamente en un envenenamiento por el arsénico, son: hacer tomar al enfermo cualquiera de las sustancias siguientes: agua de jabon, clara de huevo disuelta en agua, agua azucarada, leche. Húyase siempre de dar vinagre y toda clase de aceites, por ser altamente perjudiciales. Tambien pueden darse limaduras de hierro si las hay á mano, para contrarrestar la accion del arsénico, y haecer que el hierro se combine en el estómago con el arsénico, però esto unicamente en los casos en que haga poco tiempo que se ha ingerido el veneno.

Cuando los sintomas alarmantes han disminuido, dése *ipecc.* Si este no acabase la curacion, dese: *veratr.*, sobre todo si hay náuseas frecuentes con vómitos y calor, frio general con gran debilidad y sed ardiente. *Nux v.*, si el enfermo se encuentra peor durante el dia, tiene una fuerte astriccion de vientre, ó pequeñas deposiciones mucosas y frecuentes, con pujo, lengua roja en los bordes y punta. *China*, si hay recargos febriles nocturnos, con gran debilidad, sudores, deseo de estar constantemente hechado, sueño agitado y mal humor. Si ninguno de los anteriores medicamentos, despues del uso de *ipecc.*, concluyese la curacion, dése: *Hepar*; ó bien: *Apis*, *cham.*, *ferr.*, *merc.*, *sulph.*

Las enfermedades de los ojos y erupciones en la frente que sobrevienen por llevar sombreros cuyo fieltro ha sido tratado con preparaciones arsenicales, se combaten con: *Hepar* en primer lugar, y si este no fuera suficiente, consúltese: *Apis*, *cham.*, *merc.*, *nux v.*, *sulph.*

Contra los accidentes producidos por el abuso del arsénico en dosis alopáticas, los medicamentos principales son: *Ipec.* y *nux v.*; ó *china*, *hepar*, *iod.*, *sulph.*, *veratr.*

Los accidentes que sobrevienen en los trabajadores que manejan preparaciones arsenicales, se tratan en primer lugar con: *Ipec.* y *china*; ó bien: *Cham.*, *hepar*, *iod.*, *merc.*, *veratr.*

Asfixia.

(*Muerte aparente.*)

En todos los casos de asfixia ó muerte aparente, se acudirá ante todo á los medios mecánicos; pero evítese siempre el acudir á las sangrias y demas evacuaciones sanguíneas, que solo causan perjuicios. Los medicamentos homeopáticos se administran en estos casos, sea poniendo los glóbulos sobre la lengua del enfermo, ó disueltos en agua y dados á cucharadas, ó en lavativas.

En la asfixia por una caída, debe darse *Arn.*, si el enfermo no ha sido sangrado. Si por desgracia lo ha sido, ó bien á perdido mucha sangre por consecuencia del golpe sufrido, se dará primero *China* y despues *Arn.* Se cuidará ademas de acostar al enfermo y mantenerle la cabeza elevada.

En la asfixia por congelacion, se colocará al enfermo entre paja ó estiercol, se le frotarán las sienes, palmas de las manos y plantas de los pies con pedazos de nieve, hielo, ó agua fria si no hubiera nieve ni hielo; se le envolverá en sabanas empapadas, en agua fria, dejando la cabeza sin cubrir, y se continuará con las frotaciones hasta que se le haga volver á la vida. Para combatir los sufrimientos consecutivos estan indicados *Ars.*, *Camph.*, *Carb. v.*, ó bien *Acon.* si sobreviene una fuerte reaccion con fiebre, y *Bry.*, si no bastara *Acon.* y se presentan dolores localizados ó generales.

En la asfixia producida por un rayo, se procurará colocar al enfermo medio sentado en un hoyo recién cavado, cubriendole con tierra todo el cuerpo escepto la

cabeza y cara que se le volverá hacia el sol, hasta que vuelva á la vida, y entre tanto se le dará *Nux v.*, que se continuará hasta que se encuentre bien. Si no fuera suficiente este medicamento, consúltense *Bellad.*, *Merc.* y *Puls.*

En la asfixia de los recién nacidos los principales medicamentos son *Tart. em., op.*, ó *acon.*, *china* é *ipec.*

Asfixia por sofocacion. — Puede tener lugar por el calor, estrangulacion, gases deletéreos y sumersion.

— *Por el calor.* — Se llevará al paciente á un sitio fresco, se le acostará con la cabeza elevada y se le darán friegas con paños mojados en agua fria, agua de colonia, alcohol ó aguardiente, se cepillan fuertemente los pies, la espalda y las manos y se insufla aire en los pulmones, hasta que se presente la reaccion. Para los sintomas consecutivos consúltense : *Acon.*, *bell.*, *camph.*, *glonoin.*, *hyosc.*

— *Por estrangulacion.* — Se acostará al ahorcado sobre el lado derecho del cuerpo, y en una habitacion bien caliente, ó por lo menos que no esté fria; se le darán friegas con cepillos fuertes, se titilarán las narices, se insuflará airé en los pulmones, aplicará amoniaco á la nariz y lavativas de sal disuelto en agua y unas gotas de vinagre, y se evitará cuidadosamente el fumar al lado del enfermo y hacerle beber forzosamente mientras tenga dificultad de tragar. El medicamento principal en estos casos es *Opium*, si no bastase, acúdase á *carb. veg.*, *acon.*, *laches.*

— *Por gases deletéreos.* — Esta asfixia la producen el carbon, la falta de aire respirable, los gases de las letrinas y alcantarillas, los vinos en fermentacion y los hornos de cal. Se sacará inmediatamente al enfermo al aire libre y fresco, dejandole bastante espacio en su derredor; se le pondrá la cabeza elevada, y se le darán friegas con agua avinagrada, agua de colonia, alcohol ó aguardiente; se secan las partes mojadas, y tres minutos despues se vuelven á dar las friegas; se cepillan fuertemente los pies, las manos y la espalda, y se

aplican, si es necesario, lavativas de agua con sal y unas gotas de vinagre; se titila la nariz y se la aplica amoniaco, y se insufla aire en los pulmones.

A los asfixiados en los pozos inmundos ó letrinas y al cantarillas, se les aplican los mismos medios que á los anteriores; si han tragado porqueria, se les promueve el vómito, se les seca perfectamente las partes mojadas por la porqueria y se les hace respirar cloro, pero que no sea en exceso.

Los medicamentos principales en la *asfixia por gases deletéreos*, son *Opium*, y si no basta, *Acon.*, *bellad.*, *ipec.*

— *Por sumersion.* — Se acostará al ahogado sobre el lado derecho del cuerpo y en una habitacion muy caliente, se le secará bien, y calentará lentamente el cuerpo con ladrillos, botellas de agua, saquillos; se le aplicará amoniaco á la nariz, y se titilarán las narices, procurando insuflar aire en los pulmones, y se frotarán con cepillos los pies, manos y espalda: tambien se le pueden aplicar las lavativas anteriormente dichas. El medicamento principal para esta clase de asfixia es *Lachesis*, y si no basta, *acon.*, *bell.*, é *ipec.*, especialmente para las náuseas repétidas y aun vómitos que se suelen presentar. Tambien pueden prestar buenos servicios *Bry.*, *puls.* y *rhus.*, en los sintomas consecutivos.

Asma.

(*Ahogos, respiracion corta.*)

Debe investigarse primero la causa ocasional, especialmente en los casos agudos.

Si el asma depende de una congestion sanguinea pulmonar, dése: *Acon.*, *bell.*, *glon.*, *nux v.*, *phosph.*, *sulph.*

En el asma producido por *acímulo de gases* en el estómago é intestinos, se darán. *Carb. v.*, *cham.*, *china*, *nux v.*, *op.*, *phos.*, *sulph.*, ó *caps.*, *lyc.*, *zinc.*

Si el pecho está lleno de mucosidades viscosas, y hay es-

tertor mucoso, dénse: *Ant. tart., china, cupr., hep., ipec., lyc., stann.*

Si el asma es producido: Por la inhalacion de polvo de piedra, como por ejemplo, en los escultores, los picapedreros, los albañiles, etc., se dará: *Calc., hep., silic., sulph.*

Por la inhalacion de vapores sulfurosos: *Puls.*

Por una emocion: *Acon., coff., cham., ignat., nux v., staph.*

Por la repercusion de una erupcion: *Ipec., puls., veratr., — ars., — sulph. —* (El profesor Rapp recomienda *carb. v.*)

Si no se descubre ninguna causa ocasional, dése al principio *ipec.* á dosis repetidas (cada media hora, ó de hora en hora una cucharada). Si no sobreviene alivio alguno, el ijase entre los remedios siguientes: *Ars., apis, bell., china, glon., nux v., puls., tart. em., veratr.,* en los casos mas ó menos agudos; pero en los casos crónicos se dará: *Carb. v., cupr., hep., lyc., phos., sep., sulph.* Hé aqui algunas de las indicaciones mas importantes:

Arsenicum: Asma de los viejos, cuando los accesos son debidos á un resfriado repercutido ó suprimido; si hay agravacion á la media noche; la respiracion va acompañada de gemidos, suspiros, movimientos involuntarios y desordenados del cuerpo; los sintomas se agravan cuando el enfermo se mueve, y aun cuando se vuelve en la cama (Hg.). (Despues de *Arsen.* convienen *Ipec.* y *nux v.*)

Apis. Sensacion como si el cuello estuviera fuertemente oprimido. La region de las costillas falsas está como magullada, sobre todo la del lado izquierdo. La temperatura de la habitacion es insoportable, á causa del calor y de los dolores de cabeza que se experimentan (Hg.).

Belladonna. El pecho está por decirlo asi demasiado lleno. — Tos seca. — El movimiento agrava el estado

del enfermo, que sin embargo de esto no puede permanecer tranquilo (Hg.).

Glonoïn. Los ataques se declaran súbitamente, con opresion de pecho, angustia y suspiros. — La opresion de pecho alterna con el dolor de cabeza (Hg.).

China. La respiracion es sibilante y ruidosa, las mucosidades amenazan sofocar al enfermo, que transpira facilmente, y no puede respirar mas que con la cabeza muy elevada.

Nux vomica. Asma en las personas que toman mucho café y vino, asi como en las de vida sedentaria. Despues de escesos en el trabajo intelectual el enfermo se vé obligado á sentarse, inclinado el cuerpo hacia adelante.

Pulsatilla. La respiracion es dificil cuando el enfermo está hechado de espaldas (B.); no respira mas que con la parte superior del pecho. El asma va acompañado de vértigo, soñolencias, debilidad de cabeza, palpitaciones de corazon, calor al pecho (Hg.).

Tartarus emet. — Estertores mucosos. — Sintomas y temores de sofocacion por el acúmulo de mucosidades y parálisis de los pulmones (Tambien se puede dar *Bar, carb. v. ó phosph.*)

Veratrum. El enfermo está proximo á la sofocacion, se le presenta un sudor frio, la cara y brazo se le enfrian, con tos profunda, y dolores en los costados (Hg.).

Si el enfermo parece que está en la agonia, se puede dar con exito, segun el Dr. Hayne: *Arn., china, coff., op., carb. v.*

Si el asma se alivia con un trago de vino, dése: *Acon.* Si hay agravacion por el contrario: *Bell.*

En el asma de los niños se ha dado con mucho exito: *Acon., ars., ipec., tart. em.,* y sobre todo *moschus* y *sambucus.*

Sambucus. — El niño (habiendo tenido durante el sueño los ojos y la boca medio abiertos) se despierta despues de media noche con accesos de sofocacion,

durante los cuales la cara y las manos se hinchan y ponen azules (Comp. : Enfermedades de los niños).

En los casos graves se administran los medicamentos de media en media hora, ó de hora en hora; desde que principia el alivio, se les administra cada 3, 4 ó 6 horas. Aun cuando el ataque haya terminado, debe continuar el enfermo tomando durante algunos dias medicamento, por mañana y tarde.

Azufre.

El mejor medicamento para antidotar los efectos perniciosos de los vapores de azufre, así como de la respiración de su polvo, en los que lo muelen, azufran vino, constructores de pajuelas de azufre, etc., es *Pulsat.*, que se debe dar con bastante repetición. Si *pulsat.* no bastase, dése *merc.*; y despues si hay necesidad, *sepia* ó *china*.

Para los sufrimientos crónicos que sobrevienen como consecuencia del abuso del azufre en dosis alopáticas, consúltense: *Merc.*, *puls.*, *silic*; ó *china*, *nux v.*, *rhus.*, *sepia*.

Contra los malos efectos de las aguas sulfurosas, ó abuso escesivo de estas, el mejor medicamento es *Pulsatilla*, y si esto no corrige por completo los sintomas, dése *sepia*, ó bien *china*, *lyc.*, *merc.*, *rhus*.

Baños.

Para las dolencias que algunas veces resultan de los baños, los principales medicamentos son: *Antim. cr.*, *bell.*, *calc.*, *carb. v.*, *nitri ac.*, *rhus.*, *sep.*, *sulph.*

Antim. cr. Dolores de cabeza ó sufrimientos de estómago, con falta de apetito, náuseas, diarrea, mal humor.

Bell. Dolor de cabeza frontal, vista afectada, dolor de garganta y oídos, sufrimientos gástricos, coriza, calor febril.

Calcarea. Dolores pertinaces en las extremidades, sobre todo en las piernas, que se agravan con el cambio de tiempo, ó trabajando en el agua.

Carbo veg. Tos gruesa, rebelde, vomitos, diarrea, fiebre lenta, sufrimientos asmáticos, muchos gases en estómago é intestinos, dolor de pecho.

Nitri ac. Gran lasitud y debilidad general, con temblor de las extremidades, pesa dez de las piernas, deseo de estar hechado, sudores calientes, facilidad de enfriarse, flujo de oídos, diarreas, dolores de cabeza con nauseas y vomitos.

Rhus. Dolores de muelas y por todo el cuerpo, parálisis parciales, agravacion de los sufrimientos en la cama y con la quietud, sobrescitacion general, temblores con el mas pequeño movimiento, movimientos convulsivos despues de un baño frio, debilidad y cansancio general.

Sepia. Dolores generales, por accesos con frio glacial, frio que alterna con calor, alivio con el movimiento, de los dolores y demas sufrimientos; gran sensibilidad al aire frio y predisposicion á enfriarse; dolores de cabeza semilaterales, con náuseas y vómitos, y al mover la cabeza.

Sulphur. Dolores tenaces en las extremidades; cólicos; diarrea mucosa; coriza y catarro con secrecion mucosa abundante; dolor de oídos, dientes y cabeza; vista afectada; marcha encorbada por los dolores; gran sensibilidad al viento y al frio; gran facilidad de las extremidades á dormirse y enjumecerse.

Bazo.

Esplenitis aguda. (*Inflamacion aguda del bazo.*) — Esta enfermedad, caracterizada por fiebre, dolores punzativos, presivos, que impiden á veces la respiracion, en la region que ocupa el bazo, por aumento de volumen de este, sed, agitacion, á veces diarrea, etc., se combate comunmente con los medicamentos siguientes:

Acon. En los casos de inflamacion agudísima, con mucha fibre, sed, agitacion y dolores muy vivos.

Ars. Sed ardiente, diarreas sanguinolentas, urentes y gran postracion y debilidad; tambien está indicado si la enfermedad toma un caracter intermitente, y cuando *china* no ha corregido tal estado.

Arn. Uno de los principales medicamentos en esta enfermedad, cuando hay: dolores pungitivos, presivos, que dificultan la respiracion; ó bien cuando se declaran sintomas tifoideos, con apatia, estupor, y gran indiferencia en el enfermo.

Bryon. Astringiccion pertinaz de vientre, dolor lancinante en la region del bazo que se exaspera á cada movimiento del enfermo.

Caps. En los enfermos que han abusado de la quina y quinina, dolores tensivos, tension y presion en el vientre, gran desarrollo de gases en los intestinos.

China. Es el principal medicamento que hay que consultar despues de *acon.*, ó darlo antes si la fiebre no es considerable ó no hubiera fiebre, y cuando hay dolores presivos, lancinantes, ó si la enfermedad tomase un caracter intermitente. En este último caso consúltese despues *ars.*

Nux v. Despues de *arn.* ó *china*, cuando estos medicamentos no han podido acabar la curacion y continuan la astringiccion de vientre y el dolor de estómago y del bazo. Despues de *nux* conviene *bry.*

Infarto del bazo. (*Induracion del bazo.* — *Inflamacion crónica del bazo.*) — Esta enfermedad que suele ser la consecuencia de una inflamacion aguda, del abuso de la quinina ó de las fiebres intermitentes que han persistido por mucho tiempo, se trata con muy buenos resultados con los medicamentos siguientes: *Agnus c.*, *arn.*, *ars.*, *caps.*, *china*, *ignat.*, *iod.*, *mezer.* y *sulph.*

Cuando ha sido producida por enormes dosis de quinina para combatir las tercianas, consúltese: *Ipec.*, *ars.*, *calc.*, *ferr. m.*, *puls.*, *veratr.*

Bebidas Alcohólicas.

Las dolencias resultantes del abuso de las diferentes bebidas alcohólicas, exigen los medicamentos siguientes :

Del abuso de la cerbeza.

Calor á la cabeza ó dolor de cabeza : *Rhus* ó *ferr.*, *bell.*

Congestion sanguinea y soñolencia : *Sulph.*

Hambre canina : *Nux v.*

Embriaguez ligera : *Coloc.*, *ign.*

Náuseas : *Ars.*

Cólicos : *Coloc.*

Afecciones del estómago y del higado : *kali bi.* (L.).

Del abuso del vino.

Congestion sanguinea : *Silic.*

Calor á la cabeza : *Carb. v.*, ó *ars.*, *natr. m.*, *nux v.*

Dolor de cabeza : *Calc.*, *nux v.*, *silic.*, *zinc.*

Calambres en el estómago : *Lyc.*

Vértigos : *Zinc.*

Vértigos con náuseas : *Lach.*

Dolor de muelas : *Nux v.*

La indisposicion que sobreviene del abuso en la mesa de bebidas alcohólicas (comilona), exige :

Antimon. cr. Sufrimientos gástricos, asco, náuseas, falta de apetito, lengua sucia, amarillenta y eructos.

Carb. v. Dolor de cabeza, presivo y pulsativo, que se alivia con el aire de la calle; náuseas, pero sin vomitos, deposiciones de vientre liquidas, con gran desarrollo y espulsion de gases.

Coffea. Sobrescitacion moral, insomnio, vómitos y mucha alegría; dolor de cabeza terebrante, inquietud, no puede estarse quieto ni estar mucho tiempo en un mismo sitio; temblores generales ó parciales.

Nux v. Es el principal medicamento en estos casos. Dolor de cabeza terebrante que se agrava con el aire de

la calle, audando, moviéndose y bajando la cabeza; náuseas y vómitos; vértigos; ojos rubicundos; falta de fuerzas, tambaleo, astricción de vientre, tos, y temblor de las extremidades.

Opium. Medicamento importante contra el sopor ó soñolencia pertinaz que sobreviene en algunos casos, con cara muy encarnada y ronquidos.

Pulsat. Conviene cuando se han bebido con exceso vinos azufrados. Ofuscamiento con pesadez de la cabeza, aliviados con el aire de la calle, náuseas despues de comer, eructos agrios, lengua sucia, cubierta de una gruesa capa blanca.

Contra el *Delirium-tremens* (locura de los borrachos) el mejor medicamento es *Stram.*, y luego *Op.*, *luches.*, ó *ars.*, *bell.*, *calc.*, *coff.*, *hyosc.*, *nux v.*, y tambien *digit.* en algunos casos.

Boca.

Inflamacion de la boca (Estomatitis). — Los medicamentos principales contra esta dolencia son:

Mercurius. Cavidad bucal inflamada, escoriada, ulcerada ó cubierta de aftas, con olor fétido, cadavérico; flujo abundante de una saliva fétida, blanquizea, sanguinolenta ó espumosa; encias rojas, abultadas, que se escorían y sangran facilmente, con dolores quemantes, imposibilidad de comer, deseo de bebidas frias, diarrea ardiente y piel ardorosa con recargos febriles por la noche.

Nux v. Dolores pulsativos, urentes, en la boca; hinchazon dolorosa de las encias y carrillos; úlceras, ve-giguillas, que se extienden por toda la boca y el paladar; con salivacion espumosa, fétida y á veces sanguinolenta; una capa blanquizea, espesa, se estiende á veces por toda la boca; esta exhala un olor pútrido; astricción de vientre, mal humor, cólera facil, cara descolorida y en-flaquecimiento rápido.

Tambien pueden consultarse :

Borax. Úlceras, aftas ó vesiculas en las encias y carrillos, lengua y paladar, que sangran con gran facilidad.

Nitri ac. En los casos producidos por el abuso del mercurio y sus preparados.

Staph. Escreciencias fungosas en las encias y carrillos; palidez de la boca con úlceras ó hinchazon dolorosa, y que dan sangre con facilidad; hinchazon de las glándulas del cuello y vacilamiento de los dientes y muelas, que se descarnan facilmente.

Sulph. ac. Aftas, hinchazon, ulceracion y exudacion facil de sangre en las encias; salivacion abundante, y dolores lancinantes.

Olor fétido de la boca. — El olor fétido que exhala la boca de algunas personas, suele ser por lo comun sintoma de alguna enfermedad, pero tambien se observa que existe por si solo, sin ser dependiente de otra enfermedad. De las indicaciones de este último nos ocuparemos esclusivamente.

Si el olor fétido depende del abuso del mercurio, dése: *Aur.*, *carb. v.*, *hep.*, *lach.*, *nitri ac.*, *sulph.*, y tambien *baryt. m.*

Si es consecuencia de las lombrices, *Acon.*, *calc.*, *cina.*, *ignat.*, *merc.*, *spig.*, *sulph.*, ó *cicut.*, *filix.*, *veratr.*

Si se manifiesta solo por la mañana: *Arn.*, *nux v.*, *lyc.*, *silic.* y *sulph.*

Despues de comer: *Cham.*, *ipec.*, *nux v.*, ó *antim. er.* y *sulph.*

Por la tarde y la noche solamente: *Pulsat.*, *sulph.*, ó *nux v.* y *merc.*

En las jóvenes, en la edad de la pubertad: *Aur.* principalmente, y tambien: *Bell.*, *calc.*, *lach.*, *puls.*, *sep.*

Si el olor es ácido: *Sulph.*; de ajo: *Petr.*; de queso: *Aur.*; de pez: *Canth.*; de cebolla: *Kali hyd.*; terroso: *Mang.*; de orina: *Graph.*; pútrido: *Agar.*, *ambr.*, *anac.*, *arn.*, *ars.*, *aur.*, *merc.*, *mur. ac.*, *nitri ac.*, *nux v.*, *sep.*, *sulph.*

Salivacion (Tialismo).— Los principales medicamentos contra esta enfermedad, son: *Bell., calc., canth., cin., colch., dulc., euphor., lach., merc., nitri ac., puls., sulph. y veratr.*

Si depende del abuso del mercurio: *Bell., dulc., carb. v., hep., iod., lach., nitri ac., puls., sulph. y calc.*

Si va acompañada de dolores de estómago: *Euphor.*; de náuseas: *Veratr., zinc.*; de náuseas y vómitos: *Euphor., puls.*; de frío general: *Arg., euphor.*; si es dulce: *dig., plumb., puls., sabad.*; acre: *Merc., veratr.*; espesa: *nux m.*; fétida: *Dig., merc.*; salada: *Sulph.*; sanguinolenta: *merc., nux v., sulph.*; ácida: *Calc., ign.*; amarga: *Ars., sulph., thuja.*; de gusto metálico: *Bism., zinc.*

Bocio.

(*Papera.*)

El bocio ó *papera*, como vulgarmente se dice, es una enfermedad que se cura perfectamente; y los medicamentos empleados con éxito hasta ahora, son: *Iod.* en primer lugar, á dosis repetidas y de diluciones altas, y despues *Hep.*, si *iod.* no acabase la curacion. En caso de que estos dos medicamentos fracasasen, consúltense: *Amm. c., calc., caust., lyc., natr. c. y mur., spong., staph. y sulph.*

No podemos consignar indicaciones precisas para cada medicamento, porque es preciso guiarse para su eleccion, por las disposiciones mórbidas del enfermo.

Bronquitis.

(*Catarro.* — *Catarro de la tráquea.* — *Catarro de los bronquios.* — *Catarro bronquial.* — *Catarro laríngeo.*)

La afeccion inflamatoria de la tráquea y sus ramificaciones, es una enfermedad muy frecuente y á veces epidémica; en este último caso toma el nombre de *grippe*. La tráquea empieza por un lado inmediatamente despues

que termina la laringe, y por el otro se continua por los bronquios y termina en las pequeñas vesículas pulmonales. Sucede, pues, que en las afecciones inflamatorias de la laringe, asi como en las de la sustancia de los pulmones, la tráquea y sus ramificaciones (bronquios), siempre se afectarán simultáneamente en mayor ó menor escala.

Puede decirse en general que la respiracion será menos difícil, si la inflamacion ó el catarro no ha invadido mas que el tronco ó las grandes ramificaciones de la tráquea, aun cuando la tos, la sensacion de erosion, ó el ardor de las partes inflamadas sean de una gran violencia. Cuanto mas invada la inflamacion las ultimas y mas pequeñas ramificaciones bronquiales, mas difícil será la respiración y peligroso el estado del enfermo. Esta última forma de la enfermedad es sobre todo funesta á los niños y ancianos.

Los medicamentos principales contra la inflamacion de la tráquea ó catarro bronquial, son, entre otros: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *cham.*, *merc.*, *puls.* y *sulph.*, asi como tambien para el catarro laríngeo.

Aconitum. — Fiebre con calor ardiente, sed, dolor de cabeza, lagrimeo, dolores por todo el cuerpo, eriza, voz ronca; tos corta, seca, con dolor al toser en la parte anterior del pecho, sueño agitado, ó insomnio con agitacion; ó tambien tos húmeda, bronca, con expectoracion poco abundante.

Belladonna. — Dolor de cabeza intenso, martillante, con pesadez de cabeza, y fijo en la frente y sienes, que obliga á tener los ojos cerrados; dolor de garganta, coriza, recargos febriles por la tarde y noche; tos seca, corta, ó espasmódica, intensa, que no deja dormir al enfermo; rubicundez de la cara, la luz molesta á los ojos, sobre todo la artificial; ronquera y estornudos frecuentes; mal humor, molestando al enfermo toda clase de ruidos.

Bryonia. — Tos seca, frecuente, con dolores en los costados ó en la parte anterior del pecho, escitada por

un cosquilleo continuo en la garganta; ó tos sofocante; excesiva que obliga á vomitar; tos con expectoracion blanca, amarillenta ó sanguinolenta; las sienes acusan dolores pungitivos á cada golpe de tos; facilidad del cuerpo para transpirar, sobre todo al toser, ronquera, sequedad de las narices y de los ojos, y estertor mucoso en el pecho; ardor de la piel ó fiebre ligera, con recargos por la noche.

Chamomilla. — Grande fluxion por narices y ojos con tos seca, producida por una titilacion continúa en el pecho y garganta, ó acúmulo de mucosidades dificiles de expectorar y que producen una tos sofocante; expectoracion dificil de mucosidades amargas, y facil por las mañanas al despertar: cuando la tos es provocada ó escitada por una incomodidad, el llanto en los niños, y por una cólera; ronquera, sequedad y ardor en la garganta, fuertes recargos febriles por la noche con agitacion y encendido de la cara, sobre todo en las mejillas; mal humor, taciturnidad, irascibilidad, y agravacion nocturna de todos los sintomas.

Mercurius. — Tos seca, fatigante, escitada por un cosquilleo y sensacion de sequedad en los bronquios, ó húmeda, con expectoracion abundante de mucosidades espumosas; gran facilidad para sudar, y sudor abundante que no alivia al enfermo, antes bien le debilita; voz ronca, ronquera, coriza fluyente, expectoracion á veces de sangre, dolores en los costados y en la cabeza, y agravacion de todos los sintomas con la mas leve corriente de aire: fiebre con recargos nocturnos, y á veces diarrea mucosa.

Pulsatilla. — Ronquera con apagamiento casi total de la voz; coriza con flujo de materias ardientes, amarillas, escalofrios generales y fiebre ligera sin sed; tos primero seca, pero bien pronto se hace húmeda, con expectoracion abundante de materias verdes, blanquizeas, saladas ó amargas; á veces sanguinolentas; lagrimeo, dolor de oidos; agravacion de la tos estando hechado el enfermo y por la noche, provocando á veces vómitos de

lo que se ha-bebido y comido; ó de materiales mucosos; sensacion de sofocacion al toser, y emision involuntaria de orina; dolores en los brazos, espalda, cabeza y pies; ardor en la palma de las manos y planta de los pies, con frio ó escalofrios en el resto del cuerpo.

Sulphur. — Este medicamento conviene por lo general despues de *bry.* ó *merc.*, cuando estos medicamentos han disminuido mucho los sintomas, pero no han podido acabar con la enfermedad, ó tambien despues de los demas medicamentos y con el mismo objeto. Tos seca, fatigante, con vomitos y constriccion en forma de calambre en el pecho, y que se agrava por la noche y en la cama; ó tos húmeda con expectoracion abundante de mucosidades; sensacion de plenitud en el pecho, fatiga al andar, palpitaciones de corazon, dificultad de respirar y ruido de mucosidades en el pecho.

Ademas de los anteriores medicamentos pueden consultarse: *Hep.*, *lyc.*, *lach.*, *nux v.*, *phos.*, *rhus.*, *spong.*, *tart. em.*

En los casos crónicos y persistentes: *Ars.*, *carb. v.*, *calc. c.*, *caust.*, *dros.*, *kali c.*, *kali bi.*, *lyc.*, *phos.*, *spong.*, *stann.* y *sulph.*

Para los niños convienen especialmente: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *calc. c.*, *cham.*, *hep.*, *ipéc.*, *sulph.*, *tart. em.*; ó bien: *Lach.*, *lyc.*, *op.*, *nux v.*, *phos.*, *puls.*, *rhus.*

Para los ancianos: *Baryt. c.*, *carb. v.*, *rhus.*, *tart. em.*

En una inflamacion de la clase del crup ó garrotillo: *Acon.*, *hep.*, *lach.*, *spong.*, ó *brom.*, *iod.* (Compárese: *Crup.*).

Compárese ademas: *Catarro del pecho* y *Tos.*

Cabellos.

(*Alopecia. Caída de los cabellos. — Calvicie.*)

Los medicamentos principales contra la alopecia ó caída de los cabellos, son: *Calc. c.*, *graph.*, *hep.*, *kali*, *natr. m.*, *phosph.*, *silic.*, *sulph.*, y tambien *ars.*

Si los cabellos estan secos: *kali c.* — *calc.*, *phos. ac.*

Si tienen una gran tendencia á encanecer: *Graph.*,
lyc., *phos. ac.*, *sulph. ac.*

Si la calvicie proviene del abuso del mercurio: *Hepar*
principalmente, y si no bastase, *carb. v.*

Del abuso de la quinina: *Bell.*

De una enfermedad larga y debilitante: *China.*,
ferr., *lyc.*, *hepar.*, *silic.*, *calc.*, *phosph. ac.* y *sulph.*

Del embarazo: *Calc.*, *lyc.*, *natr. m.*, *sulph.*

De una fuerte transpiracion: *Merc.*, *china* y *silic.*

De una afliccion ó tristeza: *Staph.*, *phos. ac.*, ó
caust., *graph. ign.*

De una fiebre nerviosa ó inflamatoria: *Hepar.*, *silic.*,
lyc., *sulph.*

De fuertes dolores de cabeza ó jaquecas: *Hepar.*,
lyc., ó *nitri ac.* (*Hg.*); ó tambien *Antim.*, *calc.*, *silic.*
y *sulph.*

Alopecia con gran sensibilidad del cuero cabelludo:
Calc., *china.*, *hepar.*, *natr. m.*, *silic.* y *sulph.*

Con mucho picor en la cabeza: *Graph.*, *kali.*, *lyc.*,
silic., *sulph.*

Con escamas abundantes: *Ars.*, *calc. graph.*, *staph.*

Alopecia parcial de las partes laterales de la cabeza:
Graph. ó *phos.*

De la parte superior de la cabeza, formando una es-
pecie de coronilla: *Baryt.*, *lyc.* y *zinc.*

Cabeza.

Congestion cerebral (Congestion de sangre á la ca-
beza). — El medicamento principal contra la congestion
cerebral es *Acon.*, que se dará mientras se vea que el
enfermo se va mejorando; pero si á las 24 horas, no se
observa alivio alguno, dése *Bell.* Estos dos medicamen-
tos bastan por lo general paa curar esta enfermedad;
pero á veces, cuando la congestión es considerable, con
gran encendimiento de la cara, sopor, ronquidos é in-
movilidad del enfermo, es necessario dar *op.*; á veces
hay que acudir á *glon.*, *merc.*, *puls.* y *stram.*

Es preciso tener siempre en cuenta las causas ocasionales, la edad y el género de vida; y dénse:

Si la causa es un despecho: Cham.; — una alegría: Coff.; — un susto: Op. ó acon.; — una tristeza, pesar: Ign.; — una cólera: Nux v.; (Compárese: *Emociones morales*) — un esfuerzo corporal: Calc., rhus.; — una insolacion ó calor fuerte: Glon., ó Acon., bell., bry., camph.; — una astriccion de vientre: Bry., nux v., op., sulph., ó lyc.

Á los niños durante la denticion: Bell., calc., ó Acon., cham., coff.

Á las personas que tienen una vida sedentaria: nux v., ó Acon., sulph.

Á los bebedores: Lach., nux. v., op., ó Ars., bell., calc. c., stram.

En los casos crónicos: Calc., phos., silic., sulph.

Dolor de cabeza. — Esta es indudablemente la dolencia mas frecuente de todas; dificilmente habrá una persona que no la haya padecido. El dolor de cabeza es raras veces una enfermedad idiopática; es provocada ordinariamente por una influencia funesta exterior, ó bien es el sintoma accesorio de otra enfermedad. Las diversas clases de dolores que ocasiona el de cabeza, el asiento de esos dolores, los sufrimientos concomitantes y las circunstancias que provocan, aumentan ó disminuyen la enfermedad, son tan numerosas, y nuestra materia médica es tan rica en detalles de este género, que escribiríamos un libro sobre esta enfermedad solamente. Nos contentaremos con investigar las diferentes causas de los dolores de cabeza, con indicar sus medicamentos principales, y concluiremos con algunas particularidades características de los medicamentos que se relacionan especialmente con el dolor de cabeza nervioso, ó sea la jaqueca.

El dolor de cabeza es frecuentemente, como hemos dicho, el sintoma de otra enfermedad, y desaparece con esta enfermedad. Frecuentemente tambien es el sintoma principal de una enfermedad aguda que se anuncia, sin

estar aun bien pronunciada. Se observan por lo comun un gran cansancio y abatimiento en las extremidades. Siempre es preferible en tales circunstancias consultar á un médico homeopata. Si no se puede, se hará lo siguiente: cuando el enfermo tenga fiebre, esté alterado, inquieto, sobrescitado, se le dará con preferencia *aconitum* disuelto en agua, hasta que la enfermedad se haya pronunciado mas, ó hasta que los sintomas desaparezcan ó cambien de naturaleza. Ademas, se eligirá segun los sintomas generales, entre: *Arn.*, *ars.*, *bell.*, *bry.*, *rhus.*, etc. (Véanse: *Sintomas característicos de los medicamentos*).

En todos los casos se buscará siempre la causa ocasional, y se la tomará por guia para la eleccion de sos medicamentos.

Si el dolor de cabeza proviene de un baño, dése: *Antim. cr.*

Del uso de la cerveza: *Rhus.*

Del uso de bebidas alcohólicas: *Nux v.*, ó *Ign.*, *lach.*, *rhod.*, *selen.*, *zinc.*

Por haber bebido agua (helada): *Bell.*, *glon.*, (*Hg.*)
ó *Ars.*, *bry.*, *carb. v.*

Por haber bebido vino: *Nux v.*, *rhod.*, *silic.*, *zinc.*

Del uso del café: *Cham.*, *ign.*, *nux v.*

De una cólera: *Cham.*, ó *Lyc.*, *natr. m.*, *phos.*,
rhus.

De compresas heladas puestas en la cabeza, ó de una congelacion: *Glon.*, *lach.* (*Hg.*).

De una congestion cerebral: *Acon.*, *bell.*, *bry.*,
glon., *nux v.*

De astriccion de vientre: *Nux v.*

De una corriente de aire: *Acon.*, *bell.*, *cina.*, ó *Co-*
loc., *nux v.*, *valer.*

Zendo en coche: *Graph.*, *iod.*, *kali c.*

Despues de haber ido en coche: *Sep.* (*Hg.*).

Despues del almuerzo: *Lyc.*, *nux m.*

De un desarreglo de estómago: *Antim cr.*, *arn.*,
bry., *ipecc.*, *nux v.*, *puls.*

De un calentamiento ó sofocacion: *Carb. v.*, ó *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *silic.*

Despues de haber escrito estando al sol: *Bor.*, *calc.*, *natr. m.*

Por una emocion: *kreos.*, ó *Acon.*, *bell.*, *cham.*, *ign.*, *phos.*

Despues de un estornudo: *kali c.*

De hambre: *Silic.*

De ventosidades: *Sulph.*

De la gota: *Bry.*, *ipec.*, *ign.*, *nux v.*, *sep.*, *sulph.*

— (Si los dolores son excesivamente fuertes, dése *colocynthis.* (*Hg.*)).

Del uso de la leche: *Brom.*

De la lectura: *Arn.*, *bor.*, *kali*, *cina*, *ign.*

Del uso de limonadas: *Selen.*

Si proviene de la luz de las velas: *Croc.* — del dia: *Sep.*

De la masticacion: *Sulph.*

Del abuso del mercurio: *Hep.*, ó *bell.*, *carb. v.*, *china.*

Despues de haberse sonado: *Sulph.*

De la musica: *Ambr.*, *phosph.* — y *Tarant.* (*N.*).

De olores fuertes: *Ign.*, *selen.*

De un enfriamiento de la cabeza: *Bell.*, *sep.* ó *puls.* (despues de haberse cortado el pelo: *Ars.*, *bell.*, *glon.*).

Durante las comidas: *Graph.*

Despues de las comidas: *Anm. c.*, *arn.*, *bry.*, *calc.*, *carb. an.*, *carb. v.*, *cham.*, *graph.*, *hyos.*, *lach.*, *lyc.*, *natr. m.*, *nux m.*, *nux v.*, *phosph.*, *puls.*, *rhus.*, *sep.*, *sulph.*, *zinc.*

De un constipado ó coriza: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *cham.*, *lach.*, *merc.*, *nux v.*, *sulph.*, (*J.*), ó: *Ars.*, *cina* (*Hg.*)

De haber reido: *Phos.*

De una sacudida ó estremecimiento: *Arn.*, ó *bell.*, *cicut.*, *hep.*, *phos. ac.*

De haber estado al sol: *Natr. c.*, *selen.*, *valer.* (*B.*), ó: *Lach.*, *nux v.*, (*J.*); de haber andado al sol: *Brom.*

Del uso del tabaco: *Acon.*, *antim. cr.*, *ign.*, *magn.*

De una demasiada tension del espiritu: *Nux v.*, 6: *Anac.*, *aur.*, *cocc.*, *colch.*, *lach.*, *natr. c.*, *sabad.*, *silic.*, *sulph.*

Del uso del té: *Selen.*

De la tos: *Acon.*, *arn.*, *bell.*, *bry.*, *hep.*, *natr. m.*, *nux v.*

Del viento: *China*, *mur. ac.*

Del uso de la carne de ternera: *Nitr.*

El dolor de cabeza reumático exige: *Cham.*, 6 *Bell.*, *nux v.*, *puls.* (Hg.); 6 *Acon.*, *bry.*, *china*, *merc.*, *spig.*, *sulph.* (J.).

Si el dolor de cabeza es producido por el humo: *Agn.*

Si se presenta con el crepúsculo: *Ang.*

En una reunion numerosa de personas: *Magn.*

Al bajar la cabeza: *Nitr.*

Al volver la cabeza: *Bov.*

Mirando fijamente un objeto: *Mur. ac.*, *spong.*

Si no se puede averiguar la causa con certidumbre, 6 bien si hay muchos medicamentos indicados para la misma causa, de tal modo que la persona poco habituada á la homeopatia no sabe cual elegir, se deberan tomar por guia, para la eleccion, las indicaciones siguientes.

Naturaleza de los dolores.

Dolores con embotamiento: *Acon.*, *arn.*, *bell.*, *bry.*

« vulsivos: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *silic.*

« con adormecimiento: *Bell.*, *calc.*, *hyosc.*, *phos.*, *sab.*

« contusivos: *Calc.*, *caps.*, *cham.*, *cocc.*, *ign.*, *nitr. ac.*, *puls.*, *rhus.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.*

« con zumbido de oidos: *Aur.*

« urentes: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *phos.*, *sec.*, *veratr.*

« con calor en la cabeza: *Acon.*, *arn.*, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *ipec.*, *lyc.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *petr.*, *rhus.*, *silic.*, *sulph.*

« como si proviniesen de un clavo metido en la cabeza: *Acon.*, *coff.*, *ign.*, *nux v.*, *ruta.*

- Dolores en forma de golpes (ó sacudidas) : *Bell., bry., natr. m., nux v., puls., spig., spong.*
- “ dislacerantes : *Arn., bell., bry., calc., caps., cham., china, coff., coloc., con., ign., nux v., puls., silic., spig.*
- “ como si la cabeza fuese á estallar : *Bell., calc., caps., china, natr. m., nux v., spig., silic.*
- “ como si cavasen en la cabeza : *Bar., dulc., spig.*
- “ formicantes : *Puls., rhus., sulph.*
- “ con vibraciones en los oídos : *Caustic., sulph.*
- “ lancinantes : *Acon., arn., alum., ars., bell., bry., china, con., natr. m., nux v., petr., puls., selen., sulph.*
- “ martillantes : *Calc., natr. m., sulph.*
- “ como si uno estuviera completamente magullado : *China, coff., ign., nux v., puls.*
- “ penetrantes : *Bell., calc., china, dulc., stram.*
- “ pulsativos : *Rhus.*
- “ rápidos con el rayo : *Arn., bell., bry., ign.*
- “ tensivos : *Aur., nux v., silic.*

Asiento de los dolores.

Si los dolores se fijan :

En la parte anterior de la cabeza ó en la frente, dése : *Acon., antim. cr., arn., ars., bell., bry., china, cina, cocc., croc., coloc., dig., dulc., dros., hyosc., ign., ipec., merc. natr. m., nux v., plat., puls., rhod., sabin., sep., silic. spigel., spong., staph.*

En las sienes : *China, phos. ac., rhus.*

En la parte superior de la cabeza : *Ambr., china, cocc., cupr., lach., stram., thuja, veratr.*

En el occipucio : *China, colch., ign., nux v., puls., rhus., spig., spong.*

En el lado derecho de la cabeza : *Bell., bry., canth., cina., caust., dros., ign., sabina.*

En el lado izquierdo de la cabeza : *Ambr., arn.,*

caps., china, croc., coloc., iod., nitri ac., plat., rhod., samb., sep.

Ponemos á continuacion un pequeño número de los principales medicamentos contra los dolores de cabeza (=D. de C.), y sobre todo contra la jaqueca. Indicaremos ademas los *sintomas concomitantes* (=S. C.), asi como las circunstancias que aumentan (=Agrav.) y disminuyen (=Aliv.) los dolores.

Aconitum. Dolores golpeantes y lancinantes. — Sensacion como si la frente estuviera llena y pesada. — Sensacion de sacudimientos en el cerebro, ó de una bola que subiera á la cabeza, ó dolores pellizcantes y calambroideos en la raiz de la nariz. — D. de C. despues de un enfriamiento.

Agrav. — Con el movimiento y hablando; lo mismo al beber.

S. C. Gran sensibilidad á los olores. (Sulph.) (Hg.).

Antimonium crudum. Congestion cerebral y hemorragia por la nariz. — Dolores paralizantes, con nauseas, que aumentan despues de las comidas y por la tarde, y disminuyen al aire libre. — D. de C. despues de haberse bañado, fumado, ó despues de un desarreglo de estómago.

Apis. Parece que la cabeza está demasiado llena ó es muy grande, sensacion de pesadez, de presion y opresion. — D. de C. en las personas que padecen la *urticaria*.

Agrav. Al levantarse y estando bajo la impresion del calor de la habitacion.

Aliv. Oprimiendo la cabeza entre ambas manos.

Arnica. D. de C. despues de *una caída, un golpe, una sacudida*. — La cabe arde, mientras que el cuerpo está frio. — Dolores con embotamiento en la frente, dislacerantes y lancinantes en las sienas.

Arsenicum. D. de C. despues de las comidas; alivio con compresas de agua fria y con el aire fuerte. — Dolores dislacerantes de cabeza con vómitos, cuando uno se vuelve. — D. de C. con zumbido de oidos.

Belladonna. D. de C. que provienen de congestiones sanguíneas; con dolores contusivos y con embotamiento, como si la cabeza fuera á estallar, ó sensacion de fluctuacion de agua en la cabeza. — D. de C. neviosos (jaqueca), diariamente desde las 4 de la tarde hasta las tres de la mañana; empeorándose con el calor de la cama y estando acostado. — D. de C. despues de un enfriamiento de cabeza (p. ej. despues de cortarse el pelo).

Agrav. Con el movimiento de los ojos y de la cabeza, sobre todo al sacudirla. Encorvándose. Con la luz. Si está acostado, con la cabeza baja. Con las corrientes de aire.

Aliv. Al volverse y elevando la cabeza. Oprimiendo la cabeza entre ambas manos.

S. C. Hinchazon y pulsacion de las venas; calor y rubicundez de la cara (á veces tambien palidez). Sopor; chispas delante de los ojos (Vease: Sintomas caract. gen.).

Bryonia Plenitud y pesadez de la cabeza con presion penetrante, como si el cerebro fuera á salir de su sitio. Dolores dislacerantes, unilaterales (á la derecha), que van desde la cabeza á las megillas y pómulos. — Dolores presivos, como si serrasen la cabeza, ó como si fuera á estallar, ó bien dolores lancinantes, dislacerantes, pulsativos.

Agrav. Por la mañana temprano al despertar; al abrir y mover los ojos, con el movimiento en general, pero sobre todo *al encorbarse*; despues de comer.

Aliv. Con el reposo. Cerrando los ojos. Con la presion exterior.

S. C. Hemorragia por la nariz. Cara encarnada, hinchada; calor á la cabeza (aun estando el cuerpo frio); sed. — Náuseas; sensacion de desfallecimiento y verdadero desvanecimiento cuando uno se vuelve.

Calcarea carbonica. D. de C. de naturaleza paralizante y adormecedora, proviniendo de una congestion sanguínea. — D. de C. de las *personas escrofulosas ó anémicas*. — D. de C. provocados por un esfuerzo. —

Dolores contusivos, martillantes ú horadantes en la cabeza; con sensacion de calor y frio; ó D. de C. semilaterales (jaqueca).

Agrav. Por la mañana al despertar. Al encorvarse. Por una grande tension del espíritu. Al pasearse al aire libre.

Aliv. Al acostarse y cerrar los ojos.

S. C. Eructos inútiles; nauseas; vértigos; cara encarnada é hinchada. — Sensacion de frio en el interior ó al exterior de la cabeza.

Capsicum. Jaqueca histérica. — Accesos de dolores de cabeza de un solo lado y con aturdimiento; náuseas y hasta vómitos, agravacion con el movimiento de la cabeza y de los ojos. — Dolores contusivos en la frente y sienes; sensacion, como si la cabeza fuese á estallar, cuando se la mueve. — *Caps.* conviene principalmente á las personas flemáticas.

Carbo vegetabilis. D. de C. producidos por el calor de la lumbre; fuerte congestion sanguinea en la cabeza. — Tension calambroidea en el cerebro. — Dolores tractivos que vienen de la nuca, con náuseas. — Sensibilidad morbosa del exterior de la cabeza, aun con la presion del sombrero.

Chamomilla. Dolores semilaterales, tirantes, dislacerantes, que van desde la frente á las mandíbulas. — D. de C. *reumáticos*, despues de un sudor suprimido. — Dolores contusivos, generalmente unilaterales; con rubicundez de una de las megillas. (Véase: Sint. car. gen.). — Los D. de C. se hacen sentir aun durante el sueño.

China. Dolores de cabeza despues de *pérdidas de sangre*, ó despues de enfermedades debilitantes (Véase: Sint. car. gen.). — Congestion cerebral; sensacion como si la cabeza fuera á estallar; insomnio durante la noche. — Punzadas en la cabeza y palpitaciones en las sienes. Gran sensibilidad del cuero cabelludo.

Agrav. Con las corrientes de aire, con el mas ligero tacto al aire libre. Andando despacio.

Aliv. Con la presión fuerte. Estando hechado y callado.

Coffea. Jaqueca, con dolores semilaterales, tractivos, con aturdimiento. — Sensación como si se introdujera un clavo, ó como si el cerebro estuviese desgarrado y triturado. — Los dolores son insoportables y hacen llorar al enfermo; está fuera de sí; se retuerce, se agita, grita, ahulla, etc. (Véase: Sint. car. gen.). — Los D. de C. son generalmente causados por la meditación; por la cólera; por un enfriamiento, por una indigestión.

S. C. Gran sensibilidad, sobre todo al ruido y á la música.

Colocynthis. D. de C. *gotosos*, ó *neurálgicos en el mas alto grado*. — Dolores dislacerantes, semilaterales; tracciones, presión y pellizcos dolorosos. — Accesos de dolor, que reaparecen despues de todas las comidas ó todas las tardes, con grande inquietud y angustia. Durante los accesos, emisión de una orina abundante y clara como el agua. Fuera de los accesos es nauseabunda y poco abundante; el sudor tiene el olor de la orina.

Agrav. Encorvándose. Estando acostado de espaldas.

Glonoin. D. de C. congestivos que sobrevienen súbitamente. — Dolores graduales; sensación de pesadez, presión, palpitaciones, punzadas y erosión en la cabeza. — Dolores unilaterales encima de los ojos; se hacen sentir durante los grandes calores y duran todo el verano; aumentan y disminuyen todos los días con el curso del sol; el enfermo es muy sensible á sus rayos y á la presión del sombrero.

Agrav. Al encorvarse. Al subir una escalera. Sobre todo al menear la cabeza.

Aliv. Con la presión exterior. Descubriendo la cabeza. Paseándose al aire libre.

S. C. Pulso acelerado. — Cara encarnada; sudor en la cara. — Pérdida del conocimiento.

Ignatia. Dolor de cabeza *histérico*. — Dolores que se hacen sentir de *dentro afuera*; ó punzadas dolorosas

en la frente y raiz de la nariz. — Sensacion como si las sienes estuvieran traspasadas por un clavo. — D. de C. causados por una cólera ó por un disgusto. — Dolores pulsativos, contusivos, dislacerantes, terebrantes, penetrantes.

Agrav. Con el café, el tabaco, el ruido, los olores. Despues de comer. Por la tarde y por la mañana temprano, cuando uno se ha levantado.

Aliv. Al levantar la cabeza. Cambiando de posicion. Al bajarse disminuyen los dolores (ó aumentan).

S. C. Náuseas; obscurecimiento de la vista; miedo á la luz; rostro palido, orinas acuosas. (Hg.). — Convulsiones en las mugeres débiles. (Goullon).

Ipecacuanha. Dolores de cabeza gástricos; con náuseas y vómitos. — Sensacion como si el cráneo estuviese magullado.

Kali bichr. Accesos periódicos de D. de C. semilaterales, circunscritos á un pequeño espacio. — Obscurecimiento completo de la vista, seguido de un violento dolor de cabeza, que obliga á hecharse al enfermo; aversion á la luz y al ruido; á medida que aumenta el dolor de cabeza, se esclarece la vista. (L.).

Lachesis. D. de C. causados por un reuma; van precedidos de *tension de la nuca*. — Dolores contusivos con calor en la cabeza. — Dolores expansivos ó cortantes en las vértebras, encima de los ojos, en medio de las sienes. — Dolor de cabeza al sol.

Agrav. Por la mañana despues de levantarse. Al moverse; encorvándose; al subir. Con la presion. — Despues de haber dormido.

Aliv. Acostándose (despues de haber comido). Con los eructos. Con el calor.

Lycopodium. Dolores con aturdimiento, embotamiento, dislacerantes; sobre todo, por la tarde de 4 á 8, son mas fuertes. D. de C. despues de almorzar. (*Nux moschata*).

Mercurius. Dolores de cabeza *congestivos, catarrales, reumáticos ó sífilíticos*. — Dolores mordicantes, quemantes, punzantes, terebrantes, contusivos, martillantes;

sensacion como si la cabeza estuviera comprimida por una faja, ó como si fuera á estallar. — El asiento principal de los dolores es en la frente y sienes.

Agrav. Durante la noche; estando acostado; con el calor de la cama; al aire libre. Comiendo; bebiendo y durmiendo.

Aliv. Despues de haberse levantado. Estando sentado tranquilamente en una habitacion caliente.

S. C. Congestion cerebral. — Dolores dislacerantes que se hacen sentir en las muelas y en el cuello. — Punzadas dolorosas en el oido (izquierdo). — Sudores nocturnos que no alivian.

Natrum muriaticum. El despertar por la mañana es acompañado de un violento dolor de cabeza (G.). Sensacion de opresion en las sienes, y de presion en la parte superior de la cabeza, de pulsacion sobre todo en la frente, asi como si la cabeza fuera á estallar.

Agrav. Por la mañana. Con el movimiento, ó con los trabajos intelectuales (leer ó escribir).

Aliv. Estando sentado ó acostado. Con la transpiracion.

Nux moschata. D. de C. despues de almorzar, acompañados de soñolencia. Las sienes estan muy sensibles á toda clase de presion. — Sensacion como si el cerebro estuviese ó fuese sacudido.

Agrav. Con el tiempo frio, sobre todo frio y húmedo.

Aliv. Con el calor.

(Este medicamento conviene principalmente á las mugeres sensibles y de humor inconstante).

Nux vomica. D. de C. congestivos, gástricos, catarrales, reumáticos; neurálgicos en las personas que sufren almorranas, en las que llevan una vida sedentaria. — Dolores de cabeza por abuso del vino ó café, ó por astriccion de vientre. (Véase: Sint. car. gen.). Sensacion como si metieran un clavo en la cabeza, con presion, pesadez; ó bien como si el cerebro fuese dividido en pedazos y triturado. — La cabeza sufre tambien exteriormente.

Agrav. *Por la mañana temprano al despertar.* Con el movimiento (á cada paso). Encorvándose. Despues de comer; con el café, vino y la *meditacion*. Al aire libre.

Aliv. Despues de levantarse y durante el día. Estando sentado ó acostado tranquilamente en una habitacion caliente.

S. C. Náuseas y vomitos agrios. — Zumbidos en la cabeza. — Cara palida y alterada.

Platina. Dolores de cabeza neurálgicos. Aumentan poco á poco y disminuyen lo mismo (*Stront.*). Dolores pellizcantes ó punzantes, como si punzaran las sienas y frente. Sensacion como si se pusiera una clavija entre los huesos parietales. — Sensacion de adormecimiento. — Sensacion como si la piel del cráneo se acortase.

Agrav. Con el reposo; en la habitacion. Encorvándose.

Aliv. Con el movimiento. Al aire libre.

S. C. Sensacion como si hubiera agua en la frente. — Frio en los oidos, ojos, ó en la cara; chispas delante de los ojos. Los objetos parece que son mas pequeños.

Pulsatilla. Dolores de cabeza gástricos, catarrales, reumáticos, que provienen de anemia ó de un desarreglo de estómago y de la menstruacion. — D. de C. en las personas cuya constitucion reclama *pulsatilla*. — Dolores dislacerantes, convulsivos, semilaterales; palpitaciones, sacudidas, punzadas dolorosas.

Agrav. Por la tarde. En el reposo. En una habitacion caliente.

Aliv. Al aire libre. Comprimiendo la cabeza.

S. C. Vértigos; deseos de vomitar; zumbidos ó dolor en los oidos; cara pálida; falta de sed (y de apetito); escalofrios.

Rhus tox. D. de C. reumáticos, ó causados por un baño; ó bien calor en la cabeza causado por la cerveza. — Sensacion de pesadez, presion, hormigueo, dislaceracion, punzadas. — Los dolores se sienten hasta en los oidos, la raiz de la nariz, en los pómulos y en las mándibulas. — Sensacion de vacilacion del cerebro á cada paso.

Agrav. Por la mañana; estando acostado. Con el frío. Bebiendo cerveza.

Aliv. Con el calor. Con el movimiento moderado.

S. C. Rubicundez del rostro. — Agitación del cuerpo.

Sanguinaria. Es uno de los primeros medicamentos que hay que dar en una jaqueca, si los dolores empiezan por la mañana temprano y duran hasta la noche. (Hg.). — La cabeza parece que está tan llena que va á estallar; dolores dislacerantes, punzantes, pulsativos, en toda la cabeza; *sensacion, como si hicieran salir los ojos de sus órbitas*; van acompañados de escalofríos, náuseas, vómitos, y obligan al enfermo á acostarse, porque toda clase de movimiento los agrava. — Segun R. es conveniente *sanguinaria* si los dolores empiezan en el occipucio, se extienden á toda la cabeza, y concluyen por fijarse al lado del ojo derecho.

Sepia. D. de C. gotosos ó neurálgicos; jaqueca que proviene de una plétora abdominal ó de un desarreglo de la menstruacion. — Dolores lancinantes, pulsativos, terebrantes, por encima del ojo derecho ó en la sien; son tan fuertes que hacen gritar.

Agrav. Con el movimiento.

Aliv. Con el reposo en la obscuridad. Con el sueño.

S. C. Náuseas y vómitos.

Silicea. Medicamento principalmente empleado contra los D. de C. crónicos de diversas clases. — Dolores con aturdimiento, dislacerantes, contusivos. — D. de C. que empiezan en la nuca y se extienden por la cabeza; ó dolores que se extienden hasta la nariz y la cara.

Agrav. Por la tarde y noche. Con los trabajos intelectuales. Con el aire frío. Hablando y bajándose.

Aliv. Con el calor de la habitacion. Cubriendo la cabeza con cosas calientes (pero sin que sea apretada fuertemente).

S. C. Sudores en la cabeza; bultos en la cabeza con sensibilidad de la piel de la misma. — Caída de los cabellos.

Spigelia. D. de C. neurálgicos ó reumáticos, con

terebracion, peso, dislaceracion y punzadas. — Jaqueca que se presenta periódicamente; que aumenta y disminuye con el sol.

Agrav. Con toda clase de movimiento; con cualquier esfuerzo. Con el mas pequeño ruido.

Aliv. Estando acostado, con la cabeza alta; lavándola con agua fria. (L.).

Sulphur. D. de C. causados por congestiones sanguíneas, por una plétora abdominal (almorranas), ó por erupciones retiradas; D. de C. crónicos, gotosos y reumáticos. — Congestion con palpitaciones que suben del pecho á la cabeza. — Punzadas, magullamiento, ó sensacion como si la cabeza fuera á estallar. — Dolores presivos, dislacerantes, lancinantes, pulsativos; sensacion de hormigueo y zumbidos en la cabeza; ó sensacion como si un círculo rodease la cabeza.

Los dolores de cabeza se agravan por lo general al aire libre y se alivian en la habitacion.

S. C. Náuseas y vomitos. — El enfermo es inclinado á arrugar su frente.

Veratrum. Dolores de cabeza *gástricos ó nerviosos.* Dolores presivos, pulsativos; sensacion como si uno oprimiese fuertemente la cabeza (de un lado), ó como si el cerebro estuviera triturado.

Agrav. Levantándose.

Aliv. Con la presion exterior. Doblando la cabeza.

S. C. Delirios y locura: desvanecimientos: frio (con sed); sudores frios; náuseas y vómitos. Tirantez de la nuca y orina abundante.

C a d e r a.

Inflamacion de la articulacion de la cadera. — Esta es una enfermedad que se observa con alguna frecuencia en la primera y segunda infancia, y aun en la pubertad. Se desarrolla regularmente con lentitud despues de una caida (quizas insignificante), despues de un golpe, un enfriamiento, etc.; pero en el fondo puede descubrirse

una diserasia. Generalmente es producto del vicio escrofuloso, del sifilítico hereditario y tambien del herpético, aunque del primero lo es mas frecuentemente. El enfermo se queja al principio de dolores en la rodilla y empieza á cogear. A consecuencia de la inflamacion de la articulacion de la cadera, y del tumor mas ó menos pequeño, y á veces bastante grande que se forma (*coxartrocace*), la pierna enferma se alarga, y cuando se aprieta la cabeza del hueso femur contra su cavidad (cotiloidea), se sienten fuertes dolores. Si la enfermedad avanza, la cabeza del femur se disloca y la pierna se acorta. Mas ó menos tarde, y si la enfermedad no se cura, ó se estaciona, como sucede á veces, sobreviene la supuracion y la caries del hueso, y el enfermo muere, despues de hechar arroyos de pus, de extenuacion é inanicion.

Al princio de la enfermedad debe darse principalmente *belladonna*, despues *mercurius*, y si no bastasen *sulphur*; si no producen efecto alguno, *colocynthis* y despues *rhus*: mas tarde *Calc.*, *silic.*, ó *kali c.*, *lyc.*, *phos.* (R.).

Cuando la supuracion es muy abundante, el enfermo está muy debil, demacrado, con recargos febriles por las noches, sudores, diarrea, etc., consultense: *Asa foet.*, *phos.*, *silic.*, *sulph.* (Alvarez).

Segun el Dr. Jeanes, *stramonium* es el medicamento principal contra la inflamacion de la cadera del lado izquierdo. R. lo recomienda en todos los abscesos que hacen sufrir al enfermo tanto que le vuelven loco.

Si la pierna se alarga, dése: *Coloc.*, *kreos.*, *rhus.*, *sulph.* (B.), y thuja (Wolf).

Si se acorta: *Ambr.*, *coloc.*, *mez.*, *oleand.*, *phos.*, *sep.* (B.).

Para la inflamacion reumática ó reumatismo agudo de la articulacion de la cadera, consultense y veanse los medicamentos del articulo *reumatismo*.

Café.

Sufrimientos por el abuso del café. — Los medicamentos principales contra los síntomas producidos por el abuso del café, son: *Nux v.*, *cham.* é *ignat.*

Nux v. Gran impresionabilidad de todo el sistema nervioso; dolores de cabeza penetrantes, como si *introdujeran un clavo ó varios en la cabeza*, agravados con toda clase de movimiento; dolores violentos de estómago; humor irascible, colérico; insomnio, palpitaciones de corazón, astricción de vientre, eructos agrios, y acedias de estómago.

Chamomilla. — Dolores de estómago que cesan por mas ó menos tiempo con el uso del café; dolores de cabeza y muelas; sensibilidad escesiva de todo el cuerpo, con gritos, llanto y desesperacion; cólicos intensos; gran ansiedad en la boca del estómago; diarreas, vómitos; agravacion de todos los síntomas con la quietud; alivio con el movimiento, y deseo de estar en movimiento continuo.

Ignatia. — Dolores de cabeza presivos, penetrantes, con pulsaciones en toda la cabeza, y que se alivian bajandose; debilidad general y localizada á veces en el estómago; colicos con astricción de vientre; tristeza, melancolia y llanto continuo, alternando con desesperacion, y á veces aunque raras, alegría.

Pueden tambien consultarse en caso de necesidad: *canth.*, *caustic.*, *cocc.*, *hep.*, *ipec.*, *lyc.*, *merc.*, *puls.*, *sulph.*

Cantáridas.

Si se han introducido cantáridas en los ojos, ó tintura de las mismas, lo mejor es la aplicacion de claras de huevo ó sustancias mucilaginosas, para aplacar los dolores violentos que se experimentan. Si las cantaridas ó su tinctura han penetrado en el estómago, se hacen tomar las anteriores sustancias, para contrarrestar los dolores quemantes que se sienten en el estómago. En ambos casos se hace oler al enfermo á la vez una solucion

alcohólica fuerte de alcanfor, y si el caso es grave se friccionan con la solución las sienes, los muslos en su parte interna y los lomos; esto último si las cantáridas han producido dolores en los riñones y vejiga de la orina, ardor intenso al orinar, dolores en los costados, inquietud, sed é insomnio. Se administrará á la vez *camph.* con frecuencia.

Los síntomas que sobrevienen á consecuencia de la acción de los vegigatorios de cantáridas, como son: irritación ó inflamación de la vejiga de la orina y riñones, dificultad ó imposibilidad de orinar, orina que sale gota á gota, y quema las partes por donde pasa, fiebre, dolores en los costados, dolor de cabeza, agitación y hasta subdelirio, dése para combatirlos con éxito, *Camphora*, una cucharada cada dos ó tres horas segun la gravedad de los síntomas. Si la fiebre fuera muy violenta, dése primero *acon.*, y luego *camph.* Si este último no acabase de quitar todos los síntomas, se dará *Pulsat.*; y despues, si hubiere necesidad: *Bell.*, *Merc.*, *phos.*, *sep.* y *sulph.*

Carbunco.

El carbunco es un tumor gangrenoso de curso rápido, muy grave, que se presenta en diversos puntos de la piel. Hay dos clases de carbunclos, el *sintomático* y el *idiopático*. Padecen el primero los que viven con malas condiciones higiénicas, como son: mal régimen, uso de alimentos escasos ó malos, el trabajo escesivo en un dia de sol canicular, el cansancio considerable, las aguas poco sanas, la miseria, etc. El segundo, ó sea el carbunco por inoculación, ó *idiopático*, es debido á la acción del virus carbuncloso de los animales sobre la piel del hombre, y lo padecen de preferencia las personas que se hallan en relación constantemente con los animales, como son los pastores, esquiladores, carniceros, vaqueros, etc.

Esta enfermedad tan grave requiere la asistencia de un médico homeópata experimentado; pero en los casos

en que no lo haya ó resida lejos de la localidad, hágase lo que aconsejamos á continuacion.

Esta dolencia, desapercibida al principio para algunos, empieza por lo general por una disminucion considerable de fuerzas, y á veces por una sensacion de malestar ó de terror profundo, inesplicable. Una ó muchas pustulas se presentan despues en el punto en que se ha de desarrollar la enfermedad, se abren derramando una serosidad rogiza que va acompañada de un ardor y picor insoportables. Se va poco á poco ó rápidamente formando un tumor, en cuyo centro se manifiesta un espacio negro como el carbon. El cutis se pone reluciente, hay mucha dureza, y del centro del tumor parten dolores punzantes, intensos, que á veces producen congojas, y toda la piel del cuerpo acusa un calor ardiente. Segun progresa la enfermedad aumenta la gangrena de las partes que rodean el carbunco, se forman nuevas pústulas á veces; el pulso se pone pequeño y concentrado, y se presentan sucesivamente todos los sintomas de la adinamia, con postracion grande de fuerzas, el hipo, la sofocacion, sudores frios, etc.

Si la enfermedad se trata en sus primeros sintomas, debe darse *Arnica*, una cucharada cada tres ó cuatro horas, y luego *Nux v.* si el primero no bastase.

Cuando se encuentra al enfermo con mucha fiebre, sed, agitacion, dolores intensos, no hay aun gangrena, ó existe en pequeña extension, prescribese *Aconitum*, una cucharada cada dos, tres ó cuatro horas, hasta que hayan rebajado los síntomas febriles.

Pero el medicamento principal, el especifico por decirlo asi del carbunco, es *Arsenicum*, que hay que administrar con mucha frecuencia al principio, hasta conseguir que el tumor adquiriera buen aspecto, se limite la gangrena, y disminuyan ó desaparezcan los dolores insufribles que emperimenta el enfermo y no le dejan un momento de reposo; segun se va notando el alivio, se van retrasando las epocas de administrar el medicamento. Se puede dar despues de *arn.*, ó *acon.*, segun los casos,

y tambien segun en el periodo de la enfermedad en que se empiece á medicinar al enfermo.

Hay casos en que hay que recurrir á otros medicamentos, como son: *Apis.*, *china.*, *hep.*, *lach.*, *lyc.*, *merc.*, *nitri ac.*, *rhus.*, *silic.*, *stram.*

Carruage.

Sufrimientos causados por el movimiento en carruage.

— El medicamento principal contra los sintomas producidos por el movimiento en carruage, es *Cocculus*, y si este no bastase, d ense: *Ars.*, *ipec.*, *nux v.*, *petr.*, *sep.*, *silic.*, *tabac*; 6 *Borax*, *hep.*, *ign.*, *nux m.*, *sulph.* (B.). — Si el movimiento del carruage calma los dolores, d ense: *nitri ac.* y *graph.*

Cerebro.

Inflamacion del cerebro (Encefalitis). — *Hidrocefalo agudo.* — Podemos tratar de estas dos enfermedades   la vez, porque no se trata aqui de otra cosa mas que de llamar la atencion del l ctor sobre los primeros sintomas de una enfermedad del cerebro,   fin de que pueda buscar   tiempo los auxilios de un m dico. Estas enfermedades empiezan por un insomnio 6 por un despertar brusco y asustado, por gritos constantes y entrecortados, por gran miedo   la luz y al ruido. El enfermo se asusta facilmente, rechina los dientes, es acometido de ligeras convulsiones y violentos dolores de cabeza. — Desde que se advierten estos sintomas en los ni os, es preciso buscar sin tardanza un m dico home6pata. Solo cuando no lo haya en la localidad, 6 mientras se le va   buscar y viene, pueden darse los medicamentos siguientes:

Aconitum. Cuando hay fiebre, agitacion, sed, insomnio, etc.

Belladonna. Es muy eficaz cuando el enfermo tiene fuertes dolores de cabeza, horror   la luz, los ojos inyectados de sangre, y un delirio violento; movimientos

convulsivos de los miembros; constricción espasmódica de la garganta; calor intenso en la cabeza, con abultamiento de las venas de la frente, sienes y cuello; cara encarnada y abotagada; sueño soporoso y ojos medio abiertos.

Bryonia. — Escalofrios prolongados, calor en la cabeza y gran sed; dolores de cabeza, deseo continuo de dormir, delirio, gritos, sobresaltos.

Cina. En las personas que padecen lombrices. Vómitos continuos, rechinamiento de dientes, prurito incesante en las narices y á veces en el ano, con los demás síntomas de la enfermedad cerebral.

Opium. Cuando hay sopor, sueño profundo con ronquidos, cara rubicunda, ojos medio abiertos; postración profunda, inmovilidad, con *ausencia de todo deseo, de todo lamento.*

Stramonium. Delirio furioso, violento, con esfuerzos para arrojar de la cama, deseando morder, golpear y hacer daño á todos los que rodean al enfermo; gemidos, inquietud incesante, insomnio; mirada fija, deseo de huir de un modo lento y temeroso; ó bien sueño casi natural, pero con gemidos, estremecimientos del cuerpo, gritos, agitación.

Apis. Conviene sobre todo á los niños que se despiertan gritando; cuando el hidrocéfalo es agudo y le ha precedido una erupción erisipelatosa; cuando hay postración de fuerzas con pérdida del conocimiento; cuando está paralizado un lado del cuerpo, los dedos de los pies doblados, los ojos bizcos, hay náuseas estando hechado, el aliento es fétido y la lengua hendida.

Déense todos los días cada tres ó cuatro horas algunos glóbulos de *apis* 30^a; desde que el niño dege de despertar gritando, no deben repetirse las dosis mas que dos ó tres veces por día.

Sulphur se prescribe en los casos en que el hidrocéfalo se desarrolla lentamente después de erupciones crónicas de la piel. La cabeza cae hacia atrás. El enfermo desea estar hechado con la cabeza baja. Su cara

tan pronto está encarnada como pálida; cuando levanta la cabeza tiene náuseas. Su boca exhala un olor acre. La orina es como si estuviera mezclada con harina (Hg.).

Hidrocéfalo crónico. — Grauvogl indica como medicamento principal *calc. carb.* ó *phosphorica* en trituraciones bajas. Si por no haber médico homeópata en la localidad, hubiera necesidad de consultar á un médico alópata, *no debe permitirsele nunca aplicar nieve ó hielo sobre la cabeza del niño*; este es un tratamiento irracional que puede conducir á la muerte. Como el órgano es tan noble, cuanto mas fuerte sea la aplicacion del hielo ó de la nieve, mas cierta es la muerte. (Las compresas de agua caliente, como las ha recomendado el célebre Romberg, y como se emplean en las inflamaciones del vientre y otros órganos, son mucho mas preferibles.)

Ademas de los medicamentos que acabamos de indicar, se puede hacer uso de los siguientes:

Arnica si la enfermedad proviene de una caída, un golpe, una sacudida, etc.

Glonoin, bell., bry., contra las malas consecuencias de una insolacion.

Apis, bell., rhus., si la enfermedad se declara despues de una erisipela ó escarlatina.

Glonoin, laches (Hg.) y *bry.*, cuando se ha aplicado hielo ó nieve á la cabeza.

Bell., hep., merc., ó puls., despues de un flujo de oidos suprimido.

Ciática.

La ciática es una verdadera neuralgia del nervio ciático, en la que la articulacion de la cadera no padece nada. (Lo que se llama ciática del lado anterior del muslo no es, propiamente hablando, una verdadera ciática; no es mas que una neuralgia del nervio crural.) Esta enfermedad dolorosa y tenaz es por lo comun de naturaleza reumática, y es causada por un enfriamiento. Los medicamentos principales son: *Bell., canth., cham., coff.*,

coloc., *ign.*, *nux v.*, *puls.*, *rhus.*, en los casos agudos; *ars.*, *calc.*, *caust.*, *lach.*, *lyc.*, *merc.*, *sep.*, *sulph.*, para los casos crónicos.

El Dr. Hering proporciona las indicaciones siguientes:

Belladonna. Ciática con dolores en la cadera, sobre todo por la noche. Los dolores obligan al enfermo á cambiar de posición. — Gran sensibilidad al tacto, aun al contacto de los vestidos. — Los dolores en la pierna no son soportables mas que teniéndola suspendida.

Chamomilla. — Ciática (del lado izquierdo). — Dolores tractivos desde la cadera á la rodilla, ó dolores desde la rabadilla á las plantas de los pies. Aumentan por la noche, y obligan al enfermo á gritar con el mas ligero movimiento. — Despues de los accesos hay una sensación de adormecimiento (en las partes enfermas).

Coffea. Ciática ó neuralgia del nervio crural. Los dolores se agravan al andar, se alivian con la presión (escepto en el punto de salida del nervio crural). — Los dolores se presentan por accesos; son dislacerantes y lancinantes, se agravan por la tarde y durante la noche, con inquietud é insomnio.

Colocynthis. Ciática (del lado derecho). — Dolores lancinantes en el hueso sacro, obligan al enfermo á guardar el mas absoluto reposo, porque cualquier movimiento los aumenta. — Punzadas tensivas en la cadera, en la rodilla y tobillos, rápidas como el rayo, desde el hueso sacro al talon; los sintomas se agravan por la tarde y noche; el enfermo tiene gran deseo de beber agua. Cuando cesan los dolores, queda la parte afectada como muerta é insensible.

Ignatia. Ciática crónica, intermitente, que disminuye en verano, aumentando en invierno. — Palpitaciones violentas como si la cadera fuera á saltar; frio y sed seguidos de calor, sobre todo en la cara, con ausencia de la sed.

Nux vomica. Ciática con dolores que van desde los dedos del pie á la cadera, ó de la cadera á la corva.

Aumentan á la noche, con el movimiento, levantando la pierna. El enfermo padece sobre todo cuando tiene necesidad de hacer de vientre.

Pulsatilla. Ciática (izquierda) á todo lo largo del nervio; los dolores obligan al enfermo á cambiar de posicion, aunque el movimiento los aumenta. Se ve acometido de angustias tan fuertes, que llora frecuentemente; no tiene sed. La enfermedad aumenta por la noche. Cuanto mas aumentan los dolores, mas escalofrios hay.

Rhus. Ciática por haberse mojado el enfermo, ó haber hecho un esfuerzo. Dolores con adormecimiento, hormigueo ó tension paralitica del miembro enfermo. Aumentan con el reposo, y en el momento en que uno se mueve (*ferr.*); disminuyen con el calor seco (R.).

Clorosis.

(*Opilacion*).

En esta enfermedad tan frecuente en las jóvenes, es preciso tener muy en cuenta la menstruacion. Si esta es ordinariamente escasa ó irregular, y aun se retrasa, dése: *Puls.*, ó *sulph.*, ó bien: *kali c.*, *lach.*, *sep.* y aun *calc. c.* — Si es muy abundante ó se anticipa, dése: *Calc. c.*, ó *nux v.*, *ferr.*, *china*, *bell.* — Si está suprimida: *Con. m.*, *graph.*, *kali c.*, *lach.*, *puls.*, *sep.*, *sulph.*

Segun el Dr. Wolf, *thuja* debe ser un medicamento especifico contra la clorosis. El Dr. Schaedler recomienda *natr. m.* cuando las enfermas tienen con frecuencia accesos de debilidad como si fuera el principio de una ligera congoja, acompañados de náuseas.

Si las enfermas hubieran hecho abuso del hierro en dosis alopáticas, es preciso darlas con insistencia *Pulsat.*, y si este no bastara *hepar*. Si no hubieran hecho uso del hierro, se las puede dar una trituracion baja de *Ferr. m.*, ó agua mineral ferruginosa en pequeñas dosis, como un cuarteron ó á lo mas media libra de agua en ayunas, durante dos ó tres semanas cuidando de que las enfer-

mas paseen media ó una hora despues de tomar el agua mineral.

Cobre.

Cólicos de cobre. — El medicamento principal contra el cólico de cobre, caracterizado por dolores agudísimos de vientre que hacen gritar, diarrea, calambres y hasta frio, con sed intensa, es *Veratrum*, del cual se dará al enfermo una cucharada cada dos, tres ó cuatro horas, hasta que los sintomas disminuyan, retrasando entonces las épocas de administracion del medicamento. Si este no bastase, consúltense: *Bell.*, *hepar.*, *ipeca.*, *nuxv.*; y para las consecuencias de la intoxicacion lenta del cobre: *Aurum*, *cálc. c.*, *cocc.*

Envenenamiento por el cardenillo. — Este accidente bastante grave á veces, suele observarse con frecuencia en las familias, por descuidos de los cocineros con las vasijas de cobre, así como de los cafeteros, confiteros, lecheros, etc. Los que han comido alimentos ó tomado bebidas impregnadas mas ó menos de cardenillo, sentirán en mayor ó menor escala, náuseas, vómitos con suma angustia, fuertes dolores de estómago, gran ansiedad en el estómago, con temor de morirse, calambres en las estremidades y sobre todo en los dedos de las manos, y frio.

El primer socorro que hay que procurar á un envenenado por el cardenillo, es meterlo en la cama y abrigo bien, y administrarle despues cualquiera de los medios siguientes: *el agua albuminada ó en su defecto claras de huevo; el agua bien azucarada, el agua gomosa, y la leche*, escepto en el caso en que esta hubiera causado el envenenamiento por estar mezclada con el cardenillo. Despues de administrar cualquiera de estos medios, ó aunque así no hubiera sucedido, se recurrirá al medicamento principal para combatir esta clase de envenenamiento, y que siempre nos ha dado escelentes resultados, y es *Ipecacuanha*, de la que se disolverán

seis ú ocho glóbulos en medio vaso de agua, y se dará una cucharada de media en media hora, cada cuarto de hora, cada diez minutos, segun la urgencia del caso, retrasando las cucharadas segun vayan disminuyendo los sintomas. Si *ipéc.* no bastase para contrarrestar los efectos del cardenillo, recúrrase á *veratr.*, *arsen.*, *camph.*, *nux v.*, *sulph.*, y tambien *aur.* puede consultarse con fruto.

Cólera.

(*Cólera morbo asiático. — Cólera epidémico*).

El cólera es, como todo mundo lo sabe, una enfermedad muy peligrosa, y que ocasiona una muerte pronta; se extiende de tiempo en tiempo por diversos países en forma de epidemia. Es un hecho que la medicina alopática ha obtenido escasísimos resultados de su tratamiento en esta enfermedad, porque casi siempre ha perdido el 50 por ciento, y hasta el 79 y 80 por ciento. La homeopatía, por el contrario, ha perdido siempre por término medio un so por ciento, y aun menos, como sucedió en la epidemia de 1865.

Cuando el cólera, esta enfermedad tan aterradora, se declara, debe recomendarse á todas las personas se preserven de toda clase de excesos, de las bebidas alcohólicas, de las verduras, de los enfriamientos y mojaduras, y de evitar todo lo que no se podría soportar en estado de salud, y sobre todo debe recomendarse que no se descuide la diarrea incipiente. (N. B. — Es preciso guardarse muy bien de quererla curar con opio ó alguno de sus preparados; porque rara vez un enfermo atacado de cólera que ha tomado dosis de opio curará de dicha enfermedad; y si sobrevive al ataque de cólera propiamente dicho, sucumbirá casi siempre á un estado tifoideo que sobrevendrá á consecuencia de este tratamiento.).

Los partidarios de la homeopatía deben siempre proveerse en una epidemia de los preservativos que luego indicaremos, porque en una enfermedad que tiene un

curso tan rápido, es muy importante no perder tiempo, y que el enfermo no use medicamento alguno alopático mientras llega el médico homeópata.

(Varios son los preservativos recomendados por los médicos homeópatas contra el cólera. Unos recomiendan: *Ipec.*, *ars.* y *veratr.* Otros: *Ars.*, *veratr.* y *cupr.* Otros: *Phosphori ac.*, *ars.* y *carb. v.*, y otros finalmente solo el *alcanfor* en tintura. De todos estos preservativos, los mas seguros y eficaces siempre, son *Arsenicum* y *Veratrum*; y son los que recomendamos eficazmente á todos los partidarios del sistema homeopático, para que los usen del modo siguiente. Siempre que se presente el cólera en una localidad ó en las inmediatas, se proveerán de dos frascos llenos de glóbulos, el uno de *Ars.*, y el otro de *Veratr.* Cada segundo ó tercero día tomarán una dosis de cuatro glóbulos disueltos en dos cucharadas de agua, hora y media antes del desayuno, de *Arsenicum*, y de *Veratrum* al otro segundo ó tercero día; es decir, que cada segundo ó tercero día tomarán una vez *Ars.*, y otra *Veratr.*, y así seguirán hasta que se concluya la epidemia, tomándolos alternados. Si la epidemia fuera muy intensa, puede tomarse del modo arriba indicado, un día *Ars.* y el otro *Veratr.* hasta que vaya disminuyendo, en cuyo caso se tomarán cada tres ó cuatro días una vez *Ars.*, y otra *Veratr.* — Alvarez).

En los ataques que empiezan despues de media noche por diarrea acompañada de náuseas, vómitos y calambres en las pantorrillas y plantas de los pies, recomienda Hering *sulphur* disuelto en agua, tomando una gota despues de cada deposicion. Tambien recomienda como preservativo unos calcetines de lana espolvoreados con flores de azufre, renovados cada segundo día. (Método abandonado por ineficaz en España-Alvarez).

Otro medicamento empleado ya por Hahnemann es el *alcanfor*; se toman de 1 á 3 gotas de una solución alcohólica saturada de alcanfor, cada 5, 10, 20 ó 30 minutos segun la necesidad. El *alcanfor* conviene principalmente al principio de la enfermedad, cuando la

diarrea y los vómitos son de poca importancia, pero aun cuando se presenten en el enfermo una grande postracion de fuerzas, su piel esté fria, y no soporte á pesar de esto el calor exterior y rehuse toda clase de abrigo por ligero que sea.

(Cuando una persona se vé acometida de la diarrea colérica, con ó sin vomitos, debe dársela *Ipec.*, ó *phosphori ac.* si es muy abundante, con mucho aire y debilidad en las piernas. Estos dos medicamentos son los principales para cohibir esta diarrea, que es el primer periodo del cólera, y evitar que venga el segundo periodo. Si sobreviene el segundo periodo, ó empieza la enfermedad por él, caracterizado por nauseas y vómitos de materiales blanquzcos, diarrea con fuertes dolores de vientre, acuosa y parecida al agua de arroz, sed intensa, frio, descomposicion del semblante, etc., *Arsenicum* es el principal medicamento, y si al cabo de dos ó tres horas no hubiera alivio alguno, recúrrase á *Veratrum*. Estos medicamentos deben darse segun la urgencia del caso cada so minutos, cada cuarto de hora, cada media hora; retrasando las dosis segun se vaya declarando el alivio. En el tercer periodo ambos medicamentos prestarán preciosos auxilios; y tanto en este periodo como en el segundo si ellos no bastasen, dése *Cuprum* cuando á los sintomas mencionados se une el color cianósico ó azulado del semblante y fuertes calambres en las estremidades. *Camphora*, cuando hay ademas suma postracion de fuerzas, frialdad glacial de la piel, horror al calor exterior y á todo abrigo, porque el enfermo cree que se va á axfisiar. En los casos desesperados, cuando se cree que el enfermo va á espirar, el pulso es apenas perceptible al tacto, el aliento es frio, hay insensibilidad completa, *carb. v.* puesto en glóbulos ó gotas sobre la lengua del enfermo, producirá en la mayoria de los casos una reaccion suficiente, para que él ó cualquiera de los medicamentos ya mencionados consigan la curacion del enfermo. — Alvarez.)

Segun el Dr. Lippe, *secale* ha sido el específico en una epidemia de cólera en Filadelfia. Las principales indicaciones eran: gran deseo de bebidas acidas y gran aversion al calor exterior, de suerte que los enfermos no querian dejarse abrigar bien. El Dr. Boyce recomienda *acomit.* en bajas diluciones, como medicamento principal contra el cólera y aun en su último periodo (álgido).

Quando hay postracion de fuerzas y frialdad del aliento: *Carb. v. ó hydrocyani ac.* Si al sobrevenir la reaccion en el 2º ó 3º periodo del cólera, se presentase el tifus, lo que sucede frecuentemente con el tratamiento alopático, recomendamos principalmente *Rhus, ó bry., carb. v., hydrocyan. ac., laches., lyc., phosphori ac., ó ars., camph., natr. m., op., sulph.*

P. S.— Sucede en general con el cólera lo que con otras enfermedades epidémicas: el caracter epidémico puede variar de tal modo, que medicamentos muy eficaces en una primera epidemia, no tienen ó producen efecto alguno en la que sigue. (Sin embargo, en todas las epidemias hasta ahora transcurridas de cólera en España, *Arsenicum* y *Veratrum* han sido siempre los medicamentos principales y que han triunfado de los casos mas desesperados. No asi *Cuprum, Camphora, Carbo veget.* y otros, que siendo muy eficaces en una epidemia, no han servido de nada en la que ha seguido. En esto se funda nuestra opinion, de que tan pronto como se presente una epidemia de cólera en una localidad, tomen sus habitantes como preservativos, *Arsenicum* y *Veratrum* alternados; y añadiremos ahora, que sin perjuicio de alternar con ellos el medicamento de los antes mencionados, que mas eficaz sea para combatir la epidemia reinante, en el transcurso de la misma. — Alvarez).

Colerina.

(*Diarrea colérica — ó Cólera esporádico?*)

Esta enfermedad es poco peligrosa, y raro es el enfermo que se muere, por lo menos con el tratamiento homeopático. El medicamento principal para la colerina es *Ipec.*, medicamento que en la mayoría de casos bastará para curarla: si la diarrea va acompañada de ruido de gases, dése *phos. ac.* (ó bien *podophyll.* ó *croton tigl.*) En los casos que ninguno de estos medicamentos haya producido alivio, recúrrase á *Ars.* ó *veratr.*, que cualquiera de estos acabará la curacion.

Cólicos.

Debe ante todo investigarse la causa del cólico, lo que lo haya producido: por esto se clasifican los diferentes cólicos como sigue, indicando los medicamentos que respectivamente les convienen:

Cólicos por indigestion de alimentos. — Generalmente los hace desaparecer una pequeña taza de café; si esto no bastase, dénse:

Arsenicum, si se ha tomado agua helada ó helados.

Ipecacuanha, despues de haber comido ensaladas, frutas acidas, ó alimentos en gran cantidad y de difícil digestion.

Nux vomica, á los aficionados á manjares suculentos y bebedores.

Pulsatilla, despues de haber tomado alimentos grasos ó flatulentos, ó despues de un enfriamiento de estómago.

Cólicos nerviosos. — El medicamento principal es *coloc.* — Segun R. pueden estar indicados los medicamentos siguientes:

Belladonna, cuando hay dolores en la region umbilical, como si se pinchasen ó arañasen los intestinos. Los dolores disminuyen con la presion exterior.

Ignatia, cuando los cólicos son la consecuencia de un disgusto ó susto.

Opium, despues de un susto grande y súbito.

Plumbum, cuando los accesos tienen lugar con retraccion del ombligo.

El Dr. Baehr recomienda ademas de *plumb.*, *cupr.* y *ars.*

(*Ars.*, conviene cuando hay frio general, con ó sin calambres en las extremidades, sed ardiente, y dolores de vientre profundos, insoportables, con agitacion. — *Nux vomica*, cuando con los dolores coexiste estreñimiento de vientre, y el enfermo se está quieto, casi inmovil, porque el movimiento le agrava los dolores de un modo extraordinario. — *Pulsatilla*, cuando ademas de los dolores hay diarrea, llanto, gritos, agitacion, el enfermo no se puede estar quieto, porque la quietud aumenta los dolores, y encuentra alivio moviéndose continuamente. — Alvarez.)

Cólicos reumáticos. — Provienden de un enfriamiento ó de haberse mojado todo el cuerpo. Consúltense:

Aconitum. Despues de un enfriamiento al aire seco y frio, ó bien despues de un sudor suprimido.

Dulcamara. Despues de un enfriamiento por el aire frio y húmedo, con náuseas y diarrea.

Pulsatilla. Cuando se han mojado los pies.

Rhus. Cuando estando sudando el cuerpo, ha sido completamente mojado por la lluvia, ó despues de un enfriamiento y sobre todo de un baño.

Segun el Dr. Baehr, *coloc.* es el medicamento por excelencia en este mismo caso, de modo que le parece inutil indicar otros.

Cólicos ventosos. — Se caracterizan por hinchazon y ruido de vientre; los gases distienden la region superior de aquel y dificultan la respiracion, ó bien oprimen la vegiga y el intestino recto. Dénse:

Belladonna. Cuando en la superficie del vientre se forma un tumor oblongo en la direccion transversal, con congestion de sangre en la cabeza.

Carb. v. Si los cólicos van acompañados de eruptos agrios y fuertes, sin producir un alivio sensible. (R.)

Chamomilla. Cuando los cólicos son la consecuencia de una cólera; y los eructos frecuentes son agrios y penosos.

China. Si los gases al expelerse no producen alivio (G.).

Lycopodium. En las personas que padecen habitualmente estreñimiento de vientre, cuando los gases comprimen la vejiga de la orina y el recto (R.).

Nux vomica. Si los gases comprimen fuertemente el pecho, la vejiga y el recto (Baehr).

Opium. Si los gases comprimen en demasia la vejiga y el recto, sin que haya espulsion de gases, ni evacuaciones de vientre ni de orina (R.).

Congoja.

(*Desvanecimiento*.)

Los medicamentos para combatir una congoja se prescriben, atendiendo á las causas de la misma y circunstancias que la acompañan. Elijanse:

Op. ó *acon.*, despues de un susto ó terror.

Coff., despues de una gran alegría.

Ign. ó *cham.*, despues de una fuerte emocion.

China, despues de una pérdida de sangre.

Hepar, cuando hay pocos dolores.

Acon., ó *cham.* ó *coff.*, cuando los dolores son violentos.

Veratr., cuando los dolores ponen como *loca* á la persona.

Coc., *veratr.*, cuando sobreviene la congoja y accesos de debilidad, despues del *mas pequeño movimiento*.

Nux moschata, si la congoja ha sido precedida de *palpitaciones de corazon* y seguida de *soñolencia*.

Nux vom., en los bebedores, personas de vida *sedentaria*. etc.

Carb. veg., despues del abuso del mercurio.

Nux v. ó *phosph. ac.*, despues de las comidas.

Cham., *hep.*, si la congoja es precedida de vértigos.

Ipec., si va precedida de náuseas.

Glonoin ó *lach.*, en las mugeres gruesas.

Constipado.

(*Coriza. Romadizo.*)

El constipado ó coriza puede ser agudo y crónico. El agudo se presenta á veces en forma de epidemia, siendo á veces por su intensidad una verdadera gripe. Puede presentarse ademas bajo la forma fluente ó la seca.

Los principales medicamentos contra la forma fluente, son: *Ars.*, *cham.*, *dulc.*, *euphr.*, *hep.*, *lach.*, *merc.*, *pulsat.*, *rhus.*, *sulph.*; y *Acon.* en los casos de sintomas febriles, con dolor de cabeza y pesadez de la misma, sed, fiebre con recargos, sequedad y obturacion de la nariz que cambia pronto en un flujo nasal abundante, acuoso — Alvarez.

Arsenicum. Flujo nasal acuoso, acre, quemante, estando la nariz obstruida.

Chamomilla. Principalmente en los niños; flujo nasal acuoso, acre y que produce escozor; cabeza pesada; narices ulceradas por el flujo; sed y escalofrios; rubicundez de una megilla con palidez de la otra.

Dulcamara. Cuando hay nieblas, y en general un tiempo lluvioso, frio y húmedo. Voz ronca, obturacion de la nariz con flujo acuoso, que se suprime facilmente con el mas pequeño enfriamiento; agravacion con el reposo, y flujo de sangre por la nariz.

Euphrasia. Constipado que afecta tambien los ojos, con secrecion de lágrimas acres y flujo nasal ardiente.

Hepar. Cuando cualquier aire frio provoca el coriza, y en los casos en que *merc.* no haya sido suficiente, ó el enfermo haya hecho abuso de este medicamento. El coriza no ocupa por lo comun mas que un lado de la nariz, y existe á la vez dolor de cabeza que se agrava con el movimiento.

Lachesis. Flujo abundantísimo, acuoso, por la nariz, con hinchazón y escoriación de la nariz y labio superior, lagrimeo y estornudos frecuentes.

Mercurius. Medicamento principal contra el coriza epidémico, si el calor molesta y no se puede soportar á la vez el frío; habiendo á la vez sudor y sed. Estornudos frecuentes; hinchazón, rubicundez y ulceración de la nariz y labio superior, con flujo abundante de mucosidades fétidas, acres. — Si *merc.* no fuese suficiente (ó si se ha abusado de él) dénese: *Hepar* ó *laches.*, y mas tarde *bellad.*

Pulsatilla. Constipado que quita el gusto y el olfato, acompañado de escalofríos, falta de sed; flujo de un moco amarillo, espeso; carácter quejumbroso; llanto (Conviene despues de *Cham.* — Alvarez).

Rhus. Flujo de mucosidades sin que haya un verdadero constipado. Estornudos frecuentes. — Tiempo lluvioso.

Sulphur. En los casos rebeldes. Secreción abundante de mucosidades espesas, puriformes; pérdida del olfato; escoriación de la nariz.

En el coriza seco, caracterizado por falta de secreción de mucosidades de la nariz, con fuerte obturación de esta, se prescriben comunmente: *Amm. c.*, *bry.*, *calc.*, *nux v.*, *silic.*, *sulph.*

Ammonium carb. — Constipado con nariz completamente obstruida, sobre todo por la noche; gran sequedad de la nariz; accesos de sofocación al dormirse; lagrimeo; flujo de sangre por las narices. (Remedio también muy ventajoso contra la difteria con síntomas semejantes.)

Bryonia. Coriza crónico seco, con sequedad de las narices, y afección de la frente y senos maxilares.

Calcarea carb. — Sequedaz muy molesta de las narices, con flujo de sangre á veces; olfato excesivamente sensible; estornudos frecuentes; olor fétido ante la nariz, como de huevos podridos ó pólvora.

Nux v. Coriza por el día y en una habitación ca-

liente, que es húmedo ó fuente, pero que es seco al salir y andar por la calle, y por la noche.

Silicea. Coriza seco crónico ó fluuyente y acre. — Ulceras profundas en el interior de las narices.

Sulphur. Obturación y grande sequedad de la nariz con flujo de sangre á veces; pérdida del olfato. En los casos pertinaces.

Si sobrevienen dolores de cabeza á consecuencia de la supresión repentina de un coriza, dén se:

Aconitum, luego *puls* ó *china* ó *spigel.*, cuando los dolores son lentos, sobre todo en el lado izquierdo.

Belladonna. Dolores pulsátiles, sobre todo en el lado derecho.

Contra las sintomas que se desarrollan en el pecho á consecuencia de un coriza suprimido repentinamente dense: *Ipec.*, ó *ars.* y *bry.*, ó si no bastasen, *sulph.*

En los casos agudos deben darse los medicamentos en solución, una cucharada cada tres ó cuatro horas; en los crónicos, una cucharada por la mañana y otra por la noche, ó á dosis únicas, y á altas dinamizaciones.

Convulsiones.

Se da el nombre de convulsión á los movimientos ó contracciones involuntarias de los músculos. Se distinguen dos clases de convulsiones.

1. La convulsión tónica, en la que es continua la contracción de los músculos. La convulsión ó espasmo puede atacar algunos músculos, como los de la pantorrilla ó los del antebrazo en los escribientes, ó bien se hace general, en cuyo caso existe el tétanos.

2. La convulsión ó espasmo clónicos, en los que alternan rápidamente la contracción y relajación de los músculos; lo que produce movimientos convulsivos y temblor de ciertos miembros ó de ciertos grupos de músculos, porque el espasmo tónico se limita á ciertas partes del cuerpo. Si el espasmo es general, tienen lugar las convulsiones, la corea, etc.

Los medicamentos principales contra las convulsiones en general, son: *Bell.*, *cicut.*, *cupr.*, *hyosc.*, *stram.*, *tarant.*; ó *calc.*, *cham.*, *cocc.*, *con.*, *ign.*, *ipéc.*, *nux m.*, *op.*, *sec.*, *sulph.*

Contra las convulsiones tónicas: *Bell.*, *cham.*, *cupr.*, *hyosc.*, *op.*, *sep.*, *stram.*

Contra las convulsiones clónicas: *Bell.*, *cicut.*, *nux v.*, *plat.*, *sep.*, *tarant.*

No podemos hacer otra cosa mas que indicar los medicamentos principales y mas recomendados por los mejores prácticos homeópatas de todos los países, contra las diferentes clases de convulsiones, por no ser posible fijar una sintomatología exacta de cada medicamento.

La *epilepsia* exige principalmente: *Bell.*, *calc.*, *caust.*, *cicut.*, *cina.*, *cupr.*, *hyosc.*, *stram.*, *sulph.*, *tarant.*

Si no hay pérdida del conocimiento: *Cina.*, *stram.*, ó *magn. c.*, *nux m.*

Si la hay: *Calc.*, *canth.*, *cicut.*, *hyosc.*, *nux v.*, *plat.*, *plumb.*

Si hay convulsiones: *Bell.*, *cham.*, *cupr.*, *hyosc.*

Si el cuerpo se pone rígido: *Ipec.*, *lach.*, *mosch.*, *plat.*, ó *ign.*, *merc.*, *op.*, *veratr.*, *zinc.* — Compárese: *Epilepsia.*

En las convulsiones histéricas: *Con.*, *ign.*, ó *asa fæt.*, *bell.*, *cocc.*, *magn. m.*, *mosch.*, *nux m.*, *plat.*, *stram.*, *tarant.* Compárese: *Histerismo.*

En las convulsiones de los niños: *Bell.*, *cham.*, *ign.*, *ipéc.*; ó *acon.*, *cina.*, *coff.*, *cupr.*, *op.*, *sulph.*, *tarant.*

En las convulsiones durante la dentición: *Bell.*, *calc.*, ó *acon.*, *cham.*, *coff.*, *glonoin.*, *hyosc.*

En las convulsiones producidas por las lombrices: *Calc.*, *cicut.*, *cina.*, *ignat.*, *silic.*, *spigel.*

En las convulsiones que preceden á la menstruación: *Cocc.*, *tarant.*; ó *cham.*, *coffea.*, *cupr.*, *hyosc.*, *lach.*, *merc.*, *secal.*

En las convulsiones durante la menstruación: *Cham.*, *cocc.*, *coff.*, *cupr.*, *puls.*; ó *acon.*, *hyosc.*, *lach.*, *ign.*, *merc.*, *sec.*

En la *eclampsia* (convulsiones durante el parto ó en el sobreparto): *Bell.*, *cham.*, *cicut.*, *cupr.*, *hyosc.*, *ign.*, *op.*, *puls.*, *stram.*; ó *acon.*, *arn.*, *cocc.*, *ipec.*, *lach.*, *nux v.*, *sec.* (G.)

En la *convulsion*, *espasmo* ó *calambre del antebrazo derecho en los escribientes*: *Bell.*, *caust.*, *sec.*, *silic.*, *stann.*

En el *tétanos* despues de una hériada: Véase: *Trismo.*

En la *corea*: *Tarant.* (N.) y si este no bastase, consúltese: *Bell.*, *caust.*, *cupr.*, *hyosc.*, *ign.*, *op.*, *sec.*, *stram.*, *sulph.*, *zinc.*

En los *calambres de las pantorrillas*: *Rhus.*, *veratr.*; ó *calc.*, *coloc.*, *cupr.*, *hyosc.*, *nux v.*, *staph.*, *sulph.*

Como las convulsiones de los niños son las que se ven obligadas á cuidar con mas frecuencia las personas no médicas, nos contentaremos con indicar los medicamentos principales contra dichas convulsiones, con sus indicaciones especiales.

Aconitum. Convulsiones despues de un susto, terror, ó durante la denticion, acompañadas de fiebre, inquietud, sed, calor seco y respiracion dificil. (Inmediatamente despues de un susto debe darse *opium*, repitiendo la dosis al cabo de 19 ó 20 minutos si no hubiera alivio. Mas si ha transcurrido algun tiempo despues del susto, si el medicamento no ha producido los efectos deseados, ó si el niño tiene fiebre, etc., se dará *acon.* Si *acon.* no produce un pronto alivio, se prescribirán *bell.* ó *glon.*)

Belladonna. Convulsiones durante la denticion, con congestiones cerebrales, delirio, etc. — Sopor despues del acceso. — Accesos de furor; el niño pega y muerde. — Horror á la luz y pupilas muy dilatadas. — El mas ligero tacto (ó la contradiccion) provocan nuevas convulsiones.

Chamomilla. Convulsiones en los niños de pecho, si la madre se ha asustado mucho. — Convulsiones de los niños muy irritables y coléricos. — Movimientos convulsivos durante el sueño. — Una de las megillas está

encarnada, y la otra pálida. — (Segun las circunstancias, *cham.* puede darse alternando con: *Acon. bell.*, *caff.*, ó *ign.*).

Cina. Convulsiones de los niños que padecen lombrices, con picor en el ano y narices, rechinamiento de dientes durante el sueño, tos seca, incontinencia de orina en la cama, movimientos convulsivos de los miembros.

Coffea. Convulsiones de los niños débiles, enfermos, que duermen poco, padecen insomnios frecuentes y son muy nerviosos.

Ignatia. Cuando no se sabe si las convulsiones son producidas por el trabajo de la dentición ó por las lombrices. — Convulsiones despues de un susto ó miedo, despues de un castigo, durante la dentición; los niños tienen espuma en la boca, mueven vivamente los pies, tuercen la cabeza, vuelven ó fijan los ojos, y la cara se pone rubicunda, ardiente, y sudosa. — Los ataques tienen lugar á veces todos los dias á la misma hora. — Gritos penetrantes durante ó despues del acceso, y temblor general.

Ipecacuanha. Vómitos, náuseas, diarrea, y respiración corta durante las convulsiones; durante el ataque los niños se ponen rigidos, y su cara azulada.

Opium. Convulsiones inmediatamente despues de un susto ó terror profundo, con temblor general, gritos intensos, ó bien estado soporoso con pérdida del conocimiento.

Tarantula. Opresion de la respiración é inquietud general; saltos de tendones; necesidad de mover la cabeza lateralmente, frotándola con algun objeto. — Necesidad de mover constantemente las manos, pies y cabeza. — Necesidad de variar á cada momento de postura. — Movimiento incesante. — Contracciones musculares. — Llantos con inquietud, agitacion, deseo de morderse y pegarse durante la convulsion, y hasta de arrancarse los cabellos. — Sueño letárgico despues de

la convulsion. — La convulsion se aumenta sugetando al enfermo, y se alivia con el sudor y al aire libre. — Convulsiones periódicas (N.).

Coqueluche.

(*Tos ferina.* — *Tos nerviosa.* — *Tos convulsiva.*)

La coqueluche ó *tos ferina*, es una tos espasmódica que reina en ciertas épocas de un modo epidémico entre los niños, y ataca también con bastante frecuencia á los adultos. Tiene de particular, como todas las enfermedades epidémicas, el cambiar frecuentemente de carácter, y el que los medicamentos que han sido curativos de la misma en ciertas épocas y ciertas localidades, no producen efecto alguno cambiando el tiempo y la localidad. Esto es lo que ha producido algunas confusiones en los médicos homeópatas, indicando cada uno como medicamentos específicos, aquellos que en ciertas épocas se habian mostrado eficaces para curar la enfermedad. No hay verdaderamente medicamento alguno específico para ninguna enfermedad, y mucho menos para las epidémicas. El deber del médico consiste precisamente en investigar en cada epidemia los medicamentos (específicos) correspondientes á su carácter. En el momento que los ha encontrado, puede administrarlos al principio de todos los casos de la misma especie; sin embargo, no debe olvidar que en toda epidemia hay casos particulares en los que, sea por sus complicaciones, por la discrasia, etc., no bastan los medicamentos que de ordinario se muestran eficaces.

Así, pues, deberá darse al principio de la enfermedad, antes que la tos se haga espasmódica, los medicamentos correspondientes á los síntomas. (Compárese: *Tos y catarro del pecho.*)

Los prácticos han recomendado sobre todo los medicamentos siguientes: *Acon.*, *bell.*, *coral. rubr.*, *carb. v.*, *cina*, *cupr.*, *dros.*, *ipéc.*, *kali c.*, *kali bi.*, *sep.*, *sulph.*,

thuja, *veratr.*, *verb.* (Ademas: *Atropin.*, *coccionella*, *ledum*, *mephitis*, etc.)

Aconitum. Conviene sobre todo cuando al principio de la enfermedad hay sintomas febriles é inflamatorios correspondientes á *acon.* (El Dr. Fischer dió en una epidemia durante ocho dias, mañana y tarde, una dosis de *acon.* 200^a; obtuvo asi escelentes resultados.)

Arnica. Principalmente si los niños lloran antes ó despues de la tos.

Arsenicum. Gran debilidad, cara de color de cera y frio en la piel (G.).

Belladonna. Está indicado, cuando durante la tos la cara, y aun la esclerótica (lo blanco de los ojos) se ponen encarnadas (G.). (Comp. *Sint. car. gen.*)

Bryonia. Cuando los accesos de tos tienen lugar principalmente despues de haber comido ó bebido, y con vómitos de lo que se ha comido.

Calcarea c. Sobre todo á los niños durante la denticion, y si la tos se presenta siempre despues que han comido, y si va acompañada de vómitos (Hg.).

Carb. v. Gran postracion despues de cada acceso de tos, piel azulada, cabeza y rostro calientes. El enfermo tiene 3 ó 4 accesos de una tos espasmódica durante el dia, y por la noche no cesa (B.).

Causticum. Cuando una tos seca persiste durante largo tiempo despues de la coqueluche (G.).

Chelidonium. Cuando persiste por largo tiempo una tos húmeda, gruesa.

Cina. Conviene en los niños que se frotan frecuentemente la nariz; se ponen rígidos durante el acceso de tos, y tienen un hambre canina. Dése *cina* sobre todo á los que son caprichosos, tienen los cabellos y los ojos negros, (mientras que *belladonna* conviene á los niños tranquilos que tienen el corazon sensible y los cabellos rubios. Hg.). Despues de *cina* debe darse *mercurius* (Alvarez).

Conium. Los accesos de tos tienen lugar principalmente por la noche (G.).

Corallium rubr. Accesos violentos de una tos espasmódica. — Tos breve, bronca, continúa durante el día; al oscurecer degenera en un espasmo violento que dura una media hora (G.).

Cuprum m. Durante cada acceso de tos el niño se pone rígido, como si estuviese muerto (G.).

Drosera. Se administra si el niño se pone peor á media noche, y tiene una fuerte fiebre. La tos va acompañada de violentos accesos espasmódicos, y el niño está como sofocado; hecha sangre también con frecuencia por boca y narices (G.).

Dulcamara. Si la enfermedad se agrava cuando la temperatura pasa del calor al frío, ó si el enfermo se ha enfriado con el aire frío y húmedo.

Ferrum. Cada acceso de tos obliga al enfermo á vomitar el alimento que ha tomado.

Hyoscyamus. La tos aumenta mucho cuando el niño está acostado; disminuye cuando está sentado.

Ipecacuanha. A cada acceso de tos siente el niño tal opresión en la garganta, que está casi sofocado y su rostro se pone azulado.

Kali c. Hinchazón en forma de saco entre los párpados y las cejas (B. y G.).

Kali bi. Tos sofocante acompañada de mucosidades viscosas.

Lachesis. El niño al despertar se vé acometido de un acceso de tos; parece muy enfermo y débil (G.).

Mephitis put. Parece ser un medicamento específico para ciertas clases de tos espasmódica (G.).

Mercurius. El niño suda mucho por la noche, y sangra por las narices y boca á cada acceso de tos. — Tiene siempre, sea durante el día ó la noche, dos accesos de tos separados por un intervalo de reposo (G.).

Nux v. Tos violenta, seca, que se agrava después de las 4 de la mañana, y va acompañada de estreñimiento de vientre. La cara se pone azulada; salida de sangre por las narices y boca (G.).

Phosphorus. Gran ronquera hasta la extincion completa de la voz, á causa de la tos.

Pulsatilla. Tos gruesa con expectoracion y vómitos de mucosidades, y con diarrea que aumenta durante la noche.

Sepia. La tos se aumenta durante las mañanas, pero es húmeda y se termina por ganas de vomitar.

Silicea. Excelente medicamento para los niños que padecen lombrices, cuando *cina* no ha producido efecto.

Sulphur. Cuando hay recaidas frecuentes sin que se pueda averiguar la causa; dése tambien á los niños escrofulosos que tienen una tos seca y entrecortada, con sofocacion.

Squilla. El niño estornuda al toser. Lagrimeo, flujo mucoso por la nariz. Durante los accesos de tos, el niño se frota continuamente la nariz, los ojos y la cara.

Veratrum. Despues de cada acceso de tos el niño se queda rendido y sin fuerzas; su frente está cubierta de un sudor frio.

Verbascum. Tos sobre todo por la tarde, y por la noche sin cesar apenas un momento, con opresion de pecho y sofocacion, que despierta al niño, y es de caracter áspero y seco, ó gruesa y apagada. Mal humor y caracter irascible. Sintomas de lombrices con frotacion continua de la nariz. Durante los accesos de tos se hecha el niño la mano al cuello, como si quisiera arrancar una cosa con la mano, y á veces hasta se araña (Alvarez).

Todos estos medicamentos deben administrarse disueltos en agua; y se darán durante varios dias tres ó cuatro cucharadas al dia. — *Caust.*, *dros.*, *kali c.*, *merc.*, *phos.*, *sep.*, *silic.* y *sulph.*, solo se administrarán por mañana y noche durante tres dias; si hay alivio, se esperará el efecto de ellos.

Cuando se ha encontrado felizmente muy pronto el medicamento especifico, la coqueluche ó tos ferina que dura ordinariamente de diez y seis á veinticinco semanas, tendrá una duracion mucho mas corta, y nunca

se hará tan grave que pueda comprometer la vida del niño.

Corazon.

Palpitaciones de corazon. — Las personas que no han estudiado medicina no pueden tratar las enfermedades del corazon, porque les es imposible diagnosticarlas como es necesario. Asi es que no indicaremos aqui mas que el modo de elegir los medicamentos contra las diferentes especies de palpitaciones de corazon, segun los diversos sintomas que pueden presentarse. De esta manera no se tratará de curar las enfermedades del corazon, si no mas bien de aliviarlas.

En estas enfermedades, sobre todo en los casos agudos, es preciso si es posible, investigar la causa ocasional y tomarla por guia en la eleccion de los medicamentos. Se darán, pues, contra las palpitaciones de corazon:

A consecuencia de *emociones morales*: *Acon.*, *cham.*, *coff.*, *ign.*, *nux v.*, *op.*, *phos.*, *puls.*, *sep.*, *veratr.*

Despues de un *susto*: *Op.*, ó *acon.* y *coff.*

Despues del *miedo* ó *angustia*: *Veratr.*, *ign.*

Despues de una *alegria extraordinaria*: *Coff.*, *nux v.*

Despues de una *contrariedad*: *Acon.*, *cham.*, *coloc.*, *ign.*, *nux v.*, é *hyosc.*

En las personas *nerviosas* é *histéricas*: *Asa.*, *cham.*, *cocc.*, *coff.*, *lach.*, *nux v.* y *m.*, *puls.*, *spigel.*, *veratr.*

En las fuertes palpitaciones que *preceden*, á veces, á la *menstruacion*: *Acon.*, *calc.*, *lach.*, *puls.*, *sep.* (Alvarez).

A consecuencia de una *congestion sanguinea* ó de *plétora*: *Acon.*, *glon.*; ó *aur.*, *bell.*, *coff.*, *fer.*, *lach.*, *nux v.*, *op.*, *phos.*, *sulph.*

Despues de *pérdidas debilitantes*: *China*, ó: *Calc.*, *nux v.*, *phos. ac.*, *puls.*, *sep.*, *staph.*, *sulph.*

A consecuencia de la *supresion* de erupciones ó *úlceras antiguas*: *Ars.*, *calc.*, *caust.*, *lach.*, *sulph.*

Consúltense los medicamentos siguientes entre otros :

Aconitum. Conviene (á las personas pletóricas) cuando las palpitaciones han sido causadas por una grande emocion. — Enfermedades del corazon crónicas, con presion continua del lado izquierdo del pecho, respiracion dificil, al andar demasiado de prisa y al subir una escalera. — Dolores presivos en el corazon. — Congestion de sangre en la cabeza. — Congojas con hormigueo en los dedos.

Arsenicum. Palpitaciones sobre todo por la noche, con angustia, calor urente en el pecho, respiracion dificil. Agravacion acostándose; alivio paseándose.

Asa fet. Presion en el pecho con punzadas, sobre todo estando acostado, con respiracion dificil y sollozante. — Pulsaciones y palpitaciones de corazon, con respiracion acelerada y pulso pequeño, con otros sintomas histéricos.

Aurum. Presion permanente en el lado izquierdo del pecho. — Dolor incisivo y punzadas en la region del corazon. — Palpitaciones de corazon irregulares ó por accesos, con angustia y opresion de pecho.

Belladonna. Fuertes palpitaciones de corazon que se sienten en la cabeza; en los oidos, estando acostado, y en la garganta, andando (Alvarez).

Calcarea. Palpitaciones con angustia, sobre todo por la noche y despues de las comidas.

Conium. Palpitaciones despues de haber bebido.

Ignatia. Palpitaciones nocturnas conpunzadas dolorosas en el corazon.

Kali c. Palpitaciones por la mañana temprano, con congestion de sangre.

Lachesis. Palpitaciones con ansiedad, escitadas á veces por dolores calambroides, con tos y accesos de sofocacion. Punzadas en la region del corazon, con respiracion corta, congojas y sudores frios. — El enfermo se sienta rápidamente en la cama á causa de las palpitaciones y sofocacion. Conviene especialmente á las mugeres en la edad critica (Alvarez).

Lycopodium. Palpitaciones sobre todo durante la digestion.

Natrum m. Fuertes palpitaciones, particularmente estando acostado del lado izquierdo. — Palpitaciones irregulares de corazon, frecuentemente intermitentes, que conmueven todo el cuerpo.

Nux moschata. Palpitaciones con desfallecimiento.

Nux vomica. Punzadas y golpes en la region del corazon. — Palpitaciones principalmente despues de comer, estando acostado, por la mañana temprano, y á veces con náuseas y deseos de vomitar, y sensacion de peso en el pecho.

Phosphorus. Palpitaciones que se reproducen á cada emocion, con congestion de sangre al pecho.

Pulsatilla. Palpitaciones estando acostado del lado izquierdo. El enfermo lo ve todo triste y de mal agüero, ó bien se ve acometido de tal angustia que se destapa y se quita toda la ropa. — Palpitaciones violentas estando sentado.

Rhus. Palpitaciones violentas estando sentado. — Punzadas en la region del corazon, con sensacion dolorosa de parálisis y entorpecimiento del brazo izquierdo.

Sepia. Pulsaciones intermitentes del corazon. — Agitacion de la sangre en el pecho y palpitaciones violentas de corazon.

Spigelia. Fuertes palpitaciones que aumentan sentandose é inclinándose hacia adelante. — Respiracion oprimida.

Staphysagria. Palpitaciones causadas por la música, ó que se presentan despues de dormir la siesta.

Thuja. Palpitaciones violentas, sobre todo al subir una escalera. — Congestion sanguinea al pecho.

Veratrum. Palpitaciones violentas con respiracion acelerada, ruidosa y frecuentemente interrumpida; grande opresion del corazon.

Ademas, se pueden consultar :

En las palpitaciones *con angustia*: *Acon.*, *ars.*, *calc.*, *lyc.*, *phos.*, *puls.*, *spig.*

Palpitaciones *intermitentes* de corazon: *China, dig., natr. m., phos. ac.*

Palpitaciones *resonantes* del corazon: *Calc., spig., ó ars., rhus., sabina, staph.*

Entre los medicamentos nuevamente recomendados, hay tres que obran directamente sobre el corazon, de un modo especial, y son: *Cactus grandiflorus, Kalmia latifolia, y Madar*; siendo este último dado á conocer por el Dr. Nuñez, de Madrid. Además, se considera á *lach.* muy ventajoso en las inflamaciones y en los depósitos sobre la pared esterna de corazon; y *spong.* en las inflamaciones y depositos en la pared interior del corazon y sus válvulas.

Es preciso no repetir con demasiada frecuencia las dosis; es mejor emplear las diluciones ó atenuaciones mas elevadas.

Costado (Dolor de).

(*Pleurodinia.*)

La *pleurodinia*, enfermedad conocida vulgarmente con el nombre de *dolor de costado*, y de caracter reumático, se distingue por un dolor vivo, pungitivo, lancinante, y á veces gravativo, fijo en uno de los costados del cuerpo, con fiebre unas veces y otras sin ella, que se aumenta con la tos, la respiracion, el movimiento de los brazos y al volverse é incorporarse en la cama.

Esta enfermedad, que suele asustar mucho á los que la padecen, creyéndose atacados de una pulmonia ó pleuroneumonia, es de corta duracion, y se cura con suma facilidad y prontamente con los medicamentos homeopáticos.

El medicamento principal contra el dolor de costado, es *Arnica*, que en la mayoría de los casos será suficiente para la curacion. Si no bastase, dése *Bryonia*.

En los casos que el dolor vaya acompañado de fiebre, recúrrase á *Acon.*, que hará cesar en breve tanto la fiebre como el dolor.

En los casos bastante raros en que *arn.* y *bry.* no bastasen para la curacion de la pleurodinia, consúltense: *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *rhus*, *sabad.*

Hay casos en que la pleurodinia acompaña al catarro bronquial ó pulmonar, y entonces hay que sugetar el tratamiento de aquella al del catarro.

Crup.

(*Garrotillo.*)

Esta enfermedad tan temible en los niños, empieza ordinariamente por la noche, despues de media noche, ó por el dia, con una tos bronca, seca, semejante al ladrido de un perro enronquecido. El niño experimenta una gran dificultad de respirar, y la respiracion se hace sibilante y ruidosa. Hay épocas como tambien localidades, en que el crup es mucho mas frecuente y peligroso que en otros tiempos y lugares. Los medicamentos homeopáticos son siempre mas eficaces y seguros en el garrotillo que los alopáticos. Sin embargo, es necesario que sean administrados lo mas pronto posible. Los padres que no tengan médico homeópata á su disposicion, por vivir en el campo ó localidad donde no le hay, deberan tener siempre los medicamentos recomendados contra el crup, que son: *Acon.*, *hep.* y *spong.*

Se da primero *acon.*, que se repite de media en media hora, de hora en hora, etc., segun la urgencia del caso. Si se acude en los primeros momentos, este medicamento basta para curar el garrotillo en la inmensa mayoría de los casos. En los que no baste, acúdase á *hepar* ó *spongia*.

Hay casos que se creen de garrotillo, y no son mas que un catarro de la laringe con voz ronca; se curarán facilmente con los medicamentos apropiados á dicho catarro.

El profesor Guernsey da las indicaciones siguientes para la eleccion de los medicamentos, á las que añadimos las del Dr. Jahr, y otros médicos homeópatas.

Aconitum. Debe emplearse siempre en primer lugar, al principio, en el periodo inflamatorio, siempre que los sintomas no exijan otro medicamento, y mientras haya: Grande sobreexcitacion de los sintomas nerviosos y sanguineos, calor ardiente con sed, tos seca, bronca, frecuente y corta, respiracion acelerada con inspiracion facil y expiracion dificil, voz ronca, agitacion é insomnio.

Spongia. En el crup violento, con tos ronca, gruesa, resonante, semejante al ladrido de un perro, seca ó con mucosidades dificiles de espectorar; respiracion lenta, sibilante é imitando el ruido de una sierra en movimiento, ó accesos de sofocacion con respiracion posible solo hechando atrás la cabeza. Rubicundez de la cara y color azulado de la misma en los accesos de sofocacion. El niño esta asustado, grita lleno de terror y se agarra á las personas que le rodean en los accesos de sofocacion y de tos. La inspiracion del aire va acompañada de una tos seca y sibilante.

Hepar. Conviene cuando por la accion de *spong.* la tos se ha hecho mas facil, y la dificultad de la respiracion no depende mas que de mucosidades acumuladas en la laringe y tráquea; ó bien desde el principio los sintomas del crup van acompañados de un estertor mucoso, tos húmeda ó sofocante y ruidosa despues de media noche, con respiracion poco dificil é irritacion poco intensa de los sistemas nervioso y sanguíneo.

En los casos desesperados, en que *acon.*, *spong.* y *hep.*, son ineficaces, consúltense:

Belladonna. Conviene en la tos ronca, acompañada de congestion sanguínea en la cara y ojos (Crup espasmódico).

Bromum. Debe darse cuando hay espasmo de la laringe. La tos es sibilante, ronca, muy dolorosa; la respiracion ruidosa y dificil, ocasionada por la formacion de falsas membranas en la laringe.

Chamomilla. Ha dado muy buenos resultados en casos desesperados de crup, cuando ningun otro medica-

mento daba resultado (el niño quiere ser llevado en brazos y paseado).

Iodium. Conviene en los niños obesos, cuya cara está pálida y fría, y si el dolor les hace llevar la mano á la garganta. La voz es baja, ronca, áspera. (Hering dice que *iod.* conviene especialmente á los niños cuyos ojos y cabellos son negros; y *brom.* á los de ojos y cabellos rubios.)

Kali bichromicum. Cuando hay muchas mucosidades viscosas.

Lachesis. Cada vez que se despierta el niño se agrava la enfermedad de tal modo, que se cree va á morir.

Phosphorus. Conviene en los niños delgados, altos, pálidos, de constitucion tísica, debil y linfática. Tos gruesa, prolongada, que conmueve todo el cuerpo, y parece como que la cabeza va á estallar, con sudores generales, ardor en la piel; y tos sibilante, ruidosa, seca, con sequedad en el pecho y traquea. Accesos de sofocacion; el niño se sienta en la cama y parece que se va á asfixiar; se cubre todo su cuerpo de sudor frio, y experimenta unas angustias mortales, con palpitaciones de corazon. Respiracion difícilísima, ruidosa y anhelante, con angustia suma. Cara descompuesta, extremidades frias, y sudor frio en la cabeza (Alvarez).

Tartarus emet. Es muy eficaz cuando hay mucho estertor mucoso y gran ruido de mucosidades en la laringe y pecho, el niño no puede espectorarlas y parece que se va á asfixiar.

Contra la laringitis, la ronquera y las enfermedades catarrales que persisten despues del crup, el mejor medicamento es *Phosph.* Si este no bastase, consúltense: *Bry.*, *carb. v.*, *dros.*, *dulc.*, *hep.*, *ipcc.*

Para prevenir las recidivas del crup, *Phosph.* es el mejor medicamento, asi como tambien *lycop.*

Hé aqui el tratamiento dicho curativo dél célebre Dr. de Boenninghausen en las epidemias de garrotillo: Daba cinco papeletas con medicamento. La primera y

segunda contenian *acon.* 200^a; tercera y quinta *hepar* 200^a, y la cuarta *spong.* 200^a: hacia tomar á los niños una por el orden de numeracion cada dos horas. Pretende haber obtenido un exito feliz con dichos medicamentos, y en centenares de familias que los emplearon, ningun niño murió de crup, y esto en una larga serie de años. Tambien prescribia el *acon.* como preservativo, y aconsejaba dar una dosis cada segundo dia á los niños de una localidad, mientras reinase en ella la epidemia de crup.

Debilidad.

La debilidad suele ser comunmente el sintoma de una enfermedad, con cuya curacion se vé desaparecer á aquella. Mucha veces, sin embargo, es el origen por sí sola de innumerables sufrimientos, sobre todo cuando debe su existencia á los excesos sexuales, á enfermedades agudas, á pérdidas de sangre y otros líquidos de nuestro cuerpo, a la masturbacion, á los trabajos intelectuales y corporales llevados al exceso, y á otras causas debilitantes.

La debilidad causada por los *excesos sexuales*, se combate principalmente con *Phosph. ac.*; si este no bastase, consúltense: *Anac.*, *calc. c.*, *carb. v.*, *china*, *daphne*, *natr. m.*, *phos.*, *silic.*, *staph.*, *sulph.*

La debida á *enfermedades agudas* graves ó de larga duracion, con *China*, y si no fuera suficiente, recúrrase á: *Cocc.*, *hep.*, *natr. m.*, *phos. ac.*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.*

La producida por *pérdidas de sangre ú otros líquidos del cuerpo*, *china* es el medicamento de preferencia; en los casos en que no fuera suficiente déense: *Carb. v.*, *croc. s.*, *ferr.*, *nitri ac.*, *rhus.*, *veratr.*

La originada por la *masturbacion* cede á: *Sulph.* y *calc. c.*; y si estos no bastasen, déense: *Nux v.*, *phos. ac.* y *staph.*; y si aun estos no fueran suficientes: *Carb. v.*, *cina*, con *m.*, *natr. m.*, *plat.*

La debilidad causada por los *trabajos intelectuales y corporales llevados al exceso*, se trata: la debida á *trabajos intelectuales*, con: *Cocc.*, *nux v.*, *phos. ac.*, *silic.*, *veratr.*: á los *corporales*: *China*, *con. m.*, *rhus*, *sulph. ac.*

La engendrada por un *crecimiento rápido del cuerpo*: *Phos. ac.* y *sulph.*, y si no bastan: *Calc.* y *phos.*

La *de los viejos* se combate con *Baryta c.*, y *con. m.*, y si no son suficientes, con *Aur.*, *china*, *op.*

La debilidad *muscular* tiene su remedio en *Cocc.*; ó en *arn.*, *bell.*, *nux v.*, *staph.*, *tart. em.* y *veratr.*

La *nerviosa* en *Nux v.*; ó en *cocc.*, *ign.*, *muriat. ac.*, *phos. ac.*, *phos.*, *puls.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.*

Para la debilidad que se experimenta *al subir una escalera*: *Anac.*

Despues de *una noche en vela*: *Nux v.*, *puls.* ó *carb. v.* y *cocc.*

iendo *en carruage*: *Cocc.*, *sep.*

Despues de *escribir*: *Cam.*, *silic.* Al *escribir*: *Bry.*, *kali c.*, *sabina*, *zinc.*

Con la *conversacion*: *Arn.*, *cocc.*, *stann.*, *sulph.*, *veratr.*

Con el *ruido*: *Arn.*, *ign.*, *plat.*, *zinc.*

Con el *movimiento*: *Anac.*, *cocc.*, *coff.*, *ferr.*, *plumb.*, *nux v.*, *spig.*, *staph.*, *veratr.*

Despues de *una cólera ó indignacion*: *Bry.*, *cham.*, *coloc.*, *staph.*

Con la *lectura*: *Calc.*, *cocc.*, *natr. m.*, *silic.*

Al *levantarse de la cama*: *Carb. v.*, *ign.*, *veratr.*

Estando en la cama: *Ars.*, *calc.*, *kali c.*, *phos.*, *puls.*, *sep.*, *sulph.*

Con la *música*: *Coff.*, *natr. m.*, *phos. ac.*, *stann.*, *tarant.*, *zinc.*

Tocando el piano: *Anac.*, *calc. c.*, *kali c.*, *sep.*, *zinc.*

Despues de *reir*: *Stann.*

Con el *viento*: *Carb. v.*, *lach.*, *lye.*

Delirio.

El delirio no es mas que el sintoma de una enfermedad, como la fiebre tifoidea, la meningitis, la demencia, etc.

Los medicamentos principales contra el delirio, son :
Acon., *bell.*, *hyosc.*, *op.*, *puls.*, *rhus*, *stram.*, *veratr.*

Demacracion.

(*Enflaquecimiento. — Marasmo.*)

La demacracion ó enflaquecimiento, es siempre la consecuencia de una enfermedad. Al elegir el medicamento para combatirla, es preciso tener siempre en cuenta la enfermedad principal; y elijase, si otros sintomas no se oponen: *Ars.*, *china*, *nux v.*, *sulph.*; ó bien entre: *Calc.*, *cham.*, *merc.*, *puls.*, *silic.*, *staph.*, *veratr.*

Si hay demacracion de las partes enfermas: *Puls.*, *thuja.*; ó *carb. v.*, *graph.*, *kali c.*, *led.*, *mez.*, *phos.*

Indicaciones para la eleccion de los siguientes medicamentos.

Jod.: Demacracion muy considerable, buen apetito.
— *Podoph.*: Demacracion de los niños con deposiciones frecuentes pero naturales, ó con diarrea, pero solo por la mañana (G.). — *Petrol.*: Demacracion con diarrea por el dia solamente (G.). — *Calc.*: Demacracion con hambre canina y estreñimiento de vientre. — *Ars.*: Demacracion sin apetito, diarreas acuosas y frecuentes, sobre todo nocturnas, recargos febriles. — *Sulph.*: Demacracion con recargos febriles, estreñimiento pertinaz de vientre, vientre duro y abultado. — *Phosph.*: Demacracion con diarreas frecuentes, tos frecuente, recargos febriles, sudores, opresion de pecho con el mas leve movimiento (Alvarez).

Deseos sexuales.

Cuando los deseos sexuales ó venéreos son exagerados, dénese:

En los hombres (*satiriasis*): *Canth.*, *merc.*, *natr. m.*, *nux v.*, *sulph.*; ó *Hyosc.*, *phos.*, *stram.*, *veratr.*

En las mugeres (*ninfomanía*): *Hyosc.*, *phos.*, *stram.*, *tarant. (N.)*, y *veratr.*

Contra las *poluciones nocturnas*, cuando los deseos sexuales no estan muy escitados, y no hay sueños voluptuosos, dénse: *Phos. ac.*, ó *Con. m.*, *sep.*, *sulph.*

Si por el contrario, el deseo venéreo está fuertemente escitado, dese *Nux v.*, ó *Calc.*, *carb. v.*, *lyc.*, *phos.*, *sulph. (J.)*; ó bien *Digitalis* recomendado por el Dr. Baehr.

Dénse: Contra la inclinacion al *onanismo*: *Calc.*, *nux v.*, *plat.*, *sulph.*; ó bien: *Thuja* (Wolf).

Contra las malas consecuencias de este vicio: *Calc.*, *carb. v.*, *china*, *phos. ac.*, *puls.*, *sep.*, *staph.*

Contra la *impotencia*: *Baryt.*, (calad.), *calc.*, *cann.*, *con.*, *lyc.*, *natr.*, *sulph. (J.)*, *thuja* (Wolf).

Contra la *estirilidad*: *Bor.*, *calc.*, *cann.*, *merc.*, *phos.*

Cuando hay aversion al coito, empleense: *Caust.*, *kali*, *lyc.*, *phos.*; ó *Baryt.*, *cann.*, *natr. m.*; y si el coito es muy doloroso: *Sep.* (medicamento principal segun el Dr. Guernsey); ademas: *Ferr. ac.*, *kali c.*, *kreos.*, *lyc.*, *nux v.*, *sabina*, *sulph.*

Diarrea.

Esta enfermedad tan frecuente es mucho mas importante que el estreñimiento de vientre, que los médicos alópatas y el público son tan dados á combatir enseguida por medio de purgantes. Como los medicamentos alopáticos empleados contra la diarrea, son frecuentemente mas peligrosos aun que la misma enfermedad, hablaremos con mas detalles de los medicamentos homeopáticos propios para curar la diarrea.

En la diarrea aguda es preciso ante todo investigar su causa. Cuando esta es conocida, se elegirán los medicamentos en conformidad á los preceptos siguientes:

- Diarrea provocada: Por una *angustia* ó *susto*, en primer término *opium*; si este no produce efecto, *Acon.*, ó *veratr.*, ó *puls.*
- Por una *cólera*: *Cham.* ó *acon.*, si la diarrea es acompañada de calor, de sed é inquietud; *bry.* y *veratr.*, si hay escalofrios y deseo de reposo.
- Por el *calor del verano*: *Bry.* ó *podoph.* — Por transiciones bruscas del frío al calor: *Bry.*; si tiene lugar lo contrario: *Dulc.*
- Por un *desarreglo del estómago*, sobre todo por alimentos grasientos: *Puls.* — ó *ipec.* cuando hay náuseas y vómitos.
- Por un *enfriamiento del estómago*, siendo las frutas la causa: *Puls.* — ó *ars.*, cuando hay dolores violentos, sobre todo despues del uso de helados ó agua de nieve, etc.
- Por el *uso de la leche*: *Bry.* ó *lyc.* ó: *Calc.*, *sulph.*; *sepia* despues del uso de la leche cocida.
- Por el *uso de alimentos ácidos*: *Ipec.* ó *nux v.* (diarrea sobre todo por la noche), — *antim. cr.* (diarrea por el dia), — *staph.* (diarrea con retortijones).
- Por el *humo de tabaco*: *Cham.* ó *veratr.*
- Por un *enfriamiento*: *Opium* (diarrea súbita). — *Dulc.* (diarrea despues de uno ó dos dias con retortijones). — *Ferr.* (diarrea mas fuerte por el dia). — *Phos.* (diarrea mas fuerte despues de media noche).
- Por el *agua que se ha bebido*: *Caps.* (diarrea con tenesmo) — ó: *Ars.*, *puls.* (habiéndose enfriado el estómago).
- Si no se puede descubrir la causa y la diarrea existe ya hace tiempo, obsérvese lo que sigue:

I. Dolores y otras circunstancias de la diarrea.

- Diarrea muy dolorosa: *Ars.*, *coloc.*, *rheum.*, *rhus.*
- Diarrea menos dolorosa: *Bry.*, *carb. v.*, *caps.*, *cham.*, *dulc.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*, *veratr.*

Diarrea con tenesmo (pujo): *Ars.*, *caps.*, *merc.*, *nux v.*, *rheum*, *rhus*, *sulph.*, *veratr.*

Diarrea sin dolores: *Chin.*, *ferr.*, *hyosc.*, *lyc.*, *phos.*, *phos. ac.*, *stram.*

Diarrea con postracion de fuerzas (debilitante): *Ars.*, *calc.*, *china*, *ipéc.*, *phos.*, *veratr.*

Diarrea con evacuacion de alimentos sin digerir (lienteria): *China*, *ferr.*, *nux v.*, *sulph.*, ó *cina*, *merc.*, *phos.*, *phos. ac.*

Diarrea con vómitos: *Ars.*, *bell.*, *cham.*, *coloc.*, *dulc.*, *ipéc.*, *merc.*, *nux v.*, *puls. sulph.*

Diarrea crónica: *Calc.*, *china*, *ferr.*, *nitri ac.*, *phos. sulph.*, *veratr.*

Diarrea de los niños: *Cham.*, *calc.*, *ipéc.*, *merc.*, *rheum*, *sulph.* (*jalappa*, *senna*).

Diarrea durante la denticion: *Calc.*, *cham.*, *coloc.*, *merc.*, *sep.*, *silíc.*, *sulph.*

Diarrea de las mugeres embarazadas (no siendo grave): *Antim. cr.*, *china*, *dulc.*, *puls.*, *rheum*; si la diarrea es causada por una enfermedad crónica: *Lyc.*, *merc.*, *petrol.*, *phos.*, *sep.*, *sulph.*, *thuja* (B.).

La flojedad de vientre, ó sea la disposicion á hacer varias deposiciones al dia: *Calc.*, *graph.*, *kreos.*, *natr. m.*, *nitri ac.*, *petrol.*, *phos.*, *sulph.*, *sulph. ac.*, *veratr.*

II. Naturaleza y color de las deposiciones.

Diarrea con deposiciones acuosas: *Ars.*, *china* (deposiciones acuosas y negruzcas). — *Arn.*, *graph.* (*magn. c.*), *nux v.* (deposiciones oscuras). — *Cham.*, (*magn. c.*), *sulph. ac.* (deposiciones verdes). — *Ars.*, *china*, *hyosc.*, *merc.* (deposiciones amarillentas).

Deposiciones de color gris ó blanquizas: *Merc.*, *phos.*, *phos. ac.* (*chel.*).

Deposiciones purulentas: *Merc.*, *silíc.*, ó *Arn. canth.*, *lyc.*, *puls.*, *sulph.*

Deposiciones espumosas: *China*, *coloc.*, *magn. c.*, *rhus.*

Deposiciones de muy mal olor: *Ars.*, *carb. v.*, *graph.*, *lach.*, *puls.*, *sec.*, *silic.*, *sulph.*

Deposiciones de olor ácido: *Calc.*, *cham.*, *graph.*, *hep.*, *magn. c.*, *merc.*, *rheum.*, *sep.*, *sulph.*

Deposiciones involuntarias: *Phos.*, *phos. ac.*, *veratr.*
— *Ars.*, *bell.*, *china.*, *carb. v.*, *hyosc.*, *sulph.*

Deposiciones gelatinosas: *Colch.*, *helleb.*, *rhus.*, *sep.*

Deposiciones en forma de hilos: *Sel.*

Deposiciones arenosas: *Arg.*, *eug.*

Deposiciones gredosas: *Calc.*

Deposiciones con copos blancos: *Ipec.*, *squill.*

Deposiciones acres, corrosivas, que excorían el ano y sus inmediaciones: *Ars.*, *cham.*, *lach.*, *merc.*, *puls.*, *sassap.*, *veratr.*; ó: *canth.*, *carb. v.*, *merc. cor.*, *phos.*, *rhus.*, *silic.*

Deposiciones con falsas membranas (que parecen pedazos de intestinos): *Canth.*, *colch.*

Deposiciones como la pez: *Ipec.*, *lach.*, *merc.*, *nux v.*, *rhus.*, *sulph.*

Deposiciones sanguinolentas: *Aloë.*, *ars.*, *caps.*, *carb. v.*, *ipéc.*, *merc. c.*, *nitri ac.*, *nux v.*, *phos.*, *rhus.*, *tart. em.*, *veratr.*

Deposiciones con lombrices (Véase: *Lombrices*).

Deposiciones como la ceniza: *Asar.*, *digit.*

III. Horas de la diarrea.

Por la mañana: *Apis.*, *bry.*, *cop.*, *lyc.*, *nux v.*, *rhus.*, *podoph.*, *sulph.*, *thuja*; y se eligirá:

Sulphur: diarrea que obliga á levantarse muy temprano.

Bryonia: diarrea despues de levantarse.

Podophyllum: diarrea por la mañana y antes de medio dia.

Thuja: diarrea despues del desayuno.

Despues de medio dia: *Bell.*, *china.*, *dulc.*, *carb. v.*, *lyc.*

Por la tarde: *Dulc.*, *lach.*, *merc.*

Por la noche: *Ars.*, *china.*, *lach.*, *merc.*, *puls.*, *veratr.*;

ó bor., bry., canth., caps., caust., cham., dulo., graph.,
ipéc., nux m., rhus, sulph.

Día y noche: Sulph., Calc.

Con el fresco de la noche: Merc.

Durmiendo por la noche: Arn., mosch., puls., rhus.

IV. Sintomas concomitantes.

Antes de la deposición:

Cólicos ó retortijones: Coloc., rheum, magn. c.,
sulph., veratr.

Deseo urgente de deponer: Coloc., merc., nux
v., rheum, sulph.

Durante la deposición:

Cólicos: Coloc., ó: Cham., caps., dulo., ipéc.,
merc., podoph., rheum, rhus, silic., veratr.

Tenesmo (pujo): Ars., bell., colch., merc., nux
v., sulph.

Después de la deposición:

Cólicos: Coloc., merc., podoph., puls., rheum.

Tenesmo (pujo): Bell., canth., caps., merc.,
rheum, sulph.

A continuación ponemos los medicamentos principales contra la diarrea, con sus indicaciones más esenciales.

Antimonium crudum: Diarrea después de tomar alimentos ácidos, después de un enfriamiento, ó de un baño. — Diarrea alternante con estreñimiento de vientre (en los viejos). — Diarrea con lengua sucia y blanqueza. — Vómitos violentos, biliosos y mucosos.

Arsenicum: Deposiciones verdes y pituitosas, oscuras ó aun negras, ásperas y fétidas. — Diarrea sobre todo después de un enfriamiento del estómago (por frutas ó helados), que se agrava por la noche, sobre todo después de media noche, y acompañada de síntomas generales que indican el arsénico.

Bryonia: Diarrea que aumenta ó se renueva durante el calor del verano. — Diarrea causada por la leche. — Diarrea que se presenta después de levantarse de la

cama, desde que uno se mueve. — Náuseas y accesos de desfallecimiento, cuando uno se sienta. — Gran deseo de estar hechado y permanecer quieto.

Calcareo carbonica: Diarrea en los niños obesos, escrofulosos, cuando los dientes empiezan á querer salir. — Diarrea causada por la leche. — Deposiciones amarillentas ó blanquizcas. (Comp.: *Sint. car. gen.*) *

Carbo vegetabilis: Cólera ó diarrea de los niños que agota las fuerzas, sobre todo cuando el haliento se pone frio.

Chamomilla: Deposiciones verdes y pituitosas, ó que se asemejan á huevos escalfados; ó bien deposiciones mucosas, acres (durante la dentición), acompañadas de cólicos. (Comp.: *Enfermedades de los niños.*)

China: Deposiciones acuosas, ya negras, ya biliosas, que contienen alimentos mal digeridos. — Diarrea crónica y sin dolores en las personas muy debilitadas. — Se agrava durante la noche, con el alimento, sobre todo con las frutas. — Diarrea acompañada de muchos gases y de una fuerte transpiracion. (Comp.: *Sint. car. gen.*)

Croton tiglium: Deposiciones frecuentes, amarillentas ó verdes, acuosas, que salen violentamente, sobre todo inmediatamente despues de haber comido ó bebido.

Dulcamara: Diarrea que se manifiesta á consecuencia de un enfriamiento, especialmente en verano y otoño; se agrava por la noche.

Ipecacuanha: Deposiciones frecuentes, poco abundantes, amarillentas, ó verdes, ó parecidas á las heces. Van acompañadas de náuseas continuas, frecuentemente con vómitos de alimentos, ó de *mucosidades gelatinosas y verdes*; retortijones en la region umbilical.

Mercurius: Deposiciones disentéricas, mucosas, biliosas, con estrias de sangre; van seguidas de gran debilidad, de ansiedad, de sudor. — Retortijones, pujo antes de la deposicion, con escalofrios y calor que recorren todo el cuerpo. — Tenesmo (*pujo*) que aumenta despues de la deposicion.

Nux vomica: Pequeñas deposiciones frecuentes, de

diferentes colores, con frecuentes esfuerzos para deponer, frecuentemente inútiles (pujo que cesa despues de la deposicion), y con dolores en la espalda. — Diarrea á consecuencia de comilonas, de excesos en las bebidas alcohólicas, trabajos intelectuales, como del abuso de purgantes y otros medicamentos.

Phosphorus: Deposiciones acuosas, mucosas, verdes mal digeridas, que salen violentamente, y tambien involuntariamente. — Medicamento muy util en los casos crónicos.

Un sintoma muy característico para el empleo del fósforo, es el deseo que experimenta el enfermo de bebidas heladas, cuando calman los sufrimientos del estómago (sobre todo los vómitos); y ademas, si el enfermo toma bebidas calientes, ó si las bebidas frias que ha tomado se ponen calientes en el estomago y las devuelve.

Phosphori acidum: Deposiciones acuosas, blanquizcas ó amarillentas, que no causan dolores, sino mucho gorgoteo en el vientre, como si contuviera agua.

Podophyllum: Deposiciones muy frecuentes, abundantes, sin dolores, de colores diferentes, que salen con fuerza. — Diarrea, por la mañana solamente ó antes del medio dia, ó tambien despues de haber comido y bebido (acompañada comunmente de gran postracion). — Diarrea de los niños durante la denticion, con rotacion de la cabeza.

Pulsatilla: Diarrea de diferentes clases, producida por alimentos grasientos, agua helada ó frutas. Se agrava por la noche. — Deposiciones mucosas que varian de color de cada vez (Hg.). (Véase: *S. Carac. gen.*)

Rheum: Diarrea principalmente de las mugeres en el sobreparto, ó de los niños pequeñitos. — Las deposiciones tienen un olor agrio, y van acompañadas de cólicos. — Un olor agrio se desprende de todo el cuerpo del niño.

Rhus: Diarrea de diferentes clases, sobre todo por

la noche y hacia el amanecer, precedida de ligeros dolores en el vientre. — Diarrea producida por haberse mojado el cuerpo completamente. — Colerina ó diarrea disintérica, con dolores espasmódicos que se extienden á los muslos del enfermo, cada vez que evacua (G.).

Sulphur: Deseo súbito, pero sin dolores, de deponer, obligando al enfermo á abandonar la cama muy temprano. — Diarrea crónica de infinitas clases, sobre todo en las personas psóricas. — Deposiciones tan duras que todo se vé excoriado en derredor del ano. (Comp.: *Sint. car. gen. y Enfermedades de los niños.*)

Difteria.

Angina diftérica. — (*Angina lardácea.*) — (*Angina maligna.*) — Esta enfermedad ataca sobre todo á los niños. Es de tiempo en tiempo epidémica y contagiosa. Las amígdalas inflamadas y las partes de la cámara posterior de la boca están cubiertas de una capa blanquizca. Cuando se quita esta capa que se presenta bajo la forma de placas, ya grandes, ya pequeñas, se vé la membrana mucosa escoriada y sangrando fácilmente. Dícese que estas placas están formadas de pequeños hongos que ocasionan la gangrena de las partes que cubren.

El aliento es siempre de mal olor que puede hacerse hasta insoportable, cuando la enfermedad es muy intensa. La difteria es siempre idiopática, y frecuentemente acompaña á la escarlatina y sarampion. A veces ataca á la tráquea: en este caso va acompañada de síntomas de garrotillo, y concluye comunmente de un modo funesto.

La difteria, en general, se cura fácil y prontamente con el tratamiento homeopático, con tal que los medicamentos sean bien elegidos desde el principio. La experiencia nos ha demostrado que cada epidemia tiene sus medicamentos especiales.

Los medicamentos que nuestra experiencia ha demostrado como esencialmente eficaces, son: *Apis.*, *bell.*, *lach.*; ó: *Merc.*, *sol.* (mejor *merc. hydrocyan.*), ó *nitri ac.*, ó *ammon. mur.*

Como es difícil, aun para el médico experimentado, encontrar inmediatamente el medicamento específico, aconsejamos, si los síntomas que se presentan al principio son los febriles, con sed, agitación, insomnio, dolor de garganta, se dé *acon.* una cucharada cada tres horas. Si no hubiera alivio á las 24 horas, ó no se presentasen los síntomas febriles al principio, recúrrase á *bell.*, tomándola del mismo modo que *acon.* Si á las 24 ó 48 horas no se notase alivio alguno, debe darse *merc. sol.* ó mejor *merc. hydrocyan.* (*cianuro de mercurio*), una cucharada cada 2 ó 3 horas. Este medicamento ha sido el específico en muchas epidemias y en innumerables casos aislados (Alvarez).

Si el *merc.* no ha conseguido destruir la enfermedad, y los síntomas se agravan mas y mas, quedan dos medicamentos importantes que elegir: *Apis* y *laches.*; el primero cuando la hinchazon y la rubicundez de las partes afectas van acompañadas de humedad, y la segunda no es de color muy subido. *Laches.* conviene por el contrario cuando hay una gran sequedad en la garganta, y la rubicundez es de un rojo-escarlata muy subido, y aquella se manifiesta mucho mas al despertar el enfermo (Alvarez).

Hemos observado con bastante frecuencia que en ciertas épocas se cura facilmente con *apis* toda clase de enfermedades de garganta, asi como la difteria, de tal modo, que se ven desaparecer placas diftéricas bastante considerables en el espacio de 24 horas, empleando *Apis.* — En otras épocas no hace *Apis* efecto, y lo hacen *bell.*, *lach.* ó *ammon. mur.*; sobre todo cuando hay grande acúmulo de mucosidades en la boca con expectoración semejante á la saliva (*Ammon. m.* se ha mostrado tambien eficaz en los casos de tos acompañada de viscosidades ó catarro del estómago). El

Dr. Fischer recomienda *thuja* (una dosis, alta potencia), seguida de *acon.* y *apis*.

Para combatir los sintomas de parálisis que se manifiestan despues de un tratamiento alopático, los homeópatas americanos han recomendado *caust.* 30^a, ó *gelsem.*, en atenuaciones mas bajas. Tambien pueden consultarse: *Con.*, *lach.*, *silic.*; ó bien: *Ars.*, *bell.*, *nitri ac.*, *phosph.*

Disenteria.

Esta enfermedad es con frecuencia epidémica, y consiste en una inflamacion de los intestinos gruesos y sobre todo del recto. Va siempre acompañada de diarrea, pero las deposiciones no se componen mas que de una cantidad muy pequeña ó casi nula de materias fecales, y si de mucosidades ó de sangre, ó de las dos á la vez; son precedidas de violentos retortijones de vientre, ó de un fuerte deseo inutil de evacuar (pujo). Los medicamentos principales contra esta enfermedad tan peligrosa, son: *Acon.*, *ars.*, *bellad.*, *bry.*, *carb. v.*, *cham.*, *china*, *coloc.*, *ipec.*, *merc. sol.*, *merc. subl.*, *nux vomica*, *puls.*, *rhus.*, *sulph.*

En los casos tenaces y crónicos conviene *sulph.*

En los casos muy graves, con gran postracion de fuerzas, y con sintomas de disolucion de la sangre, ó de gangrena, elijase: *Ars.* ó *carb. v.*

Aconitum. Al principio de los sintomas febriles, principalmente si la disenteria se adquiere en dias calurosos seguidos de noches frias.

Arsenicum. Evacuaciones pútridas, involuntarias, gran debilidad, fetidez de la boca, orinas y aliento, estupor, y manchas rojas ó azules en diversas partes.

Belladonna. Está indicado en los casos en que *acon.* parece estar indicado, pero cuando este último medicamento no es suficiente; ó cuando hay delirio, lengua seca y roja en su punta.

Bryonia. Especialmente durante el calor del verano, y á consecuencia de un enfriamiento por bebidas frias.

Carb. veg. Si *ars.* no basta para el estado de putridez, y sobre todo cuando el aliento del enfermo es frio, frias estan sus estremidades, la cara descompuesta, y se queja de dolores quemantes.

Chamomilla. Cuando hay gran agitacion con sed, dolores reumáticos, mal humor con desesperacion.

China. Si *ars.* ni *carb. v.* sirven contra el estado de putridez, ó bien contra la disenteria que se manifiesta en las localidades pantanosas, y cuando la enfermedad adquiere el tipo intermitente.

Colocynthis. Violentos retortijones que obligan al enfermo á encogerse. Deposiciones mucosas y sanguinolentas, ó amarillas, espumosas ó biliosas; plenitud y presion en el vientre con gorgoteo é inflacion del mismo; escalofrios que parten del vientre. — Disenteria causada por una fuerte cólera.

Ipecacuanha. Especialmente conviene en la disenteria de otoño, con pujo fuertisimo, dolores cólicos, deposiciones primero de materias biliosas y luego sanguinolentas.

Mercurius sol. Violentos retortijones antes de deponer, precedidos de un gran deseo de hacer de vientre. Despues de la deposicion el deseo es mas intenso aun que antes; los esfuerzos para deponer no hacen salir á veces mas que sangre pura, ó materias mezcladas con sangre y mucosidades verdes, amarillas; gritos al deponer, y frio y escalofrios; náuseas, eruptos, sudor frio en la cara, gran debilidad y temblor de las estremidades.

Mercurius subl. Parece estar indicado principalmente si la vegiga de la orina se afecta á la vez, y si hay deseo continuo de orinar.

Nux v. Pequeñas deposiciones frecuentes con pujo y evacuacion de mucosidades sanguinolentas, dolores violentos en la region umbilical; ó deseos de deponer numerosos é inútiles, cesando con la deposicion.

Pulsatilla. Cuando las evacuaciones no contienen mas que mucosidades estriadas de sangre, deseos de vomitar ó vómitos mucosos, escalofrios frecuentes, respiracion dificil y humor quejumbroso, lloroso.

Rhus. Disenteria crónica con evacuaciones nocturnas involuntarias, sin dolores ni pujos.

Sulphur. En los casos crónicos ó en los mas desesperados, cuando ningun medicamento produce efecto alguno, y si hay: respiracion dificil, pujo violento sobre todo por la noche, deposiciones extriadas de sangre, deseo continuo de hacer de vientre, que molesta mucho y cansa.

Compárese: *Diarrea* y consúltese tambien *podoph*.

Divieso.

(*Forúnculo*.)

Todo mundo conoce este pequeño tumor tan doloroso. No debe nunca apresurarse la supuracion con cataplasmas ó unguentos irritantes, como la miel, cebollas cocidas, etc.; y es preciso abstenerse siempre de toda incision en el forúnculo.

Los medicamentos siguientes bastan siempre para quitar el dolor y apresurar la supuracion:

Aconitum. Cuando hay sintomas febriles y los dolores son intensos.

Apis. Si los dolores son punzantes, urentes.

Arnica. Pequeños forunculos muy dolorosos.

Arsenicum. Si son urentes, como si se aplicasen carbones ardiendo á la parte enferma.

Belladonna. Fuertes dolores, y el divieso se pone tan encarnado que parece una verdadera erisipela su superficie.

Lachesis. Si se advierten manchas ó pequeñas ampollas de color azulado.

Mercurius. Dolores pulsativos y lancinantes, hinchazon dura, roja y reluciente, con prurito en el divieso ó en su derredor.

Silicea. Medicamento principal para apresurar la supuración, ó agotar la del divieso ya abierto, y concluir su curación. Dolores pungitivos, lancinantes, urentes, insoportables, con inquietud, gran inflamación con mucha rubicundez, abultamiento excesivo del tumor, y fiebre á veces.

Stramonium. Medicamento muy eficaz cuando los dolores son tan violentos que vuelven al enfermo casi loco (R.). Gracias á *stramonium* los sufrimientos disminuyen casi al instante y la supuración se acelera.

Lycopodium. Cuando se forman abscesos y no se puede soportar nada sobre el divieso, antes se aumenta considerablemente el dolor (L.).

El grande divieso maligno que se presenta á veces en la espalda, exige de preferencia *silic.*, ó *ars.* si hay postración y los dolores son insufribles, y fiebre altísima con gran sed y ardor: ó *Hyosc.*, *lyc.*, *nitri ac.* (B.); *apis*, *lach.*, *merc.*, *stram.* (B.).

Para combatir la disposición á padecer diviesos, consúltense: *Arn.*, ó *Ars.*, *calc.*, *lyc.*, *nux v.*, *phos. ac.*, *silic.*, *sulph.* (B.).

Además, para combatir los diviesos con dolores lancinantes al tacto: déense: *Mur. ac.*, *silic.*

Los periódicos ó que se presentan en épocas fijas: *Lyc.*

Los pequeños: *Magn.*, *zinc.*

Los que se presentan en primavera: *Bell.*

Los voluminosos: *Ars.*, *hyosc.*, *lyc.*, *nitri ac.*, *silic.*

Dolores.

No podemos estendernos en este lugar sobre las diversas clases de dolores, sino dar solamente algunas indicaciones características para los principales medicamentos que se usan.

Aconitum. Accesos de dolores con sed y cara encarnada. — Gran irritación nerviosa y agitación, como si se estuviese en la agonía.

Belladonna. Dolores que aparecen y desaparecen súbitamente (G.).

China. Accesos de dolores provocados por el mas ligero tacto de la parte enferma, y que se hacen entonces insufribles.

Platina. Los dolores aumentan poco á poco y disminuyen lo mismo.

Sulphuris acidum: Dolores que aumentan poco á poco, pero desaparecen rápidamente.

Valeriana. Dolores palpitantes, á sacudidas, instantáneos, que disminuyen con un cambio de posicion.

Ademas, compárense los sintomas característicos generales de: *Ars.*, *cham.*, *coff.*, *puls.*

Podrán tambien servir de guia en la eleccion de los medicamentos, las circunstancias concomitantes siguientes:

Ansiedad ó angustia: *Ars.*, *bell.*, *carb. v.*, *cham.*, *natr.*, *veratr.*

Respiracion entrecortada: *Natr. m.*, *puls.*

Rubicundez de una sola megilla: *Cham.*

Estando de pié: *Agar.*

Al descubrirse: *Aur.*

Cada segundo dia: *Lyc.*

Levantándose del asiento: *Puls.*

Andando: *Ang.*, *veratr.*

Dando un paso en falso: *Bry.*

Oprimiendo las partes doloridas: *Plat.*

Al subir cuestras ó escaleras: *Calc.*

Despues de haber bebido: *Helleb.*

Estando acostado: *Mosch.*

Con voluptuosidad: *Laches.*, *tarant.* (N.).

Sufrimientos causados por los gases (con calor):

Carb. v.

Dolores que provocan delirio ó locura: *Veratr.*

Sed: *Acon.*, *cham.*

Falta de sed: *Lyc.*, *puls.*

Respiracion corta: *Natr. m.*, *puls.*

Escalofríos: *Coloc., dulc., mez., puls., sep.*; ó bien: *Ars., graph., ign., rhus.*

Calor: *Acon., rhus*, ó: *Bell., bry., carb. v., silic.*

Transpiración: *Lach., merc., natr., sep.*, ó: *Ant. tart., bry., coloc., rhus, sulph.*

Compárense además: *Neuralgia facial, Dolor de cabeza, Jaqueca, Dolor de riñones, etc.*

Embarazo.

Es sabido que sobreviene durante el embarazo en muchas mugeres, una multitud de padecimientos que antiguamente se combatían frecuentemente con sangrias. Ahora declaran los médicos alópatas, al contrario, que no se puede y también que no es necesario hacer nada. Esto no es más que un pretexto para ocultar la impotencia de su método. Todo lo contrario sucede con el nuestro. La experiencia ha demostrado que no solo cura la homeopatía los padecimientos ocasionados por el embarazo, sin peligro para la madre y su niño, sino que también graves enfermedades crónicas desaparecen más fácilmente durante el embarazo; de suerte, que con un tratamiento cuidadoso y atento, la madre y el niño se verán libres de enfermedades cuya curación hubiera sido más difícil, ó imposible, después del parto. Hé aquí porque es preciso aconsejar la asistencia lo más pronto posible de un médico homeópata.

No hablaremos aquí más que de los padecimientos más comunes del embarazo, indicando los medicamentos que la experiencia ha sancionado.

Para las venas dilatadas, ó varices, que se presentan generalmente en el embarazo: Arn., ó puls., ó carb. v., lyc., sulph. (Vendaje metódico ó medias elásticas.)

En los casos ligeros de *diarrea: Ant. cr., china, dulc., puls., rheum.* — En los casos graves, producto de una enfermedad crónica: *Lyc., merc., petrol., phos., sep., sulph., thuja (B).* (Compárense: *Diarrea.*)

Manchas en la cara: Con., sep., thuja.

Deseo frecuente y dificultad de orinar: Puls. ó: Cocc., con., nux v., phos. ac., sulph.

Flujo insensible de orina: Phos. ac., rhus.

Hambre voraz, ó enferniza (bulimia): Ars., magn. m., natr. m., nux v., petrol., rhus, sepia.

Dolores de estomago, malas digestiones, náuseas y vómitos: Ipec. ó: Con., fer., kreos., lach., magn. m., natr. m., nux v., petrol., phos., puls., sep., veratr., ó sulph. (J.).

Estreñimiento de vientre: Bry., nux v., op., sep.; ó: Alum., lyc., sulph.

Dolor de vientre: Arn., bry., cham., nux v., puls., sep.; ó Bell., lach., veratr.

Dolor de muelas: China, sulph.; ó: Apis, calc., magn. c., nux m., nux v., puls., rhus, staph., sep.; ó Alum., bell., hyosc., merc.

Para las convulsiones y espasmos nerviosos: Bell., cham., cic., hyosc., ign., tarant.; ó Cocc., mosch., plat., stram.

Para el dolor de cabeza: Bell., bry., china, cocc., nux v., puls., veratr.

Para el sueño tenaz y pesado, que acomete á diversas horas: Op. ó: Acon., bell., lach.

Para las llamaradas de calor á la cara y cabeza (sofocos): Acon., bell., lach., puls.

Para la pesadez general, con horror al movimiento, pulso lleno, deseo de estar hechada ó sentada continuamente la embarazada: Acon., bell., nux v., sep., ú op.

Para la tristeza y llanto sin causa apreciable: Ign., puls.; ó bien: bell., phos. ac., staph.

Los medicamentos deben darse con circumspeccion; no en dosis demasiado fuertes ó frecuentes.

Enfriamiento.

Los principales medicamentos contra las consecuencias de un enfriamiento, son: *Acon., ars., bry., calc., carb. veg., cham., coff., dule., ipec., merc., nux v., puls., rhus, sulph.*

Si los sufrimientos á consecuencia del enfriamiento, son agudos, febriles y dolorosos: *Acon.*, *ars.*, *bell.*, *cham.*, *coff.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.* — Si los dolores son insignificantes y no existen sintomas febriles: *Dulc.*, *ipéc.*, *puls.* — Si los sufrimientos son rebeldes, crónicos: *Carb. veg.*, *calc.*, *silic.*, *sulph.*, y aun *ars.*

Si el enfriamiento ha sido en el agua, ó por el frio húmedo: *Calc.*, *dulc.*, *puls.*, *rhus.*, *sulph.*

Para el enfriamiento de la cabeza: *Bell.*, *glonoin* (despues de cortarse el pelo), *sep.*

El del estómago con helados, agua fria estando sudando y frutas: *Ars.*, *bry.*, *puls.*, *veratr.*

El de los pies: *Silic.*, ó: *Puls.*, *cham.*

Despues de haber tenido los pies mojados: *Silic.*, ó: *Puls.*, *sep.*, *rhus.*

Despues de haber tenido el cuerpo completamente mojado: *Calc.*, *sep.*, *rhus.*, ó: *Bell.*, *bry.*, *dulc.*, *nux mosch.*

Despues de haberse mojado completamente el cuerpo, estando sudando: *Rhus.*, ó: *Acon.*, *bry.*, *dulc.*, *sep.*

Enfriamiento despues de haberse mojado la cabeza: *Puls.*, ó *bell.*, *bry.*, *dulc.*, *rhus.*

Para las personas que se enfrian facilmente porque transpiran mucho: *Carb. v.*, *china*, *hep.*, *merc.*, *phos. ac.*, *rhus.*, *veratr.*

Las que se enfrian facilmente, y que el frio mas pequeño pone enfermas: *Bry.*, *calc.*, *carb. v.*, *merc.*, *rhus.*, *silic.*, *veratr.*: *Ars.*, cuando el frio provoca dolores; *cham.* y *nux v.* cuando provoca escalofrios.

Para las erupciones suprimidas por un enfriamiento: *Ars.*, *bry.*, *ipéc.*, *phos.*, *puls.*, *rhus.*, *sulph.*

Para los enfriamientos en tiempo húmedo y frio: *Calc.*, *carb. veg.*, *dulc.*, *merc.*, *puls.*, *rhus.*, *veratr.*

Durante una tempestad: *Bry.*, *rhod.*, *silic.*

Los enfriamientos á cada cambio de temperatura ceden con: *Calc.*, *carb. v.*, *dulc.*, *lach.*, *merc.*, *rhus.*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.*

Con el frio seco: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *ipéc.*, *sulph.*

Con el calor: *Ars.*, *bell.*, *bry.*, *carb. veg.*, *dulc.*, *ipéc.*, *merc.*, *veratr.*

Epilepsia.

En los casos agudos, que son los menos difíciles de curar, investigúese la causa de la enfermedad; y dese, cuando la epilepsia provenga:

De un miedo ó susto: *Op.*, ó: *Ign.*, *bell.*

De una aflicción ó cólera: *Ign.*, *cham.*

De la supresion de la menstruacion: *Lach.*, *puls.*

En los casos recientes recúrrase á: *Bell.*, *ign.*, *nux v.*, *op.*

En los crónicos dése primero *Sulph.*, y despues si este no bastase, consúltense: *Calc.*, *caust.*, *cupr.*, *silic.*; ó bien *bell.*, seguido de *lach.*, *hep.*, *silic.*, *tarant.*

Si un poco de agua, tomado antes del acceso, lo evita, dése: *Caust.* ó *cupr.*; si los accesos no se verifican mas que por la noche, sobre todo durante la luna nueva: *Silic.*

La epilepsia depende frecuentemente del onanismo; no se podrá curar si el enfermo no renuncia definitivamente á este vicio.

Erisipela.

Esta enfermedad, que consiste en una inflamacion y tumefaccion de la piel, tiene por le comun su asiento en la cara y la parte de la cabeza cubierta por los cabellos. Los medicamentos principales son:

Aconitum. Se da este medicamento al principio, cuando hay fiebre, fuerte dolor de cabeza, sed, y quebrantamiento general.

Apis. Está indicado cuando la rubieundez de la erisipela es pálida, y los párpados estan edematosos.

Arnica y *ruta.* Cuando la erisipela es consecuencia de una herida.

Belladonna. Cuando la rubieundez de la piel de la cara es brillante y muy roja, sobre todo en el lado derecho (R.). Delirio, escitacion é inquietud.

Borax. Cuando la erisipela se ha declarado en el lado izquierdo de la cara, y cuando el enfermo sufre horriblemente si se rie.

Graphites. Cuando la erisipela es vesiculosa, sobre todo si el enfermo á sufrido otras iguales.

Lachesis. Cuando la piel es de color violáceo; principalmente cuando el enfermo tiene accesos de delirio, desde que cierra los ojos (R.).

Phosphori acidum. Cuando la erisipela se declara á consecuencia de una herida del periostio.

Rhus. Cuando la erisipela se declara al principio en el lado izquierdo y pasa luego al lado derecho de la cara, formando vésiculas, invade el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo; delirio, fiebre alta, lengua seca, sed.

Silicea. Cuando la erisipela sobreviene á consecuencia de la herida del hueso.

Stram. Erisipela difícil y tarda en salir, con delirio mas ó menos furioso, lengua seca, fiebre intensa, sed, y agitacion continua.

Cuando la erisipela ataca las membranas cerebrales, sea por no tener facilidad para salir á la piel, sea por la retirada mas ó menos repentina despues de haber brotado, el medicamento principal es *Stram.*, ó *bell.*, *rhus.*, ó *laches*, *camph.*, *ars.*

La erisipela *sencilla* se cura bien y pronto con: *Acon.*, *bell.*, *lach.* y *rhus.*

La *fugaz*, con: *Apis*, y *rhus.*, ó tambien *graph.*

La vesiculosa, con: *Graph.*, *rhus.*, ó *lach.*, *stram.*

La *flegmonosa*, que ataca generalmente las extremidades, con gran inflamacion, y que se extiende mucho, se combate con *Acon.* al principio, y despues con *bell.*, *graph.*, *lach.*, *puls.*, *rhus.*, ó *merc.* — Si sobreviene la supuracion: *Hepar.*, ó *silic.*, y *graph.* si se presenta la fiebre lenta con supuracion inagotable.

Las erisipelas acompañadas de edema ceden á: *Apis* y *rhus.*

Las que ulceran las regiones donde salen: *Clemat.*,
rhus. y *silic.*

En las que se presenta la gangrena. *Ars.*, *carb. v.*,
lach., ó *chinin.*

Erupciones.

Erupciones de la piel. — Los medicamentos principales contra las erupciones crónicas en general, son: *Antim. cr.*, *ars.*, *calc.*, *caust.*, *lyc.*, *merc.*, *rhus.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*

Erupciones con dolores urentes: *Ars.*, *rhus.*

Erupciones con exudación: *Carb. v.*, *graph.*, *lyc.*, *rhus.*

Erupciones acompañadas de picor: *Rhus.*, *sep.*,
staph. — *Caust.*, *merc.*, *sulph.*

Erupciones dolorosas: *Arn.*, *bell.*, *phos. ac.* — *China.*
dulc., *hep.*, *lyc.*, *puls.*, *sep.*, *silic.*

Erupciones sin dolores: *Lyc.*, *sulph.*

Erupciones con costras: *Calc.*, *con.*, *graph.*, *lyc.*, *rhus.*

Erupciones con dolores como de heridas: *Graph.*,
hep., *sep.*

Erupciones de la cabeza. — Se eligirá entre los medicamentos siguientes (Raue):

Calc. c. ó *lyc.*, si la erupción produce una secreción espesa, pero no corrosiva.

Rhus. si la piel que rodea la erupción está inflamada y ulcerada.

Baryt. c., *graph.*, *natr. m.*, *phos.*, *rhus.*, si la erupción hace caer los cabellos.

Lyc. si la erupción exhala mal olor y va acompañada de miseria.

Natr. m. si la erupción está circunscrita á las partes cubiertas de pelo y á la nuca.

Clemat. y *petrol.* si tiene principalmente su asiento en el occipucio y cuello.

Hepar. si pica sobre todo por la mañana al levantarse: al rascarse se provocan dolores urentes y una sensación de herida. — Cuando se han empleado unguentos exteriormente.

Clemat., *graph.*, *hep.*, *lyc.*, *natr. m.*, *rhus.*, *staph.*,
thuja: Erupciones con secreción húmeda.

Ars., *calc.*, *merc.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*: Erupciones
con costras secas.

El profesor Guernsey recomienda como muy eficaces
los medicamentos siguientes:

Arsenicum. La piel de la cabeza está seca y áspera,
y las partes cubiertas de pelo lo están de costras secas
que pueden extenderse hasta la frente, cara y orejas.

Graphites. Las erupciones de la parte cabelluda de
la cabeza segregan un líquido claro y viscoso, que forma
costras.

Phosphorus. La piel de la cabeza está blanca y lisa;
los cabellos caen.

Calcareo carbonica. Conviene á los niños linfáticos
con fontanelas abiertas: las costras son tan grandes y
gruesas que no forman mas que una, cubriendo fre-
cuentemente la mitad de la cabeza. Un pus espeso sale
de estas costras.

Guernsey proscribe toda clase de lociones, porque
dice que parece que la vegetación de las costras y los
pequeños hongos que las engendran comunmente, se hace
mas próspera. — Una ó dos dosis de una alta atenua-
ción, administradas á largos intervalos, y de una vez,
son suficientes para curar la enfermedad.

Erupciones de la cara. — Las mas frecuentes son
las siguientes:

Costra de leche de los niños. Se la trata con exito
con: *Ars.*, *bar.*, *calc.*, *dulc.*, *graph.*, *hep.*, *lyc.*, *merc.*,
rhus., *sep.*, *sulph.*

Arsenicum. Conviene en las erupciones secas, esca-
mosas, que hasta hacen caer los cabellos, cuando se ex-
tienden al cuero cabelludo. *Ars.* es excelente tambien,
cuando la erupción se presenta bajo la forma de flores
y pequeñas vesículas, llenas de un líquido acre que
causa al enfermo punzadas y quemazon.

Baryta. Conviene á los niños mal nutridos, en los

que se retrasa el desarrollo, ó que tienen las glándulas infartadas y duras.

Calcareo carbonica. Se da á los niños obesos y escrofulosos. Costras gruesas encubren un pus amarillento.

Dulcamara. Cuando hay costras gruesas y oscuras en la cara, frente, sienes y barba; cuando sus bordes son rubicundos y sangran facilmente cuando se les rasca.

Graphites. Cuando la erupcion segrega un liquido claro como agua, viscoso, que hace caer las costras, que se forman de nuevo. El asiento de la erupcion es ordinariamente en la barba y detras de las orejas.

Hepar. Cuando la erupcion se estiende siempre mas y mas en forma de pequeñas vesiculas.

Lycopodium. Cuando tiene un olor fétido y sangra facilmente.

Mercurius. Conviene á los niños cuyas encias estan escorbúticas, y cuando hay salivacion.

Rhus toxicodendron. Si la erupcion está rodeada por todas partes de una *areola roja é inflamada*, con fuerte picor sobre todo durante la noche (G.). Las glándulas del cuello y barba están infartadas y la nuca está rigida (R.).

Sulphur. Cuando la erupcion se estiende mas y mas por todo el cuerpo, y cuando produce al enfermo un gran picor (G.). Cuando hay erupciones vesiculosas con grande picor, y sangran cuando se rascan (B.).

Es inutil observar, que cuando los sintomas no se opongian, estos medicamentos pueden ser empleados contra erupciones que afecten otras partes del cuerpo mas que la cara.

Mentagra (Herpes en la barba). — Exigen: *Ars.* y *caust.* Se los alterna cada quince dias. Ademas: *Calc.*, *mezer.* (J.).

Couperose (Pústulas rojas en la cara). — Exige frecuentemente: *Ars.*, *kreos.*, *calc.*, *carb. an.*; ó: *Rhus.*, *ruta*, *veratr.* (J.). Si va acompañada de fiebre es preciso emplear: *Ars.*, *ign.*, *natr. m.* y *nux v.*

Efélides (*Manchas pequeñas de color pardo*). — Desaparecen con el empleo de: *Lyc.*, *phos.*, *sulph.*; ó: *Ant. cr.*, *calc.*, *dulc.*, *graph.*, *sep.*

N. B. Se disolverán los medicamentos en agua y se administrarán por cucharadas dos ó tres veces por día durante tres ó cinco días; despues se suspenderán por algun tiempo; nunca se repetirá el medicamento á no ser que la enfermedad se agrave.

Escarlatina.

Es una enfermedad de la piel muy conocida, generalmente epidémica; no empieza como el sarampion por el constipado y la tos, sino por enfermedad de la garganta, que hace sospechar un angina simple. La erupcion va siempre precedida de fuerte fiebre con dolores de cabeza, y empieza del segundo al tercero día de enfermedad por manchas encarnadas, primero en el cuello, y luego por todo el cuerpo. Estas manchas, de color rojo ya subido, ya bajo, se confunden generalmente tanto, que grandes porciones de la piel se las vé cubiertas de una rubicundez erisipelatosa. El caracter de esta epidemia es muy variado, ya es sencillo, ya es maligno. El delirio y las convulsiones preceden frecuentemente á la erupcion; á veces va acompañada de graves sintomas cerebrales y soñolencia.

La piel se descama ordinariamente del sexto al noveno día, y á veces antes, en pedazos mas ó menos grandes.

A veces la inflamacion de la garganta se hace maligna, diftérica (Véase: *Angina diftérica*). Hay tambien epidemias en las que los riñones se afectan gravemente, con orina albuminosa y la hidropesia consecutiva.

Ademas del regimen apropiado y de una temperatura uniforme de 16° C. en la habitacion donde esté el enfermo, es preciso tenerle bien abrigado, que no se destape, que no se levante de la cama, y que la piel transpire mucho al brotar la erupcion, y algo menes

mientras subsista. En la descamacion es cuando hay mas peligro de que sobrevenga la hidropesia y otras enfermedades, si no se tiene cuidado de que el enfermo no se enfrie y cometa algun esceso en la comida ó bebida. Todo el cuidado es poco al considerar los peligros á que está expuesto el enfermo, por falta de observancia en el régimen, y alimentarse demasiado, aligerarse de ropa y levantarse antes de tiempo.

En cuanto al tratamiento homeopático, Hahnemann fué el primero que recomendó la *belladonna* como preservativo de la escarlatina. Mas tarde comprendió que las epidemias de escarlatina no tienen siempre el mismo caracter, y que la *belladonna* servia por lo tanto solamente para la escarlatina *lisa*. Las experiencias contradictorias de los médicos homeópatas han demostrado que la *belladonna* no es un medicamento específico absoluto contra todas las clases de escarlatina, pues puede haber casos y epidemias en que la *belladonna* no produzca efecto, produciéndolo cualquiera de los medicamentos siguientes: *Apis.*, *hyosc.*, *rhus.*, *stram.* —

Para combatir la fiebre con los demas sintomas que la acompañan antes de la salida de la erupcion, dese *acon.* una cucharada cada tres horas.

Para la angina con fuerte dolor de garganta y dificultad de deglutir, *bellad.*, y si este no bastase, *merc.*; y si este tampoco, *baryt. c.* ó *hepar*.

Si la angina se hiciera diftérica, y la difteria se propagase ó no á la garganta por completo, recúrrase á *merc.*, ó mejor *merc. hidrocyán.* (*cianuro de mercurio*); y si no bastase, á *lach.*, ó *apis* (Véase: *Difteritis*).

Si la angina se hace gangrenosa: *Ars.*, y despues *carb. v.*, *lach.*, *sulph.*

A veces se presentan vómitos tan tenaces, con ó sin diarrea, ó á veces esta, tambien tenaz, que es preciso quitar estos síntomas, porque sino no brota la erupcion, y el enfermo se muere. En estos casos el medicamento indicado en primer lugar es *Ipec.*, una cucharada cada dos ó tres horas. Si *ipéc.* no bastase dése *ars.*

Si hay dificultad grande de orinar, con escozor, la orina sale gota á gota, dése *Canth.*; y si este no bastase recúrrase á *camab., con., dulc.*

El insomnio es frecuentemente un sintoma que molesta mucho á los enfermos, sobre todo á los niños; los pone muy nerviosos, y es otro de los sintomas que impiden brotar la erupcion ó que esta progresa si ha brotado ya. El medicamento mejor contra el insomnio es *Coffea*, y si este no bastase, consúltense: *Acon., bell., nuc. v.* Tanto *Coffea* como los otros medicamentos se dan de una vez, una dosis sobre la lengua, en seco, ó en dos cucharadas de agua, antes de la media noche, y sin interrumpir el medicamento que tome el enfermo para combatir la enfermedad, esperando solo que pasen tres ó cuatro horas despues de haber tomado *coffea* ó cualquiera de los otros, para darle el medicamento que tomaba antes. El insomnio es un sintoma grave á veces, y que no se debe descuidar.

En los casos de *repercusion* ó retirada brusca de la erupcion, situacion gravisima que ocasiona la muerte del enfermo sino se acude á tiempo á remediarla, se consigue hacer reaparecer la erupcion á beneficio de: *Bry., ó phos., stram., sulph.* Si se presentan sintomas cerebrales con delirio furioso, *bell.*, y si este no alivia pronto dése *stram.*; *opium* conviene cuando á los sintomas cerebrales acompaña un sueño soporoso.

Las indicaciones siguientes son las mas importantes en el tratamiento de la escarlatina:

Aconitum. Malestar general, inquietud, desasosiego, insomnio, fiebre, sed, vómitos biliosos, dolor de cabeza, cara encarnada, vértigos, salida de sangre por las narices; congestion ó inflamacion de la garganta.

Arsenicum. Pérdida total de fuerzas, postracion con calor quemante, cara urente; sudores continuos ó nocturnos, descomposicion del semblante, manos y pies frios; angina gangrenosa, grande agitacion é insomnio. Este medicamento conviene en el último periodo de la

escarlatina maligna, y para la hidropesia que en muchos casos sobreviene despues de concluida la erupcion.

Belladonna. Grande inflamacion de la garganta con imposibilidad de deglutir y dolores vivos y punzantes; gran dolor de cabeza, sed violenta; ojos congestionados y dolorosos, con horror á la luz, á cuyo brillo se cierran involuntariamente; vertigos con oscurecimiento de la vista; lengua encarnada y seca; insomnio con inquietud, gritos é imposibilidad de estar mucho tiempo en una misma postura; visiones raras, que asustan, cerrando los ojos y á veces hasta teniéndolos abiertos; subsaltos de tendones y estremecimientos generales ó locales de alguna parte del cuerpo.

Capsicum. — Escoriacion de la garganta; contraccion y espasmos en la garganta; acumulacion de mucosidades espesas en la garganta, boca y nariz, con dificultad para arrojarlas; vesiculas en la boca y lengua; pujo para orinar; dolores urentes al orinar; sueño intranquilo, lleno de ensueños; postracion y repugnancia á incorporarse siquiera en la cama y tomar lo que le dan.

Mercurius. Uno de los principales medicamentos cuando predominan los sintomas de inflamacion de la boca, con salivacion, úlceras en la boca, la que está cubierta á veces de una capa blanca, juntamente con la lengua (inflamacion cremosa); angina diftérica, infarto de las glándulas del cuello, y ulceras en la garganta.

Muriatis acidum. Medicamento que debe tenerse en cuenta en los casos de escarlatina maligna con: Aliento fétido, lengua y labios secos, agrietados, y negros á veces; exudacion de sangre de las encias; megillas de color rojo subido; color livido de la erupcion, especialmente en el cuello; orinas involuntarias; el enfermo se escurre poco á poco á los pies de la cama; postracion, mirada apagada, embotamiento de los sentidos; úlceras en la boca, garganta, vetanas de la nariz, con flujo fétido ó corrosivo.

Phosphorus. Exudacion frecuente de sangre por las

narices, y á veces de la boca, oídos y ojos; lengua y labios secos, asperos, tostados, cubiertos de costras negras; pérdida de la palabra y oído; gran sequedad de boca y garganta; incontinencia de orina; sed ardiente y calor urente; delirios tranquilos, ó sopor con inmovilidad; caída de los cabellos durante la enfermedad ó en la convalecencia.

Rhus. Se emplea solo en los casos raros en que la erupcion se convierte en erisipela vesiculosa, con soñolencia, sobresaltos, agitacion, gran sed y fiebre alta; ó en los casos en que la erupcion se complica con sintomas tifoideos, con gran postracion y debilidad, orinas sanguinolentas con dificultad de orinar; lengua y labios secos, agrietados, de color oscuro; y dientes cubiertos de mucosidas oscuras, que se espesan y secan, poniéndose de color negruzco; delirio furioso ó bajo, con palabras incoherentes y entrecortadas.

Stramonium. Uno de los primeros medicamentos para hacer brotar la erupcion, cuando es difícil conseguir ésto, ó en los casos de retirada brusca de la misma, con: Delirio furioso, deseo de morder, escupir, arañar y tirarse de la cama; perdida del conocimiento, saltos musculares y de todo el cuerpo, miedo de personas imaginarias, sed violenta, frio general ó fiebre alta; palidez de la piel en los casos de retirada de la erupcion; orinas suprimidas ó involuntarias; ojos encarnados con mirada hosca, brillante, ó llena de miedo; cantos y risas involuntarias á veces, y sequedad de la boca, fauces, ojos y narices (Alvarez).

Sulphur. En los casos complicados con sintomas tifoideos, con lengua seca, agrietada, encarnada, y cubierta de mucosidades oscuras; sed con fiebre ardiente; delirios continuos ó sueño soporoso, saltos de tendones y ojos convulsos; cara de un rojo subido con gran sequedad y obstruccion de las narices por las costras que contienen; orinas escasas y rojas.

En la terminacion de la escarlatina suele presentarse la inflamacion de una ó ambas parótidas: los principales

medicamentos para combatirla son: *Bell.*, *merc.* y *rhus.*; y si estos no bastasen: *Carb. v.*, *phos.*, *silic.*, *sulph.*

Tambien suele presentarse el flujo purulento de oídos (*otorrea*), que se combatirá con: *Hepar.*, *merc.*, *puls.*, *silic.* ó *sulph.* — Si sobreviniera inflamacion de uno ó ambos oídos, dese: *Bell.*, *cham.*, *hep.*, *pulsat.*

Para la hidropesia general (*anasarca*) que sobreviene despues de la erupcion, el medicamento principal es: *Ars.* Los medicos americanos de nuestra escuela recomiendan *Apis.* Si *ars.* ni *apis* dominan la hidropesia, consúltense: *Baryt. m.*, *hell.*, *silic.*

Para las hidropesias parciales del vientre (*ascitis*), de la cabeza (*hidrocéfalo*), y del pecho (*hidrotorax*), de los pies, manos, cara (*edemas*), etc., consúltense los mismos medicamentos que para la hidropesia general, y ademas: *Arn.*, *bell.*, *digit.*, *senna*, *squilla.*

Escorbuto.

Esta enfermedad puede empezar por sintomas generales ó por locales. Si empieza por los primeros, el enfermo pierde gradualmente sus fuerzas y actividad; sus ojos se hundén y rodean de un círculo elevado; dolores fuertes en las extremidades y articulaciones, y gran abatimiento. Los sintomas locales ya precedan ó sigan á los generales, son los siguientes: Tumefaccion de las encias, reblandecimiento ulceroso con hemorragia de las mismas; aliento extraordinariamente fétido; manchas y equimosis en la piel; tumores sanguineos en el trayecto de los músculos, que se ulceran y exudan sangre con mas ó menos profusion. Debilidad suma con síncope repétidos, opresion constante, diarrea fétida, á veces sanguinolenta; si la enfermedad no se contiene, la ulceracion destruye las encias, los dientes se mueven y caen, y hasta los huesos maxilares se llegan á cariar; la fiebre lenta y las hemorragias acaban por fin poco á poco con la vida del enfermo.

Causas de esta enfermedad que deben evitarse ó removerse para su tratamiento: los alimentos salados, la falta de vegetales frescos y agua fresca, el frio y el calor húmedos, habitaciones húmedas y mal ventiladas, trabajos rudos y exsesivos con alimentacion escasa é impresiones morales tristes.

La enfermedad es *esporádica* cuando acomete á individuos aislados; *epidémica* cuand acomete á un gran número á la vez, como sucede en los buques, guarniciones, prisiones, ciudades sitiadas, etc. Cuanto el individuo es mas debil por su constitucion fisica, mas le atacará la enfermedad.

Los medicamentos principales para combatir esta enfermedad con exito pronto y seguro, son: *Kreos.*, *mercurius*, *muriat. ac.*, *nux v.*, *sulph.*

Kreosotum. — Rubicundez inflamatoria de las encias con prolongacion de los dientes; dolores tractivos y punzantes en las encias que se estienden hasta las sienes; úlceras y fungosidades fétidas en la boca y encias, con hemorrogias sero sanguinolentas de un olor fétido; acumulacion de saliva serosa en la boca; úlceras pútridas en la lengua, encias, carrillos internos y paladar, con gran fetidez; aumento de todos los sintomas en la mitad superior de la boea y al bostezar; agravacion notable con la menstruacion, despues de esta, y con el flujo blanco, que es tambien fétido y sanguinolento á veces, diarrea pútrida; fiebre con postracion; demacracion; laxitud y pesadez, sobre todo en las piernas; accesos de desvanecimiento al despertar por la mañana; abatimiento y desespera de su curacion; melancolia con deseo de la muerte.

Mercurius. — Prurito y rubicundez de la encias; encias fungosas, esponjosas y que sangran facilmente; descarnamiento ó separacion de las encias de los dientes, con dolor quemante y sensacion de escoriacion al tocarlas y comer; encias lividas, descoloridas y muy sensibles; úlceras en las encias; salivacion; sed aunque haya mucha saliva; la boca exhala un olor fétido; gusto sa-

lado, pútrido: gran debilidad en las articulaciones; lengua cargada de mucosidades espesas y ulcerada en los bordes y punta; saliva á veces sanguinolenta; pérdida de la palabra á causa de la inflamacion ó ulceracion de la boca y lengua; temblor de esta; el olor que exhala la boca es cadaveroso; agravacion de todos los sintomas de la boca por la tarde y noche, acostándose del lado derecho, con el calor de la cama y con el aire fresco de la tarde; sudores abundantes que no alivian; sudores en la cara y cabeza; todo el cuerpo está como magullado; gran cansancio y debilidad con pérdida de las fuerzas y temblor de todos los miembros; demacracion general y recargos vespertinos con sudores, abatimiento moral; aprensiones; morosidad y repugnancia á la conversacion. — Vacilamiento y caida de los dientes.

Muriatis acidum. — Grande ulceracion de la boca y sensibilidad de las partes al tacto; úlceras, pútridas, negruzcas, que exhudan sangre negruzca; úlceras profundas y pústulas en la lengua; olor horriblemente fétido; saliva viscosa, negruzca, fétida; dolores pulsativos en las encias y lengua, agravados bebiendo agua fria; hormigueo y presion en las encias; la boca en su totalidad presenta un aspecto muy, oscuro ó negro; sequedad de la boca con imposibilidad de tragar agua; agravacion de todos los sintomas, en el reposo; postracion escesiva con orinas y deposiciones involuntarias; horror al movimiento; marcha incierta por la gran debilidad; tristeza, taciturnidad y concentracion con ansiedad.

Nux vomica. — Úlceras de olor fétido, granos y vesiculas dolorosas en la boca, en la lengua y paladar; vacilamiento y caida de los dientes (despues de *merc.*); hinchazon pútrida y dolorosa de las encias, á veces con dolores pulsativos como cuando hay un absceso, ardor, punzadas y exudacion facil de sangre; las bebidas y alimentos calientes, asi como el agua fria, el vino y el café, agravan todos los sintomas de la boca; gusto pútrido y fétido en la boca; los alimentos no tienen gusto; hambre con aversion á los alimentos; lengua negruzca

y escoriada con bordes rojos; agravacion por la mañana y noche, al tragar los alimentos, y comiendo y bebiendo cosas frias; gran laxitud y fatiga con repulsion al movimiento, que agrava todos los sintomas; pérdida rápida de las fuerzas y gran debilidad de los músculos; estreñimiento de vientre ó deposiciones frecuentes, pequeñas y fétidas; humor hipocondriaco, inquietud, desesperacion, mal humor y temor á la muerte.

Sulphur. — Hinchazon de las encias con dolores pungitivos; hinchazon dura de las encias con exhudacion de pus y sangre; saliva sanguinolenta ó salada ó ácida y amarga; vacilamiento doloroso, prolongacion, dentera y caida facil de los dientes; vesiculas, aftas y ampollas en la boca y lengua, con ardor y dolor de escoriacion al comer, esfoliacion de la membrana mucosa de la boca; tumores duros y redondeados en las encias con exudacion de sangre, olor fétido, á veces ácido de la boca, por la mañana, tarde y despues de las comidas; gusto pútrido en la boca; pérdida del apetito; sed; sequedad de la garganta; gran sensibilidad de las encias y lengua al tacto; agravacion al tragar la saliva y alimentos, hablando, y comiendo y bebiendo cosas frias; gran debilidad y enflaquecimiento, deseo de estar siempre hechado, fiebre lenta con recargos, diarrea fétida ó estreñimiento de vientre pertinaz, marcha imposible por la gran debilidad é impresionabilidad al aire: melancolia, angustia, llanto y temor de una muerte proxima.

Si estos medicamentos no fueran suficientes, consúltense en primer lugar: *Ammon. c., caust., carb. v., nitri ac., staph., sulph. ac.*; y en segundo: *Ammon m., canth., hep., natr. m.*

Excoriacion.

(*Intertrigo.*)

Esta enfermedad, caracterizada por un rojo vivo y escoriacion de la piel, con picor, escozor y dolor á veces, y exhudacion de una serosidad amarillenta, y sangre cuando es grande su estension, se presenta en la parte

interna de los muslos, ingles, axilas y cuello de las personas gruesas; en las ingles, muslos, cuello y detras de las orejas, y aun en los tobillos en los niños; y en la rabadilla en las personas que sufren una enfermedad aguda y larga como la fiebre tifoidea y otras. En estas personas la excoriacion ó excoriaciones se convierten en úlceras á veces.

Los medicamentos principales contra la excoriacion, son: *Arn.*, *ars.*, *cham.*, *graph.*, *ign.*, *merc.*, *lyc.*, *puls.*, *sep.*, *sulph.*

La excoriacion en las personas gruesas cede á: *Arn.*, *baryt c.*, *lyc.*, *merc.*, *sulph.*

En los niños principalmente á: *Cham.*; y si este no basta, dése *merc.*, ó *hep.*, *lyc.*, *sulph.*

La que se presenta en la rabadilla en los enfermos graves, cede á *arn.*, y si este no bastase, dése *secal. corn.*, ó *ars.*, *carb. v.*, si hay úlceras.

La excoriacion en los pezones de los pechos se combate con: *Arn.*, ó *graph.*, *merc.*, *sulph.*

La que se presenta en las articulaciones, se trata con: *Mang.*, *merc.*, *sepiá.*

Si acompañan á la excoriacion dolores lancinantes y escozor, dése: *Phos.*; si gran prurito, *petrol.*; si exuda mucho, *baryt c.*, *petrol.*

En los casos de mucha ó poca exudacion, debe lavarse con agua fresca la parte excoriada, secarla con cuidado y cubrirla con polvo fino de arroz, ó aceite lavado en los niños si no bastase el polvo fino de arroz. Lo mismo debe hacerse con las escoriaciones de la rabadilla, teniendo ademas cuidado de poner trapos finos sobre ellas para preservarlas del roce de la cama y que haya gran limpieza en esta; si se convierten en úlceras, cúreselas dos ó mas veces al día, cubriendolas con planchuelas finas de cerato.

Escrófulas.

Los medicamentos empleados hasta ahora con mas exito contra esta enfermedad, son: *Sulph.*, *calc. c.*,

baryt c., bell., merc., silic.; y despues de estos, *Ars., asa, con., hep., iod., rhus.*; ó *aur., carb. an., dulc., graph.* Todos se darán á dosis única de altas atenuaciones y se esperará sus efectos, antes de pasar á dar otro medicamento, ó repetir el mismo si hay alivio con él.

Para las afecciones de la piel que acompañan á las escrófulas, como son, erupciones, herpes, úlceras, etc., dése: *Clem., dulc., hep., lyc., merc., rhus., sepia, silic., staph., sulph.*

Si hay supuracion de las glándulas infartadas debe curárselas las veces necesarias al dia con planchuelas, de cerato, limpiándolas antes con agua tibia, y secándolas con trapos limpios de hilo. Los medicamentos principales en este caso son: *Merc., ó silic.*; y si estos no fueran suficientes, consúltense: *Asa, hep., phos., sulph.*

Si hay dolores intensos en las glándulas infartadas, con ó sin rubicundez de la piel, fiebre, sed, etc., dése en primer lugar *Acon.*, para rebajar la fiebre, y despues *bell.* Si esta no bastase, y las glándulas tendieran á la supuracion, dése para evitarla *hepar.*; y si esto no fuera ya posible, recurrase á *silic.*, y despues á *merc.*

A veces acompaña á las escrófulas, especialmente en las personas muy linfáticas y débiles, una fiebre lenta con recargos y hasta sudores nocturnos, falta de apetito, morosidad, tristeza, etc. En estos casos debe darse al principio *Ars.*, y si este no fuera bastante á combatir tal estado, *Phos., silic., ó sulph.*

Estañõ.

En los casos graves de envenenamiento por este metal, dése al enfermo inmediatamente una de las siguientes sustancias: clara de huevo, azucar ó leche. En cuanto empiecen á disminuir los sintomas adminístrese con frecuencia *ipec.*; y luego, contra los sufrimientos que quedan, el mejor medicamento es *pulsat.* Si este no acabara

con ellos, consúltense: *Calc. c., phos., rhus., sulph., ó nux vom.,* y tambien *laches.*

Contra la intoxicacion lenta por los vapores de estaño, dése: *Puls.,* y si este no basta: *Ars., caust., china, ign., phos., rhus., stram., valer.*

Estómago.

Aunque vamos á ocuparnos de la mayor parte de las enfermedades que se desarrollan en el estómago, no es posible en un manual popular dar amplios detalles sobre el diagnóstico de las diversas dolencias de dicho organo. Cuando la enfermedad es aguda, es preciso investigar antes de nada la causa que de ordinario la ha provocado ó agrava. Así es:

Que despues de una cólera, se dará: *Acon., ó cham.,* cuando predomina el calor; *bry ó veratr.* cuando predomina el frio: *cham. ó coloc.* cuando la enfermedad va acompañada de retortijones de vientre.

Despues del uso de alimentos azucarados, manteca hechada á perder, y alimentos grasientos: *Puls. ó carb. v.*

Despues del uso de la cerveza agria: *Acon.*

Despues del uso de alimentos que inflan (verduras, habas): *Bry., lyc.*

Despues del uso del pan y pasteles demasiado calientes: *Bell.*

Despues de haber bebido ó comido cosas demasiado calientes: *Caust.*

Despues de haber bebido ó comido demasiado de prisa: *Silic.*

Despues de haber comido en demasia: *Antim. cr. ó puls.* (Será bueno tomar antes una pequeña taza de café).

Despues del uso del vinagre ó alimentos muy ácidos: *Antim. crud., ó Ars., bell., ferr., sulph.*

Despues del uso de helados (ó agua de nieve): *Ars., puls.*

Despues del uso de las patatas: *Ahom., sep., veratr.*

Despues del uso de la leche: *Calc*, *china*, *con.*, *sep.*, *sulph.*

Despues del uso de frutas: *Ars.*, *bry.*, *china*, *puls.*, *veratr.*

Despues del uso del repollo: *Bry.* ó *china*, *lyc.*, *puls.*

Despues del uso de alimentos dulces: *Ign.*, ó *cham.*

Despues de beber vino (en los borrachos): *Lyc.*, ó *ars.*, *carb. v.*, *nux v.*

Despues de beber vino acido: *Antim.* *cr.*

Despues de beber vino azufrado: *Puls.*

Despues de haber comido cosas saladas: *Carb. v.*, ó *Ars.*

Despues de haber fumado: *Cocc.*, *merc.*, *ipéc.*, *nux v.*, *puls.*, *Staph.*

Despues de tomar un calor escesivo: *Bry* ó *silic.*

Despues de un enfriamiento: *Ars.*, *bell.*, *cham.*, *cocc.*, *dulc.*, *ipéc.*

Despues de lesiones mecánicas, como contusiones, golpes, caídas sobre el estómago y vientre: *Arn.*, *bry.*, *rhus*; ó *Puls.*, *ruta*, *sulph. ac.*

Despues de vigiliias prolongadas ó estudios forzados: *Arn.*, *nux vom.*, *puls.*, *sulph*, ó *carb. v.*, *cocc.*, *ipéc.*, *veratr.*

Despues de causas morales: *Cham.*, *coloc.*, ó *acon.*, *bry.*, *china*, *nux v.*, *sulph.*

Despues de excesos sexuales: *Calc.*, *merc.*, *nux v.*, *phos. ac.*, *staph.*

Si no se puede soportar la carne: *Ferr.*, *ruta*, *silic.*, *sulph.*

Si todo lo que el enfermo toma le causa sufrimientos: *Carb. v.*, *china*, *lach.*, *natr.*, *nux v.*, *sulph.*

Dispepsia. — (*Digestion difícil.*) — Esta enfermedad se distingue por la debilidad de la digestion, con poco ó ningun apetito, eructos, flatulencia, mal humor, soñolencia, estreñimiento de vientre ó diarrea, y otras molestias, despues de las comidas; disposicion á las indigestiones, agrios y saburra gastro-intestinal.

Los medicamentos mas principales contrala dispepsia, son: *Hepar* y *sulph.*, cuyas dosis se darán á largos intervalos y de diluciones altas, esperando siempre que una nueva agravacion de la enfermedad indique repetir la dosis ó dar otro medicamento.

Si dichos medicamentos no bastasen, consúltense:

Arnica. Eructos frecuentes y semejantes á huevos podridos; deseo de acidos; despues de las comidas plenitud y peso en la boca del estómago; vértigos; cabeza pesada; tez amarilla, terrosa; náuseas frecuentes con ganas de vomitar sobre todo por la mañana y despues de comer; humor hipocondriaco. Conviene en los casos producidos por golpes, conmociones, sacudidas, esfuerzos, trabajos intelectuales é insomnio con irritacion nerviosa.

Bryonia. Repugnancia á los alimentos hasta el punto de no poder soportar el olor; regurgitaciones frecuentes, sobre todo despues de las comidas, y mas aun en ayunas; sensibilidad de la boca del estómago al tacto, é imposibilidad de soportar los vestidos oprimidos; astriccion de vientre ó deposiciones duras; deseo de vino, café y acidos; indigestion facil por el pan ó la leche.

Calcareo. Gusto agrio y amargo; sed continua con apetito debil; accesos de hambre voraz; repugnancia á la carne; náuseas y regurgitaciones ácidas despues de haber tomado leche; dolores de estómago y vientre, y deseo de dormir; despues de las comidas, calor, ruido de gases, dolor de cabeza y estómago; tension en los lados del vientre; deposiciones ventrales cada dos, tres ó cuatro dias; debilidad general; boca pastosa, seca.

China. Conviene no solo en la dispepsia por causas debilitantes, sino tambien en la producida por exhalaciones dañosas, terrenos pantanosos, y humedad. Indiferencia por los alimentos y bebidas, como por saciedad; gusto ácido y amargo de los alimentos; indigestiones frecuentes y fáciles, sobre todo cenando tarde; despues de comer aunque sea poco: malestar, deseo de dormir, plenitud de estómago, desarrollo de gases, humor

hipocondriaco, regurgitación de lo tomado, gran debilidad con deseo continuo de estar hechado.

Hepar. Indigestion facil y frecuente; nauseas frecuentes por la mañana con ganas de vomitar y eruptos, ó vómitos de materias ácidas; acumulacion de mucosidades en la garganta; deposiciones duras, difíciles y secas; repugnancia á la grasa: sed pronunciada; deseo de vinos cosas ácidas, picantes y confortantes, presion y ruido de gases, abultamiento de la boca del estómago; en los casos en que ha habido abuso del mercurio, y en los crónicos antes ó despues de *sulph.*, ó despues de *merc.*

Lachesis. En los casos crónicos; apetito irregular; repugnancia al pan y deseo de vino y leche, que ambos perjudican; náuseas, eruptos y vómitos despues de haber comido; despues de cada comida, pereza, malestar, peso, plenitud, sueño, vértigos, dolores de estómago y otros sufrimientos; eructos que alivian; respiracion difícil; estreñimiento de vientre; deposiciones duras, difíciles; rostro terroso y amarillo.

Mercurius. Gusto pútrido, dulzaino, ó amargo, sobre todo por la mañana; repugnancia á los alimentos sólidos, carne, cocidos ó calientes, con deseo solo de cosas frescas, leche, vino y aguardiente; despues de comer pan presion en la boca del estómago; eructos, agrios, náuseas y deseos frecuentes de vomitar; presion y tension en el estómago; humor triste, susceptible é irascible.

Nux vomica. Al principio del tratamiento en las dispepsias recientes, y en las personas que padecen almorranas; gusto ácido y amargo de la boca y alimentos; sobre todo del pan; deseo de cerveza y repugnancia á los alimentos; despues de las comidas, náuseas, eruptos, regurgitación ó vómitos de los alimentos, flatulencia, cabeza pesada, vértigos y humor irascible; grande sensibilidad de la boca del estómago al tacto y vestidos, con peso, presion; eructos y regurgitación agrias; calor y rubicundez de la cara durante la digestion; estreñimiento

y deposiciones duras; laxitud, pereza y deseo de estar siempre sentado ó hechado.

Pulsatilla. En las mugeres ó personas de temperamento linfático, de caracter dulce y afable, con disposicion á la saburra gástrica y agrios, y gusto ácido, pútrido, amargo de los alimentos y boca; deseo de cosas acidas, picantes, vino, aguardiente; falta de sed; respiracion dificil; deseos de vomitar; eruptos; eructos del gusto de los alimentos comidos; hipo frecuente; deposiciones diarreicas; el pan causa sufrimientos; tristeza, melancolia y llanto.

Sulphur. En la dispepsia crónica debe empezarse por este medicamento, y en las personas muy irritables; gusto pútrido, ácido de la boca; repugnancia á la carne, leche y grasas, y deseo de cosas ácidas; despues de las comidas, respiracion trabajosa, náuseas, dolores de estómago, regurgitacion de los alimentos, laxitud, escalofrios; agrios, pituitas; flatulencia é inercia en el vientre; sed pronunciada; humor triste, hipocondriaco, moroso é irascible.

Si estos medicamentos no bastasen; consúltense ademas: *Carb. v., lyc., natr. mur., rhus., ruta., sep., silic.*

Gastralgia. (Dolores de estómago. — Calambres de estómago.) — Los verdaderos dolores de estómago neurálgicos, que no dependen de una enfermedad orgánica del estómago, se distinguen por accesos periódicos, en cuyo intervalo no tiene el enfermo dolores. La gastralgia está por lo general ligada á otra enfermedad. Está combinada frecuentemente con la anemia, y se declara despues de fuertes pérdidas de sangre, enfermedades debilitantes y una lactancia prolongada; ó bien se la observa en personas cloróticas ó tuberculosas. La gastralgia puede ser tambien la consecuencia de otra enfermedad localizada en el vientre. Va frecuentemente acompañada de enfermedades de la matriz, de menstruacion muy abundante y adelantada, de irritacion de la médula espinal, etc. En todos estos casos es preciso

tener en cuenta la dolencia fundamental, porque haciéndola desaparecer, cede la gastralgia por completo. Pero hay gastralgias terribles que acompañan á alteraciones orgánicas del estómago; son incurables, ó por lo menos muy difíciles de curar; solo citaremos la úlcera (redonda, perforante) y el cancer del estómago.

En todo los casos consúltense los siguientes medicamentos:

Belladonna. Conviene sobre todo á las mugeres y personas delicadas y sensibles. — Dolores que parecen corrosivos, presivos ó calambroideos. — *Disminuyen cuando el enfermo se encorba ó retiene el aliento.* — Dolores de estómago que reaparecen siempre *durante la comida.* — Gastralgia que produce hasta congojas. — Sed, pero los dolores aumentan despues de haber bebido. — Insomnio por la noche con sueño durante el dia. — El Dr. Well pretende que *belladonna* es un medicamento especifico contra los calambres de estómago, cuando los dolores se estienden á la médula espinal. Cuando en los casos crónicos no baste *bellad.*, dése *calc. c.*

NB. Frecuentemente *atropinum* calma, al menos por algun tiempo, los dolores de estómago violentísimos.

Bryonia. Dolores presivos ó lancinantes, ó sensacion de hinchazon que aumenta durante ó despues de las comidas. — Todos los movimientos agravan los dolores; la presion exterior los alivia. — Dolores de estómago con estreñimiento de vientre. — Presion en las sienas, frente y occipucio, como si el cráneo fuese á estallar, aliviada oprimiendo la cabeza.

Calcareo carbónica. En las personas pletóricas, en las mugeres con menstruacion muy abundante, y despues de *bellad.*, cuando este no haya completado la curacion. — Dolores presivos, calambroideos, y *sensacion de arañadura y contraccion en el estómago*, con ansiedad. — Agravacion de los dolores por la noche y despues de las comidas, con *vómitos de los alimentos.* — Estreñimiento de vientre con almorranas dolorosas, ó bien diarrea crónica.

Carbo vegetabilis. Si *nux v.* ha aliviado pero no ha curado. — *Acúmulo excesivo de gases en el estómago*, con dilatacion de este, eructos y agrios, con opresion de pecho. — Dolores contractivos, calambroideos, que obligan á encogerse, con sofocacion y agravacion estando hechado. — *Presion dolorosa con ansiedad*, sobre todo á la noche y despues de las comidas, en el estómago; aumentada con el tacto en la boca del estómago.

Chamomilla. Sensacion como si una piedra estuviese sobre el estómago, con hinchazon, respiracion corta y angustia. — Grandes dolores con ansiedad, inquietud, que obligan al enfermo á doblarse. — En este caso, si *cham.* no produce alivio alguno, recurrase á *coffea*. — Agravacion de los dolores despues de las comidas y á la noche, con grande angustia y movimiento incesante. — Alivio momentáneo tomando café y encogiéndose mucho. — Gritos, desesperacion, humor irascible, palabras malsonantes.

NB. *La gastralgia durante la menstruacion* se cura ordinariamente con *cham.* ó *nux v.* si es abundante; con *cocc.* ó *puls.* si es escasa.

Cocculus. Muy ventajoso en las personas de caracter sombrío, descontento y flemático. — Dolores presivos, lancinantes, sobre todo en ó despues de las comidas. — Sensacion de plenitud y pellizcos en el estómago con respiracion oprimida. — Dolores de estómago con náuseas; el agua viene á la boca (pero sin pirosis). — *La salida de gases alivia*.

Coffea. Util en personas excesivamente nerviosas, impresionables, y que padecen frecuentemente insomnio. — Dolores lancinantes, presivos, *distlacerantes*, tan intensos, que hacen gritar, arrastrarse por el suelo y retorcerse. — Si *coffea* no los calma, dése *bell*.

Ignatia. Dolores de estómago principalmente en las mugeres, despues de un disgusto, y de haber sufrido hambre largo tiempo. — Los dolores disminuyen comiendo, van generalmente acompañados de una sensacion de debilidad y vacio en la boca del estómago, ó si

como el estómago estuviese suspendido de un hilo. — Hipo, regurgitacion de los alimentos ingeridos. — Repugnancia á los alimentos, bebidas y tabaco.

Nux vomica. — Medicamento principal contra los calambres de estómago de las personas que toman mucho café y aguardiente, de las que padecen almorranas, etc. — Calambres ó presion en el estómago, por la mañana en ayunas ó despues de las comidas. — Dolores urentes en el estómago, opresion y presion. Se estienden frecuentemente á la espalda, entre los hombros, ó hasta los riñones. Van acompañados frecuentemente de náuseas y el agua sube á la boca, ó bien los accesos de dolores se terminan por un vómito. — Estreñimiento de vientre, véntosidades y almorranas. — Los vestidos molestan en la boca del estómago. — Arañamiento y contraccion en el estómago. — Caracter vivo y pendenciero, moroso é irascible, con gran aprension sobre la enfermedad. — Palpitaciones de corazon con ansiedad. — Despues de *nux v.*, dése *cham.* ó *cocc.*

Pulsatilla. Dolores de estómago despues de tomar alimentos grasientos, pasteles, ó de un enfriamiento de estómago. — Dése tambien á personas de la constitucion de *puls.* — Calambres con náuseas que desaparecen despues de vomitar. — Presion en el estómago despues de haber comido pan. — Sed nula, escepto cuando los dolores son mas fuertes. — Agravacion de los dolores por la tarde y entrada de la noche, con escalofrios que aumentan en proporcion de los dolores. — Dolores lancinantes que se agravan andando. — Humor triste, lloroso, y caracter dulce y tranquilo.

Sulphur. — Dolores presivos como una piedra, principalmente despues de las comidas, con náuseas, pituitas y vómitos. — Agrios, pirosis, regurgitacion frecuente de los alimentos. — Los vestidos incomodan en el alto vientre, con tension é inflacion de dicha region. — Repugnancia á los alimentos grasientos, ácidos y cosas azucaradas. — Vertigos, atontamiento de cabeza, al-

morranas, humor melancólico, hipocondriaco, con disposición tan pronto á incomodarse como á llorar.

En todos los casos en que los medicamentos arriba expuestos no producen alivio ó es pasagero, es de temer una enfermedad orgánica del estómago. Entonces es necesario consultar á un buen médico homeópata. Si esto no es posible, se pueden ensayar los siguientes medicamentos: *Ars.*, *baryt. carb.*, *bism.*, *caust.*, *graph.*, *kreos.*, *lach.*, *lyc.*, *magn.*, *mez.*, *phos.*, *silic.*, *stann.*, *staph.*, *stront.*

No se repetirán los medicamentos mientras haya alivio, y no se cambiarán mientras no haya una agravación ó cambio de síntomas.

Gastritis. — (*Inflamación del estómago.*) — La verdadera *inflamación del estómago*, es generalmente causada por materias acres (venenos) introducidas en el estómago; sin embargo, un fuerte enfriamiento, el uso del agua de nieve, estando el cuerpo muy caliente, ó el empleo excesivo de ciertos estimulantes, pueden causar una irritación inflamatoria del estómago. Los principales síntomas de esta enfermedad son dolores en el estómago, continuos, violentos, agravados con el tacto y la presión, la ingestión de una sustancia cualquiera, calor y pulsación en la boca del estómago; vómitos de todo lo que se toma y grande angustia; estremidades frias; espasmos, debilidad grande y estreñimiento de vientre. Los dolores son generalmente urentes. Escusado es decir que hay que tratar la enfermedad según su causa. Si la gastritis es ocasionada:

Por un abuso de bebidas alcohólicas, dése: *Ars.*,
nux v.

Por el agua de nieve ó los helados: *Ars.*, *puls.*

Por bebidas frias (estando el cuerpo sudando): *Bry.*

Ademas, elijase entre los siguientes medicamentos:

Aconitum. Al principio del tratamiento; fuerte fiebre inflamatoria. — Dolores violentos con vómitos y mucha sed.

Arsenicum. Pérdida rápida de las fuerzas, con cara pálida, desencajada, estremidades frias. Si *ars.* no basta, dése *veratrum*.

Belladonna. Si á los síntomas ordinarios se unen los cerebrales, con estupor, pérdida del conocimiento y delirio. Si no basta *bell.*, dése *hyosc.*

Ipecacuanha. — Si predominan los vómitos, y la enfermedad ha sido causada por una indigestion, con dolores violentos.

Si estos medicamentos no bastasen, consúltense: *Bry.*, *carb. v.*, *cham.*, *nux v.*, *puls.*

Los que no hayan estudiado medicina harán bien en emplear *acon.* 30^a, administrado de hora en hora ó de dos en dos horas, siempre que la gastritis no sea la consecuencia de un envenenamiento ó vaya acompañada de diarrea, de frio y postracion de fuerzas (J.).

Pirosis. — (Agrios—Rescoldera). — Caracterizada esta enfermedad por un fuerte ardor de estómago, con gases y liquidos agrios, acres, que suben á la garganta á veces, quemando por decirlo asi las partes por donde pasan, sobre todo durante y aun despues de la digestion, con estreñimiento de vientre por lo general, humor triste ó desesperacion, se combate perfectamente con: *Sulph. ac.*, y si este no basta, con *Pulsat.*; ó despues, con *Ars.*, *carb. v.*, *nux v.* y *sulph.* En los casos rebeldes, en los que ninguno de los medicamentos anteriores fuera suficiente, consúltense: *Bell.*, *calc.*, *caps.*, *cham.*, *china* y *staph.*

Pituitas. — (Aguas del estómago). — Esta dolencia no suele ser por lo general mas que un sintoma de otra enfermedad, pero algunas veces se presenta por si sola. En ambos casos se distingue por el acúmulo y espulsion de una cierta cantidad de agua, á veces enorme, que sale del estómago y sube á la boca, sin náuseas ni vómitos, insípida ó de diversos sabores. Los principales medicamentos para combatirla, son: *Ipec.* y *puls.*, y despues, si estos no fueran suficientes, los siguientes: *Bry.*, *calc.*, *hep.*, *merc.*, *nux v.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*

Pituitas, despues de comer cosas ácidas: *phos.* ;
 despues de tomar leche: *Cupr., phos.* ;
 despues de beber agua: *Nitri ac., sep.* ;
 por la mañana: *Sulph.* ;
 por la tarde: *Anac., cyclam.* ;
 por la noche: *Carb. v., graph.* ;
 despues de las comidas: *Silic., sulph.* ;
 cada segundo dia: *Lyc.* ;
 agrias: *Carb. an.* ;
 amargas y que se vomitan: *Lyc.* , ó : *anac.,*
natr. m., silic. ;
 con angustia, temblores y calor: *Euphor.* ;
 con dolores de vientre: *Sulph.* ;
 con dolores de estómago: *Natr. m., sep.,*
silic. ;
 con náuseas: *Cyclam.* ;
 con frio: *Silic.*

Retraccion del orificio del estómago y esófago. — Al principio se alivia ordinariamente con *nux v.* (ó *ranunc. bulb.*), si los alimentos se detienen poco en el orificio del estómago.

En los casos inveterados, B. ha obtenido grandes exitos con *zinc.* ó *carb. v.* ó *phosph.* Guernsey recomienda *baptisia*, si el enfermo no puede tragar mas que los liquidos.

Hemos prescrito tambien con exito este medicamento en un caso semejante. Los alimentos sólidos, por escasos que fuesen, se detenian en el esófago, y provocaban terribles angustias.

En la retraccion, estrechez ó espasmo del esófago, el principal medicamento es *hyoscyam.*, y si este no combate por completo la enfermedad, dése *nux v.*, ó *bell.* ; y si aun es necesario, consúltese: *Ars., bry., phos., rhus.* y *sulph.* ; ó *lach., plumb., stram., veratr.*

Si la retraccion tiene lugar en la parte superior del estómago, dése *Crot.*

Saburra gástrica ó intestinal. — (*Indigestion.* — *Em-pacho gástrico ó intestinal.* — *Gastrosis.* — *Suciedad de*

estómago ó intestinos.) — Bajo todos estos nombres se comprende la *suburra gástrica*, que proviene siempre de un enfriamiento ó de haber tomado alimentos en exceso ó nocivos, y que puede limitarse solo al estómago ó comprender á la vez los intestinos. Para combatir esta enfermedad téngase siempre presente la causa que la ha producido, si es posible saberla, y dése el medicamento ó medicamentos necesarios segun aquella, teniendo en cuenta los medicamentos de causa expuestos al principio de este capítulo.

Los principales medicamentos que deben consultarse en esta enfermedad, son los siguientes:

Aconitum. Solo en los casos en que sobrevenga fiebre con sed; lengua amarillenta con gusto excesivamente amargo; vómitos verdes ó mucosos y amargos; náuseas escesivas; fuerte dolor de cabeza y grande angustia.

Antimonium. Despues de haber comido en demasia; hipo frecuente; lengua blanca con acúmulo de saliva ó mucosidades en la boca; eructos fétidos ó del gusto de los alimentos tomados; vómitos de alimentos, mucosidades ó agua; mucha opresion en la boca del estómago; sed; acúmulo de gases en el estómago é intestinos; diarrea con gases y sin dolores; dolor de cabeza con fuertes mareos sobre todo al andar.

Arsenicum. En los casos de un fuerte enfriamiento, despues de haber bebido agua fria ó de nieve, helados, y otras sustancias frias; sed intensa con deseo continuo de beber, aunque poco de cada vez; náuseas continuas y escesivas; vómitos alimenticios, biliosos, verdes; dolores atroces de vientre y estómago, con frío ó escalofrios generales, y á veces calambres en las pantorrillas; grande y penosa angustia; grande ardor en el estómago; estreñimiento de vientre ó diarrea acuosa y verde, amarilla ú oscura, con ó sin pujo; los vómitos y la diarrea se reproducen bebiendo ó moviendo el cuerpo; sudores frios.

Bryonia. Cuando el cuerpo se ha enfriado, en verano y en tiempo caliente y húmedo; lengua seca y

amarilla ó blanca; sed con sensacion de sequedad en la boca y garganta; olor pútrido en la boca; fuerte repugnancia á los alimentos; vómitos biliosos; tension y plenitud en la boca del estómago; estreñimiento de vientre; frio y escalofrios ligeros; cabeza atontada, vértigos, y dolor de cabeza presivo, lancinante, sobre todo en los lados de la misma.

Chamomilla. Cuando una cólera, rabia concentrada, fuertes disputas, etc. han sido la causa del desarreglo del estómago, gusto amargo; náuseas y vómitos amarillentos, verdes ó agrios: grande ansiedad y angustia; deposiciones de vientre en forma de diarrea verde ó materias ácidas, y mucosidades biliosas semejantes á huevos batidos; cara roja sobre todo en las megillas; mal humor, irascibilidad, desesperacion. Si los enfermos han tomado ya manzanilla en infusion y en exceso, como suele acontecer, no se debe dar *cham.*, y si *pulsat.*

Ipecacuanha. Medicamento que conviene sobre todo cuando predominan las náuseas y vómitos, con ó sin diarrea, sin sintomas generales, y se han tomado alimentos indigestos. En los casos dudosos, en que no es posible averiguar la causa de la indigestion, se empezará siempre por este medicamento, eligiendo despues, si el no basta, el que sea mas indicado. Deseo constante de vomitar, aun despues de haberlo hecho; náusea continua con dentera; vómitos faciles y violentos de alimentos ó mucosidades; con los vómitos coinciden deposiciones diarreicas amarillas, ó de olor fétido, pútrido, agrio; cara pálida, amarilla; lengua cubierta de una capa gruesa amarillenta, ó limpia y seca; fetidez de la boca; á esta sube del estómago un liquido amargo, ó agrio, que hace vomitar; dolor de cabeza frontal; frio ligero ó escalofrios.

Mercurius. Lengua húmeda y blanca ó amarillenta; labios secos, quemantes y agrietados; gusto pútrido y nauseabundo; vómitos mucosos ó amarillentos y verdes; sensibilidad dolorosa de la boca del estómago y vientre; sueño diurno con insomnio nocturno; sed con repugnan-

cia á las bebidas. Muy conveniente cuando hay lombrices.

Nux vomica. Lengua seca y blanca, ó amarilla con bordes y punta rojos; sed ardiente; náuseas frecuentes, sobre todo andando; vómitos de los alimentos ingeridos; fuerte dolor de estómago, y presión dolorosa en la boca del estómago y lados del vientre; estreñimiento de vientre con deseo aunque inútil de deponer; vértigos; postración; deseo de estar continuamente echado y no moverse; carácter inquieto, irascible, pendenciero.

Pulsatilla. Lengua fuertemente cargada de mucosidades blancas; pastosidad de boca; gusto pútrido, repugnante; fuerte repugnancia á los alimentos, con deseo de cosas ácidas; pituitas; agrios; regurgitación; náuseas y deseos de vomitar insoportables, sobre todo después de comer y beber; vómitos alimenticios ó mucosos; agrios, amargos; diarrea mucosa; escalofríos con laxitud; tristeza, llanto; ó disposición á incomodarse fácilmente en las personas de carácter dulce y tranquilo.

Tartarus emeticus. Náuseas continuas con deseos de vomitar y grande angustia; vómitos violentos, sin resultado; parece que el estómago é intestinos van á salir por la boca; ó bien evacuaciones mucosas por arriba y abajo.

Si los medicamentos anteriores no bastasen, consúltense; *Arn.*, *caps.*, *carb. v.*, *china*, *cocc.*, *colocyn.*, *hepar.*, *rheum.*, *rhus.*, *veratr.*

Estreñimiento de vientre.

Como el estreñimiento es una enfermedad muy comun, y los purgantes que se dan generalmente en ella no consiguen otra cosa que hacerla mas tenaz y difícil de curar, es necesario hacer observar al público, que no es una dolencia tan peligrosa como se cree ordinariamente. Al contrario, las personas que padecen de estreñimiento de vientre, son por lo general mas ágiles y vigorosas que las que padecen diarrea, ó que usan pur-

gantes continuamente para vencer el estreñimiento; estas últimas se hacen viejas prematuramente. Un régimen apropiado, alimentos vegetales y frutas, en lugar de carne, leche y manteca, serán muy útiles. En caso de necesidad se podrán poner pequeños enemas de agua fría por la noche, que se deberán conservar dentro del intestino toda ella. Si esto no fuera suficiente, se pondrá por la mañana otro enema de agua fría mas abundante, á la que puede añadirse un poco de sal comun en los casos mas rebeldes.

Los medicamentos principales para curar radicalmente el estreñimiento de vientre, son los siguientes (segun el profesor Guernsey):

Alumina. Evacuacion difícil, aunque sea de deposiciones blandas; de suerte que hay que hacer grandes esfuerzos, á causa de la inactividad del recto.

Belladonna. Congestion de sangre en la cabeza, cara y ojos encarnados, calor en la cabeza, pulsacion de las arterias del cuello, perceptible á simple vista, sensibilidad á la luz y el ruido. El profesor Guernsey dice que ha curado con *bell.* (en alta atenuacion) estreñimientos tales, que no habian sido vencidos por los purgantes mas enérgicos.

Bryonia. Deposiciones oscuras, secas y duras, como tostadas.

Graphites. Las deposiciones se componen de grandes bolas unidas entre si por hilos mucosos. De tiempo en tiempo las deposiciones son delgadas como lombrices. (*Graph.* conviene sobre todo á las personas sugetas á erupciones que segregan un liquido acuoso y viscoso.)

Lycopodium. Sensacion de gorgoteo en el vientre. Borborigmos, sobre todo en el lado izquierdo del vientre, debajo de las costillas. — Orinas con poso encarnado. — Violentos dolores dorsales antes de la emision de la orina.

Magnesia mur. Deposiciones difíciles de gran calibre, que caen en pedazos desde que salen del ano.

Nux vomica. Estreñimiento de las personas cuya

constitucion indica *nux v.* — Deposiciones grandes y difíciles, ó pequeñas y dolorosas.

Opium. Las deposiciones estan formadas de grandes bolas redondeadas y negras. (Se dice que *opium* en atenuacion alta es un medicamento especifico en este caso.)

Phosphorus. Deposiciones semejantes á los escrementos de los perros, ó secas, largas y delgadas, que salen dificilmente.

Platina. Deposiciones viscosas, que se pegan en el ano como la arcilla.

Plumbum. Estreñimiento con cólicos violentos, y el vientre está como pegado á la espalda. Las deposiciones se componen de bolas pequeñas, semejantes á escrementos de carnero.

Sepia. Sensacion como *si hubiera en el ano bolas pesadas.* Los escrementos estan cubiertos de mucosidades y no salen, á pesar de los mayores esfuerzos. En los niños es preciso sacarselos con frecuencia con los dedos. *Sepia 200^a* está recomendado como medicamento especifico contra el estreñimiento de las mugeres en cinta.

Silicea. Deposiciones compuestas de grandes masas duras que, á fuerza de violentos esfuerzos, salen en parte, pero entran de nuevo.

Sulphur. La primera presion que se hace para deponer es tan dolorosa, que no se atreve el enfermo á intentarla de nuevo.

Thuja. Dolores excesivos cuando los escrementos salvan el ano.

Zincum. Escrementos muy secos, arenosos; son insuficientes y salen dificilmente.

El estreñimiento en los niños pequeños se cura con: *Bry.*, *op.*, *nux v.*, *sep.* (*Nux v.* sobre todo cuando la madre ó la nodriza toman mucho café, ó alimentos con demasiadas especias, etc.)

El estreñimiento que alterna con diarrea, se cura con *Nux v.*; ó bien: *Ant.*, *lach.*, *tart.*

Despues de haber tenido una polucion ó varias (estreñimiento pertinaz): *Thuja*.

Estreñimiento viajando: *Plat*.

Estreñimiento con sudores: *Bell*.

Con deseo frecuente de orinar: *Sassap*.

Se obtendrá mejor la curacion de un estreñimiento crónico con pocas dosis de altas atenuaciones, que con dosis fuertes y frecuentes de las bajas; estas últimas solo producirán un efecto paliativo.

Fiebres.

Damos en los casos de fiebre:

Catarral: *Bry., cham., nux v.*; ó: *Bell., dulc., puls., sulph.*

Inflamatoria: *Acon., bell., bry., merc., nux v., phosph., sulph.*

Pútrida: *Ars., bry., rhus.*

Biliosa: *Acon., ars., bell., cham., coloc., ign., nux v., staph.*

Causada por la denticion: *Acon., calc., cham.*

Gástrica: *Bry., ipec., nux v., puls.*

Héctica: *Ars., calc., kali, lyc., phos., puls., sulph.*

De leche: *Acon., calc., puls., sep. y bell.*

Mucosa: *Calc., phos., puls., sulph.*

Puerperal: *Acon., arn., bell., bry., cham., merc., nux v., puls., rhus.*

Reumática: *Acon., bell., bry., cham., rhus.*

Traumática: *Acon., arn.*

Vermínosa (de lombrices): *Acon., calc., cina, merc., silic., sulph., veratr.*

Fiebre amarilla. — Este azote de los trópicos, es una enfermedad epidémica y contagiosa, aunque su contagio no es directo sino que procede de los focos de infeccion; y casi nunca la padece dos veces un mismo individuo. Es endémica en la isla de Cuba, Veraacruz, américa inglesa, varios puntos de los Estados Unidos,

Cartagena de Indias, etc., y no acomete mas que á las poblaciones del litoral de estos paises, propagándose á las de otras de diversos paises de América y Europa, á causa de ser importada por los buques que arriban á sus puertos, especialmente cuando llevan mercancías de los puntos infestados, y sobre todo cueros y lanas. Retirándose á alguna distancia de la costa, dos ó tres leguas adentro, se libra uno completamente de su influjo. En los paises en que es endémica, ataca de preferencia á los extranjeros, cebándose sobre todo en los procedentes de climas frios, y en los que abusan de las bebidas alcohólicas, placeres venéreos y se enfrían estando sudando y al sereno. Reina en los meses de calor, desde Abril ó Mayo hasta Octubre, que es cuando hace mas estragos, y se atenua y desaparece á fines de Noviembre comunmente. Lo mismo sucede cuando es importada en nuestras costas.

La duracion media de la enfermedad es de una semana, y la muerte acaece generalmente entre el cuarto y septimo dia. La convalecencia es á veces muy lenta.

Esta enfermedad suele empezar con y sin sintomas precusores. En el primer caso, dos ó tres dias antes de empezar el primer periodo, hay inapetencia, dolor de cabeza, dolores en las rodillas ó lomos, y una laxitud y cansancio tan grandes, que los enfermos apenas pueden moverse.

Primer periodo. — La fiebre amarilla se presenta muchas veces de un modo brusco, empezando por un frio repentino, generalmente á eso de media noche, que es seguido de fiebre intensa, ardor en la piel, gran sed, fuerte dolor de cabeza, y en la espalda, brazos y piernas. Los ojos se ponen encarnados, llorosos; el paciente presenta un sintoma especial casi siempre, que consiste en vértigos ó mareos al sentarse. La lengua se pone gruesa, puntiaguda y con los bordes encarnados, con capa gruesa, blanca y amarilla en su centro; vómitos biliosos ó mucosos, náuseas tenaces, sensacion de opresion, agitacion é inquietud, supresion de la orina,

locuacidad, megillas coloradas, transpiracion biliosa de la piel á veces, que deja manchas amarillas en la camisa del enfermo, y espresion triste, melancólica, abatida ó dura del semblante. Este periodo dura de 24 á 48 horas, y si se ha llegado á tiempo, se hace desaparecer la enfermedad en la mayoria de los casos, lo cual se verifica cediendo la fiebre y demas sintomas, que terminan por abundantes sudores y sueño, verificándose una rápida convalecencia.

Segundo periodo. — Si la enfermedad pasa al segundo periodo, lo ejecuta comunmente de un modo terriblemente engañoso, y por una especie de abatimiento. Desaparece la fiebre enteramente, la lengua se pone casi natural, el enfermo tiene hambre y desea vestirse, mientras que en realidad se estan verificando los cambios mas temibles; prescribese la mas rigurosa dieta y tén-gase un cuidado muy solícito. Los sintomas que se desarrollan inmediatamente despues de los anteriores é indican la proximidad del tercer periodo, son: hambre voraz, sensacion dolorosa, mordicante en el estómago, insomnio constante, frecuentes esfuerzos para arrojar las flemas de la garganta, agrios que suben á la boca, flatulencia y ruido de vientre, peso y debilidad en el abdomen, capa ligera de color de limon en la esclerótica (blanco de los ojos), pulso lento, irregularidad en las ideas, delirio furioso á veces, ó bien una grande apatia con torpeza en los movimientos, y aspecto notable de ansiedad ó tristeza. Los vómitos son á veces de un verde oscuro y de consistencia oleaginosa, ó con estrias de sangre; la piel se cubre de sudor viscoso y de un olor especial, respiracion agitada, y deposiciones pequeñas y repetidas de materias iguales á las de los vómitos.

Tercer periodo. — La transicion del segundo al tercer periodo es rápida. Los sintomas principales son: fuerte ardor en la garganta y estómago, dolores violentos en el estómago y vientre, diarrea de color oscuro ó negra; orinas oscuras ó negras, ó amarillentas; color

de la piel amarillo intenso, eructos é hipo, postracion profunda sin poder mover la cabeza ni los pies, y delirio bajo. Desea salir de la cama, el pulso se pone debil y frecuente, confuso ó lento y blando; hemorragias de las encias, garganta y estómago, por el ano y las orinas á veces, agitacion continua con insomnio; sudores y estremidades frias: el delirio bajo ó de musitacion se convierte en furioso; vómitos frecuentes de un liquido amarillo oscuro, ó de una especie de agua del color del vino tinto, ó de un moco ó flema mezclados con multitud de pequeñas porciones ó manchas muy oscuras, semejantes al rapé, alas ó patas de mosca, ó porciones de telaraña, y á veces de sangre, ya pura ó mas ó menos mezclada con los materiales anteriores. Si la enfermedad no se detiene al llegar á este punto, hay que temer los terribles vómitos negros con poso semejante al polvo de café, hollin ó rapé, precipitados en agua y de la consistencia de la melaza. La supresion de orina, el estupor y la inmovilidad, y las convulsiones, preceden ordinariamente á la muerte. En algunos casos las hemorragias de sangre por boca y nariz, es podrida, é infestan la habitacion del enfermo. Las deposiciones de vientre se asemejan á los vómitos, con dolores violentos de estómago y vientre, el enfermo grita en los accesos de los dolores, y muere ordinariamente en uno de ellos.

A veces se desarrolla el tifus ó fiebre tifoidea, siendo una transicion de la fiebre amarilla, con irritacion gastro-intestinal y cerebral en ocasiones, abatimiento grande de fuerzas y otros sintomas del tifus.

Tratamiento. Debe someterse el enfermo á una dieta rigurosa, y que no tome mas que sustancia ligera de arroz ó agua panada. Hé aqui ahora los principales medicamentos para combatir tan terrible enfermedad.

Es un hecho reconocido por todos los autores y médicos que han tratado los enfermos de diversas epidemias de fiebre amarilla, que *aconitum* es el medicamento especifico del primer periodo, cuando hay frio, fiebre

mas ó menos violenta, calor seco y ardiente de la piel y los demas sintomas del primer periodo; y muchas veces concluye con la enfermedad, produciéndose á beneficio de él copiosos sudores, quedando luego una debilidad ó inapetencia consiguientes, que ceden á algunas dosis de *china*.

Belladonna es el medicamento que reemplaza á *aconitum*, si este no hace disminuir la fiebre y sus sintomas concomitantes, y hay grande excitacion, delirio, fuerte dolor de cabeza, encendimiento de la cara, sed abrasadora, mirada centellante, pulso variable, dolores fuertes por todo el cuerpo, etc.

Si *acon.* ni *bellad.* corrigièsen el estado febril, recúrrase á *bryonia*, sobre todo cuando hay fuertes dolores de estómago y vientre ó de todo el cuerpo; y si *bry.* aun no bastase, acúdase á *gelseminum*.

Ipecacuanha conviene cuando los vómitos y las náuseas son los sintomas que predominan y no han cedido á *acon.*, y no alivian al enfermo. Cuando son violentos é incesantes y no han cedido á *ipec.*, dése *tart. em.*

Algunos autores aconsejan *pulsat.* despues de *acon.*, si los dolores en los riñones son muy fuertes, juntamente con los vómitos, ó *argentum nitricum*.

Estos medicamentos son generalmente los del primer periodo, y los que salvan á la inmensa mayoría de los pacientes, evitando que la enfermedad pase al segundo periodo.

Si la enfermedad pasa al segundo periodo, existe ya el verdadero peligro. Debe cuidarse que el enfermo esté quieto en la cama y bien abrigado. No debe consentirse en ninguna de sus peticiones, que son: levantarse, cambiar de habitacion y de cama, diversos alimentos, etc.; en este periodo como en el anterior solo se le permitirá sustancia de arroz. El medicamento principal en este periodo, reconocido asi por todos los autores, es *arsenicum*, ó *mercurius* si *ars.* no diese resultados, y el enfermo sintiese dolores agudos en el higado, ansiedad, insomnio, y color amarillento de la piel. Si el insomnio

fuera constante, juntamente con gran inquietud y estado nervioso por las noches, dése *coffea*.

Si la enfermedad pasa desgraciadamente al tercer periodo, tres medicamentos existen principalmente para combatirla, *ars.*, *veratr.*, *china.*; y en segundo lugar, *laches.*, *crotalus* y *carb. v.*

Ars. es el primer medicamento á que hay que recurrir, para el color amarillo ó azulado de la cara, ojos hundidos y sin brillo, nariz afilada, frialdad y sudor pegajoso, labios y lengua negruzcos, vómitos violentos, negruzcos, ó de sustancias oscuras, con gritos y lamentos; pulso desigual, acelerado, debil, gran postracion de fuerzas, dolores urentes en el estómago, calambres, diarrea semejante á los vómitos, gran miedo á la muerte y sed ardiente.

Veratr. en los mismos casos que *ars.* y despues de este, cuando el frio y los sudores no han sido dominados por *ars.*, antes por el contrario han aumentado; manos y pies frios, asi como las orejas y nariz, temblores y calambres. Sed intensa, deposiciones negras con vómitos de bilis; inquietud, pérdida de conocimiento ó modorra.

Algunos autores dicen que es preciso dar *lachesis* cuando *ars.* no corrige los sintomas, y si *laches.* no bastase, *crotalus*. *Laches.* cuando predominan los sintomas nerviosos, con agitacion, inquietud, lamentos, insomnio, sequedad de la lengua, que apenas se puede sacar de la boca y esto con temblor; *crotalus* cuando predominan la demacracion, las hemorragias y la ictericia.

Esto dependerá del caracter de la epidemia, pues cada una requiere medicamentos especiales, como ya se ha dicho en diversas partes de esta obra. El Dr. Holcombe, de Nueva-Orleans, en la epidemia que padeció esta poblacion en 1867, curó la mayoria de los enfermos que trató con *laches.* y *crotalus*.

China conviene para combatir la debilidad profunda que dejan las pérdidas causadas por los vómitos y sobre todo por las hemorragias, y contribuye á disminuirlas.

Carbo veg. se da ya en los casos desesperados, en que ninguno de los medicamentos anteriores ha producido efecto alguno; descomposicion del semblante, estremidades y aliento frio, pulso imperceptible, ojos medio abiertos; en fin parece que el enfermo está en la agonía. Una ó varias dosis de este medicamento producen con frecuencia una reaccion saludable, que da lugar al empleo y accion de los medicamentos anteriores.

Segun el Dr. Carreira, de Rio-de-Janeiro, *argentum* y *ergotina* de la 5ª son un poderoso correctivo de los vómitos negros.

Consúltense ademas :

Para la diarrea dolorosa, oscura ó sanguinolenta :
Phosph. ac., *podoph.*, *veratr.*, *merc.*

Para la miccion dolorosa ó supresion de la orina :
Canth.

Cuando predominan las hemorragias y *china* no bastase, dése *ergotina*, ó *carb. veg.*

Para la metrorragia (sangre de la matriz) con ó sin aborto : *Sabina*, *secale*, *hamamelis*.

Cuando *coffea* no pueda combatir el estado nervioso, y este llegue á un punto extraordinario, dése : *Ign.*, ó *hyosc.* y *stram.* si hay ademas delirio ó convulsiones.

Cuando la fiebre amarilla pasa de repente al estado *tífico*, con los caracteres de una fiebre tifoidea intensa, el principal medicamento que hay que dar, es *rhus*. Sus sintomas son : lengua seca y negra, labios secos, parduzcos y resquebrajados, pulso debil, delirio ó modorra, respiracion ruidosa, diarrea, náuseas y vómitos, pérdida del conocimiento, palabras incoherentes é inmovilidad sin deseo alguno.

Si *rhus*. no bastase, consultense : *Ars.*, *natr. m.*, ó *carb. v.* Si predominan los sintomas nerviosos, dése *hyoscyamus* ó *bellad.*, y aun *coffea*.

En la convalecencia es muy facil la recaida si el enfermo comete escesos en el regimen alimenticio, ó se levanta y sale antes de haber recuperado las fuerzas.

China en solucion, dos ó tres cucharadas al dia, acelera la convalecencia.

Fiebre intermitente. — Consiste en accesos regulares de frio, calor y sudor, que se presentan en periodos regulares y fijos, es decir, cada 24, 48, 72 horas. Hay casos en que la fiebre se presenta cada 4 ó 7 dias. Asi se llaman cotidianas, tercianas, cuartanas, y semanales las que se presentan cada 7 dias.

A veces se presentan los accesos mas tarde ó mas pronto que de ordinario, ó bien se verifican dos accesos el mismo dia, é independientemente el uno del otro.

La alopatia no conoce otro medicamento contra la fiebre intermitente que la *quinina*, la cual en verdad corta ordinariamente los accesos por algun tiempo; pero la fiebre aparece por lo comun al 19°, 21° ó 28° dia, cuando no se siguen tomando dosis de quinina como preservativo.

La homeopatia no tiene semejante remedio universal contra la fiebre intermitente; y para encontrar para cada caso particular el verdadero medicamento especifico homeopático, es preciso tener en cuenta las circunstancias siguientes:

1) Las diferentes fases de la fiebre: *frio*, *calor* y *sudor*, estan perfectamente desenvueltas? Falta alguna de ellas? Predomina alguna sobre las demas?

2) En que momento se presenta la sed? Es antes de la fiebre ó durante el frio? Es unicamente durante el acceso del calor ó el del sudor? Es en los intervalos que separan las diversas fases?

3) Cuales son los sintomas concomitantes que se presentan antes, durante ó despues de las diferentes fases de la fiebre?

Iriamos demasiado lejos si quisiéramos insertar en este libro un repertorio de la fiebre intermitente; no haremos mas que indicar los medicamentos principales, y sobre todo sus sintomas mas caracteristicos.

Los medicamentos principales, son: *Ars.*, *china*, *ignat.*, *ipéc.*, *lach.*, *natr. m.*, *nux v.*, *puls.* y *sulph.*

Ademas, son dignos de tomarse en consideracion los medicamentos siguientes: *Apis.*, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *caps.*, *carb. v.*, *eucaliptus*, *rhus.*, *sabad.*, *staph.*, *tarant.*, *veratr.*; y *plantago*, para las intermitentes cogidas en terrenos de regadio.

Arsenicum. Fiebre intermitente, irregularmente desarrollada (diaria ó cada 3^o ó 4^o dia). — Frio y calor simultáneos ó alternantes, ó frio interior y calor exterior, y vice versa. O bien frio (por la tarde) y calor (á la noche), y luego sudor. — Gran debilidad. — Dolores de estómago violentos. — Predisposicion á las hinchazones hidrópicas.

Sed: el enfermo no bebe mas que en el periodo del calor; bebe con frecuencia pero poco de cada vez. — Sed inalterable durante el sudor.

Sintomas concomitantes (sobre todo durante el frio y el calor): Inquietud, angustia, dolores en los huesos y riñones, náuseas, respiracion dificil.

Despues de la fiebre: violento dolor de cabeza.

China. Medicamento preservativo sobre todo en las localidades pantanosas, ó en las que se produce la fiebre por una agua mal sana.

Antes de la fiebre: Náuseas, sed, hambre canina, dolor de cabeza, angustia, palpitaciones de corazon, estornudos, etc.

Frio: alterna con el calor (comp. con *ars.*), ó calor que sobreviene mucho tiempo despues del frio.

Sudor: Ia solamente en algunas partes del cuerpo, ó muy abundante (sobre todo á la noche).

Sed: ordinariamente entre el frio y el calor, ó despues del calor y el sudor. El frio aumenta despues de haber bebido.

Durante la fiebre: abatimiento.

Despues de la fiebre: Sueño agitado y tez amarilla (*lach.*).

Ignatia. Medicamento principal cuando hay lombriees, gran tristeza, llanto y opresion de corazon.

Frio: Náuseas y vómitos, tez palida, dolor en la

espalda; alivio del frio con el calor exterior; frio parcial ú horripilacion interior, con calor al exterior.

Calor: durante el calor, dolor de cabeza, vértigos, delirio, cara pálida ó alternativamente pálida y roja, ó rubicundez de una de las megillas.

Sed: solo existe durante el frio, y desaparece con el calor.

Antes ó despues de la fiebre: dolor de cabeza y en la boca del estómago, gran cansancio, sueño profundo con ronquidos.

Ipecacuanha. Frio interior que aumenta al aproximarse el calor (*nux v.*). Poco ó ningun sueño durante el frio, fuerte sed durante el calor.

Sintomas concomitantes: Náuseas y vómitos con lengua sucia ó limpia. — *Opresion de pecho* antes ó despues de la fiebre (*ars.*).

NB. Este medicamento tiene de bueno que aun cuando no convenga en algun caso, opera sin embargo un cambio favorable, para que luego *china, ign., nux v., ó ars.* hagan desaparecer los accesos mas facilmente.

Lachesis. Renovacion de los accesos por los alimentos ácidos.

Frio: frio que se presenta generalmente despues de comer ó por la tarde, con dolor en las estremidades y riñones, que impiden el estarse quieto al enfermo, ú opresion de pecho con estremecimientos convulsivos.

Calor: violento dolor de cabeza, delirio locuaz, cara encarnada, grande agitacion, ó frio interior con calor violento al exterior; aparicion del calor principalmente por la noche, reemplazándolo el sudor hacia el amanecer.

Sed: ardiente durante el calor.

Despues de los accesos: tez descolorida, terrosa, de un gris-amarillento; dolor de cabeza, gran debilidad y falta de fuerzas.

Natrum muriaticum. Frio continuo, calor con aturdimiento y dolor de cabeza fuertisimo, dolores de huesos,

aturdimiento, oscurecimiento de la vista, vertigos y cara encarnada.

Sed: gran sed durante el frio y el calor.

Sintomas concomitantes: ángulos de los labios ulcerados, gran debilidad; boca del estómago dolorosa al tacto; gusto amargo y pérdida total del apetito.

Nux vomica. Frio y calor simultáneos; ó calor antes del frio; ó calor exterior y frio interior y viceversa (*ars.*). Frio que no se alivia con el calor exterior. — Temor de destaparse, aun durante el periodo del calor y el sudor. — Dolores lancinantes en los costados y vientre (*bry.*), con vértigos y ansiedad durante el frio (*ars.*). — Sueño durante el frio; las uñas de los dedos de las manos se ponen azules (*Rovvley*). — Gran abatimiento y debilidad paralítica, ya antes del acceso (*B.*).

Pulsatilla. Está principalmente indicado cuando un exceso en el comer ha provocado recaídas de la fiebre (*lach.*). — Dolores de estómago, gusto amargo; vómitos de mucosidades, de bilis ó cosas agrias. — Frio, seguido de calor con sed (ordinariamente á la entrada de la noche), diarrea durante la fiebre. — Escalofrios que sobrevienen tambien durante los intervalos.

Sulphur. Conviene sobre todo en los casos tenaces, á las personas psóricas, ó cuando la fiebre ha sido precedida por erupciones de la piel suprimidas (*sepia*).

Ténganse tambien presentes los medicamentos siguientes:

Belladonna. Fuerte congestion sanguínea á la cabeza, delirio ó sopor, horror á la luz, etc.

Bryonia. Predomina el frio; es acompañado de tos con punzadas en el pecho ó debajo de las costillas. El movimiento agrava los sintomas.

Calcarea carbonica. Conviene en los casos crónicos y tenaces, á las personas escrofulosas, y á las que el abuso de la quinina ha puesto sordas.

Carbo vegetabilis. Accesos de fiebre rebeldes ó completamente irregulares. — Dolores dislacerantes en los

dientes y estremidades antes de la fiebre. — Sed solo durante el frio (*Ign. y caps.*).

Cina. Vómitos y hambre canina, antes, durante, y despues de la fiebre.

Rhus. Erupcion urticaria durante la fiebre, ó cólicos con diarrea, presion en la boca del estómago, palpitaciones de corazon con angustia.

Sabadilla. La fiebre se presenta siempre á la misma hora. — Frio seguido de calor con dolor de cabeza. — Fiebre con sintomas gástricos; tos seca y espasmódica durante el frio y sed solo entre el periodo del frio y el del calor.

Staphisagria. Fiebre intermitente que casi se limita al frio. — Hambre canina antes y despues del acceso. — Sintomas de escorbuto durante la fiebre.

Tarantula. Fiebre terciana crónica, rebelde á todos los demas medicamentos, y con sintomas morales raros, con movimientos continuos de la cabeza y miembros; menstruacion dificil.

Veratrum. Frio exterior, sudor frio y deseo de bebidas frias. — Frio con náuseas, seguido de calor y sed *inestinguible*, delirios, cara encarnada, sopor continuado. — *Sudor sin sed*, con gran palidez de la cara.

El *eucalyptus globulus* es un medicamento usado ultimamente, para las intermitentes, sobre todo cotidianas y aun tercianas, cogidas en terrenos pantanosos ó húmedos.

Cuando las intermitentes han sido tratadas con grandes cantidades de quinina, dése en primer lugar, si aun existe la fiebre, *Pulsat.*; si ya no existe, *ars. ó ipec.*; y si estos no bastan, *carb. v., natr. mur.*

No se dan medicamentos durante los accesos de la fiebre, y si inmediatamente despues; tambien se da una dosis unas horas antes del acceso. Las personas que quieran dar los medicamentos disueltos en agua ó en forma de gotas, los harán tomar á los enfermos en los intervalos de los accesos, una cucharada cada tres ó cuatro horas. Es menester igualmente observar una dieta

severa, y abstenerse de alimentos grasientos y ácidos, como tambien de cosas de pasteleria.

Fiebre puerperal. Se desarrolla generalmente en los primeros ocho dias que siguen al parto, distinguiéndose por la violencia de la fiebre, fuertes dolores de vientre, supresion completa ó casi completa de los loquios (purgacion), sintomas cerebrales, vómitos mas ó menos violentos, deseo de orinar y deponer y hasta movimientos convulsivos, convirtiéndose á veces en tifoidea. Esta enfermedad exige mucho cuidado y es siempre gravisima, necesitando para su tratamiento la asistencia de un médico homeópata experimentado.

En los casos en que no fuera posible encontrarlo, ó mientras viene, consúltense los medicamentos siguientes :

Aconitum. Es el medicamento que hay que dar al principio y muchas veces impedirá que la enfermedad pase adelante. Calor violento, seco y ardiente; cara encarnada, vómitos biliosos, sed inextinguible, sensibilidad excesiva de la parturienta á los dolores; *angustia inconsolable con gran temor á la muerte*; agitacion y gemidos. Si la enfermedad está algo avanzada es inutil y aun perjudicial dar *acon.*; en este caso dése uno de los medicamentos siguientes.

Belladonna. Vientre elevado, con dolores lancinantes, punzantes, como *si los intestinos estuvieran cogidos con garfios ó uñas*; presion violenta en los órganos genitales como si todo fuera á salir por ellos; dificultad de tragar y espasmos de garganta; cara y ojos encarnados; boca seca con sed y lengua roja; sintomas cerebrales, como son delirios furibundos y sueño profundo ó insomnio, hemorragias de la matriz, con sangre coagulada y fétida; pechos vacios y péndulos ó hinchados é inflamados.

Bryonia. A veces conviene despues de *acon.* Vientre escesivamente sensible al mas ligero movimiento ó contacto, con estreñimiento; dolores lancinantes en el vientre exasperados por la presion; fiebre intensa con calor urente general, *sed ardiente* con deseo de bebidas frias :

humor irascible, aprension, temor á la muerte é inquietud sobre el exito de la enfermedad.

Hyoscyamus. En los casos en que *bell.* no sea suficiente contra los sintomas cerebrales y tifoideos. Visiones que asustan ó pérdida completa del conocimiento; temblor de las estremidades sobre todo de las superiores; convulsiones y espasmos en la garganta, hemorragia por la matriz de una sangre coagulada.

Mercurius. En los casos que *bell.* no basta, pero cuando los sintomas cerebrales no existen ó son poco pronunciados. Sintomas de derrame en el vientre (de agua) con dolores lancinantes y presivos; gemidos continuos; sudores generales, abundantes y debilitantes; sed ardiente, inestinguible; cara descompuesta, terrosa ó amarilla; salivacion abundante; deposiciones mucosas y sanguinolentas con pujo; orinas muy fétidas y agravacion nocturna de todos los sintomas.

Nux vomica. Supresion repentina de los loquios (purgacion); pesadez y ardor en el vientre y órganos genitales; ó por el contrario, los loquios son excesivamente abundantes y van acompañados de dolor de riñones, dificultad de orinar y orinas ardientes; estreñimiento de vientre con náuseas y vómitos; cara encarnada; dolor de cabeza con vertigos, zumbido de oidos, accesos de desvanecimiento y oscurecimiento de la vista.

Rhus. Indispensable en los casos de sintomas cerebrales y tifoideos; gran postracion; lengua, encias y labios secos, agrietados y negruzcos; agravacion de los sintomas con la mas pequeña contrariedad; los loquios blancos se cambian en sanguinolentos; hemorragias por la nariz y matriz, estas últimas en forma de coágulos.

Sulphur. En los casos mas desesperados y en las mugeres sugetas á erupciones crónicas. Cólicos violentos con abultamiento excesivo de vientre y dolor de riñones; loquios suprimidos ó casi suprimidos; pujo para deponer y orinar; dolores violentos en el bajo vientre, calor. frio y convulsiones.

Ademas de estos medicamentos se da tambien *Ars.*

en los casos en que *merc.* no haya hecho nada contra el derrame de agua en el vientre. Gran debilidad, cara pálida, terrosa, descompuesta; deseo incesante de bebidas frías, pero la enferma bebe muy poco de cada vez; sudores fríos.

Algunos prefieren *apis* á *ars.*

También se da *carbo v.* á último extremo, cuando ni *merc.*, *ars.* ni *apis* han sido eficaces contra el derrame escesivo de agua en el vientre.

Fiebre tifoidea. — (*Tifus.*) — (*Fiebre gástrica.*) — (*Fiebre adinámica.*) — (*Fiebre atáxica.*) — Bajo todos estos nombres se comprende la entidad morbosa llamada tifoidea, según las formas y gravedad que reviste. No presenta siempre el mismo grado de intensidad ni las mismas formas, y por eso se la ha llamado y se la llama como dejamos consignado, y además fiebre mucosa, fiebre de los buques, fiebre de lazaretos, cárceles, campamentos, etc. La fiebre tifoidea se desarrolla á veces lentamente y poco á poco; otras se declara súbita y violentamente. En general va precedida de un período más ó menos largo de laxitud, abatimiento y falta de apetito. Entonces sobrevienen escalofríos seguidos de calor, ó un gran frío seguido de un calor persistente con delirios y ensueños que debilitan. El enfermo yace sobre su cama y está como embotado; los labios y los dientes se ponen negros, como si estuvieran cubiertos de hollín; la lengua está seca, como una lengua ahumada. — Diarrea á veces con deposiciones semejantes á un puré; otras, estreñimiento pertinaz de vientre.

Según que el cerebro, el pulmón ó los intestinos se afectan, así se la designa con los nombres de fiebre tifoidea ó tifus de forma cerebral, pulmonar ó abdominal. Esta última es la más frecuente; la enfermedad tiene su asiento en la membrana mucosa de los intestinos; produce en ellos úlceras que causan una diarrea, y á veces hemorragias muy peligrosas.

Todas las enfermedades pueden tomar un carácter nervioso ó tifoideo, ó hacerse tifoideas, como suele

decirse, si las circunstancias son desfavorables para el enfermo, ó el tratamiento está mal dirigido.

El tifus se presenta aislado (esporádico), ó en forma de epidemia. Sus causas son muy variadas: así, una mala alimentacion ó insuficiente, el cansancio, ó un agotamiento de fuerzas, ya físico, ya moral, así como los grandes disgustos y las desgracias que se sufren, son las mas abonadas para producirlo. La causa principal de esta enfermedad, para algunos, y probablemente la mas frecuente, parece provenir de sustancias orgánicas que corrompen el agua que se bebe; por eso puede concentrarse el tifus en algunas casas que emplean la misma agua.

La experiencia nos ha convencido que el Dr. Wells ha tenido razon al esponer, que no hay enfermedad alguna en que sea preciso elegir con mas cuidado los medicamentos al principio, que en la fiebre tifoidea. Así aconseja que es preferible esperar uno ó varios dias, que no dar un medicamento del que no está uno seguro. Es inutil hacer observar que en tales circunstancias, las personas que no han estudiado medicina cargan con una gran responsabilidad al tratar una enfermedad de esta clase, sin el concurso de un médico homeópata. Solo á la poca atencion que se presta á veces á la eleccion de los primeros medicamentos, es preciso atribuir esos casos graves de fiebres tifoideas que, á pesar del tratamiento homeopático, se desarrollan de tiempo en tiempo. Si el medicamento se elige mal, la enfermedad progresa hasta el punto en que no es posible detenerla, y cuando no se puede reparar la falta que se ha cometido al principio.

Al principio de una fiebre tifoidea esporádica, es esencialmente difícil, y aun imposible generalmente, indicar el medicamento específico; porque el enfermo por lo comun no se queja mas que de sintomas generales, que no permiten elegir con precision un medicamento homeopático. Por el contrario, en las epidemias, ha tenido ocasion el médico ordinariamente de observar y tratar otros casos mas adelantados, y conocer los medi-

camentos correspondientes al caracter de la epidemia. El médico, pues, puede encargarse, con esperanzas de un exito satisfactorio, del tratamiento de una enfermedad que está en su principio: pero otra persona cualquiera deberá esperar, antes de esponerse al peligro de elegir mal un medicamento.

Aun cuando en la mayoria de los casos la fiebre tifoidea se desarolle lentamente y poco á poco, y se empleen á tiempo los medicamentos homeopáticos especificos y la enfermedad pase á veces facil y prontamente, hay otros en que el enfermo cae rápidamente en el delirio, pierde el conocimiento: y entonces, á falta de médico homeópata, hay que tratarlo homeopáticamente. Para estas ocasiones vamos á indicar los medicamentos mas eficaces, para las diversas formas de fiebre tifoidea.

Quando predominan los sintomas cerebrales (*tifus cerebral*), se emplearán: *Apis, bell., hyosc., lach, op. y stram.*

Si predominan los sintomas pulmonales (*tifus pulmonar*), consúltense: *Bell., bry., merc., phos., puls., rhus., sulph., tart. em.*

Pero cuando predominan los sintomas del vientre (*tifus abdominal*), dênse: *Apis, ars., bry., chelid., carb. v., muriat. ac., phos. ac., rhus., sulph., veratr.*

Si hay sintomas de una disolucion de sangre: *Ars., carb. v., china, phos.*

En una hemorragia de los intestinos: *Alum. (L.),* ó bien: *Ars., carb. v., china, laches., phos.*

En el tifus con dolores en las estremidades: *Bry., rhus. (B.).*

En el tifus sin dolores: *Phos. ac. y phos. (B.).*

Quando se trata al enfermo desde el principio de la enfermedad, dicen algunos autores que con *bry.* ó con *rhus.* se corta ó por lo menos se disminuye la fiebre tifoidea. Los homeópatas americanos é ingleses aseguran lo mismo con respecto á *baptisia tinctoria*, medicamento del que hacen grandes elogios, y que corta la fiebre en

el primer periodo, pues en el segundo no hace mas que disminuirla y quitarla parte de su gravedad. Debe darse pues la *baptisia* en el primer periodo.

En los casos gravísimos, en el último extremo, cuando parece que la vida se va á extinguir, se conseguirá reanimar las fuerzas del enfermo, y conducirle á un estado algo satisfactorio con *carb. v.*

En el periodo de convalecencia, cuando existe una gran debilidad física y nerviosa, hay que combatirlas y hacer que aquella no se haga interminable. Para esto elijase primero *Cocc.*, y si no basta, *china* ó *veratr.*

Hé aquí ahora un breve resumen de los principales medicamentos contra la fiebre tifoidea, con sus indicaciones principales.

Apis. Parece que este medicamento posee en ciertas épocas efectos específicos contra las epidemias mas diversas, mientras que en otras, aun cuando parece que la epidemia es la misma, no produce efecto alguno. Una indicacion esencial de *apis* es la *sequedad* de la lengua (ó bien vesículas en la lengua con sensacion de heridas ó aspereza); la piel está seca y caliente: *falta de sed.*

Arnica. Soñolencia comatosa, embotamiento, aliento fétido, piel cubierta de grandes manchas verdes, que tiran á amarillo; el enfermo asegura que está perfectamente bien (Hg.); delirio, ronquido y deposiciones involuntarias.

Arsenicum. Sintomas de gran debilidad ó de fuerte disolucion de la sangre. — Deposiciones oscuras, pútridas, que salen sin que el enfermo lo note. — Sobresaltos frecuentes y gemidos; mandíbula inferior pendiente, con ojos medio abiertos.

Si *ars.* no produce un alivio pronto, recúrrase á *carb. v.*

Belladonna. Rubicundez y calor ardiente de la cara; mirada brillante, ojos encarnados, sed ardiente con repugnancia á las bebidas; agitacion, insomnio ó sueño intranquilo con sobresaltos; murmullos; delirio bajo ó violento, con deseo de tirarse de la cama y visiones asus-

tadizas; dolor de cabeza violento, sobre todo de sien á sien; labios, dientes y lengua secos, y esta roja; orinas escasas y muy encarnadas; respiracion rapida y pulso frecuente. (Despues de *bell.*, se dará *hyosc.* ó *stram.*)

Bryonia. Medicamento de los mas importantes en todos los periodos del tífus. — Lengua cubierta de una capa blanca, espesa, ó amarillenta, ó lengua seca. — Indicaciones *principales*: Gran debilidad con deseo del reposo; dolores en las estremidades y la cabeza; dolores lancinantes en el pecho y en la region del higado; agravacion de los dolores con el movimiento. — Estreñimiento de vientre, con deposiciones secas, como quemadas. — El enfermo tieno delirio; cuando se vuelve en la cama tiene náuseas ó desvanecimientos. — Boca seca sin sed; ó bien fuerte sed, el enfermo bebe mucho de cada vez, pero á largos intervalos. (*Ars.* tiene los sintomas contrarios.) (Despues de *bry.* la mayoría de las veces está indicado *rhus.*)

Chelidonium. Muy ventajoso en ciertos casos de tífus epidémico. — Deposiciones de color claro, gris ó blanquizo, que salen con frecuencia insensiblemente, aunque el enfermo esté en todo su conocimiento. — La orina, á pesar de la secrecion imperfecta de la bilis, es poco oscura, frecuentemente pálida.

Cocculus. Muy eficaz en ciertos casos al principio de la enfermedad. — Grande abatimiento que, con el mas pequeño esfuerzo, puede llegar hasta el desfallecimiento; la cabeza está afectada, hay aturdimiento, apatia, soñolencia sin verdadero sueño; dolor de estómago, parálisis de las estremidades. Conviene tambien en los casos avanzados y despues de *rhus.*

Hyoscyamus. Pérdida del conocimiento con delirio. (El delirio no es tan violento como el de *bellad.*, es mas bien un murmullo incomprensible, pero hay muchos saltos y palpitacion de tendones y músculos.) El enfermo responde por lo comun perfectamente á las preguntas, pero en seguida pierde de nuevo el conocimiento ó cae en el delirio.

Lachesis. Todos los síntomas se agravan al despertar. — Mandíbula inferior pendiente; lengua seca, roja ó negra, con punta agrietada. — Lengua temblorosa al sacarla, ó bien su punta se queda detrás de los dientes inferiores. Mirada estúpida, los ojos parece que estan llenos de sueño; vértigos al volverse en la cama; orinas de un rojo oscuro y abundantes.

Mercurius. Cuando predominan los síntomas gástricos, y poco ó nada los cerebrales; gran sensibilidad de la boca del estómago al tacto; lengua cubierta de una capa espesa, amarilla; encías que exhudan sangre; diarrea amarilla, verde; sudores abundantes, debilitantes y que no alivian.

Muriat. ac. El enfermo se escurre en la cama poco á poco hasta los pies de ella; orinas suprimidas; olor fétido de la boca que está toda negruzca; gran debilidad y postracion, el enfermo suspira y gime durante el sueño.

Nux vomica. Sopor como por embriaguez, con pérdida del conocimiento; megillas y palmas de las manos rojas y quemantes; lengua seca, con bordes y punta encarnados; labios secos y hendidos; gusto amargo y pútrido de las bebidas; presión y tensión dolorosa en la boca del estómago y en los lados del vientre; estremidades como paralizadas; humor irascible, impaciente y discolorado; estreñimiento de vientre.

Phosphori ac. Grande apatía, indiferencia, sentidos embotados; gran inflamación de los intestinos con gorgoteo. — Diarrea con deposiciones acuosas, no dolorosa, blancas ó amarillentas (feculentas). — Laconismo y repugnancia á la conversacion; mirada fija, estúpida, con ojos hundidos y vidriosos; soñolencia invencible y sueño lleno de desvarios; ó delirios con murmullos; sordera; deposiciones diarreicas, orinas rojo-oscúras, ó estreñimiento de vientre y orinas con sedimento rojizo; sudor frío en la cara, manos, y boca del estómago con ansiedad. (Conviene antes ó despues de *opium*.)

Rhus. Como *bry.*, es un medicamento esencial en

todas las clases de tífus. — *Indicaciones principales*: dolores en las estremidades que aumentan con la quietud; el enfermo se mueve constantemente ó cambia de posicion. — Sangre por la nariz sobre todo por la noche; rubicundez en forma de triangulo en la estremidad de la lengua. — Diarrea (deposiciones que salen involuntariamente) que aumenta por la noche. — Sueño agitado ó delirio; el enfermo habla consigo mismo, pero por lo general de un modo incoherente. — Gran debilidad y postracion que no permite casi moverse en la cama; soñolencia comatosa con murmullos y ronquidos; delirios locuaces con deseo de huir de la cama, y que alternan con momentos lúcidos; ojos encarnados; lengua y labios secos, agrietados; sordera; lengua roja y temblorosa con fuerte sed; orinas sanguinolentas, y diarrea á veces lo mismo; sudor viscoso con angustia.

Stramonium. El enfermo levanta la cabeza con frecuencia de la almohada (G.). Delirio violento, siendo preciso sugetar al enfermo, porque se quiere tirar de la cama, morder, arañar y escupir; ó huir de la cama impelido por visiones asustadizas; canta, silva, ó desgarrar cuanto tiene á mano; no reconoce á sus parientes ni amigos; pupilas dilatadas, insensibles; deposiciones de vientre y orinas suprimidas; estado soporoso con ronquido que alterna con los delirios.

Ademas de estos medicamentos, convienen otros, y aunque aquellos son los principales y estan casi siempre indicados en unos ú otros casos, indicaremos aun tres que suelen estarlo tambien, aunque no con tanta frecuencia.

Opium. El enfermo duerme continuamente, tiene una especie de soñolencia comatosa; nada le llama la atencion; si despierta á fuerza de llamarle ó menearle, mira estúpidamente y se vuelve á quedar profundamente dormido; boca abierta con fuertes ronquidos.

Pulsatilla. El enfermo se queja y lamenta continuamente; no puede estarse quieto, llora con frecuencia y

se desespera á veces. Diarrea, falta de sed, boca pastosa; y perdida del conocimiento con delirio, y con gemidos.

Sulphur. Es el específico en algunos casos, sobre todo en los que recaen en personas escrofulosas, sugetas á erupciones ó que se han suprimido. Conviene cuando la enfermedad está algo avanzada y despues de *nux v.* á veces. Calor continuo sobre todo á la noche, con cara pálida, pulso lleno, acelerado; fuerte sed; lengua seca, achocolatada; orinas muy escasas de un rojo oscuro, que se enturbian enseguida; insomnio, delirios con ojos abiertos, y estreñimiento de vientre.

En cuanto á la convalecencia de la fiebre tifoidea, diremos que es preciso tener una gran prudencia en la alimentacion; que es preciso abstenerse de cosas que lleven dulce, de las de pasteleria y frituras. En cuanto á los medicamentos indicados para hacer avanzar la convalecencia, ya los hemos consignado al principio.

Fiebre urticaria. — (*Urticaria.*) — (*Porcelana.*) — Consiste esta erupcion, la mayor parte de las veces acompañada de sintomas febriles, sobre todo la variedad aguda, en la aparicion de vesiculas ó pápulas (elevaciones) lenticulares, ya diseminadas por toda la piel, ó circunscritas á ciertas partes, y que se parecen á las que producen las picaduras de las ortigas, produciendo un picor urente, irritante, insoportable.

Esta enfermedad proviene de escesos en el regimen, de un fuerte acaloramiento, de estar al sol abrasador ó de un ejercicio violento.

Existen dos formas, una aguda y otra crónica.

En la aguda, por lo comun acompañada de fiebre, la erupcion se estiende instantáneamente por todo el cuerpo, y su duracion es corta. Los medicamentos que hay que dar, son: *Acon.*, si hay fiebre comucha agitacion y sed. *Camph.*, si no existiese fiebre. *Apis*, si la fiebre no cede á *acon.* *Bry.*, si *apis* no ha concluido con la erupcion; y *dulc.*, si *bry.* no ha sido suficiente, ó bien *rhus*.

En la forma crónica, llamada asi, porque dura varias

semanas, nunca va acompañada de fiebre, y á veces solo suele haber recargos febriles por las noches. Ocupa la erupcion por lo comun el vientre, pecho y organos genitales, aunque tambien puede ocupar otras regiones. El medicamento principal contra esta forma, segun Teste, es *croton tiglium*; pero este medicamento suele ser ineficaz en bastantes casos. Los medicamentos principales que se deben consultar por el orden de su enumeracion, son: *Lycop.*, *calc. carb.*, *ars.*, *rhus.* y *caust.*, y aun *urtica urens*.

Si aparece ó se agrava al aire libre: *Nitri ac.*

Con el aire frio: *Calc. carb.*

Con el ejercicio violento: *Con.* y *natr. m.*

Flatulencia.

(*Ventosidades.*)

La flatulencia y ventosidades suelen ser casi siempre el sintoma de alguna enfermedad, como la dispepsia, el histerismo, etc. Sin embargo tambien pueden subsistir por si solas, sin depender de otra enfermedad. Son un sintoma muy molesto, y que á veces producen dolores y hasta cólicos (*véase cólicos ventosos*).

Los principales medicamentos para combatir con exito la flatulencia y ventosidades, son: *Carbo v.*, *china*, *lycop.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*; y *asa fæt.* en las mugeres que tienen mucho histérico.

Si se desarrollan á consecuencia de alimentos flatulentos, dése, *china*, y si no basta, *carb. v.*

Despues de bebidas repetidas: *Nux v.*, y si no basta, *puls.*

Despues de haber tomado alimentos grasientos: *pulsat.*, ó *china*, si aquel no basta.

En los niños: *Cham.*

Que se aumentan estando acostado: *Phosph.*

Por la mañana: *Nux v.* — Por la tarde: *Puls.* — A la noche: *Carb. v.*, *merc.*

Que se aumentan con el movimiento: *Natr.* — Con la tos: *Cocc.*

Que se alivian con la presion : *Helleb.* — Inclinando el cuerpo adelante : *Bell.* — Eructando : *Natr.* — Ventoseando : *Carb. v., natr.*

Cuando van acompañadas de angustia : *Nux v.* — De escalofríos : *Mez.* — De náuseas : *Gratiola.* — De opresion de la respiracion : *Mez.* — De dolor de cabeza : *Calc. phos.* — De contraccion de los intestinos : *China.*

Flemones.

(*Tumores inflamatorios. — Abscesos.*)

El flemón ó tumor inflamatorio, no es otra cosa que una gran inflamacion de la piel y tegido celular subyacente, con rubicundez de los tegidos, tumefaccion y dureza. Puede ser circunscrito y difuso. En el primer caso ocupa un cierto espacio de la piel, del cual no pasa; en el segundo se estiende á gran distancia á veces. Su asiento es por lo comun en las estremidades. Puede sobrevenir espontáneamente, ó á consecuencia de golpes, caidas, rozaduras, etc.

Los principales medicamentos para combatirlos son los siguientes :

Aconitum. — Cuando hay fiebre violenta, sed, fuertes dolores y rubicundez viva.

Belladonna. — En el flemón difuso y aun en el circunscrito, cuando la rubicundez es casi erisipelatosa, y se estiende á lo lejos.

Bryonia. Si el tumor acusa un fuerte calor y tension, ya la rubicundez sea pálida ó fuerte.

Hepar. Si hay dolores lancinantes, pulsativos, que indican que se está formando la supuracion.

Phosphorus. — En sugetos escrofulosos, altos, delgados, demacrados, con fiebre lenta y fuertes dolores.

Pulsatilla. En las personas sensibles, linfáticas, que gritan y se quejan mucho, y cuando al tumor le rodea una aureola rojiza.

Silic. Cuando *hepar.* no concluye de hacer supurar y abrir el tumor. Sirve para apresurar la supuracion,

sobre todo cuando los dolores son pungitivos, lancinantes.

Tambien se da *arsen.* en los casos en que los dolores son irresistibles por lo urentes, y el flemon presenta mal aspecto, parece que se va á gangrenar por su color violáceo.

Si despues de abierto el tumor, la supuracion no tiene trazas de concluirse, hay recargos febriles, inapetencia, etc., los mejores medicamentos para agotarla, son: *Silic.*; despues, si este no basta, dése: *phos.* en los sugetos que tengan fiebre lenta, esten demacrados y tengan aspecto tísico: *merc.*, cuando hay fuertes sudores que no alivian, la supuracion es sanguinolenta, hay diarreas, y sobre todo si el enfermo ha padecido sífilis. *Calc.*, despues de *phos.* si este no ha hecho otra cosa que aliviar al enfermo sin acabarle de curar. Tambien pueden consultarse *hepar.* y *sulphur.*

Si despues de concluida la supuracion quedan aun los tegidos indurados, con ó sin dolores, dése: *Baryt. c.* cuando no hay dolores; y despues, si hay necesidad *iodium* ó *kali c.* Cuando hay dolores, dése: *Carb. an.*, y si no basta, *con.* Cuando la induracion se resiste en ambos casos, dése, una ó dos dosis de *Sulphur*, y vuélvase al medicamento que esté mas indicado de los anteriores.

Flujo blanco.

(*Leucorrea — Flores blancas.*)

Hay que elegir el medicamento correspondiente, segun el calor y la naturaleza del flujo. Dése cuando son:

Acres: *Alum.*, *borax*, *con.*, *ferr.*, *merc.*, *phos.*; ó *Ars.*, *carb. v.*, *iod.*, *sep.*, *silic.*

Acuosas: *Graph.*, ó *puls.*, *sep.*

Quemantes: *Calc.*, ó *con.*, *kreos.*

Oscuras: *Nitri ac.*

Verdes: *Carb. v.*, *sep.*

Con picor: *Calc.*, ó *kreos.*, *merc.*

- Lechosas: *Calc.*, *puls.*; ó *ammon. c.*, *silic.*
Mucosas: *Bor.*, *magn. c.*, ó *calc.*, *graph.*, *mez.*,
stann., *sulph.*
Purulentas: *Cocc.*, *merc.*, *sabin.*; ó *kreos.*, *lyc.*, *sep.*
Que corroen la ropa: *Jod.* (G.), *nitri ac.*, *phos. ac.*
Teñidas de sangre: *China*, *cocc.*, ó *kreos.*, *nitri ac.*
Viscosas: *Borax*, *stann.*
De mal olor: *Kreos.*, *nitri ac.*, *sabina*, *sepia.*
Que ponen tiesa la ropa: *Alum.*
En forma de sacudidas (que sale): *Silic.*
De color de carne: *Alum.*, *cocc.*, *nitri ac.*
Que tiñe la ropa de amarillo: *Carb. an.*, *prunus.*
Amarillenta: *Carb. v.*, *cham.*, *murex*, *natr. m.*,
nux v., *sabina*, *sepia*, *sulph.*
Se darán, segun las circunstancias concomitantes, y
cuando el flujo va acompañado:
De dolores de vientre: *Con.*, *kreos.*, *magn. m.*, *puls.*,
silic., *sulph.*
De dolores como de parto: *Dros.*
De dolores de riñones: *Caust.*, *magn. m.*; ó *baryt.*,
graph., *kali.*
De debilidad: *Alum.*, *kreos.*, *sep.*
De diarrea: *Natr. m.*
De cansancio: *Alum.*
De temblor: *Alum.*
De punzadas en los órganos genitales: *Sepia.*
De cara amarilla: *Natr. m.*
De dolor de cabeza: *Natr. m.*, *puls.*
De abultamiento de vientre: *Sepia*; ó *Ammon. m.*,
graph.
Si el flujo precede á la menstruacion: *Calc.* ó *alum.*,
ferr., *kreos.*, *puls.*, *ruta*, *sulph.*
Si se presenta despues de la menstruacion: *Alum.*,
cocc., *merc.*; ó *kreos.*, *phos. ac.*, *silic.*
Juntamente con la menstruacion: *Chinin*, *graph.*,
puls.
Inmediatamente que cesa la menstruacion: *Ruta.*
Administrense los medicamentos disueltos en agua,

mañana y noche, y durante tres ó cinco dias, y luego suspéndanse durante ocho ó quince dias. No se usarán medicamentos externos, pero se cuidará mucho de la limpieza de los órganos genitales, lavándolos con frecuencia con agua tibia. G. rechaza hasta las simples inyecciones de agua.

Fluxion á la cara.

(*Fluxion á las muelas. — Flemon en el carrillo. — Flemon.*)

La fluxion á la cara ó flemon, producida por el dolor de muelas, por un enfriamiento, una fuerte incomodidad, etc., con dolores mas ó menos insoportables, gran hinchazon, y rubicundez unas veces y palidez otras, se combate pronto y felizmente con: *Bell.*, *hepar.*, *merc.* y *silic.* *Acon.* cuando bay fiebre.

Bellad. Cuando los dolores son insoportables, producen desesperacion, no dejan dormir; gran hinchazon con rubicundez que se estiende mucho, y parece erisipelatosa. (Si *bell.* no alivia, dése *cham.*)

Hepar cuando los dolores son pungitivos, lancinantes, y el flemon tiende á la supuracion.

Mercur. si el dolor de muelas, por estar estas caria-
das, ha producido la fluxion, con fuertes dolores quemantes, gran salivacion, dificultad de tragar, dolor de oidos, hinchazon de los párpados, vacilacion de las muelas y punzadas en las encias.

Silicea. Cuando los dolores pungitivos, lancinantes, son tan vivos, que causan la desesperacion del enfermo, y *hepar.* no ha podido combatirlos. Hay supuracion, y el flemon no acaba de abrirse; ó despues de abierto no se agota la supuracion.

Estos son los medicamentos que triunfan casi siempre de todos los casos. Cuando despues de resuelto el tumor ó de haber supurado, queda alguna induracion del mismo, se quitará esta con *Baryt. c.*, *hepar.*, *staph.*

En algunos casos rebeldes á los medicamentos antes indicados, consúltense: *Arn.*, *puls.*, *staph.*, ó *bry.*, *nux v.*, *sulph.*

Fósforo.

La primera cosa que hay que hacer en un envenenamiento por el fósforo, si se llega á tiempo, es hacer vomitar al enfermo cuanto antes, todo lo contenido en su estómago; para lo cual se le titila la campanilla con las barbas de una pluma, ó se le pone tabaco ó mostaza en la lengua. Luego que se ha conseguido hacerle vomitar se le dará café negro, y despues un poco de magnesia. Húyase siempre de dar aceite y cualquiera otra sustancia grasa.

Si despues de haber tomado la magnesia existen aun sufrimientos el mejor medicamento es *nux v.*, que se debe dar con bastante frecuencia.

Como un antidoto importante debe tambien considerarse el vino, sobre todo el generoso, si lo hay á mano, dándosele al evenenado con azucar.

En los casos en que *nux v.* no bastase á corregir los sintomas, consúltense: *Calc. c.*, *camph.*, *coff.*, ó *china* y *Hamamelis* en las hemorragias que por las aberturas naturales se presentan en los envenenamientos graves.

Gangrena.

Si amenaza una parte ó un miembro del cuerpo, es preciso recurrir á los medicamentos siguientes: *Ars.*, *china*, *laches.*, *secal. cor.* y tambien *carb. v.*

Arsenicum. Cuando los dolores son muy violentos y el calor los disminuye.

Lachesis. Si la parte presenta un color azulado. — Despues de la intoxicacion por el veneno de un cadaver ó serpiente. (*Ars.*)

Secale cornutum. Principalmente en los viejos, y en los casos en que el calor aumenta los dolores.

Carbo veg. Conviene cuando hay supuracion fetidísima.

Glándulas.

Inflamacion de las glándulas. — Se combate perfectamente con *Acon.*, *bell.*; *merc.*, *phos.*; ó: *Nux v.*, *puls.*, *silic.*, *sulph.*

Supuracion de las glándulas. — Se trata con: *Hep.*, *merc.*, *silic.*; ó: *Bell.*, *calc.*, *dulc.*, *merc.*, *nitri ac.*, *sulph.*

Infarto de las glándulas. — Los principales medicamentos son: *Baryt. c.*, *carbo an.* y *coniúm.* Si estos no bastan, consúltense: *Bell.*, *calc.*, *graph.*, *lyc.*, *merc.*, *nitri ac.*, *nux v.*, *phos.*, *rhus.*, *silic.*, *sulph.* (Véanse: *Pechos* y *Parótida.*)

Gota.

(*Artritis.*)

La gota es hereditaria en ciertas familias; ataca sobre todo á las personas que comen manjares suculentos y llevan una vida muy sedentaria. Se parece mucho al reumatismo, pero se distingue de este por la hinchazon de las articulaciones, causada por el depósito de sustancias minerales (tofós); lo cual no se verifica en el reumatismo. Los dolores en la gota aumentan ordinariamente á la noche con el calor de la cama. El reumatismo no se distingue por esta particularidad. Las orinas de los gotosos contienen casi siempre un depósito de arenillas ó arena gruesa, que reaparece de tiempo en tiempo, acompañado de los cólicos nefríticos mas violentos.

Se comprenderá facilmente que la gota no se cura, si el enfermo no cambia de método de vida, cesando en el uso de las bebidas alcohólicas á la vez.

En los casos agudos consúltense los medicamentos siguientes:

Aconitum. Si hay grande fiebre, piel seca y caliente, sed, etc.

Arnica. Uno de los principales medicamentos. Dolores como si las articulaciones estuviesen dislocadas, ó

sensacion como si la parte enferma se apoyase sobre un cuerpo duro.

Arsenicum. Si los dolores disminuyen con el calor exterior, y si el enfermo está muy debil y demacrado.

Bryonia. Cuando el mas pequeño movimiento aumenta los dolores.

Ferrum. Si los dolores aumentan por la noche, y si el gotoso experimenta un deseo continuo de cambiar de sitio la parte enferma. (*Rhus*.)

Nux vomica. Conviene sobre todo á las personas que comen y beben mucho.

Pulsatilla. Cuando la gota pasa de una articulacion á la otra.

Rhus. Gran hinchazon con ardor y escozor, imposibilidad de moverse, deseo de cambiar continuamente de sitio la parte enferma; agravacion de todos los sintomas por la noche.

Sabina. Es muy ventajoso en la gota aguda y crónica, cuando los dolores se hacen insoportables si se tiene el miembro en suspension. (En los casos de verdadera podagra (gota en los pies) los principales medicamentos son (B.): *Arn.* y *sabin.*)

En la gota crónica con hinchazon y deformidad de las articulaciones, se dan con ventaja:

Calcareo carbonica. Si la causa principal es un enfriamiento por humedad, ó si los dolores aumentan cuando el tiempo está lluvioso.

Lycopodium. Si la orina contiene un depósito considerable de arenilla encarnada. (*Antim. cr.*, *zinc.*)

Ademas se pueden consultar: *Caustic.*, *graph.*, *natr. m.*, *silic.*, *sulph.* (*Thuja*, *Wolf.*)

En un caso de gota aguda que no ha sido tratado aun, se dan los medicamentos indicados á dosis fuertes y frecuentemente (de la 6^a ó 12^a dilucion; ó de la 200^a). En los casos crónicos será mejor servirse de las altas potencias, y esperar su accion, sin repetir las dosis, varias semanas.

Grietas.

Los medicamentos que principalmente se deben emplear contra las grietas, son: *Calc.*, *puls.*, *sepia*, *sulph.*; ó: *Arníc.*, *cham.*, *hepar.*, *lach.*, *lyc.*, *natr. m.*, *petrol.*, *rhus.*, *zinc.*

Si las grietas son profundas y exhudan sangre: *Merc.*, *sassap.*; ó: *Petrol.*, *puls.*, *sulph.*

Si aparecen ó se aumentan despues de haberse lavado: *Calc.*, *sep.*, *sulph.*; ó: *Antim. cr.*, *puls.*

Las grietas de los obreros que les salen en las manos, por trabajar con ellas en el agua: *Calc.*, *hepar.*; ó bien: *Alum.*, *merc.*, *sassap.*, *sulph.*

Las que se presentan en el invierno ceden á *petrol.* ó á *sulph.*

Las del ano ceden casi siempre á *graph.*, ó á *arnic.* Si estos no bastan consúltense: *Calc.*, *cham.*, *hep.*, *rhus.*, *sassap.*, *sulph.*

Las de los pezones ceden á *arnic.*, si este no bastase, dése *graph.*; y en caso de necesidad, *cham.*, *merc.*, *sulph.*, y aun *calc.*, *ign.* y *puls.*

Las de las manos, á: *Alum.*, *hep.*, *petrol.*, *rhus.*, *sulph.* Si son profundas y sangran: *Merc.*, *petrol.* y *sassap.*

Las de los dedos, á: *Merc.*, *petrol.*, *sassap.*

Las de las articulaciones de los dedos, á: *Mangan.* *phos.*

Las que se presentan debajo y en derredor de las uñas, á: *Natr. m.*

Las de los pies, á: *Alum.*, *aur.*, *calc.*, *hep.*, *lach.*, *petrol.*, *sulph.*, *zinc.*

Las que se presentan en la punta de la nariz, á: *Carb. an.*

Las de las ventanas y angulos de la nariz, á: *Antim. cr.*

Las de la cara, á: *Silic.*

Las de los ángulos de los labios (comisuras de), á: *Merc.*, *mez.*

Las de los labios, á: *Ammon. m.*, *arn.*, *ars.*, *bry.*, *caps.*, *croc.*, *ign.*, *merc.*, *natr. m.*, *veratr.*, *zinc.* Si se ulceran: *Merc.*, *phos. ac.*

Las de los órganos genitales se tratan: si estan en el prepucio, con *sulph.* — En el trayecto del cordon espermático: *Cann.*, *sulph.* — En el glande: *Kali.* — En el escroto: *Arn.*, *graph.* — En el miembro: *Arn.*, *graph.*, *kali*, *mosch.* — En los testiculos: *Caust.*, *graph.*, *sulph.*

Grippe.

La grippe se presenta bajo la forma de un catarro epidémico que frecuentemente, y en poco tiempo, se estiende por paises enteros. Los medicamentos que se emplean en este catarro, son los mismos que los del catarro ordinario. Sin embargo, consúltense las indicaciones siguientes:

Aconitum. Cuando la enfermedad se presenta con caracter inflamatorio bien pronunciado, tos seca violenta y que conmueve todo el cuerpo, con ó sin opresion de pecho; catarro brónquico y congestion ó inflamacion de la garganta.

Arsenicum. Gran postracion y debilidad agravadas por la noche ó despues de tomar alimento; dolor violento de cabeza con coriza, con flujo corrosivo; tos espasmódica con ganas de vomitar y hasta vómitos; afeccion catarral de los ojos.

Belladonna. La tos se hace espasmódica; el dolor de cabeza es insoportable y se agrava con la luz, el movimiento, la conversacion; agitacion, inquietud y hasta delirio.

Bryonia. Dolores reumáticos en las extremidades y pecho, que no permiten el mas pequeño movimiento.

Camphora. Si hay una especie de asma catarral, con acúmulo enorme de mucosidades en los bronquios; accesos de sofocacion; piel seca y fria al tacto; el enfermo desea estar destapado constantemente; dolor de

cabeza que se aumenta con el cambio de tiempo, ansiedad, insomnio.

Causticum. Sensacion de herida en el pecho; dolores en las estremidades que impiden el movimiento y en los huesos de la cara; tos seca, violenta, que se agrava á la noche con calor general.

Ipecacuanha. Si los accesos de tos van acompañados de vómitos, náuseas y arcadas en seco.

Mercurius. Dolores en la cabeza, cara, oídos, muelas y estremidades, con dolor de garganta; tos seca, convulsiva, violenta é incesante, y que no permite hablar; coriza; la sangre sale por las narices á consecuencia de la tos tan violenta; calor con sudores generales, abundantes, que no alivian.

Nux vomica. En las personas biliosas, de caracter violento, hipocondriacas. Tos gruesa y ronca; dolor de cabeza, violento, contusivo, gravativo, especialmente en la parte posterior; vértigos; dolor de riñones; insomnio, sueño agitado; estreñimiento pertinaz de vientre.

Pulsatilla. Cuando la tos no deja descansar de dia ni de noche al enfermo y se aumenta, estando acostado.

Sabadilla. Coriza con flujo abundantísimo; atontamiento de cabeza; tos sorda con vómitos ó expectoracion de sangre, desde que se acuesta el enfermo; agravacion de todos los sintomas si el enfermo se enfria, por la tarde y antes de media noche.

Stannum. La tos, al principio seca, se vuelve húmeda con expectoracion abundante; si el enfermo habla ó lee, siente una gran debilidad en el pecho y garganta, y hasta ronquera; expectoracion amarillenta, verde, de mal olor; despues de toser y expectorar, el enfermo se siente muy postrado y debil; agravacion de todos los sintomas con el movimiento y la conversacion.

Veratrum. — Gran debilidad. El enfermo tose hasta que cae completamente rendido, presentándosele un sudor frio en la frente; agravacion de los sintomas bebiendo, haciendo de vientre (poniéndose muy pálido, debil, y lleno el cuerpo de sudor frio) y sudando.

Hambre canina y falta de hambre.

Véase: *Apetito*.

Hemorragias.

En todas las hemorragias, cuya causa no se puede descubrir con certidumbre, tiene un guia casi seguro en la eleccion de los medicamentos, el color de la sangre y sus caracteres esenciales.

Si la sangre es: acre, dése: *Kali, silic.*

Oscura: *Bry., carb. v.*

Coagulada: *Cham., plat., rhus.*; ó: *Bell., china, ferr., hyosc., ign., ipec., puls., sabad.*

Negra: *Cham., croc., lach., nux v., puls., sep.*

Rojo-clara: *Bell., dulc., hyos.*; ó: *Arn., ipec., phos., rhus., sabina, secal. c.*

Viscosa: *Croc.*

Si huele mal: *Bell., bry., cham., croc., sab.*

Hemorragias por exceso de sangre en el individuo: *Acon., bell., croc., op., sabina.*

Hemorragias por debilidad: *China, ferr., ipec., y secal.*

Epistaxis. — (*Hemorragia de la nariz.* — *Flujo de sangre por la nariz.*) — Para la hemorragia de la nariz están indicados los medicamentos siguientes:

Aconitum. En las personas sanguineas, con fuerte dolor de cabeza y cara encarnada. (*Bell.*)

Arnica. Despues de un golpe ó commocion. — A la salida de la sangre precede una sensacion de hormigueo en la nariz.

Bryonia. Despues de un calentamiento. — Menstruacion retardada por el vicio reumático (N.).

Carbo vegetabilis. — Hemorragia frecuente y abundante, sobre todo por la mañana y durante las deposiciones de vientre. — Gran palidez de la cara antes y despues de la hemorragia.

China. Hemorragia nasal en personas anémicas, ó

durante los accesos de debilidad, ó á consecuencia de pérdidas de sangre.

Conium. Hemorragia nasal al estornudar.

Crocus. Sangre espesa, viscosa, negra.

Mercurius. La sangre se coaguda en seguida y forma un tapon.

Nux vómica. Si es á consecuencia de bebidas espirituosas ó trabajos mentales, habiendo ademas precedido sequedad en la nariz y oclusion de la misma (Alvarez).

Phosphorus. Sangre abundante, clara, en personas de constitucion tísica, y rebelde á los medicamentos anteriores; que se presenta de nuevo por la mas ligera causa, y sin causa ostensible (Alvarez).

Pulsatilla. Menstruacion suprimida ó muy escasa.

Rhus. Hemorragia nasal por la noche y encorbándose.

Cocculus y sepia. Durante el embarazo ó en las personas que tienen predisposicion á padecer almorranas.

Sulphur. Hemorragias crónicas, rebeldes á los demas medicamentos, y cuando se han suprimido las almorranas que ha tiempo se padecian.

Gastrorragia. — (*Hematemesis*. — *Melena*.) — La gastrorragia, ó vómitos de sangre procedente del estómago, puede ser de sangre roja, en cuyo caso se llama *Hematemesis*; ó de sangre negra, llamándose entonces *Melena* ó vómito negro.

Los principales medicamentos contra la hematemesis, son: *Acon.*, *arn.*, *ferr.*, *hyosc.*, *ipéc.*, *nux v.*

Aconitum. Si hay fiebre, pesadez general, sed, y peso en el estómago.

Arnica. En los casos de golpes, caidas, contusiones, y en los grandes vómitos de sangre roja y espumosa, ó coagulada.

Ferrum. Sangre pálida, con debilidad general, palidez del enfermo, vahidos, desvanecimiento.

Hyoscyamus. Sangre descolorida, color azulado de la cara; pulso duro y lleno; ardor en el estómago como si estuviera inflamado; si se presenta cuando se va

verificar la menstruacion, al principio de esta ó durante ella.

Ipecacuanha. Vómitos de sangre roja acompañada de alimentos; náuseas continuadas; frio en las extremidades con sudor en la frente y en la cara; los vómitos no quitan el deseo de vomitar, que sigue cada vez aumentando mas; color azulado en derredor de los ojos. Conviene ademas si la causa ha sido una indigestion, ó el enfermo ha abusado de la quinina.

Nux vómica. Es tan grande la incomodidad en el estómago, que el enfermo desea vomitar; vomita al fin una sangre rojo-oscura mezclada con bilis, alimentos ó materias acidas. Estreñimiento de vientre. Supresion de almorranas que subsistian hacia tiempo.

Si estos medicamentos no bastasen, consúltense: *Bry.*, *carb. v.*, *china*, *lach.*, *lyc.*, *mez.*, *millef.*, *sulph.*, *veratr.*

Los principales medicamentos contra la melena ó vómito negro, son:

Arsenicum. Vómitos negros, abundantes, fétidos, con angustia estrema, sed ardiente, palidez de la cara y hasta descomposicion de la misma, y frio general con sudores frios.

China. En los casos en que el enfermo está muy debilitado, anémico, hay sincopes, desvanecimiento, mareos, y una debilidad tan grande, que apenas puede hablar.

Veratrum. En los casos que *ars.* no haya bastado, y se aumenten considerablemente los sintomas marcados para este medicamento.

En caso de necesidad, consúltense: *Ipec.*, *nux v.* y *m.*, *sulph.*

Hemoptisis. (*Hemorragia pulmonar.* — *Espectoracion de sangre.* — *Tos sanguinolenta.*) — Investiguese ante todo la causa ocasional.

Si la hemoptisis es la consecuencia:

De un esfuerzo, de una caída, de un golpe, dése: *Arnic.*

De una congestion pulmonar con fiebre: *Acon.*, ó *bell.*, *bry.*, *nux v.*

De la menstruacion suprimida: *Bry.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*

Es menester tambien fijar la atencion en el color y consistencia de la sangre.

En una hemorragia abundante y peligrosa, los medicamentos principales, son: *Acon.*, *arn.*, *china*, *ipéc.*, *op.*, *puls.* (Hg.). Déense:

Aconitum. Si la sangre es rojo clara; ansiedad, inquietud; hervidero de sangre en el pecho antes de la hemorragia; angustia mortal; expectoracion de sangre abundante por intervalos; escitada no por tos, sino por una ligera tusiculacion.

Arnica. Espectoracion facil de sangre negra y coagulada, con dificultad de respirar, dolores en el pecho, ardor y contraccion en el mismo, palpitaciones de corazon, calor y accesos de desfallecimiento; ó sangre rojo-clara mezclada de coágulos y mucosidades, espumosa; ó expectoracion de sangre escasa cada vez que se tose, y en forma de esputos, con dolor en la cabeza al toser.

China. Si el enfermo está tan debil que parece va á desfallecer, y suda mucho. Gusto de sangre en la boca; expectoracion de sangre con tos violenta; escalofrios á la vez alternando con calor pasajero, temblor pasajero, vertigos, vahidos, oscurecimiento de la vista.

Ipecacuanha. Si hay una tos espasmódica, sofocante, frecuentemente acompañada de vómitos; si la respiracion es dificil y la sangre rojo-clara (ú oscura). (Conviene despues de *acon.* ó *ars.*)

Opium. En los casos mas graves y especialmente si recaen en personas que abusan de las bebidas espirituosas. Vómitos de sangre espesa y espumosa, mezclada de viscosidades; la cara está hinchada, quemante, de un rojo subido, ó de color pálido-azulado; agravacion de la tos despues de tragar; sofocacion, respiracion dificil y angustia, frio en las estremidades con calor en el pecho y tronco; soñolencia y sobresaltos.

Pulsatilla. En los casos graves y tenaces, con expectoracion de sangre negra y coagulada; en los casos que se ha suprimido la menstruacion: ansiedad y escalofrios: dolores en la parte inferior del pecho.

Ademas de estos medicamentos y en casos menos graves, pueden consultarse: *Ars.*, *bell.*, *carb. v.*, *dulc.*, *ferr.*, *hyoscy.*, *ign.*, *nux v.*, *sulph.*

En las hemoptisis causadas por la supresion de las almorranas, el principal medicamento es *nux v.*, y si este no basta, *sulph.*

Inutil es hacer observar, que el enfermo debe permanecer quieto en la cama, evitar toda clase de emociones, abstenerse de hablar en alta voz, no beber ni comer cosas calientes, ni tomar bebida alguna fuerte. Para evitar las repeticiones de la hemorragia ó el desarrollo de tubérculos, consúltense: *Ars.*, *calc. c.*, *lach.*, *nitri ac.*, *nux v.*, *phos.*, *puls.*, *sulph.*

En los casos graves se administran los medicamentos de media en media hora ó de hora en hora, segun la urgencia del caso.

Metrorragia. — (*Hemorragia uterina* — *Flujo de sangre de la matriz*.) — Las hemorragias uterinas pueden presentarse despues de un parto ó aborto; en este casos los principales medicamentos son: *Arn.*, *bell.*, *cham.*, *crocus*, *ipec.*, *plat.*, *sabina* (comp.: *Aborto*). En las menstruaciones demasiado abundantes (*menorragias*): *bell.*, *calc. c.*, *ferr.*, *ipec.*, *nux v.*, *plat.*, *sabin.*, *secal.* (Comp.: *Menstruacion*). La hemorragia puede ser tambien causada por un tumor, un pólipo ú otra enfermedad grave, como por ejemplo la fiebre tifoidea. En este caso dése: *Ars.*, *china*, *rhus*, *secal.* (G). (Comp.: *Hemorragias*). Para las mugeres sanguineas se da sobre todo: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *cham.*, *nux v.*; ó bien: *Plat.*, *sabina*, *sulph.* En las personas muy debilitadas, conviene: *China* ó *secal.*; ó bien: *Crocus*, *ipec.*, *puls.*, *sep.*, *sulph.*

Siganse, para la eleccion de los medicamentos, las indicaciones siguientes:

Aconitum. Es ventajoso para las mugeres que tienen

vértigos en cuanto se levantan, lo cual las obliga á he-
charse de nuevo. — Temen morirse á cada momento.

Arnica. Cuando la metrorragia proviene de una
caída, de un golpe ó violenta conmocion, por ejemplo, si
se va en carruage por un camino lleno de baches, y
especialmente en las mugeres embarazadas.

Belladonna. La muger experimenta una sensacion
en sus órganos genitales, como si todo fuera á salir por
ellos, con dolores violentos en las caderas, como si las
rompieran, y en el vientre bajo.

Bryonia. Dolores de cabeza; la enferma cree que
su cabeza va á estallar; su malestar empeora desde
que se mueve. — Tiene vértigos al levantarse. Salida
de una sangre rojo-oscura con dolores de riñones, náu-
seas, vértigos y accesos de desfallecimiento.

Calcarea. Conviene á las mugeres obesas, cuya
menstruacion es muy abundante y se adelanta.

Chamomilla. Gran inquietud y ansiedad. — Sale
por intervalos una sangre negra y coagulada.

China. Gran debilidad; zumbido de oídos; con-
gojas; en los casos mas graves, con pesadez de cabeza,
vértigos, embotamiento de los sentidos, soñolencia,
palidez, frio en las extremidades y estremecimientos
convulsivos.

Crocus. Salen filetes de sangre negra. — La en-
ferma experimenta la sensacion de tener una cosa que
se mueve en el vientre. Sangre negra, viscosa, mezclada
de coágulos; tez amarilla y terrosa; grande debilidad
con vértigos, obscureumiento de la vista y congojas; pulso
apenas perceptible; gran ansiedad é inquietud; frio y
sudores frios. En los casos mas graves y despues de *china*.

Hyoscyamus. La hemorragia va acompañada de
delirios, convulsiones y una gran agitacion.

Ipecacuanha. Medicamento por excelencia, segun
Hering, en todas las grandes hemorragias despues de un
parto. — Sangre rojo-clara; cólicos en la region umbi-
lical; náuseas continuas (G.).

Platina. Hemorragias en las que la sangre es negra,

espesa, con dolores de vientre que vienen de las caderas, y ponen los órganos genitales muy sensibles (G.). Hemorragia precedida de violentas emociones. (Hg.).

Pulsatilla. Hemorragias de las personas cuya constitucion reclama *pulsatilla*. — La hemorragia cesa con frecuencia por completo, y vuelve de repente (G.).

Rhus. Metrorragia causada por un esfuerzo corporal.

Sabina. La sangre es ya espesa y negra, ya acuosa. Despues del parto ó el aborto; dolores de vientre y en las caderas, como los de parto; gran debilidad; dolores en la cabeza y estremidades. Los dolores parten de la espalda y se dirigen al empeine (pubis).

Stramonium. La enferma habla con esceso durante la hemorragia, y se entrega á extravagancias fantásticas.

Disuélvase los medicamentos en agua y adminístrense cada 2 ó 3 horas, hasta que se declare el alivio; en los casos de metrorragia como de hemoptisis, la persona agena á la medicina hara bien en servirse de las atenuaciones medias; las bajas podrán agravar la hemorragia. En cuanto á las altas atenuaciones, curan frecuentemente, es verdad, mas rápida y seguramente, pero exigen una eleccion delicadísima y minuciosa.

Otorragia. — (*Flujo de sangre de los oidos.*) — El principal medicamento contra esta hemorragia es *merc.*, y si no basta dése *puls*. En caso de necesidad, consúltese: *Bry.*, *calc.*, *cicuta*, *graph.*, *laches.*, *nitri ac.*, *petrol.*, *rhus*, *sulph.*

Rectorragia. — (*Sangre de espaldas.* — *Flujo de sangre de los intestinos.*) — Los principales medicamentos contra esta hemorragia, son: *Acon.*, *bell.*, *calc.*: *china*, *ipéc.*, *nux v.*, *sulph.*

Aconitum. Punzadas y presion en el ano; sensacion de plenitud en el vientre, con tension, presion y calor fuerte; dolores en las caderas y rabadilla; sed; agitacion.

Belladonna. Hemorragia acompañada de fuertes dolores de caderas y vientre, cabeza y garganta; gran peso en el vientre y ano.

Calcarea. En personas pletóricas que tienen rectorragias frecuentes, que se presentan por lo comun despues de cada deposicion, y seguidas de gran quebrantamiento de fuerzas.

China. Gran debilidad producida por hemorragias anteriores, ó por la constitucion especial del individuo, y que se aumenta en extremo despues de cada hemorragia. Sangre fluida, pálida, acuosa, con sudores frios, palidez general y congojas.

Ipecacuanha. La sangre sale á la vez con los excrementos y en grande cantidad, con náuseas, vómitos, dolores de vientre, frialdad de la piel, sudor frio en la cara y frente.

Nux vomica. — Estreñimiento habitual de vientre; deposiciones de vientre sanguinolentas; pujo despues de la deposicion, y deseo de deponer con gran quemazon en el ano; congestion de vientre y de cabeza, con fuerte calor en aquel y abultamiento del mismo; cabeza pesada, vértigos; sangre mucosa; agravacion con el movimiento.

Sulphur. Despues de *nux* y en los casos en que este no ha acabado la curacion; estreñimiento de vientre que alterna con hemorragia acompañada de mucosidades, y que causa erosiones en el ano; por su ardor; congestion frecuente á la cabeza y gran peso en el ano; pesadez general, palpitaciones de corazon, con angustia y en los casos en que una erupcion ha sido suprimida.

Ademas de estos medicamentos pueden tambien consultarse: *Ars.*, *carbo v.*, *merc.*, *nitri ac.*, *phos.*, *rhus*, *tart.*

Uretrorragia. — (*Hemorragia de la uretra.* — *Hematuria.* — *Orinas sanguinolentas*). — Los medicamentos principales contra esta enfermedad, son los siguientes:

Aconitum. Fuerte fiebre con sed, con calor en la uretra y deseos de orinar, y emision de orina sanguinolenta ó sangre pura, con dolor en los riñones y vegiga de la orina.

Cannabis. Emision gota á gota de orina sangui-

nolenta con dolores urentes al orinar, retencion completa de orina con hemorragia.

Cantharis. Predominio de dolores insoportables, urentes, lancinantes, que no permiten estar en la cama, ni orinar; con salida de sangre en gotas, ó mas abundancia. El dolor al orinar es tal, asi como el escozor, que el enfermo resiste todo lo que puede antes de determinarse á orinar.

Pulsatilla. Emision de orinas sanguinolentas con sedimento purulento. Dolores presivos, urentes en la vegiga de la orina.

Sulphur. Si las orinas salen mezcladas de mucosidades y sangre, con ardor en la uretra.

Hematuria con deseo de vomitar: *Ipec.* — Con ardor: *Puls.* — Con dolores de estómago: *Ipec.* Con dolores en la vegiga y riñones: *Ipec., puls.* — Con parálisis en las piernas: *Lyc.* — Con estreñimiento de vientre: *Lyc.*

Tambien pueden consultarse los siguientes medicamentos en caso de necesidad:

Arn., ars., calc., china, con., mez., millef., phos., zinc.

Hemorroides.

(*Almorranas. — Tumores hemorroidales.*)

Los tumores hemorroidales provienen de que los órganos del abdomen y principalmente las venas llamadas hemorroidales, estan demasiado llenas de sangre. Estos tumores dan lugar, de tiempo en tiempo á abundantes flujos de sangre. La disposicion á padecer hemorroides, es por lo comun hereditaria. Una vida sedentaria y las comidas suculentas la favorecen; se encuentran en estos casos muchos sintomas de una congestion sanguinea en los órganos abdominales; como son: dolores en la espalda y riñones, flatulencia, estreñimiento de vientre, picor en el ano, etc.; y tambien congestion en el pecho y cabeza, ó bien hipocondria y otros padecimientos morales. Estos sintomas disminuyen ordinariamente cu-

ando sobreviene un flujo de sangre por el ano. Los antiguos trataban de provocar el flujo por medio de sanguijuelas ó del álces.

Los principales medicamentos contra las hemorroides, son: *Nux v.* y *sulph.*: que algunos recomiendan dar del modo siguiente: Durante tres dias seguidos una dosis por la mañana de *sulph.* y otra por la noche de *nux v.*; luego se descansa por tres ó seis dias, y se vuelve á repetir ambos medicamentos del mismo modo; y así sucesivamente. Este método tiene sus partidarios pero no consigue grandes resultados, siendo mas bien paliativo que otra cosa. Hay que atender siempre á los sintomas que acusa el enfermo.

Los medicamentos indicados contra esta enfermedad, ademas de *nux v.* y *sulph.*, son numerosos, y entre ellos mencionaremos especialmente: *Acon.*, *apis*, *bell.*, *caps.*, *carbó v.* *cham.*, *lyc.*, *sep.* y *aesculus*.

Si las hemorroides causan flujos ó exhudacion mucosa; dése: *Antim. cr.*, *caps.*, *carb. v.*, *graph.*, *phos.*, *puls.*, *sulph.*

Si el flujo es de sangre abundante: *Acon.*, *bell.*, *calc.*, *china*, *ipéc.*, *phos.*, *puls.*, ó *hamamelis* si la sangre es negruzca.

Si producen un fuerte picor en el ano: *Acon.*, *nux v.*, *sulph.*

Si hay cólicos hemorroidales: *Carb. v.*, *coloc.*, *lach.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*

Si los tumores hemorroidales se inflaman: *Acon.*, *cham*, *muriat. ac.*, *puls.*, ó: *ars.*, *nux v.*, *sulph.*

Contra las consecuencias que á veces sobrevienen por la supresion de las almorranas: *Nux v.* y *sulph.*, ó *calc.*, *carb. v.*, *puls.*

Para destruir la predisposicion á padecer almorranas: *Nux v.* y *sulph.*; ó: *Calc.*, *carb. v.*, *caust.*, *graph.*, *laches.*, *petrol.*, *puls.*

Hé aqui las indicaciones mas esenciales:

Aconitum. Punzadas y presion en el ano con presion y pesadez en el vientre, dolores de riñones, cabeza y pecho; pesadez general, las hemorroides sangran facilmente;

agravacion por la noche y mañana, al inclinarse, y con el frio; alivio con el calor.

Aloes. Tumores hemorroidales externos, en forma de racimos de ubas, dolorosos en estremo, ardorosos, sensibles y con gran calor; agravados por la tarde, estando de pie y sentado; aliviados con la aplicacion del agua fria.

Antimonium crudum. Secrecion abundante de mucosidades blanco amarillentas, con ardor, hormigueo, prurito y aun grietas en el ano, y dolor en la rabadilla; agravacion por la noche y con el calor del verano, y tambien despues de bañarse; alivio con la quietud y al aire libre.

Apis. Hemorroides voluminosas que exhudan una sangre negra, especialmente al hacer de vientre y sin dolores; agravacion por la noche y con el tiempo húmedo; alivio con el calor y durante el dia.

Arsenicum. Tumores hemorroidales con dolores quemantes, son pequeños pero muy dolorosos; la sangre que exhudan es ardiente; calor y agitation con ardor en las venas; demacracion; agravacion por la noche y con el frio; alivio con el calor.

Belladonna. Hemorroides fluyentes con fuertes dolores en los riñones como si fueran á romperse; agravacion con el tacto, por la tarde y por la noche; alivio estando de pié ó acostado.

Capsicum. Si los tumores están muy hinchados con flujo de sangre ó mucosidades sanguinolentas, y dolores quemantes en el ano; tirantez dolorosa en los riñones y espalda, con dolores de vientre y durante las deposiciones; agravacion con el contacto y el frio y al principio del movimiento; alivio con la quietud y el calor.

Corbo veg. Hinchazon voluminosa y azulada de los tumores, con dolores de riñones; estreñimiento de vientre con flujo de sangre por el recto; ardor en las hemorroides y el ano despues de hacer de vientre; flatulencia, inercia en el vientre sin deponer apenas; congestion de sangre en la cabeza, y exhudacion abundante de muco-

sidades por el ano; agravacion por la mañana, al aire libre, aplicando cataplasmas y con la presion; alivio despues de estar acostado.

Chamomilla. Dolores compresivos en el vientre, deseo continuo de hacer de vientre; diarrea á veces quemante y corrosiva; grietas dolorosas y úlceras en el ano, con flujo hemorroidal; agravacion por la noche y acostado; alivio con el calor.

Ignatia. Dolores violentos, profundos en el ano y tumores, prurito y hormigueo, flujo abundante de sangre, y salida del intestino recto al hacer de vientre; deseo frecuente y urgente de defecar con escoriacion y contraccion del recto, y salida nada mas de mucosidades sanguinolentas; agravacion por la noche y mañana, y despues de estar acostado; alivio durmiendo de espaldas.

Muriatis acidum. Medicamento muy importante en esta enfermedad. Tumores hemorroidales hinchados, grandemente inflamados y de un color azulado ó rojizo, dolores de escoriacion, punzadas horribles, insufribles y grande sensibilidad al tacto; agravacion en el reposo y con el tiempo húmedo; alivio con el movimiento; debilidad escesiva con horror al movimiento y deseo de estar hechado constantemente ó sentado, pero los dolores y ardor no lo permiten.

Nux vomica. Personas de vida sedentaria, dadas á las bebidas espirituosas y manjares suculentos; en las mugeres embarazadas y á consecuencia de enfermedades verminosas (de lombrices). — Dolores de magullamiento que no permiten el mas pequeño movimiento; estreñimiento pertinaz de vientre, con deseo sin resultado de deponer, y como si el ano tuviera un tapon ó estuviera cerrado; congestion frecuente en el vientre y cabeza con abultamiento de aquel; cabeza pesada, vértigos, imposibilidad de trabajar mentalmente; flujo de sangre y mucosidades por el ano; hemorroides dolorosas; agravacion por la mañana temprano, con el movimiento y el mas ligero tacto; alivio con el reposo y una fuerte presion.

Pulsatilla. Personas linfáticas, delicadas, sensibles; deposiciones difíciles con congestión de sangre en el ano; hemorroides con gran dolor de ulceración; que sangran fácilmente, con grande prurito, escozor y dolor de escoriación; salen fuera del recto con facilidad; agravación por la tarde al oscurecer hasta las once de la noche, y con el calor; alivio con el frío.

Sulphur. En los mismos casos que *nux v.* y después de este; sobre todo si el estreñimiento alterna con diarrea; sensación de erosión en el ano con prurito y punzadas; congestión frecuente á la cabeza, palpitaciones de corazón; dispepsia, dificultad de orinar; exudación, ardor y salida frecuente de los tumores hemorroidales, con flujo de mucosidades sanguinolentas; agravación por la tarde y noche, con el calor de la cama, con el trabajo y el tacto; alivio con el movimiento y el calor. Después de *sulph.* conviene *calc. c.* en las personas pleóricas, sobre todo si se les ha suprimido el flujo hemorroidal.

En cuanto á las dosis y repetición de los medicamentos, se darán atenuaciones medias y bajas si se quiere obtener un alivio pronto. Si se busca un alivio duradero, es mejor y ventajoso emplear atenuaciones mas elevadas. Pero no se obtendrán resultados favorables, si no se consigue que el enfermo guarde un régimen severo y tenga un género de vida conveniente.

Hernias. (Quebraduras.)

En las hernias estranguladas, con dolores violentos y vómitos, es preciso llamar al médico sin tardanza. En tanto que llega, se darán al enfermo medicamentos que estando bien elegidos, facilitarán la reducción de la hernia.

Los medicamentos principales son:

Aconitum. Si hay fiebre o inflamación del tumor herniario; *belladonna*, si la hernia es muy dolorosa, y si el mas ligero tacto aumenta los dolores.

Nux vomica. Si un enfriamiento, una cólera, una indigestion, han precedido al accidente.

Opium. Si la hernia estrangulada ha causado vómitos cuyo olor es desagradable, cara encarnada y vientre abultado.

Veratrum. Si las estremidades se enfrían y se declara un sudor frío.

Sulphur. Si los vómitos son agrios.

Si la hernia presenta un color malo, si se teme la gangrena y el medico no ha llegado aun, dése *arsen.* alternandolo con *laches.* En los casos graves se dará una dosis cada cuarto de hora ó media hora.

Las hernias de los niños y aun las de los adultos si no son muy antiguas, pueden curarse con los medicamentos. En los casos agudos, en que la hernia es la consecuencia de un esfuerzo, dése *rhus*, y si este no basta, *nux v.* Si la hernia ha salido lentamente, á fuerza de estar derecho, dése: *Cocculus* (Hg.); *sulph. ac.* (B.). ó *aur. f.*; *borax, calc. c., cham., cina, lyc., nux v., op., silic., stann., sulph. y sulph. ac.* (G.).

Las hernias de los niños que salen á consecuencia de llorar demasiado, se curan con *cham.*, y si este no basta, *borax*, y si hay necesidad *aur.* ó *nux v.*

Los síntomas generales indican el medicamento que se ha de elegir. (Véanse: *Sint. car. gen. y Enfermedades de los niños*).

Herpes.

Los medicamentos principales contra las herpes, son: *Ars., calc., clem., con., dulc., graph., merc., rhus, sepia, silic., sulph.*

Graph., lyc., rhus, contra las herpes húmedas;

Rhus, sep. contra las herpes que producen picor;

Ars., calc., silic. contra las herpes escamosas;

Calc., con., graph., lyc., rhus, sulph., contra las herpes con costras.

Sepia, silic. contra las herpes secas.

Herpes zoster ó zona. — (*Fuego de S. Antonio*). — Esta enfermedad rara de la piel produce pequeñas vesículas, que no se hacen notables mas que en ciertas partes de la piel, siendo una inflamacion de caracter erisipelatoso. El liquido que encierran dichas vesículas se seca poco á poco en forma de costras. Se estienden en forma de cinturón sobre una mitad del cuerpo, sucediendo esto generalmente en el pecho. La erupcion va acompañada generalmente de dolores quemantes, de pinchazos, picor y una sensacion como si hubiera escoriaciones.

Los medicamentos principales son: *Graph.*, *rhus*, (*J.*); *merc.* Gerhardt); *ars.*, *puls.*

Herpes anular. — Esta variedad rara de herpe se presenta en forma de anillo, ya por medio de vesículas que se secan pronto formando costras mas ó menos gruesas, ó una sola; ó bien en esta última forma. El medicamento principal para combatir esta herpe, es *sepia*; y si este no basta, consultense: *Calc.*, *caust.* y *sulph.* (Schrön).

Hidropesia.

La hidropesia no es una enfermedad idiopática, es siempre un sintoma ó la consecuencia de otra enfermedad, y con frecuencia de una incurable. Las causas mas frecuentes de la hidropesia general (*anasarca*), son enfermedades del higado, riñones ó corazón. Hé aqui porque no es posible dar en un manual de esta clase todas las indicaciones necesarias para el tratamiento de esta enfermedad, porque es preciso ante todo investigar la causa ocasional.

Ademas de la hidropesia general y la ascitis (que ordinariamente se llama simplemente hidropesia), hay tambien acúmulo de agua en otras cavidades ú órganos; como por ejemplo: la hidropesia del cerebro (*hidrocéfalo*), la del pecho (*hidrotorax*), la del pericardio (*hidropericardias*), la de los ovarios, etc.

No podemos suministrar por lo tanto mas que ligeras indicaciones :

La hidropesia aguda del cerebro exige principalmente: *Apis*, y si no basta, *helleb.*: ó *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *sulph.* La hidropesia crónica: *Calc. c.*, *phosphorica*; ó *Ars.*, *helleb.*, *sulph.*

La hidropesia del pecho: *Bry.*, *sulph.*; y en los casos crónicos é inveterados: *Ars.*, *carb. v.*, *dig.*, *squilla*.

Si la ascitis y la hidropesia general han sido precedidas de pérdidas de sangre ó enfermedades debilitantes, déñse sobre todo: *Apis.*, *ars.*, *bry.*, *colch.*, *dig.*, *helleb.*, *sulph.*; ó tambien: *Bell.*, *calc.*, *con.*, *dulc.*, *merc.*, *rhus.*, *scilla*, *sepia*.

El procedimiento menos recomendable es la puncion.

En los casos de hidropesia producidos por la retro-pulsion del sarampion, escarlatina, etc., véanse estos capitulos.

Hierro.

En las intoxicaciones graves producidas por el abuso del hierro como remedio alopático, conviene tomar tazas de té negro, para contrarrestar los sintomas mas culminantes. Para combatir los variados sintomas de la intoxicacion, tres son los principales medicamentos: *China*, *hepar* y *puls.* que sirven tambien para tratar los malos efectos del abuso de las aguas minerales ferruginosas. Debe empezarse el tratamiento por *hepar* ó *puls.*, y luego acudir á *china* si ninguno de los dos bastase.

Si ninguno de los tres fuese suficiente, consultense: *Arn.*, *ars.*, *bell.*, *ipee.*, *merc.*, *veratr.*

En las intoxicaciones graves es conveniente que el enfermo viva en el campo para conseguir mas pronto su curacion, pues en las ciudades se prolonga mas la intoxicacion férrica.

Hígado.

No hablaremos detenidamente de las enfermedades del hígado, porque las personas que no son médicas, no pueden diagnosticarlas y apreciarlas justamente. Hé aquí las indicaciones principales:

En la inflamación aguda (*hepatitis aguda*), están indicados: *Acon.*, *bell.*, *merc.*, *nux v.*; ó bien: *Bry.*, *cham.*, *lach.*, *sulph.*

En la inflamación crónica (*hepatitis crónica, infarto*): *Calc.*, *lach.*, *lyc.*, *merc.*, *nux v.*, *sep.*, *sulph.* Si es producida por el abuso de la quinina: *Ars.*, *calc.*, *ferr.*, *lach.*

Contra los cálculos biliares (*cólicos biliosos*), china es el principal medicamento y si este no basta, *bell.*, *podoph.*, *sulph.*

Hipo.

El hipo es un sintoma molesto ya sea idiopático, ya sintomático de una enfermedad mas ó menos grave. Aquí no trataremos mas que del primero, pues el segundo relacionado con la enfermedad que lo produce, cae bajo el tratamiento especial de esta.

Las causas del primero, pueden ser un susto, una risa excesiva, un enfriamiento, etc., y es á veces tan molesto y repetido, que rinde á la persona que lo padece, haciendola arrojar todo cuanto tiene en el estómago, y no permitiendola tomar alimento alguno, ni aun agua.

Los medicamentos principales para combatirlo, son: *Hyosc.* en primer lugar, y si este no basta, *nux v.* Si con estos no desaparece, consultense: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *ign.*, *magn. m.*, *puls.*, *stram.*, *zinc.*

Si es espasmódico, dése: *Bell.*, *nux v.*, *stram.* — Violento: *Hyosc.*, *nux v.*, *stram.* —

Si se presenta ó agrava despues de beber: *Ign.*, *puls.* — Despues de las comidas: *Cyclam.*, *hyosc.*, *merc.*, *zinc.* — Durante las comidas: *Magn. m.*, *merc.*,

teucrium. — Con el movimiento: *Carb. v.* — A la noche: *Ars.* — Por la tarde: *Puls., silic.* — Despues de fumar: *Antim. cr., ign., puls.* —

Si va acompañado de dolor de estómago: *Magn. m.* — De dolor en el pecho: *Ammon. m.* — De sudor: *Bell.* — De convulsiones: *Bell., stram.* — De golpes en la boca del estomago: *Teucrium.* — De acúmulo de agua en la boca: *Lobel.* — De sofocacion: *Pulsat.* — De desesperacion: *Agnus, hyosc.*

Hipocondria.

La hipocondria es una enfermedad del sexo masculino, en la que el enfermo piensa continuamente en sus sufrimientos, y experimenta ó cree experimentar los dolores mas violentos y mas estraños; sin que el médico pueda, ni aun con la inspeccion mas escrupulosa, encontrar alteracion alguna correspondiente á los órganos de que se queja. El Dr. Bähr llama con razon á la hipocondria „un egoismo enfermizo“.

Cuando la hipocondria proviene de excesos sexuales, pérdidas de sangre y otras causas debilitantes, los principales medicamentos, son: *Calc., china, nux v., sulph.;* ó *anacar, con., natr. m., phos. ac., sepia, staph.*

Si proviene de desórdenes en los órganos del vientre, de una vida sedentaria, ó de trabajos intelectuales excesivos: *Nux v., sulph.;* ó bien: *Aur., calc. lach., natr., y silic.*

Los medicamentos principales en general contra esta enfermedad tan difícil de curar, son:

Nux vómica y *sulph.*: cuando la causa es una plétora abdominal, ó una disposicion á las almorranas.

Staphisagria: Si la hipocondria resulta del onanismo.

Conium. Si resulta del onanismo y de una abstinencia demasiado prolongada, estando muy escitados los deseos sexuales.

Se han recomendado ademas: *Natr. m., phos., stann.* (Bähr y Hartmann).

Para combatir el estreñimiento de vientre, se han recomendado las lavativas de agua fria; además, un régimen apropiado al enfermo, el movimiento, la gimnasia de sala, y la hidroterapia (*Comp.: Histérico y Hemorroides*).

Histérico.

El histérico es una enfermedad del sistema nervioso que padecen las mugeres. Tiene analogía con la hipocondria. Se desenvuelve despues de la pubertad, y debe tener su origen en los órganos genitales (matriz y ovarios). Los sintomas histéricos son mas variables aun que los de la hipocondria, y tienen por lo tanto un caracter semejante. El tratamiento es sintomático, le sirven de guia las indicaciones del momento, suministradas por las sensaciones morbosas ó por las funciones desarregladas. Es muy difícil una curacion radical, solo es posible cuando el médico egerce una gran influencia moral sobre la enferma.

Los principales medicamentos para combatir el histerismo, son *Con., ign., nux m. plat., sep., valer.*

Las principales indicaciones que vamos á trascribir, son tomadas de la obra del profesor Guernsey sobre las enfermedades de las mugeres y niños. Este médico distinguido que se dedica especialmente á las enfermedades de las mugeres, se ha servido solo de los medicamentos homeopáticos en su larga práctica de mas de 25 años; puede, pues, considerársele como una autoridad en esta materia. En el tratamiento de esta enfermedad ha prestado siempre una gran atencion á las particularidades constitucionales de los enfermos; asi es que las siguientes indicaciones no solo son de un gran valor en el tratamiento del histérico (y enfermedades semejantes), sino tambien en el tratamiento de todas las enfermedades en que se encuentren estos sintomas.

Aconitum. Miedo de estar en sociedad (de pasar por las calles frecuentadas, por las plazas públicas, etc.)

— Vértigo cuando se levanta despues de estar acostada.
— Temor de morir, predicion del dia en que ha de morir (Acon debe administrarse á alta potencia, y no repetirse á menos que la enfermedad se agrave de nuevo).

Arsenicum. Una emocion cualquiera provoca un acceso de asma histérico. — Agravacion por la noche, sobre todo despues de media noche. — La enferma no puede acostarse solo por el temor de sofocarse. — Gran miedo á morir. La enferma quiere beber á cada momento, pero no bebe de cada vez mas que muy poco.

Asa fetida. Toda escitacion suscita sintomas histéricos en la faringe (globo histérico); sequedad y dolores urentes en el esófago, la enferma tiene una sensacion como si fuera un bocado de la comida que tiene que tragar. — Estos sintomas van comunmente seguidos de una respiracion dificil, de una sensacion de escoriacion y pinchazos dolorosos, que van desde el pecho al esófago.

Aurun met. La enferma tiene siempre la idea de suicidarse. — Palpitaciones de corazon con deseo de suicidarse. —

Belladonna. Acúmulo de sangre en la cabeza, con cara y ojos encarnados. — Mirada feroz. — Palpitaciones dolorosas en la cabeza, sobre todo encima de de los ojos. — Gemidos dia y noche: insomnio. — Desesperacion. — La enferma está dias casi enteros en el mismo sitio, y rompe agujas. — Soñolencia sin poder dormir.

Calcarea carbonica. — Conviene á las personas histéricas y de un temperamento llamado leucofegmático. — La boca del estómago está combada. — Vértigo al subir una escalera. — La enferma tiene facilmente frio, sus pies están frios y húmedos, aun por la noche. — Desde las tres de la mañana ya no puede dormir mas. —

Causticum. Parálisis de los parpados superiores que caen sobre los ojos; á la enferma la cuesta mucho

tenerlos abiertos. — Almorranas estremadamente dolorosas al andar.

Chamomilla. La enferma es inclinada á reñir y obstinarse: tiene gran trabajo en responder convenientemente á las preguntas que se la dirigen.

Cocculus. Sensacion de apretamiento en la parte superior de la garganta. — Respiracion oprimida y tos con cosquilleo. — Menstruacion atrasada que produce tan grande abatimiento de fuerzas, que la enferma no puede casi hablar. — Nauseas hasta el desvanecimiento. — Zumbidos y ruidos en los oidos.

Coffea. Irritabilidad general y sobreescitacion violenta. — Dolor de cabeza, como si se metiera un clavo en el cerebro, y como si estuviera dislacerado ó magullado.

Conium. *Vértigo, sobre todo si la enferma está acostada,* de modo que no puede volverse en la cama sin ser acometida de vértigo. — *De tiempo en tiempo se suprime la orina repentinamente; no vuelve á salir sino despues de algunos momentos.* — *La menstruacion va precedida de un infarto doloroso de los pechos, de vértigos, y de agravacion de todos los sintomas histéricos.* — Estreñimiento de vientre, con deseo continuo de deponer. — Globo histérico.

Hyoscyamus. — Calambres y convulsiones que no se diferencian de la epilepsia, mas que por la irregularidad de sus accesos. — La enferma se hace lasciva y se descubre con placer. — Risas estupidas y maneras ridiculas.

Ignatia. Angustia con opresion de pecho, obligando á la enferma á gritar pidiendo socorro. — Deglucion dificil. — Los accesos espasmódicos van seguidos de suspiros profundos. — La enferma sequeja mucho de una *sensacion de vacio en el estómago, gime frecuentemente,* y se abandona á la desesperacion, como si tuviera una pena oculta. — La alegria degenera frecuentemente en una gran desolacion. — Penas profundas. — La enferma se asusta facilmente.

Jodium. Sensacion estraña de debilidad y falta de aliento al subir una escalera. Flujo blanco que atiesa la ropa.

Lachesis. Sensacion como si una bola subiese á la garganta; esta sensacion, aunque desagradable, la soporta facilmente la enferma, pero no soporta por el contrario presion alguna exterior sobre el cuello; ademas cree que se va á ahogar. — No puede sufrir presion en el pecho, vientre y caderas; cree aliviarse aflojándose los vestidos. — Al despertar, aumentan los sintomas y el mal humor; la enferma está entonces como falta de aliento. —

Lycopodium. Sensacion continua de saciedad; asi es que la enferma rehusa toda clase de alimentos, porque á cada bocado está, como suele decirse, lle na hasta el cuello. — Dolores cólicos que van de derecha á izquierda. — Ruidos de gases, sobre todo á la izquierda y debajo de las costillas. — Sedimento encarnado en las orinas. — Agravacion de los sintomas por la tarde (desde las 4 las 8). — Emision frecuente y abundante de una orina pálida, sobre todo por la noche.

Magnesia muriatica. Medicamento muy importante en el histerismo. — Accesos frecuentes de calambres, dia y noche, con grande insomnio. — Estreñimiento de vientre; evacuacion dificil de una gran cantidad de materias fecales que se parten en pedazos al salir del ano. — Accesos de desfallecimiento en la mesa: las náuseas y el temblor se alivian eructando.

Moschus. La enferma niñe é insulta continuamente á los que la rodean, hasta que por fin cae sin conocimiento. — Teme la muerte y no hace mas que hablar de ella. — Accesos frecuentes de desfallecimiento. — Gran deseo de cerveza y aguardiente. — Opresion de pecho.

Natrum muriaticum. — Conviene sobre todo á las personas cuya menstruacion se va alargando siempre y es menos abundante de cada vez. — Dolor de cabeza violento por la mañana al despertar. — Sueños agitados por la noche, sueño ligero; la enferma sueña con ladrones, y no se queda tranquila hasta que se ha registrado

la casa de arriba abajo. — Sonambulismo. — Deseo continuo de comer sal; grande repugnancia al pan. — Todos los sintomas disminuyen desde que la enferma transpira. — Gran debilidad y sed. — Grande inclinacion á llorar.

Nux moschata. La enferma pasa súbitamente de la seriedad á la alegría; rie facilmente, y se pone como hinchada despues de las comidas. — Flujo blanco en lugar de la menstruacion. — Boca y lengua secas despues de dormir (pero sin sed).

Nux vomica. La enferma no puede ordinariamente dormir desde las tres de la mañana; despues de las cinco de la mañana se vuelve á dormir y duerme una gran parte de la mañana. — Está peor por la mañana. — Estreñimiento de vientre; deposiciones dificiles pero abundantes.

Phosphorus. Conviene principalmente á las personas delgadas, esbeltas. — Las materias fecales son largas, delgadas, secas y duras; su evacuacion es dificil. — La enferma tiene una sensacion continua de debilidad en el vientre, lo que aumenta y agrava mas aun los demas sintomas. — Soñolencia y fuertes eructos de aire despues de comer. — Deseos sexuales fuertemente excitados.

Platina. Presuncion y desprecio de los demas. — Fuertes dolores espasmódicos en la raiz de la nariz. — Un cosquilleo singular sube de las partes genitales al vientre. — Desposiciones dificiles que se pegan al ano como la arcilla. — Calambres acompañados de gritos. — Menstruacion escesivamente abundante, de una sangre cocura y espesa. — La enferma tiene escalofrios y falta completa de sed; esto se alivia al aire libre.

Pulsatilla. Grande variacion en los sintomas. — La enferma rie y llora facilmente. — Puede sentirse muy enferma, una hora despues de haberse creído muy bien. — Es tímida y perezosa, pero dulce, buena y facil de tratar. — A veces está silenciosa y melancólica. — Tiene

mal gusto de boca, sobre todo por la mañana; ó bien el gusto le falta de tal modo, que no tiene deseo de nada.

Sabina. La enferma está nerviosa é histérica; cuando está embarazada aborta casi siempre despues del tercer mes. *Sab.* puede evitar el aborto, y si la enferma la toma con frecuencia, puede conseguir una curacion completa.

Sepia. Dolores de estómago que suben hasta el cuello; la lengua se pone rigida, la enferma se queda muda y rigida como una estatua. — Sensacion de vauidad en el estómago. — Orina de un olor nauseabundo, contiene una materia semejante á la arcilla que se pega fuertemente á la vasija. — Manos y pies frios. — Debilidad súbita, acompañada de grande transpiracion. — La enferma está en la plenitud de su conocimiento, pero no puede hablar ni moverse. — Tiene accesos de risas ó llantos involuntarios. — Sensacion de frio en las espaldas, seguido de convulsiones en el lado derecho del cuerpo, y de una respiracion dificil.

Stannum. La enferma experimenta una fuerte debilidad cuando baja una escalera, pero puede subirla sin dificultad. — Se sienta con dificultad y se deja caer pesadamente en la silla; pero se levanta facilmente. — Cuando lee ó habla en alta voz, se siente enseguida sin fuerzas. — Los sintomas aumentan poco á poco y disminuyen lo mismo.

Staphysagria. La enferma es muy susceptible; la menor palabra inconveniente la hiere profundamente; se incomoda, se indigna, tira todo cuanto tiene en las manos. — Los dientes buenos y malos son muy sensibles al contacto de los alimentos y bebidas.

Stramonium. La enferma se abandona á toda clase de caprichos estravagantes y absurdos. — Es muy timida y se asusta al aspecto de los objetos mas ordinarios que mira fijamente. — Gran aflujo de palabras. — La enferma gusta de la sociedad y el dia. — Su cara está abotagada por congestiones sanguineas.

Sulphur. Los accesos espasmódicos van seguidos de

una sensacion de bienestar; todo la parece bien. — Despues de los accesos deja fluir una agua clara y abundante. — Experimenta llamaradas de calor repentinas; su frente esta caliente, los pies mojados; el hambre es tan urgente que no puede esperar hasta la hora de comer.

Valeriana. Sensacion como si alguna cosa caliente subiese al cuello; la respiracion es entrecortada y la garganta experimenta un cosquilleo seguido de tos. — Sensacion como si un hilo cólgase de la faringe en el esófago. — Timidez, sensacion de temblor, palpitaciones de corazon.

Veratrum. *Sudor frio* por todo el cuerpo, principalmente en la frente. — Pulso debil; se cuentan dificilmente las pulsaciones.

Viola odorata. La enferma llora mucho y no sabe porque. — Sufrimientos en el pecho con respiracion dificil, angustia y palpitaciones de corazon.

Zincum. Grande agitacion en los pies y piernas, obligando á la enferma á moverlas continuamente.

Huesos.

Las enfermedades de los huesos son casi siempre la consecuencia de una discrasia, como sucede con la inflamacion de las rodillas. Una de las enfermedades mas frecuentes de los huesos es el *raquitismo*. Proviene de una nutricion insuficiente de los huesos, que se ponen blandos y frágiles. Los medicamentos principales contra esta enfermedad, son: *Calcareo carbonica* ó *phosphorica*, y segun Raue, tambien *oleum jecoris* (aceyte de higado de bacalao), de la que se trituran algunas gotas con azucar de leche, dándose de esta trituracion una dosis por las mañanas, en la cantidad de lo que puede contener la punta de un cuchillo, y una hora antes del desayuno.

Si la enfermedad ha sido precedida del abuso del mercurio, déense: *Asa.*, *aur.*, *hepar*, *iod.*, *sulph.* (R.).

Las indicaciones siguientes contra el *raquitismo*, *supuración*, *inflamación*, etc. de los huesos, son debidas á Raue y otros autores.

Angusturá. Caries sobre todo de los huesos largos, y en los sugetos que han abusado del café.

Asa fetida. Inflamación de los huesos (*osteitis*), ó caries en los niños escrofulosos, y despues del abuso del mercurio: exóstosis, caries y necrosis especialmente de los huesos de las piernas y brazos; *reblandecimiento* de los huesos.

Aurum. Caries de los huesos de la nariz, úlceras en la bóveda del paladar (cielo de la boca), exóstosis y otros enfermedades de los huesos cortos; abaso del mercurio.

Calcareá carbonica. ó mejor *phosphorica* segun algunos. Formación incompleta de los huesos, sobre todo si despues de fracturas la formación de la nueva sustancia ósea avanza con lentitud. Desviación de la columna vertebral y torcedura de los huesos largos de las extremidades, sobre todo de las piernas; hinchazon de las articulaciones; reblandecimiento de los huesos; cabeza muy voluminosa en los niños con fontanelas tardías en cerrarse; exóstosis y caries en los brazos y piernas.

China. Caries con supuración abundante.

Dulcamara. Exóstosis con úlceras en los brazos, por consecuencia de una sarna repercutida.

Fluorí ac. Caries á consecuencia de la sífilis ó del abuso del mercurio. — Caries de los huesos temporales (sienes).

Lycopodium. Exóstosis, osteitis y caries en los sugetos escrofulosos.

Oleum jecoris aselli. Enfermedades de los huesos en los niños escrofulosos, sobre todo cuando se afectan las extremidades de los mismos, con úlceras fistulosas de bordes elevados y que sangran facilmente, y segregan un pus de olor desagradable.

Mercurius. Osteitis y caries, con dolores en los

huesos como si rompieran la parte enferma. Dolores osteocopos.

Mezereum. Exostosis en los brazos y piernas de los sujetos escrofulosos.

Nitri acidum. Enfermedades de los huesos á consecuencia de las sífilis ó del abuso del mercurio.

Phosphorus. Exostosis en el cráneo con dolores violentos, penetrantes, que aumentan por la noche. Hinchazon de las clavículas.

Phosphori acidum. Osteitis ó dolores despues de una lesion del periostio, como si se raspasen los huesos con un cuchillo.

Pulsatilla. Desviacion de la columna vertebral, con fontanelas abiertas en los niños.

Ruta. Periostitis (inflamacion del periostio) á consecuencia de lesiones mecánicas.

Sepia. Exostosis y caries en las piernas y brazos, sobre todo en las mugeres que han parido mucho y en las herpéticas.

Silicea. Medicamento de los mas importantes en todas las enfermedades de los huesos, sobre todo cuando hay fistulas que segregan un pus seroso que contiene esquirlas (pedazos de hueso). Exostosis, caries, necrosis, supuraciones crónicas inagotables, fontanelas tardas en osificarse, etc.

Staphysagria. Recomendada especialmente contra la osteitis de las falanges de los dedos.

Sulphur. Enfermedades de los huesos á consecuencia de una sarna mal curada, otras erupciones y abuso del mercurio. Desviacion, reblandecimiento, hinchazon, caries y otras afecciones de los huesos. Se da en la mayoria de los casos al principio del tratamiento; luego *calc.*, y despues *silic.*; volviendo si hay necesidad á *sulph.* despues de *silic.*, y asi sucesivamente.

NB. Se prefieren las atenuaciones elevadas á las dosis fuertes y frecuentes, disolviéndolas en agua, y administrandolas mañana y tarde por cucharadas, y observando reposos bastante largos.

Ictericia.

Si la ictericia se declara á consecuencia de una cólera: *Cham.*; ó: *Acon. nux v.*, y en caso de necesidad *lach.* y *sulph.*

A consecuencia de un susto: *Op.*, ó *Acon.*, *merc.*

Por el abuso de la quinina: *Merc.* ó *bell.*, *calc.*, *nux v.*

Por el abuso del mercurio: *China*, ó *hep.*, *lach.*, *sulph.*

Por el uso del ruibarbo en dosis alopáticas: *Cham.*, ó *merc.*

Por el uso de frutas verdes con diarrea blanquiza: *Rheum*:

Por el uso de huevos, ó si la amarillez de la piel se presentó en otoño: *Nitri ac.*

En los casos crónicos, dése:

Lyc. cuando los pies están hinchados.

Sep. cuando la lengua está cubierta de una gruesa capa blanca; el enfermo está sin apetito y tiene fiebre lenta (Hg.).

Lach., *sulph.* si accesos de cólera han producido frecuentes recaídas (Hg.)

En la ictericia ordinaria (que proviene de un catarro de la parte de los intestinos llamada duodeno), el mejor medicamento es *mercurius*, que curará casi siempre la enfermedad, si es que el enfermo no ha abusado de él. En este caso debe sustituirse por *china*, y si este no basta, *lach.* ó *hep.* Cuando el enfermo no ha abusado del mercurio, debe darse *merc.* con insistencia, y si al cabo de cuatro ó seis dias no se notase alivio alguno, sustituyase por *china*. Si *merc.* hace desaparecer casi la enfermedad, y quedan restos de ella, dése *china*, y si no basta, *lach.*, ó *hepar* y *sulph.*

Disuélvase los medicamentos en agua, y dése una cucharada tres ó cuatro veces al día, hasta que la orina se ponga clara y los excrementos empiecen á tomar color; en este caso se darán las cucharadas á intervalos mas largos.

Insectos venenosos.

Contra el envenenamiento ó inflamaciones mas ó menos graves que suelen presentarse á consecuencia de las picaduras de los insectos venenosos, se emplean los mismos medios que contra el envenenamiento por las cantáridas (Véase: *Cantaridas*), aplicandolos á la parte picada é inflamada.

Los medicamentos principales para combatir los sufrimientos producidos por las picaduras de los insectos venenosos, son: *Acon.* cuando hay sintomas febriles, y luego *Arníc.*, y *bell.* ó *merc.*, despues de *arnic.* Cuando no haya fiebre debe empezarse por *arnic.*

En los casos de picaduras en sitios muy sensibles y delicados del cuerpo, seguidas de inflamación y fiebre, es preciso dar inmediatamente *camph.*, y hacer respirar á la vez su tintura fuerte, y si esto no bastase, dése *acon.* para evitar las consecuencias que suelen sobrevenir si no se acude á tiempo.

En las inflamaciones que sobrevienen á consecuencia de las picaduras de las abejas, el medicamento específico por decirlo así es *lachesis*, que se debe repetir con frecuencia. Si hay fiebre dése antes *acon.* Si *lach.* no bastase, se dará *bell.*, y si hay necesidad, *merc.*

En las picaduras de los ojos causadas por arañas y otros insectos, se empleará *acon.* si hay fiebre, y si no la hay, el medicamento mejor es *arn.*, que se repetirá con frecuencia, poniendo á la vez paños mojados en agua de *arnica* en el lado afecto, que se remudaran tan pronto como se sequen. Si *arn.* no bastase, acudase á *Bell.*, *merc.*, *puls.* y *sulph ac.*

Contra las inflamaciones á veces bastante serias que producen los pelos de ciertas orugas, cuando se introducen en la piel, lo mejor es aplicar compresas empapadas en tintura de alcanfor no muy concentrada, administrando á la vez *camph.*; si este no bastase dese *arn.* ó *rhus.*

Insomnio.

El insomnio no es en todos los casos mas que un sintoma de otra enfermedad, qu es preciso curar para conseguir la vuelta del sueño. Sin embargo, es el insomnio un sintoma tan culminante y molesto casi siempre, que es preciso elegir un medicamento para quitarlo. En la eleccion de los medicamentos es preciso siempre investigar la causa del insomnio, si es posible.

Aconitum. Despues de un susto. — Insomnio causado por una angustia, ó por el calor, con agitacion, ó con sueño lleno de sobresaltos.

Belladonna. Soñolencia sin poder dormir. — No se puede dormir á causa de visiones que asustan y cosas imaginarias.

Chamomilla. Cólicos, sobre todo en los niños.

Coffea. Despues de una excitacion, alegria escesiva (sobre todo en los niños). — Despues de haber tomado té.

Hyoscyamus. Insomnio por sobreexcitacion nerviosa, sobre todo á consecuencia de enfermedades graves, ó en personas sensibles é irritables.

Ignatia. Despues de una inquietud de ánimo, de una pena. — Despues de haber tomado té.

Moschus. Insomnio por sobreexcitacion nerviosa, en las personas histéricas é hipocondriacas.

Nux vómica. Despues del abuso del café, de haber bebido mucho, de trabajos intelectuales. — Insomnio desde antes de amanecer (*Calc.*). Gran affluencia de ideas por la noche que quitan el sueño.

Opium. Despues de un susto, por miedo, en los viejos; cuando al enfermo se le presentan toda clase de apariciones que le impiden dormir.

Pulsatilla. Cuando se ha comido demasiado; affluencia de ideas, que impiden dormir; parece que la sangre hierve en las venas, calor con ansiedad y ácumulo de sangre en la cabeza.

Sulphur. Despues de grandes emociones, despues de haber perdido personas amigas, etc.; si no se ha podido dormir hace varias noches. (Hg).

Thuja. Medicamento eficaz con frecuencia en los insomnios crónicos, cuya causa no es posible encontrar.

No se dará mas que una dosis de cualquiera de los medicamentos anteriores, antes de acostarse; no se repetirá, á no ser que despues de varias horas no se haya podido dormir aun el enfermo.

En muchos casos el insomnio es la consecuencia de una enfermedad crónica, y hemos advertido que las enfermedades de los riñones son su causa mas frecuente. Va entonces acompañado de una gran agitacion de las piernas. Los medicamentos indicados para las enfermedades de los riñones, producen un gran alivio en el sintoma insomnio; pero no podemos hablar mas de este punto, porque nos llevaria demasiado lejos.

Intestinos.

Enteritis. — *Inflamacion de los intestinos.* — El mejor medicamento contra la inflamacion de los intestinos, caracterizada por fuertes dolores de vientre, elevacion de este, vómitos, náuseas, sed, fiebre, etc., es *acon.*, administrado por cucharadas cada 3 ó 4 horas, el cual disminuirá mucho los sintomas y dominará la enfermedad, y luego *bell. ó bry.*, y si estos no bastan, *lach.*, *merc.*, *nux v.*, *sulph.*, acabarán de curar la enfermedad.

Estrangulacion de los intestinos. — (*Cólico miserere* — *Volvulo.*) — Esta enfermedad, causada por el enchufamiento de un asa intestinal en otra, ó sea su estrangulacion, se caracteriza por vómitos de excrementos y aun de orina, hipo, frio, sudores frios y sed inextinguible. Es preciso llamar inmediatamente un médico homeópata, y mientras llega, ó si no lo hubiera en la localidad, elijase entre los medicamentos siguientes: *Op.* se dará en primer lugar; y si al cabo de algunas horas no hubiese

alivio, dése *plumb.* Si estos dos medicamentos no consiguiesen la curacion, empléense: *Acon.* si hay gran fiebre, sed, cara encarnada, agitacion angustia y miedo á la muerte; *Veratr.*, vómitos con sudores frios, frio de las extremidades y de la lengua: *Bellad.* en los mismos casos que *veratr.* y despues de este, si no ha producido efecto alguno, y hay ademas sintomas nerviosos; *Sulph.* cuando los vómitos son agrios, ácidos, insoportables por este concepto; *Nux v.* cuando los vómitos son biliosos, menos violentos, pero la respiracion es dificil, y cuando la causa ha sido un enfriamiento, una contrariedad, una cólera; *Lach.* cuando hay sintomas de gangrena, con ansiedad estrema, pulso debil, imperceptible; y *ars.* despues de *lach.* cuando este no contiene el curso de la gangrena, frio general, sed intensa, lengua fria, cara descompuesta y ojos hundidos.

Iodo.

Los medios mejores para combatir los casos graves de intoxicacion por el iodo, son: el agua de almidon, la cola de almidon, la harina de trigo candeal y las bebidas mucilaginosas.

Contra los sufrimientos consecutivos el mejor medicamento es *bell.*, que se dará con frecuencia, y si no bastase, dése *hepar*, y si hay necesidad *phos.* En los casos rebeldes consúltense: *Ars.*, *china*, *coff.*, *spong.*, *sulph.*

Para combatir los sintomas producidos por las dosis alopáticas del ioduro de potasio, y abuso excesivo de este medicamento, el mejor medicamento es *hepar*, que se tomará con frecuencia. Si no fuera suficiente, déense: *Bell.*, *merc.*, *phos.*, *spong.* y *sulph.*

Jaqueca.

(*Hemicránea.*)

Véase: *Dolores de cabeza.*

Lamparones y Muermo.

Los caballos, asnos y mulas, y á veces los gatos y los perros y otros animales, padecen una enfermedad virulenta en ocasiones; enfermedad que nace en ellos espontáneamente ó bien se trasmite de unos á otros, y se distingue por erupciones en la piel y membranas mucosas de las vías respiratorias, exudaciones específicas y colecciones de pus en el tegido celular, los vasos linfáticos y músculos. Esta enfermedad se llama *muermo* cuando se asienta en las vías respiratorias, y *lamparones* cuando ataca al tegido celular y muscular y á los vasos linfáticos, produciendo úlceras, abscesos de pus, tumores con costras y supurantes. Esta enfermedad se trasmite al hombre, ya por inoculación, ó por infección. Se trasmite por inoculación, cuando una parte cualquiera del cuerpo desprovista de su epidermis, se pone en contacto con alguna de las materias tóxicas que arroja el animal lámparo-muermoso, sobre todo las que arroja por las narices, úlceras y ampollas. Se trasmite por infección viviendo y cuidando á animales muermosos ó con lamparones.

Es una enfermedad que hay que tratar bien y con cuidado desde el principio, porque se complica frecuentemente, invade continuamente nuevos tegidos, y el marasmo y la fiebre lenta concluyen con las fuerzas y la vida del enfermo en los casos crónicos; pues en los agudos suelen morir los enfermos á la tercera semana, segun los casos, ó mas tarde, por un estado tifoideo.

Contra los diversos accidentes producidos por la trasmisión del muermo y lamparones, empléese de preferencia *phos. ac.* al principio; y *ars. si phos. ac.* no corrige pronto los sintomas. Despues de haber tomado ambos medicamentos, y cuando no corrijan ó degen restos de la enfermedad, puede darse *sulph.*, y mas tarde *Calc. Merc.* conviene en los casos agudos y aun en los crónicos de inflamación de los vasos linfáticos,

tumores costrosos, úlceras y supuraciones, y despues de el convendra *silic.*

Conviene ademas que el enfermo ocupe una habitacion ventilada, se mude con frecuencia la ropa asi como la de la cama, y use una alimentacion sana y en la cantidad que aconsege su estado general.

Laringe.

Catarro laringeo. — Vease: *Bronquitis.*

Laringitis aguda. — (*Inflamacion aguda dela laringe.* — *Angina laringea.*) — Para la inflamacion aguda de la laringe, con fiebre, tos bronca, ronquera, dolor en el cuello y laringe, dificultad de respirar, etc., el mejor medicamento es *acon.* que se dará con frecuencia hasta que los sintomas febriles hayan disminuido. Entonces se reemplazará por *bry.*, que por lo general concluye con la enfermedad. En los casos que asi no suceda, dése *hepar* ó *spongia.* *Hepar* cuando hay estertor mucoso, tos húmeda, frecuente, que resuena en la cabeza, con dolores en las sienes al toser y dificultad de respirar por la mucha cantidad de mucosidades que hay en la laringe y bronquios. *Spongia* cuando existe tos bronca, seca, ronquera, expectoracion nula ó muy escasa; respiracion lenta, difcil, sequedad en la laringe y accesos de sofocacion.

Para los sintomas que á veces suelen quedar despues de concluida la laringitis, como son, entre otros, la ronquera y la tos, los medicamentos mejores son: *Carb. v.*, *dros.*, *hepar*, *phos.*

Laringitis crónica y Tisis laringea. — Los principales medicamentos contra estas enfermedades son: *Ars.*, *carb. v.*, *caust.*, *hep.*, *iod.*, *phos.* En segundo lugar: *Calc.*, *cist.*, *dros.*, *kreos.*, *led.*, *mang.*, *merc.*, *nitri ac.*, *sulph.*

Si dependen de una afeccion sifilitica: *Merc.*, *nitri ac.*, *sulph.*; ó *aur.*, *iod.*, *spong.*

De una erupcion herpética de las extremidades su-

periores, cara ó cabeza, repercutida: *Nitri ac.* en primer lugar; y en segundo, *caust.*, *phos.*

De vegetaciones en las mismas regiones, tratadas con cáusticos ó cortadas. *Caust.*, *lyc.*, *staph.*, *thuja.*

Lengua.

Aspecto, color, cubierta, etc. de la lengua. — Tomamos las indicaciones características siguientes, del tratado de patología y terapéutica del Dr. Raue.

Belladonna, tart. em. — Lengua completamente roja, con papilas muy elevadas.

Kali bichromicum, lach. — Lengua de un rojo brillante.

Rhus tox. La lengua tiene en su punta una rubicundez en forma de triángulo.

Sulphur. Punta de la lengua encarnada (mal circunscrita), con bordes rojos.

Arsenicum. Lengua de color de plomo.

Digitalis, ars., mur ac. Lengua azulada.

Rhus tox. Capa blanca en un lado de la lengua.

Causticum. Capa blanca en los dos lados.

Phosphorus, bry. Capa blanca solo en medio de la lengua.

Sepia. Lengua fuertemente cargada, solo en su raiz.

Arsenicum, lach., natr. m., nitri ac. Capa en forma de manchas circunscritas.

Lach., rhus t., sulph., kali bich. Lengua seca, roja y agrietada en su extremidad.

Bry., puls. Lengua seca, sin sed.

Mercurius, rhus, stram. Lengua hinchada, con la señal de los dientes.

Ipecacuanha, cina, dig. Lengua limpia, con sufrimientos gástricos.

Lachesis. Temblor de la lengua, no se puede sacar (fiebre tifoidea).

Lycopodium. Lengua pesada, temblorosa, con mandíbula inferior pendiente; ó bien el enfermo recoge la lengua rápida é involuntariamente y la hecha á un lado y á otro (fiebre tifoidea).

Inflamacion de la lengua. — (*Glositis*). — Los mejores medicamentos son: *Acon.*, *apis*, *arn.*, *ars.*, *bell.*, *lach.*, *merc.* Si la inflamacion es escesivamente voluminosa y hay induraciones, *bell.* y *merc.* son los medicamentos que se deben dar despues de *acon.*

Ademas, de *acon.*, *bell.* y *merc.* que serán suficientes en la mayoría de los casos, tómense en consideracion los medicamentos siguientes:

Arnica. Despues de una lesion.

Apis. Si hay vesiculas pequeñas en los bordes de la lengua, ó sensacion como si estuviera cocida, ó dolores quemantes y lancinantes.

Arsenicum y *lachesis.* En los casos graves en que haya sintomas de gangrena.

Lesiones de la lengua. — *Arn.*, *bell.*, *merc.* ó *phos. ac.* son los mejores medicamentos contra las lesiones mecánicas de la lengua, producidas por haberla mordido, por picaduras de insectos etc. En algunos casos cuando sobreviene fiebre, hay que dar *acon.*

Parálisis de la lengua. — *Baryt. c.*, *bell.*, *hyosc.*, — ó: *Caut.*, *cocc.*, *nux v.*, *op.*, *rhus.*

Úlceras en la lengua. — *Agar.*, *ars.*, *bov.*, *graph.*, *lyc.*, *merc.*, *mur. ac.*, *natr. m.*, *nux v.*, *op.*, *silic.*, *veratr.*

Lesiones mecánicas.

(*Esguinces* — *Torceduras de pies* — *Luxaciones* — *Fracturas*. — *Contusiones*. — *Conmociones*. — *Derrengaduras*. — *Equimosis* ó *cardenales*. — *Heridas* — *Pasos en falso* — etc.)

Los medicamentos principales contra toda clase de lesiones mecánicas, son: en primer lugar *arnica*, en fomentaciones de agua arnicada al sitio afecto, á la vez que en una dilucion baja al interior; y en segundo lugar *rhus*.

A veces es necesario dar algunas veces antes de *arnica* ó *rhus*, algunas dosis de *acon.* (ó *belladonna* ó *glonoin*, si hay aturdimiento, dolores violentos de cabeza

con acúmulo de sangre en la misma). En los casos en que haya fiebre ó una inflamacion, se dará *acon.* primero para rebajar aquellas y luego se usará el *arnica*.

Si hay dolores violentos, irresistibles en las partes contusas ó heridas, es frecuentemente ventajoso *hypericum*. (Véase: *Trismo*).

NB. En los casos de lesiones de la espina dorsal y médula espinal, causadas por una caída, golpe, etc., *hypericum perforatum* es el medicamento específico. — *Conium maculatum* lo es á la vez de las lesiones de los pechos ó mamas (N.). *Cicuta virosa* de las de la cabeza cuando producen una conmocion cerebral (N.). — *Conium mac.* y *iód.* contra las de los testículos (N.). — *Calendula, acid. phos.* y *ruta* contra las de los huesos (N.). — *Bryonia* y *rhus* contra las de las partes tendinosas (N.). — *Aconitum* contra las de los ojos (N.).

Las *derrengaduras* producidas por levantar grandes pesos se combaten con *rhus*. Si hay dolores lancinantes y violentos sobre todo en los riñones, y que aumentan con el movimiento, dése *bryonia*; y si ambos no bastan, consúltense: *Calc., carb. v., sulph.*

Para los dolores de cabeza despues de una derrengadura, dése: *Calc.*

Para combatir la disposicion á las derrengaduras: *Sepia*.

Pasos en falso. — Las conmociones resultantes de un paso en falso, se curan con *bryonia*, y si este no basta, *puls.* Rara vez será necesario recurrir á *rhus*. Los sufrimientos de estómago se tratan con *bry.* ó *puls.* La disposicion á dar pasos en falso se cura con *Phosph.*

Conmociones. — Las consecuencias de una fuerte conmocion á causa de una caída, golpes, etc. se tratan al principio con *arnica*; pero si á la vez se ha experimentado un gran susto, dése *opium*; ó bien *acon.* si hay sincope. Si en las conmociones cerebrales no bastase *cicuta virosa*, dése *bell. ó phos. ac.*

Contusiones. — Las contusiones ó magullamientos exigen tambien en primer lugar *arnica* al interior, y al

exterior en compresas empapadas en agua de árnica. Para las de las articulaciones conviene *rhús* en lugar de *arnica*.

Equimosis ó cardenales. — Estos que resultan siempre de las contusiones se combaten con *arnica* y *rhús*. Si estos no bastan para hacerlos desaparecer, consúltense: *Bryon.*, *acon.*, *dulc.*, *lach.*, *nux v.*, *sulph.* y *sulph. ac.*

Lesiones de los huesos (golpes, fracturas). — Las lesiones de los huesos, como por ejemplo los golpes en la tibia (espinilla), codo, etc., se curan con *ruta* (al interior y al exterior como el *arnica*), cuando van acompañadas de dolores internos, que parece tienen su asiento en el hueso mismo. Si los dolores son externos, y sobre todo si la parte dolorida tiene una rubicundez erisipelatosa, dése *symphitum officinale* de la misma manera.

El profesor Rapp y otros médicos homeópatas aseguran que las lesiones ó contusiones de los huesos de la naturaleza mas grave, ó aunque sean las fracturas complicadas, que hubieran exigido en otros casos la amputación, son rápida y facilmente curadas, si despues de haber limpiado cuidadosamente la herida, se envuelve inmediatamente el miembro enfermo con algodón empapado en tintura de *arnica* (ó de *symphitum*) y se le coloca en buena posición. No se puede de ningun modo cambiar el vendage; si el pus abre el vendage se colocan nuevas capas de algodón, sin quitar las primitivas. Si hay fiebre, se da *acon.* al interior mientras se aplica el *arnica* en compresas ó en el algodón segun la lesión, lo cual se puede hacer en toda clase de lesiones que haya fiebre, á escepcion de las de la cabeza. Las lesiones mas graves dícese que son así rápidamente curadas, sin que haya casi fiebre traumática.

Luxaciones y torceduras de pies. — En una verdadera luxación, lo primero que hay que hacer es reducir la dislocación, ó sea colocar el hueso en su lugar. Se aplicarán enseguida compresas de agua de *arnica*, y se dará *arnica* al interior, y si no basta *rhús*. Si hay fiebre se da *acon.* y luego se vuelve á *arn.* ó *rhús*. Los dolores

que sobrevienen á veces se combaten con *rhus*. Si hay necesidad se recurrirá á *bryon*.

En las torceduras de pies, pónganse inmediatamente compresas empapadas en agua de árnica, que se renovarán tan pronto como se sequen, y dése á la vez *arn.* al interior. Si sobreviniese fiebre dése *acon.* al interior, sin dejar de aplicarlas compresas de árnica; y luego que haya rebajado ó desaparecido, vuélvase á *arn.* *Rhus* conviene despues de *arn.* si quedan dolores y tumefaccion en el pié, que *arn.* no ha podido quitar.

Mons. Rödiger ha demostrado que no hay mejor medicamento en una torcedura de pies, que un baño de pies, tan caliente como se pueda resistir, y á una temperatura de 30° R. sobre poco mas ó menos, y que se sostendrá añadiendo agua caliente. Pasada media hora se envolvera el pie en algodón empapado en tintura de árnica, y sugeto por un vendage seco. Dicese que pasados uno ó dos días puede ya andar el enfermo. (Húyase siempre de las sanguijuelas y aplicacion de compresas empapadas en agua de nieve, porque retardan la curacion y agravan la enfermedad).

Heridas. — Los medicamentos principales contra las heridas, son: *Arn.*, *cic.*, *gran.*, *staph.* y *sulph. ac.*, sin olvidarse nunca de limpiar la herida perfectamente, y aplicar compresas empapadas en agua de árnica; y sin dejar por eso de hacer uno ó mas puntos de sutura, ó aplicar tiras de emplastro aglutinante para unir los bordes de las heridas. En cuanto empiece la supuracion, se cesará en el uso del árnica al interior y exterior, y se activará la cicatrizacion con *hepar*, y si este no basta, *silic.*

Las heridas con contusiones hechas con instrumentos obtusos y contundentes, como golpes de hacha, sable, espada. etc. exigen de preferencia *arn.*

Las heridas causadas por mordeduras de animales no rabiosos, asi como por las garras ó uñas de los mismos, se curan con *arn.*, y si este no bastase, dése *sulph. ac.*

Las producidas por instrumentos cortantes, como cuchillos, cortaplumas, navajas de afeitar, etc., se curan con *staph.* en lugar de *arn.*

Las producidas por espinas, con *acon.* y *cic.*, y si estos no bastan, recúrrase á: *Hepar, nitri ac.* y *silic.*

En los casos de heridas con hemorragia abundante, si *arn.* no la detiene pronto, dése *diadema* ó *phos.* si aquel no basta; y *china* si el enfermo está debil.

En los casos de gangrena de una herida, dése *china* al principio; pero si la piel toma un aspecto negruzco, dése *lach.*, ó *ars.* si hay grande postracion de fuerzas, con frío y sed intensa. — *Silic.* conviene en los casos de supuracion abundante y fétida.

Fiebre traumática. Sucede á veces que á causa de un golpe, contusion, caída, etc., sobreviene solo una fiebre mas ó menos intensa, y que compromete en algunas ocasiones la vida del enfermo. Si en estos casos *acon.* no basta, dése *arn.* Si tampoco este basta, dése: *Opium* si hay soñolencia, insensibilidad completa; cara y extremidades azuladas ó lividas; frialdad de la piel y respiracion estertorosa. *Champhora*, si *op.* no basta, y si hay: pies y manos frias, temblor de la lengua, de las manos y los pies al levantarlos; frialdad de toda la piel, cara pálida ó azulada; diarrea; lividez de los labios; pulso debil; venas distendidas; respiracion no acelerada; dolores ambulantes y pungitivos.

Licopodio.

En los casos de intoxicacion por esta sustancia empleada como secante, cosa que sucede con frecuencia en los niños tratados alopáticamente, dése en olfacion *camphora*, y al interior en dilucion ó atenuacion baja. Si *camph.* no basta dése, *puls.* *Nux v.* conviene cuando sobreviene un estreñimiento pertinaz de vientre. *Acon.* si hay fiebre con calor y agitacion. *Cham.* en los niños, cuando *acon.* no basta, y si el niño grita mucho y hay que estarlo paseando constantemente porque asi encuentra alivio. Si hay ademas espasmos ó convulsiones.

Téngase siempre en cuenta que *pulsatilla* es el mejor antídoto del licopodio.

Lobanillos y Lipomas.

(Lupias — *Tumores enquistados.* — *Tumores esteomatosos, etc.*)

Los lobanillos, lupias, etc., se combaten admirablemente con *baryta carbonica*, que se dará frecuentemente; viéndose desaparecer al poco tiempo el tumor ya por resolución ó supuración. Si esta no se agota, dése *silic.*, y si no basta, *phos.* En los casos rebeldes que *baryta* no pueda combatir, dese *Calcareo carbonica*.

Los *lipomas*, que á veces toman un volumen enorme, y que tambien se les llama vulgarmente lupias, se combaten principalmente con *Calcareo carbonica*, que se repetirá con frecuencia. Si *calc.* no bastase, recúrrase á *graph.*, ó bien á *hep.* y *silic.* En la mayoría de los casos *calc.* es el específico.

Los *gangliones* ó tumores mas ó menos movibles que se presentan en las articulaciones y trayecto de los tendones, se combaten siempre con éxito con *rhus*, que es su medicamento específico. En los casos bien raros en que *rhus* no bastase, dése *arnica*, y luego *silic.*, *zinc.*, si hay necesidad.

Locura.

La locura ó alienación mental no puede tratarse detalladamente en un manual popular. Véanse, para las causas que la hayan producido ó la sostengan, las diversas enfermedades del artículo: *Padecimientos morales.*

Lombrices.

La *tenia* ó *lombriz* solitaria no se expulsa facilmente con los medicamentos homeopáticos, aun que sin embargo, se registran bastantes casos de expulsión solo con

la medicacion homeopática. *Sulph.* y *merc.* alternados, una dosis de cada uno una semana, y otra del otro á los ocho dias, por espacio de varias semanas, suelen conseguir algunas curaciones; si no bastasen, *calc.*, *silic.*, *sulph.* y *thuja*, pueden emplearse si corresponden ademas á los sintomas restantes que presente el enfermo. Los medicamentos alopáticos empleados contra la solitaria, y administrados en atenuaciones bajas durante algun tiempo y con el regimen conveniente, obran tan enérgicamente como las fuertes dosis. Tambien *cuprum oxyd. nigr.* en tritúracion baja expulsa con frecuencia la solitaria. El professor Hale recomienda mucho las pepitas de calabaza cocidas con leche, y luego el eter sulfúrico.

Los medicamentos principales contra las lombrices, son:

Aconitum. Fiebre con cólicos, escitacion inquietud, sed, náuseas, vientre duro y elevado, tos intensa y cara encarnada con pupilas dilatadas,

Belladonna. Grande sobreescitacion nerviosa, gritos, sobresaltos y miedo, fuerte sed y hasta convulsiones. (Si no basta, recúrrase á *Laches.*)

Cina. Tos con desos de comer á cada momento, frotamiento continuo é involuntario de narices, estreñimiento de vientre, agravacion de la tos antes de comer y al principiar á comer; alivio despues de comer. La tos se hace á veces tan intensa que parece la coqueluche ó tos ferina. Rechinamiento de dientes. Vómitos de lombrices.

Mercurius. Falta completa de apetito; diarrea mucosa, tos que se agrava por la noche; rechinamiento de dientes, se despierta sobresaltado, habla dormido.

Sulphur. Conviene cuando han rebajado los sintomas producidos por las lombrices con alguno de los medicamentos anteriores. Se dará una dosis por la mañana en ayunas, y se esperarán sus efectos sin repetirla.

Para quitar la disposicion á las lombrices, aconsejan algunos se dé *cina*, *merc.* y *sulph.*, una dosis de cada uno por el orden de enumeracion, un dia fijo de cada

semana, y esto por espacio de dos ó tres meses, ó mas si hubiera necesidad. Se da una semana, *cina*, la siguiente *merc.*, y la otra *sulph.*, y luego se empieza por *cina*, y asi sucesivamente.

Se recomiendan tambien contra las fiebres producidas por las lombrices: *China*, *cicut.*, *silic.*, *spigel.*

Contra los cólicos y convulsiones: *Cicuta*.

Contra los cólicos con diarrea, frio y hambre voraz: *Spigelia*.

Contra las fiebres en las personas escrofulosas: *Sulphur*.

Para la demacracion, el apetito voraz, la palidez de la cara con ogeras profundas, únicos sintomas á veces de las lombrices, ó restos de los estados agudos que las mismas producen, dénse, despues de la accion de *sulphur* y si este no basta: *Baryt. c.*, *calc.*, *graph.*, *lyc.*, *natr. m.*, *silic.*, *veratr.*

Para los sufrimientos producidos por los *oxyuros vermiculares*, que se caracterizan por un gran picor en el ano, picor irresistible, que quita de dormir por la noche, y produce á veces convulsiones en los niños, ó inquietud, agitacion, sin poder estarse quietos ni sentados, el medicamento principal es *Ignatia*, que se debe repetir con frecuencia. Se reemplazará por *acon.* si hay agitacion febril, sobre todo por la noche, con insomnio. Disminuidos los sintomas ó casi ya desaparecidos, se administrará *sulph.*, una sola dosis, y se le dejará obrar todo el tiempo que sea necesario mientras el enfermo siga aliviado. Si no bastase, dése *calc.* del mismo modo, y luego *ferr.*, y tambien *china* ó *filix mas.* A veces conviene tambien *merc.* despues de *ignat.*

Para combatir la disposicion á padecer esta clase de lombrices que producen sufrimientos tan variados, se aconsejan: *Ignat.*, *sulph.* y *calc.*, en el orden enumerado, una dosis de cada uno semanalmente por un tiempo mas ó menos largo segun la necesidad. Una semana se da *ignat.*, una dosis en un dia fijo; el mismo dia de la semana siguiente se da otra dosis de *sulph.*; y el mismo

dia de la semana tercera, otra de *calc.*, y á la siguiente *ignat.*, y así sucesivamente.

Conviene abstenerse, cuando se padecen lombrices de cualquiera clase que sean, de la leche, dulces, pastas y del pan fuera de las horas de las comidas.

Luz.

Fotofobia — (*Horror á la luz.*). — Los medicamentos principales son: *Acon.*, *bell.*, *euphr.* y *sulph.* (Comp.: Enfermedades de los ojos y niños).

Magnesia.

Es tal el abuso que se hace de los preparados de magnesia para combatir alopáticamente las enfermedades del estómago y otras, que suelen observarse frecuentemente intoxicaciones por dichas sustancias. Los mejores medicamentos para combatirlas, son:

Arsenicum. Dolores quemantes, violentos, que se agravan por la noche y obligan al enfermo á salir de la cama.

Chamomilla. Si hay dolores de cólico, violentos, con ó sin diarrea y con muchos gases.

Coffea. Insomnio con grande escitacion nerviosa.

Colocynthis. Cólicos con dolores insoportables, estreñimiento de vientre.

Nux vomica. Despues de *coloc.* cuando este no basta especialmente para el estreñimiento.

Pulsatilla. Cólicos con diarrea. Si no bastase, dese *rhabar.*, especialmente cuando las deposiciones despiden un olor agrio.

Mandíbula.

Contraccion espasmódica de la mandíbula — (*Trismo*). — Esta enfermedad muy peligrosa á veces es frecuentemente ocasionada por heridas principalmente en las manos, dedos y pies. Va ordinariamente acompañada de tétanos. Asi es, que si á consecuencia de una lesion

se teme el tétanos, es preciso absolutamente encontrar el medicamento que lo ha de curar (Véanse: Lesiones). Además de *arnica* que es el principalmente indicado en las contusiones, debemos mencionar:

Hypericum. Lesiones traumáticas de diversas clases, sobre todo si espinas ó clavos han entrado en la planta de los pies, ó si se han introducido agujas debajo de las uñas rompiéndose al penetrar; ó si las extremidades de los dedos han recibido una contusion violenta, ó si uno ó varios nervios han sido heridos ó dislacerados; estas lesiones van seguidas de *dolores excesivos que suben á lo largo de los nervios* (Hg. L.).

Los medicamentos principales contra los primeros síntomas del trismo, son: *Angust.*, *bell.*, *ign.*, *nux v.*

No indicamos los medicamentos aconsejados contra el tétanos, porque el tétanos bien desarrollado no debe ser tratado mas que por el médico.

Mareo.

El medicamento principal contra el mareo, es *Cocculus*. Si no bastase, dése *Staph.* ó *hyosc.* Algunos aconsejan *tabacum* contra el mareo producido por el movimiento de un buque. Si los vómitos son muy tenaces, dése *Ipec.*, y si no basta, *antim. cr.*

Matriz.

Caida de la matriz. — En los casos agudos, y despues que la matriz haya sido introducida, basta que la muger permanezca algunos dias hechada y tome *nux vomica*, una dosis dos ó tres veces al dia. Si esto no fuera suficiente, ó si el caso fuese crónico, elijase entre: *Aur.*, *bell.*, *calc.*, *sep.*, *stann.*

Caida de la vagina. — Para corregir la caida de la vagina. estan indicados: *kreos.*, *merc.*, *nux v.*

Cancer de la matriz. — Los medicamentos principales contra esta enfermedad casi siempre incurable, son: *Ars.*, *aur.*, *bell.*, *carb. an.*, *con.*, *kreos.*, *graph.*,

iod., *magn. m.*, *sepia*, *staph.*, *thuja*. (Se pueden emplear los mismos medicamentos para las induraciones de la matriz).

Dilatacion de la matriz. — Tiene lugar en las mujeres de edades avanzadas, que han parido mucho, ó no se ha contraído bien la matriz despues de un parto. El sintoma principal es un gran abultamiento de vientre, y las molestias consiguientes á dicho abultamiento. El medicamento esencial contra esta enfermedad, es: *Sepia*. Se repetirán sus dosis con frecuencia. Si no bastase, elijase entre: *Bell.*, *calc.*, *china*, *lach.*, *nux. v.*, *plat*.

Gases en la matriz. La introducion de aire en la matriz es cosa que produce casi siempre la muerte, y suele por lo comun tener lugar en los partos. Otras veces se desarrollan gases dentro de la matriz que producen grandes incomodidades, dolores, dilatacion del organo, sintomas simpáticos en el estomago, etc. El mejor medicamento para expulsarlos de la matriz es *Phosph.*, y si este no bastase, dése *Lyc.* y en caso de necesidad, *China*.

Metralgia. — (*Calambres de la matriz.* — *Espasmos de la matriz.* — *Dolores nerviosos de la matriz.*) — El medicamento principal contra la metralgia ó neuralgia de la matriz, es *Cocculus*. Si no quitase los dolores, recúrrase á *coffea*; y si tampoco este bastase, consúltense: *Bell.*, *cham.*, *con.*, *hyosc.*, *ign.*, *magn. m.*, *nux v.*, *sepia*, *stann*.

Metritis. — (*Inflamacion de la matriz.*) — Se presenta por lo comun despues del parto, y á veces reina de un modo epidémico (Véase: Fiebre puerperal). Tambien se suele observar en otros casos, sin que la causa haya sido el parto, y si un enfriamiento, la supresion rápida de la menstruacion, et. Consúltense las siguientes indicaciones en este caso.

Aconitum. — Al principio del tratamiento, y cuando hay una fuerte fiebre inflamatoria, grandes dolores en el bajo vientre, sed, dolor de cabeza, ansiedad y miedo á la muerte.

Belladonna. — Presion, peso y contracion en el bajo vientre, como si la matriz fuera á salir por la vagina, con dolores lancinantes en el vientre y caderas, y gran imposibilidad de moverse y tocar la parte afecta: fuerte dolor de cabeza de sien á sien.

Chamomilla. — Si la causa ha sido una viva contrariedad ó una cólera, y los dolores son dislacerantes, desgarrantes, y la enferma no puede estarse quieta mucho tiempo.

Mercurius. — Cuando los dolores son lancinantes, presivos ó terebrantes, y sobre todo si hay sudores frecuentes con ó sin escalofrios, y poco calor.

Nux vomica. Dolores presivos, violentos, en el bajo vientre, que se agravan con la presion y el tacto; dolor violento en los riñones; dificultad de orinar y orina dolorosa y gota á gota; agravacion todas las mañanas y á la entrada de la noche.

Pólipos de la matriz. — El medicamento principal es *Staphisagria*. Si este no bastase, dese: *Calcarea*.

Si en lugar de pólipos existen ó se arrojan *hidátides*, el mejor medicamento es *Cantharis*; y si este no basta, *Chamomilla*.

Médula espinal.

Mielitis. — (*Inflamacion de la médula espinal.*) — No puede ser tratada por una persona ajená á la medicina. Sin embargo, en los casos agudos, y hasta que llegue el médico homeópata, se puede dar *acon.* si hay mucha fiebre, agitacion y sed: y luego *dulc.* ó *nux v.*, ó bien *merc.*

Melancolia.

Véanse: *Padecimientos morales.*

Menstruacion.

Las diversas irregularidades que acompañan y siguen á las menstruaciones, asi como los variados sufrimientos

que se presentan antes, durante y despues de la menstruacion, se han hecho tan frecuentes, que la menstruacion regular y sin dolores es una escepcion en la época presente.

Amenorrea (falta de la menstruacion). — Cuando no se presenta la menstruacion en las jovenes, elijanse:

Para las jóvenes cloróticas y anémicas: *Puls.*, *ferr.*, *sulph.*

Cuando hay hemorragias por la nariz, en lugar de la menstruacion: *Bry.*, y luego *laches.*

Cuando hay tos sanguinolenta en lugar de la menstruacion: *Phos.*, ó *nux v.* si hay hemoptisis; y si no bastasen, *op.*, *puls.*

Cuando hay sufrimientos en el pecho y gran debilidad: *Cocc.*

Cuando hay vómitos, y espasmos en las extremidades: *Cupr.*

Cuando hay acúmulo de sangre en la cabeza ó plétora: *Acon.*, *bell.*

Ademas, en los casos rebeldes, dénse: *Caust.*, *con.*, *graph.*, *kali.*, *sep.*

No conviene repetir mucho los medicamentos, y deben darse con grandes intervalos unos de otros, y á dosis únicas.

Dismenorrea (menstruacion dolorosa, con calambres ó cólicos). —

Belladonna. Sensacion de presion violenta, como si todo fuera á salir por los órganos genitales. — Dolores que aparecen y desaparecen repentinamente. — Durante los accesos de los dolores, la cara y los ojos se ponen encarnados, y se nota una pulsacion en las venas del cuello.

Cocculus. Medicamento principa lcontra la menstruacion dolorosa (J.). — Debilidad paralitica en las espaldas y extremidades inferiores. — Sufrimientos hemorroidales (almorranas) despues de cada menstruacion (G.).

Coffea. Calambres de los mas violentos, de tal modo

que la enferma está como fuera de sí; grita, rechina los dientes, se retuerce. (Si no hay pronto alivio, dése *secale*.)

Pulsatilla. Dolores en los riñones y caderas; sensación de tensión hasta en los muslos, ú hormigueo. — Presión en el recto. — (Mujeres cuyo temperamento reclama *pulsat*.)

Veratrum. — Vómitos y diarrea durante la menstruación, frío en las manos, pies y cara, con sudor frío en la frente. (Cara encarnada con sudor caliente: *Cham*.)

Menstruación suprimida. —

Si la causa consiste en:

Un susto, dése: *Acon.*, *puls.*, ó: *lyc.*, *plat.*

Una cólera: *Acon.*, *cham.*, *plat.*

Un enfriamiento: *Puls.*, *sep.*, ó: *Dulc.*, *nux m.*, *sulph.*

Además se recomiendan como eficaces: *Con.*, *graph.*, *kali*, *lyc.*, *silic.*, *sulph.*; ó bien: *Caust.*, *cocc.*, *natr. m.*, *phos.*

Duración y naturaleza de la menstruación. —

Menstruación adelantada: *Calc. c.*, *nux v.*; ó: *Carb. v.*, *ipéc.*, *rhus*, *sabina*.

Menstruación retardada: *Caust.*, *cupr.*, *dulc.*, *graph.*, *kali*, *lyc.*, *natr. m.*, *puls.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*

Menstruación demasiado corta: *Amm. c.*, *puls.*, *sulph.*

Menstruación demasiado larga: *Cupr.*, *lyc.*, *natr. m.*, *nux v.*, *plat.*, *secale*, *silic.*

Menstruación muy escasa: *Con.*, *dulc.*, *graph.*, *kali c.*, *magn.*, *puls.*, *sulph.*

Menstruación muy abundante: *Bell.*, *calc.*, *ferr.*, *ipéc.*, *nux v.*, *plat.*, *sabina*, *secale*, *stram.*

Cesación de la menstruación (Edad crítica) (*Ménopausia*). —

Los medicamentos principales contra los sufrimientos que acompañan de ordinario á la retirada de la menstruación, son: *Lach.*, *puls.*, *sep.*, *sulph.*; ó: *Cocc.*, *ign.*, *sulph. ac.* — *Lachesis* es el específico, por decirlo

asi, de las afecciones que se presentan en la edad critica de las mugeres.

Contra las llamaradas de calor con sudor, dése: *Lach., sulph. ac.*; ó: *Calc., puls., sepia.*

Mercurio.

El medicamento de que mas abusan los alópatas es sin disputa el mercurio. Por consiguiente, cuando un enfermo tratado por la alopattia recurre á la homeopatia, es menester ante todo, si ha abusado del mercurio, darle un antídoto, de que luego hablaremos.

En los casos graves de envenenamiento por esta sustancia, que suelen ser por el sublimado corrosivo, dense cualquiera de los medios siguientes: la clara de huevo diluida en agua, el agua azucarada, leche ó almidon disuelto en agua. La clara de huevo y el agua azucarada, son sin disputa alguno los mejores, y se pueden dar alternados.

El antídoto principal, lo mismo para los sufrimientos consecutivos que para los casos en que se ha abusado del mercurio en dosis alopáticas, es *Hepar*, que se tomará disuelto en agua, una cucharada cada dos, cuatro, seis ó mas horas, segun la necesidad. Si *hepar* no fuera suficiente, dése *Nitri ac.* si predominan los sintomas de la boca y garganta, ó *bellad.* si hay el temblor llamado *mercurial* ó de los azogados. Despues de la accion de *nitri ac.*, dado caso que aun queden sufrimientos que combatir, conviene *sulph.*; despues de agotada su accion se prescribirá *calc. c.*

Cuando el enfermo haya abusado del mercurio y azufre á la vez, dése: *Bellad* y *puls.*

En los sufrimientos crónicos por el abuso del mercurio, consúltense, ademas de las indicaciones anteriores las siguientes:

Para las afecciones hidrópicas: *China, dulc., hell., sassap., sulph.*

Contra las afecciones de las glándulas: *Aur., baryt. c., carb. v., dulc., nitri ac., silic.*

Contra las úlceras: *Aur.*, *bell.*, *hep.*, *lach.*, *nitri ac.*, *sassap.*, *silic.*, *sulph.*

Contra la salivacion y enfermedades de la boca y encías: *Carb. v.*, *china*, *dulc.*, *hep.*, *iod.*, *nitri ac.*, *staph.*, *sulph.*

Contra los dolores: *Carb. v.*, *china*, *dulc.*, *guai.*, *hep.*, *lach.*, *phos. ac.*, *sassap.*, *sulph.*

Contra las afecciones de los huesos: *Asa*, *aur.*, *calc.*, *lach.*, *nitri ac.*, *phos. ac.*, *silic.*, *sulph.*

Contra la sobreexcitacion nerviosa: *Bell.*, *carb. v.*, *cham.*, *hep.*, *nitri ac.*, *puls.*

Contra la excesiva impresionabilidad á los cambios de tiempo: *Sulph.*, y si no basta, dénse: *Carb. v.* ó *china*, ó *dulc.*

Contra la debilidad considerable que á veces sobreviene: *Carb. v.*, *china.*, *hep.*, *lach.*, *nitri ac.*

Contra las afecciones de los ojos: *Bell.*, *hepar*, *nitri ac.*, *sulph.*

Mordeduras de animales venenosos.

El Dr. Hering aconseja la aplicacion de calor seco á distancia contra las mordeduras de los animales venenosos, como las serpientes, perros rabiosos, etc. Un hierro hecho áscua, un carbon ardiendo, ó aun que sea un cigarro encendido si no se tiene á mano los anteriores medios, se aproximarán á la herida todo lo posible sin quemar la piel, pero teniendo cuidado que el calor no pierda su intensidad, para lo cual se pueden renovar los medios que lo suministran. Tambien es bueno untar con aceyte, manteca, jabon ó saliva, en derredor de la mordedura, teniendo cuidado de volver á untar tan pronto como el calor seque el cuerpo que se ha usado. Todo lo que destile la mordedura se quitará con cuidado. Esto debe continuarse durante una hora ó mas, hasta que los accidentes producidos por el veneno empiecen á disminuir. En tal caso se suspenden las aplicaciones del calor y las unturas.

Cuando la mordedura es de serpiente ó culebra es preciso hacer tomar á la vez al mordido agua bastante salada, y si esto no basta, aguardiente, vino cumun ó generoso á cucharadas, cada cuarto de hora, hasta que disminuyan los sufrimientos.

Si sobrevienen inflamaciones erisipelatosas, dése *Apis*.

Si los dolores se agravan, van desde la herida al corazon; aquella se pone azulada, hinchada y marmórea, con vértigos, náuseas y congojas, dése inmediatamente *ars.* con frecuencia, retrasando sus dosis en cuanto se note alivio. Si *ars.* no fuera suficiente, dése *bell.*, y si este no basta, *sen.* *Laches.* prestará muy buenos servicios si *ars.* no basta, en los casos en que la mordedura no haya sido hecha por la serpiente del mismo nombre. Contra las mordeduras del sapo, el medicamento específico, por decirlo así, es *lachesis*.

Contra los sufrimientos crónicos producidos por las mordeduras de las serpientes, se aconsejan *merc.* y *phos. ac.*, este principalmente.

Para el tratamiento de las mordeduras de un perro rabioso, además de la aplicacion del calor á distancia, véase: *Rabia*.

Miliar.

Los medicamentos principales contra la miliar, ó fiebre miliar segun otros, son: *Acon.*, *apis.*, *ipéc.*

Aconitum. Conviene al principio de la enfermedad, cuando hay fiebre; mientras que *ipéc.* se emplea principalmente en los casos en que la respiracion es difícil, ó hay náuseas, vómitos, etc.

Apis y *bellad.* están indicados cuando la miliar se ha suprimido y se presentan sintomas cerebrales. — *Bry.* é *ipéc.* convienen especialmente en la miliar de las parturientas: — *acon.*, *bry.*, *cham.*, *ipéc.* (*apis*, *bell.*), en los niños. En los casos graves, cuando la miliar no quiere salir, dése *cuprum aceticum*, ó *stram.* si hay sintomas cerebrales.

Muelas (*Dolores de*).

No hay enfermedad ni dolores que se presten mejor á ser tratados por personas estrañas á la medicina que los dolores de muelas. En efecto, se presentan frecuentemente, y todos saben que la alopatia no aconseja otra medicación que la extraccion de la muela dañada. Además, no siendo la enfermedad peligrosa, se amolda perfectamente á experimentar la eficacia del tratamiento homeopático.

Todos los médicos homeópatas, como las personas que se han acreditado en el tratamiento de los dolores de muelas, serán consultadas con frecuencia por enfermos que no lo harán para otra enfermedad, por no tener confianza en la homeopatia. Estas son las razones que nos obligan á estendernos un poco mas en los dolores de muelas.

En los dolores de muelas, como en toda otra cualquiera enfermedad reciente, hay que inquerir ante todo la *causa ocasional*. Eligiremos pues, si son producidos:

Por un despecho, un disgusto: *Acon.*, *cham.*, ó *rhus*, *staph.*

Por una cólera: *Cham.*, *coloc.*, *nux v.*

Por el aire de la noche: *Merc.*, ó *nux m.*

Por un tiempo frio y húmedo: *Nux m.*, *rhus.*

Por un viento fuerte: *Acon.*, *silic.*

Por el viento en general: *Acon.*, *puls.*, *rhus*, *silic.*

Por una corriente de aire: *China* ó *bell.*, *calc.*, *sulph.*

Por una calefaccion muy fuerte: *Glonoin.*, *rhus.*

Por un enfriamiento estando el cuerpo sudando: *Rhus* ó *Cham.*

Además, se tendrán en cuenta el *sexo*, la *edad*, el género de vida, etc., del enfermo; y se prescribirán en los dolores de muelas:

De los niños: *Acon.*, *antim. cr.*, *bell.*, *calc.*, *cham.*, *coff.*; ó bien: *Ignat.*, *merc.*, *nux m.*, *puls.*, *silic.*

De las mugeres: *Bell.*, *cham.*, *china*, *coff.*, *hyos.*

ignat., puls., sep.; ó tambien: *Acon., calc., nux m., sulph.*

Antes de la menstruacion: *Ars. (baryt.).*

Al principiar la mienstruacion: *Calc., cham., carb. v., lach., phos.*; ó: *Amm. carb., natr. m.*

Despues de la menstruacion: *Calc., bry., cham., phos.*

Durante el embarazo: *Bell., calc., hyos. (magnes. c.), sep., sulph.*; ó: *Apis, bry., merc., nux v., phos., staph.*

Durante la lactancia: *Calc., china*; ó: *Acon., ars., bell., dulc., merc., nux v., phos., staph., sulph.*

Dolores de muelas en las personas nerviosas y sensibles: *Acon., bell., cham., coff., china, hyosc., nux m.*

Dolores de muelas en los tomadores de café: *Cham., nux v.*; ó: *Bell., carb., cocc., merc., puls., rhus, silic.*

En cuanto al sitio y estension de los dolores, prescribanse, si atacan:

Solo á las muelas: *Calc., cham., hyos., lach., merc., puls., rhus, staph.*; ó tambien: *Antim. cr., bell., bry., carb. v., caust., china, coff., hep., nux m., nux v., phos., silic., sulph.*

A todos los dientes de una mandíbula: *Cham., merc., rhus., staph.*

A los de un lado solamente: *Acon., bell., cham., merc., nux v., puls.*

A las muelas, con afeccion simultánea de las encias: *Bell., merc., staph.*; ó: *Nux v., puls., rhus.*

A las muelas, con hinchazon simultánea del carrillo: *Cham., merc., (cham. si hay hinchazon roja, merc. si es pálida)*; ó: *Arn., bell., bry., nux v., puls., staph., sulphur.*

En cuanto á las horas en que los dolores se agravan, téngase en cuenta lo siguiente: Agravacion:

Por la mañana al despertar: *Bell., carb. v., lach., nux v.*

Al medio dia: *Cocc., rhus.*

Por la tarde: *Nux v., puls.*; ó: *Calc., caust., merc., phos., sulph.*

Al oscurecer: *Pulsat.*

En la primera parte de la noche: *Bell., hyos., merc., phos., puls., rhus.* (ó bien: *Antim. cr., bry., calc., caust., hep., ign., nux m., nux v., staph., sulph.*).

Si los dolores son mas fuertes:

Antes de medio dia: *Carb. v., caust., natr. m., nux v., puls., staph., sulph.*

Por la noche: *Bell., carb. v., cham., puls., rhus, staph., sulph.*

Solo por el dia: *Bell., calc., merc., nux v.*

Solo por la noche: *Bell., phos.*

Segun los sufrimientos concomitantes se eligirá entre los medicamentos que vamos á indicar. Cuando hay:

Dolores de cabeza: *Apis, glon., lach.*

Acúmulo de sangre en la cabeza: *Acon., calc., china, hyos., lach., puls.*

Venas hinchadas en la frente y manos: *China.*

Calor en la cabeza: *Acon., hyosc., puls.*

Dolores quemantes en los ojos: *Bell.*

Rubicundez en las megillas: *Acon., bell., cham.;* ó: *Arn., merc., nux m., phos., puls., rhus, sulph.*

Rubicundez de una sola megilla: *Cham.*

Palidez de la cara: *Acon., ars., ign., puls., spigel., staph., sulph.*

Salivacion: *Merc.;* ó: *Bell., dulc.*

Frio ó escalofrios: *Puls., rhus.*

Calor: *Hyos., rhus.*

Palpitaciones de corazon y neuralgia facial: *Spigel.*

Antes de elegir un medicamento segun las indicaciones que acabamos de dar, véase en la lista alfabética de los medicamentos principales contra los dolores de muelas, si la naturaleza de los dolores, y sobre todo si las indicaciones que se refieren á la agravacion y alivio de los dolores, concuerdan; solo en este caso se podrá contar con seguridad con una curacion rápida.

Abreviaturas. En las indicaciones que siguen, para evitar repeticiones, nos serviremos de las abreviaturas: D. M. = dolores de muelas; Agr. = á agravacion;

Al. — á alivio; S. C. — á sufrimientos ó sintomas concomitantes.

Aconitum. D. M. á causa de un enfriamiento, sobre todo con el aire frio y seco, con dolores pulsativos.

S. C. Acúmulo de sangre en la cabeza, dolores ardientes en la cara. Inquietud, agitacion, el enfermo está como loco. (Si *acon.* no remedia tal estado, compárense: *Cham.*, *coff.* ó *bell.*)

Antimonium cr. Dolores en las muelas cariadas; dislacerantes, corrosivos, pulsativos, que se estienden frecuentemente hasta la cabeza.

Agr. Por la noche en la cama; despues de comer; bebiendo agua fria.

Al. Paseándose al aire libre.

Apis. D. M. tensivos y con estremecimientos; dolores violentos en las encias.

S. C. Contraccion involuntaria de las mandíbulas. Dolores de cabeza. Exudacion de sangre de las encias.

Arnica. Es muy ventajoso frecuentemente despues de las operaciones en los dientes. D. M. presivos, pulsativos, como si se retorciese la muela ó se la extragera.

Agr. Con el tacto.

S. C. Hinchazon del carrillo.

Arsenicum. D. M. por la noche, sobre todo á media noche (ó antes de la menstruacion). Dolores pulsativos, tensivos, urentes, ó sensacion como si las muelas vacilasen ó se hubieran alargado.

Agr. Con el tacto, acostándose del lado dolorido, durante el reposo, con el frio.

Al. Con el calor exterior, volviéndose en la cama y paseando.

S. C. Angustia escesiva con inquietud y palpitations de corazon. — Grande postracion. — Los dolores exasperan al enfermo (Comp.: Sint. Car. gen.).

Belladonna. D. M. á causa de un enfriamiento, y en los niños. Dolores en las muelas cariadas y encias; parece que los dientes estan ulcerados ó heridos, con dolores lan-

cinantes, incisivos, dislacerantes, con estremecimientos, ó con calor en las encías y pulsacion en la megilla.

Agr. Por la mañana al despertar, ó algun tiempo despues de comer, ó por la noche despues de acostarse; mordiendo, bebiendo cosas calientes, con el tacto, al aire libre.

Al. Limpiándose los dientes hasta hacer salir sangre, ó apretando con frecuencia las partes doloridas.

S. C. El enfermo está agitado y corre por todos lados á fuerza de angustias y dolores; disposicion á llorar. Salivacion, dolores quemantes en los ojos, garganta seca con fuerte sed.

Bryonia. Dolores de muelas intensos en personas vivas, prontas á incomodarse, sanguíneas, tercas. — Dolores lancinantes, pulsativos, dislacerantes; ó dolores que pasan á otras muelas, á la cabeza ó á la megilla. Los dientes parecen demasiado largos y vacilan.

Agr. Acostándose del lado sano, fumando, masti-cando, y comiendo y bebiendo cosas calientes.

Al. *Acostándose del lado afecto*. Alivio momentáneo teniendo agua fría en la boca, asi como al aire libre.

Calcareo c. D. M. principalmente en las mugeres embarazadas; dolores en las muelas cariadas ó vaci-lantes; dolores en la raíz de las muelas.

Agr. Por la noche, con un enfriamiento, una cor-riente de aire, con el frio, comiendo y bebiendo cosas frias (aun con el ruido).

S. C. Acúmulo de sangre en la cabeza.

Chamomilla. D. M. á consecuencia de un enfria-miento, estando sudando el cuerpo, ó de una cólera. D. M. en las mugeres antes de la menstruacion. — D. M. en los niños. — Los dientes se mueven y parece se alargan. — Dolores dislacerantes, tensivos, incisivos, de hormiguelo, ó punzantes con estremecimientos hasta en el oido; los dolores se propagan á las sienas, ojos y cabeza.

Agr. A la noche y con el calor de la cama; poco despues de haber comido ó bebido (caliente ó frio). — Despues de haber tomado café.

Al. A veces poniendo un dedo mojado en agua fria sobre la muela afecta.

S. C. Mal humor, agitacion (*acon., bell., coff.*) — Rubicundez de una megilla, transpiracion en la cabeza, fuerte sed, hinchazon (roja) de una megilla, gran debilidad en las articulaciones: dolores en las articulaciones de la mandibula cuando se abre la boca, y que se propagan á las muelas: glándulas submaxilares dolorosas é infartadas.

China. D. M. en las mugeres durante la lactancia ó el embarazo, ó despues de pérdidas de líquidos. Dolores pulsativos, constrictivos, dislacerantes, incisivos y tensivos.

Agr. Con las corrientes de aire, el tacto, el movimiento.

S. C. Infarto de las encias, sequedad de la boca con sed, acúmulo de sangre en la cabeza, hinchazon de las venas de la frente y manos.

Coffea. D. M. de los mas violentos, con sensacion de palpitations lancinantes y presion intermitente; dolores al morder.

S. C. El enfermo está como loco; llora, tiembla, se agita. — (*Acon., bell., cham.*)

Glonoin. D. M despues de una fuerte calefacion seguida de un enfriamiento: dolores palpitanes y contusivos en todos los dientes y muelas, acúmulo de sangre en la cabeza y dolores de cabeza.

Hyosciamus. D. M. de personas muy sensibles y nerviosas. Dolores violentos, dislacerantes, pulsativos, que llegan á producir en el enfermo hasta la rabia; dolores palpitanes, contusivos y tensivos, durante los cuales parece que la muela ó muelas afectas se mueven, y desprenden durante la masticacion.

S. C. Calor fugitivo, acúmulo de sangre en la cabeza, movimientos convulsivos en los brazos y dedos.

Ignatia. D. M. en las personas cuya constitucion exige *ign.* — Muelas doloridas como si estuvieran heridas ó rotas, ó dolores corrosivos en los dientes incisivos.

Agr. Con el café, el tabaco, despues de comer, por la noche despues de acostarse y por la mañana al despertar.

Mercurius. Dolores en las muelas cariadas; tensivos, lancinantes, dislacerantes, terebrantes, que se propagan á los oidos y cabeza: dolores en un lado de la cara.

Agr. Comiendo y bebiendo (caliente ó frio), con el aire frio (de la noche); dolores solamente diurnos (que cesan por la noche), ó nocturnos (con el calor de la cama) insoportables, y que obligan á salirse de la cama (*Magn. c.*).

Al. Con el calor exterior (pero no con el de la cama).

S. C. *Salivacion*: hinchazon (pálida y dura) del carrillo, encias blancas, ulceradas, dolorosas, que sangran facilmente; gran propension á la transpiracion que no alivia.

Nux vomica. D. M. en las personas cuya constitucion indica *nux v.* — D. M. á causa de un enfriamiento; dolores en las muelas buenas ó desgastadas; dolores tensivos, terebrantes palpitanes, como si las muelas fuesen arrancadas, ó como si la sangre se acumulase toda á aquella parte dolorida.

Agr. Por la mañana en la cama ó á la noche. Con la lectura, la reflexion, estando espuesto al aire libre y frio ó aspirando el mismo, con el movimiento, comiendo. Acostándose del lado dolorido.

Al. Permaneciendo en un sitio caliente, durante el reposo, acostándose sobre el carrillo del lado sano.

S. C. Glándulas submaxilares dolorosas; tumor en las encias proximo á abrirse (*Lach.*).

Pulsatilla. D. M. en las personas cuya constitucion indica *puls.* — *Dolores palpitanes* (como si el nervio se contragese y dilatase repentinamente), ó dolores tensivos, dislacerantes, lancinantes, contusivos.

Agr. Durante el reposo, en una habitacion caliente, con el calor de la cama, limpiándose los dientes.

Al. Con el aire húmedo, al aire libre, aspirando aire frío por la muela afecta, paseando, con una fuerte presión sobre el carrillo afecto.

S. C. Dolores dislacerantes en los oídos, dolor de cabeza semilateral, calor en la cabeza con escalofríos. Palidez de la cara con escalofríos.

Rhus toxicodendron. Los dolores se presentan después de haberse mojado el cuerpo estando sudando, ó después de un baño frío. Sensación como si las muelas estuviesen muy largas, se menean, vacilan y están como insensibles. Dolores lancinantes y á sacudidas, ó tensivos y dislacerantes; dolores de magullamiento.

Agr. Por la noche, después de una cólera, de un enfriamiento, al aire libre.

Al. Con el calor y el movimiento.

S. C. Melancolía y tristeza, ó ansiedad y tristeza. — Mal olor de los dientes cariados. — Dolores que se propagan á las mandíbulas y al cráneo.

Sepia. D. M. de carácter crónico, especialmente en las mugeres gruesas; dolores contusivos, lancinantes, que se extienden hasta los oídos, brazos y dedos, con hormigueo en estos últimos.

Agr. Con las corrientes de aire frío, tocando las muelas, hablando.

S. C. Tez amarilla, respiración difícil, carrillo hinchado, tos, infarto de las glándulas submaxilares.

Silicea. D. M. con inflamación del periostio de la mandíbula, ó dolores crónicos con afección de las mandíbulas.

S. C. Piel enfermiza, cualquiera lesión tiende á ulcerarse. Insomnio por la noche, ocasionado por un calor general.

Spigelia. D. M. de naturaleza neurálgica, con dolores palpitantes ó lancinantes (en el lado izquierdo), rápidos como el rayo.

Agr. Por la noche, después de comer, con el agua fría ó el aire frío.

S. C. Cara pálida, abotagada; círculos amarillos

en derredor de los ojos, dolores en los ojos; deseo frecuente de orinar con orina abundante; palpitaciones de corazón; dolores en la cara; escalofríos.

Staphysagria. Dolores en los dientes cariados que se ponen fácilmente negros y se rompen, cayendo á pedazos; dolores corrosivos, tensivos, dislacerantes.

Agr. Por la noche ó hacia el amanecer, al aire libre, bebiendo cosas frías, masticando, comiendo, *aspirando aire frío por la boca.*

Al. A veces con una fuerte presión (mientras que el tacto ligero aumenta el dolor).

S. C. Encías pálidas, hinchadas, ulceradas, con pequeñas vesículas.

Sulphur. D. M. á causa de erupciones suprimidas ó mal tratadas. Encías infartadas, con dolores contusivos. Encías que dan sangre. — Las altas potencias de *sulph.* son frecuentemente muy ventajosas en los dolores de muelas crónicos, ó en los de las mugeres embarazadas.

Agr. La primera parte de la noche; al aire libre; con las corrientes de aire; enjuagandose la boca con agua fría.

Veratrum. Dolores de muelas con dolores de cabeza y cara encarnada ó hinchada.

S. C. Sudor frío en la frente, frío general con calor interior, sed inestinguible y deseo de bebidas frías. Náuseas hasta vomitar bilis. Cansancio en las extremidades. Postración de fuerzas hasta el síncope.

NB. En los dolores de muelas agudos y muy violentos, se dará el medicamento indicado de hora en hora, ó de dos en dos horas, hasta que se declare el alivio. En los dolores crónicos, ó en los de las mugeres embarazadas, se darán los medicamentos dos ó tres veces al día solamente.

Nariz.

Cancer de la nariz. — Los medicamentos principales contra tan terrible enfermedad, son: *Ars.* y *carbo*

an.; y despues: *Aur.*, *calc.*, *sep.* y *silic.*, y tambien *tarant.*

Caries de los huesos propios de la nariz. — Si la caries proviene del vicio sifilítico, el principal medicamento es *Mercurius*; pero si el enfermo ha abusado de este medicamento en dosis alopáticas, dése en su lugar *Aurum*, y luego *hepar* ó *silic.* Si la caries es escrofulosa ó herpética, el mejor medicamento es *Aurum.*, y si este no basta, consúltense: *Asa fæt.*; *merc.*, *silic.*, *sulph.*

Hinchazon é inflamacion de la nariz. — La hinchazon que se presenta en los sugetos escrofulosos, se combate con: *Asa fæt.*, *aur.*, *hep.*, *merc.*, *rhus.*, *sulph.* — La que proviene de una lesion traumática ó mecánica, con: *Arnica*, y si este no basta, consúltense, *hepar*, *silic.*, *sulph. ac.* — La que se presenta en los que abusan de las bebidas alcohólicas, con: *Ars.*, *lach.*, *merc.*, *puls.*, *sulph.*; ó bien: *Bell.*, *hep.*, *phos.*, *nux v.* — La hinchazon producida por el frio intenso, con: *Rhus*; ó: *Apis.*, *Bry.*, *caust.*, *lach.*, *merc.* y *staph.* — En las personas sifilíticas y que han abusado del mercurio, con: *Asa.*, *aur.*, *hep.*, *lach.*, *sulph.*

La inflamacion de la nariz con tumefacion, rubicundez viva y dolorosa, se combate con: *Belladonna*. Si toma una forma erisipelatosa, con *Rhus*. Despúes se pued® recurrir en el primer caso, y despues de *bell.*, á *hep.*, ó *merc.*; en el segundo y despues de *rhus.*, á *laches* ó *apis*.

Si tanto en la hinchazon como en la inflamacion existen costras mas ó menos gruesas, dése, *Graphites*; y si este no basta *rhus.*, ó *carb. v.*, *natr. m.*, *sep.*, *silic.* — Si la rubicundez se hace cobriza, *ars.* ó *cann.*; ó bien: *Lach.*, *phos.*, *staph.*

Olfato. — El aumento, disminucion ó pérdida del olfato, son sintomas en la mayoria de los casos dependientes de otra enfermedad, ya de la nariz, de los órganos digestivos, etc.; pero algunas veces se presentan aislados, y aunque no lo sean, causan tantas molestias,

que se ofrecen como los mas culminantes y es preciso combatirlos. Hé aqui sus indicaciones mas esenciales.

Cuando hay exaltacion del olfato ó sensibilidad excesiva del mismo para los ácidos, dése: *Drosera*. — Para el vino: *Nux v.*, *tabac.* — Para los ajos: *Sabadilla*. — Para los huevos y grasas: *Colchic.*, *puls.* — Para el humo del tabaco: *Bell.*

Cuando se perciben olores imaginarios, si son ácidos: *Alum.* — De aguardiente: *Aur.* — A cuerno quemado: *Sulph.* — De queso: *Nux v.* — A almizcle: *Agnus c.* — A pólvora: *Calc.* — A pus: *Sen.* — A azufre: *Ars.*, *nux v.* — A tabaco: *Puls.* — A huevos podridos: *Calc.*, *puls.* — A pábilo de una vela recién apagada: *Nux v.* — A humo: *Sulph.* — Nauseabundos: *Canth.* — A cosas podridas: *Aur.*, *paris.*

Si el olfato está disminuido, consúltense: *Alum.*, *calc.*, *cyc.*, *kal.*, *mez.*, *tabac.*

Si la pérdida del olfato es completa, dése en primer lugar, *Sepia*; y en los casos que este no baste, consúltense: *Aur.*, *calc.*, *caust.*, *kali*, *natr. m.*, *phos.*, *silic.*, *sulph.*

Ozena. — Esta enfermedad, verdadera inflamacion crónica de la membrana mucosa de la nariz, acompañada por lo comun de úlceras, grietas y costras en las narices, como de un flujo mucoso ó casi siempre purulento, se trata bien y con exito con los medicamentos siguientes: *Asa. aur.*, *graph.*, *hep.*, *merc.*, *nitri ac.*, *puls.*, *silic.*, *sulph.*, *thuja.* — Las úlceras, grietas y costras, se combaten, si predominan, con: *Aur.*, *graph.*, *merc.*, *nitri ac.*, *silic.*, *sulph.* — Si el flujo purulento predomina: *Merc.*, y si no basta: *Aur.*, *hep.*, *lach.*, *puls.*, *silic.*, *sulph.* — Si la enfermedad tiene un origen sifilítico ó mercurial, dése en primer lugar: *Aurum*. Si este no basta, consúltense, primero *merc.*, si el enfermo no ha hecho abuso de él en dosis alopáticas, y despues: *Asa.*, *hep.*, *lach.*, *nitri ac.*, *sulph.*

Pólipos en las narices. — El medicamento principal contra los pólipos que se forman en las fosas nasales, es

Staphysagria, que se repetirá con frecuencia. Si no fuera suficiente, dése *teucrium*; y si este no bastase, consúltense: *Calc.*, *phos.*, *sepiá*, *silic.*

Neuralgia facial.

(*Neuralgia de la cara.*)

Esta enfermedad tiene una gran semejanza con los dolores de muelas. Los medicamentos homeopáticos bien elegidos, la hacen desaparecer bien pronto. Pero la eleccion de los medicamentos es frecuentemente muy difícil y reclama la mayor atencion por parte del médico. No podemos indicar aqui mas que los principales medicamentos que son necesarios en los casos agudos. Al elegir los medicamentos se atenderá á las indicaciones siguientes, asi como á lo característico de aquellos.

1) En la neuralgia facial que proviene de un cúmulo de sangre en la cabeza, se emplearán: *Bell.*, *bry.*, *glon.*, *nux*; ó: *Acon.*, *lach*, *phos.*

2) En la neuralgia reumática, muy dolorosa, causada por un enfriamiento, dése: *Acon.*, *caust.*, *cham.*, *coloc.*, *merc.*, *puls.*, *rhus*, *spigel.*

3) En la neuralgia propiamente dicha: *Spigel.*: ó: *Bell.*, *china*, *coff.*, *hyosc.*, *nux v.*, *plat.*

Ademas, se empleará *bellad.* cuando los dolores son en el lado derecho: *spigel.*, cuando son en el lado izquierdo; *china* cuando son provocados por el mas ligero tacto. — Si los dolores se presentan fijamente á la misma hora, dése *Spigel.*, ó *chinin* é *ignat.*; cuando aumentan y disminuyen poco á poco: *Stannum* ó *platina*.

Se prescribiran, en los dolores:

Contusivos: *Acon.*, *bell.*, *glon.*, *puls.*, *phos.*

Convulsivos: *Puls.*, *spigel.*

Presivos: *Hyosc.*, *plat.*, *veratr.*

Cortantes: *Bell.*

En los que parecen separar los huesos: *Bell.*, *ign.*, *plat.*, *spigel.*

Damos tambien á continuacion los principales medicamentos empleados contra esta enfermedad, con sus indicaciones especiales.

Aconitum. Neuralgia del lado izquierdo, con calor y rubicundez en las mejillas (R.). — El enfermo está como un loco, se agita en la cama, da gritos, etc.

Arsenicum. Dolores periódicos con grande inquietud, angustia, postracion.

Belladonna. Neuralgia del lado derecho, con rubicundez (ó palidez) de la cara, y acompañada de convulsiones de los músculos de la cara.

(*Bismuthum nitricum*. El enfermo siente alivio paseando, ó gargarizándose con agua fria.)

Causticum. — Los músculos de la cara están paralizados en parte y no se puede abrir la boca. — Neuralgia facial acompañada de dolores reumáticos en las articulaciones.

Coffea. Dolores insoportables que van desde los brazos hasta las estremidades de los dedos. — El enfermo está como fuera de si, habla mucho, está muy agitado, etc. (R.).

Conium. Dolores dislacerantes sobre todo por la noche.

Hepar. Dolores que tienen su asiento en el hueso pómulos, y aumentan con el tacto.

Mercurius. Dolores muy violentos que se estienden por la mitad de la cara; aumentan con el calor de la cama y van acompañados de salivacion.

Mezereum. Dolores espasmódicos, con adormecimiento en la region de los pómulos; se estienden á las sienas, oidos, dientes, al cuello y espalda.

Natrum mur. Acesos periódicos, sobre todo despues de una fiebre intermitente cortada (R.).

Nux vomica. El ojo del lado afecto se pone encarnado y lacrimoso (R.). — La constitucion del enfermo indicará ademas la *nux*.

Platina. Dolores presivos. — Sensacion de frio é insensibilidad en la region de los pómulos.

Pulsatilla. Cuando la constitucion del enfermo lo indique.

Sepia. Este medicamento es frecuentemente muy ventajoso contra la neuralgia y dolores de muelas de las mugeres embarazadas (Baehr).

Spigelia. Neuralgia del lado izquierdo; va acompañada de convulsiones y dolores dislacerantes, reaparece siempre á las mismas horas y se presenta con palpitaciones de corazon. — Cara pálida, desfigurada con frecuencia y abotagada.

Sulphur. En las personas psóricas, si los medicamentos anteriores no producen efecto, ó es pasajero.

Thuja. Dolores que parten del pómulo izquierdo, cerca del oido, que se estienden á los dientes y nariz, ó por los ojos á las sienes, é invaden toda la cabeza. — La parte enferma abrasa como el fuego, y es muy sensible á los rayos del sol.

(Se recomienda tambien el empleo alternativo de *thuja*, y *china*, ó de *thuja* ó *cocculus*. — Wolf da *argentum nitricum* cuando no hay indicacion de otro medicamento. — Tambien *zincum valerianicum* y *ammonium valerianicum*, en trituraciones ó atenuaciones bajas, se emplean ventajosamente. Lo mismo sucede con *china* y *ferrum* administrados á personas débiles y anémicas.

En cuanto á las dosis de los medicamentos y su repeticion, el mismo Dr. Baehr, tan partidario de las bajas atenuaciones, reconoce que dando dosis fuertes y frecuentes, se ve agravarse la enfermedad peligrosamente. Asi es que vale mas servirse de atenuaciones medias ó altas, retrasar el medicamento si hay alivio, y no repetir las dosis mas que cuando la enfermedad seagrava.

Oidos.

Otalgia. — (*Dolores de oidos*). — Los principales medicamentos contra los dolores de oidos, son: *Arn.*, *bell.*, *cham.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *rhus.*, *sulph.*

Arnica. Sensacion de presion, lancinante, de dislaceracion y calor. Sensibilidad al ruido.

Belladonna. Dolores que se presentan por accesos, que aumentan con el tacto y el movimiento (Despues de *bellad.* conviene *hepar.*).

Chamomilla. Fuertes punzadas como si fueran producidas por cuchillos; dolores tensivos que llegan hasta el lóbulo de las orejas.

Mercurius. Sensacion de frio en los oidos y agravacion de los dolores con el calor de la cama; dolores lancinantes, profundos, dislacerantes, que se propagan á los dientes y megillas.

Nux vomica. Personas cuya constitucion reclama *nux v.* — Dolores dislacerantes y lancinantes.

Pulsatilla. Oido hinchado é inflamado en su parte exterior — Personas cuya constitucion es de *puls.* — Dolores como de sacudidas y dislacerantes.

Rhus. Dolores despues de un enfriamiento del cuerpo estando sudando.

Sulphur. Dolores dislacerantes y lancinantes que se propagan á la cabeza y garganta. — Sensibilidad escensiva del oido al mas pequeño ruido.

En los casos crónicos, ó si los medicamentos indicados arriba no producen efecto, y si hay á la vez erupciones, dése *merc.* y *sulph.* y aun *calc.*; cuando haya sensacion de frio ó insensibilidad de los oidos, *platina.*

Otitis. — (*Inflamacion de los oidos.*) — Contra la otitis interna aguda, el medicamento especifico, por decirlo asi, es *Pulsatilla*, cuyas dosis se tomaran con frecuencia. Si el cerebro se afecta á la vez, y hay dolor de cabeza, delirio, angustia, vómitos, frio, etc., dése *belladonna.*

Si *puls.* y *bell.* no producen efecto alguno, ó bien no concluyen con la enfermedad, consultense: *Hepar*, *mercurius*, *silicea* ó *sulphur*, que concluirán con la enfermedad y ayudarán á dar salida al *pus.*

En la otitis externa *puls.* es igualmente el medicamento principal y si no basta: *Bell.*, *merc.*, *sulph.*

Otorrea. (*Flujó de oidos.*) — Es menester ante todo

investigar la naturaleza del flujo y su causa. Se dará, cuando el flujo es :

De cera líquida : *Con., merc.*

De mucosidades : *Merc., puls.* ; ó : *Calc., lyc.*

De pus : *Puls., silic.* ; ó : *Calc., lyc., merc.*

De sangre : *Calc., merc., nitri ac., puls., sulph.*

De sérosidades : *Caust., merc., nitri ac.*

Amarillento : *Phos.*

Fétido : *Aur., carb. v. caust., hep., zinc.*

Después del sarampión : *Puls., ó sulph.*

Después de la escarlatina : *Bell., después merc., luego bell., hep.*

Después de las viruelas : *Merc., ó hep., silic.*

Si persiste después de una otitis aguda : *Merc., puls., sulph.*

Después del abuso del mercurio : *Aur., asa, hep, nitri ac., silic., sulph.*

Después del abuso del azufre : *Puls., ó merc.*

Si coexiste con infarto de las glándulas del cuello : *Puls, merc., ó bell., hepar.*

Si la otorrea se suprime de repente, ya por un enfriamiento, ya por otra causa : *Bell., merc., puls.* ; ó *bry., dulc., nux v.*

Pólipos en los oídos. — *Calcarea y staphysagria* son los medicamentos principalmente recomendados. — *Kali bich.* aplicado exteriormente (á la 1^a. ó 2^a. atenuacion) reduce y hace caer el pólipo.

Sordera. — Si es congestiva, dénese : *Aur., bell., graph., merc., phos., silic., sulph.*

Si es nerviosa : *Caust., mur. ac., petr., phos., veratr.*

Si es reumática : *Ars., bell., merc., puls., sulph.*

Si proviene de una erupción crónica suprimida : *Sulph.* , y si no basta : *Antim., caust., graph.*

Después de la escarlatina : *Bell., hep.* — Después del sarampión : *Puls. ó carb. v.* — Después de las viruelas : *Merc. Sulph.* —

Después de fiebres intermitentes suprimidas con el

sulfato de quinina: *Puls.*, y luego *Calc.*: ó bien: *Carbo v.*, *hep.*, *nux v.*, *sulph.*

Por el abuso del mercurio: *Hepar*, y si no basta: *Asa fet.*, *nitri ac.*, *staph.*, *sulph.*, ó *aur.*

Despues de fiebres lentas y de curso largo: *Phos.*, y si no basta, dense: *Arn.*, *cocc.*, *phos. ac.*, *veratr.*

Si la sordera es incipiente, consúltense: *Bell.*, *calc.*, *hyosc.*, *lyc.*, *nitri ac.*, *op.*, *petrol.*, *puls.*, *secal.*, *silic.*, *sulph.*

Si los oidos parece que estan fuertemente tapados: *Lyc.*, *puls.*, *silic.*

Si hay paralisis del nervio acústico: *Bell.*, *hyos.*, *puls.*, *silic.*

Para la sensibilidad grande del oido á los ruidos: *Aur.*, *coff.*, *lyc. sep.*, *spig.*

Ojos.

Amaurosis. — (*Ambliopia amaurotica* — *Debilidad de la vista*). — Los mejores medicamentos contra la amaurosis son: *Aur.*, *bell.*, *calc.*, *china.*, *dros.*, *merc.*, *natrum. m.*, *nux v.*, *phos.*, *ruta*, *sepia*, *silic.*, *sulph.*, *veratr.* O bien, en segundo lugar: *Agar.*, *cann.*, *caust.*, *cina*, *croc.*, *dig.*, *kali*, *magn.*, *plumb.*, *spig.*, *zinc.*

Si su causa ha sido el haberse dedicado á trabajos finos, imperceptibles, consúltense de preferencia *Ruta*, y despues *bell.*, y si estos no bastan: *Carb. v.*, *china*, *spigel.*

Si es debida á pérdidas de sangre, flujo blanco ó diarreas, excesos sexuales: *China*, *cina*, *phos.*, *sep.*, *sulph.*

Si depende de haber recibido fuertes golpes en la cabeza: *Cicuta*, y despues: *Arn.*, *con.*, *ruta*, *staph.*

Despues de la supresion de la menstruacion, hemorroides, epixtasis, etc., *Calc.*; despues, *Lyc.*, *nux v.*, *phos.*, *puls.*, *sulph.*

Despues de la supresion de una erupcion: *Bell.*, *calc.*, *caust.*, *lach.*, *merc.*, *phos.*, *sulph.*

Despues de padecimientos sífilíticos: *Sulph.*, y en segundo lugar. *Bell.*, *merc.*, *nitri ac.*, *sassap.*, *silic.*

Por el abuso del mercurio: *Hepar*: y despues: *Bell.*, *nitri ac.*, *silic.*, *sulph.*

Si es debida á dolores de cabeza crónicos: *Aur.*, *bell.*, *calc.*, *nux v.*, *phos.*, *puls.*, *sep*, *sulph.*

En las personas que han abusado de las bebidas alcohólicas: *Lach.*: y despues: *Calc.*, *hyosc.*, *nux v.*, *op.*, *sulph.*

Edema de los párpados.) — (*Hinchazon de los párpados.*) — Los principales medicamentos contra el edema de los párpados, son: *Apis*, y despues *baryt. c.*; si estos no bastasen, consúltense: *Ars.*, *bry.*, *hepar*, *merc.*, *rhus*, *sulph.*

Estrabismo. — (*Ser vizco.*) — El principal medicamento contra el estrabismo es *Hyosycamus*; si este no bastase, consúltense: *Alum.* y *bell.* En los niños depende muchas veces de las lombrices. En estos casos se combate perfectamente con *merc.* y *sulph.*

Fistula lagrimal. — *Tumor lagrimal* — *Obstruccion del conducto lagrimal.*

La fistula lagrimal se combate perfectamente con el tratamiento homeopático. Los principales medicamentos para conseguir la curacion radical, son, en el orden que los enumeramos: *Natr. carb.*, *puls.*, *sulph.*, *calc.*, *silic.*, *petrol.*, *lyc.*, *stann.*

El tumor lagrimal, que tan doloroso es, y que si no se combate bien y se evita su frecuente reproduccion, suele convertirse en fistula, se trata principalmente con *Hepar*; y si este no basta, consúltense: *Bell.*, *merc.*, *puls.*, *silic.*, *sulph.* — Para evitar su frecuente reproduccion, dése *Sulph.*, y luego *calc.*

La obstruccion del conducto lagrimal, debida la mayor parte de las veces á una supuracion producto de una inflamacion crónica del mismo. ó engrosamiento ó tumefaccion de la membrana mucosa, se combate con

Silicea; si este no bastase, dénse: *Sulph.*, *calc.*, *lyc.*, *natr. m.*, *puls.*, *sep.*

Hemeralopia. — (*Ceguera nocturna.*) — El mejor medicamento para combatir la ceguera que se declara desde que se pone hasta que sale el sol, es: *Veratrum*; si este no fuera suficiente, consúltense: *Bell.*, *merc.*, *puls.*, ó *hyos.*, *nux v.*

Miopia. — (*Vista corta.*) — Si no es congénita exige principalmente: *Phos.*, *puls.*; ó: *Calc.*, *china*, *con.*, *euphr.*, *hyosc.*, *lach.*, *lyc.*, *phos. ac.*, *rhus*, *sulph.*

Neuralgia ocular. — Contra los dolores neurálgicos de los ojos, ó la neuralgia ocular, el principal medicamento es *Spigelia*; si este no bastase dése, *bell.*; y si aun hubiera necesidad, consúltense: *Chelid.*, *chinin*, *puls.*, *hyosc.*, *coloc.*, *sulph.* y *calc.*

Nictalopia. — (*Ceguera diurna.*) — El mejor medicamento contra la ceguera que se declara desde que sale hasta que se pone el sol, es *Acon.* Si este no basta, dése *Merc.*; y si ninguno de los dos es suficiente, consúltense: *Con.*, *nux v.*, *phos.*, *silic.*, *stram.*, *sulph.*

Oftalmia y Blefaritis. — (*Inflamacion de los ojos y de los párpados.*) — Comprendemos ambas enfermedades en un mismo capitulo, porque casi siempre se presentan juntas, y aun cuando asi no sea, su terapéutica viene á ser la misma generalmente. Solo haremos mencion de las oftalmias mas frecuentes y que los profanos á la medicina pueden tratar homeopáticamente, á reserva siempre de no haber médico homeópata en la localidad.

La *oftalmia de los recién nacidos* se presenta generalmente en los primeros ocho dias despues del nacimiento, ó á las veinticuatro ó cuarenta y ocho horas. Unos la atribuyen á la intensidad de la luz á que se exponen los ojos; los otros al fresco del aire que toca los ojos de los niños. La causa mas frecuente es sin duda la infección que tiene lugar durante el trabajo del parto. No es necesario que la madre haya padecido ó padezca sífilis; la leucorrea solo un poco fuerte puede ocasionar esta enfermedad. El borde de los párpados se pone en-

carnado, se hinchan, segregan un liquido mucoso, puriforme, amarillento, generalmente irritante y corrosivo, haciéndose cada vez mas espeso y purulento.

En el tratamiento de esta enfermedad es necesario limpiar los ojos con cuidado (de hora en hora lo menos), ya por medio de una pequeña geringa de cristal, con la cual se hacen inyecciones de agua tibia en los ojos, ya con una pequeña esponja fina humedecida en agua tibia; secándolos luego con un paño ó pañuelo de hilo. Las personas que limpian los ojos de los niños, tendran cuidado de no llevar las manos á sus ojos, antes de lavarlas. Si se limpian con asiduidad los ojos, los medicamentos homeopáticos curarán casi siempre esta gravísima enfermedad, haciendo desde su principio que sea menos grave y rápida en su curso. Solo asi se evita el que los niños pierdan los ojos, y no sometiéndoles á las torturas del tratamiento alopático.

El medicamento principal contra la oftalmia de los recién nacidos es: *Chamomilla*, que se procurará dar con bastante frecuencia, cada tres ó cuatro horas, dos glóbulos en la lengua de cada vez. Si hubiera fiebre, con agitacion, etc., dése *acon.* primero hasta que rebagen los sintomas febriles, y recúrrase enseguida á *cham.* Si estos medicamentos no bastan, consúltense: *Apis.*, *ars.*, *bell.*, *hep.*, *lyc.*, *merc.*, *rhus.*, *thuja.* Si la secrecion aumenta y toma un caracter purulento, y no basta *cham.*, dése *merc.*, y luego *hepar* ó *silic.* si *merc.* no la corrigiese. (El Dr. Goullon recomienda *lycopodium* interiormente á la 30ª, y exteriormente en inyecciones á la 6ª. — Wolf, por el contrario recomienda *thuja* y *apis*; y algunos médicos americanos, *arsenicum.*)

La *oftalmia escrofulosa* es una enfermedad muy frecuente; se cura mas facilmente y con mas seguridad con la homeopatia que con la alopata. Se encuentra por lo comun en los niños y personas que han presentado por mas ó menos tiempo sintomas escrofulosos. (Infarto de las glándulas, erupciones, etc.). El primer sintoma es casi siempre una grande fotofobia (horror á

la luz); es el que se resiste mas á la curacion. Los principales medicamentos, ademas de una buena alimentacion, aire puro y limpieza, son: *Acon.*, *bell.*, *calc.*, *con.*, *hep.*, *merc.*, *rhus*, *sulph.*

Aconitum. Conviene al principio de la enfermedad, cuando hay gran inyeccion en las conjuntivas, temor á luz, dolores, etc.

Belladonna. Despues de *acon.*, y si persiste la fotofobia, con fuerte y dolorosa inflamacion de los ojos.

Conium (ó *hyoscyamus*). La inflamacion y los dolores son de poca importancia. — Un verdadero espasmo impide á los párpados el abrirse.

Mercurius y hepar. Ulceras en la córnea, con erupcion en derredor de los ojos y picor en la piel de la cara:

Sulphur y calcarea. Véanse: *Sint. car. gen.*

Rhus. Una fuerte rubicundez erisipelatosa invade los párpados, con pinchazos (G.).

Los medicamentos se daran dos ó tres veces al dia, durante tres ó cinco, luego se disminuyen las dosis, y si hay alivio suspéndanse la medicacion á no ser que la enfermedad se agrave.

La *oftalmia catarral* se trata con: *Acon.*, *ars.*, *bell.*, *euphr.*, *hepar*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*

La *oftalmia reumática*, con: *Acon.*, *bry.*, *euphr.*, *merc.*, *puls.*, *rhus*, *spigel.*, *sulph.*, *veratr.*

La *oftalmia sifilitica*, con: *Merc.*, *nitri ac.*; ó *puls.* si proviene de una gonorrea ó blenorragia suprimida.

La *oftalmia blenorragica* con: *Acon.*, *china*, *Nitri ac.*, *puls.*, *apis*, *sulph.*

La debida á causas traumáticas (golpes, contusiones, introduccion en los ojos de cuerpos estraños), con: *Acon.*, *arn.*, *hep.*, *puls.*, *ruta*, *sulph.*

La debida al abuso del mercurio, con: *Hepar*, *nitri ac.*, *puls.*, *sulph.*

La debida á cansancio de los ojos por trabajos escesivos, con: *Arn.*, *bell.*, *carb. v.*, *ruta* y *spigel.*

Orzuelo. — El principal medicamento contra los

orzuelos, es *Puls.*; que se repetirá con frecuencia; si no bastase, dése, *staph.* Si los dolores fueran vivos, punzantes, *hepar.* Si va acompañado de inflamacion del párpado é inyeccion de las conjuntivas oculares, *bell.* En caso de necesidad, consúltense ademas: *Amm., graph., sep., silic.*

Parálisis de los párpados. — Los medicamentos principales, son: *Veratrum*; si este no basta, dése *Sepia*, y si-tampoco este fuera suficiente *Zincum*. En caso de necesidad, consúltense: *Alum., bell., graph., lach., plumb., rhuis., spigel, stram.*

Presbicia. — (*Vista cansada*). — Los medicamentos principales segun el orden de su enumeracion, son los siguientes: *Calc., carb. an., con., baryt., dros, sep., natr. m., sulph, silic., lyc.*

Úlceras, opacidad y manchas en las corneas. — Contra las úlceras de la córnea, se emplean: *Sulph., calc., silic., merc., euphr., natr., ars., hep., lach.*

Contra la opacidad ú oscurecimiento: *Sulph., euphr., cann., puls., nitri ac., magn.*

Contra las manchas: *Sulph., silic., nux v., hep., puls., bell., nitri ac., sep., cina.*

Iriamos demasiado lejos si hablásemos de las demas enfermedades de los ojos menos importantes y frecuentes que las descritas. Nos contentaremos con mencionar los principales medicamentos en las enenfermedades de los ojos, segun Bönninghausen y Lippe.

Aconitum. Fotofobia. ((*Bell.*) — Oftalmia muy dolorosa y secrecion abundante de los parpados. — Parpados inflamados, rojos y duros (*Thuja*).

Apis. Hinchazon edematosa de los párpados.

Arsenicum. Inflamacion escrofulosa de los parpados, con úlceras, en los bordes internos. (B.)

Belladonna. Temor á la luz (*Acon*). — Ectropion. — Hemeralopia. — Nictalopia. — *Vista doble; vision de chispas*; los objetos parecen rojos. — Estrabismo. — Parálisis de los nervios de los ojos.

Bryonia. Oftalmia en las personas que sufren de la

gota. — Sensacion como si los globos oculares saliesen de sus órbitas.

Calcareo carb. Manchas ó úlceras en la córnea. — Los ojos lloran por la mañana temprano, asi como al aire libre (R). Dolores punzantes en los ojos durante la lectura, á la luz de las velas (*Merc.*)

Carbo veg. Dolores y debilidad en los ojos, que provienen de que el enfermo ha forzado demasiado su vista, ó se ha dedicado á trabajos muy finos y delicados. — Hemorragias oculares. ((*Calc. c., cham., nux v.*).

China. Debilidad de la vista á causa de hemorragias.

Cina. Debilidad de la vista á causa del onanismo. (L.) — Dolores en los ojos leyendo á la luz de las bugias. — Alivio enjugando los ojos.

Cocculus. Dolores, como si arrancasen los ojos (acompañados de dolores de cabeza). (L.) — Imposibilidad de abrir los ojos durante la noche. (*Sep.*)

Conium. Catarata á consecuencia de una conmocion cerebral ó golpes. — Se ven los objetos rojos (*Bell., hyos., hep., sulph.*) — Vista corta (*miopia*). (*Puls. phos.*)

Crocus. Párpados agitados por un movimiento nervioso. — Inclinacion á comprimir ó á enjugar los párpados. — Ojos que lloran cuando se quiere leer. (Dr. Bell.) — Dolores lancinantes y calor en los ojos despues de operaciones quirúrgicas (L.).

Dulcamara. Oftalmia ocasionada por un enfriamiento. — Movimientos convulsivos de los párpados (y de los labios) al aire frio.

Euphrasia. Ojos pegados por la noche. — Oscurecimiento de la córnea y oftalmia á causa de lesiones mecánicas en los ojos. — Fotofobia. — Ojos con lagañas, lagrimas, irritacion y pinchazos.

Hepar. Ulceras en las córneas. — Se ven los objetos rojos (*Bell., con.*) — Los párpados duelen como si tuvieran heridas.

Hyoscyamus. Oclusion espasmódica de los párpados.
— Estrabismo. — Hemeralopia.

Ignatia. — Inflamacion de la parte superior del globo ocular. — Movimientos convulsivos de los globos oculares.

Kali c. Elevaciones (como pequeños sacos) entre los párpados y las cejas. — Sensacion de frio en los párpados.

Lycopodium. La luz del dia y aun la del sol afecta poco los ojos, pero la luz de las bugias los afecta por el contrario considerablemente (Dr. Bell).

Mercurius. Horror á la luz y al fuego. — Dolores agudos en los párpados. — Ulceras y costras en sus bordes.

Nux v. Hemorragia ocular. — Sufusion de sangre bajo la conjuntiva ocular.

Phosphorus. Catarata (ó glaucoma) en su principio. — Haya livio si se tiene cuidado de estar en la oscuridad, ó bien con los dias nublados. — Pérdida momentánea de la vista, como por desfallecimiento. — Todo lo que se vé parece negro.

Pulsatilla. Orzuelo (principalmente en el párpado superior) — Fistula lagrimal. — Ojos llorosos al aire libre y con el viento.

Sepia. No se pueden abrir los ojos por la noche. — Párpados que hacen sufrir por la mañana al despertar, como si fueran demasiado pesados. — Orzuelo. — Gran sensibilidad á la luz del dia (L.).

Silicea. — Vista cansada (presbicia). — (*Sepia*). — Deslumbramientos.

(*Kali c.*) — Catarata. (*Euphr. puls., sulph., con.*) — Infarto de la glándula lagrimal. — Ojos que lloran al aire libre.

Spigelia. Dolores en el fondo del globo ocular, principalmente moviendo los ojos. — Párpados colgantes, duros, inmóviles. — Circulos amarillentos en derredor de los ojos.

Thuja. El enfermo está mejor cubriendo con una

cosa caliente los ojos (L.). — Reblandecimiento inflamatorio del lado interno de los párpados. (L.) Hinchazon inflamatoria y dura de los párpados (L.).

Veratrum. Coloracion azulada y amarilla de lo blanco de los ojos — Contraccion ó parálisis de los párpados (superiores). — El globo del ojo está vuelto hacia arriba. — Circulos verdes en derredor de los ojos. —

Opio.

Lo primero que hay que hacer en un envenenamiento por el opio, es hacer tomar al envenenado con frecuencia tazas de café bien concentrado, hasta que empiecen á disminuir los primeros sintomas. Si no hubiera café disponible, puede darse en su lugar vinagre mezclado con agua; pero si hay café, prefírase este al vinagre. Luego que los sintomas mas graves hayan rebajado, disuélvanse seis ú ocho globulos de *ipecacuanha* en medio vaso de agua, y dése al enfermo una cucharada de tres en tres horas; siguiendo con dicho medicamento hasta que se consiga la curacion, pero dándolo á intervalos mas largos. Si *ipéc.* no bastase, recúrrase á *bell.*, que acabará la curacion.

Para los sufrimientos consecutivos al abuso del opio en dosis alopáticas, el principal medicamento es: *Belladonna*. Si este no bastase, consúltense: *Nux v.* y *merc.* — *Coffea* conviene para el insomnio y agitacion.

Orinas.

Las *enfermedades de las vias urinarias* no pueden ser tratadas en general por cualquiera persona, por que su diagnóstico y la justa apreciacion de la enfermedad fundamental son aqui de la mayor importancia. La enfermedad fundamental puede ser de la mayor importancia, como hemos dicho, y de naturaleza muy diferente. Puede existir una afeccion de los riñones ó de la vegiga,

calculos nefríticos ó vesicales, estrecheces de la uretra ó enfermedades de la próstata, etc. Solo el médico puede distinguir estos casos. Así es que no hablaremos mas que de las enfermedades menos graves y mas comunes de las vias urinarias, en las que, las personas que no tienen conocimientos médicos deberán guiarse por la causa que las ha producido, para poder tratarlas con mas éxito.

Si la causa es:

Un enfriamiento, dénse: *Acon.*, *bell.*, *calc.*, *dulc.*, *nux v.*, *puls.* (Véase: *Enfriamiento.*)

Una caída, un golpe, una sacudida: *Arn.*; ó: *Con.*, *rhus*, *puls.*

El abuso de las bebidas alcohólicas: *Nux v.*; ó: *Ars.*, *bell.*, *calc.*, *coff.*, *ign.*, *lach.*, *op.*, *puls.*, *zinc.*

El abuso de las cantáridas (por ej. en vegigatorios): *Camphora*; ó: *Acon.*, *nux v.*, *puls.*

Si el cuerpo se ha mojado por completo, ó si el padecimiento ha sido producido por trabajar en el agua, dénse: *Puls.*; ó: *Bell.*, *calc.*, *hepar*, *lyc.*, *nux m.*, *rhus*, *sepia*, *silic.* (*Cepa*, cuando los pies se han mojado). (Véase: *Enfriamiento.*)

Si la causa depende de almorranas mal tratadas: *Acon.*, *arn.*, *apis.*, *merc.*, *sulph.* (Hg.).

Ademas, se darán en los casos

de deseo inutil de orinar: *Canth.*; ó: *Acon.*, *arn.*, *camph.*, *caust.*, *coloc.*, *hyosc.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*

Cuando hay deseo nocturno y frecuente de orinar: *Bry.*, *caust.*, *kreos.*, *graph.*, *hep.*, *lyc.*, *nux v.*, *rhus.*, *spigel.*, *sep.*, *sulph.* (B.).

Cuando la orina sale gota á gota: *Canth.*, *sulph.*; ó: *Arn.*, *camph.*, *dulc.*, *staph.*

Cuando hay retencion de orina: *Canth.*, *lyc.*, *stram.*; ó: *Acon.*, *arn.*, *camph.*, *hep.*, *hyosc.*, *op.*, *puls.* (*Stram.* cuando la secrecion de la orina está completamente suprimida.)

Si los sufrimientos tienen lugar:

Antes de orinar, dense: *Bor.*, *coloc.*, *nux v.*, *puls.*;

ó: *Arn.*, *bry.*, *rhus*, *sulph.* — (*Merc.* si se presentan al empezar á orinar).

Mientras se orina: *Cann.*, *canth.*, *hep.*, *lyc.*, *merc.*, *phos. ac.*, *puls.*, *thuja*.

Despues de orinar: *Canth.*, *coloc.*, *hep.*, *natr. m.*

Insertamos á continuacion los medicamentos principales contra las enfermedades de las vias urinarias, y contra la secrecion anormal de la orina, con sus indicaciones especiales.

Aconitum. Orina encarnada y caliente. — Miccion acompañada de angustia, y frecuentemente de una transpiracion abundante. — Es el mejor medicamento que se puede dar á los recién nacidos, que no pueden orinar los primeros dias (G.).

Apis. Ardor y punzadas dolorosas en la uretra durante, antes y despues de orinar (G.). — *Enfermedades de las vias urinarias* despues de erupciones suprimidas (despues de la urticaria), ó si las erupciones no brotan por completo. — El vientre es muy sensible á la menor presion y al mas leve tacto. (Hg.)

Arnica. Despues de una caida, un golpe, una conmocion. Cuando hay sintomas de fiebre é inflamacion, se le alterna con *acon.*, dando este primero, y despues *arn.*) — Retencion de orina, causada por el espasmo del esfinter de la vegiga. — Deseo inutil de orinar (B.).

Belladonna. Retencion de orina ó emision dificil de algunas gotas de orina mezclada con sangre; con pinchazos dolorosos, que van desde los riñones á la vegiga de la orina, angustia, inquietud, cólicos. (Si *bell.* no basta se da *hep.*) (Hg.). — Retencion de orina en los niños, acompañada de gemidos y gritos repentinos (G.).

Cantharis. Deseo frecuente de orinar, acompañado de dolores y cólicos tan violentos, que el enfermo no puede menos de gritar. — Orina mezclada con sangre frecuentemente. — Emision frecuente de orina con cólicos y dolores quemantes. — *En los niños* que gritan mucho al orinar unas cuantas gotas solamente.

Chamomilla. Deseo de orinar, con angustia; orina;

orina caliente. — Emision frecuente de una gran cantidad de orina acuosa (G.).

Cina. La orina se vuelve espesa, coma la escarcha.

Conium. La emision de la orina no es continúa, sino muy intermitente.

Hepar. Orina ácida, urente, corrosiva; mezclada de sangre.

Lycopodium. Emision de orina precedida de fuertes dolores dorsales que desaparecen orinando (G.). — Orinas con arenillas encarnadas. — Mucho gorgoteo en el vientre.

Mercurius. Orina acre, corrosiva, de olor ágrío ó nauseabunda. — Deseo continuo de orinar, frecuentemente con transpiracion.

Incontinencia de orina. — Se observa con mas frecuencia en las mugeres. — Cuando sea provocada por la tos, déense: *Antim. cr.*, *bry.*, *caust.*, *natr. m.*, *puls.*, *spong.*, *staph.*, *veratr.*; por las ventosidades: *Puls*. Si se verifica por el dia: *Ferr.*; durante el primer sueño: *Sep.* (Hg.).

Para los que se orinan en la cama recomienda B. los medicamentos siguientes: *Sep.* en los onanistas. — *kreos.* cuando la persona se orina en lo mas profundo de su sueño. — *Puls.* cuando esta enfermedad aumenta en el otoño. — *Silicea* para los niños que padecen lombrices (si *silic.* no basta *cina* concluirá la curacion — Alvarez). — Ademas se pueden emplear ventajosamente los medicamentos siguientes:

Sulph. Niños pálidos y demacrados, cuyo vientre está abultado, los que no quieren que se les lave, y que desean alimentos acidos y dulces (Hg.).

Calcarea. Niños gruesos, obesos, con cara encarnada, que sudan y se enfrian facilmente (Hg.).

Mercurius. Niños que transpiran mucho, y cuyas orinas son cálidas, acres, de olor fuerte (Hg.).

Silicea. Niños de cabellos rubios y ojos azules, especialmente si se han vuelto enfermizos despues de la

vacunacion, tienen glándulas infartadas, ó si tienen los dedos ulcerados en la raiz de las uñas (Hg.).

Causticum. Niños de ojos y cabellos negros, que se orinan durante el primer sueño; no pueden hacer de vientre mas que estando de pié (Hg.).

Bell., *cina*, *ferr.*, *puls.*, *rhus* son tambien de utilidad.

Segun Wolf thuja es el medicamento principal. (Dícese que no produce efecto mas que en las personas cuyas manos estan llenas de verrugas. Dr. Smith.)

Es preciso ver que posicion tiene el niño durante el sueño. Si está de espaldas: *Puls.*, *rhus.*; ó: *Calc.*, *ferr.*, *nux v.*, *sulph.*; sobre el vientre: *Bell.*; ó: *Calc.*, *puls.*

En esta enfermedad se obtiene mas exito dando dosis á altas atenuaciones y de tarde en tarde, que dándolas á bajas atenuaciones y con frecuencia.

Ovarios.

Contra la inflamacion del ovario, ya del lado derecho, ya del izquierdo, ó de ambos á la vez, se recomienda en primer lugar *Acon.*, si hay sintomas febriles, con dolores agudos, intensos, pungitivos. En segundo lugar están indicados; *Apis* (sobre todo si la inflamacion reside en el ovario izquierdo con dolores constrictivos), *bell.* (si la inflamacion está en el ovario derecho), *lach.* y *merc.* Si estos medicamentos no bastan, consúltense: *Canth.*, *lyc.*, *staph.*

Contra los quistes del ovario se aconsejan: *Lyc.*, y si este no basta, *Sulph.*, *ars.*, *graph.*, *lach.*, *plat.*

Contra la hidropesia de los ovarios: *Apis*, *dulc.*, *helleb.*, *sabina.*

Padecimientos morales.

Las emociones violentas provocan frecuentemente enfermedades corporales y mentales. El medicamento

debe elegirse atendiendo siempre á las causas y síntomas concomitantes.

Si la emoci3n es la consecuencia de un *despecho*, y va acompañada :

De cólera, arrebató, irritaci3n, se da : *Cham.*

De miedo ó ansiedad : *Acon.*

De una pena oculta, aficci3n ó vergüenza : *Ign.*

Si hay indignaci3n y despecho escesivos, hasta el punto de arrojar cuanto se tiene á mano : *Staph.* (ó *coloc.*).

Turbaci3n del espíritu ó pensamiento : *Veratr.*

Inquietud, temor, indiferencia : *Ars.*

Si la enfermedad debe su origen á un fuerte susto, dése inmediatamente despues del susto : *Opium*; mas tarde : *Acon.* y *bell.*

Despues de una violenta emoci3n causada por la alegría, dése : *Coffea.*

Si hay convulsiones y despertar con sobresalto : *Hyosc.*

Locura, manía de sermonear y declamar, y gran sensibilidad del cuello : *Lach.*

Si la menstruaci3n ha sido demasiado abundante : *Plat.*

Si se ha suprimido : *Puls.*

Si el enfermo sufre de ansiedad, y mucho durante la noche : *Merc.*

Si tiene deposiciones involuntarias, sudor frío ó frío glacial : *Veratr.*

Cuando la enfermedad ha sido causada por los celos : *Hyosc.* ó *lach.*

Por una aficci3n ó pena : *Ign.*, ó *phos ac.*, ó *staph.*

Por una humillaci3n ó mortificaci3n : *Coloc.*; ó : *Bell.*, *ign.*, *plat.*, *puls.*, *staph.*

Por un amor desgraciado : *Ign.*, *phos. ac.* — *Hyosc.* cuando va acompañado de celos.

Por una cólera ó contrariedad : *Nux v.*, ó *bry.*, *cham.*, *acon.*, *platin.*, *staph.*

Melancolía. — Los principales medicamentos contra

la melancolia en general, son: *Aur.*, *ign.*, *natr. m.*, *nux v.*, *veratr.* Tambien pueden consultarse en segundo lugar: *Anac.*, *antim. cr. ars.*, *bell.*, *lach.*, *puls. stram.*, *sulph.*

Para la melancolia negra se aconsejan: *Aur.*, *nux v.*; ó: *Ars.*, *lach.*, *graph.*, *merc.*, *sulph.*

Para la melancolica dulce: *Ignat.*, *phos. ac.*, *puls.*, *veratr.*

Para la melancolia religiosa: *Aur.*, *lyc.*, *puls.*, *sulph.*, *veratr.*

Nostalgia. — (*Amor al pais.*) — Los mejores medicamentos, son: *Caps.* si hay rubicundez en las megillas; *Merc.*, si hay angustia y sudor durante la noche; *Phos. ac.* si el enfermo se demacra; fiebre lenta ademas con sudores abundantes al amanecer.

Panadizo.

Los principales medicamentos contra el panadizo, son: *Graph.*, *hepar*, *merc.*, *silic.*

Graph. cuando empieza y es superficial.

Hepar cuando es mas profundo, ocupa una gran estension y hay dolores punzantes con gran rubicundez, y se notan sintomas de supuracion.

Merc. cuando la piel está pálida no obstante ocupar el panadizo una gran estension. O bien hay dolores profundos, el panadizo se ha abierto, y sale pus mezclado con sangre.

Silic. cuando se han interesado los huesos, los dolores son insufribles, penetrantes, profundos, el panadizo tarda en abrirse, la supuracion se verifica con lentitud; ó bien despues de abierto la supuracion es fétida, inagotable, y hay temores de caries ó necrosis del hueso.

Tambien pueden consultarse ademas: *Apis.*, *lach.*, *lyc.*, *sulph.*

Se recomienda tambien *asa fet.* cuando se ha declarado la caries.

Pantorrias (*Calambres en las*).

El medicamento principal contra los calambres en las pantorrias, es: *Veratrum.*; si no basta, dése: *Cuprum m.* Si tampoco este fuera suficiente, consúltense: *Camph., coloc., sulphur.*

Parálisis.

Se elegirán los medicamentos atendiendo á la causa de la enfermedad, y segun las regiones ó los órganos paralizados. Se prescriben:

Contra la parálisis que sigue á la apoplegia: *Arnica, cocculus, lachesis* ó bien: *Bell., caust., nux v., rhus, sulph.*

Contra la parálisis de naturaleza reumática (sobre todo despues de haberse mojado todo el cuerpo): *Rhus, ó: Calc., caust., dulc., led., sulph.*

Ademas, se dará con ventaja en la parálisis:

De los párpados superiores: *Caut. (G.), sep., spig., veratr.*

De los músculos de la cara: *Caut. y graph.*

De la lengua y organos de la voz: *Bell., caust., dulc., hyosc., lach., stram.*

De la vegiga de la orina: *Ars. (G.)* ó: *Bell., dulc., hyosc.*

No podemos hablar aqui de la parálisis que proviene de un envenenamiento ó de graves enfermedades del cerebro ó de la médula espinal.

Parótidas.

Parotitis. — (*Inflamacion de las parótidas*). — Los principales medicamentos son los siguientes:

Mercurius. — Si el tumor es pálido. Este medicamento es el específico en la mayoria de los casos.

Belladonna. Si el tumor presenta una rubicundez erisipelatosa, fiebre aguda; ó si se presentan sintomas

cerebrales con desaparicion del tumor. Si *bell.* no basta, dése *hyosc.*

Apis. Si la rubicundz es poco intensa, y hay dolores lancinantes y urentes.

Pulsatilla ó *mercurius, sulphur.* Si el tumor desaparece y se afectan los testículos.

Carbo veg. ó cocculus. Si el tumor va acompañado de fiebre lenta.

Ademas se recomiendan tambien *rhus.* y *kali c.*

Silicea conviene cuando el tumor tarda en abrirse, ó bien despues de abierto no se agota la supuracion.

Parto y Sobreparto.

Los medicamentos principales empleados contra los diversos accidentes que sobrevienen en el parto y sobreparto son los siguientes :

Falta de dolores ó dolores muy cortos : *Puls.,* de hora en hora ; si no basta dése. *sec.* — *Nux m.* es muy ventajoso si ha precedido un enfriamiento. — Si hay sintomas de congestion cerebral, soñolencia, ronquidos : *Op.*

Dolores espasmódicos ó falsos. — Si la parturienta está muy agitada y desesperada : *Coff.* de media en media hora ; si este medicamento no obra pronto, dése : *Cham.* ó *acon.* y *bell.,* segun los sintomas generales. (Comp. *Cu-rac. gen.*) — Deseo continuo de defecar : *Nux v.*

Si despues del parto tardan en espulsarse las secundinas, ó hay adherencia de la placenta, dése *puls.,* y si no basta, *sec.,* pero empleados con precaucion ; el Dr. Nuñez recomienda *calc. c.* en estos casos, con preferencia á *puls.* y *sec.*

Si sobrevienen hemorragias durante el parto ó despues, el mejor medicamento es : *Crocus,* y si este no basta, *platina.* En caso de necesidad pueden consultarse : *Bell., cham., china, ferr., sabina.*

Contra las convulsiones que suelen á veces presentarse durante el parto ó despues de el, dése : *Ignat. ;* si este no basta, *hyosc. ;* ó bien : *Cicuta, bell. y cham.*

Si hay rasgaduras de las partes como consecuencia del parto laborioso, ó producidas por la cabeza voluminosa del feto al pasar por los órganos genitales externos, dése: *Arnica*, y si este no basta *sulph. ac.* A la vez convendrá lavar las partes desgarradas con agua de árnica, tibia, y que la muger tenga los muslos juntos.

Dolores llamados entuertos. — Se presentan despues del parto, y si no son muy fuertes y de larga duracion, no se les debe combatir por que son necesarios para la contraccion de la matriz. Solo se deberá dar *Arn.* en todos los partos, dos ó tres cucharadas al dia, y por espacio de tres dias.

Si los entuertos son demasiado fuertes, dénse. *Coff.* ó *cham.*, ó bien *nux v. puls.*; á las mugeres cuyas fuerzas son exiguas y tienen un aspecto de pobreza de sangre, se dará *sec.*

Fiebre de leche. — Si se dá *arn.* inmediatamente despues del parto, no se debe temer por lo general la fiebre de leche, ó por lo menos será corta. Si se declara se prescribirá *acon.*, y si hubiera gran escitacion nerviosa, *coff.* Si estos medicamentos no bastan, dénse: *Bell.*, *bry.*, y *rhus.*

La erupcion urticaria que se presenta á veces en el sobreparto ó puerperio, se cura generalmente con *Apis.* Si es la miliar, *bry.*; y si no basta *ipec.*

El estreñimiento no debe nunca combatirse en el sobreparto, y mucho menos con purgantes. Solo en el caso que despues de 6 ó 7 dias no haya defecado la enferma, se la dará *bry.*, ó *nux v.*, ó si hay necesidad una lavativa de agua tibia.

La diarrea durante el sobreparto es muy peligrosa y exige mucho cuidado la eleccion de los medicamentos. Compárense los medicamentos siguientes indicados en el artículo: *Diarrea: Antim. cr., dulc., hyosc., puls., rheum., sec.*

Las almorranas que se forman á veces en el puerperio se combaten con *Apis.*

La supresion de los *loquios* ó *purgacion* se combate con: *Coloc.*, *hyosc.*, *nux v.*, *plat.*, *sec.*, *veratr.*, *zinc.*

La estremada abundancia de *loquios* con: *Bry.*, *calc.*, *croc.*, *hep.*, *puls.*, *rhus.*

El insomnio y la inquietud con: *Coffea*, ó bien: *Bell.*, *cham.*, *nux v.*, *puls.*

Los cólicos, con: *Cham* ó *bry.*; ó bien: *Bell.*, *nux v.*, *veratr.*

La caída de los cabellos, con: *Calc.*, *lyc.*, *natr. m.*, *phos. sulph.*

La *falta de leche* ó la *desaparicion* de la misma, exige: *Puls.*, ó bien *Bell.*, *bry.*

Cuando hay *galactorrea* ó sea flujo de leche por los pezones, dése: *Calc. c.* ó *bell.*; *bry.*; cuando fluye mas por la noche, y *china* si sobreviene una gran debilidad.

Las *grietas de las pezones* se previenen teniendo cuidado de lavarlos diariamente con agua fria, 3 ó 4 semanas antes de la época del parto: así que se presenten, lávense los pezones con una solucion de leche condensada, y si esto no basta, con agua de árnica; ademas se prescribirán: *Cham.*, *calc.*, ó *sulph.*; ó bien *graph.* y *lyc.*

— Si *el niño no quiere mamar* porque la leche es mala, dése *merc.* á la madre, y mas tarde *cina*. Si la leche es amarillenta y amarga: *Rheum.*, si es azulada: *Lach.*; si es demasiado gruesa: *Puls.*; si se coagula facilmente: *Bor.*, *lach.*

El *malestar* ó los *dolores causados por la lactancia*, exigen:

Borax. Si hay sensacion de vacuidad en el pecho despues de dar de mamar.

Croton tíg. Si hay dolores violentos cuando el niño coge el pezon, y que van de este al hombro.

China. Si hay debilidad despues de dar de mamar.

La *mamitis* ó inflamacion de los pechos, exige principalmente:

Belladonna. Sensacion de pesadez en el pecho inflamado, con abultamiento, dureza y rubicundez.

Bryonia. Sensacion de pesadez y dureza, pero abultamiento con piel mas bien pálida y con boca y labios secos.

Rhus. Dolores reumáticos y agitacion en las extremidades.

Graphites. Muchas cicatrices en los pechos producto de abscesos en los mismos, impiden la salida de la leche. Dicese que en tales casos impide *graph.* la formación de nuevos abscesos. (G.)

Si á pesar de todos estos medicamentos se forma supuracion con absceso, dése *hep.*, ó *merc.*, ó *silic.* si tarda en abrirse el absceso, ó si despues de abierto no se agota la supuracion, y el pus es fetido. Si sale mezclado con sangre dése *merc.* — *Phos.* conviene despues de *silic.*, cuando no se agota la supuracion y hay fiebre lenta.

Pecho.

Catarro pulmonar. — El *catarro simple* exige los medicamentos siguientes: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *cham.*, *hep.*, *merc.*, *nux v. puls.*, *rhus.*, *sulph.*

El *catarro de los niños*: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *calc.*, *cham.*, *ipéc.*, *lach.*, *op.*, *phos.*, *sulph.*, *tart. em.* (R.)

El *catarro de los viejos*: *Baryt c.*, *bry.*, *carb v.*, *lach.*, *rhus.*, *tart. em.*, *veratr.*

El *catarro epidémico*, ó sea la *gripe*: *Acon.*, *bell.*, *bry.*, *lach.*, *merc.*, *nux v.*, *phos.*, *sulph.* — Cuando la gripe va acompañada de una sensacion como si las extremidades del enfermo estuvieran magulladas y paralizadas, debe darse *causticum* y *rhus.* (J); ademas consúltense: *Ars.*, *china*, *ipéc.*, *phos.* (Comp. *Grippe* y *Tos*).

Si el *catarro* va acompañado de *coriza* ó de *ronquera*, véanse estos artículos.

Congestion pulmonar. — *Acon* y *bell.*; ó bien *Apis*, *ferr.*, *nux v.*, *phos.*, *puls.*, *sulph.* (Comp. *Asma*).

Pechos.

Inflamacion de los pechos. — Véase en el artículo *parto* y *sobreparto* esta misma seccion.

La *induración* de los pechos exige: *Arn.*, *carb. an.* y *con.*, cuando es la consecuencia de un golpe.

Las *induraciones* y *nodosidades*: *Bell.*, *carb. an.*, *con.*, *silic.*, ó bien: *Apis.*, *ars.*, *calc. c.*, *clemat.*, *coloc.*, *graph.*, *lyc.*, *luch.*, *merc.*, *nitri ac.*, *oleum jec.*, *phos.*, *puls.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*

El *cancer*: *Ars.*, *clemat.* y *silic.*; ó: *Con.*, *hep.*, *kreos.*, *tarant* (N.).

Pesadillas.

Los medicamentos principales contra las *pesadillas*, son: *Acon.*, *nux v.*, *puls.*, *sulph.*

Aconitum. Cuando la *pesadilla* va acompañada de acúmulo de sangre en la cabeza, de sueños angustiosos y que hacen difícil la respiración.

Nux vomica. Conviene si la enfermedad es producida por una vida sedentaria, estudios muy asiduos, alimentación demasiado abundante y succulenta, y el abuso de licores fuertes.

Opium. Cuando la *pesadilla* se declara violentamente, el enfermo ronca y tiene ruido en el pecho, su cara está llena de ansiedad y cubierta de sudor frío, sus estremidades se agitan convulsivamente.

Pulsatilla. Si la enfermedad proviene de haber sobrecargado demasiado el estómago. — En los casos crónicos dénese: *Sulph.* y *silic.*

Rara vez se emplearán los medicamentos siguientes: *Nitri ac.* (asi como *tereb.*) cuando la *pesadilla* se declara poco despues de haberse dormido el sugeto. *Guajac.* si el ataque se manifiesta cuando está acostado de espaldas. *Mezer.* *pesadillas* despues de media noche.

Pescados venenosos.

Contra el envenenamiento por pescados venenosos se administrará polvo de carbon de encina mezclado con aguardiente: si esto no basta dése al enfermo tazas de

café negro, y si tampoco esto fuera suficiente, se le dará azucar en polvo ó agua muy azucarada. Finalmente, una parte de vinagre y dos de agua, será una pocion que prestará muy buenos servicios cuando los medios anteriores hayan fracasado. Tan luego como por cualquiera de dichos medios hayan rebajado los síntomas del envenamiento, se dará *Ipec* con bastante frecuencia, y si este medicamento no acabara de hacer desaparecer los padecimientos, prescribese *puls*.

Si el envenamiento es por las almejas, no se dará el carbon mezclado con aguardiente sino con agua fuertemente azucarada, haciendo ademas tomar al enfermo tazas de café, y que respire un pomo que contenga alcohol alcanforado. *Ipec.* y luego *puls.* harán desaparecer el resto de los síntomas.

Si como consecuencia del envenamiento tanto por las almejas como por los demas pescados aparece una erupcion en la piel, una rubicundez mas ó menos viva, dolor de garganta y cabeza, picor, etc., dése *acon.* si hay fiebre y agitacion; *bell.* si no hay fiebre, y *hep.* ó *merc.* despues de *bell.* para concluir con la enfermedad. En los casos rebeldes consúltense: *Ars.*, *dulc.*, *phos.*, *sepia*, *sulph.*

Pies.

Sudor de pies. — Si se ha suprimido, dése *Silic.*, y si no basta, *sep.*; ó bien: *Cupr.*, *kali c.*, *merc.*, *nux v.*, *phos.*, *rhus.*

Sudor de pies en las plantas solamente: *Acon.*

Entre los dedos: *Acon.*, *ferr.*, *kali*, *silic.*, *tart.*, *thuja.*

Sudor de pies corrosivo: *Iod.*, *nitri ac.*, *silic.*, *zinc.* —

— Fétido: *baryt. c.*, *cyc.*, *graph.*, *kali*, *sep.*, *silic.*

— Frio: *Lyc.*, *merc.*, *squilla*, *sulph.*

Plétora.

Las personas que padecen esta enfermedad tienen entre otros síntomas, los característicos de dormirse en cualquiera parte, sus movimientos son lentos y aman la quietud teniendo aversión al movimiento.

Las principales medicamentos para combatir esta enfermedad, son *Acon.* y *bell.*; ó bien *baryt. c.*, *arn.*, *nux v.*, *op.*, *calc.*, *merc.*

Pleuresia.

Dése al principio *acon.* de tres en tres horas. Si el estado del enfermo no mejora, prescribáse *bryonia*, y después *sulph.* si se verifica la exudacion (*Comp. Pulmonia*).

Plomo.

Contra el envenenamiento por el plomo hágase lo siguiente: disuélvase una cucharada de sulfato de magnesia ó de sosa en un cuartillo de agua, y dése al enfermo por cortadillos, uno de cada vez. Si no se tienen á mano dichas sales, úsense la leche, la clara de huevo ó el agua de jabon. Después disuélvase *nux v.*, seis ú ocho glóbulos en medio vaso de agua, y dése una cucharada cada dos ó tres horas. Si *nux v.* no bastase, dése *op.*, y luego *alum.* ó *plat.* si hay necesidad.

Contra el cólico de plomo ó de los pintores, dése en primer lugar *Opium*, y si no basta *nux v. plat.* Además pueden consultarse: *Alum.*, *antim. cr.*, *cocc.* y *zinc.*

Contra los sufrimientos crónicos resultantes de la intoxicacion por el plomo, ó del abuso del mismo como medicamento, consúltense: *Alum.*, *bell.*, *nux v.*, *op.*, *plat.*

Contra el estreñimiento pertinaz de vientre: *Plat.*, ú *Op.*, *nux v.*, *alum.*

Contra los dolores, contracturas, parálisis, etc., *plat.*, ó *nux v.*, *bell.*, *zinc.*

Podagra.

La *podagra* ó sea la gota en los pies se combate con *Arnica* y *sabina*.; ó bien *Acon.*, *ars.*, *bry.*, *calc.*, *graph.*, *lyc.*, *natr. m.* *rhus.*, *thuja* (B). (Comp. *Gota*.)

Polisarcia.

(*Obesidad*. — *Gordura escesiva*.)

El mejor medicamento contra la polisarcia es *Aurum*; si este no bastase, consúltense: *Ant.*, *ars.*, *baryt.* *calc.*, *sulph.*

Prúrigo.

(*Prurito*. — *Picor vivo en la piel*.)

Esta enfermedad tan desagradable puede curarse fácilmente con los medicamentos homeopáticos; sin embargo, es tenaz con bastante frecuencia. Fígrese bien la atención en los signos característicos que vamos á dar.

Si el picor se calma *rascándose*; déense: *Calc.*, *phos.*

Si al rascarse cambia de sitio: *Iyn.*, ó: *Mez.*, *spong.*, *staph.*, *sulph. ac.*

Si no disminuye *rascándose*: *Puls.*, *spong.*

Si por el contrario aumenta: *Puls.*, ó: *Caps.*, *caust.*, *con.*, *led.*, *mez.*, *silic.* (B).

Si por la noche al desnudarse y meterse en la cama, parece que el picor es ocasionado por picaduras de pulgas por todo el cuerpo: *Ars.*, *nux v.*

Si el picor es provocado por el calor de la cama, dése: *Carb. v.*, *merc.*, *puls.*, *sulph.* (Hig).

Si despues de haberse rascado hay picor: *Lach.*, ó *Caust.*, *lyc.*, *puls.*, *sulph.*

Si despues de haberse rascado se presentan habones: *Dulc.*, *lach.*, *mez.*, *rhus.*

Si despues de haberse rascado sale sangre: *Merc.*, *sulph.*, ó *Dulc.*, *lach.*

Si despues de rascarse siente el enfermo dolores urentes: *Caust.*, *lach.*, *rhus.*, *sulph.*

Si despues de rascarse hay una sensacion semejante al dolor que causaria una herida: *Sep.*, *sulph.*, ó *Hep.*, *mez.*, *olean.*, *rhus.*

Pulmonia.

La verdadera pulmonia es siempre precedida de un acceso de frio ó escalofrios muy fuerte, y seguido de dolores lancinantes y presivos en el pecho, aumentados por la tos; la respiracion es acelerada. El enfermo tiene ordinariamente mucho calor; su cara está encarnada, y las mejillas de un rojo subido, frecuentemente violáceo. Cada respiracion un poco fuerte provoca dolores y tos. Los esputos no tardan en salir revestidos de sangre, mas tarde tienen un aspecto herrumbroso. Gracias á los medios de diagnóstico modernos, podemos conocer generalmente de un modo preciso el asiento y estension de la inflamacion, su aumento y disminucion. No es posible que cualquiera pueda apreciar el caracter, y la estension de la inflamacion; así es que se deberá llamar un médico homeópata cuanto antes.

Si no lo hay en la localidad, ó mientras llega de una gran distancia, se dará al enfermo en el caso de que haya fiebre con agitacion, sed, etc., *acon.*, una cucharada cada tres ó cuatro horas. Pero si el enfermo presenta fiebre escasa, teme el movimiento, no se debe dar *acon.* y si *bry.*, y despues *phos.* y *sulph.* — *Sulph.* se da cuando *bry* y *phos.* no han terminado la curacion. Si hay temor de que el enfermo tenga tubérculos, se prefiere *laches.* ó *phos.* á *sulph.*

Merc. conviene cuando hay sudor continuo y abundante, que no alivia al enfermo.

Opium. Cuando el enfermo está en un estado de sopor.

Rhus. Cuando se presentan sintomas tifoideos.

Tartarus em. Cuando el enfermo no puede especta-

rar, hay síntomas precursores de una parálisis de los pulmones con fuerte estertor mucoso, de suerte que parece se va á asfixiar. En este caso, cada media hora debe darse una cucharada, y luego que se note alivio, se darán de mas tarde en tarde. Si el alivio no se presenta pronto, dése *carbo. veg.*, una cucharada cada diez minutos.

Púrpura.

La púrpura *hemorrágica* se combate con *bry.*, *ó rhus.*, ó bien *led.* y *sec.*, ó *phos.*

La *senil*, con: *ars.* y *con.*

La púrpura *roja* es una erupción generalmente inofensiva, que adopta un termino medio entre la escarlatina y el sarampion. Se trata especialmente con *acon.* o *coff.*; á veces exige *bell.* ó *sulph.*

Pústula maligna.

La pústula maligna no es mas que una especie de carbunco, es si se quiere su forma mas benigna: se presenta en las partes de la piel habitual ó accidentalmente descubiertas, sobre todo donde es mas fino el cutis. La pústula proviene del contacto con animales que padecen carbunco, de la sangre y despojos de los mismos, muertos de dicha enfermedad ó cansancio, y sobre todo manejando pieles de los animales que lo han padecido. La padecen los pastores, carniceros, vaqueros curtidores, esquiladores cardadores, etc.

En el punto donde se ha de desarrollar la pústula, se declara un picor ligero, formándose una veguilla que se estiende y se aumenta el picor. A la veguilla reemplaza una mancha lívida en cuyo fondo hay un tubérculo pequeño; el picor, calor y escozor aumentan, hay tension en la piel con hinchazon y rubicundez. La mancha se ennegrece y aumenta, hay mas hinchazon de las partes que la rodean, y su rubicundez se convierte

en una erisipela con gran inflamacion. La hinchazon es enorme, se estiende á gran distancia, se desarrolla la gangrena que penetra mucho, y se presentan los sintomas generales de postracion y putridez, con fiebre lenta, sed, abatimiento, sudores frios, pulso pequeño y concentrado, etc. Tal es el curso que sigue tan grave enfermedad si no se la cura en sus primeros periodos.

Para su tratamiento vease el del *Carbunclo*, porque en ambos es enteramente igual, no olvidándose que *arsenicum* es el medicamento especifico, por decirlo asi, tanto del *carbunclo* como de la *pústula maligna*.

Quemaduras.

En los casos de quemaduras de mucha estension con gran supuracion, apliquese la *caléndula*, del mismo modo que el *árnica* en los golpes y contusiones, y prescribase ademas al interior á baja dilucion, una cucharada cada dos ó tres horas. Pasadas algunas horas se reemplazarán las aplicaciones de la *caléndula*, con la aplicacion de una mezcla de aceyte comun y clara de huevo bien batidas, cubriendo ademas la parte con un paño ó mejor una manta de algodón fino empapado en la espresada mezcla. Esta aplicacion se renovará cuando esté seca, y hasta que se cicatrice por completo la herida. Con este método los dolores desaparecen pronto, y la superficie quemada, por estensa y profundamente que lo haya sido, cicatriza pronto, y la cicatriz resultante es menos visible que con otro cualquier método de los preconizados.

Cuando no haya á mano *caléndula* en tintura, úsese la de *arnica*, la de *ortigas* ó la de *cantáridas*, pero lo mejor es la de *caléndula*, ó en su defecto la de *arnica*.

Tambien se reemplazará *Caléndula* al interior, por cualquiera de los medicamentos siguientes:

Aconitum. Si hay fiebre con sed, inquietud é insomnio.

Arsenicum. Si hay sed urente con deseo de beber poco de cada vez.

Belladonna. Si hay fuerte dolor de cabeza con delirio, agitacion continua; la luz y toda clase de ruidos molestan mucho. (Si no basta dése *hyosc.*)

Hepar. Si hay dolores pungitivos, como si introdugeran cuchillos en la superficie quemada; latidos profundos.

Mercurius. Si se declaran sudores abundantes, y la superficie quemada exhala un pus sanioso.

Silicea. Si *hepar* no basta y la cicatrizacion no avanza á causa de que la supuracion no se agota, y es de mal caracter.

Quinina.

Los principales medicamentos contra los sufrimientos producidos por el abuso de la quinina en dosis alopáticas, son: *Ipec.*, *Ars.*, *Puls.*

Ipecacuanha. Al principio en la inmensa mayoria de los casos, cuando hay sintomas gástricos, dolores vagos, zumbido de oidos y dolor de cabeza.

Arsenicum. Sed intensa, hinchazones en los pies, piernas, vientre, cara ó manos; respiracion penosa, tos seca y fatiga.

Pulsatilla. Se da principalmente este medicamento en los sufrimientos consecutivos á una fiebre intermitente cortada con enormes dosis de quinina. Dolores de muelas, oidos y cabeza, y tambien en las extremidades. Tristeza, llanto, y deseo de estar constantemente sentado ó hechado; el movimiento mas moderado produce sudores, ansiedad y cansancio grande.

Ademas de los espresados medicamentos pueden estar indicados:

Belladonna. Si hay acúmulo de sangre en la cabeza con calor en la cara, ardor y dolor en la garganta, dolores muy fuertes de cabeza.

Calcarea. Si *puls.* no basta.

Ferrum. Hinchazon de los pies, color pálido mate de la piel con pérdida del apetito, tristeza y deseo de estar hechado.

Mercurius. Si se declara la ictericia, con estreñimiento de vientre ó diarrea biliosa, sudores molestos, y úlceras ó erupcion miliar en la boca, con ó sin salivacion.

Veratrum. Frio intenso en todo el cuerpo ó solo en las extremidades; sudores frios, sed, estreñimiento y hasta calambres.

Rabia.

(*Hidrofobia*.)

En las mordeduras de perros rabiosos, el mejor medio es el calor á distancia, es decir la aplicacion mas proxima posible á la herida de un hierro hecho áscua, de una brasa gruesa de carbon, ó bien de un cigarro ardiendo. El mejor preservativo para que la rabia no se declare, es *bellad.*, que se dará cada tres ó cuatro dias. una dosis en ayunas, durante los cuarenta ó sesenta dias que siguen á la mordedura.

Si la rabia se declara, dése *bell.*, y si á las 24 horas no hay alivio, dése *hyosc.*, y si este no basta, *stram.* Algunos recomiendan *canth.* y *lach.*, ademas de los anteriores medicamentos.

Reumatismo.

Esta enfermedad que todos conocen, se declara ya con fuerte fiebre, como el reumatismo agudo de las articulaciones, ya sin fiebre, como el reumatismo ordinario (generalmente localizado), que se hace entonces facilmente crónico.

Contra el reumatismo agudo de las articulaciones conviene principalmente: *Acon.*, *arn.*, *bell.*, *bry.*, *cham.*, *china*, *dulc.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.*, *rhus*.

Contra el reumatismo crónico: *Ars.*, *calc.*, *caust.*, *hep.*, *lach.*, *lyc.*, *phos.*, *sulph.*

Contra el *reumatismo ambulante*, ó contra los dolores que van súbitamente de una parte á otra, estan indicados: *Puls.*; ó bien: *Arn.*, *bell.*, *nux m.*, *sabin.*, *sulph.*

Segun los sintomas, elijase entre los medicamentos siguientes:

Aconitum. Al principio del reumatismo agudo, con fuerte fiebre.

Arnica. Sensacion como si las articulaciones estuvieran dislocadas ó rotas; con sensacion de adormecimiento frecuentemente ó de hormigueo, sobre todo cuando el enfermo tiene una *sensacion como si la parte afecta descansara sobre un objeto duro.*

Belladonna. Rubicundez erisipelatosa de las partes inflamadas, ó fiebre con sintomas cerebrales. — Fuerte acúmulo de sangre en la cabeza, pulsacion de las arterias del cuello (á la vista), y rubicundez de la cara y ojos.

Chamomilla. Dolores reumáticos que aumentan por la noche, con sensacion de adormecimiento de las partes enfermas, y dolores dislacerantes en la cabeza, oidos y dientes.

Mercurius. Afecciones reumáticas con sudores abundantes que no alivian. — Hinchazon edematosa (abotagamiento) de las partes enfermas, que experimentan con frecuencia una sensacion de frio.

Nux vomica. Reumatismo de los borrachos, de las personas de vida sedentaria, principalmente si se situa entre los hombros, en las espaldas y riñones.

Pulsatilla. Afecciones reumáticas que van de una parte á otra del cuerpo. — Agravacion á la caida de la tarde, ó por la noche con el calor de la cama.

Rhus. Reumatismo despues de haberse mojado enteramente el cuerpo, sobre todo estando sudando, ó cuando se han hecho grandes esfuerzos corporales. — Sensacion de dislocacion, adormecimiento y parálisis, ó verdadera parálisis de las partes enfermas. — Agravacion con la quietud, alivio con el movimiento suave pero continuo, mientras que el enfermo sufre cuando empieza á moverse, por ej. cuando se levanta de su asiento.

En cuanto á las demas indicaciones, especialmente para el reumatismo crónico, véase: *Gota*.

En los reumatismos agudos conviene dar los medicamentos cada tres ó cuatro horas. En los crónicos y tenaces es mejor darlos con grandes intervalos de descanso, y repetirlos poco.

Riñones.

Lumbago. — (*Dolores de riñones*). — Los dolores de riñones son por lo general el sintoma de otra enfermedad, como por ej. las almorranas en los hombres, y las enfermedades de la matriz en las mugeres. Este es el motivo porque no se pueden dar indicaciones mas detalladas respecto á su tratamiento.

Los principales medicamentos contra los dolores de riñones, son: *Caust.*, *nux v.*, *puls.*, *rhus*, *sep.*, *sulph.*; ó bien: *Arn.*, *bry.*, *calc.*, *cocc.*, *ign.*

Si provienen de un esfuerzo corporal, dése: *Rhus*, ó: *Bry.*, *sulph.*

Inflamacion de los riñones. — (*Nefritis*). — Es imposible dar en un manual popular todos los datos necesarios para diagnosticar convenientemente y tratar bien la nefritis. Los principales medicamentos son: *Acon.*, *bellad.*, *cann.*, *canth.*, *nux v.*, *puls.*

En la *Albuminuria* ó enfermedad de Bright, se aconsejan: *Apis*, *ars.*, *canth.*, *merc. subl.*, *nitri ac.*

En los *Cálculos de los riñones* ó mal de piedra: *Lyc.*: ó *Antim. cr.*, *calc.*, *sassap.*, *silic.*, *zinc.*

Contra los *Cólicos nefríticos*: *Canth.*, *nux v.*; ó bien: *Bell.*, *berb.*, *cann.*, *colch.*, *lyc.*, *sassap.*

Rodillas.

Si la inflamacion de las rodillas no es causada por una lesion mecánica, ó por la gota ó el reumatismo, es casi siempre la consecuencia de una discrasia; por eso cuesta mucho siempre curarla.

Cuando la inflamacion es reciente, los principales medicamentos son: *Acon.*, *arn.*, *bry.*, *led.*, *lyc.*, *puls.*; en los casos crónicos (*tumor blanco*): *Calc. c.*, *iod.*, *rhus*, *silic.*, *sulph.*

Ronquera.

En los casos agudos de ronquera catarral, he aqui los medicamentos principales: *Carb. v.*, *cham.*, *dulc.*, *hep.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.* — En los casos crónicos: *Carb. v. caust.*, *hep.*, *phos.*, *silic.*, *sulph.*

Cuando la voz es hueca, cavernosa, déense: *Spong.*, *veratr.*; ó: *Acon.*, *dros.*, *samb.*, *stann.*

Cuando es muy baja: *Dros.*, ó *China*, *cham.*

Si hay afonia completa: *Carb. v.*, *phos.*, ó: *Antim. cr.*, *caust.*, *hepar.*, *merc.*, *puls.*, *spong.*, *veratr.*

Si la ronquera es consecuencia de un esfuerzo de la voz, déense: *Carb. v.*, *phos.* (en los cantantes) — Lippe recomienda *Aurum triphyl.*

Si es consecuencia del sarampion: *Carb. v.*, *puls.*; ó *Antim. cr.*, *sulph.*

Si es á consecuencia del crup: *Phos.*, ó: *Brom.*, *hep.*, *spong.*

Compárense ademas las indicaciones siguientes en la eleccion de los medicamentos:

Antimonium crudum. Conviene cuando la afonia es causada por un acaloramiento ó insolacion, ó bien la ronquera se agrava con el calor del sol, como por el aumento de temperatura.

Carbo veg. Cuando la ronquera se aumenta por la noche y despues de haber hablado ó cantado, ó cuando es causada por el sarampion.

Causticum. Ronquera y afonia que parece dependen de una debilidad de los músculos de la laringe. — Sensacion de heridas en la laringe.

Chamomilla. Conviene especialmente á los niños que experimentan un cosquilleo que produce la tos, y que se

ven acometidos de una ronquera acompañada de punzadas y ardor doloroso.

Drosera. El enfermo está ronco, tiene la voz baja y sufre hablando.

Kali carb. Garganta seca, ronquera con fuertes estornudos (B.).

Nux moschata. Ronquera andando cara al viento.

Nux vomica. — Ronquera que proviene de un enfriamiento, con sensación de raspadura en la garganta.

Phosphorus. Ronquera crónica (aun despues del cup): sequedad y aridez de la garganta.

Pulsatilla. Ronquera que impide al enfermo hablar en alta voz.

Rostro y fisonomia.

Cuando faltan los síntomas característicos en una enfermedad, el rostro y la fisonomia del enfermo ofrecen frecuentemente al médico preciosas indicaciones para la elección de los medicamentos.

El abotagamiento del rostro exige: *Ars.*, *bell.*, *cham.*, *kali c.*

El edema en derredor de los ojos: *Ars.*, *phos.*;

debajo de los ojos: *Phos.*, ó *ars.*;

encima de los ojos: *Sepia*;

entre los párpados y las cejas: *kali c.*;

Las arrugas profundas de la cara: *Lyc.*, ó *Sepia*, *stram.*

El color pálido: *China*, *cina*, *phos. ac.*, *sep*, *sulph.*;

azulado: *Camph.*, *con.*, *cupr.*, *dig.*, *hyosc.*, *op.*, *veratr.*;

azulado en derredor de la boca: *Cupr.* ó *cina*.

terroso: *China*, *ferr.*, *merc.*

Si la piel de la cara está untuosa: *Natr. m.*, *rhus*, *selen.*

Si está amarillenta: *Con.*, *ferr.*, *nux v.*, *sep.*, *sulph.*

Circulos amarillentos en derredor de los ojos: *Nitriac.*, *spigel.* (*nux v.*).

Color amarillento en derredor de la boca y nariz :
Sep., ó *nux v.*

Color amarillo en las sienes : *Caust.*

Tez verduzca : *Carb. v. (ars., veratr.)*.

Color verduceo en derredor de los ojos : *Veratr.*

Rubicundez de la cara : *Acon.*, *bell.*, *cham.*, *china*,
hyosc., *nux v.*, *op.*

Rubicundez azulada : *Bell.*, *bry.*, *cupr.*

Rubicundez circunscrita en las megillas del enfermo :
China, *ferr.*, *lyc.*, *phos.*, *sulph.*

Tez cambiante (ya pálida, ya rojiza) : *Bell.*, *ignat.*,
phos., *plat.*

Mandíbuda inferior pendiente : *Bell.*, ó : *Ars*, *hyosc.*,
lyc., *op.*

Sabañones.

Los medicamentos principales contra los sabañones
son :

Nitri acidum y *petroleum*, no solo al interior, sino
tambien exteriormente diluyéndolos en espíritu de vino,
ó mezclandolos con manteca fresca á guisa de unguento.
El acido nítrico se encuentra en las farmacias bajo el
nombre de pomada azótica; pero es mejor prepararla re-
cientemente siempre que se vaya á emplear. Se emplea
tambien con ventaja una mezcla de aceite de tremen-
tina y espíritu de vino.

Si los sabañones son dolorosos, elíjase entre : *Nitriac.*,
petrol., *phos.*

Si pican mucho : *Nux v.*, *sulph.*

Si tienen un color rojo-azulado : *Bell.*, *kali.*

Sarampion.

Esta tan conocida enfermedad de los niños empieza
ordinariamente por una fiebre catarral con escalofríos,
dolor de cabeza, horror á la luz, ojos, llorosos, coriza
(frecuentemente con estornudos y sangre por la nariz),
ronquera y tos que á veces toma un caracter cru-

pal. Este primer periodo de la enfermedad, que va siempre acompañado de mas ó menos fiebre, dura generalmente tres ó cuatro dias, enseguida aparece la erupcion en la cara, luego en el cuello, pecho y se estiende despues por todo el cuerpo. Esta erupcion se caracteriza por manchas rojo-claras, del tamaño de una lenteja; se ponen pálidas cuando se las oprime con el dedo, pero la rubicundez vuelve inmediatamente del centro á la periferia (En la escarlatina de la periferia al centro.)

El sarampion tiene por lo comun una marcha benigna; sin embargo exige cuidados asiduos, por que sino sobrevienen enfermedades secundarias; ó bien la erupcion puede suprimirse repentinamente y poner la vida en peligro. Se tendrá al niño enfermo en una habitacion caliente á la temperatura uniforme de 14^o R. y algo oscura, hasta que la descamacion, que se verifica por medio de pequeñas peliculas farinosas, se haya verificado.

Al principio de la enfermedad, antes de la erupcion, se dará *acon.*, cada tres ó cuatro horas segun la intensidad de la fiebre. Si esta última es muy fuerte, y se notan sintomas cerebrales, se prescribira *bellad.* Cuando el enfermo teme la luz, tiene un violento coriza con ojos llorosos, se aconseja principalmente: *Euphrasia*. Si hay sintomas catarrales: *Bry.*, que hará brotar muy pronto la erupcion. Si se presenta el insomnio con mucha inquietud y exasperacion, y no ha podido corregir estos sintomas *acon.*, dése *coffea*. Si la erupcion brota francamente, y los sintomas febriles han rebajado, dése *puls.* que se continuará hasta la terminacion del sarampion, si este sigue su curso regular.

En caso de supresion repentina de la erupcion, dése *bry.*, *puls.* ó *phos.*, ó bien *bell.* si hay sintomas cerebrales, y si no basta, *stram.* — Tambien se recomiendan *Apis*, *ipcc.*, ó bien *carb. v.* cuando el aliento es frio y parece que el niño está en laagonia: *camph.* cuando el aliento es caliente. Si sobreviene un estado tifoideo el mejor medicamento es *phos.*, y si no lo combate pronto, dése *rhus*, ó *puls.*, *sulph.*

Para combatir las enfermedades resultantes del sarampion, se recomiendan :

Contra la sordera : *Sulph.*, *calc.*, *puls.*, *silic.*

Contra las parótidas : *Rhus*, ó bien : *Arn.*, *merc.*, *carb. v.*

Contra la miliar blanca : *Nux v.*, ó bien *ars.*

Contra el flujo purulento de oidos : *Puls.*, ó *carb. v.*, *silic.* ; ó bien : *Lyc.*, *merc.*, *nitri ac.*, *phos.*, *sulph.*

Contra las diarreas : *China* y *merc.* ; ó bien : *Puls.*, *calc.* y *sulph.*

Contra el estreñimiento de vientre ; *Op.*, ó *bry.*, *lyc.*, *plat.*, *nux v.*

Contra la tos en general : *Bry. cham.*, *dros.*, *nux v.*, *phos.*, *sulph.*

— gruesa, cavernosa : *Cham.*, *ign.*, *nux v.*, *spong.*

— espasmódica : *Bell.*, *cina*, *hyosc.*, *lach.*, *spigel.*, *stann.*

Contra la ronquera : *Carb. v.*, *caust.*, *hepar.*, *phos.*, *sulph.*

Contra las hinchazones edematosas : *Apis*, *ars.*, *china*, *hell.*, *samb.*

Contra la fotofobia : *Bell.*, *puls.*, *sulph.*, ó *phos.* y *merc.*

Contra la falta de apetito y la tristeza : *Ignatia*, ó bien : *Merc.*, *phos.*, *puls.*, *sulph.*

Sarna.

Desde el descubrimiento del acarus de la sarna, esta no es considerada como una verdadera enfermedad, sino como la consecuencia natural de una irritacion ocasionada por un pequeño animal, el acarus, que forma surcos en la piel. El mejor tratamiento por lo tanto, será aquel que destruya al acarus. Los medicos antiguos habian observado que despues de haber hecho desaparecer la enfermedad por medio de medicamentos externos, sobrevinian enfermedades internas frecuentemente

mortales. Se ha pretendido que estas observaciones no eran mas que ilusiones, ó bien que dichos médicos habian tomado por sarna otras erupciones.

Nosotros sabemos que Hahnemann fué el primero que demostró que la lepra, de que se hace mencion en la biblia, y la sarna, son enfermedades idénticas. Las investigaciones que se han hecho con los leprosos de las costas de Noruega y Suecia, han probado efectivamente que las costras de los leprosos contenian millares de acarus muertos. Ademas, cualquier médico puede convencerse frecuentemente que aun cuando los insectos hayan sido muertos, queda un picor en la piel que se reproduce durante muchos años, ó bien se declaran enfermedades internas de un caracter muy grave con frecuencia, como vemos sucede despues de la curacion de otras erupciones ó úlceras de la piel con medicamentos esternos, ó despues de la transpiracion de pies suprimida. No tenemos porque discutir aqui el pro y el contra de la *teoria de la psora* de Hahnemann; nos basta indicar como se curará la sarna prontamente y sin malas consecuencias.

El acarus debe destruirse con fricciones, es una condicion absoluta para la curacion. Los medios mas recomendados son: el *bálsamo del Perú*, ó el *unguento de pez líquida y estoraque* (Estoraque liquido 30 gramos, aceyte de oliva 8, alcohol rectificado 3), con los que se frotan las partes de la piel que pican. Cuando mas pronto se empleen estos medios, mejor, para evitar las malas consecuencias que la sarna pudiera causar. Es tambien util á la vez emplear los medicamentos al interior, y al principio la tintura de *sulph.* ó atenuaciones de este medicamento (12^a. ó 30), administrado mañana y tarde á cucharadas durante varios dias, y luego de mas tarde en tarde durante otros varios. Si el picor no ha desaparecido por completo, se dará: *Merc.*, ó: *Calc., sep., silic.* (B.). En los casos de sarna seca, se da al principio *carb. v.*, luego *hepar* ó *caust.*, diluidos en agua, mañana y noche (Hg.); ó *kreos., merc. y sep.* (B.).

Cuando la sarna ha sido mal tratada, sobre todo si se han empleado fricciones de mercurio ó azufre, los mejores medicamentos son: *Caust.* ó *sepia* (B).

Setas.

Lo primero que hay que hacer en un envenenamiento por las setas, es procurar que el enfermo vomite cuanto antes, haciéndole tomar agua fria en bastante cantidad, titilando á la vez la garganta con las barbas de una pluma, y prescribiéndole una pocion de aceite de olivas y carbon de encina en polvo. Si estos medios no bastasen, dése *amoniaco*. Rebajados los sintomas mas graves, hágase que el enfermo tome café con frecuencia y vino, con lo cual se evitarán los sufrimientos consecutivos. Si estos al fin se declaran, *Ipec.* y *puls.* los combatirán perfectamente, ó bien: *Nux v.* y *carb. v.*

Sofocacion por el calor.

Se darán:

En los casos de sofocacion por el calor en general:

Antim. cr., bell., bry., carb. v.

Sofocacion por el fuego: *Antim. cr., zinc.*

Sufrimiento por el calor del estio: *Bell., bry., carb. v., puls.*

Sufrimientos á consecuencia de grandés trabajos hechos bajo la impresion de un sol canicular: *Antim. cr., bry., camph., lach., Natr. c. y puls.*

En una insolacion: *Acon.,* y luego *bell.,* y si no bataan *Camph.* y *glon.*

Tabaco.

Elijanse los medicamentos segun la naturaleza de los sufrimientos que causa el tabaco.

Aconitum. Violento dolor de cabeza con náuseas.

Bryonia. Dolor de muelas despues de haber fumado (*China*).

Chamomilla. Vértigos hasta producir la pérdida de los sentidos: sed, vómitos de bilis ó diarrea.

Cuprum. Accesos espasmódicos.

Ignatia. Náuseas y otros sufrimientos en las personas que no estan habituadas á fumar (*Cocc.*, ó *puls.* y *staph.*)

Las enfermedades crónicas de los obreros que trabajan en las fábricas de tabaco, son mas difíciles de curar; los medicamentos mejores son: *Ars.*, *coloc.*, *cupr.* La primera condicion es naturalmente que el enfermo abandone la fábrica.

Tabes mesentérica.

(*Tisis mesentérica.* — *Tisis abdominal, intestinal.*)

Para esta enfermedad que acomete de preferencia á los niños en la primera infancia, y que se caracteriza por una demacracion general con vientre muy abultado, recargos nocturnos, hambre voraz ó falta de apetito, sed intensa, etc., se recomiendan: *Sulph.*, *calc. c.* ó *ph.*, *ars.*, *silic.*, *staph.*

Conviene dar los medicamentos á diluciones altísimas, de una sola vez una dosis, y esperar su accion sin repetir otra dosis ó cambiar de medicamento en tanto haya alivio.

Té.

El principal medicamento contra los sufrimientos producidos por el abuso del té como bebida, es: *Coffea.* Si este medicamento no bastase, consúltense: *China*, *ferr.*, *thuja.*

Testículos.

Las causas mas frecuentes de la inflamacion de los testiculos (*orquitis*) son las lesiones mecánicas ocasionadas por golpes, sacudidas, contusiones y la gonorrea ó blenorragia.

En el primer caso se dará *arnica* al principio. Si hay fiebre se dará antes *acon*. Si estos medicamentos no bastan, désen *conium*, *pulsatilla* y aun *zincum*.

Cuando es consecuencia de una gonorrea ó blenorragia, dése: *Puls.*, y si no basta, *clematis* y *merc.*, ó bien *aur.* y *nitri ac.*

Cuando quedan los testículos indurados despues de terminada su inflamacion, consúltense; *Agnus*, *arg.*, *aur.*, *clem.*, *con.*, *graph.*, *rhod.*

El hidrocele es una dolencia que hasta padecen los niños pequeños; es una enfermédad que entonces se cura facilmente con los medicamentos, siendo mas difícil de curar con los mismos en las personas adultas y de mas edad. Los medicamentos mas eficaces, son: *Arn.*, *calc.*, *graph.*, *nux v.*, *puls.*, *rhod.*, *sili.*, *sulph.*

El hidrocele producido por una erupcion herpética suprimida se cura con: *Graphites* (N).

El hidrocele en las personas escrofulosas se trata con: *Silicea*.

La inflamacion erisipelatosa del escroto, ó *erisipela del escroto*, se cura con: *Mer.*, ó *ars.*

Tiña.

La tiña se caracteriza por la erupcion en el cuero cabelludo, y á veces en otras partes del cuerpo, de numerosos y pequeños granos encarnados poco salientes, y á los que reemplazan pronto pequeñas pústulas amarillas, cuyo vértice se cubre euseguida de costras muy adherentes, irregularmente circulares, al principio amarillas, y luego gris-oscuras, y deprimidas en forma de embudo ó canal. A veces están dichas pústulas aisladas, pero otras cubren el todo ó parte de la cabeza, y se estienden por el cuello, infartando casi siempre las glándulas del mismo. Exhalan generalmente mal olor, y producen la caída de los cabellos si no se curan en poco tiempo.

La tiñd ès tan contagiosa como la sarna, y se tras-

mite con los vestidos, peines, toallas, almohadas, cepillos de cabeza, etc.

El principal medicamento contra la tiña, y que la cura bien pronto si es reciente, es: *Lycopodium*: si este no bastase, dése *Sulphur*, ó bien *rhus* y *sepia*. *Hepar* conviene cuando se ha estendido la erupcion por el cuello.

Otros médicos homeópatas recomiendan ademas para los casos rebeldes: *Ars.*, *baryt. c.*, *graph.*, *oleander*, *staph.*, *viola tr.* y *dulc.*

Hay ademas otra tiña seca, llamado amiantácea ó furfurácea cuyas costras delgadas se desprenden y pegan à los cabellos: Los principales medicamentos para combatirla son: *Ars.*, *calc.*, *graph.*, *phos.*, *sulph.*

Tisis.

(*Tubérculos.*)

La tisis se declara ordinariamente à la edad de 20 á 35 años. Segun los datos estadísticos causa una quinta parte de los casos de muerte. Es un hecho incontestable que la tisis es una enfermedad hereditaria en muchas familias, y que cierta constitucion física, la constitucion tísica, predispone á ella. Pero se ha observado que la tisis hace morir á personas que no debian dicha enfermedad ni á su constitucion, ni á su familia. Todo el mundo sabe que una tisis muy desenvuelta es incurable; pero puede contenersela al principio, merced á un buen tratamiento y régimen conveniente. Importa, pues, conocer la enfermedad desde su principio, é impedir su desarrollo por todos los medios posibles. No podemos dar muchos detalles en este manual popular sobre el régimen y tratamiento homeopático que se deben seguir en la tisis, esté ó no desarrollada.

Los principales medicamentos, son: *Sulph.*, *calc.*, *lic.*, *phos.*; ó: *Ars.*, *china*, *iod.*, *kali c.*, *lyc.*, *nitri ac.*, *nux v.*, *puls.*, *samb.*, *silic.*

Todos estos medicamentos, y principalmente los pro-

cedentes del reino mineral, deben darse á altas atenuaciones, y esperar sus efectos todo el tiempo posible.

B. recomienda *phosphorus* cuando la tisis va acompañada de sudores que solo se presentan durante el sueño; y *sambucus*, cuando se declaran desde que el enfermo se despierta, y son reemplazados por calor seco cuando el enfermo se duerme. Nosotros hemos hecho uso de dichas indicaciones con éxito, aun que la tisis estuviera muy avanzada y no hubiera esperanza alguna de curacion. Hemos obtenido un alivio notable.

Tisis dorsal: — (*Tabes dorsal*:) — No puede ser tratada por personas que no han estudiado la medicina. Generalmente es muy difícil de curar y aun incurable, si está muy avanzada.

Su causa mas frecuente parece ser el onanismo. En este caso aun es posible la curacion, si el enfermo se presenta pronto al médico, y sigue un régimen y género de vida convenientes. Los medicamentos principales son: *Nux v.*, *sulph.* y *argent. nitric.*, en altas atenuaciones y á dosis muy distantes unas de otras.

B. ha recomendado como medicamento específico *aluminium metallicum* 200^a.

Torticolis.

Esta enfermedad debida casi siempre á un enfriamiento ó al reumatismo, y que consiste en el espasmo ó contraccion espasmódica del músculo mas importante de las regiones laterales del cuello, imposibilitando el movimiento de este del lado efecto, se cura con: *Bryonia*, ó bien *rhus* y árnica.

Tos.

La tos no es mas que el sintoma de otra enfermedad; acompaña comunmente á las inflamaciones de los pulmones, de la tráquea, laringe, etc. La importancia de este sintoma (de la tos) y el tratamiento varian segun la na-

turalaleza de la enfermedad fundamental que provoca y en tretiene la tos.

La tos mas funesta es la producida por los tubérculos en los pulmones, porque tarde ó temprano conducen á la supuracion de los pulmones (tisis.)

Como la tos es tan comun, y es imposible á los que no han estudiado medicina apreciar justamente el peligro mas ó menos grande que puede tener, aconsejamos desde luego á toda persona que la padece, sobre todo si arroja esputos sanguinolentos y enflaquece, que se haga ver por un médico lo mas pronto posible. Porque cuanto mas haya avanzado, menos se podrá curar el enfermo.

He aquí un corto repertorio de los medicamentos propios de la tos. El orden que seguimos en él, indicará que circunstancias deben guiar en la eleccion de los medicamentos.

Cuando la tos *es seca, sin esputos*, dénse principalmente: *Acon., ipec., phos., spong.*; ó *Bell., bry., carb. v., china, cina., hyosc., ign., nux v., rhus, sulph., veratr.*

Si hay esputos: *Ars., calc., lyc., phos., puls., sep., stann.*

Naturaleza de los esputos.

Si los esputos son:

acres, dése: *Alum., ars., caust., merc., puls., silic. albuminosos: Ars., china, ferr.*

acuosos: *Cham., graph., magn. c., stann.*

blanquzcos: *Lyc., sep.*

espumosos: *Ars., phos., puls.*

granulosos: *Phos.*

grises: *Lyc.*, ó: *Ambr., ars., thuja.*

amarillentos: *Calc., phos., puls., stann.*

lechosos: *Ars., sulph.*

negruzcos: *China, nux v.*, ó: *Lyc. y rhus.*

purulentos: *Calc., china, con., kali c., lyc., phos., sep., silic.*

sanguinolentos: *Ferr. ipec., nitri ac., phos., puls., sulph.*

verdes: *Puls.*, *sep.*

viscosos: *kali bi.*, *stann.*; ó: *Ars.*, *cham.*, *phos.*

Gusto de los esputos.

Si el gusto de los esputos es;

agrio, dése: *Calc.*, *nux v.*, *phos.*; ó: *Bell.*, *china*,
kali c., *puls.*, *sulph.*

amargo: *Cham.*, *puls.*, ó *ars.*

desagradable: *Puls.*; ó: *Ars.*, *iod.*, *merc.*, *stann.*

dulzaino: *Phos.*; ó *Calc.*, *plumb.*, *puls.*, *sabad.*, *scilla*,
stann.

insípido: *Bry.*, *calc.*, *china*, *ignat.*, *staph.*

gusto de yerbas: *Nux v.*

á grasa: *Caust.*, *puls.*; ó *Asa foet.*, *magn. m.*

metálico: *Cupr.*, *ipéc.*, *rhus.*

pútrido: *Arn.*, *ars.*, *carb. v.*, *cham.*, *puls.*, *sep.*,
stann.

salado: *Ars.*, *lyc.*, *phos.*, *puls.*; ó *China*, *merc.*,
natr. c.

Mal olor de los esputos.

Calc., *natr.*, *sanguin.*, ó: *Ars.*, *lyc.*, *phos. ac.*, *sep.*,
stann., *sulph.*

Epoca del día en que la tos aumenta, asi como de la
noche.

Cuando la tos aumenta:

por la mañana, dése: *Cham.*, *cina*, *euphr.*, *ipéc.*,
lyc., *natr. m.*, *phos.*, *puls.*, *rhus*, *sep.*, *stann*, *veratr.*

por la tarde: *Bry.*, *nux v.*

la primera parte de la noche: *Bell.*, *bry.*, *calc.*, *nux v.*,
rhus, *sepia.*

el resto de la noche: *Bell.*, *baryt c.*, *calc.*, *dulc.*,
hyosc., *nux v.*, *phos.*, *puls.*

Antes de media noche: *Hepar*, *rhus.*

Despues de media noche: *Bell.*, *nux v.*

Durante el día: *Euphr.*

Durante el día y la noche: *Dulc.*, *lyc.*, *stann.*; ó
cham., *ign.*

Causas ocasionales.

Si la tos es ocasionada:

Por el aire frio: *Bry.*, *phos.*, ó: *Acon.*, *carb. v.*,
hep., *spong.*

bebiendo: *Bry.*, *cocc.*, *hep.*, *nux v.*; ó *Acon.*, *ferr.*,
ars., *lyc.*, *op.*

con el calor de la habitacion: *Puls.*; ó: *Bry.*, *croc.*,
spig.

con el calor de la cama: *Nux m.*, *puls.*

por un cosquilleo en la garganta: *Ambra*, *calc.*, *zinc.*,
ó: *Bry.*, *caust.*, *hep.*

por un cosquilleo en la boca del estómago: *Bell.*,
bry., *hep.*, *natr. m.*, *phos. ac.*

por un cosquilleo en el hoyo del cuello: *Lach.*, ó:
Bell., *cham.*, ó: *Cocc.*, *ign.*, *phos. ac.*, *puls.*

por demasiada concentracion del espíritu: *Nux v.* ó
cocc.

Estando acostado: *Ferr.*, *hyosc.*, *puls.*, *rhus.*, ó:
Ars., *bell.*, *cham.*, *cocc.*, *con.*, *dros.*, *ign.*, *ipec.*, *merc.*,
phos., *sabad.*

Estando acostado de espaldas: *Nux v.*

Por la denticion en los niños: *Cham.*, *cina*, *ipec.*;
ó: *Hyosc.*, *rhus.*

Por un despecho: *Acon.*, *bry.*, *cham.*, *ign.*, *nux v.*,
staph.

Por fuertes dolores de pecho: *Acon.*, *bry.*, *nux v.*

Por una sofocacion por el calor: *Acon.*, *nux v.*,
thuja; ó: *Bry.*, *ipec.*

Por trabajos intelectuales: *Nux v.* ó *ign.*

Por el humo del tabaco: *Acon.*, *coloc.*, *spong.*,
staph., ó: *Bry.*, *ferr.*, *ign.*, *nux v.*

Por una irritacion de estómago: *Bell.*, *bry.* ó *merc.*

Por una irritacion de la laringe: *Cham.*, *cina*, *hep.*,
ipec., *merc.*, *nux v.*, *spong.*, *sulph.*

Por una irritacion de pecho: *Bell.*, *cham.*, *merc.*,
stann. ó *veratr.*

Por la lectura: *Nux v.*

Por el movimiento: *Nux v.*; ó: *Arn.*, *ars.*, *bry.*

Tocando el piano: *Calc.*

Por punzadas dolorosas en el cuello: *Cham.*, ó *stann.*

Con el llanto (en los niños): *Arn.*, *cham.*, *dros.*

Por un enfriamiento: *Bry.*, *dros.*, *ipéc.*, *nux v.*,
rhus.

Por una fuerte respiracion: *Bry.*, ó: *Cina.*, *ipéc.*

Por una sensacion de apretamiento en el cuello:
Cocc., *ign.*

Con la conversacion: *Anac.*, *cham.*, *lach.*, *merc.*,
stann., *sulph.*

Riendo: *China*, *dros.*, *phos.*, *stann.*

Bebiendo vino: *Borax.*

Durante el sueño: *Cham.*, *lach.*, *verb.*

Despues del sueño: *Lach.*

Si la tos se presenta:

Al aire libre: *Ipec.*, *nux v.*, ó: *Ars.*, *bry.*, *cocc.*,
lyc., *phos.*, *rhus*, *spig.*

Al despertar: *Nux v.*, *rhus*, ó: *Ign.*, *puls.*

Durante ó despues de la comida: *Bell.*, *bry.*, *ferr.*,
nux v., *zinc.*

Durante el reposo: *Puls.*, *rhus.*, ó: *Ferr.*, *hyosc.*

Despues de haberse acostado: *Nux v.*, *puls.*, *sabad.*,
ó: *Rhus*, *ruta*, *staph.*

Durante el sueño: *Arn.*, *bell.*, *calc.*, *cham.*, *lach.*,
nitri ac., *sepia.*

Despues de dormir: *Laches.*

Hé aqui ahora, por orden alfabético, los medicamentos principalmente empleados contra las diversas clases de tos mas frecuentes.

Aconitum. Tos seca, corta, con sintonas febriles.

— Tos despues de un calentamiento ó un enfriamiento aire seco y frio; al principio de las enfermedades inflamatorias de pecho.

Belladonna. Tos espasmódica, seca, ronca, convulsiva, que provoca cosquilleo en la tráquea, respiracion corta, coriza, estornudos, dolor de cabeza como si fuese á estallar, dolor en la nuca, dolores dislacerantes en el pecho ó punzadas en las caderas, ó bien sensacion como si alguno arrancase una cosa del vientre.

Bryonia. Tos seca, con cosquilleo en el cuello, que aumenta despues de comer hasta hacer vomitar al enfermo. — Punzadas dolorosas en los lados, en la cabeza, en el cuello ó en el pecho. — Accesos violentos de tos, durante los cuales sufren la cabeza y el pecho. — Afecciones inflamatorias del pecho, con expectoracion de mucosidades amarillentas ó mezcladas de sangre oscura y coagulada. — *El enfermo desea el mas grande descanso.*

Chamomilla. Tos seca en los niños, ocasionada por un enfriamiento en invierno. — Tos seca provocada por un cosquilleo en el hoyo del cuello, con sensacion de una cosa que sube á la garganta ó detiene la respiracion. — Tos con cosquilleo, causada especialmente por la conversacion. Aumenta si el enfermo se encoleriza, permanece al aire frio, al viento, si come y bebe; disminuye con el calor de la cama.

Dulcamara. Tos que proviene de un enfriamiento (sobre todo con la humedad) con grande secrecion de mucosidades, acompañada frecuentemente de ronquera. Se agrava si se está quieto en la habitacion; se alivia con el movimiento.

Hepar. Tos semejante á la del erup, sobre todo si el enfermo toma bebidas frias ó se enfria, aun cuando no se le enfria mas que un solo miembro (por ej. las manos).

Hyoscyamus. Tos seca, espasmódica, escitada por un cosquilleo en la tráquea. Aumenta por la noche y si el enfermo permanece acostado; disminuye cuando se sienta.

Ignatia. Tos espasmódica, gruesa, dia y noche; parece hay una pluma en el cuello; cuanto mas tose mas tiene necesidad de toser.

Ipecacuanha. Tos que sobreviene sobre todo en los niños, cuando parecen amenazados de sofocacion producida por mucosidades acumuladas. (*Tart. em.*) — Tos seca, espasmódica; la cara se pone roja y azulada; el niño se pone tieso. — Tos acompañada de náuseas y vómitos,

ó de dolores en el ombligo; deseo de orinar; respiracion corta. — Tos provocada andando al aire libre y frio. — *Tos durante el sarampion* (en los niños pequeños), *continua, muy violenta, en cada respiracion.* (Segun G. ipec. alivia inmediatamente.)

Nux vomica. Tos seca provocada por una sensacion de opresion y arañamiento en la garganta; dolores, como si la cabeza fuese á estallar; sensacion de magullamiento en el epigastrio. — Tos que hace despertar temprano, ó bien por la mañana temprano se hace mas intensa. — Tos en las personas cuya constitucion es de *nux v.*

Pulsatilla. Tos de diferente naturaleza, seca por la tarde y noche, acompañada por la mañana de expectoracion. — Tos que se presenta cada vez por dos accesos. Tos que aumenta con el calor de la habitacion y de la cama, y que cesa al aire libre.

Rhus. Tos cuya causa ha sido que estando el cuerpo sudando se mojó sea con baños frios, ya de otra manera. La tos aumenta ordinariamente por la tarde y antes de media noche; conmueve fuertemente la cabeza y pecho; aumenta despues de acostarse. disminuye cuando se vuelve el enfermo en la cama; va acompañada de vómitos (que se verifican sobre todo si se está acostado de espaldas); cesa por lo comun despues de los vómitos. — En ciertas épocas parece que *rhus* alivia á todos los enfermos atacados de tos. (Véase; *Tos ferina.*)

Trismo.

(*Contraccion espasmódica de la mandíbula inferior.*)

El trismo es una enfermedad muy peligrosa ocasionada frecuentemente por heridas principalmente en las manos, dedos y pies. Va acompañado de tétanos ordinariamente. Asi es, que si á consecuencia de lesiones, es de temer el tétanos, es preciso absolutamente encontrar el medicamento propio para evitarlo (Véase: *Lesiones*).

Ademas del *arnica* que está principalmente indicado en las lesiones, debemos mencionar sobre todo á:

Hypericum. — Lesiones mecanicas de diversa naturaleza, sobre todo si espinas ó clavos se han introducido en la planta de los pies, ó agujas han penetrado bajo las uñas al romperse, ó las estremidades de los dedos se han contundido violentamente, ó bien se han dislacerado ó herido nervios: estas lesiones van seguidas de dolores escesivos que suben á lo largo de los nervios (Hg. L.).

Los medicamentos principales contra los primeros sintomas del trismo, son: *Angust.*, *bell.*, *ign.*, *nux v.*

No indicamos los demas medicamentos contra el tétanos, por que este ya desarrollado no puede ser tratado mas que por el médico.

Úlceras.

Las úlceras crónicas, que resisten tenazmente á la curacion, tienen casi siempre su origen en una enfermedad interna (discrasia). Debe tratárselas con medicamentos internos; pues la curacion con medicamentos externos puede acarrear malas consecuencias.

Puesto que la causa ocasional es una enfermedad crónica, será el tratamiento mas feliz empleando las altas potencias y administrando los medicamentos á largos intervalos, que en dosis frecuentes y de bajas atenuaciones.

Úlceras rodeadas de una areola roja: *Ars.*, *hep.*,
puls. silic.;

de granos: *Lach.*, *sulph.*;

con carnosidades: *Ars.*, *sep.*, *silic.*; ó *petrol.*,
sulph.;

azuladas, anchas, rodeadas de vesiculas:
Lach.;

de bordes duros: *Ars.*, *lyc.*, *merc.*, *silic.*;

urentes: *Ars.*, ó: *Caust.*, *lyc.*, *merc.*, *rhus*,
silic.;

Úlceras cancerosas: *Ars.*, *silic.*, *sulph.*;
sin dolores: *Lyc.*, *phos. ac.*
inflamadas: *Acon.*, *ars.*, *hep.*, *merc.*, *silic.*
fungosas: *Ars.*, (*carb. an.*), *lach.*, *silic.*;
gangrenosas (necrosis): *Ars.*, *china*, *lach.*,
secal., *silic.* — (*Plumb.*)

Úlceras de bordes gruesos: *Merc.*;
profundas: *Calc.*, *puls.*, *silic.*;
que sangran fácilmente: *Ars.*, *carb. v.*, *lyc.*;
que segregan un pus abundante: *Puls.*, *sep.*;
acuoso: *Caust.*, *merc.*;
corrosivo: *Ars.*, *caust.*,
merc., *rhus*, *silic.*;
fétido: *Hepar*, *phos. ac.*,
sulph.;
sanguinolento: *Ars.*, *he-*
par, *merc.*;
sanioso: *Ars.*, *carb. v.*,
merc., *nitri ac.*, *rhus*,
silic.;
seroso: *Caust.*, *merc.*
(*asa fact.*);
que no segregan pus: *Calc.*, *lach.*, *merc.*,
silic.;
en forma de verruga: *Ars.*;
dolorosas: *Con.*, *silic.*, *sulph.*;
verduzcas: *Ars.*

Uñas.

Enfermedades de las uñas de las manos. — Elijanse los medicamentos según las indicaciones siguientes:

Uñas azuladas: *Chel.*, *china*, *digit.*;
descoloridas: *Ars.*;
deformes: *Graph.*;
dolorosas: *Antim. cr.*;
rodeadas de padrastrós: *Natr. m.*, *rhus*, *sulph.*;
que se esfolian: *Merc.*;

Uñas amarillentas: *Con.*;
con manchas blancas: *Nitri ac.*;
con dolores pungitivos en su derredor: *Graph.*,
hep., *silic.*;
con supuración en su derredor: *Silic.*, ó *merc.*,
sulph.

Enfermedades de las uñas de los pies. — Las principales indicaciones son las siguientes:

Ulceras con carnosidades encima: *Staph.*, ó *petrol.*,
silic.;
gruesas: *Graph.*;
azuladas: *Dig.*, *mur. ac.*;
dolorosas: *Bell.*, *hep.*, *silic.*, *teuer.*;
deshidratadas: *Ars.*;
deformadas: *Graph.*, *sep.*;
cuyas estremidades se meten en las carnes:
Staph.

Vegiga de la orina.

Catarró de la vegiga. — Es producido ordinariamente por un enfriamiento, por lesiones exteriores ó medicamentos irritantes, por la presencia de arenillas ó cálculos. Es preciso, pues, tratar la enfermedad segun su causa.

Ademas, el tratamiento varia segun la enfermedad sea aguda ó crónica.

En los casos agudos damos principalmente:

Aconitum. Cuando el enfermo tiene mucha fiebre, muchos deseos de orinar, y experimenta al orinar dolores urentes (*Bell.*).

Cantharis. Cuando hay un deseo continuo de orinar, al orinar se experimentan dolores fuertes en alto grado, escozor urente y dolores contractivos, y hay con frecuencia pérdida de sangre.

Se pueden dar ademas: *Arn.*, *ars.*, *nux v.*, *puls.*, en los casos agudos; pero en los casos crónicos se darán: *Calc.*, *carb. v.*, *dulc.*, *lyc.*, *phos.*, *petrol.*, *sulph.*

El tratamiento de estas enfermedades es tan difícil, que es imposible dar mas indicaciones en un manual popular. (Véanse: *orinas*.)

Parálisis de la vejiga. — *Ars.*, *bell.*, *dulc.*, *lach.*

Si la *parálisis* es *parcial*, de tal suerte que la orina sale tosiendo y estornudando, etc., dénse: *Antim. cr.*, *bry.*, *caust.*, *natr. m.*, *puls.*, *spong.*, *staph.*, *veratr.* (Comp. — *Incontinencia de orina*).

Si la orina sale espulsando ventosidades, *puls.* es el medicamento que se debe emplear.

En la *parálisis de la vejiga*, consecuencia de los partos, si la enferma no experimenta deseos de orinar, aunque la vejiga esté llena, y no puede orinar espontáneamente (sin ayuda de la sonda), se da con éxito una dosis de *arsenic.*, alta potencia (Guernsey).

Venéreo. — Sífilis.

Blenorragia. — (*Gonorrea* — *Purgaciones*). — Si hay sintomas de una fuerte inflamacion, dése *acon.* hasta que rebagen. Si no hay sintomas febriles, ó despues del uso de *acon.*, se prescribirá siempre *cannabis*, tres cucharadas al dia, por espacio de tres ó cuatro dias, y luego se deja descansar al enfermo, esperando la accion del medicamento. El enfermo debe guardar quietud y la tranquilidad mayor posible. Desaparecidos los sintomas mas culminantes, se dará, para conducir con el flujo que queda, *merc.* si es verde ó puriforme, y *sulph.* si es blanco, cuidando de no dar mucho medicamento, porque entonces se presentan agravaciones.

Si á pesar del uso de *cann.* hay dolores violentos, erecciones dolorosas, dificultad inmensa de orinar, orina que sale gota á gota ó sanguinolenta, se prescribirá *cantharis*, una cucharada cada 4 horas, hasta que desaparezcan dichos sintomas. Si no bastase *canth.*, dése *merc.* ó bien *sulph.*

Contra la gonorrea crónica: *Sulph.*, ó bien: *Caps.*, *natr. m.*, *nux v.*, *sep.*, *thuja*.

Contra los malos efectos de la supresion brusca de la blenorragia, como son dolores reumatoídeos, etc., dése en primer lugar *cannabis* para restablecer de nuevo el flujo, que se tratará despues como se deja dicho. Si *cann* no bastase, consúltense: *Merc.*, *puls.*, *sulph.* (Véase: *Testículos*).

Bubon. — El bubon agudo que sobreviene ya en una ingle ya en ambas á consecuencia de la blenorragia ó el chanero, está subordinado en cuanto á su tratamiento al de las enfermedades que le originan. Sin embargo, á veces por sus dolores, magnitud ó induracion, exige una atencion especial. Hé aqui las indicaciones especiales:

Bubon inflamado: *Hepar*, *merc.*, *silic.*, *sulph.*

indurado: *Carbo an.*, *hepar.*, *merc.*, *sulph.*;
o *aur.*, *staph.*, *thuja*.

dolorido: *Merc.*, ó bien: *carb. v.*, *hep.*,
nitri ac.

ulcerado: *Merc. pr. r.* (trituracion baja), *hep.*,
sulph., ó *nitri ac.*

Chancro. — Los chancros agudos con fondo elevado y úlceras que se estienden profundamente, se curan general y prontamente con *mercurius praecip. rubr.* 3^a á 6^a trituracion, una dosis todas las mañanas. Si se ha hecho abuso del mercurio, ó si la úlcera es superficial, dése *nitri ac.*; si la úlcera es elevada, papilar, *thuja*, y mas tarde *nitri ac.* ó *staph.* Si el mercurio no basta para curar el chanero, ó se forman costras en derredor de la úlcera, y si el enfermo ha tenido anteriormente erupciones en la piel, dése primero *sulph.* ó *hepar* en trituracion, y vuélvase á *merc.* despues. Téngase cuidado con la repeticion frecuente de los medicamentos, porque suele producir fuertes agravaciones.

No podemos hablar aqui de los sintomas secundarios de la sifilis. Los medicamentos principales contra sus diversas formas, son: *Aur.*, *kali bichr.*, *lach.*, *nitri ac.*, *merc. sol.* y *subl.*, *sassap.*, *staph.*, *sulph.*, *thuja*.

Verrugas.

Los principales medicamentos para combatir con éxito y prontitud las verrugas, son: *Calc.*, *caust.*, *dulc.*, *graph.*, *lyc.*, *phos.*, *natr.*, *nitri ac.*, *rhus*, *sepia*, *thuja*, *sulph.*

Verrugas callosas: *Calc.*, *lyc.*

Verrugas con picor: *Sulph.*

Verrugas carnosas ó pediculadas: *Caust.*

Verrugas anchas, duras y friables: *Antim. cr.*

Úlceras en derredor de verrugas antiguas: *Antim. cr.*

Verrugas inflamadas: *Thuja*, *sulph.*, ó *bell.*, *caust.*, *nitri ac.*, *sep.*, *silic.*

Verrugas en las cejas: *Caust.*;

en la nariz: *Caust.*;

en la cara: *Caust.*, *dulc.*, *kali*, *sepia*.

Verrugas y otras excrecencias sicósicas en los órganos genitales: *Thuja* y *nitri ac.*, y si estos no bastan, consúltense: *Euphr.*, *lyc.*, *merc.*, *phos. ac.*, *sabina*, *staph.* y *sulph.*

Verrugas en el orificio de la matriz: *Thuja*, *secal.*;

en los brazos: *Calc.*, *dulc.*, *sep.*, *silic.*, *sulph.*

en las manos de los onanistas: *Nitri ac.*, *sep.*, *thuja* y *sulph.*;

en las manos en general: *Berb.*, *calc.*, *dulc.*, *lyc.*, *natr. m.*, *nitri ac.*, *rhus*, *sepia*, *thuja.*,

en las yemas de los dedos: *Thuja*;

en el dorso de los dedos: *Dulcam.*;

en los lados de los dedos: *Antim. cr.*;

en los dedos en general: *Berb.*, *lyc.*, *petrol.*, *rhus*, *sulph.*;

anchas: *Berb.*;

en los dedos gruesos de los pies: *Spigel.*

Vértigo.

El vértigo no es mas que el sintoma de otra enfermedad, y generalmente de una congestión cerebral, ó

de falta de sangre (vértigo congestivo ó anémico). A veces sobreviene repentinamente, otras es crónico. Si se puede averiguar su verdadera causa, se la tomará por guía para la elección del medicamento.

Después de comer ó haber cargado demasiado el estómago: *Arn.*; ó: *Cham., cocc., nux v., puls., rhus.*

A consecuencia de una congestión sanguínea en la cabeza: *Acon., bell., glon.*; ó bien: *Nux v., phos., sulph.*

A causa de la anemia: *China, ferr., puls.*; ó: *Cal., natr. m.*

Después de erupciones ó úlceras suprimidas: *Calc., sulph.*

A causa de congestiones hemorroidales: *Nux v., sulph.*

Además se tendrán en cuenta las indicaciones siguientes:

Aconitum. Vértigo al volverse, con pérdida de la vista ó del conocimiento.

Arnica. Vértigo al volverse, moviéndose, comiendo.

Belladonna. Vértigo con ansiedad y desvanecimiento. Laxitud antes y después del acceso. — Vértigo como si uno fuera columpiado. (*Ferr., merc., thujá.*)

Calcarea. Vértigo al subir (una escalera). — Aturdimiento en la cabeza y temblor antes de desayunarse.

Cocculus. Vértigo con deseos de vomitar al volverse.

Conium. Vértigo volviendo la cabeza ó volviéndose en la cama.

Ferrum. Vértigo bajando una montaña ó á la vista de agua corriente.

Natrum muriaticum. Vértigo con sacudidas en la cabeza y falta de reflexión.

Nux vomica. Vértigo por la mañana temprano y después de comer; á causa de esfuerzos intelectuales; acostándose de espaldas. (*Sulph.*)

Phosphorus. Vértigo con náuseas y dolor de cabeza presivo. — Vértigo crónico á todas las horas del día.

Pulsatilla. Vértigo con dolor de cabeza, zumbido de

oidos, calor ó palidez de la cara, negro delante de los ojos, náuseas.

Rhus. Vértigo que hace caer y con temor de la muerte.

Sulph. Vértigo sobre todo cuando está sentado.

Hay una multitud de otras indicaciones, segun las circunstancias que provocan, aumentan ó disminuyen el vértigo: segun la época del día en que se verifica y los sufrimientos concomitantes, de los que vamos á indicar los mas importantes.

Vértigo: Despues de haber tomado café: *Cham.*

Encorbándose: *Bell., bry., lach., nux v., puls.*

Entrando en una habitacion viniendo del aire libre:

Merc., phos.

Con oscurecimiento de la vista: *Acon., bell., nux v., puls.:* ó: *Arn., hep., ign.*

Con palpitaciones de corraçon: *Plat., puls.*

Levantándose de la cama: *Bell., cocc., puls.,* ó: *Acon., arn., bry., china, merc.*

Despues de beber vino: *Natr. c., zinc.*

Jendo en carruage: *Hep., silic.*

Con vómitos y náuseas: *Calc., puls.,* ó: *Acon., ars., bell., bry., cocc., nux. v.*

En las zonas tórridas: *Lyc.*

Que sube de la nuca: *Silic.*

En el occipucio: *China, zinc.*

Víruela, Varioloide y Varicela.

Se han recomendado tantos medicamentos contra la viruela, que han sido eficaces en unas epidemias y en otras no, que se debe fijar mucho la atencion en el caracter especial de la epidemia, como ya lo hemos dicho al tratar de otras epidemias. El *variolinum* ó *vaccinum*, es el medicamento que, en general, parece ser el mas ventajoso, no solo como preservativo, sino en todas las fases de la enfermedad.

Wolf y B. han recomendado *thuja*; pero algunos de mis colegas y yo no hemos podido comprobar la eficacia de *thuja*. El Dr. Teste recomienda *causticum* 30^a y *mercurius corros.* 30^a, dados alterernativamente (esto es, dos veces *caustic.* por la mañana y dos veces *merc. cor.* por la tarde). Varios médicos homeópatas han visto buenos resultados de este tratamiento.

El Dr. Nuñez recomienda *clermatis* como preservativo y curativo.

Los médicos americanos y algunos europeos recomiendan *Sarracenia purpurea*, y otros la desechan como ineficaz.

Segun los sintomas y las complicaciones, se ve precisado el práctico á recurrir á otros varios medicamentos, de que no podemos hablar — Los principales son *acon.*, *apis* y *bell.*, el primero para el primer periodo ó periodo febril, y los segundos, sobre todo *bell.* para el periodo eruptivo, con agitacion, insomnio y aun sintomas cerebrales. Para el periodo de supuracion, *merc.*, y para el de la desecacion, *acon.*, *bell.*, *cham.*, *puls.*

Arsenicum. Cuando hay gran postracion de fuerzas; las viruelas se deprimen ó vuelven negras (*rhus* y *tart. em.*).

Coffea. Agitacion y vomitos biliosos.

Stram. Delirio furioso, deseo de arrojarse de la cama, cantos, risas, llanto, sueño con sobresaltos ó insomnio completo, etc.

Sulph. (y *chinin*). Picor irresistible al empezar la desecacion.

Rhus. Sintomas tifoideos.

Phosphorus. Hemorragias.

En cuanto á la vacunacion, no diremos de ella que no es un preservativo, pero si que ha contribuido á propagar las escrofulas, herpes, etc.

La viruela loca, ó la *varicela*, no exige ordinariamente tratamiento médico. La *varioloide*, por el contrario, se curará con *vaccinum* ú otros medicamentos recomendados contra la viruela.

Vómitos. (*Náuseas, etc.*)

Aunque estos sufrimientos no sean mas que los síntomas de una enfermedad, no por eso dejan de ser importantes. Solo la naturaleza de los vómitos y las circunstancias que los acompañan, nos hacen conocer la enfermedad; ellos nos guian en la eleccion de los medicamentos.

Si se ha descubierto la causa segura de la enfermedad, lijense en las náuseas y vómitos

provocados por el movimiento de un carruage y navio: *Ars., cocc.* (Hartung recomienda *hyoseyamus*, otros *tabac*, y *staph.*);

provocados por un desarreglo de estómago: *Antim. cr., bry., ipec., nux v., puls.*;

provocados por excesos en las bebidas: *Ars., lach., nux v.*

En los vómitos y nauseas de las embarazadas, dénse: *Ipec., nux v., puls.*, ó: *Con., kreos., natr. m., sep., veratr.* (Comp. Embarazo.)

Naturaleza de los vómitos.

Dénse, en los vómitos,

agrios: *Calc., china, lyc., nux v., phos., sulph.*;

de alimentos: *Ars., bry., cupr., ferr., nux v., silic.*;

acuosos: *Bry., caust.*;

biliosos: *Ars., bry., cham., merc., nux v., sep., veratr.*;

de bebidas: *Ars.*, ó: *Bry., cham., ipec., nux v., silic.*;

de materias estercoráceas: *Bell., nux v., op., plumb.*;

mucosos: *Dros., puls.*;

negros: *Ars., nux v.*;

sanguinolentos: *Arn., ferr., ipec., phos.*

Si hay náuseas, dénse: *Ipec., nux v., puls., silic., sulph., veratr.*

Si hay deseos de vomitar: *Ipec.* ó *bell.*

Zarzaparrilla.

Es este un medicamento del cual suele abusarse mucho, y que produce sintomas variados en el estómago, vientre y órganos genitales. Los principales remedios homeopáticos contra sus malos efectos, son *Merc.* y *bell.* ó bien: *Phos., sep., sulph.*

Apéndice.

Enfermedades de los niños.

Como no podemos conocer los sintomas subgetivos, es decir, los sentimientos y sensaciones del niño, no podemos tomar en consideracion mas que los sintomas objetivos, es decir, los fenómenos patológicos que se presentan á nuestros sentidos, tales como la tez y la expresion del rostro, la temperatura de la piel, el humor, los gestos del niño, etc. Por eso en el tratamiento de estas enfermedades, y sobre todo con el método homeopático, debe tener el médico mucha paciencia y experiencia; sin ambas cualidades es imposible ser un buen médico de niños. Aunque no podemos contar con los sintomas subgetivos, cuya descripcion exacta en los adultos es una condicion indispensable para la buena eleccion de los medicamentos, la homeopatia ha sabido sin embargo utilizar tambien los diferentes sintomas objetivos para la eleccion de sus medicamentos, que el medico homeópata puede dar los medicamentos que convienen á la enfermedad con mucha mas seguridad, y sin ningun peligro para la organizacion tan delicada del niño, que lo puede hacer el médico alópata. Una multitud de sintomas que para este no tienen valor alguno ó muy poco, son frecuentemente de una importancia decisiva para el médico homeópata. Sábese que nuestros adversarios, que no pueden negar en absoluto nuestros

triumfos, sostienen que esos triunfos no dependen mas que de la dieta ó confianza que el enfermo tiene en nuestros medicamentos. Pero en las enfermedades de los niños no puede hacerse intervenir la confianza; y cuanto á la dieta ó régimen, el médico homeópata y el alópata mandan generalmente las mismas prescripciones dietéticas; de suerte que cuando se quiere discutir de buena fé, no se puede poner por causa la dieta. Los éxitos de la homeopatía, bien superiores á los de la alopatía, no deben de ningun modo ser atribuidos sino á la influencia directa de los medicamentos aplicados segun los principios homeopáticos.

No hablaremos mas que de las principales enfermedades de los recién-nacidos y niños de pecho, con sus medicamentos principales.

Las enfermedades de los niños que no se encuentren en este capítulo, deben buscarse en el lugar que les corresponde en el cuerpo de nuestro tratado.

Solo por facilitar al principiante el estudio de los medicamentos y grabarlos en su memoria, damos en cada medicamento las indicaciones que deben guiar en su eleccion.

Hablemos primero de algunos abusos.

Lactancia de los niños. — En general nadie niega que la leche de la madre es para los recién-nacidos el mejor y mas sano alimento; muchas madres y parteras creen sin embargo que es mejor acostumbrar enseguida al niño á otro alimento, cuando la madre prevee que en mucho tiempo no podrá lactar á su hijo. Este es un grave error; porque justamente las primeras semanas despues del parto son las que ofrecen mas peligros asi para la madre como para el niño; y solo dejando á la naturaleza seguir su curso se evitarán seguramente esos peligros. En los grandes calores del estío, sobre todo, es muy importante que la madre dé de mamar á su hijo, ó por lo menos hasta que el otoño empiece y el tiempo refresque.

Un segundo abuso que se comete por la generalidad,

es el dar á los niños agua de *manzanilla* ó *hinejo*. La mayoría de las niñeras y parteras creen que un niño no puede estar sano y robusto, sino se mezcla la leche que toma con una ú otra de las aguas espresadas. Si solo se añadieran á la leche una de esas aguas cuando el niño tiene vientos ó cólicos, no nos opondríamos á esa mezcla. Pero el uso continuo de tales mezclas provoca al fin los males que se desean evitar. El uso del agua de manzanilla causa, como los experimentos en el hombre sano lo han demostrado, cólicos, una diarrea biliosa, insomnio, una gran irritabilidad, y disposición á rubicundeces y escoriaciones de la piel. Los que no quieran creerlo, no tienen que ir mas que por ej. á América, donde apenas se hace uso de la manzanilla; rara vez verán rubicundez y escoriaciones en la piel de los niños.

Repertorios de las enfermedades de los niños.

Demacracion de los niños (atrofia): *Ars.*, *calc.*, *china*, *petrol.*, *phos.*, *podoph.*, *silic.*, *sulph.*

Aftas: *Borax*, *merc.*, *sulph.*, *sulph. ac.*

Asma y respiracion dificil: *Ipec.*, ó *ars.*, *samb.*

Cólicos: *Cham*, *bell.*, *acon.*; ó: *Cina*, *ipéc.*, *jalappa*, *rheum*, *senna*. — Cuando se ha abusado de la manzanilla: *Ign.*, *puls.* ó *nux v.*

Estreñimiento de vientre: *Bry.*, *magn. m.*, *nux v.*, *op.*, *sep.*; ó *Lyc.*, *sulph.*

Convulsiones: *Bell.*, *cham.*, *ign.*; ó: *Cina*, *ipéc.*, *op.*, *tarant.*

Gritos sin que se pueda apreciar la causa: *Bell.* ó *cham.*

Crup: *Acon.*, *hep.*, *spongia.*

Denticion: *Acon.*, *bell.*, *calc. c.*, *coff.*; ó *Cham.*, *ign.*, *kreos.*, *merc.*, *podoph.*, *sulph.*

Diarrea causada por agrios en el estómago: *Rheum*, ó: *Cham.*, *sulph.*

Diarrea causada por el calor del verano: *Bry.*, ó: *Carb. v.*, ó: *Ipec.*, *nux v.*, *podoph.*

Diarrea causada por el tiempo frio: *Dulc.*, ó: *Nux m.*, *rhus*, *sulph.*

Romadizo (coriza seco): *Nux v.*, *samb.*; coriza húmedo: *Cham.*, *carb. v.*, *dulc.*

Escoriaciones: *Cham.*, ó: *Hepar*, *merc.*, *silic.*, *sulph.*

Fiebre: *Acon.*, *cham.*, *coff.*, ó *bell.*

Ictericia: *China*, *merc.*, ó *luch.*

Indigestion: *Ipec.*, *cham.*, ó: *Bell.*, *merc.*, *nux v.*, *puls.* — Cuando hay mucha acidez: *Bell.*, *calc.*, *cham.*, *rheum.*, ó *nux v.*, *puls.*

Inflamacion de los ojos: *Acon.*, *cham.*; ó: *Bell.*, *hep.*, *merc.*, *sulph.*

Insomnio: *Coff.*, ó: *Acon.*, *bell.*, *cham.*, *nux v.*, *op.*

Pecho. — El niño no quiere cogerlo. Véase: *Parto y Sobreparto.*

Infarto ó inflamacion del pezon ó pezones: *Arn.*, *cham.*; ó *Bell.*, *hep.*, *silic.*

Retencion de orina: *Acon.*; ó: *Arn.*, *camph.*, *cham.*, *puls.*

Tumor sanguíneo en la cabeza: *Arn.*; ó *rhus.*, *silic.*

Lombrices (Sufrimientos causados por las): *Cina.*, *calc.*, *ferr.*, *merc.*, *nux v.*, *sulph.*

Vómitos: *Ipec.*, *puls.* — Vómitos de leche: *Aethusa.*

— Vómitos con estreñimiento: *Nux v.*

N. B. De todos los medicamentos que acabamos de citar, se da á los niños pequeños, de uno á seis meses un glóbulo sobre la lengua, de seis á doce dos glóbulos, de una atenuacion elevada.

Indicaciones especiales para los diversos medicamentos.

Aconitum. El niño tiene la piel seca y caliente, no tiene sueño, grita mucho, muerde sus dedos, y tiene diarrea con deposiciones acuosas y verduzcas. — Reten-

ción de orina en los recién-nacidos. — Tos crupal. — Accesos de tos durante los cuales lleva el niño su manos al cuello. — (G.). — Fiebre verminosa. —

Apis. Despierta por la noche con gritos penetrantes. (Cuando principia el hidrocéfalo).

Arsenicum. No es posible hablar á los niños; estan mejor cuando se les pasea (Hg.).

Belladonna. Conviene principalmente á los niños que se desarrollan rápidamente, tienen los ojos azules y los cabellos rubios; conviene tambien á los niños que duermen poco, pero que estan siempre en un estado de soñolencia, medio dormidos, medio despiertos (G.). — Conviene ademas á los que son vivos, caprichosos, que lloran y rien por nada, transpiran y se enfrian facilmente. — Los niños ponen los brazos sobre la cabeza durante el sueño, ó bien doblan la cabeza ó se hechan de vientre (Hg.). *Gritan repentinamente*, sin causa conocida, y cesan de gritar tambien repentinamente. Suspiran mucho. — *Belladonna* es tambien util para la diarrea del estio; cuando los niños enfermos tienen la garganta tan seca que se agitan, meten las manos en la boca, como si quisieran arrancar alguna cosa de su garganta (G.).

Borax. Miedo durante un movimiento de bajada, bajando una escalera, acostando al niño, etc. Asi, por ej., el niño que duerme tranquilamente en los brazos de su niñera, se despierta gritando si se le quiere acostar. — *Susto violento causado por el mas pequeño ruido*. — *Aftas* que sangran facilmente cuando el niño come y bebe. — Las pestañas se meten dentro de los ojos. — Los niños lloran y gritan antes de orinar.

Bryonia. Labios secos y agrietados. — Estreñimiento de vientre con deposiciones duras, secas, como tostadas. — Los niños agitan sus mandíbulas como si masticasen. — Nu pueden sufrir el movimiento; el mas pequeño parece que aumenta sus sufrimientos.

Calcareo carbonica. Este medicamento conviene sobre todo á los niños escrofulosos y gruesos, á los que tienen la piel seca, floja y las fontanelas abiertas; á los que

transpiran tanto por la cabeza, que mojan la almohada en gran parte (G.). — Muchas costras sobre la parte de la cabeza cubierta por los cabellos, con picor; los niños se rascan la cabeza, cuando se les turba su sueño ó se les despierta (Hg.). — Deseo de comer huevos durante una enfermedad ó convalecencia (Hg.). — Deposiciones blanquezas y como mezcladas de cal. — La boca del estómago parece que está combada. — Tos, acompañada de mucho ruido mucoso en los bronquios, y que se aumenta por la mañana. — Infarto de las glándulas del cuello. — Dentición difícil. — Insomnio después de las tres de la mañana (G.).

Causticum. Los niños no pueden hacer de vientre sino de pié, y de ningún modo estando sentados (Hg.).

Chamomilla. Los niños quieren que se les esté paseando continuamente en brazos, y no están quietos más que en esta posición; ó bien dan vueltas, tiran la cabeza hacia atrás, y se ponen tiesos. No quieren que se les toque (Hg.). Tienen movimientos convulsivos durante el sueño. Piden una porción de cosas que rehúsan en cuanto se les da (G.). Llanto y gritos, mal humor; una de las mejillas está quemante y encarnada, la otra pálida; sed; sudor en la frente y cabellos; cólicos ó diarrea con deposiciones verdes ó semejantes á huevos cortados. — Sudor en la cara después de haber comido. — Convulsiones durante la dentición; una de las mejillas está encarnada y la otra pálida. — El niño sonríe durante su sueño ó se despierta sobresaltado; grita, suspira, llora, se agita. Tiene cólicos con sudor en la frente. — Salivación con sed y con boca y lengua secas (Hg.).

Cina. Sufrimientos que provienen de lombrices. Los niños se frotan continuamente la nariz y la frente. Durante el sueño encorban la cabeza, se levantan sobresaltados, y en sus ensueños son acometidos de miedo y susto (Hg.). — No están acostados cinco minutos sin gritar: es preciso que se les acune, les pasee y les meza en las rodillas día y noche. — Movimientos de deglución continuamente, como si los niños quisieran

tragar alguna cosa. — Pequeña tos de irritacion. — Hambre canina. — Diarrea cada vez que han bebido. La orina se vuelve lechosa despues de algun tiempo, ó bien se coagula formando una masa gelatinosa. — Los niños se vuelven y tuercen durante el sueño y rechinan con frecuencia los dientes (G.). — Lloran y gritan; no se dejan tocar, son insensibles á las caricias y rehusan lo que se les ofrece (B.).

Coffea. El niño llora facilmente, y al llorar rompe en carcajadas repentinamente; luego llora de nuevo (G.). — Convulsiones de los niños durante la denticion, con rechimiento de dientes (Hg.). — Insomnio, como si proviniese de un exceso de alegria.

Ignatia. Los niños se despiertan temblando y dando gritos penetrantes. — Movimientos convulsivos de las estremidades. — Espasmos acompañados de gemidos. — Calambres provocados por un susto (G.), ó por un castigo (Hg.). — Convulsiones durante la denticion, espuma en la boca y los pies se mueven sin cesar (Hg.). — Deposiciones dificiles de vientre con caída del recto. —

Ipecacuanha. Tos durante el sarampion en los niños delicados; á cada respiracion sobreviene una tos violenta y continúa. — Los niños lloran, gritan y duermen con los ojos entreabiertos (B.). — Deposiciones semejantes al agua de haber fregado, ó verdes, con cólicos y náuseas que aumentan por la noche.

Ialappa. Los niños estan contentos y tranquilos durante el dia; pero durante la noche gritan y se agitan (G.). — Fuertes cólicos de vientre, con ruido de gases; el niño grita y se retuerce con los dolores (N.).

Lycopodium. La orina encierra un sedimento de arena roja que mancha las envolturas; los niños gritan fuertemente antes de orinar, y cesan despues de gritar tan pronto como empiezan á orinar (G.). — Las ventanas de la nariz se agitan fuertemente durante la respiracion, como si fueran á cambiar de sitio (en los niños que sufren de los órganos de la respiracion) (Wilson). — El niño

grita todo el dia y duerme toda la noche (G.). — Mucho ruido de gases en el vientre, sobre todo en el lado izquierdo, bajo las costillas. — Agravacion por la tarde de 4 á 8.

Nux vomica. Medicamento principal despues del empleo de purgantes, medicamamentos narcóticos, despues de un abuso de manzanilla, etc. — Estreñimiento de vientre con deposiciones dificiles y duras, ó deposiciones frecuentes, pero pequeñas, acompañadas de muchos esfuerzos inútiles. — Caída del recto durante las deposiciones. — Hernias. — Insomnio ó agravacion de los sufrimientos de 3 á 4 de la mañana. — Durante el dia y dentro de casa, el niño es acometido de un coriza que fluye al aire libre; durante la noche, por el contrario, es un romadizo (B.). — Los niños encogen frecuentemente las piernas, y las estienden pronto (G.).

Opium. Estreñimiento de vientre, y si las deposiciones se componen de grandes bolas endurecidas (alta atenuacion (G.). — Insomnio con cara encarnada (Hg.).

Petroleum. — Diarrea solo durante el dia, acompañada de demacracion (G.).

Platina. Estreñimiento con deposiciones ó heces fecales que se pegan al ano, como la arcilla.

Podophyllum. Demacracion; las deposiciones son naturales pero demasiado frecuentes. — Diarrea sobre todo por la mañana y antes de medio dia, ó bien despues de haber comido ó bebido (Comp.: *Diarrea*). — Caída del recto. — Denticion dificil; los niños vuelven la cabeza, suspiran mucho durante el sueño, rechinan los dientes y duermen con los ojos entreabiertos.

Rheum. Diarrea en los niños de pecho, con deposiciones amarillento-claras, no dolorosas, que contienen muchas mucosidades. — Diarrea durante la denticion con tenesmo frecuente. — Salivacion con cólicos y diarrea. Deposiciones ácidas, semejantes á la leche coagulada, á la levadura ó al agua de jabon; se vuelven mas tarde verdes; ponen encarnado el ano. — Los niños se agitan y encogen las piernas. — Se incomodan

y tienen delirio durante el sueño. Palidez; movimientos convulsivos de los músculos de la cara y dedos. — *Rheum.* conviene principalmente á los niños cuyo cuerpo exhala un olor ágrío, á pesar de la limpieza mas escrupulosa; es bueno tambien en una diarrea ágría ó ácida con cólicos (Hg.); lo mismo en los cólicos de los niños que se agravan descubriéndoles un brazo ó una pierna (R.). — El niño pide de comer todo lo que se puede imaginar; luego que ha comido un poco no quiere mas. (Dr. Bell.)

Senna. Cólicos ventosos, los niños gritan de tal manera que se ponen azulados (G.).

Sepia. Estreñimiento de vientre en los niños y los recién nacidos, cuando es preciso sacar los excrementos con los dedos, á causa de la inactividad del recto (G.). — Incontinencia de orina en los niños durante el primer sueño (G.).

Stannum. Cólicos y otras afecciones de vientre que se alivian oprimiéndole. — El niño quiere que se le acueste siempre de vientre, de espaldas ó sobre las rodillas de la madre ó niñera; de otro modo está descontento (G.).

Sulphur. Los niños despiertan con frecuencia con gritos. — Grande voracidad; el niño quiere llevarlo todo á la boca y lo mira con avidez. — Se asusta frecuentemente y da gritos terribles. — Los excrementos escorian el ano, ó los pliegues de la piel que rodea al ano.

Tarantula. Corea ó baile de S. Vito. — Movimientos desordenados é involuntarios de los brazos y manos, de los músculos de la cara. — Gestos, visages involuntarios. — Las cosas se caen de las manos (N.).

Nos permitimos tambien llamar la atencion del lector sobre el *tratamiento profilactico*, muy recomendado por el Dr. Gastier y otros médicos.

Como el herpetismo, las escrófulas y otras enfermedades (psora, sífilis y sicosis) han invadido, por decirlo así nuestra actual generacion casi por completo, gracias

á la indiferencia [imperdonable] de los médicos vacunadores, debe tomarse uno la pena de examinar, un poco mas que lo hace la generalidad de los médicos homeópatas, esas enfermedades que se han hecho tan generales. El Dr. Gastier recomienda se de á los niños, despues de pasados algunos dias de su nacimiento, una dosis de la 30^a ó 200^a atenuacion de *sulphur*, y repetirla á las 4 ó 5 semanas (si los sintomas no indican otro medicamento), y administrar tres meses despues una dosis de *calcareo carb.* El Dr. Nuñez recomienda *sulphur* y *mercurius*, una dosis del primero á principios de un mes, y otra del segundo á principios del mes siguiente, y asi sucesivamente; y aconseja las altas atenuaciones. Dicese que este tratamiento favorece el crecimiento de los niños y el desarrollo normal de sus dientes; ademas, preserva á los niños de enfermedades discrásicas (herpes, etc.). El profesor Guernsey aconseja dar al niño, si es posible, los mismos medicamentos como profilácticos que han sido indicados segun los sintomas de la discrasia que sufre el padre ó la madre. No se dará al niño mas que una sola dosis de una alta atenuacion.

Indice alfabético.

A.

Aborto 54.
Absceso 53.
Aconitum 20.
Aethusa Cynapium 24.
Aftas 56.
Agrios 172.
Aguas del estómago 172.
Ahogos 65.
Albuminuria 310.
Alcanfor 56.
Alimentos (deseo ardiente de ciertos) 59.
Almorranas 220.
Alopecia 77.
Alumina 24.
Ambliopia amaurótica 280.
Amenorrea 259.
Amigdalitis 56.
Ammonium carbonicum 22.
Amor al país 294.
Anasarca 226.
Angina 56.
— difterica 137.
— lardácea 137.
— maligna 137.
— laríngea 243.
Año (enfermedades del) 58.
Anorexia 59.
Antimonium crudum 22.
Apetito 59.
— escesivo 59.
— (falta de) 59.
Apis mellifica 22.
Apoplegia 60.

Argentum nitricum 22.
Arnica montana 22.
Arsénico 62.
Arsenicum album 24.
Artritis 308. 207.
Ascitis 226. 227.
Asfixia 63.
Asma 65.
Aspecto de la lengua 246.
Aurum metallicum 25.
Azufre 68.

B.

Baile de S. Vito 144.
Baños 68.
Baryta carbonica 25.
Bazo (enfermedades del) 69.
Belladonna 25.
Blefaritis 282.
Blenorragia 331.
Boca (enfermedades de la) 72.
Bocio 74.
Borax 26.
Bronquitis 74.
Bryonia alba 27.
Bubon 332.

C.

Cabellos (enfermedades de los) 77.
Cabeza (enfermedades de la) 78.
— (dolores de) 79.
Cadera 92.

- Café (sufrimientos por el abuso del) 94.
- Caidas 247.
 - de los cabellos 77.
 - de la matriz 256.
 - del recto 58.
 - de la vagina 256.
- Calambres del estómago 167.
 - de la matriz 257.
 - de las pantorrillas 295.
- Calcareo carbónica 27.
- Calculos biliares 228.
 - en los riñones 310.
- Calor (sofocacion por el) 317.
- Calvicie 77.
- Camphora 28.
- Cancer de la matriz 256.
 - de la nariz 272.
 - de los pechos 300.
- Cantáridas (picaduras y malos efectos de las) 94.
- Cantharis 28.
- Capsicum 29.
- Carbo vegetabilis 29.
- Carbuncló 95.
- Cardenales 249.
- Cardenillo (envenenamiento por el) 402.
- Caries 236, 237.
 - de los huesos de la nariz 273.
- Carruage 97.
- Catarro bronquial 74.
 - de los bronquios 74.
 - de la vegiga de la orina 330.
 - de la tráquea 74.
 - epidémico 210.
 - laríngeo 74.
 - pulmonar 299.
- Causticum 29.
- Ceguera diurna 282.
 - nocturna 282.
- Cepa 30.
- Cerebro (enfermedades del) 97.
- Cerveza (sufrimientos por el abuso de la) 71.
- Chamomilla 30.
- Chancro 332.
- China 30.
- Ciatica 99.
- Cina 31.
- Clorosis 104.
- Cobre 102.
 - (cólicos de) 102.
- Cocculus 31.
- Coffea 32.
- Coito 129, 130.
- Cólera morbo epidémico 103.
 - esporádico 107.
- Colerina 107.
- Cólicos de cobre 102.
 - de plomo 302.
 - menstruales 259.
 - miserere 242.
 - nefríticos 310.
 - nerviosos 107.
 - reumáticos 108.
 - ventosos 108.
 - por indigestion 107.
- Colocynthis 32.
- Color y cubierta de la lengua 246.
- Congestion cerebral 78.
 - de sangre en la cabeza 78.
 - pulmonar 299.
- Congoja 109.
- Conium 32.
- Conmociones 248.
- Coqueluche 116.
- Constipado 110.
- Contraccion de la mandibula 327.
- Contusiones 248.
- Convulsiones 112.
- Corazon (enfermedades del) 120.
- Corea 114.
- Coriza 110.
- Córnea (enfermedades de la) 285.
- Costado (dolor de) 123.
- Costra de leche en los niños 190.

Coxartrocace 93.
Crocus 32.
Croton Tiglium 33.
Crup 124.
Cuprum 33

D.

Debilidad 427.
— de la vista 280.
Delirio 429.
Demacracion 429.
Derrame de sangre, cerebral 60.
Derregadura 248.
Descenso de la matriz 256.
— del recto 58.
— de la vagina 256.
Deseos ardientes de ciertos alimentos 59.
— sexuales 429.
Desvanecimiento 409.
Diarrea 430.
— colérica 407.
Difteria ó difteritis 437.
Dilatacion de la matriz 257.
Disenteria 439.
Dismenorrea 259.
Dispepsia 164.
Divieso 444.
Dolores de cabeza 79.
— estómago 167.
— garganta 56.
— muelas 264.
— oidos 277.
— de la matriz 257.
— nerviosos 442. 273.
— en los riñones 340.
Drosera 33.
Dulcamara 34.

E.

Eclampsia 444.
Edad critica (padecimientos de la) 260.
Embarazo 444.
Embriaguez 74.

Empacho gástrico ó intestinal 173.
Encefalitis 97.
Enflaquecimiento 429.
Enfriamiento 449.
Enteritis 242.
Epilepsia 143. 447.
Epistaxis 212.
Equimosis 249.
Erisipela 447.
— del escroto 349.
Erupciones 449.
— de la piel 449.
— — cabeza 449.
— — cara 450.
Escarlatina 452.
Escorbuto 457.
Escoriacion 460.
Escrófulas 461.
Esguinces 247.
Espasmos 412.
Espectracion de sangre 244.
Esplenitis aguda y crónica 69. 70.
Estaño (intoxicacion por el) 162.
Esterilidad 430.
Estómago (enfermedades del) 163.
Estomatitis 72.
Estrabismo 284.
Estreñimiento de vientre 476.
Euphrasia 34.

F.

Falta de apetito 59.
— de sueño 244.
Ferrum 34.
Fiebres 479.
— adinámica 193.
— amarilla 479.
— ataxica 493.
— biliosa 479.
— catarral 479.
— de denticion 479. 340.
— de leche 479. 297.

Fiebre gástrica 193.
 — héctica 129. 179.
 — inflamatoria 179.
 — intermitente 186.
 — miliar 263.
 — mucosa 179.
 — puerperal 191.
 — pútrida 179. 193.
 — reumática 179. 308.
 — tifoidea 193.
 — traumática 179. 248. 291.
 — urticaria 200.
 — verminosa 179. 252.

Fisonomía 312.

Fístula lagrimal 281.

Flatulencia 201.

Flemones 202.

Flemon en el carillo 205. 264.
 265.

Flores blancas 203.

Flujo blanco 203.

Flujo de sangre por la nariz
 212.

— — del estómago 213.

— — de los intestinos 218.

— — de la matriz 216.

— — de los oídos 218.

— — de los pulmones 214.

— — del recto ó ano 218.

— — de la uretra 219.

Flujo purulento por los oídos
 278.

Fluxion á la cara 205.

— á las muelas 205.

Forúnculos 141.

Fósforo 206.

Fotofobia 255.

Fuego de S. Antonio 226.

G.

Gangliones 252.

Gangrena 206.

Garganta (dolor de) 56.

Garrotillo 124.

Gases en la matriz 257.

Gastralgia 167.

Gastritis 171.

Gastrorragia 213.

Gastrosis 173.

Glándulas (afecciones de las)
 207.

Glonoin 34.

Glositis 247.

Gonorrea 331.

Gordura excesiva 303.

Gota 207.

Grietas 209.

Grippe 210.

H.

Hambre canina 59.

Hematemesis 213.

Hematuria 219.

Hemeralopia 282.

Hemicránea 79. 243.

Hemorragia cerebral 60.

— del estómago 213.

— de la matriz ó uterina 216.

— de los oídos 218.

— de los pulmones 214.

— de los intestinos 218.

— por la nariz 212.

— por la uretra 219.

Hemoptisis 214.

Hemorroides 220.

Hepar 35.

Hernias 224.

Herpes 225.

— zoster ó zona 226.

— anular 226.

Hidrocefalo agudo 97. 227.

— crónico 99. 227.

Hidrocele 319.

Hidrofobia 308.

Hidropericardias 226.

Hidropesía 226.

— general 226. 27.

— del vientre 227.

— del pecho 227.

— del corazón 227.

— de los ovarios 292.

Hidrotorax 226.

Hierro 227.
 Hígado (enfermedades del) 228.
 Hinchazon de la nariz 273.
 Hipo 228.
 Hipocondría 229.
 Histérico 230.
 Horror á la luz 255.
 Huesos (enfermedades de los) 236.
 Hyoscyamus 35.

I.

Ictericia 239.
 Ignatia 39.
 Impotencia 129. 130.
 Incontinencia de orina 291.
 Indigestion 173.
 Induracion del bazo 70.
 — de los pechos 300.
 Infarto del bazo 70.
 Inflamacion de las amígdalas 56.
 — de la articulacion de la cadera 92.
 — del bazo 69.
 — de la boca 72.
 — del estómago 171.
 — de los huesos 236. 237.
 — de la laringe 245.
 — de la lengua 246.
 — de la matriz 257.
 — de la médula espinal 258.
 — de la nariz 273.
 — de los oidos 278.
 — de los ojos y párpados 282.
 — de los ovarios 292.
 — de las parótidas 295.
 — de los pechos 298. 299.
 — de los riñones 310.
 — de las rodillas 310.
 — de los testículos 318.
 Insectos venenosos (picaduras de los) 240.
 Insomnio 241.
 Intertrigo 160.

Intestinos (enfermedades de los) 242.
 — inflamacion 242.
 — estrangulacion 242.
 Iodium 36.
 Iodo 243.
 Ipecacuanha 36.

J.

Jaqueca 79. 243.

K.

Kali bichromicum 37.
 Kalmia latifolia 37.
 Kreosotum 37.

L.

Lachesis 38.
 Lamparones 244.
 Laringe (enfermedades de la) 245.
 Laringitis 245.
 — aguda 245.
 — crónica 245.
 Lengua 246.
 — aspecto, color, cubierta 246.
 — inflamacion 247.
 — parálisis 247.
 — úlceras 247.
 Lesiones mecánicas 247.
 — equimosis ó cardenales 294.
 — esguinces 247.
 — conmociones 248.
 — contusiones 248.
 — derrengaduras 248.
 — fracturas 249.
 — heridas 250.
 — luxaciones 249.
 — pasos en falso 248.
 — torceduras de pies 249.
 Leucorrea 203.
 Licopodio (malos efectos del empleo del) 251.
 Lipomas 252.

Lobanillos 252.
Locura 252.
Lombrices 252.
— solitaria 252.
Lumbago 340.
Lupias 252.
Luxaciones 249.
Luz (horror á la) 255.
Lycopodium 38.

M.

Magnesia (abuso de la) 255.
Magnesia muriatica 38.
Malparto 54.
Manchas en la córnea 288.
Mandibula (contraccion de la) 255.
Marasmo 129.
Mareo 256.
Matriz (enfermedades de la) 256.
— caída ó descenso 256.
— cancer 256.
— dilatacion 257.
— gases 257.
— inflamacion 257.
— metralgia 257.
— pólipos 258.
Médula espinal (enfermedades de la) 258.
Melancolia 258. 292.
Melena 243.
Menopausia 260.
Menstruacion (desarreglos de la) 258.
— cesacion 260.
— difícil ó dolorosa 259.
— falta 259.
— supresion 260.
Mercurio 264.
Mercurius 39.
— sublimatus 39.
Metritis 257.
Mezereum 39.
Metrorragia 246.
Mielitis 258.

Miliar 263.
Miopia 282.
Mordeduras de animales venenosos 262.
Muelas (dolores de) 264.
Muermo 244.
Muerte aparente 63.

N.

Nariz (enfermedades de la) 272.
— cancer 272.
— caries de los huesos de la 273.
— hinchazon é inflamacion 273.
— olfato 273.
— ozena 274.
— pólipos 274.
Natrurn muriaticum 39.
Náuseas 337.
Necrosis 236. 237.
Nefritis 340.
Neuralgia facial ó de la cara 275.
— ocular 282.
Nictalopia 282.
Ninfomania 129. 130.
Nitri acidum 40.
Nux moschata 40.
— vómica 44.

O.

Obesidad 303.
Oftalmia 282.
Oidos (enfermedades de los) 277.
— inflamacion 278.
— otalgia 277.
— otorrea 278.
— polipos 279.
— sordera 279.
Ojos (enfermedades de los) 280.
— amaurosis 280.
— blefaritis 282.

- Ojos estrabismo 284.
- fistula lagrimal 284.
- hemeralopia 282.
- inflamacion 282.
- miopia 282.
- neuralgia ocular 282.
- nictalopia 282.
- obstruccion del conducto lagrimal 284.
- oftalmia 282.
- orzuelo 284.
- parálisis de los párpados 285.
- presbicia 285.
- tumor lagrimal 284.
- úlceras, opacidad y manchas en la cornea 285.
- Olfato 273.
- aumento 273.
- disminucion 273.
- pérdida 273.
- Olor fétido de la boca 73.
- Onanismo 129. 130.
- Opacidad de la cornea 285.
- Opilacion 104.
- Opio (abuso y envenenamiento) 288.
- Opium 41.
- Orinas 288.
- sanguinolentas 249.
- Orinarse en la cama 294.
- Orquitis 318.
- Orzuelo 284.
- Osteitis 236. 237.
- Otitis 278.
- Otorragia 218.
- Otorrea 278.
- Ovarios (enfermedades de los) 292.
- hidropesia 292.
- inflamacion 292.
- quistes 292.

P.

- Padecimientos morales 292.
- melancolia 293.
- Padecimientos nostalgia 294.
- Pais (amor al) 294.
- Palpitaciones de corazon 120.
- Panadizo 294.
- Pantorrillas (calambres en las) 295.
- Papera 74.
- Parálisis 295.
- de la lengua 247.
- de los párpados 285.
- de la vegiga de la orina 331.
- Parótidas 295.
- Pasos en falso 248.
- Parto 296.
- Pecho (enfermedades del) 299.
- catarro pulmonar 299.
- congestion pulmonar 299.
- Pechos (enfermedades de los) 299.
- cancer 300.
- induracion 300.
- inflamacion 299.
- Periostitis 236.
- Pesadillas 300.
- Pescados venenosos 300.
- Phosphorus 42.
- Phosphori acidum 42.
- Picor en el ano 58.
- en la piel muy vivo 303.
- Pies (sudor de) 301.
- Pirosis 172.
- Pituitas 172.
- Platina 43.
- Pletora 302.
- Pleuresia 302.
- Pleurodinia 123.
- Plomo (intoxicacion) 302.
- cólicos de 302.
- Plumbum 43.
- Podagra 303.
- Podophyllum 43.
- Pólipos en la matriz 258.
- en los oidos 279.
- Polisarcia 303.
- Poluciones nocturnas 130.
- Porcelana 200.

Presbicia 285.
Prolapso de la matriz 256.
— del recto 58.
— de la vagina 256.
Prurigo 303.
— del ano 58.
Prurito 303.
Pulmonia 304.
Pulsatilla 44.
Purgaciones 334.
Púrpura 305.
Pústula maligna 305.

Q.

Quebadruras 224.
Quemaduras 306.
Quinina (abuso de la) 307.
Quistes 252.

R.

Rabia 308.
Raquitismo 236. 237.
Repugnancia á ciertos alimentos 59.
Rescoldera 472.
Respiracion corta 65.
Retraccion de los orificios del estómago y esófago 173.
Reumatismo 308.
Rheum 44.
Rhododendron 44.
Rhus 45.
Riñones (enfermedades de los) 310.
— albuminuria 310.
— cálculos 310.
— cólicos nefríticos 310.
— lumbago 310.
— nefritis 310.
Rodillas (inflamacion de las) 310.
Romadizo 110.
Ronquera 311.
Rostro y fisonomia 312.

Ruido de oídos 279. 280.
Ruta 45.

S.

Sabañones 313.
Sabina 46.
Saburra gastrica ó intestinal 173.
Salivacion 74.
Sambucus 46.
Sangre de espaldas 218.
Sarampion 313.
Sarna 315.
Satiriasis 130.
Secale cornutum 46.
Setas (envenenamiento por las) 317.
Sepia 46.
Sifilis 331.
Silicea 47.
Sofocacion por el calor 317.
Solitaria 252.
Sobrepardo 296.
Sordera 279.
Spigelia 47.
Spongia 48.
Stannum 48.
Staphysagria 48.
Stramonium 48.
Suciedad de estómago é intestinos 173.
Sudor de pies 301.
Sufrimientos causados por el abuso del café 94.
— el movimiento del carruage 97.
Sulphur 49.
Sulphuris acidum 50.
Supuracion de los huesos 236.

T.

Tabaco 317.
Tabes dorsal 324.
— mesentérica 318.
Tarantula 50.

Té (abuso del) 348.
Tenia 252.
Testículos (enfermedades de los) 348.
— erisipela del escroto 319.
— hidrocele 319.
— orquitis; 319.
Thuja 54.
Tialismo 74.
Tifus 193.
Tiña 349.
Tisis abdominal 348.
— dorsal 321.
— intestinal 318.
— laríngea 245.
— mesentérica 348.
— pulmonar 320.
Tofos 207.
Torceduras de pies 249.
Torticolis 321.
Tos 321.
— convulsiva 116.
— ferina 116.
— nerviosa 116.
— sanguinolenta 214.
Trismo 327.
Tubérculos 320.
Tumores enquistados 252.
— esteomatosos 252.
— hemorroidales 220.
— inflamatorios 202.
— lagrimales 281.

U.

Ulceras 328.
— en la córnea 285.

Ulceras sifilíticas 332.
Uñas (enfermedades de las) 329.
Uretrorragia 249.
Urticaria 200.

V.

Vagina (caída ó descenso) 256).
Varioloides y varicela 335.
Vegiga de la orina (enfermedades de la) 330.
— catarro 330.
— parálisis 334.
Venéreo 334.
— blenorragia 334.
— bubon 332.
— chancro 332.
Ventosidades 201.
Veratrum 52.
Vértigo 333.
Verrugas 333.
Vías urinarias (enfermedades de las) 288.
Viruelas 335.
Vista cansada 285.
— corta 282.
Vólvulo 242.
Vómitos y nauseas 337.
— negros 213.

Z.

Zarzaparrilla (abuso de la) 338.
Zincum 52.
Zoster ó Zona (herpes.) 226.

Gran establecimiento homeopático

del
Dr. Willmar Schwabe,
en Leipsik.

(„Homöopathische Centralhalle“)

 Farmacia homeopática central con el nombre de „Samuel Hahnemann“. Fabricación de botiquines homeopáticos para médicos, familias y propietarios de ganados; cajas de viage y bolsillo segun los manuales mas conocidos. — Expedición á todos los países. — Fabricación y preparación de todos los medicamentos y fabricación de todos los artículos empleados por los médicos homeopatas. — Importación directa de todos los alcoholaturos y tinturas madres de los países extranjeros. — Gran librería especial, editor, libros de fondo y ocasion; gran colección de las mejores obras sobre homeopatía, en lengua francesa, alemana, inglesa, italiana y holandesa.

 Esta casa es la única de este género 
 que ha representado á la homeopatía en 
 la gran exposición universal de Paris, y 
 que ha obtenido premios en las exposi- 
 ciones industriales de Chemnitz (1867), 
 Horodenka (1867), Moscou (1872), y Viena (1873). 

Es muy escaso el número de establecimientos que como el nuestro, fuera de todo contacto con las drogas alopáticas, se ocupan única y esclusivamente de la fabricación de los medicamentos homeopáticos. Preparamos los medicamentos lo mas concienzudamente posible, segun las prescripciones de Hahnemann, el fundador de la homeopatía, y que están bien indicadas en nuestra obra

Farmacopea homeopática poliglota

(en lengua alemana, inglesa, francesa, española é italiana) autorizada por la asociacion de los médicos homeopatas de Alemania.

Por nuestras estensas relaciones con todas las partes del mundo, tenemos la facilidad de adquirir de un modo seguro y auténtico, los medicamentos de procedencia extranjera. Por todas estas razones se vé honrado nuestro establecimiento con la confianza de un gran número de partidarios de la homeopatía, y ha recibido muchos elogios por parte de diferentes principes y gobiernos.

Fijese bien la atención en que este establecimiento es el único de su clase en Leipsik que se dedica exclusivamente á la preparación de medicamentos homeopáticos, y no está unido ni tiene relaciones con farmacia alguna alopática.

Precios de nuestros botiquines y medicamentos.

A. Botiquines homeopáticos arreglados á la: „Medicina homeopática doméstica del Dr. Bruckner“.

CS Cajas muy elegantes de madera pulimentada, con adornos plateados, cerradas con llave. **CS**

I. Con medicamentos en trituraciones y diluciones, ó solamente diluciones.

CS Los frascos contienen 5 gramos de liquido medicamentoso; los medicamentos de uso mas frecuente se encuentran en frascos de 15 á 25 gramos.




Figura 1. Botiquin homeopático con 145 medicamentos en frascos de 5, 15 y 25 gramos.

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|
| 300. | 200. | 180. | 145. | 128. | 106. | 84. | 63. | 41 | medicamentos. |
| 112½. | 75. | 74¼. | 60. | 52½. | 45. | 33¾. | 27½. | 20 | francos. |

Las cartas se dirigirán al: **Dr. Willmar Schwabe, en Leipzig,**
Homöopathische Centralhalle.

II. Con medicamentos en trituraciones y diluciones, ó solo en diluciones, en frascos de 5 gramos.




Figura 2. Caja homeopática de 120 medicamentos en frascos de 5 gramos.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-----|---------------------------|
| 300. | 252. | 200. | 180. | 144. | 120. | 104. | 80. | 60. | 40. | 32 medic. |
| 88 $\frac{3}{4}$. | 75. | 61 $\frac{1}{4}$. | 56 $\frac{1}{4}$. | 50. | 37 $\frac{1}{2}$. | 32. | 26 $\frac{1}{4}$. | 20 $\frac{3}{4}$. | 19. | 13 $\frac{1}{4}$ francos. |

III. Con medicamentos en tubos que contienen de 600 á 800 glóbulos; los medicamentos de uso frecuente, en tubos que tienen de 3000 á 4000 glóbulos.



Figura 3. Caja homeopática de 144 medicamentos.

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|-------------|
| 300. | 252. | 200. | 180. | 144. | 120. | 104. | 84. | 60. | 43 medicam. |
| 84 $\frac{1}{2}$. | 74 $\frac{1}{4}$. | 60. | 56 $\frac{1}{4}$. | 48 $\frac{3}{4}$. | 37 $\frac{1}{2}$. | 32. | 26 $\frac{1}{4}$. | 20 $\frac{1}{2}$. | 19 francos. |

Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
Homöopathische Centralhalle.

IV. Con medicamentos en tubos que contienen de 600
á 800 glóbulos.

300. 252. 180. 144. 120. 104. 84. 60. 48. 32 medicam.

62½. 52½. 39½. 33¾. 26¼. 22½. 17¼. 13¾. 8¼. 7½ francos.

Las cajas que contienen de 60 á 300 medicamentos en glóbulos, son de madera pulimentada, con adornos plateados, y cerradas con llave; las de 43 y 32 medicamentos son de carton y muy elegantes.

 Todas estas cajas, muy elegantes, y de madera de jacaranda con adornos de nacar, 33⅓ por 100 mas.

B. Cajas de viage y bolsillo.

I. Con medicamentos en trituraciones y diluciones, ó solo diluciones, en frascos de 3 gramos.

63. 43. 32. 24 12 medicamentos.

22½. 16¼. 13¾. 11¼. 7½ francos.

II. Con medicamentos en diluciones, en frascos de 75 centigramos ó 50 gotas.

64. 42 medicamentos.

20. 15 francos.

III. Con medicamentos en glóbulos.

a) Cajas muy elegantes de taflete dorado y muy sólidas, con tubos que contienen 600 glóbulos (véase fig. g).




Figura 4. Caja de viage y de bolsillo de 60 medicamentos.

Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
Homöopathische Centralhalle.

150. 120. 100. 80. 60. 40. 24. 12 medicamentos.
 $33\frac{3}{4}$. $28\frac{1}{4}$. $24\frac{1}{2}$. $20\frac{3}{4}$. 17. $13\frac{1}{4}$. $8\frac{3}{4}$. 5 francos.
- b) Cajas de tela, pero muy elegantes:
 80. 60. 40. 24. 12. 6 medicamentos.
 $16\frac{1}{4}$. $13\frac{1}{4}$. $9\frac{1}{2}$. $5\frac{3}{8}$. $2\frac{9}{10}$. 2 francos.
- c) Cajas de madera con altas potencias en tubos pequeños:
 200. 150. 120. 100 medicamentos.
 $46\frac{1}{4}$. 37. $31\frac{1}{4}$. $27\frac{1}{4}$ francos.
- d) Cajas muy elegantes de taflete, con tubos de pluma en los que se contienen los medicamentos:
 150. 100. 60. 40. 24 medicamentos.
 $35\frac{3}{4}$. $26\frac{1}{4}$. $18\frac{3}{4}$. 15. $11\frac{1}{4}$ francos.

C. Cajas para usos especiales.

- I. Cajas con 12 medicamentos para el tratamiento del cólera, é indicaciones para servirse de ellos 5 frs. — cts.
- II. Cajas con 12 medicamentos para el tratamiento de la angina y difteria 5 — —
- III. Cajas para el tratamiento del dolor de muelas
- a) con 12 medicamentos 3 - 75 -
- b) - 24 - 7 - 50 -
- IV. Cajas con 44 medicamentos para el tratamiento de las viruelas 5 — —
- V. Cajas con 12 medicamentos para el tratamiento de la tos ferina ó convulsiva 3 - 75 -

D. Medicamentos en frascos aislados, para uso interno.

I. Dinamizaciones en glóbulos de la escala centesimal hasta la 30ª dinamizacion, y trituraciones de la escala centesimal hasta la 30 dinamizacion.

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|---------------------|---------|
| 500 gramos | 7 francos | 90 cts. | 25 grs. | (frascos a) fig. 5) | 90 cts. |
| 200 | - 3 - | 75 - | 15 - | (- b) - | 65 - |
| 100 | - 2 - | 50 - | 10 - | (- c) - | 45 - |
| 50 | - 1 - | 50 - | 5 - | (- d) - | 30 - |

Tubos con 2000 glóbulos (frascos e figura 5) 25 cts.

Tubos con 100 ó 1000 glóbulos (frascos f—n figura 5) 20 cts.

Las cartas se dirigirán al: **Dr. Willmar Schwabe** en Leipzig,
 Homöopathische Centralhalle.

II. Dinamizaciones en diluciones líquidas de la escala centesimal hasta la 30 dinamización.

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|--|----------------------------|---------|
| 500 gramos | 5 francos | 60 cts. | | 25 grs. (frasco a) fig. 5) | 75 cts. |
| 200 - | 2 - | 80 - | | 45 - (- b) | 50 - |
| 100 - | 4 - | 90 - | | 10 - (- c) | 40 - |
| 50 - | 4 - | 25 - | | 5 - (- d) | 25 - |

III. Dinamizaciones en diluciones líquidas de plantas extranjeras, trituraciones elevadas (7^a—30^a), altas potencias (31^a—200^a), y dinamizaciones isopáticas en glóbulos.

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 25 gramos (frasco a) figura 5) | | 4 franco | 25 céntimos. |
| 45 - (- b) - 5) | | — | 75 - |
| 40 - (- c) - 5) | | — | 60 - |
| 5 - (- d) - 5) | | — | 40 - |
| Tubos (e—n figura 5) 30 céntimos. | | | |

E. Medicamentos para uso externo.

I. Extractos, tinturas y soluciones alcohólicas.

a) *Arnica, Calendula, Hypericum, Urtica, Symphytum, Helianthus, Verbascum, Ammonium causticum, Ferrum muraticum*:

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------------|
| 500. | 250. | 200. | 100. | 50. | 25. | 15 | gramos. |
| 3,15. | 4,90. | 4,60. | 0,90. | 0,60. | 0,40. | 0,25 | francos, céntimos. |

b) *Rhus, Abrotanum, Thuja, Ruta, Collodium, Bellis, Euphrasia*:

| | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|------|--------------------|
| 500. | 250. | 100. | 50. | 25. | 15 | gramos. |
| 5,0. | 2,70. | 4,60. | 4,0. | 0,50. | 0,30 | francos, céntimos. |

c) *Hamamelis, Hydrastis*:
25 gramos 60 centimos.

II. Emplastos, tafetanes, etc.

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| a) Esparadrapo de arnica | } | 4 metro cuadro 32 francos. |
| b) - de caléndula | | |
|  blanco, negro y encarnado; muy superior al inglés, porque no irrita.) | } | 4050 cm. 3 francos 75 céntim. |
| | | 4 hoja 30 céntimos. |

Las cartas se dirigirán al: **Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,**
Homöopathische Centralhalle.




Figura 5. Frascos del establecimiento del Dr. Willmar Schwaba
 en Leipzig (Alemania), Homöopathische Centralhalle.

c) Aceyte para el pelo, preparado con árnica, medicamento mas eficaz contra la alopecia ó caída de los cabellos:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) Frasco grande | 2 francos — céntimos. |
| 2) $\frac{2}{3}$ frasco | 1 - 50 - |
| 3) $\frac{1}{3}$ frasco | 1 - — - |
| 4) frasco pequeño | 60 - - |

F. Botiquines homeopáticos para farmacéuticos, médicos, hospitales y clínicas, y utensilios farmacéuticos.

I. En forma de armario, con tinturas madres, trituraciones, diluciones y utensilios farmacéuticos:

desde 4000 á 3000 francos.

II. En forma de caja, con tinturas madres, trituraciones, y dos diluciones diferentes de todos los medicamentos:

desde 200 á 1000 francos.

 Mandamos gratis y franco de porte los precios corrientes y catálogos de estos botiquines, con grabados numerosos que los espican, á todo aquel que nos los pida en carta franqueada.

III. Cajas con los utensilios, muy elegantes, de madera pulimentada, con adornos plateados y cerradas con llave, conteniendo: 2 balanzas, pesos, morteros, capsulas, espátulas y cucharas, tubos graduadores de gotas, alcohol concentrado y alcohol diluido en agua, agua destilada, azucar de leche y glóbulos: 57 francos.

IV. Frascos y tubos:

a) frascos con tapon esmerilado:

| | |
|------------------------|--------------|
| de 15 gramos | 40 céntimos. |
| de 10 - | 30 - |
| de 5 - | 25 - |

b) frascos amarillos y blancos, con tapones de corcho:

| | |
|---------------------|------------------------|
| el 100 de 15 gramos | 7 francos 50 céntimos. |
| - - - 10 - | 7 - — - |
| - - - 5 - | 6 - 75 - |

c) tubos para glóbulos con tapones de corcho:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| el 100 (letra e figura 5) | 5 francos 60 céntim. |
| - - (- f - 5) 3 | - 75 - |
| - - (- g - 5) 3 | - 75 - |
| - - (- h - 5) 4 | - 50 - |
| - - (- i - 5) 3 | - 45 - |

Las cartas se dirigirán al: **Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,**
Homöopathische Centralhalle.

el 100 (letra k figura 5) 3 francos 15 céntim.

- - (- l - 5) 2 - 50 -
 - - (- m - 5) 2 - 50 -
 - - (- n - 5) 3 - 50 -

d) frascos amarillos, que sirven para las dinamizaciones, redondos, de bordé plano, ancho, sin estar encorbados ni arriba ni abajo, y de una capacidad doble de la necesaria para la dinamizacion :

el 100 (letra e figura 5) 7 francos.

e) tubos medidores de gotas, que sirven para facilitar la operacion de contar las gotas, para el agua destilada, el alcohol concentrado y alcohol diluido en agua: 2 francos 25 céntimos.

f) tapones de corcho de la mejor calidad y muy poco porosos:

| Letra a. | b. | c. | d. | e. | f. | g. | h. | i. | k. | l. m. n. |
|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|----------|
| 2. | 1,60. | 1,25. | 1,15. | 1,0. | 0,95. | 0,90. | 0,75. | 0,90. | 0,75 | frs. |

g) pesos:

1 grano (peso médico de Nuremberg): 60 cénts.

Caja muy elegante con todos los pesos: 9 francos 50 céntimos.

h) balanzas farmacéuticas, desde 60 á 80 francos.

i) balanzas de cuerno, desde 5 á 7 francos.

k) balanzas de cristal, desde 6 á 8 francos.

l) capsulas de porcelana: 2 francos.

m) espátulas y cucharas, desde 50 á 80 céntimos.

n) etiquetas:

| | |
|----------------------|----------------------|
| grandes | pequeñas |
| el 100: 30 céntimos. | el 100: 20 céntimos. |

o) sustancias indiferentes:

1. Alcohol concentrado (sin empireuma), de una densidad de 0,83, 500 gramos: 1 franco 90 céntimos.

2. Alcohol diluido en agua, densidad 0,89, 500 gramos 1 franco 50 céntimos.

3. Agua destilada (exenta de toda sustancia orgánica e inorgánica):

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|-------|------|------------------------|
| en frascos de | 500. | 1000. | 1500. | 2000 | gramos. |
| tapon esmerilado | (0,90. | 1,25. | 1,60. | 1,90 | francos. |
| 50 kilogramos en frasco | | | | | sin frasco |
| 44 francos 29 céntimos | | | | | 5 francos 50 céntimos. |

Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
 Homöopathische Centralhalle.




Figura 6. Grande botiquin con 136 medicamentos.

136 Cajas complementarias para las farmacias, con 136 y 78 medicamentos, conteniendo los de uso externo y tinturas madres: 1 Arnica 250 gramos; 2 Belladonna 25 gramos; 3 Carbo vegetabilis 25 gramos; 4 Muriatis acidum purum 125 gramos; 5 Nitri acidum purum 25 gramos; 6 Rhu-toxicodendron 25 gramos; 7 Sulphuris acidum purum 25 gramos; 8 Symphytum 125 gramos; 9 Thuja 25 gramos; 10 Urtica 25 gramos; 11 Cantharis 25 gramo 11 francos 25 céntimos.

c) botiquines con 64 medicamentos en trituraciones y diluciones; (5 medicamentos para uso externo: Arnica, Symphytum, Thuja, Carbo vegetabilis y Muriatis acidum) — 51 frascos letra c, 40 frascos letra a, 3 frascos con 120 gramos): 33 francos 75 céntimos.

d) botiquines con 43 medicamentos en trituracion y diluciones (2 medicamentos para uso externo: Arnica, Symphytum) — (32 frascos letra c, 9 frascos letra a, 2 frascos con 120 gramos): 25 francos 50 céntimos.

Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
Homöopathische Centralhalle.

- e) botiquines con 26 medicamentos en trituraciones y diluciones (2 medicamentos para uso externo: Arnica y Symphitum) — (17 frascos letra c, 7 frascos letra b, 1 frasco letra a): 15 francos.
- f) botiquines con 24 medicamentos en trituraciones y diluciones, cajas elegantes de carton: 9½ francos.
- g) botiquines con 16 medicamentos en trituraciones y diluciones, caja de tela, para servicio de las caballerizas: 8 francos.
- h) botiquines con 8 medicamentos en trituraciones y diluciones, para el campo: 3 francos 15 céntimos.

H. Medicamentos específicos para el tratamiento de los animales domésticos.

| | | |
|--|----------|--------------|
| Contra la peste bovina. | 4 franco | 25 céntimos. |
| - la inflamacion del bazo | 1 - | 25 - |
| - la pulmonia del ganado | 3 - | 75 - |
| Nitri acidum purum, 100 gramos en frasco de madera | 1 - | 60 - |
| Sulphuris acidum purum, 100 gramos en frasco de madera | 1 - | 60 - |
| Muriatis acidum purum, 100 gramos en frascos de madera | 1 - | 60 - |

I. Botiquines con medicamentos en glóbulos para el tratamiento de los animales domésticos.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| en frascos de | <table border="0"> <tr> <td>{</td> <td>200. 120. 80. 43 medicamentos.</td> </tr> <tr> <td>800 glóbulos</td> <td>{ 43. 26½. 18. 8¾ francos.</td> </tr> </table> | { | 200. 120. 80. 43 medicamentos. | 800 glóbulos | { 43. 26½. 18. 8¾ francos. |
| { | | 200. 120. 80. 43 medicamentos. | | | |
| 800 glóbulos | { 43. 26½. 18. 8¾ francos. | | | | |
| los medicamentos de uso frecuente en tubos de 3000 glóbulos en las mismas cajas | <table border="0"> <tr> <td>{</td> <td>96. 60. 43 medicamentos.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>{ 31½. 20¾. 15 francos.</td> </tr> </table> | { | 96. 60. 43 medicamentos. | | { 31½. 20¾. 15 francos. |
| { | | 96. 60. 43 medicamentos. | | | |
| | { 31½. 20¾. 15 francos. | | | | |

K. Libreria francesa.

- Belloti, Dr.,** Idiopathie ou nouvelle médecine spécifique. 80. Broch. 8 francos.
- Bruckner,** Médecine homoeop. domestique. 80. 5 francos.

Las cartas se dirigirán al: **Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,**
Homöopathische Centralhalle.

- Bruckner**, Petit guide homoeopathique. 4 francos 25 cénts.
Günther, Dictionnaire vétérinaire homoeopathique. gr. 8^o.
 6 francos.
Hering, Médecine homoeopathique domestique. Avec fig.
 12^o. 10 francos.
Hirschel, Guide du médecin. 3^o. 8 francos.
Noack, Pharmacopée homoeop. polyglotte. 8^o. 9 francos.
Schwabe, Le Choléra, guérison prompte et sûre par l'homoeo-
 pathie. 8^o. 40 céntimos.

Los pagos de los pedidos se harán remitiendo letras de cambio sobre una de las plazas de Europa de mas importancia

Cuadro comparativo de monedas.

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 4 Franco = | 8 Groschen. |
| 5 - = | 4 Escudo 10 - |
| 20 - = | 5 - 10 - |
| 25 - 50 Céntimos = | 4 Libra esterlina. |
| 2 - 10 - = | 4 Florin de Holanda. |
| 2 - 60 - = | 4 - de Austria. |
| 3 - 55 - = | 4 Escudo de Prusia. |
| 4 - - - = | 4 Lira. |
| 4 - 5 - = | 4 Rublo de plata de Rusia. |
| - - 22 - = | 4 Piastra de Turquía. |
| 4 - - - = | 4 Dracma de Grecia. |
| 4 - - - = | 4 Franco de Suiza. |

Papel moneda segun el cambio corriente.

Reduccion de francos à reales.

| Francos. | Reales. Cénts. | Francos. | Reales. Cénts. |
|-------------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 3 80. | 9 | 34 20. |
| 2 | 7 60. | 10 | 38 —. |
| 3 | 11 40. | 11 | 41 80. |
| 4 | 15 20. | 12 | 45 60. |
| 5 | 19 —. | 13 | 49 40. |
| 6 | 22 80. | 14 | 53 20. |
| 7 | 26 60. | 15 | 57 —. |
| 8 | 30 40. | 16 | 60 80. |

Las cartas se dirigrán al: **Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,**
 Homöopathische Centralhalle.

| Francos. | Reales. | Cénts. | Francos. | Reales. | Cénts. |
|--------------|---------|--------|-----------------|---------|--------|
| 17 | 64 | 60. | 39 | 448 | 20. |
| 18 | 68 | 40. | 40 | 452 | —. |
| 19 | 72 | 20. | 44 | 455 | 80. |
| 20 | 76 | —. | 42 | 459 | 60. |
| 21 | 79 | 80. | 43 | 463 | 40. |
| 22 | 83 | 60. | 44 | 467 | 20. |
| 23 | 87 | 40. | 45 | 471 | —. |
| 24 | 91 | 20. | 46 | 474 | 80. |
| 25 | 95 | —. | 47 | 478 | 60. |
| 26 | 98 | 80. | 48 | 482 | 40. |
| 27 | 102 | 60. | 49 | 486 | 20. |
| 28 | 106 | 40. | 50 | 490 | —. |
| 29 | 110 | 20. | 100 | 380 | —. |
| 30 | 114 | —. | 200 | 760 | —. |
| 31 | 117 | 60. | 300 | 1,140 | —. |
| 32 | 121 | 50. | 400 | 1,520 | —. |
| 33 | 125 | 40. | 500 | 1,900 | —. |
| 34 | 129 | 20. | 600 | 2,280 | —. |
| 35 | 133 | —. | 700 | 2,660 | —. |
| 36 | 136 | 80. | 800 | 3,040 | —. |
| 37 | 140 | 65. | 900 | 3,420 | —. |
| 38 | 144 | 40. | 1,000 | 3,800 | —. |

Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
Homöopathische Centralhalle.

Los envios se harán inmediatamente despues del recibo del pedido, sea directamente, sea por medio de nuestros agentes.

Los precios marcados en esta lista, entiéndase que solo son en Leipsik, en el despacho de la farmacia. Los pedidos del resto de Alemania y extranjero aumentan necesariamente su coste con los gastos de embalage, porte, flete, derechos de aduanas y demas, que son de cargo del que hace el pedido. Esta gran farmacia, ademas, no puede expedir al extranjero los pedidos de pequena importancia, y solo lo hará puntualmente de los que asciendan á una suma regular.

La correspondencia se dirigirá franca de porte y del modo siguiente:

Dr. Willmar Schwabe

Alemania

L e i p z i g

(Homöopathische Centralhalle).

Con la mas alta consideracion:


La Administracion del establecimiento homeopático del
Dr. Willmar Schwabe.


Esta obra se halla de venta en los *Establecimientos de los señores Fabian & C^a en Valparaiso y en Santiago de Chile*, adonde tambien se encuentra un surtido completo de Botiquines homeopáticos y de preparaciones sueltas, trabajados con todo esmero en la antigua botica del Doctor Schwabe en Leipzig.




Las cartas se dirigirán al: Dr. Willmar Schwabe en Leipzig,
Homöopathische Centralhalle.

Leipzig. imprenta de Breitkopf y Haertel.





41-1-16



16



16.861