



6531

The image shows a single page from an antique manuscript. The text is written in a dark, cursive script, likely Devanagari, though the characters appear somewhat stylized. It is organized into approximately ten horizontal lines. In the top left corner, there is a rectangular box containing the number '6531' in a larger, bolder font. To the right of this, the first few lines of text begin. The paper has a distinct yellowish-tan hue, characteristic of old documents. There are several small, faint red marks scattered across the page, most notably near the bottom right. The overall texture appears slightly rough and uneven.



25
298

169







MEDICUS
OFFICIOSUS
WEINHART

F E R D . C A R O L I

WEINHART,

Phil. & Med. D. Saer. Cæs. Majest. Consil.
& Personæ Medici Med. Pract. & Aphor.
in Acad. Oenip. Prof. Ord.

M E D I C U S O F F I C I O S U S ,

Praxi Rationali Methodico - Aphoristica,
cum selectis Remediorum Formulis,
Lib. instructus.

NUNC AUTEM MAGIS LIMATUS,
correctus, ac typo & ordine meliori, denuò
in lucem editus.

CUM DUPLICI, CAPITUM ET RERUM
I N D I C E .

Illusterrimo ac Doctissimo Viro

ALEXANDRO CANCELLERIO
Philos. ac Medicinæ Doctori.

V E N E T I I S , M D C C X X X V .

Ex Typographia Hertziana.
Expensis Joannis Jacobi Hertz.

S U P E R I O R U M P E R M I S S U , A C P R I V I L E G I O .

Illustrissime; ac Eruditissime
Domine.



Ogitanti mihi quam
arcta sint inter nos
amantissima necessi-
tudinis vincula vehemens ardor in-
cessit, eam quoque publica aliqua si-
gnificatione testari. Opperiebar op-
portunitatem: quum venit commo-
dum OFFICIOSUS hic MEDI-
CUS officiosè per Germaniam exce-
ptus: fætus quippe fuit Clarissimi
Viri Ferd. Caroli VVeinhart Cas-
rei Medici, officii sui peritissimi.
Aureum hoc opus quum typis nostris
cudere statuisse, illico excogitavi,
me non alii MEDICUM OFFI-
CIOSUM dicare posse congruenter,

*nisi OFFICIOSISSIMO ME-
DICO ALEXANDRO CAN-
CELLERIO. Prælo igitur , di-
xi , committatur MEDICUS
OFFICIOSUS sub auspiciis Eru-
ditissimi Viri , qui primas partes
tulit in officiositate ; quique OF-
FICIOSUS in me , ac Amantissi-
mus semper singularis præsttit a-
moris indicia. En igitur , Vir Exi-
mie , offero Nomini tuo celeberrimo
librum hunc non mole quidem
magnum , at doctrina & praxeos
scientia præstantem. Officia is con-
tinet omnia probi , accuratique Me-
dici in suo munere ritè obeundo ,
in curandis nempe omnibus huma-
ni corporis pathematibus . Tibi
editur inscriptus , qui officia &
partes Medici eximii ab adolescen-
tia usque adhuc adeo explevisti ,
ut jam ALEXANDER alter in
Arte Apollinea Magnus etatem tui*

nominis celebritate longe superaveris. Qui a primis annis Gloriae viam ingressus, ac nihil faciens vel generis nobilitatem, vel augenda rei familiaris industriam, in scientiarum, eruditionisque consecutione omnem operam, iudicium omne collocandum esse putasti. Hinc est quod primum Graecæ literalis Lingua summam peritiam asecutus ad Latinæ quoque eruditionis apicem pervenisti, ac Sopbia postmodum in ressuspenetralia, in recentioris et hyphica, seu rerum naturalium perscrutatione oculatissimus judex evagisti. Quibus instructus prædiis, haud mirum cuiquam videri debet, si in Medicæ et acultate tantum proficeris, ut carus, optatusque Nobilibus, Civibusque nostris magnacum laude Artem Meicam profitearis in hac Italiae Urbe Praeiana, ubi tot Viri præstantissimi faciunt Meici-

nam. At quo incantus provehor?
Non mens est animus hic per tuas
laudes excurrere; haud enim ignoro,
quantum atuis audiendis praconis
abhorreas, ceterum de cui ostendere
omnibus, me jure quidem merito
OFFICIOSUM hunc **MEDI-**
CUM tuo Nomi*n*i dedicasse; quan-
do omnes id noverint, ac idem tibi
pariter persuasum fuerit, Officii mei
partes me explevisse ipse met quoque
putabo. *Suscipe igitur lata fronte,*
Vir Doctissime, hanc benevoli animi
in Te mei qualemcunque significati-
onem, ut sit mansura amicitia no-
sira & perpetuum monumentum. Per-
ge me diligere ut hactenus fecisti.
Et ad Nestoris annos plurimum
Vale.

Obsequentiis. Amicus & Servus
Jo: Gabriel Hertz.

P R Æ F A T I O.

Oⁿtavus propemodum effluxit annus , quo publicam in lucem edi- di Enchiridion Novum , conti- nens Systema seu Nucleum universæ Me- dicinæ Practicæ , quod præter meritum apud Philiatros gratiam invenit , ut exem- plaria ejus jam passim hinc inde distra- cta , adhuc avide a me expetantur . Cum verò in prædictis Thesibus nonnulli desiderarent remediorum Formulas , quoad Dosin expressas (quod a me tunc omis- sum , ne Enchiridion in librum excrese- ret , cum Artis Medicæ summa perfectio sit , concinna & debita formularum com- positio , ac plurimum difficile sit , semper ex tempore Medicamentum gratum , ac debite compositum & aptum præscribe- re præsertim Neo-practicis , & qui in Pra- xi Medica non diu & multum exercitati fuerunt , vel memoriam minus firmam ac felicem obtinuerunt) ideò , ut & his sa- tisfaciam , ac cunctis me officiosum exhibeam , præsentibus his Thesibus selectas remediorum Formulas proponere volui ,

non

non quidem dubias & incertas , sed diu-
turna experientia & longo usu veluti ca-
nonizatas , quas tum propria viginti se-
pren annorum , tum peritissimorum Clas-
sificorum & in arte Medica consummato-
rum Authorum praxis suppeditavit . Inter
vivos honoris ac filialis gratitudinis ergo
nomino Colendissimum Dom . Parentem
meum *Paulum* , olim Serenissimi Archiducis
Ferdinandi Caroli &c. &c. Archiatrum , nunc Excelorum Dicasteriorum
Physicum , quem Deus post 80. ætatis an-
num feliciter ac sane consummatum , ul-
terius sospitem & in columem quam diu-
tissime conservet . Inter defunctos D . Pa-
truum meum *Casparum Vveinhart* , olim
Serenissimi Archiducis Sigismundi Francisci
&c. &c. Personæ Medicum : hinc pa-
riter & Excelorum Dicasteriorum Physi-
cum , post 68. ætatis annum è vivis ere-
ptum . Item Avum meum *Paulum* quoque
 nomine , olim Marchionis Burgaviensis ,
hinc Serenissimorum Principum Ferdinan-
di Caroli , Sigismundi Francisci , Claræ
Isabellæ & Leopoldinæ Protomedicu-
m , post 75. ætatis annum piissimè in D . de-
functum . Tandem etiam Avum meum
Maternæ lineæ , *Gerardum Schlairmacher* ,
olim

olim Serenissimi Archiducis Leopoldi ac
Claudiæ Aulæ Medicum , post 64. circiter
ætatis annum è vita decedentem . Ne au-
tem prædicta remedia Empyricè & pro-
misœ in usum trahantur , addidi Caute-
las ac generalem & aphoristicam Metho-
dum , qua cuncta remediorum genera ex
fonte chirurgico , pharmaceutico & diæte-
tico derivata , decenter , & juxta normam
artis , pro circumstantiarum varietate ac
morborum depulsione usurpari possint .
Non enim hic expectare oportet arcana
& secreta (nomina apud Medicos rationa-
les , quibus apertæ & candidæ Musarum
januæ , exosa & incognita) sed vulgaria ,
& in praxi trita , quæ tamen , si debite
ac Methodice applicaveris , & morbum co-
gnoveris , in quibus duobus verum Medi-
cinæ arcanum continetur , abunde suffi-
cient , ad morbos quoq[ue]cunque depellendos .
Præmisi tandem in principio Generalia
quædam ad Medici Officium spectantia ,
quæ passim in libris Medicis haud obvia ,
a me tamen tum per experientiam , tum
per frequentem lectionem , in proprium
usum conscripta & annotata , quæque
singulariter virtutem , scientiam & pru-
dentiam Medici , in quibus perfectio ar-
tis

tis consistit , respiciunt , ut ad illam pro viribus aspirarem , ac in statu meo me perficerem . Cum autem ab eadem quam longissime me adhuc abesse , ingenue fateri necesse habeam , aliis interim conatum hunc meum communicare volui , ut saltem

— fungar vice cotis , acutum ,
Reddere quæ ferrum solet , excors ipsa secandi .

Cedat qualiscunque hæc mea industria , ad DEI solius Gloriam , Medicæ Juventutis utilitatem , ac Proximi ægrotantis unicam salutem .

APPROBATIO MEDICA.

UT sedulus virtutum sectator , vitiorumque extirpator Medicus , in morborum debellatione pariter ac sanitatis conservatione , Officio suo ritè defungatur , hunc sui Medicæ Officiosi titulo Tractatum accipiat ductorem comitemque fidelissimum . Venerabitur certe ejus Autorem , Prænobilem & Magnificum Incl. Facultatis Medicæ Seniorem , utpote plurimis , quibus charo Eruditorum orbi innotuit , scriptis clarissimum . Quæ uti multis jamdudum præludent , ita præsentem Tractatum veris innixum principiis , scientia firma , fidaque rerum experientia corroboratum , judicio exin solido , accurata methodo , & grata concinnitate compösum , censeo dignissimum , qui cunctis per impressionis lucem saluti cedat certissimum .

Theod. Frid. Statlender,
Med. D. & Prof. Ord. ac
Phys. Oenipont.

NOI REFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di revisione, ed approvazione del P. Fr. Tomaso Maria Gennari Inquisitore nel Libro Intitolato *Medicus Officiosus Praxi Rationali Methodico-Aphoristica*, cum selectis Remediorum Formulis, instructus. Auctore Carolo Weinhart, non v' esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Secretario Nostro, niente contro Principi, e buoni costumi, concedemo Licenza che possi esser Stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 19. Luglio 1734.


(Andrea Soranzo Procur. Reffor.

(Zam-Piero Pasqualigo Reffor.

(Lorenzo Tiepolo Cav. Procur. Reffor.

Agostino Gadaldini Segr.

IN-



INDEX

CAPITUM.

CAPUT PRIMUM.

- D**E Officio Medici in genere. pag. i.
CAP. II. De Officio Medici in specie , & pri-
mo quidem de Affectibus , requirentibus Venæ se-
ctionem. 53.
CAP. III. De Officio Medici , in Affectibus requi-
rentibus Arteriotoniam , Cucurbitulas , Scarificatio-
nem , Hirudines , Vesicatoria & Fonticulos . 82.
CAP. IV. De Officio Medici , in Affectibus indican-
tibus Balnea & Acidulas . 102.
CAP. V. De Officio Medici , in Affectibus indicantibus
Purgationem . 130.
CAP. VI. De Officio Medici , in Affectibus indicant-
ibus Sudorifera , Diuretica , Salivantia , Errhina ,
Sternutatoria , Apophlegmatizantia & Expector-
rantia . 176.
CAP. VII. De Officio Medici , in Affectibus , exigen-
tibus curam Lactis , Chalybis , usum Thee , Cof-
fee , Chocolata , & Laudani opiat . 213.
CAP. VIII. De Officio Medici , in Affectibus exigen-
tibus Alexipharmacis , Antifebrilia , Anthelminti-
ca , Carminativa & Lithontriptica . 252.
CAP. IX. De Officio Medici , in considerandis
& præ-

& præscribendis Appropriatis & Confortantibus :
288

CAP. X. De Officio Medici , in Affectionibus exigentibus Adstringentia , Stegnotica , Hypnotica , Anodyna & Vulneraria . 356

CAP. XI. De Officio Medici , in præscribenda debita Dieta . 383





CAPUT I.

De Officio Medici in genere.

ARTICULUS I.

De Religione & Virtutibus Medici.

I.



Un , teste Ecclesiast. cap. 38.
a Deo omnis medela , & Me-
dicus quidem ægrum curet , sed
Dens sanet : sit etiam Medicis
peculiare Paracleti donum ,
teste Divo Paulo ad Corinth.
cap. 12. alii quidem per Spir-
itum datur sermo Sapientæ ; alii
autem sermo Scientiæ secundum
eundem Spiritum : alteri Fides

in eodem Spiritu : alii gratia Sanitatum in eodem Spi-
ritu &c. Medicus in primis Divini Numinis cultor sit ,
per veram & orthodoxam Religionem Catholicam .

I I.

UNICA ejus cynosura sit gloria Dei , ac salus proximi ; lemma & suprema lex sit : *Deum colere , neminem ledere , ac omnibus velle prodesse .* Provinciam suam Medicus à Divina providentia , per legitimam vocationem humeris suis impositam , attenta sollicitudine , ac sollicita attentione administret , & Divinum spectando obsequium salutis ac perfectionis sua centrum , in officii ac muneris sui partibus , ad divinæ voluntatis amissim pura intentione peractis , collocet , cogitans , se redditurum aliquando desuper severissimam rationem , in magno totius Orbis conventu , ac sabbato sempiterno .

I I I.

Veneretur ac imitetur Medicus pro Viribus , SS. Cælites Medicos , & quidem mense Januario , die XXXI. *S. Cyrum Alexandrinum .* Februario die XXV. *S. Cæsareum , B. Gregorii Nazianzeni fratrem .* XXVIII. *S. Dionysium Diaconum .* Martio die X. *S. Cradatum Corinthium .* XV. *E. Joachimum Japponensem .* Aprili die XIII. *S. Papium Diaconum .* Majo die III. *S. Juvenalem .* VI. *S. Joannem Damascenum .* Junio II. *S. Alexandrum Martrem .* XIX. *S. Ursicinum .* XXVI. *S. Samsonem Presbyterum .* Julio XV. *S. Antiochum .* XVII. *S. Pantaleonem .* Augusto die XVI. *S. Diomedem .* XX. *SS. Leontium & Carpopherum .* XXII. *S. Philippum Benitum Florentinum .* XXV. *S. Genadium .* Septembri die XXVI. *SS. Cosmam & Damianum .* Octobri die XVIII. *S. Lucam Evangelistam .* XXX. *S. Zenobium .* Novembri die II. *Theodotum .* IX. *S. Orestem , Decembri die VI. S. Emilianum &c.*

I V.

Loquendo de Virtutibus cardinalibus, ac in primis de Temperantia, Medicus sit 1. *castus*, præsertim gynecæi, sequorisque sexus curam gerens; hinc apud Lacedæmonios Æsculapii simulachrum ex agno casto fuit. 2. Sit *sobrius*, ut ad invisendos ægrulos, eisque opem ferendam, quacunque diei ac noctis hora promptus, paratus, ac sui juris sit. 3. *Taciturnus*, ne vel occulta artis mysteria, vel secretiora ægrorum mala, aut alia extra limen minimè evulganda, plenis buccis ubique effutiat; hinc Medicina muta dicitur, ac Ægyptii in *Iidis* & *Serapidis* templis præsidum Deorum Medicinæ, apud ipsos Harpocratem silentii Deum, labia digito comprimentem adorarunt. 4. Sit *modestus*, ac moribus honestis elegans, cui pietas curæ, dilectio cordi, compassionis sensus carus, ac præcipue *Mansuetudo* familiaris, ac humanus affetus suavis sit. Hinc in Delo simulachro Apollinis Charites additæ sunt, citharam, tibias & fistulam manibus tenentes; non tantum ad Musices & carminis inventionem denotandam, verum etiam, quod deceat, Medicum esse humanum, gratiosum, & affabilem.

V.

Loquendo de *Fortitudine*, Medicus 1. Sit *fortis* ac intrepidus ad labores quoscunque tolerando, ut pote ægrotantium saluti totus mancipatus. 2. Sit *fortis* ad Momorum calumnias, ad artis osorum & contemptorum scommata, sarcasmos, ac commentitias cavillationes, aliaque Medicum ferientia, ab infirmis, adstantibus aut aliis subinde prolata, æquo animo ferenda: gnarus celare cordis æstus, invitumque multa dissimulare. 3. *Fortis* & *cordatus* in debellandis mor-

bis, ut non agat vel nimis tumidè, vel nimis timidè, ut nec temerè audeat, nec inconsultè timeat: ut ingruentes difficultates ac periculorum & impedimentorum Iliadem generosè vincat. 4. *Fortis* tandem, ut sit communis Utilitatis amator, privatæ oblitus, Patientes vel sapientius impatientes visitando patiens, adversus mollia durus, in arduis fidens, in gerendis magnanimus, in gestis modestus, in adversis constans, in secundis temperatus, ac in omnibus invictus.

V I.

Loquendo de *Justitia*, Medicus quoque æquitatis fississimus sit custos, suum cuique tribuens, sitque 1. Erga omnes comis, cunctis officiosus, nulli onerosus, affinibus facilis, sociis amabilis, reliquis urbanus, languentibus placidus, ad similes familiaris. 2. Sit devotus ad Deum, benignus in proximum, liberalis in egenos, promptus ad concordiam, sobrius ad mundum. 3. Sit Domini servus, proximi socius, ac mundi Dominus, superiora habens ad gaudium, æqualia ad confortium, inferiora ad servitium. 4. Laudet bonos, malos toleret, minori indulget, majori cedat, studeat omnibus prodesse, nocere nulli.

V I I.

Loquendo tandem de *Prudentia Galen. 1. 8. meth. med. cap. 9.* Medicum natura prudentem desiderat. Cum autem à peritissimis Sophiae cultoribus duplex statuatur prudentia, quarum una ad vitam juxta virtutum ac rationis normam legitimè instituendam: altera verò ad artis præcepta prudenter, ac debito modo, loci, temporis, ac personarum circumstantiis, singulisque eventibus ritè accommodanda, habilem ac idoneum reddit, utraque planè in Medico Practico quam maximè expetitur: prima, quia Virtutum ex-

terarum dux, princeps, moderatrix ac architecta, & quia quasi complexus omnis perfectionis, ac compendium omnis felicitatis: altera, quia hac duce & luce utendum in diffcili planè Microcosmi imperio, ne ceteroquin, per vias tot occasionum variarum præcipitiis infestas, tot difficultatum sentibus obductas, tot arduarum quæstionum gurgitibus intercisas, tot millenarum circumstantiarum labyrinthis implicatas, frequentius laborare, hærere, cespitare ac labi, necesse habeat Medicus. Unde haud immerito apud Syros mos obtinuit, ut Apollo pingeretur barbatus, ad innuendam nempe prudentiam, quæ in Medico requiritur, ac ætatis decursu in primis possidetur, in quem finem etiam veneranda antiquitas, simulachro Apollinis serpentem addidit, pro symbolo nimirum prudentiæ.

V I I.

PRæter Vitia, Virtutibus supradictis opposita, Medicus in primis vitare studeat *invidiam*, cavendo, ne alterius ingenium, doctrinam, eruditionem, praxin uberiorem, feliores inibi successus, frequenter auditorium, favorem civium, superiorum gratiam, fiduciam ægrorum, honores ac existimationem canino dente rodat: de libris ad thesibus sinistrè ac frivolè judicet, Collegæ sui votum prælivore suggillet, remedii formulam prudenter & ex lege artis præscriptam, calumniosè improbet: eum morbum non intellexisse, in causa hallucinatum, nec legitima usum fuisse curandi methodo, ægris & adstantibus clanculariè & nefandè instillet: sicque famam ejus virulenta detractione laceret. Item, ne arcana sua, earumque singularem chyrotechniam, invidiosè cerlet.

I X.

Vitetur insuper *avaritiam*, cavendo, ne non tam Medeæ, id est, artis Medicæ gratia, quam propter vellus aureum, vela faciat, ne Vulturis instar lucris ac ruginæ inhiantis, ægros continuis suis petitionibus, exactioribus & pactis ab insigni vel fordinie, vel pluropelia profectis, fatiget ac exhaustat: ne lucri cupidine in extremam turpitudinem adactus, largiora præmia ac stipendia sperans, morbos ægrotantium protrahat, vel moximum levem ita periculum exageret, extendat ac amplificet, ut sub facie auxiliandi, praxin depilandi, loculosque emungendi exerceat: ne experientolas aliquas nullis forsan rationibus innixas, vel secreta opinativa & imaginaria empyrico supercilio ac hyperbolico præconio decantans, perquam studiosè velet, celet ac custodiat, ut ægri etiam dato copioso auro, ab eo talia remedia velut ex captivitate redimere necesse habeant: ne cum Pharmacopœis concors, partiatur lucrum, levissimo in morbo pretiosissima præscribens medicamenta: ne tandem auri fulgore excæcatus, eò prottervitatis, petulantiae ac perversitatis perveniat, ut venena propinet, abortum procuret, sterilitatem inducat, falsimonium fide jurata probet, aliaque christiano Medico indigna & scelestæ committat.

X.

Tandem detestetur Medicus *superbiæ*, cavendo, ne eò deveniat arrogantiæ, ut alios suos Collegas tanquam volitantes umbras ex alto despiciat, ac se solum ceterorum exemplum, artis Hippocraticæ canonem & archetypum, vana ostentatione arbitretur, ne aliorum curationes vel consultationes reprehendendo, gloriam, ac rixis & altercationibus unicam

cam sibi laudem ac pompam comparare studeat : ne remedia levis licet pretii , nec adeo difficilis compositionis , pro secretis , singulari studio , diuturnis laboribus , vigiliis ac sudoribus , maximisque sumptibus comparatis jactet , vendat , sicque popularem plausum ac fumum capret : ne flatuente superbiæ halitu distentus , omnia celet , & non nisi arcana arcanissima crepet : ne plurimarum felicissimarum & inauditarum curationum à se factarum , proprius ac vanus sit buccinator : ne tandem se uberioribus naturæ , animi , fortunæque muneribus præcellere , veram Palladis artem agere , neque censore , neque alterius ope indigere , falsò sibi persuadeat : sicque nimium sibi fidens , etiam in gravioribus periculis , alios sibi adjungi non modo non postulet , verùm etiam oblatos repudiet .

A R T I C U L U S II.

*De Scientiis ac Disciplinis Medico
necessariis.*

I.

Lingua Latina , quæ fidissima scientiarum interpres , basis ac radix , Medicus nec sine magna turpitudine , nec sine artis dispendio carere potest , cui , si comitem addiderit græcam , ut saluberrimas doctrinæ Medicæ undas ex Hippocr. Galeno , Aetio , Alexandrino , Egineta , Oribasio , Dioscoride &c. aliisque velut ex originariis fontibus haurire , gustare , ac vim vocis , dictionis nucleus , latentemque energiam melius percipere valeat , imitabitur ingeniosissimum illum virum , qui Romam & Græciam dissidentes , manus tamen invicem jungentes pinxit , addito lemmate ; conspirant amicè .

I I.

AD Poësin, non quidem lascivam illam turpium morum illicem, quæ venenum melle conditum lectitantibus nefandè instillat, sed castam & eruditam, Medico subinde divertere licet, horis præcipue succisivis, eamque non quidem ut civem, sed peregrinam tractare, tum, ut animi laxandi causa, delectabile ejus viretum peragrando, moralium flore & fructus carpat: tum, ut apud ægros atque etiam i Regum, Principum, Magnatumque symposiis, ac sapientiorum quorumque congressu, quin & in diserto sacrorum, moralium, profanorumque & philosophantium sermone, sententias ejus magna cum laude, a præsigni & efficaci ad bonam frugem exhortatione vel honesta delectatione proferre possit: tum ut eloquentiam suam, quæ *Marco Tullio* teste, absque Poësi sicca & imperfecta est, uberrimis Poetarum fontibus irrigare, sermonemque suum sententiis verbisque Poeticis, non quidem affatim & ad nauseam, sed condimenti loco tantum appositis, ac in tempore prolatis, quasi luminibus ac stellulis illustrare possit.

I I I.

ELoquentia eruditione munita, non tam decora & elegans est in Medico, quam etiam suo modo necessaria, tum in Cathedris ad artis decorum ostendandum, ad opes ejus amplissimas in medium lucem proferendas, & salutem ac sanitatem ægrotantium promovendam: tum in consultationibus publicis ineundis, ad mentis concepta ornatae proferenda, ad sententiam suam argumentis acerrimis & exquisitis rationibus stabilendam, ac adversarios, erronea ac falsa hypothesi innixos, de ponte dejiciendos; tum ad ægros, Medicis haud in paucis contradicentes persuadendos, ad pœ-

pœnitentiam contumaces , proposito dextra cum fa-
cundia prognostico de morbi periculo , ad eam dispo-
nendos , ad ægros mæstos consolandos , timentes eri-
gendos , diffidentes excitandos , iratos placandos , fu-
rentesque coercendos .

I V.

Philosophia Medicinæ foror germana & uterina est ;
facem ei præferens . Sine hac Medicina est po-
tius cadaver quoddam exsangue , quam corpus vivens ,
est ramus divulsus ab arbore , hinc Medicina rationa-
lis dicitur , à ratione nempe & dialectica , ac Medici
Physici ob Philosophiam denominantur , cùm Medi-
cinæ principia sint intimiora Philosophiæ arcana , ea-
que aliud non sit , quām particularis quædam Philo-
sophia , ac specialis & experimentalis Physica , cau-
fas & affectiones corporum naturalium in specie ex-
ponens , easque ratione & experientia examinans . Si-
ne Philosophia enervis est omnis doctrina Medica ,
omnis disquisitio à veritate recedit , oriuntur monstro-
sa opinionum portenta , novitatum quisquiliæ & pa-
leæ , ac sententiæ vigilantium somniis haud absimiles ;
descriptiones sunt mutilæ , & detruncatæ , aut omni-
no nullæ , axiomata vix probabilia , propositiones ob-
scuræ , probationes difficiles vel erroneæ , ordo con-
fusus , ac methodus curativa innumeris penè errorum
laqueis irretita . Cùm enim curatio fundetur vel in
indicatione , quæ aliud non est , quam syllogismus seu
unius ex altero per rationem illatio , vel in *experien-
tia* aut *analogismo* , quorum primum suppeditat modum
argumentandi ab inductione , alterum ab exemplo ,
clare elucescit , quod ille melius noverit curare , qui
melius noverit Philosophari , hinc necessariò oportet
esse , ut Medicus sit vel Philosophus vel stultus , cùm
tertium , si detur , crassi bubulci vel asini genus sit .

V.

Astrologiam etiam Medico convenire , nullus est , qui ambigit , nisi cui auriculas ignorantia , & pertinacia commodavit cornua , nemo enim inficiari potest , jucundum illud & fæcundum cæli cum inferioribus conjugium ac commercium , viresque ac influxus luminarium in Vegetabilia , Mineralia , immò & ipsum Hominem , quod testantur melancholici , maniaci , epileptici , aliquique circa constellationes graviores luminarium , & lunæ in primis , quæ non immerito astrorum omnium speculum & infundibulum appellatur , pejus habentes . Videmus etiam paulò plenius radiente Diana , humidiorum morborum fævitiem exasperari , ac in pejus ruere paralyses , apoplexias , lethargos , hydropses & sexcenta alia symptomata . Idem testantur epimenia , ad easdem lunæ phases recurrentia , dies critici , vulnera luminaribus conjunctis vel oppositis inficta , difficultius tardiusque coalescentia , pericula ex V. S. in violentis aspectibus celebrata , dysenteriæ , febres malignæ , pestilentiales , aliaque mala epidemica , quorum ex astris origine , non maximus tantum Hippocrates , sed & complures alii tradidere : immò etiam ex astrorum secuturis aspectibus prævisos prodiderunt .

V I.

Botanices & Anatomie maxime peritus sit Medicus : illius non tam ad decorum , ut remediorum suorum actualem habeat notitiam , quam ad necessitatem , pro visitandis Pharmacopoliis : hujus , cum sit oculus Medicinæ , in cimmeriis difficultatum prælucens tenebris , fit lumen , quo homo in homine quætitur & invenitur : sit fenestra illa , quam Momus in humano corpore desiderabat , ut abditi morborum , cau-

causarum, partiumque affectarum recessus patesierent: sit prima ac firmissima basis, super quam erigitur medendi methodus. Medicus enim sine Anatomia est cæcutiens, qui viam baculo examinans, huc atque illuc miserabiliter cespitat.

VII.

Chymia Medico non minùs necessaria: non quidem illa, quæ pro lepide omnia dilapidat, & ut aurum coquat, omnia decoquit; sed illa, quæ utpote fidissima rationalis Medicinæ ministra & socia, tum ad utilitatem, tum ad splendorem ac amplitudinem Reipublicæ Medicæ multūm confert; parando ac suppeditando lectissima omnis generis medicamenta, sapore etiam, dosis exiguitate, ac vi energetica commendatissima, quibus immanes morborum hydræ potentissimè expugnantur, quorum contumacia Galenorum auxiliorum vim haud raro satis superbe eludit; hinc plures cum *Mattioli.* in epistola quadam audent dicere: neminem Medicum absolutum esse, immo ne mediocrem quidem, qui in hac nobilissima scientia non sit exercitatus.

VIII.

MEdico honorificum est, si partem Medicinæ *Chirurgicam* ita mente calleat, ut urgente necessitate etiam Ministrum & operatorem agere queat. Sicuti enim boni Imperatoris est, militis gregarii partes sustinere, si necessitas instet: ita dedecori non erit Medico, si protēnata, pro rei gravitate ac data occasione, ministrum agat, cùm submissio hæc & humilitas pro salute ægri, in necessitatis angustiis constituti suscepta, existimationis jacturam minimè inferat. Si vero adsint Ministri, & artis peritia & manus dexteritate insignes, præsidem agat Medicus, atque inter eos splen-

splendeat, ut Dux inter milites, operationes coru-
dirigendo, tratendo præcepta, rescindendo errores,
ac cavendo, ne solennis hæc Medicinæ pars abeat in
carnificinam.

I X.

Medicum *Pharmacopœum* agere, ac parare clysmata, facere potionēs & quævis magmata, vel etiam cataplasma, unguenta aliaque levissima ægris porrígere, philargiriam, lucrumque sapit, ac Medicus maculam haud levem inurit; cum sublimius atque excellentius Medicorum munus sit, quam ut ad manuales has operationes, vilesque mercaturas se demittat, præsertim si adsint artis Pharmaceuticæ periti, qui pharmaca decenter ac rite paraverint ac dispensaverint. Interim unum vel alterum sibi peculiare ac reservatum remedium, cuius usum & enchires in ille solus novit, dispensare haud indecens erit; præsertim si non lucrum, sed honorem, artis laudem & amicorum gratiam aucupari, eorumque sanitati propicere intendat.

X.

Fallacissima est *Praxis*, quæ valida non est *Theorie* basi munita, nam solida prius, exquisita & firmissima principia jacienda, antequam ad Practicæ perfectionis culmen assurgatur, crassis semper ignorantiae te-nebris sepultus jacebit Theoreticorum face destitutus, exercitandus prius Medicinæ Tyro in Theoriæ Palaestra, antequam Athleta Medicus in Praxeos descendat arenam; nec audeat ægritudinis monstrum aggredi ac devorare, nisi prius dente meditationis seu studio Theoriæ detriverit principia, ac mentis in ore volverit generalia Medicinæ dogmata: Utilius est prius cum mortuis, hinc cum vivis tempus terere, præser-tim

tim etiam, cùm singula ferè præcepta & recondita, quæ in praxi observantur; affluentius in Præticæ Medicinæ libris ac scriptis elucescant; quare animus priùs Theoria probè imbuendus, investiganda humani corporis elementa, principia, humores, temperamenta, aliæque ejus proprietates, & affectiones, perpendenda insignis affectuum varietas, numerusque penè infinitus; considerandus ægritudinum mos, motus, magnitudo atque eventus: ruminandæ causæ sæpiùs abditæ ac per vestigatu difficillimæ, utendum signis diagnosticis, ac generali medendi methodo; quæ omnia non sicco pede & per transennam peragenda, sed pluribus annis solida & eximia horum acquirenda eruditio. Nam teste Hippoc. *Vita brevis, ars longa.*

X I.

Theoria probè instructus Medicus noverit, non satis esse confusam animo tenere medendi effigiem, & generales de arte medica contemplationes & notiones habuisse, sed ad tecmarsin & particularia descendendum esse, cum non homini, sed Calliae vel Socrati Medicina fieri debeat: noverit etiam Praxin à Theoria distare, quantum æra lupinis: in Præctica occurrere sæpiùs aliquid, quod nec dici, nec scribi potest; omnes etiam penè morbos curari in cathedra & libris: non omnes verò in lectis, in quibus ægri sæpiùs moriuntur; Experientiam igitur, quæ est anima & mater Medicinæ, judex etiam & lapis lydius, ad cuius obrusam pleraque examinanda, sibi comparet Medicus, ægrotantium lectulos, indefessa diligentia frequentando, juvantia & lædentia exactè considerando, cum Medicis practicis & præcipue senioribus conversando & consultando, pharmæcopolia adeundo, librosque praticos ac præcipue eorum observationes perlustrando.

A R T I C U L U S III.

*De Officio Medici, in Ægris assumendis
& vifitandis.*

I.

Non decet Medicum, haud rogatum sua offere officia, nam teste Hippoc. promptitudo & facilitas medendi effusò oblata, ab ægris contemnitur; atque turpe est, imperium & potestatem in corpus, ab ipsis ægris emendicare. Accedit contemptui non tam minor confidentia, quæ tamen haud modica est bona curationis circumstantia, quām suspicio haud exigua, vel quæsti lucri, vel jactantiæ & nimiæ ambitionis. Præstat igitur in suæ dignitatis cultum, in debitam sui artisque medicæ venerationem atque decorem, propria virtute meritisque inclarescere Medicum, & vocatum assistere ægrotanti, quām se ipsum obtrudere, ac malierculas, pharmacopæos, chirurgos, consanguineos, amicos, aliosque ægrorum assilientes, adiunctos habere, ut operam alicujus veluti buccinis undique deprædicent, ac patientes per fas & nefas procurent.

I I.

Sicuti Rudolphus Primus Imperator asseruit: melius esse benè imperare, quam Imperium ampliare; ita melius est pauciores infirmos suo Regimini commissos, magna cum animi applicatione, diligentia, studio, artisque præceptis regere, quām plurimis uno eodemque tempore non posse satisfacere: cum enim, docente Cefso, optimus ac maximè idoneus sit artifex, qui non diu ab ægro recesserit, & qui ad omnes circum-

cumstantias sedulo attenderit, easque ritè percontatus fuerit; impossibile erit, tot ægris decenter invigilare posse, & ferè non obvium accommodare medicamentum, sine ulla percontatione, cognitione causæ, & cum discrimine.

III.

Agross deploratos & conclamatos, solo prognostico relinquendos, eorumque curam minimè suscipiendam esse, Hippoc. jubet l. de art. dum ait: *Medicinae est vehementes morborum impetus retundere, & eorum, qui morbis vici sunt, curationem non aggredi;* ne teste Galen. fidissimo Hippocratis interprete, infamentiur apud vulgus remedia, quæ multis fuere saluti; quod tamen intelligendum esse judico de illis tantum morbis desperatis & conclamatissimis, qui per se & revera tales sunt, nulla arte aut ope curabiles, vel ipsa natura immedicabiles, ut v. g. cæcitas & sorditas congenita, hectica marasmodes, sphacelus, phthisis consummata &c. non de his, qui plerumque saltum interimunt, & ex quibus aliquos ægros convalescisse observatum est, horum enim curatio generoso animo tentanda, præmisso tamen in spe difficiili prudenti præfigio, vel prædicto mortis periculo: cum melius sit anceps experiri remedium, quam nullum, ac Celsus teste, temeritas subinde restituit, quos ratio non sanat. Nam sicuti in bello sæpè longe violentius ex necessitate, quam virtute pugnatur; ita satius est aliquid cum periculo facere, quam spe adempta certo perire, præsertim cum etiam monstra in arte subinde contingant, & monente Philone, auxilium divinum maximè plerumque adsit, cum deficit humanum.

I V.

IN Medicam potestatem hand recipiendos esse , qui confessionem Sacramentalem renuant , jubet supremum Ecclesiæ caput *Innocent. III. in concil. Lateranens. tit. 37. c. 15.* quod jussum repetit *Pius V. in sua bulla 8. Mart. 1566.* in lucem edita ; cum Medici , inquit , ad infirmos in lecto jacentes vocati sunt , ipso ante omnia moneant , ut confessori omnia peccata sua juxta ritum S. R. E. confiteantur , nec tertio die ulteriorius eos visitent , nisi longius tempus confessor ob aliam causam infirmo concederit . Quod eò intelligendum , ut Medicus teneatur ægrotantem periculi , vel per se vel per alium , prout necesse videbitur , admonere , cumque ad exomologesin sacramque Viaticum suscipiendum adhortari , minis etiam erga recusantem , quo deserere eum velit , adhibitis . Eum autem nihilominus renuentem , omnino non inviseret , seu ex toto deficeret , non suadent *Sanchez. Villalob. Barbos. Sylvet. Dian.* aliqui ab eodem citati , cum Medicus divina Pietatis æmulus , tentatis omnibus , quæ ipsi præcepti sunt ; & quantum ex se est , pietatis opus ulterius prosequi , adhibitisque præfidiis , ut forsitan æger adhuc resipiscat , vitam prolongare possit , præsertim etiam si metuendum , ægrum à Medico ex toto derelictum , magis obstinatum fore , & obsequia , quæ jam forte parabat , omnino negaturum esse .

V.

Medicum paulò gravius periclitantem seipsum curare , minus tutum est , ob judicium in re propria , densa Philautiæ ac affectuum inordinatorum nube magis obtenebratum : infirmis etiam frequentius int sensualitati magis , quam rationi obedientibus ; hinc præstat , vel alias simul in consilium adhibere , qui citra

citra animi perturbationem de morbo judicent, & absque pavore remedia suggerant, vel si Medicus ægrotans adeo sit debilis, ut mens etiam langueat, iis omnem medendi provinciam concredere.

V I.

Medicum non teneri, cum extremo vitæ periculo, peste correptis succurrere, nisi pacto se obligaverit, vel salario ad id conductus fuerit, in confessio est. Hostes & inimicos suos in curam medicam assumendos esse nonnulli dubitant, ne, si quid humanitus accideret, eosque mori contingenteret, suspicionem incurreret. Verum sicuti Medicina etiam inimicis opem non denegat, sed odium benevolentia, damnum beneficentia, ac pessima quæque humanitate vincendo, medelam adhibere non recusat: ita majori hoc in passu utendum cautela, ut etiam si fieri possit, alter adsit Medicus, vel alius doctus Vir, rationes curationis intelligens, receptis quoque in pharmacopolio sedulò asservatis, utpote incorruptis candoris & sedulitatis testibus.

V II.

Nonnulli Medicis inobedientes, gulosos, qui Medicum & Medicinam infamant: ut etiam Ingratos, qui jam olim vitæ discrimine erepti, detestanda ingratitudine beneficentiam Medici contempserunt, eumque denuò ad opem ferendam impudenter accer- sunt, opera Medica haud dignos censem; verum intemperantes ac inobedientes, qui vivunt, prout volunt, debent curari prout possunt: neutquam vero omnino derelinquendi, quod enim, teste Galen. us intemperantiae dediti, nullis possunt juvari præfici diis, potius de cura prophylactica quam actuali morborum curationem intelligendum; præsertim etiam,

cum aliis remediis & nova temperantia , quam infirmitate oppressi s̄epiūs sectantur , juvari possint . Ingratos quoque haud omnino negligere oportet , ne avaritiae aut crudelitatis accusent Medicum , cuius supremum debet esse cura , ut nihil committat , quod vel Christiane charitatis jura frangere , vel nobilem & præclaram facultatem , turpi pecunię exactione fēderet possit .

VIII.

CUm salus egri suprema Medico lex sit , ea quoniam minimum dependeat à legitima Medici visitatione , quę est veluti anima felicis curationis , hinc plurimum interest , ut à Medico decenter instituatur multum enim pr̄estat ad morbi cognitionem : plus ac ejus curationem : plurimum ad errorum plurimorum qui ab egri & assidentibus in absentia Medici committuntur , evitationem . Sic etiam quod vox vivi Preceptoris : quod pr̄esens Magistri auctoritas apud discipulos , hoc Medici pr̄esentia apud egros ; ac tantum hoc evo valet remedium , quantum de Medico sperat eger , quantumque in eo est opinionis & auctoritatis ; hinc promptum semper habens juvandum , rogatus omnibus domi sit oportet , neque tristem à se quemque patiatur abire , latus omnibus visitando auxilium , vel quantum in se est , non denegaturus .

IX.

Medicus egrotum accedat opportune ; semperque illorum , qui periculosius decumbunt , prius : rectum liquorum verò posterius curam gerat . Matutinum in primis tempus eligat visitationi aptissimum , s̄epiū etiam vespertinum huic labori impendat , interdum bis de die , si morbus pr̄esertim acutus urgeat : subinde

ter vel quater , si morbus acutissimus , & præsertim
rogatus ; in levioribus & chronicis quotidie semel vel
alternis diebus , immo quandoque post 3. 4. vel plures
dies dénum , prout opus esse videbitur , ita tamen ,
ut semper quid ad redditum usque suum faciendum sit ,
reliquerit . Optime faciet , si accessum moderatus fuerit
juxta morbi conditionem , ægrotantisque affectio-
nem . Sunt enim ægrorum aliqui , qui crebro se in-
visi maximoperè lœtantur , & Medici non aliter quam
Angeli cujusdam aut Numinis cœlitus delapsi adven-
tum expectant ; alii e contrario à saepius invisentibus af-
ficiuntur molestia , Medicumque querendi lucri , se
ipsos verò detestandæ arguunt avaritiam .

X.

AD ægrum placide ingressus , lœtabundus eum fa-
laret Medicus , ac moneente Hippoc. meminerit
auctoritatis & sessionis , anima enim teste Philosopho
7. Phys. 2. sedendo sapientior fit , & prudentior , ac
Intellectio assimilatur quieti & statui magis , quam mo-
tui ; unde olim quoque sedere tenebantur consultantes
& judicantes . Sedeat ex adverso vultus ægrotantis ,
ut ex eodem velut ex speculo mala tum Præsentia
tum futura intueri valeat , & quidem paulò remo-
tius , præsertim in ægritudine maligna , vel quod tu-
tius ex latere , ne miasmate venenato , cum halitu ab
ægrotantis corpore emisso , inficiatur & ipse Medicus ;
quo in casu etiam ad ingressum suffitum parari , fene-
stras aliquatenus aperiri ad spatium aliquod jubebit ,
sequi tum odoramentis , tum in ore detenta Myrrha ,
vel masticata rad. Zedoar. Angel. Cort. cit. rotul. aut
morsell. aliisque alexipharmacis , & breviori præcipue
visitacione , ab imminentे contagio immunem reddet .

X I.

Sedens , pacate ac modeste hilari facie ad ægrum conversa , gravitateque comitati & humanitati conjuncta , cognita , visuque necessaria inspiciat , ea quoque , de quibus fas & opus est , interroget , ægrumque vel adstantes morbi Historiam referentes patienter , ac attente audiat , sermocinetur de rebus Medico non naturalibus dictis , de cibo & potu , eorumque vario præparandi & administrandi modo & usu , de ægro ad confidentiam & obedientiam disponendo , de remediis debito tempore & modo exhibendis , de aliis etiam rebus indifferentibus ac opportunis , juxta ægrotantium conditionem , capacitatem & genium , quibus Medicus Prothei instar se conformet , omnesque lucretur , modo à civilitatis ac modestæ gravitatis limitibus non secedat .

X II.

Ab initio Visitationis , præsertim de morbi essentia , causis vel exitu oraculorum more dubius respondeat , neque ordinatorum semper rationem redat præcipue coram vulgo & ignaris , aut ægris quibusdam hæsitantibus & omnia secura metuentibus , ne majorem hæsitandi occasionem nanciscantur : bene tamen coram peritis & scientificis agendorum , morbique causæ sæpius manifestandæ , ut præceptis medicis magis obtemperent , & non respondeant , quod Aristoteles Medico suo multa vetanti , & non pauca circa morbi causam edicenti , scitè respondisse fertur : *ne me cures , ut bubulcum vel fossorem , sed prius causam edissere , atque ita præceptis tuis me facile morigerum reddideris .*

XIII.

EGris non nimium familiaris sit Medicus, ne ipsum, ejusque remedia parvi pendant, & contemnunt, nec ministros sibi faciat socios, nisi debitam in se venerationem posthabeant: non tamen inimicos sed benevolos potius, eorumque acta collaudando ac celebrando, sibi devinctos reddat. Procuret etiam, quantum ex se est, ut ægrotis adstantes & assidentes munere suo ritè fungantur, ut sint infirmis grati, gnavi morum & consuetudinis & naturæ ægrorum, sint mundi, gratiosi, urbani, seduli, fideles, patientes, dociles, ac Medico obtemperantes; cavendo etiam, ne ægris vel iram concitent, vel tristitiam ex intempestivis nunciis, vel aliam offensam causentur.

XIV.

Visitando, Medicus diutiùs ægris, quām par est, non adstet, vel saltem raro & quidem non nisi familiaribus: mulieres etiam non nisi cum aliorum adstantium præsentia, & brevi intervallo visitet, illico quasi transeunter accessionem quodammodo fugitivam exhibeat: neque tamen etiam, nisi coactus nimium properet, in omnes circumstantias diligenter inquirens, & in primis, quomodo tulerint medicamenta, attentè notans, cùm ex juvantibus & lædentibus tutissima sumantur morborum remedia, hinc maximè hallucinantur, qui statim ac ægros intuitui sunt, pulsumque tetigerunt, rigoroso, ut decet, morbi, causarumque examine neglecto, inconsultò statim medicamenta dictant, & Andabatarum more agenda præcipitant.

X V.

Medicus ægrotos visitans, honestè & decorè vestitus sit, sicuti enim sumptuosus valde vestitus arrogantiam sapit, ac lividi dentis scommata vix evitat, ut taliter vestiti vel luxu perdita, levia, otiosa ac prodiga audiant ingenia, vel incurvant suspicionem ampulloſi circulatoris & agyrtæ; ita folidus aut nimium vilis vestitus, vel quæſtum exilem, vel egestatem, vel avaritiam denotat. Videat igitur, ut vestitus gravis sit, honestè elegans, mundus, non lacerus aut labo vel spurcitie inquinatus, ut omnia ad optimam existimationem, prudentiam ac animi moderationem sint composita. Ad cultum & munditium corporis quoque spectat, ut Medicus manus quam maxime purissimas habeat, faciemque mundam, & pilos in barba & capite decenter compositos, cavendo quoque, ne tetro odore ex quacunque parte corporis emissio, vel ex foliditie oriundo, ægrotantibus molestiam, vel econtra etiam odoribus moschatis vel ambratis, fæminis hystericos excitet paroxysmos.

X V I.

Tandem Medicus visitans, artem Medicam adversus ejus osores & contemptores acriter tuaatur, eam male tractantes semel bilve tacite correptos, & non emendatos palam arguat: ægros inobedientes blandè primùm, hinc severè corripiat, vel omnino deserere comminetur, præsertim vero apud potentiores sciat, vi virtutis patientiae & mansuetudinis, Medico quam maximè necessariæ, multa connivere, ferre, dissimulare, ac calumnias, aliaque innocenter, ac injustè sæpius illata, vitæ sinceritate, & oppositis actionibus, aut amicorum, vel proborum aut eruditorum potentumve laude abolere.

ARTICULUS IV.

*De Officio Medici in dignoscendis Morbis
eorumque Causis.*

I.

Quò quis Medicus accurior est in morbi cognitione, èd felicior in ejusdem curatione, asserente enim Hippoc. de art. si sufficerit Medicus ad cognoscendum, sufficiet etiam ad curandum, ut adeo non mirum, complures tantùm in medicina operibus aberrare, quantum in cognitione morbi falluntur. Cum igitur prima basis curandorum morborum sit recta eaurundem cognitionis, atque debitum unius ab alio discrimen, Medicum plane percontatorem esse oportet, qui necessariis interrogationibus non parcere, sed artificiofa inquisitione morbi essentiam ejusque causam investigare debet, antequam curationis methodum aggre-diatur.

II.

Haud malè agunt illi Medici, qui in curatione morborum, moram aliquam admittunt, ac prima die toti sunt in examinando ad amissim egro, circa causas occasionales, omnesque morbi antecedentes ac præsentes circumstantias, quo tempore nihil remediorum imperant, ne per illorum usum ordinaria morbi periodus signorumque constantia perturbetur, aut morbos aliena facie fistunt, vel saltem generale aliquod & innoxium præscribunt Medicamentum. Secunda die, diligenter consideratis rebus ante dictis, morbi speciem tandem decernunt, & exinde remedia opportuna præscribere incipiunt; latent enim saepius in puteo Democriti profundissime sepulta prima mor-

borum stamina, densaque caligine circumfusa delitescunt, ut non nisi magno, summaque industria erui possint.

I I I.

Antesignanus noster Hippoc. *I. de affect. tit. 36.* quinque interrogata Medico, cum ad ægrotum devenerit, proponenda injungit, inquirendo : 1. *Quid dolear?* 2. *Ex qua causa?* 3. *Quot diebus?* 4. *An ali-
vus secedat?* 5. *Quo victu utatur?* plurimi quæstionum harum limites paulo angustiores agnoscunt, hinc etiam celeri cogitatione, linceaque mentis acie percur-
rere, examinare & perpendere jubent, ægrotantis tem-
peramentum, ætatem, sexum, & quoad hunc, sciscitando, an mulier grāvida, & quot mensib⁹ utero gerat? an menses in virginibus vel non grāvida, vel lo-
chia in puerperis ritē fluant? item quale anni tempus,
aeris constitutio, loci ac regionis mutatio, consuetudo
in victu, exercitia, idiosyncrasia, ac singulares, oc-
cultæque nonnullorum proprietates. Item quærendo:
an & quibus hactenus usus fuerit remediis? qualis
eorum fuerit effectus? an prioribus jam annis tali morbo
laboraverit, vel Parentes simili morbo detenti fuerint?
an consuetam aliquam evacuationem neglexe-
rit? &c.

I V.

Pradictis similibus quæstionibus pro re nata pro-
positis, observatis simul ægri moribus, discursu,
facie, oculis, ac lingua, præsertim in morbis acutis,
pulsum tanget Medicus, ex eoque virium vel robur
aut debilitatem, vel effervescentiam febrilem, aut na-
turalem aconomia corporis dispositionem dignoscet;
ita tamen, ut, sicut in civilibus non uni testi, ita ne-
que in foro Medico huic signo, tanquam fallaci subinde
& in-

& incerto, præsertim in affectibus capitis, ut apoplexia, lethargo, febris etiam malignis, facilique ex causa mutabili, & in variis individuis vario, non fidat.

V.

IDem dicendum de Urina, quæ post pulsum cognitum inspicienda, quoad substantiam, colorem & contenta scite examinanda, in morbis præsertim, qui Uroscopiae subjacent, ac quorum causa in genere venoso, epate, liene, renibus, ureteribus vel vesica delitescit. Hinc exhibandi fôrdidi illi Uromantes & Lotion-Physici, qui, nescio quod yaticinium, omni ratione carens, levi popello vendunt, & quidem non ut Apollo ex tripode, sed ex matulis oracula edunt, ac turpem lucri odorem venantur. Noverit autem Medicus, urinam æquè ac pulsum, ut signum coindicans tantum considerandum esse; ita, ut cætera quoque signa diagnostica ex aliis fontibus desumpta, ad partes vocari debeant, ut ex omnibus simul certi quid decerni possit, cum sola Protei instar mutabilior sit, tum pro diversa individuorum varietate, sanguinis que ac spirituum crassi, tum pro diverso vitæ genere, pro vigiliarum vel somni, repletionis vel inediae, motus vel quietis, regionis, anni temporis, assumptorum, aliarumque circumstantiarum varia conditione.

V I.

Sicut autem Urinæ, ita etiam præ varietate affectuum, excretorum alvi, sputi ac sudoris habenda ratio; præterea quoque tam in morbis chronicis, quam acutis, Hippoc. in cognoscendo hypochondriorum statu, num eadem mollia, æqualia & sine dolore, Medicum quotidie diligentissimum esse jubet, cum ibi non tam potissima facultatis naturalis sit sedes, quam etiam veluti Palæstra quædam, in qua omnes prope-

modum nature, morbique fiant conflictus, ut adeo non tantum multum inserviant pro morborum diagnosis, verum etiam non leve futuri presagii evadant argumentum.

V I I.

CUm ex dictis facilè elucescat, quanta solertia, ingenii perspicacitate, & vigilantia egeat Medicus, ad cęritudinis ideam, speciem, causamque detegendam, ut adeo veteres haud frustra Palladis ac AEsculapii simulacro, draconem veluti vigilante symbolum, & quem acutissima pervigilique oculorum acie preditum esse tradunt, apponenter, fontes signorum partis affectę morbi causarumque quam diligentissime trutinandi & delibandi, quales sunt. 1. Essentialiter inherentia, quo spectant partis temperies, magnitudo, figura, morbus ipse sensibus obvius. 2. Cognitio causarum procatarcticarum & dispositivarum, vel hereditiarum. 3. Actiones lese, & quidem vel naturales, vel vitales, vel animales. 4. Excreta, eorumque substantia, qualitas, quantitas, sapor, modulus ac ordo excretionis. 5. Qualitates mutatę quoad calorem, frigus, colorem, saporem, sonum. 6. Examen juvantium & lędentium. 7. Mutatio unius morbi in aliud.

V I I I.

QUOD si verò, ut subinde etiam, omni adhibita diligentia, & ab initio in primis contingit, planè obscura fuerit morbi species, ut penitus cognosci & pescipi nequeat, presertim si quis vocetur ad curationem morborum vel complicatorum, vel obscure procedentium, vel similitudinem cum aliis morbis habentium, ut Medicum confundant, ac anxium & dubium reddant, ad magna saltem remedia non acceden-

dendum, sed inviolabile illud præceptum Hipp. 6. epid.
s. 2. text. 50. observandum: si non potes prodesse,
vide saltem ne noceas. Hinc vel urgenti symptomat
prospiciendum, vel debilia aut communia tentanda
præsidia, ex quorum administratione nullum ægroti
immineat periculum, vel res tota naturæ committen-
da, confortantibus interim insistendo, tenuemque vi-
ctum imperando, usque dum natura vel vincat, vel
morbum detegat; cavendo tamen, ne æger aut ad-
stantes propositum tuum agnoscant, ac te ex incerta
conjectura remedia tentare, eaque cum alienæ vitæ
discrimine experiri, malè & perperam accusent.

ARTICULUS V.

*De Officio Medici, in Prognosti-
cando.*

I.

Vix ulla Medicinæ pars est, quæ excellentiam
artis, & Medici præstantiam adeo ostendat,
quam ea, quæ eventus præsagiendi rationem tenet.
Hæc enim maximam medenti conciliat autoritatem,
cum Numinis instar.

1. Quæ sint, quæ fuerint, quæ mox futura sequan-
tur, prænoscat. 2. Futuris docet tempestivè occurre-
re, cùm oculati Argi instar veluti ex specula fata-
ras affectiones, imminentiaque gravissimorum sym-
ptomatum pericula prævideat & præcaveat. 3. Apud
ægros & adstantes parit admirationem: hinc admira-
ratio fiduciam, fiducia obedientiam, ac obedientia
sanitatem. 4. Medicum infamia, calumniis, ac cri-
mine internectionis liberat. Cùm enim omnes sanari
non possint, ac plurimi, vel ob ægritudinis contu-
maciam, vel ægri inobedientiam, vel ejusdem
debi-

debilitatem , vel adstantium errores , vel rerum necessariarum defectum , vel fati necessitatem ; vitali lique preventur : Medicus prudenti præfigio ab omni mortis culpa se reddet immunem . Officium enim ejus est , morbos sanabiles sanare , & insanabiles prædicere , ne , si fortè ars victa malo fuerit , vel ignorasse , vel sefelliſſe videatur .

I I.

Sicuti etiam scientia Prognostica nobilissima ac utilissima , ita pariter quoque obscurissima & difficilima , ut plures vel peritissimi Medici , subinde in præfigiendo cæcutiant , & vacillent . Difficillima est , 1. Ob subitam crisi mutationem , quæ prædictionem multoties interturbat . 2. Ob velocissimum urgentis morbificæ causæ impetum , nunc ad penitiora partis alicujus principis penetralia , nunc ab iis ad ignobiliorē corporis partem , ut vel repentina salus , vel inopinatus sequatur interius . 3. Ob plures morbos ex humoribus diversis & contrariis scaturientes . 4. Ob causas procatarcticas inopinato supervenientes , crisi certitudinem corruptentes . 5. Tandem ob peculiares hominum proprietates & idiosyncrasias , Medico sæpen numero haud compertas .

I I I.

CUm igitur tanta Prognoseos difficultas , ut etiam *Hippon.* præfigendi artis magister peritissimus 2. aph. 19. pronuntiaverit , acutorum morborum non esse certas Prædictiones neque ad salutem , neque ad mortem ; cautum semper Medici sit præfigium , ne , si res aliter ac prædixit , succedat , ægro & adstantibus risui & contemptui habeatur , vel commissi in curationis negotio erroris insimuletur , nihil enim juxta effatum *Hippoc.* 2. prorr̄ber. & lib. prænot. ineptius est ,

*et, quam Medicum in prognosi morborum frequenter falli. Sicuti enim unquam hallucinari, ferè supra captum hominis : ita rarissimè solius artificis, prout ingenuè fatetur *Cous noster prænot.* 41. & *Galen.* in Commentar.*

IV.

Medicus nunquam sanitatem, nisi infallibilis sit ; certo promittat, vel ejusdem certos præfigat terminos : multò minus agyrtarum & scurrarum more, turpis captandi lueri causa, certitudinem talem juramento confirmet, cum nunquam certus sit de supra causa, à qua cuncta hæc inferiora diriguntur, neque etiam de obedientia ægri, vel diligentí applicatione, aut operatione remediorum, vel naturæ coöperatione, aliisque pluribus casibus subitaneis atque fortuitis, temerarias ejusmodi pollicitationes evertentibus, ut adeo non mirum, tales sui dedecore, infamiaeque dolore meritas errorum suorum pœnas luere.

V.

Pari ratione nunquam mortem certam, nisi certissima & infallibilia fuerint indicia, vel eam absque spei, si aliqua astulserit, mentione prædicet, ne forte, quem moriturum infallibiliter falsò præsenserit, magna cum nominis sui calumnia, non ita longè post, quasi à mala sententia provocaret, supervivat. Non enim omnia adeo manifesta sunt circa ægros, ob specialem uniuscujusque individui idiosyncrasiam, quin interdum hujus ratione miracula in Medicina fieri videantur, & ii, qui conclamati putantur, præter spem subinde convalescant.

VI. Ægri-

VI.

Agritudine incipiente aut parum invalescente, judicium suum suspendat Medicus, ac oraculorum more, ambiguè de morbi exitu sermocinetur, illudque Galen. 1. *De dieb. decret.* 12. observet: *nihil in morbo firmiter præsagire possimus, satius est tacere, quam temere pronuntiando falli*, quia 1. non nulli videntur morbi ab initio salutares, latente malignitate, qui postmodum ex insidiis erumpentes ad occasum insperatò tendunt, cum dedecore bene præfigientium. 2. Medici nonnulli minùs cauti facile decipiuntur, dum vel subitis ægrorum alleviationibus, absque ratione & causa manifesta repente factis, caca decepti fiducia, & ab omni suspitione remoti, salutem statim spondent, dum non raro, insperata supervenit mors, ac spei gaudium inopinatò vertitur in mærorem, cum arti ignominia & Medici infamia vel mala pertimescunt, quæ tamen, sicuti præter rationem ac temere eveniunt, ita non sunt formidanda; utpote instabilia; vel tandem magnum & acutum pronuntiant morbum, qui dein repente evanescit, superstite solum Medici amusi & inexperti infamia Nihil igitur temere affirmandum: nihil etiam contemnendum.

VII.

Medicus in *Prædictionibus Hippoc.* utpote hac in arte cautissimi & exercitatissimi, apprimè versatus sit, & nocturna diurnaque manu eas versans, illius *lethale, malum, pericolosum, & perniciosum* probè norit distinguere. Sciat etiam interdum à multis bonis indicis unum malum vinci, & rursus è contrario, à multis malis unum bonum, noverit quoque fundamentum legitimum prognoscens cujuscunque consiste-

sistere, in circumspecta consideratione robori naturæ, & violentiae morbi, & utriusque mutua collatione; in primis etiam ægri decubitum & faciem veluti corporis & animi speculum, & oculos, in quibus elucet vitæ nostræ radius & Vitium præcipuus character, & nares, & linguam, quæ humorum qualitates ac inflammations internas siccitate sua exprimit, & manus & pulsum & urinam, reliqua excreta, ac præsertim signa coctionis in iis apparentia vel deficiente, lincea mentis acie contempletur, quæ cùm Galen. accuratissimè semper observaverit, se nunquam in prædictione deceptum fuisse gloriatus est; unde etiam 3. epid. comment. ult. doctum in arte, non valde in prædicendo falli posse, affirmat.

VIII.

SI Medicus dubiam naturæ victoriam sagaci conjectura prævideat, periculum adstantibus matrè insinuet, ut patiens prospicat conscientiæ, domuique suæ disponat, & affines curæ suæ & hæreditati cogitent, in sequē Medicus à mortis subsecutæ culpa fiat immunis; nihil interim omittendo, quod ad opem naturæ ferendam, ad ægrotantis solamen, assidentium gratificationem? suæque operationi ultimum posse tribuendum, accommodatum videbitur: spei etiam, si aliquid adsit lumen ostendendum, salusque à remedii & à viribus, si hæc constiterint, ac nullos obtingat error, speranda.

X I.

SI Medicus nullam superesse spem; aegrumque protinus conclamatum viderit, post exitum e cubiculo absque terrore, submissa voce & apparenti saltem vilus & animi tristitia, assistentibus judicium suum appetiat, nullatenus autem ægrotantem omnino deserat, cum

cum multi sāpē mirabiliter sanentur , ac monstra non tantum in natura , sed etiam in arte contingent , ac interdum in desperatis casibus benedictio Divina præter omnem spem , dum ex officio sāpius extremè laborantibus succurrimus , nobis affulgeat ; hinc sāpius à Medicis prognostico derelicti , vel sponte , vel ob viis oblatis remediis convalescunt .

X.

Medicus animum decubentis presertim timidorem , quantum fieri potest , & anime salus concedit , erigat , consoletur , spemque ejus dulciter nutriat : cùm ejusmodi confidentia , spiritibus recreatis & in motum concitatis , sāpius humores corporis facilius corrigantur , hisque bene se habentibus , viscerum damna quoque promptius deleri possint ; ita tamen , ne periculis in morbis egrum nimis hilarem ac bone spei plenum reddendo , in multo majorem hinc conjiciat tristitiam , cùm in pejus ruit morbus , vel ultra ejus promissa producitur , aut in futura salute nimium confisus , Medico , ut fas est , non obtemperet .

X I.

CAVEAT Medicus , ne coram infirmis , qui oculis & auribus intenti in cubili detinentur , ac gestus , vocesque Medici nondum claras , & vix dum in labiis herentes , circumspiciunt , mussitet , vel gestu aſſidentibus , ac multò minus ipsis egris , egritudinis periculum & acutiem manifestet , nisi vel occurrat eger animo fortis & prudens , qui plūs magni fecerit icire eventus morbi veritatem , quām exitum adversum extimuerit , vel egrī morosi ac protervi , remedia ad salutem utilia ac necessaria respuant , ut ea lubentiūs admittant , vel exposcant , vel Patientes permaneant ad

ad pœnitentiam contumaces, & monita salutaria spernentes, cras in crafstium differant, quo in casu Medicus zelo charitatis accensus, suavi primùm cum dexteritate, hinc etiam hac vana existente, indignabundus propinquam iis mortem aperte præfagiatur, ut saluti suæ provideant, & licet malevolentiam incurrat, generosè tamē eam temnat, pro certo habens, gloriæ palmam sibi comparari, si quidquam adversum in recti muneris executione procedat.

ARTICULUS VI.

De Officio Medici in Consultando.

I.

Consultatio Medica non tantum ægroto maximè utilis, quam Medico honorifica. Utilis, quia 1. cum in rebus alioquin omnibus pluralitas, tum votorum tum consiliorum, tam sollicite queratur & expectatur, eadem minimè rejicienda in re maximi momenti, qualis est sanitas & vita nostra, thesaurus longè omnium præstantissimus; ut adeo æger bonam recuperandæ valetudinis spem, ac singulare emolumentum sperare possit, ex plurium Doctorum virorum colloquio, qui magna vigilancia & cura, sapienti consilio, fide egregia, mira dexteritate, & accuratissima providentia eidem assistunt, ac de ejus affectu curando differunt. 2. Quia curatio & cognitio morborum, ut-pote sæpius res arduæ & intricatae, multorum iudicio ac voto magis enodantur, ut unus solus in tanta judiciorum difficultate, in tam magna experimentorum incertitudine, in tam præciputi occasionum lubricitate, in tot millenis rerum circumstantiis, sæpius haud sufficiat.

I I.

Honorifica Medico est Consultatio , cum in ea Medicorum doctrina , judicium , modestia , aliaeque virtutes præcipue cognoscantur ; sicuti enim plures ob consultationem indigne institutam , famam via indirecta acquisitam , derepente amiserunt ; ita econtra multi rara eruditione conspicui , qui ob taciturnitatem & modestiam , vel aliorum invidiam diutissimè latuerunt , facto sermone doctrina & eruditione pleno , emerserunt , hominumque benevolentiam & amorem magnetice ad se rapuerunt . Præterea labores & curæ æquis inter se partibus dividuntur , ut vel plus laudis , si ex communi voluntate res bene geratur , vel minus invidiæ , si consilii dexteritatem speratus successus fefellerit , in Medicos retundet , sive vulgi calumniæ , imperitorumque detractorum tela magis evitentur .

III.

Si igitur morbi gravitas id exigat , atque æger , vel adstantes , aut consanguinei alios pro consilio proponant , Medicus alacriter eos admittet , neque per hoc , prout venerandus *Senex. l. de præcept.* ait , indecor quidquam aut contra autoritatem suam facturum aliquid unum illum affirmat , qui plures advocaverit . Si quidem hominem se fateri , nec unum omnia posse agnoscere , apud sapientes nihil omnino præjudicat , aut de jam præconcepta existimatione diminuit , cùm præsertim cuicunque , etiam doctissimo , id evenire possit , ut , dum alterius curam peragit , continuis ipse etiam curis & sollicitudinibus obrutus , & quibusdam quasi tenebris circumfusus , eo ipso reddatur perplexus , minusque perspicax ad discernenda ea , quæ in præsenti casu magis forent necessaria , magisque conducibilia . Hinc etiam laudabile hoc institutum haben-

di consultationes, etiamnum viget in non paucis Hispanæ, Galliæ & Italiae locis, Parisiis in primis & Patavii, ac modo etiam Viennæ, ubi perraro morbus gravis curandus suscipitur, quin conjunctis plurimorum consiliis de agendis deliberetur, si res postulare videatur.

IV.

UT ægro utilis, ac Medico honorifica sit Consultatio, primo consulentes sint eruditi, perspicaces, providi, curarum præsertim felicium experientia insignes, ac pacis præcipue amantes; hinc olim Romani Medicos in templo pacis congregari jubebant, ut de ægri salute placide, & absque altercatione conferrent, & ab execribili, fædaque magis angue lernæ contentione abstinerent. Ad ægrotantis enim salutem, veritatisque centrum unicè collimandum; non ad gloriam, non ad lucrum, non ad privata commoda aliosque affectus, qui pessimi sunt Consiliarii; plures enim ægrotantes, ob exorta inter Medicos dissidia, dum privatis inter se gliscunt odiis, aut æstuant simultibus, videntes quomodo calamitatem aut maledicta alteri afferant vel affingant, infaustissimam sortiti sortem pereunt, dum occasio nunquam redditura præterit, pessumdata restat natura, morbus invalescit, ægerque internecione deletur. Sicuti igitur Medicorum æmulatio, contentio ac dissidentia, in ægrotantium periculum ac perniciem, adstantiumque confusione, ita eorum consensio ac concordia, in maximum ægrotantis & reip. Medicæ emolumentum & honorem cedit.

V.

Secundò, Consultatio mature instituatur, antequam prosternat, conculcet, vires atterat, ac prorsus enervet morbus, ægerque symptomatum violentia ac fævitia succumbens agonizet. Numerus consulentium ad evitandam confusionem non sit nimius: hinc cùm in ore duorum vel trium sit omne verbum, ac trium virorum unio, sit quasi symbolum perfectionis, adeo ut cognitio, quæ à tribus eruditis non habetur, vix à pluribus obtineri queat, gemini vel tres sufficiunt, licet etiam in aulis Principum quatuor, vel ad summum sex, non improbentur.

V I.

Tertiò, Consultatio non sit imparata, omnia enim subita probantur incauta, nisi subinde necessitas, ob repentina, graviaque ac urgentia symptomata supervenientia, gladiatorum more in arena ex tempore consilium capiendum esse jubeat; hinc maximè ægrotis consultum atque proficuum & exoptandum foret, ut Medicus ordinarius prius casum, seu speciem facti, cum omnibus circumstantiis cæteris futuris consiliariis scripto mitteret, ut tanto paratiores, majorique eruditione instructi accederent, *sana enim Consultatio*, ut inquit, *Blas apud Luert. ex eruditione rerumque peritia & experimento contingit.*

V I I.

Quartò, Consultatio sit ordinata, ita Medicus ordinarius omnium primò Historiam morbi, ejusque originem, vehementiam, durationem, adhibitaque præsidia, fide recta, menteque sincera proponat: hinc doctoratu junior ascendendo ad seniorem usque,

con-

conclusum ultimato formantem graviter, eruditè, libèrè, benignè tamen ac modestè, absque ullo existimationis suæ nævo, de morbi genere, differentiis, causis, signis, indicationibus, ac materia remediorum, & quidem omnia lynceo mentis acumine penetrando differat, sententiam suam validissimis rationibus stabiliat, præstantium & authenticorum scriptorum auctoritate fulciat, experimentis atque exemplis, quibus res clarior evadit, confirmet, aliorumque opiniones, si minus idoneæ & rationi consentaneæ videantur, modestè & absque zelo refutet, atque aliam magis tutam curationis viam persuadeat.

VIII.

Sicuti Galen. non reprobatur Medicorum dissensum, sed amicitia plenum, ac doctam duorum Medicorum contentionem, honestum consultantium certamen appellavit, quæ etiam in medicina, ubi multa conjecturabilia, quia ambiguitate & controversia non carent, inevitabilis: immò sèpius cotis instar ferrique mutuo attriti veritatis ignem elicit, atque ex dissonantium vocum opinionumque discordia, gratissima, ægroque utilissima emergit harmonia; ita prudentis erit Medici, sententiam adversariam, si necessitas urgeat, benevolè revellere, non prorsus eam negando, vel directè vehementius impugnando, sed placidè distinguendo, ac contrariorum argumentorum vi modestè retundendo. Cordati enim Medicus est, revelli sine pertinacia, & revellere sine iracundia, cavendo insuper vel maximè, ne dicta & facta Ordinarii vel alterius, ad ejus oppressionem & contemptum, suique ad aucupandum honorem carpat, sua meliora importunè obtrudat, peccata in medendo obtendat, & omnia crebris contradictionibus pessumdet.

I X.

Quintò , Consultatio talis sit , in qua superflua omnia vitentur , nihil ad pompam , nihil ad ostentationem proponatur , nihil etiam necessarium ad sanitatem ægro redimendam , omittatur . Exulent igitur . 1. Qui loquacitate sua , dum de ægroti salute , vel saltē de rebus ad eam pertinentibus sermoncinari deberent , turpissime in devia , ac inaniū & importunarum quæstionum labyrinthum incident , vel de non entibus prolixa verboſitatem discurrunt . 2. Qui eloquentiam suam ostendentes , magnificis verbis , superbiſque nominibus de morbo , ejusque causis pronuntiant , hincque vel curam alii prorsus morbo accommodant , vel in remediis omnino jejunī & sterileſ frigescunt ; cum tamen laudabilius sit fideliter curare , quam subtiliter de morbo disputare ; & admirari morbos , non autem curare , sit hominis sua arte & inge- nio abutentis . 3. Qui , ut boni Practici videantur , remediis onerati ut mendicus laciniis & asinus faccis prodeunt , ac morbos eorumque causas ſicco pede tranſeuntes , nescio quibus ſecretis , non tam è tripo- de Apollinis aut Jovis cerebro depromptis , quam propria ſpeculationes inventis , morbum ſanaturos ſeſe , promiſſis potius magnificis aures ſcalpunt magis , quam effectu prætant .

X.

Quoad locum Consultationis , Patavii habetur in publico , ubi coram plurimis auditoribus , consanguinitate junctis aliisque , magna cum gravitate de natura affectus differitur , & plerumque in potissimum consensus , in parvis diſſensuſ , ſed amicitia plenus reperitur . Alibi ſemotis arbitris , aliisque affi- niibus ac ægrorum domesticis peragitur , ut ſic libe- rius

nus proferantur sententiae , factaque à primo Medico , si correctione indigeant , liberè sine omni nota gnorantiae , corrigi possint , in quem aliàs creduli adstantes , si mors subsequeretur , ejus causam referrent . Sive autem in publico sive in privato instituatur loco , nunquam tamen in præsentia ægri , periculoso valde vel incurabili morbo laborantis , ne audita mentione infelicis exitus turbetur animo , qui corpore jam ante languebat infirmo ; vel prius saltem de simulato prognostico conveniendum , ut ejus animus in bonam spem erigatur , veritate rei interim amicis insinuata .

X I.

FActa Consultatione , Medicus ordinarius peritorum consultorum exequatur consilia , eorumque decretis obtemperet , necesse est ; sæpe enim accidit , ut hic consultorum dicta contemnat , laceret , & præscripta eorum , postquam abierunt rejiciat , lividis coloribus depingat , ad sua redeat , in sententia ac erroribus suis obstinate perseveret , ægroque persuadeat , eos multa quidem dixisse , sed scopum non attigisse , se melius ægri naturam noscere , sicque melius sanitati suæ consulere posse . Sed sicuti talis , dum consultores ægro sunt præsentes in eodem loco , summè arrogans ac præsumptuosus , in socios perfidus & æroganti summe perniciosus jure merito habetur : ita si consulentes absint , scriptoque tantum sua communient consilia , Medici adstantis ac domestici potior habenda ratio , tum quia autopsia Medicum docet & confirmat , tum quia , licet è longinquò expertissima præsidia medica præscribantur , sæpius tamen vel eorum mentem non semper recte percipiunt ægroti , vel dubii sunt , an hæc ferre possint , vel nova inexspectata , nec prævisa superveniunt symptomata , vel remedia non statim eam , quam ægroti sibi pollicebantur , præstant operam , ut jam deserere sit animus ;

quibus in casibus necessarium est , ut ordinarius præscriptæ curæ clavum teneat , ac dirigat , & pro ratione loci , temporis , ægri ac morbi , nunc addat , nunc demat .

X I I .

Quisquis igitur vitam summopere zelans , morbo pertinaci ancipiti , periculoso aut ex toto vel ex parte insanabili corriperis , & ad medicam consultationem , velut ad anchoram & asylum confugis , ut vel levamen , vel integrum exinde speres valetudinis restitutionem , ut eadem ritè & dicto modo peragatur , cura ; vel si perniciosa consulentium dissidia & turbas timeas , eos seorsim accerse ; vel ut separatim sententiam , atque rationes suas scriptis mandent , jube , eaque Medico tuo adstanti & ordinario approbanda vel rejicienda , vel ex parte vel ex integro committe . Si enim vir probus sit & honestus , in cuius animo Charites , medicæ virtutes ac peritia conspirant , excitatus præfertim fiducia tua ad majorem curam & sollicitudinem , nihil quidquam in votis optatisque habebit , quam ut boni principis instar , vel amantissimi patris aut tutoris , valetudinem tuam regat , vitamque pro viribus tueatur ; si autem ejus scientiam ac peritiam suspectas habeas , eum prorsus cum merito foistro dimittas , aliique , cui libentius fidas , salutem tuam concredas , consulo .

ARTICULUS VII.

*De Officio Medici, in Methodo
medendi.*

I.

Rogatus olim à nonnemine *Cappivaccius*, magis nominis & immensæ eruditionis, præclarè de universa Medentum republica meritus, ut arcana & secreta sua communicare vellet, scitè respondit: *Disce meam Methodum, & habebis mea secreta.* Hæc enim est arcanorum summum arcanum, hæc est basis ac firmissimum artis medicæ fulcrum, hæc est *lapis lydius*, quo veri rationales Medici à spuriis & adulterinis, empiricis nempe & agyrtis discernuntur, hæc est vera ars, qua per indicationes auxilia inventiuntur ad sanitatem tum conservandam, tum redimendam. *Nemo enim ut Parens Medicinæ Galen. 9.
method. 8.* testatur, artis Medicæ scientiam nancisci potest, nisi & Methodum quandam habuerit per universalia Theorematata, & in particularibus se exercuerit.

II.

Medici Methodici est, curare cito, tuto, & jucundè. Citò quidem, tum ob celerem fugacitatem occasionis, quæ citatis alis properat ac fulguris instar fugit: tum ob corporis humani œconomiam variis mutationum vicissitudinibus obnoxiam, tum ob celerrimos haud raro causæ morbificæ motus, ut medicamenta, quæ antea erant proficia, hinc reddantur inutilia, tum ob vires, quæ modo validæ ad remedium perferendum, postea diminutæ & languidæ, illud ipsum admittere nequeunt. Rectè igitur magnus

Hip-

Hippoc. in epist. ad Crater. meminit : *Ab omni quidem arte aliena res est procrastinatio ; verum maximò in Medicina , in qua vitæ periculum parit : præcipue augeum occasio attendenda in morbis acutis , qui vehementissimis stipati symptomatibus , oxyssimè citato cursu ad statum properant.*

III.

CAveat igitur Medicus , ne agyrtarum , & Pseudomedicorum instar , turpissimi lucri causa morbos prolonget , ac momentum illud occasionis , quod est anima curationis , turpiter negligat : neque etiam imitetur meticulosos illos & superficiarios Medicos , qui famæ suæ nimis sollicitè consulentes , ac mulierculas , imperitum vulgus , subinde etiam magnates , nescio quid ultra artem sibi sapere visos , timide resipientes , nullum magnæ efficacij præfidium administrare audent , quod non ipsis adstantibus vel approbatum vel concessum fuerit , ne ex minus prospero eventu , nocuisse potius , quam profuisse visi , ægri incurvant contemptum ; neque timido illos lepores , quorum timore plures ægrotorum è vita discedunt , vel chronicos incurront affectus , dum vel ab initio , non satis validè mox revellunt materiam aliquam in partem affluentem , vel purgationem , saburra caco-chymica in primis viis harente , differunt , usque dum præternaturale præpullulet fermentum , totam insufficiens massam sanguineam , ac reliquas viscerum digestiones corrumpens ; vel dum ebullitiones febriles , prætermisis venæsectionibus non restinguunt , vel in morbis gravibus quibuscumque , ad generosum aliquod auxilium descendere reformati , non perpendentes illud Massariæ : vix ullos magnos curari morbos , quia raro se expeditunt Medici à lenientibus ; vel illud Cel- si : satius est , experiri anceps remedium , quam nul-lum .

I V.

NON tantum *citò* curabit Medicus , cum elapsa occasione causæ morbificæ repente sumant aliam ideam , motum , ac morem , humores noxiæ dominantur , morbus invalescat , symptomata sœviant , vires collabascant , naturaque oppressa succumbat ; sed etiam celeritati jungenda est *securitas* veluti media , & inter duas reliquas conditiones præstantissima . Li-
cet enim , in morbis chronicis falices inducias con-
centibus , festinatio nimia sœpiùs periculum minetur , Medicus tamen eò semper intenta mentis acie colli-
mare debet , ut *tutò* saltem medeatur .

V.

TUTÒ curabit Medicus , si utatur remediis velut amicis , paucis nempe sed expertis , ac longissima annorum serie approbatis , & quasi canonizatis . Certa enim dubiis & incertis præferenda , hinc dum Cels. l. 3. c. 9. temerariis subinde remediis utendum esse innuit , asserendo : *quos ratio non juvat , temeritas subinde sanat* ; intelligendum hoc de morbis planè conclamatibus & desperatis , in quibus melius est anceps remedium experiri quam nullum . *Tutò* curabit , qui noverit remedia vulgaria præ foribus nascentia , viribus integris , facilique pretio ubivis habenda , sœpiùs præstare exotericis & peregrinis , incertam subinde pro-sapiam mentientibus , suspectis , mangonizatis , nec raro situ , teredine , sentinaque corruptis .

VI.

TUTÒ curabit , qui noverit , æquè feliciter & faci-
liter curari morbos remediis simplicissimis , eu-
poristis ac vulgaribus , selectis tamen , ac circumspe-
ctè ,

*E*cce, & cum iudicio adhibitis, quam per abstrusissima nonnullorum secreta. Hinc, teste *Helmont.* pauca sunt, quæ Medicum nobilitant; ac aureum illud *Arnoldi de Villa nova* dictum probe observandum: *Dolus est, uti compositis, ubi simplicia sufficiunt;* sicuti enim simplex victus saluberrimus ac naturæ convenientissimus, ita pariter & pharmaca, cùm in utriusque natura paucis contenta sit. Pro re nata igitur Medicus, nec solis euporistis & simplicibus, nec semper compositis uti sciet.

V I I.

Tuò curabit, qui didicit abstinere remediis chymicis propria manum haud paratis, aut quorum experientiam nondum habet, præsertim si Galenica sufficiunt. Item qui purgantibus violentis, præcipue Mercurialibus & antimonialibus haud usus fuerit, præsertim in jam senescentibus, lactantibus, cachecticis, & debilibus; aut venæsectione nimis prodiga in ætate jam ingravescente, in non assuetis, in modo inveterato, viriumque defectu; vel Opiatis in asthmate, hydrope, infantibus, extremaque spirituum inopia exhaustis; vel Dulcibus, in affectibus tartareo-acidis.

V I I I.

Tuò curabit; qui omnes causæ morbificæ reliquias è corpore ad pulvisculum usque expellit, ne iis relictis, massa cruxis subinde ebulliat, fermentescat, sicque recidivam radice sua pejorem patiatur æger; qui insuper maximè studuerit eradicandæ causæ morbificæ, exsiccandoque fonti, unde tot symptomatum scaturigines propullulant, ita tamen, ut subinde à regia via divertere, & symptomatibus præsertim urgentioribus occurrere possit, vel causæ simul & symptomatibus prospicere. Item qui morbis debilibus de-

debilia, valentibus valentia adhibet remedia. Sicuti enim, quæ longo tempore sunt contracta, lentè curare oportet, ita quæ brevi breviter, ut creationis morbi & curationis, paria quodammodo sint temporum momenta.

IX.

Tuò curabit, qui auream illam venerandi *Coi* observaverit regulam: *Si non potes prodesse, saltem ne noceas.* Sæpius enim, dum chronicas ac profunda radice inveteratas ægritudines curare præsumimus, hydram ier næam offendimus, ac non solum non iuvamus, sed magis lædimus: hinc noverit, optimum saepè medicamentum esse, non uti medicamento. *Quieta* namque & *abstinentia*, præcipiente *Celso*, *gravissimi curantur morbi*: immò neglecti subinde morbi, teste *Actio*, fiant leviores: frustranea enim sunt medicamenta, exhausta natura, vel obtento jam fine, vel ubi ipsa natura sufficit. *Tuò* etiam curabit, qui topica, nisi aliquid adsit, quod curationem pervertere possit, ante universalium remediorum usum non applicaverit: qui medicamenta temerè non mutaverit, cum crebrior corum mutatio, vel ignorantiam vel diffidentiam innuat; qui tandem vel diæta subinde sola, vel saltem nunquam sine illa medebitur, nam sine clavis & remis navigat, qui nulla victus ratione observata, Medicinam facere conatur. Hinc verum illud magni *Sennerti* effatum: *Medicamenta vel efficacissima incassum propinantr ubi jussum & conveniens diæta regimen fuerit neglectum.*

X.

Jucundè tandem, quæ ultima medendi conditio, debitur Medicus, si remediis utatur suavibus, & quoad fieri potest colore, odore & sapore gratis; lu-

ben-

bentius enim tinctura vel essentia dulcis & odorata ,
vel paucæ & insipidæ pillulæ , vel exiguus assumitur
pulvisculus , quam longum & ingratum apozema , aut
potiones amaræ vel prodigiosæ , & theriacales com-
positiones , & nauseabunda variorum simplicium com-
miftio , quæ insuper certa ignorantiae filia , periculo-
sa etiam & sumptuosa .

X I.

Jucundæ curabit , qui sine dolore vel absque insigni
molestia ægrotum tractaverit , vitando omnia ,
quæcunque vel animum vel sensus ejus offendere pos-
sunt : concedendo econtra , quæ visui jucunda oculos
delectant : quæ tactui grata & attingenti mollia , quæ
in cibo & potu palato suavia , in iis præfertim , quæ
parùm nocere valent , aut quorum levis illata noxa ,
facilè reparari potest , curando etiam ut omnia sint
munda , mundisque vasculis excipientur . Nullus adsit
ministrorum , nisi quem æger libenter viderit : nemo
adstantium vel amicorum cubiculum introeat , nisi
cujus adventus & præsentia ægro fuerit gratissima .
Jucunditatem augebit per omnia Medicus , si lenitatis ,
dilectionis & beneficentiaz affectibus excitatus , erga
ægrum fuerit humanus , affabilis , suavis & gravis .

X II.

DUm autem ægrorum genio gratificari conatur
Medicus , caveat , ne nimia promptitudine in
præstandis ægro obsequiis excedat ; quemadmodum
enim facilitas mediocris jucunda est , & nihil detra-
hit de autoritate Medici , ita , si nimia , non tam
sæpè cedit in Medici contemptum quām ægrī perni-
ciem , si præfertim concedantur , quæ curationis cur-
sum retardare , vel morbi periculum augere possunt
ut medicastris adulatoribus haud infrequens , dum vel
in

in gratiam ægrorum , causa morbifica multùm adhuc
incorpore luxuriante , dolores Narcoticis sedant , sic-
que ut cum Rhæse loquar , rem magni terroris com-
ponunt ; vel appetitui ægrorum unice lenocinantes ,
nunc frigidam , nunc vinum , nunc cibos solidiores ,
ubi non deberent , porrigunt : nunc servorum ritu qui-
buscunque jussis parent , cùm tamen Medici , ex Æ-
sculapii progenie exorti , ægris dominari , iisque præ-
esse debeant , sicuti duces exercituum militibus , ac Re-
ges subditis . Certè , quàm multi blanda aurium gar-
garizatione , per deceptorios hos susurriones instituta ,
ad superlunares allegati fuerunt , qui sub rigidis ve-
rorum Medicorum præceptis , convaluerint .

XIII.

Jucundè tandem curabit Medicus , qui minoribus ,
quoad fieri potest medebitur expensis , haud imi-
tando illos , qui ægros in maximas inutiles ac super-
vacaneas expensas præcipitant , præscribendo ad often-
tationem potiùs , vel incitiam suam multitudine &
pretio medicamentorum tegendo , vel Pharmacopolas ,
cum quibus subinde pacta quædam circumventiosa in-
stituunt , ditando , præscribentes remedia tam cara
quàm rara , quæ ægrum è morbo convalescentem , in
novas pro tot debitis persolvendis angustias & ægri-
tudines deturbant , ut deinceps mori potiùs cupiat abs-
que medicamentorum ope , quam cum tanta pharmaco-
rum supellectile , ac hæredum suorum dispendio ,
perire .

XIV.

Felix igitur ille Medicus , qui *tutò* , *citò* ac *jucundè*
medebitur . Licet autem reperiantur quidam ca-
sus , in quibus hæc tria requisita in curatione conjungi
nequeunt , non enim in morbis chronicis semper citò ,
nec

nec in illis, qui vomitum desiderant, aliisque semper
jucundè mederi valemus, unde spectandum ad id, quod
magis urget, anteponendaque securitas celeritati &
jucunditati, maximè ubi mortis impendet periculum:
satius tamen est, morbum cum minori jucunditate
cito curare, quam ægrorum palato & voluntati ab-
blandiendo, affectum prolongare & exasperare.

A R T I C U L U S VIII.

*De Officio Medici, in petendo & reci-
piendo Sostro.*

I..

M Edicis ac Præceptoribus non rei, quam commi-
nicant, sed operæ quam locant, pretium solvi,
elegantissimo loco exprimit Senec. l. 6. de benefic. c. 34
emis, inquit, à Medico rem inæstimabilem, vitam &
valetudinem bonam: à bonarum artium præceptore stu-
dia liberalia & animi cultum, itaque, his non rei pre-
mium, sed operæ solvitur: quod deserviunt, quod a re-
bus suis avocati nobis vacant, mercedem non meriti,
sed occupationis suæ ferunt. Meritò igitur Medico con-
venit Honorarium, tam pro visitationibus, quam iti-
neribus, formularum præscriptionibus, tædio, labore,
lectione ac meditatione &c. cum illud honora Medi-
cum, non de verbali tantùm, ut ita dicam, sed reali-
etiam honore intelligendum sit; si enim Juris Consul-
tus non tenetur gratis consilium ferre, nisi pauperi-
bus, si Advocatus pro labore honorarium postulare
potest, multò minus Medicus gratis haud mederi tene-
tur, utpote saluti hominum unicè intentus.

II.

Licet verò Medico competit honorarium pro suo labore & diligentia, et si etiam moriatur æger, dummodo juxta artis præcepta medicinam fecerit, ut nihil ipsi imputari possit, quod vel maximè observavit *Socrates*, cuius morientis ultima vox erat: *O Crito Crito!* *Æsculapius gallum debemus, quem reddite, nec negligatis;* tamen de mercede cum ægro pacisci, præfertim in morbis dolorificis & acutis, videtur esse res, nobilissima arte medica indignissima, ac mos potius Empiricorum & agyrtarum, qui, dum dolor est & occasio vigeat, quidquid possunt, arripiunt, quod tamen, sicuti impium, ita arti potissimum ignominiosum, Pacta hujusmodi honestis viris avaritiam & sorbitiem: Jurisconsultis extorsionem sapiunt; quid enim non largiretur in periculo constitutus? *pellem pro pelle,* ut legitur in lib. Job. *Ego omnia, quæ possidet homo, dabit pro anima sua.* Sicuti igitur de mercedē cum ægro pacisci indignum, de illa deliberare durante morbo indecorum & avarum, ita impium, urgente eodem magno & acuto.

III.

Caveat ingenuus Medicus, ne tacito quodam postulandi genere, apud ægrotum hanc aut illam vestem, clinodia, equum, libros, aliamve supellectilē domesticam nimium commendet, neve ab eodem, si mercator fuerit, quidquam emere tentet, ne aliquam inferat cogitationem hominibus alioquin suspiciose, & delucro semper cogitantibus, velle, ut sibi offeratur, id quod emit, aut collaudat, artificio quodam id extorquere, quod ipsum oblaturum non confidit, multo minus quidquam ex domo Patientis assumere, detestandæ avaritiae indicio, quam summopere improbat divinus

D *senex,*

senex , dum lib. de dec. ornat. sapientem Medicum
argenti contemptorem debere esse dicit . Idem innuit
Seneca , ac laudatissimo exemplo re ipsa testatus est
Hippoc. Abderites , qui nunquam se pro usu medicina
accepisse mercedem scribit ; quia Medicina libera est
& Deorum munus ; quam laudis partem Patri quo-
que suo Medico attribuit hoc disticho Ausonius :

Obtuli opem cunctis pescantibus artis inemptæ ;

Officiumque meum cum pietate fuit.

I V.

Sicuti laudabilis mos est nonnullorum locorum , quo
certum pretium certis Medicorum laboribus de-
terminatur : ita si nihil certi statutum sit , æquum
exigere potest sostrum Medicus , cavendo , ne vel
nimio rigore incurrat suspicionem avaritiæ , vel abje-
cto nimis pretio suspicionem negligentia , quasi non
adhibuisset ea omnia , quæ è re ipsius ægri fuissent
cum contemptu etiam nobilissimæ artis ; potissimum
autem illuc respiciet , quid conditio ægrorum ferat ,
quid mores postulent , & quid morbi essentia con-
veniat . Sunt enim alii morbi periculosiores maligni-
tate sua , alii diuturnitate tædiosi : alii curatu magi-
jucundi &c.

V.

Cui Medico honor curæ est , cautum se gerat in
hoc negotio , neque facile Sostrum ab ægro exi-
git , quia grati sponte dant , ingrati verò ne coacti
quidem ; est enim longè satius , ut asserit Hippoc.
morbo servatis ingratitudinem exprobrare , quam ma-
lè habentes emungere , aut miseros sine ope relin-
quere . Nullus enim Medicorum est , qui non experia-
tur multos etiam gratos : subinde autem horridam ille-
lam , terribilemque faciem , si præmia laboris poscat

vel ægros, qui vano verborum falloculo, & turgidis
promissionum, gratiæque ampullis Medicum dimit-
tunt: hinc verborum obſiti, elegantissimum *Bal-*
thaf. Zabnii tractatum de mendaciis, capite vel pa-
ragrapho adaugent, quasi Jure quodam divino vel na-
turali obſtrictus teneretur Medicus, ut largos illos non
in unum sed complures studiorum annos, in libros
cariores, in peregrinationes quoque impensos sumptus,
in gratiſi tantum aspectus ſpem, aut vanæ promi-
ſionis exſpectationem, ſummo privatæ rei cum damno
impenderit, & tandem id lucri habeat, ut miſerri-
mum fervorum fervum fe exhibeat.

V I.

Non decet Medicum esse mercenarium, sed nobis
item & ingenuum, ut ejus liberalitatem & prom-
ptitudinem studiorum officiorumque, ægri magis ex-
periantur, quam de collatis in illum beneficiis aut lar-
ga beneficentia eidem exhibita, gloriari possint. Su-
blimior, & supranaturalis medentis debet esse inten-
tio, ac ſpes æternæ Mercedis, ex obſequio exinde
Deo præſtito. Stolidus enim jure meritò haberetur il-
le Medicus, qui in morbis præcipue malignis, ſub vi-
li forſan uno vel altero imperiali, tota die venalem
circumferret animam: qui dum per annum, ſæpè etiam
complures, plurima præſtitit officia, vel nihil, aut
vix & ne vix quidem imperialium aliquot munuscu-
lum, ex rejectæ non raro monetae quisquiliis accipit;
qui pro exiguo ſubinde ſalary, tot aeris excretorum-
que corruptelas, tot itinerum pericula, tot æftus, tot
algores, nimbos, nives, inundationes, tot ægrorum
visitations in varias partes distributorum, aut longa
ocorum intercapedine diſſitorum, tot prandiorum in-
terruptiones, tot juges vigilias, ſomni interruptiones,
el maturas ad gallicinium expergefactions, tot fol-

licitudines & curas sustineret, nisi perenne quoddam officio suo ritè functis, superesset præmium.

V I I.

IN accipiendo Sostro Medicus eam moderationem observare potest quam *Severus & Antoninus Imperatores* prudentibus & advocatis ex publico, ut moris olim erat, salariatis, in acceptandis xeniis & donativis à clientibus præscripserunt: *neque omnia, neque semper, neque ab omnibus*. Nam valdè inhumanum est à nemine accipere, passim vilissimum, omnia avarissimum. Præcipue autem pauperibus gratis succurrere studeat, non enim lucri, sed sanitatis & charitatis causa medendum: immo lucrum tunc maximum esse credendum est, si lucrum negligatur in tempore; quod enim ad superos transit, nos ne sentientes quidem divites reddit & locupletes, hinc placet, quod summo cum laudis & honoris titulo de *Hieronymo Fabricio ab Aquapendente* refert *Polybius Rhod.* in elogiis virorum Illustrium, laudatum Medicum constantissimè omne oblatum munus recusasse seque eodem planè animo erga pauperes quo erga divites se exhibuisse: id verò eo ipso effecisse eum, ut tot muneribus aureis aliisque pretiosis & rarioribus ornatus fuisset, ut amplum satis cubiculum iis exornaret, quibus inibi omnibus bene dispositis, han- toribus addidit inscriptionem: *Lucris neglecti lucrum*

C A P U T II.

De Officio Medici in specie , & primò quidem , in Affectibus requirentibus Venæsectionem.

ARTICULUS I.

*Quibus in morbis Medici officium sit ;
secare Venam?*

I.

Venæsectio, cùm sanguinis plenitudinem ad mediocritatem reducat, corpus gravi onere liberet, illudque calorem nativum liberius ventilando, arctioresque vias & meatus referando, alacrius & expeditius reddat : ejus etiam orgasmum & effervescentiam fistat : humores ipsi permixtos per effervescentiam, conflagrationem & adustionem corruptos, vel omnino in putredinem degenerantes evacuet, ulterioremq[ue] putredinem arceat, sanguinem ventilando, circulationemque libriorem reddendo : præterea sanguinem è vasis p. n. elabentem, vel ferociori impetu in partem aliquam irruentem, vel potius in parte quadam stagnantem, revellat, derivet, eum promptius ad partem ab affecta distantiore moveat, stagnationis incrementum inhibeat, sanguinemque pristino motui & circulationi restituat ; clarè elucescit, eam indicari in morbis excitatis à vitio sanguinis vel *in quanto*, vel *in quali*, vel *in motu*.

His præsuppositis officium Medici erit, eam, a primarium maximè necessarium & utilissimum remedium administrare, in omnibus inflammationibus, tam internis, ut phrenitide, angina, ophithmia, pleuritide, peripneumonia, hepatitide, inflammationibus ventriculi, intestinorum, mesenter. lien. vesic. uteri &c. quam etiam externis: neque sanguitum mittendus ratione præsentis, sed etiam ratione futuræ inflammationis præcavendæ, ut in fratre, luxatione, contusione magna, vulneribus majoribus, iecu, casu, doloribus cujuscunque partis vehementioribus, in quibus Galen. se nullum majus inventum remedium fatetur, quam Venæsectionem usque ad amni deliquum administratam, nisi viribus jam collapsis & debilitatis.

I I I.

Venæsectionem quoque administrari curabit in
bribus continuis, ubi nimius urget, vel men-
tur æstus, aut nimia turgescencia, vel impetus sa-
guinis ad caput, pulmones vel alia membra, præ-
tibus præsertim coindicantibus; cum depletis hac-
tione vasis, laxataque quasi sanguinis massa, via sue
natur diaphoreticis, purgantibus, aliisque præcipita-
tibus in statu morbi exhibendis. In Intermittentibus
præsertim sub hoc climate, non adeo necessarium
dicabit, nisi adsit plethora, vel urinæ rubræ, cra-
fæ, ingens cephalalgia, vel metuatur futura febris con-
tinua, vel inflammatio alicujus visceris.

IV.

IN febribus malignis quām cautissimē procedet Medicus, observando præcipue statum sanguinis febricitantis, an ad dissolutionem, orgasmum & ni-
miam ebullitionem inclinet, an verò ad coagulum, lentorem ac majorem malignitatem: in posteriori ca-
su parcè adhibenda, vel eadem omnino superceden-
dum, præsertim etiam, si ab experientia pluribus no-
nisi quām profuisse constiterit: in priori verò, ubi
malignitas mitior cum febre ardente vehementiori
uncta, in subiecto præsertim juvenili vel plethorico,
& si visceris inflammatio adesse vel imminere videa-
tur, confidentius & largius administrabit.

V.

Apparentibus petechiis, bubonibus vel parotidibus, intermitte Medicus Venæsectionem, si ex hisce evacuationibus natura potentior reddita sit, ac viætri-
cis naturæ signa deprehendantur, ut pulsus æqualitas,
vehementia, dilatatio plenior, febris ac symptomati-
vum remissio, cum veris coctionis signis: cautè tam-
en & parcìus administrabit, si erumpant symptomati-
cæ, ex ingenti sanguinis ebullitione, & humorum
malignorum ac putrescentium fervore, admotis paulò
post V. S. cucurbitulis, cum levata sic subinde natu-
ra, post talem V. S. copiosos sudores, eosque criticos
erumpere observemus. Idem ferè observabit Medicus
in variolis, abstinenti à V. S. eisdem erumpentibus,
si eruptio fiat per ebullitionem depurativam, & ex
eorum eruptione febris & symptomata remittant: ad-
ministrando econtra, si fit eruptio per ebullitionem
corruptivam cum febre intensiori, anxietate, difficul-
tate spirandi, urina rubra, crassa, aliisque gravioribus
symptomatibus, ac minor etiam adsit malignitas. An-

te eorum eruptionem Medicus eam administrabit, sanguis nimium ferreat, ebulliat, copia turgescat cum impetu caput petat, immineant inflammatione viscerum, adsint deliria &c. Nam hæmorrhagia narium in principio copiosa, morbum imminuit, natura oneris parte levata, reliquum facilius expellit, & vincit.

VI.

Medicus V. S. quoque instituet in omni fluxu & evacuatione sanguinis copiosiori, ut *hæmorrhagia narium*, *vulnerum*, *hæmoptysi*, *vomitu sanguinis*, *mictu cruento*, *dysenteria nimium cruenta*, *immoderato fluxu mensum*, *hæmorrhoidum* &c. viribus nondum extremitate debilitatis, maximè etiam si orientur ex copia & orgasmo sanguinis. Idem faciet, in affectibus consueta sanguinis suppressione exortis, ut in *suppressione mensum*, *hæmorrhoidum* &c. nisi affectus jam sint omnia inveterata.

VII.

SAnguinem præterea mittet in catarrhis ac deflationibus calidioribus, sero cum cruoris massa ebulliente & turgescente, affectibus rheumaticis, arthritide universali, mania, melancholia, apoplexia sanguinea, id est, à stagnatione sanguinis circa capitis vasa producta, cum faciei rubore & venarum turgescientia, quæ nullo alio remedio citius curatur, quam per V. S. in ipso curationis vestibulo statim institutam. Item in palpitatione cordis, in qua Galen. 5. de loc. affect. c. 2. fatetur, se nunquam inutiliter in hoc affectu venam secasse In dyspnœa, quæ fit sine stertore, & uno verbo in omnibus aliis affectibus, qui vel à sanguinis copia, vel ejusdem vitiosa qualitate, vel præpostero ejus motu oriuntur: sicuti econtrario nullo horum urgenti-

urgente, omittitur, ut in phthisi, hætico, paralyse,
ascite, tympanitide &c.

VIII.

Ultimè tandem pro cura prophylactica Venæsec-
tionem suadet Medicus, semel vel bis in an-
no administrandam, qui sanguine abundant, & qui-
bus nec integrum, nec commodum est, exactam
servare diætam & clinicam agere vitam, cùm nulla
alia suppetat ratio valetudinem suam tuendi, & vi-
tam in longam senectutem producendi, quām vel per
exactissimam diætæ rationem, vel per purgationem,
& V. S. Semel vel bis in anno, vere nempe & au-
tumno institutam. Qui enim sobriè haud vivunt, sin-
gulis diebus aliquid crudi humoris addunt, qui sensim
& sensim adauctus ac putrescens, lethales excitat af-
fectus, ut adeò plures fere hac de causa pereant.

ARTICULUS II.

*De Officio Medici, in observandis Coindicanti-
bus, & Contraindicantibus
Venæsectionem.*

I.

IN Venæsectione præcipuè observabit Medicus pér-
mittentia vel prohibentia, cum thesaurus vitæ in
sanguine sit reconditus, ac *Helmontia* teste, vires vi-
tales & sanguis sint correlativa; hinc oculus dexter
præcipuè ad vires, sinister ad morbum dirigendus. In-
telliguntur autem per vires præcipuè vitales, quæ sunt
debiles, vel per *resolutionem*, seu ab immodica eva-
cuacione, seu à morbi diuturnitate vel doloris atrocio-
tate

tate vel labore, inedia, vigiliis &c. & cognoscitur per pulsum continuum, parvum, languidum ac valde frequentem; vel per suffocationem seu *oppressionem*, ab humorum copia, & cognoscitur ex pulsu vario, confuso & inaequali, & quod nulla causa externa resolvens praecesserit. Sicuti igitur viribus non resolutis, sed suffocatis & oppressis convenit V. S. & quidem larga: ita viribus nonnihil imbecillibus, medicris: resolutis vero & planè prostratis nulla, cum non deceat exhaustos spiritus vitales magis exhaurire.

I I.

CUm vires insignem à rebus secundum naturam, præter naturam, & non naturalibus mutationem patiantur, de iis etiam considerationem instituet Medicus, & primò quidem *de ætate*. Ex ætatum numero sanguinis missionem coindicat *ætas florens*, inter pueritiam & extremam senectutem media. Pueri Galen. Venæctionem prohibet, eamque ante 14. annum non vult administrari; Medicus tamen in septennibus, octennibus, decennibus &c. detentis morbis acutis à sanguinis copia, ejusque effervescentia exortis, tutam & necessariam judicabit, præsertim si validiores, venis amplis ac copia sanguinis prædicti. In admodum natu parvis tutius est abstinere his in locis, quia vires in tam tenella ætate debiles, fermenta viscerum in primo flore, unde facile exhauiuntur, habitus corporis tener ac facile resolubilis & perspirabilis, ac aliud est in Gallia, aliud in Italia, aliud in Germania Medicinam facere.

I II.

IN Senibus idem Galen. post annum 60. Venæctionem prohibet, quia senes frigidi, siccii, debiles, & ob sanguinis ac spirituum penuria, ejus novam

xam vehementer sentiunt. Interim tamen eam admettet Medicus, morbo acuto id exigente, ac validioribus viribus existentibus, quæ non semper dependent ex numero annorum, sed ex musculo, & bene habito corpore, cum pulsu magno & venis amplis; cavendo tamen ne decipiatur Medicus, inflatis in senibus venis, cum sœpè à flatibus oriri possit talis venarum distensio. Sicuti autem permittitur V. S. morbis acutis eam exigentibus, ita eadem in senibus limitatur, ut parcior fiat ejusdem evacuatio.

IV.

MULIER, molliore habitu & frigidiori temperie prædita, V. S. minus tolerat, quam Vir. In Gravidis fœtus in utero etiam non impedit V. S. urgentibus præsertim morbis acutis, vel aliis abortum minitantibus, eam tamen moderatur, ratione quantitatis. *Hippoc. enim 5. aph. 31. Mulier utero gerens, vena sedæ abortit.* (intellige venæsectionem largiorrem, & antiquis ad libras consuetam, ut fœtui alimentum subtrahatur) Sicuti autem urgentibus morbis acutis Venæsectio in gravidis permittitur, & teste experientia, innoxie administratur, præcipue à primo mense usque ad quintum: cautiùs verò mediis & postremis, & quidem in partibus superioribus, ut media na vel salvatella; ita eam pro præcavendo abortu, circa medium gestationis tempus, vel ultimis temporibus pro facilitando partu, non temerè & ex consuetudine tantum, sed consideratis probè indicantibus & prohibentibus, administrandam curet Medicus; nempe in plethoricis tantum, & copiosos alias menses habentibus, ubi abortus periculum imminet à copia sanguinis, fœtum obruente & suffocante, quo in casu præsentissimum est remedium V. S. sœpiùs etiam quandoque repetita, hinc etiam accidentia gravidis supervenientia, ut inappetentia, vomitus &c. cum ex san-

Sanguine retento, impuro & cacochymo (meliore fœtui in alimoniam cedente) orientur, à Venæfectione sublevantur : immò in totum auferuntur, si usque ad solutionem symptomatum singulis mensibus iteretur, cùm econtra à purgatione magis exacerbentur.

V.

QUoad temperamentum, V. S. magis coindicat *sanguineum*, minus *biliosum*; omnium minimè *malancholicum* & *pituitosum*; quod ad *habitum corporis*, cum magis coindicat *carnosus*, venisque latis præditus: sicuti econtra difficulter V. S. sustinet *præpunguis* & *obesus*, uti & *habitus omnino rarae & gracilis naturæ*, cum venarum exilitate, *Gracilitas enim corporis*, cum venarum latitudine magis permettere solet V. S. Quoad *anni tempus*, eam magis coindicat *vernus*: hinc *autumnale*, minus *hyemale*, ac omnium minimè *æstivum* ac caniculare. Quoad *regiones*, largiore V. S. tolerat *temperata*, hinc *calida* & *sicca*, minimè autem *frigidior*, unde in Germania cautiùs, quàm in Italia, Gallia, Hispania &c. vena secunda, qua copiosiori, homines etiam apparenter robustos, in animi deliquium, cachexiam, hydropem, vel alios morbos incidere, observamus.

V I.

QUoad *consuetudinem* alacriùs & leviùs Venæfectionem perferunt *assueti*, quàm non *assueti* & *hæmophobi*. Licet autem non tanta sit vis consuetudinis, ut semel *detractus sanguis*, necessariò dein singulis annis subtrahi debeat: præsertim si altero anno non adsit idem indicans, ac causa venæfectionis sublata sit; tamen ejusdem multa habenda ratio, cùm experientia constet, V. S. assuetos statis vicibus in vena pun-

pungi solita , titillationem sentire , natura quasi ad solitas evacuationes monente . Quoad *victum* , magis evacuandi utentes eodem *pleniori* & *liberaliori* : parcus *frugaliter* victitantes . Quoad *animi pattemata* , Venæctionem impediunt *ira* , *tristitia* , *tumor* , quo etiam reducuntur *vigiliae* ac nimius *vene-*
orum usus : sicuti econtra eam indicat *terror* subita-
neus , pro suffocatione cordi ex *cruoris stagnatione im-*
pedienda .

VII.

Evacuationes , tempore V. S. coincidentes , si sint *sanguinis* , & accedant pro quantitate causæ , ut sint veluti criticæ perfectæ , nihil innovandum , teste Hippoc. I. aph. 20. si *diminutæ* , adjuvandæ , & V. S. administranda , evacuando tantum , quantum conjun-
ctis evacuationibus causa morbifica requirit . Si nimiæ , prius sistendæ , in quem finem etiam locum habere posset V. S. revulsoria . Si sint evacuationes *aliorum* humorum , sed per *alvum* , vel *vomitum* vel *habitum corporis* , vel *abscessum* &c. eodem ferè modo proce-
dendum , & criticæ perfectæ , naturæ relinquendæ : diminutæ , per loca conferentia adjuvandæ : hinc pro exigente necessitate Vena secunda .

A R T I C U L U S III.

*De Officio Medici, in considerando Loco,
& Quantitate Venæsectionis.*

I.

Locus Venæsectionis administrandæ specificatur, tum ab affectu, exigente vel revulsionem, vel derivationem, vel evacuationem, tum à situ partis affectæ hujus vel illius, Vena apertioñem requirentis, *Revulſio*, quæ est sanguinis in quadam parte stagnantis, in contraria vel opposita evacuatio, si sit *universalis*, contrarietatem observat respectu totius corporis, & in eo contrarios terminos respicit, vel à capite ad pedes, vel à dextris ad sinistram & vicissim: ita tamen, ut non simpliciter pars distantissima requiratur, sed attendenda origo flutionis, tum vasorum communio cum parte affecta. Si *particularis* & *localis*, in uno membro contrarios terminos respicit, & quidem vel à parte posteriore ad anteriem, vel ab interna ad externam & vicissim, licet hæc potius ad derivationem referenda, nec facile in principio, corpore pleno instituenda. Sicuti autem revulſio sanguinem stagnantem in contraria distantiori evacuat, dum reliquus sanguis promptius ad venam apertam fluit, & imminuta ejus quantitate, sanguis stagnans à vicinis vasis depletis reforbetur, ac motui circulari restituitur: ita derivatio in proximiori, & evacuatio ex ipsa parte affecta evacuat.

II.

Circa Venarum electionem, stante circulari sanguinis motu, non amplius superstiosus sit Medicus. Nulla enim hic ordinis prærogativa specialis, neque ulla Vena datur, cuius sectio specialiter medeatur determinatae alicui parti vel morbo. Communiter in praxi, pro evacuatione in febribus secatur *mediana*, ut potè tutissima, cui arteria non subjacet; vel *Basilica* cui tamen arteria subjacet. *Cephalica brachii* ramus ceteris exilior est, minusque in praxi observabilis; interim una vel altera non apparente, altera magis conspicua aperienda, cum omnes hæ Vena æquales sint rivuli, ex eodem flumine sanguinem haurientes: eadem *Mediana* vel *Basilica* *evacuationis* causa secatur, in affectibus omnium illarum partium, quæ sunt sitæ inter claviculas & renes, ut *Cordis*, *pulmonum*, *epatis*, *lienis*, *ventriculis*, *renum* &c. ut etiam *revulsionis* gratia in omnibus affectibus partium inferiorum, ac etiam superiorum supra claviculas, ut *Colli*, *faciei*, *capitis* &c.

III.

An *dextra* vel *sinistra* secanda, desumitur ex habita ratione vel *revulsionis*, vel *derivationis* vel *evacuationis*: sic v. g. in pleuritide dexterí lateris, ut vera fiat *revulsio*, si Medicus in principio vocetur, & adsit insignis *plethora*, in sinistro latere, ut potè parte opposita Vena secunda. Secus & ordinariè per *derivationem* potius ex *brachio* partis affectæ, unde statim insigne doloris emergit levamen. *Evacuationis* causa *dextra* magis aperiri solet, nisi in affectibus *lienis*, ubi *sinistra* præfertur, ut fervetur *rectitudo* & *vasorum communio*. In *Venæctione* præservativa, verno tempore dextri: autumno finistri

stri brachii vena tundi solet, non autem necessario debet.

I V.

Vena cephalica manus, & Salvatella, incidi solent, si vel in brachio nulla Vena sit conspicua, quæ tundi possit, vel virium adsit minus robur, cum tardius, & minori cum debilitate evacuent, aut majus immineat periculum ex V. S. largiori, ut in graviditate. Apertio Salvatellæ in febre quartana pluribus experimentis laudata, solido caret fundamento, & nulla ratione fulciri potest. Vena frontis, derivationis gratia secari solet in affectibus capitis, ut phrenitide, mania, dolore capitidis, ophthalmia &c. Venæ sublingualis seu raninæ, ejusdem causæ gratia aperiuntur, præferunt si turgidæ sunt, in dolore capitidis, prunella seu inflammatione & ardore linguae, in qua mature aperiendæ; item in angina, in qua etiam, ubi febris haud adeò magna, nec corpus plethoricum, vel solæ aperitæ, præcavent faucium angustiam, dum anginæ sentitur principium.

V.

Vena sub genu utriusque cruris, secari solet in pedibus ulceratis. Saphena, in suppressione mensium, & exinde oriundis affectibus, licet in plethoricas & suppressione antiquiori, plures priùs ex brachio, hinc ex pede mittant Medici. Ischiatica, in coxendum dolore. Cephalica pedis ad pollicem, vel quæ est ad minimum pedis digitum, in affectibus capitidis pro revulsione, in febribus quoque continuis, si adsit æltus & dolor lumborum, cum urinis rubris crassis, vel materia caput petat cum cephalalgia, vigiliis, imminentibus deliriis, quo in casu post unam vel alteram Phlebotomiam in brachio administratam, hæc Vena

edis secunda. Convenit etiam derivationis gratia, in effectibus renum ac partium infra eos existentium, ut vesicæ, uteri &c. Interim quod de Venis brachii, hoc etiam de Venis pedis dicendum, parùm nempe interesset, vi sanguinis circulationis, quæcunque tandem tangatur, cum omnes sint ramuli unius trunci, licet Medicus subinde accommodare se debeat vulgari praxi.

VI.

Quantitas emittendi sanguinis desumitur ex morbi magnitudine ac virium labore, tantumque evanescendum, quantum morbus exigit, & vires tollerant. Ratione *magnitudinis morbi*, Galen. in febribus ardentissimis, maximis phlegmonibus, & doloribus vehementissimis, sanguinem ad animi deliquium mittendum esse suadet, modo vires sint validæ, quod tamen hoc tempore obsoletum, ejusque loco repetita commendatur V. S. præsertim in paucitate sanguinis, debilitate corporis, & ubi magis revellendum; abstinendum etiam a V. S. *Neroniana* dicta, seu apertione duarum vel trium venarum simul & semel, eodem tempore.

VII.

In *Inflammationibus*, Hippoc. sanguinem ad coloris mutationem usque mittendum esse jubet, si in prima vel secunda V. S. appareat crudus, pituitosus & aquosus, eadem continuanda usque dum appareat rubicundus, & vicissim; cuius præcepti observatio, licet in præcepto optimè succedat, pertinaciter tamen coloris mutatio expectanda non est, cum vires prius deficiere possent. Nonnulli sanguinis emittendi quantitatem, ex labescente fluxionis impetu ac pulsus mutatione colligunt, quæ tamen non semper exspectanda, num in robustioribus non nisi plurima sanguinis jactura facta, succedant.

VIII.

TUto procedet Medicus, in quantitate sanguinem
emittendi detrahendi, si largiorem adhibeat
vel eam pro necessitate repeatat, ubi major sanguis
effervescentia, major sanguinis copia, ætas florens
temperamentum sanguineum, venæ latæ & ampla
regio ac tempus anni calidius: parcus econtra,
præsertim in Germania licentiosa illa & prodiga
marum apertio, nonnisi urgente admodum indicatio
instituenda, idque saltem permittentibus, nec contum
indicantibus viribus, cum sanguis sit vitæ thesaum
& copiosior V. S. spiritus exhauriat, calorem innat
dissipet, viscera languefaciat, cruditatesque genera
hinc testatur experientia, aliquos ex phlebotomia
piosa in morbos incidisse longos, nonnullos in reliquo
tempore frigidos, aut decoloratos ac cachecticos
additos fuisse: alios incidisse in morbos exitiales
hydropem, dispnæam, hepatis ac ventriculi imba
litatem vel tremorem, paralysin, apoplexiā, i
tissimum igitur est, à Mediocritate non recedere:
ad ventilatoria V. S. ad Unc. 4. 5. & in evacuatoria
ad Unc. 6. 8. 9. &c. pro una vice emittere.



ARTICULUS IV.

*De Officio Medici, in considerando
Tempore Venæsectionis.*

I.

CUM tempus V. S. aliud sit *commoditatis* : aliud *necessitatis*, vel aliud *ratione therapeuticae* : aliud *ratione prophylacticae* ; ambo quām maximē confideranda. Ratione curæ *therapeuticae*, urgente *necessitate*, ut in angina , pleuritide vehementi , contusione magna , casu , hæmorrhagia enormi , apoplexia , catarrho suffocativo &c. nulla habenda ratio diei , horæ & temporis , sed quantocuyus administranda , etiam neglecto prævio clystere vel laxativo , cùm hi morbi ita sint comparati , ut nisi iis V. S. subito occurratur , ager in præsentaneum conjiciatur vitæ periculum .

II.

EOdem modo acceleranda V. S. in febribus continuis , ac ab initio statim , vel secunda aut tertia die sanguis detrahendus est , modo ventriculus vel primæ viæ nulla humoris corruptela , vel cruditate referuntæ sint , quo in casu clyster vel laxativum præmitendum . Nam , 2. aph. 29. incipientibus morbis , si quid movendum videatur : move ; cùm vero consistunt ac vigent , quiescere melius est . Principio neglecto , etiam in augmento Venam secare licet , modo absit malignitas , viresque non sit resolutæ , nec proximè

immineat crisis. In *febribus intermittentibus*, ut v. gr. tertiana, etiam post tertium, immo quartum paroxysmum & ultra, commodè ac tutò Venam secabit Medicus, quia in his febribus interdum cacochymia multa & sanguis paucus; interdum sanguis à principio copiosus, & cacochymia in massa sanguinea cum urina rubra, crassa, turbida: interdum econtra; unde pro horum varietate Vena nunc citius, nunc tardius secanda: nunc prorsus V. S. intermittenda.

III.

IN *febribus continuis* legitimum tempus V. S. est remissio febris, si autem nulla sit, ut in febribus synochis, eligenda hora matutina, quia tunc omnia corpora magis vegeta. In *Intermittentibus* tempore apyrexiae Vena secunda. Si V. S. sit reiteranda, & quidem evacuationis causa, præcipue in acutis & morbis universalibus, eadem die fiat. In his enim subito corpus in aliud statum transferendum, ac sàpè evanit, ut morbus mox principium percurrat, ac postmodum V. S. ambigua fiat: si revulsionis causa, diversis diebus repetenda est, ut natura contrario motui diversis vicibus, & intervallo interjecto assuescat magis. Si in uno eodemque affectu, & purgatione, & V. S. opus sit, præstat V. S. purgationi (intelligitur autem radicativa, non lenitiva,) præmittere.

IV.

RAtione curæ prophylacticæ, seu in V. S. electa, in qua commodum tempus exspectare possumus, inter anni tempora, ob temperatam ejus qualitatem opportunissimum est vernum, teste Hippoc. Aph. 53. ubi ait. *Quibus sanguinem è venis detrahere convenit, iis vere secunda est vena, hinc autumnale, quod etiam aliquid de calore remittit.* Eligenda dies fere

serena, minimeque turbida. Horæ etiam antepomeridianæ aptissimæ, quia tunc temporis peracta concoctio, & solis ortis animum reddit hilariorem. Eli-gendi dies, in quibus non occurrit violenta quædam constellatio, aut ipsum novilunium vel plenilunium, aut quadraturum aliqua. Quoad lunam, in augmen-to ejus instituta efficacior, & commodior est, quam in ejusdem decremento, quia natura pristinas tunc temporis vires cœtiùs recolligit.

V.

Vulgò etiam attenditur ad signa Zodiaci, ex quibus pro administranda V. S. faventia ponunt, *arietem*, *libram*, *arcitenem* & *anphoram*, minus faventia, *taurum*, *geminos*, *leonem*, *virginem* & *scorpium*; medio modo se habentia, *cancrum*, *scorpio-nem* & *pisces*. Sed multis præstantibus viris, hæc signa ne minimum quidem valent ad legitimum Phlebotomiæ usum, cùm jam aliquot viginti gradus à pristina sua statione recesserint, in quo olim Venæctionis usui fuerunt destinata. Sic pariter partitio corporis humani in diversa Zodiaci signa, dum *arie-tum* capiti, *taurum* collo &c. adscribunt, absurdâ est & phantastica; hinc metus in V. S. in dictis signis contrariis celebrata, de nihilo est, cùm omnia sint contra rationem & experientiam.

V I.

Non approbet Medicus Tabellam hanc infra ap-positam phlebotomicam, mendacissimam & impostoriā, principio stolidissimo, numerorum nem-pe delirio & chimæricæ calculationi innixam, ac plu-rium penè manibus, & multorum calculis ober-

xantem. Sicuti autem Medicus, Tabellæ hujus san-
toribus fungum pro crebro, ac peponem pro cor-
de relinquit; ita subinde connivere potest, ne ob-
validam nonnullorum impressionem, solus metus
idem efficiat, quod in morione illo aulico, qui per
jocum à lictore sic instituto, virga percussus, gla-
dium tamen esse rarus, nihilominus exanimatus
cecidit.



T A B U L A

GENERALIS

Secundum quam V. S. pro recepta superstitione
vulgi consuetudine instituitur; ubi prima dies
à novilunio numeranda, ita tamen, ut si no-
vilunium horis ante meridianis incidat, illas
dies pro prima accipiatur: si autem horis po-
meridianis, insequens pro prima numeretur.

Dies	Dies	Dies
1)	11) bona, aliis mala	21)
2)	12) bona	22)
3) mala	13))	23) bona
4)	14) mala	24)
5)	15)) bona	25)
6 bona	16) mala	26)
7)	17) bona, aliis mala	27) extreMè mala
8)	18) bona	28) bona
9) mala	19) mala	29) mala
10)	20)	30) mala

A R T I C U L U S V.

De Officio Medici, in, ante, & post V. S.

I.

UT Venæsectio ritè instituatur, quædam ante quædam in, & quædam post eam consideranda. Præparatio eam præcedens consistit in hoc, ut 1. præcedentibus aliquot diebus, vires crapula aut forti exercitatione non opprimantur. 2. Primarum Viarum præcedat evacuatio, morbo inducias ferente, vel si ventriculus ciborum ingluvie aut crapula obrutus, vel alvina regio excrementis onusta. 3. Animus patientis excitetur, ne per mœrorem vel consternationem motus sanguinis impediatur. 4. Patiens resicitur, cui præsertim eximius oris ventriculi sensus, per succum acidituscum limon. granat. vel ovum recentis sorbile, hausto desuper vino generoso, vel jucundum evpeptum, non tamen longè à Venæsectione assumptum. 5. Moderata fiat deambulatio & commotio membra, in quo V. S. instituitur. Sic præsertim altiores & profundiores habentes venas, brachium priùs commoveant, frictiones in eo instituant, vel grave quoddam pondus manu gestent.

I I.

PRæterea 6. Si in manibus vel pedibus instituatur Phlebotomia, partes hæ in aquam calidam imponendæ, ut probè incalescant, rubescant, & venæ magis conspicuæ evadant. 7. Venæ brachii ordinariè ante prandium, nisi aliud suadeat necessitas: sublinguales & pedum 3. vel 4. horis post prandium secari solent. 8. Non fiat V. S. statim à somno: sed hora ante pomeridiana eligenda, nona nempe vel deci-

decima &c. 9. Situs ægri supinus sit sedens, vel de-
cumbens in valde languidis vel debilibus, aut ni-
mium meticulosis, vel animi deliquio obnoxii.

III.

IN ipsa V. S. 1. Pars incidenda prona collocanda :
2. Eadem pars liganda tribus supra locum inciden-
dum digitis, (in sublingualibus ac Vena frontis, col-
lum moderate constringendum, ligatura nunc levio-
ri, vena satis apparente, nunc strictiori in casu con-
trario, nunc dupla, ita ut una etiam infra locum
incidendum instituatur, vena existente tremula
ac inconstanti. 3. Vena oculis haud apparens, mol-
litie & digitorum attactu præterfluentem sanguinem
sentiente exploranda, notanda, ac modestè ferienda,
per transversum in Venis brachii & sublingualibus: per
rectitudinem in Vena frontis & reliquis. 4. Major fiat
apertura, ubi sanguis copiosior & crassior evacuandus,
ut in melancholicis & pituitosis: minor, ubi subtilior,
tenuior & magis biliosus. Instrumentum Phlebotomicum
venarum varietati, situi, & foramini nunc ampliori,
nunc minus amplo faciendo respondeat. Tuttissimè ape-
ritur vena scalpello, seu ferro incisorio.

I V.

PRÆTEREA 5. antequam Vena aperiatur, caven-
dum, tactu præcipue ante ligaturam explorando,
ne vel Arteria sub basilica latens fecetur, & sanguis arte-
riosus, tenuis, rubicundus saltatim egrediatur, eum maxi-
ma virium debilitate, ac metu aneurismatis, vel Nervus
sub mediana, vel tendo sub utrisque, unde dolor ingens
rumor, stupor, resolutio, convulsio &c. 6. Vena aperta
superius vinculum laxandum, sanguinis segnior fluxus,
pugno arctius adducto, vel compressohalitu, aut excitata
tussi vel screatu, promovendus. 7. Sanguis viribus con-
stantibus una vice: eis non constantibus iteratis vicibus;

oppresso interdum venarum osculo emittendus, 8. Si fanguis crassus, niger, putridus effluat, fluxus minus impediendus & fistendus, quam subtilior, tenuior, & colore magis rubicundus, virium tamen semper habita ratione.

V.

INsuper, 9. dum Sanguis emittitur, 3. saltem pelvicolis, stannicis, terreis, vel vitreis excipiendus, reponendusque loco, quo nec ventus, nec fumus, nec der pulvis aut sol eum afficere possit, 10. Imminens quandoque animi deliquium, ex timore, vel majori evacuatione oriundum, & cognoscibile, ex remissione sanguinis fluxu, pallido faciei colore, oscitatione oculorum vertigine, aurium tinnitu, pulsus mutacione, singultu, nausea &c. tum prohibendim, vena dito subinde obturata, sal ori indendo, labia eodem fricando, vel aquam frigidam ore gestando, eamque saepius expiendo; tum præsens removendum, supino decubitu, ac injecta ex insperato in faciem aqua frigida, vel acet. ros. suaveolentibus nari adhibitis, exhibitione jusculi, vel vin. generof. cum confect. alk. ve julep. vit. parati ex 2. vitell. ov. cum unc. 6. vin. alb. & sacch. fin. unc. ss. 3. gutt. ol. dest. cinam. vel cochl. aqua cinam. buglos. vel cum vin. parat.

VI.

Si loco Venæ, casu aperiatur Arteria, illico foramen claudendum, ac lamina saturni, vel nummus argenteus inter 2. linteola apponatur cum forti ligatura, vel applicetur Catapl. stegnot. Galen. ex thur. alpil. lepor. cum album ov. hinc membrum diu extensem servandum, ac in opposita parte pro revulsione Vena secunda. Si Nervus vel tendo lœdatur, mox oleum destillat, terebinth. vel ol. destill. cer. calidum vulnusculo

Si instillandum , vel accipiendo ad unc. i. ol. dest. tereb.
us spirit. vin. drach. i. & euphorb. dr. ss. apposito desuper
& Emplast. ex tereb. cer. & modico euphorb. Si Vena per-
tusa intumescat , apponatur ol. rut. vel ruta oleo cocta,
vel vin. calid. cum sal. mixt.

VII.

Post Sanguinem sufficienter emissum , vinculum
enodandum , manus dilatanda , brachium exten-
dendum , vulnus detergendum ac deligandum , super-
imposito gossypio oleo tincto , si V. S. ex eodem vul-
nere ea die reiteranda , vel splenio vino madido , si
Vena magis coarctanda , vel etiam nummo argenteo in-
ter 2. linteola applicato , si Sanguis difficulter fista-
tur; quo in casu etiam prodest crepit. lup. vitriol. ust.
gossyp. ust. lanug. cydon. &c. Facta deligatione , bra-
chium in media figura detinendum , quiescendum ;
omnisque tam animi , quam corporis contentio yitan-
da . Vulgus post V. S. somnum tota die prohibet ,
tum ne foramen nondum coalitum in somno aperia-
tur , tum ne calor exiguus interiora petens , in somno
suffocetur ; sed quia primum diligent adstantium cu-
ra , & probè facta deligatione præcaveri potest : po-
sterius verò verum non sit , nisi forsitan immodica
fuit sanguinis evacuatio , aut timiditas accelerit , quæ
animi deliquium inferre possit ; ideo nihil obstat , quin
saltem post cibum , vel paucis à V. S. horis somnus
iniri possit .

VIII.

Hora una aut altera elapsa , alimentum euchi-
mum temperanter sumendum , ne coctio laeda-
tur , & anfa novæ vitiosorum humorum faburræ ad-
ministretur . Brachium eo die vehementi motu haud
agitandum , vitetur aer intemperatus , moderentur
ani-

animi pathēmata; animus sit hilaris, tranquillus, se. cho
ponantur labores, & seria negotia, ac judicium san- tan
guinis, pro conservatione ulteriori sanitatis, non ne- exc
gligatur.

ARTICULUS IV.

*De Officio Medici, in Sanguine per
V. S. emissō, judicando.*

I.

QUoad judicium de Sanguine missō ferendum, officium Medici est, considerare ejus colorem, consistentiam, ac serum. Optimus erit sanguis, qui benē fibrosus, æqualis ac unius substantiæ, epatis parenchyma repræsentet, ruborem cum splendore floridum exhibens, supernatante serosa materia, in debita ac proportionata quantitate & qualitate.

I I.

QUoad colorem, ruber & floridus, pauca aqua so perfusus, bonam valetudinem indicat. Interim in acutis sanguinem impensè coloratum, morbi maligni signum esse plures asserunt; hinc etiam, teste Baglivo olim Romæ observatum, omnes ferè ab acutis morbis evasisse, quorum sanguis V. S. extractus, crux alba atque glutinosa prædictus erat: econtra mortuos, quorum sanguis valdè rutilans erat, cum superficie nimium rubicunda. Ruber & spumosus, nisi spuma per accidens ex defluxu sanguinis excitetur, copiam, fervorem, orgasmum ac ebullitionem sanguinis denotat. Nigricans vel maculis nigris spectabilis, ejus per lentam phlogosin adustionem ac humorem melan-

le. cholicum, *albus* pituitam, & si simul *spumosus*, mul-
n. tam ejus progeniem, tusses, raucedines, & catarrhos
e. excitantem innuit. *Flavescens*, *viridis*, *flavam* aut
retorridam bilem; *lividus*, & *cæruleus*, dolores circa
lienem, ac humoris melancholici, aliorumque pec-
cantium abundantiam; *variegatus*, instar marmoris,
insignem humorum in M. S. confusionem putredini ob-
noxiam significat. Color *cinereus* extremam adjustio-
nem arguit.

I I I.

QUoad *consistētiam*, *Sanguis*, qui lente effluit
(quod nonnunquam etiam provenit, vel ob fo-
ramen non satis amplum, vel sanguinis copiam
aut paucitatem, vel timorem, aut venas flatu turgi-
das) & picis instar digitis adhærescit, uti & fundo
pelvicularum; ac celerrimè concrescit, concretusque
difficulter finditur, *crassior* est, ac obstruktiones indi-
cat. *Tenuior* econtra, qui tardius concrescit, facilius
que finditur, & ad bacilli attactum diffilit; hinc im-
perfectam hæmathosin, viscerumque eidem inservien-
tium debilitatem significat. Qui *variegatus* multum,
pelliculari duntaxat de se emittit tremulam & mobi-
lem, sub ea continens substantiam fibris prorsus desti-
tutam, vel minus cohærentem, ut attactus in partes
diffiliat, *putridus* est, ac sanguinis corruptelam deno-
rat. Qui *crusta alba*, *glutinosa*, *viscida*, & quando-
que *densa* ac *diaphana*, ruptu & fissu diffici prædi-
tus est, *crudior* est, denotans portiones fermentibiles
in M. S. in statu cruditatis existentes, perfectamque
coctionem nondum adeptas.

I V.

Quoad serum, illud modicum & colore pallidum conveniens est ac naturæ proportionatum. *Nimis copiosum*, massa sanguinis veluti Insula circumdata eidem supernatante, arguit, vel prægressum potius liberaliorem, vel obstructionem aut imbecillitatemnum, vel viscera sanguinificationi dicata infirma, insufficienrem per urinas aut insensibilem transpirationem excretionem: *paucissimum*, aut *nullum*, casas contrarias indicat *Nimis flavescentes*, bilem salium lixiviorum copiam denotat. *Ceruleum* & *lactescens*, splenis affectuum comes, *Album* & *lachrymiferum*, vel alimenta intempestivè & præproperè ante V. assumpta, & in chylum conversa, vel viscerum mathos dicatorum, & sanguinis intemperiem adabilitatem innuit. *Sanguis male olens*, licet rarus putredinis ac corruptionis index, ac mortis prodromus. Probitas sanguinis in pedis vel manus sectione calidam effusi, dignoscitur, tum ex laudabili ejus iore, tum ex fibris, sanguine virgula conquaflato parentibus, & quidem inter se coherentibus, tractu facile disrumpendis.

A R T I C U L U S VII.

De Officio Medici, in prescribendis Remediis post judicium V. S. pro Cura Vernali, vel Autumnali.

Id

Sanguine probè considerato, officium Medici ex pro varia ejus constitutione curam prophylacticam in

instituere, & si humores pituitosi, biliosi, melan-cholici, putridi abundant, eos per epicrasin evacuare per Decocta, vel Nodulos laxativos; si obstruc-tiones adsint, eas tollere per Brodia alterantia, & deob-struentia. Si fervor bilis aut sanguinis, eum tempera-re per usum Acidularum, aut seri lactis vel Brodiorum alteratorum; si debilitas viscerum sanguifican-tium, ea roborare, prout ex sequentibus magis appa-rebit Remediorum formulis.

Brodium alterans. R. Herb. acetos. endiv. cichor. petrosel. cum tot. chærefol. fl. borag. pimpinell. sanguisorb. an. q. pl. M. S. Species pro brodio herbarum, quarum manipulus unus coquatur in brodio carnis, pos-tea coletur per linteum & reddatur acidum succo ci-tui, aut conteratur in ipso sequens pulvis.

R. Pulv. epat. rub. vel cryst. tart. unic. ss. subinde etiam addi potest aliquid de sal. absinth. vel aliis sa-libus digestivis. Pulvis pro brodio herbarum, de quo tres cuspides cultri plenæ ipsi immittantur. Continuen-tur hæc Brodia, ad unc. vi. per 14. circiter dies.

Species pro Vino. R. Herb. recent. acetos. chærefol. dracunc. hort. pimpin. sanguisorb. fl. borrag. meliss. an. q. pl. absinth. parùm M. S. Species, sive herbæ recen-tes pro vino, quarum manipuli duo immittantur in ampullam vini albi unius mensuræ, sistatur per aliquod tempus, & de eo sumatur semper primus Potus per Mensem Maji.

Nodulus laxativus. R. Fol. senn. f. unc. ss. agar-crud. incis. & conquass. rad. mechoac. crasse pulveris. an. unc. ss. z. z. incis. drach. i. ss. horb. card. ben. agrim. ce-terach. summi. absinth. fl. borrag. anib. an. p. i. cort. cit. incis. drach. i. B. M. incis. & contus. dentur ad Nodul. ex sind. alb. S. Nodulus herbarum laxativus pro una & dimidia mensura vini, & una dimidia mensura aquæ fontis, aut aquæ cichoreæ vel boraginis distillatae, de quo mane bibatur octava pars sumtis primum, aliquot cochlearibus brodii carnis aut juscuvitellorum ovorum.

Alius

Alius : R. Rad. cichor. dr. iij. fænic. enul. polyp. q.
an. dr. ij. herb. absinth. Rom. card. b. chamæd. cent.
min. adjant. aur. an. p. i. fol. senn. f. unc. i. ss. rhab.
el. agar. troch. an. dr. ij. passul. min. unc. i. cinam. vel
galang. min. dr. j. sem. anis. scrup. iv. crem. tart. dr.
ij. ss. M. incis. & contus. ad Saccul. exsind. rub. S.
Nodus herbarum laxativus: cui affundatur una &
dimidia mensura vini albi, & una dimidia mensura
aquaæ bullientis, relinquatur in loco calido per 12,
aut 24. horarum spatium, posteâ asservetur in cella
vel cubiculo, de quo bibatur quotidie pars octava vel
paulum minus.

Decoct. laxativum R. Pulp. tamarind. unc. i. rhab.
fol. sen. f. an. dr. vij. passul. min. unc. iii. sem. fænic.
contus. dr. i. ss. coq. in aq. font. lib. iv. ad lib. ii.
Col. detur. ad usum. S. Decoctum laxativum pro
purgando Sanguine, de quo mane sumatur octava
pars, vel aliquantum plus quam medium octavæ par-
tis die accipiatur.

Pulvis digestivo-laxativus, R. Crem. tart. vel pulv.
epat. rub. scr. i. sal. absinth. gr. vij. scam. sulph. gr.
vii. x. xij. &c. ol. dest. mac. gut. ij. M. f. Pulv. den-
tur 4. doses. S. Pulvis digestivo-laxativus de quo
sumatur quotidie una dosis, vel diebus alternatis ma-
ne, jejune in brodio, vel in potu aquæ mineralis,
cujus posteâ bibatur una ampulla.

Alius R. Fol. senn. f. tart. alb. an. unc. i. sem. anis.
caryoph. cinam. galang. an. dr. j. diagryd. dr. ij. M. f.
Pulv. S. Pulvis laxativus purgans sanguinem de quo
drachma, aut media drachma quandoque sumatur.

Serum lactis. R. Ser. lact. cum succ. cit. vel tama-
rind. vel crem. tart. vel acet. parat. depur. & clarif.
unc. vij. viii. x. lib. i. &c. essent. cit. q. f. pro grato
odore. Detur. per 14. dies vel 3. septim. S. Serum
lactis, mane jejune bibendum. & postea per unius
horæ spatium deambulandum.

Serum lactis magis compositum. R. Rad. cichor.
scorz.

scorz. herb. endiv. acetos. fumar. cuscutea. cochlear. bec-
cabung. chærefol. pimpin. sanguis. fl. borrag. an. q. pl.
M. S. Species pro Sero lactis herbarum. De quibus ma-
nipulus unus vel duo ebulliantur in potu lactis captæ
aspergatur succus citri vel acetum, & coletur per
linteum.

Serum lactis Fonsecæ, Magnatibus familiare, & gu-
stum gratum. Rx. Tamarind. unc. iij. aq. frag. (vel al-
terius destillat. vel aq. font. lib. v.) terantur in mort.
lapid. ut nuclei denudentur, & auferantur, aquam sen-
sim affundo: hinc Rx. lact. caprill. lib. iv. ebull. tum
affund. dilutum tamarind. coque simul parum sine agi-
tatione ollæ, in vase terreo vitreaceo, donec partes ca-
scose sequestrantur, hinc refrig. col. per lint. depur. 2.
album. ov. ac ultimò filtretur per chart. aromatiz. eff.
cit. g. s. ad grat. odor.



C A P U T III.

*De Officio Medici, in Affectibus
requi-
rentibus Arteriotomiam, Cucurbitulas.
Scarificationem, Hirudines, Vesicato-
ria, & Fonticulos.*

ARTICULUS I.

*De Officio Medici, in adhibenda Arterio-
tomia, & Cucurbitulis, sine & cum
scarificatione.*

L.

Licet alias ex communi Practicorum experientia assuetum tantum sit, aperire Venas, factum tamen, ut etiam aperientur arteriae; sic Gelen. earum incisionem commendat, in Capit calidis, affectibus, ut v. g. in diuturnis Capitis doloribus calidis, & spirituosis, ut cephalalgia hemicrania, calidis & acribus oculorum defluxionibus, ac ophthalmiis contumacibus, in vertiginosis, phreniticis, in fluxionibus à temporibus ad dentes, & à dentibus versim ad tempora, præsertim si adsint dolores temporum fixi, cum pulsu arteriarum notabili.

I I.

UT autem Medicus hoc in passu cautus sit, ac ritè suo fungatur officio, cùm res periculo non careat, tum ob metum insignis hæmorrhagiax, tum ob difficultem ratione pulsus consolidationem, & aneurismatis superventum, observabit. 1. Arteriotomiam nonnisi in difficillimis, & inveteratis morbis, qui aliis non cedunt auxiliis, esse exercendam, & non nisi urgentes necessitate, ac præmissis universalibus, 2. Arterias tantum minores aperiendas esse, ut v. g. prope aures vel in temporibus, cum in majoribus prædicta pericula magis metuenda sint. 3. Eam non instituendam in debilibus, quos præstat aliis auxiliis curare, quàm partibus sanguine & spiritu privatis, in certum periculum deducere 4. Tantum ex secta arteria emitendum sanguinis, quantum effluit, nisi sit nimium, hinc vulnus consolidandum apposito Emplast. *ex aloë, thur. sarcocoll. bol. Arm. pil. lepor. cum album. ov. except. vel terra vitriol. dulc. cum terr. fig. album. ov. except.* 5. Arteriotomiam inveteratos, aliosque præternaturales affectus citius curare, quàm V. S. tum quia arteriæ omnem omnino distribuunt sanguinem, sive que natura omnem farcinam per arterias expellit, & quidem multò velocius; tum quia à flatulentu & calido sanguine arterioso plurimi producuntur, & soventur morbi.

I I I.

Cucurbitulæ vel applicantur cum scarificatione, incisa cute, vel integræ sine scarificatione. Sine hac locum habent 1. in nimio fluxu mensium, infra mammas appositæ; ex Hippoc. 5. apb. 50. mulieri si placet menstrua sistere, cucurbitulam quam maximam ad

mammas appone. 2. Ad femur & crura pro ciendis mensibus, in quem finem etiam frequentius scarificationes simul prosunt. 3. Contra urinæ suppressionem realem, & in calculo jam in ureterem delapso, ubi juxta ductum ureterum applicatae, & versus inguinalia tractæ, calculum subinde transferunt, dolores leniunt, & urinæ fluxum carent.

VI.

PRæterea 4. locum habent in hæmorrhagia nostrum, hypochondriis applicatae sed cautè, ne sequatur inflammatio; item pedibus, ex observatis. *Post.* Usitata etiam admodum, & proficua in hoc casu ventosa magna ad nucham applicata. 5. Valentes ad dolorem stomachi, & intestinorum a flatibus oriundum, quo in casu, teste *Galen.* incantamenti instar subinde juvant. 6. Ad motum ciendum stagnanti sanguini, ut dum in apoplexia faturæ coronali applicantur. Affigi solent aqua calida prius madida, & ad ignem candelæ calefactæ præmissa frictione partis per lintea calida.

V.

CUcurbitulae cum scarificatione, cum sanguinem eructe evacuent, eoque effuso, alias vasibus majoribus in capillaria effundatur, hoc modo totum quoque corpus evacuant, sicque haud immerito V. S. vicaria appellantur, & applicari solent. 1. Ubi V. S. locum non habet; vel ratione virium ægri, ut in pueris, gravidis, senibus aut morbo longinquo, vel acuto fractis, cum non confertim, sed paulatim & sensim evacuent; vel ratione lipothymiae imminentis, vel ratione difficultatis secandi venas. 2. In partibus gangræna affectis pro humoribus impactis, & corruptis eliciendis. 3. In partibus acri fluxione tentatis.

4. Pro

4. Pro veneno a cane rabido , aut aliis animalibus
venenatis immisso extrahendo . 5. Pro mensibus cien-
dis . 6. Pro oculis fluxione tentatis . 7. In febribus
malignis petechialibus .

V I.

Loca frequentiora applicandarum Cucurbitula-
rum , sunt in dorso , regio interscapularis & lum-
bi . In brachio , humero , in pedibus femori & su-
ris affigi solent . Quantitas sanguinis extrahendi varias
pro morbi vehementia , & causæ morbificæ ratione .
Parva & minima est , ad unc. ij. vel iij. mediocris ,
ad unc. iv. v. summa , ad unc. x. xij. Ubi morbi
magnitudo urget , applicandæ copiosiores & majores
jamdum sanguine repletæ , iterum removendæ , ac
denuò post repetitas scarificationes imponendæ , &
foramina altius infligenda : in minori affectu , mino-
res & paucæ cucurbitulæ sufficiunt , nec eas cum sca-
rificatione repetere opus est .

V I I.

Scarificatio nunc est superficiaria , nunc profundior :
Quando crassior ipsa cutis , sanguisque evacuandus
profundius delitescit , perficitur phlebotomo seu scal-
pello , parte prius fomentata aqua tepida , aut propè
fornacem calefacta , admotis postmodum cucurbitulis
vel solum calefactis , vel juxta Belgas cum flamma ,
qua potentius quidem trahunt , sed majorem ægris
causant timiditatem . Eadem peracta , loca scarificata
abluenda aqua tepida , & plagulæ pauco sevo obli-
nienda .

VIII.

Sicuti Scarificationem menstruatim ex consuetudine tantum institutam, tam prodigaliter vitae nostrae inestimabilem thesaurum, Sanguinem nempe profundentem. Medicus nullatenus approbet: ita moderatum ejus usum, urgente praesertim necessitate, minime damnet, cum experientia testetur, multos provente aetatis homines, sine nullo damno, hoc praevidi genere usos fuisse; neque verum est, ut vulgo dici solet, illum scil. qui semel scarificaverit, protam vitam illud continuare necesse habere, nisi in vita periculum se precipitare velit, cum experientia contrarium testetur. Hinc etiam *Mæb. in hist. de jec. petech.* affirmat, puerum 8. annorum crebrioribus ophthalmis, & fluxionibus oculorum obnoxium, suos periti cujusdam Medici, Scarificationibus per singulos menses bis usum fuisse, easque ad 10. aetatis annum feliciter continuasse: cessantibus autem his affectibus, eundem cessasse etiam ab ipsarum usu, absque ulla morborum invasione.

ARTICULUS II.

De Officio Medici, in præcipienda applicatione Hirudinum.

I.

Hirudines seu *Sanguisugæ*, non secus, ac Scarifications, capillaria pariter venarum & arteriarum aperiunt vasa, sive sanguinem evacuant tamen in hoc antecellere videntur, quod paulatim & sensim evacuando, minorem creent molestiam plus insuper afferant emolumenti, cum hirudine

sanguinis sint appetentes: cucurbitulæ verò sàpè loco sanguinis, aquosus tantum & seruos humores evacuent.

II.

Applicari solent Hirudines, vel totius corporis evacuandi gratia, vel ob morbum membris aliquibus privatis, Quoad primum, veteres præfertim in gravidis, pueris, senibus, acuto morbo detentis, venæctionis usu contraindicato, applicabant eas ad venas majores, ut medianam, basilicam &c. Quoad alterum, Hirudinibus usi fuerunt tanquam vero topico remedio, hinc præmissis universalibus, imponebant has in omni arthritide supra locum affectum, coxa in doloribus Ischiaticis, in abscessibus, cutis fæditaribus, malignis tumoribus, vulneribus, morsibus venenatis; item ad illas partes, ubi V. S. & cucurbitulae nequeunt applicari, ut v. g. naribus, labiis, pudendis &c.

III.

Hodie usus earum non adeò frequens, cum, si sanguis universaliter sit evacuandus, id fiat per V. S. si particulariter, per scarificationem, nisi applicatio ad venas hæmorrhoidales, quæ frequentissima, ad imitationem naturæ, in nonnullis corporibus eas sponte & periodice, summo cum sanitatis emolumento aperientis. Ex Hippoc. enim in *epidem.* ij. quibus Hæmorrhoides profluant, neque pleuritide, neque pulmonis phlegmone, neque phagadæna, neque furunculis, neque terminthis, neque lepta, neque vitiligibus albis corripiuntur, immò ex eodem 6. *aph. ij.* *Melancholicis & nephriticis hæmorrhoides supervenientes*, bonum sunt, & 6. *aph. 21.* *Infantis*, si varices, vel hæmorrhoides appareant, insanie fit

solutio. Præterea præservare dicuntur a morbis a Melancholia vulgo derivatis, ac dantur etiam exempla plurium virorum longævorum ex periodico hæmorrhoidum fluxu, ut adeo venæ Hæmorrhoidales non sine ratione quibusdam dicantur *venæ aureæ*.

I V.

CUm igitur natura sponte sua venas Hæmorrhoidales cum emolumento refert, æquum est, ut an imitatrix id ipsum efficiat, quare earum apertio, cum utilitate præscribenda erit a Medico, in mania, melancholia, affectione hypochondriaca, scorbutica, palpitatione cordis, scirrho lienis, affectione arthritica, nephritica, affectibus etiam pectoris, cum suppressos illos excitet, teste Hipp. 6. aph. 12. dum ait: *diuturnas curanti hæmorrhoides, nisi una quæpiam servetur aperta, periculum aquæ inter cutem aut tabis impendet.* Item in suppressione mensium, dum sanguinem in vasis uteri, propter copiam & crassitatem infarctum, ad orificia venarum sedis trahunt, vi vacui.

V.

SIcuti autem ex Galen. non adeò tutum est, natum evacuationi per hæmorrhoides assuefacere, cum periculosus sit excessus, seu sanguis supra modum excernatur, seu suppressatur; ita, licet earum apertio in multis magis morbis prosit, nunquam tamen eadem temerè tentanda, sed diligenter advertendum, num prius fluere consuetæ fuerint, & modo suppressæ morborum causa existant, vel sanguis alias affectet vias & exitus, vel an natura eò tendat, quod per earum intumescientiam, dolorem, pruritum, vel aliquot guttulas sanguinis effluentis innescet, quo in casu earum apertio majori cum emolumento celebrabitur.

VI.

Pars, cui applicandæ Hirudines, linteis aqua nitrofa madidis abstergenda, hinc aqua dulci ablueda, & siccanda denique aliquot guttulis sanguinis columbini irroranda, vel saccharo pulverisato fricanda; postmodum Hirudines, & quidem non venenosæ, sed præparatæ, & ritè electæ, seu per fistulam, seu per cucurbitulam, seu manu ipsa mediante linteo albo, & mundo comprehensæ, parti applicantur, & quidem in ano posterius coccygem versus in affectibus lienis: exterius vero magis, ubi venam cavam deplete animus. Applicatæ Hirudines prius non removendæ, nisi per se decidunt, maturato tamen, si placet eorum casu per aspersionem nitri, salis, vel cineris. Postquam ceciderunt, pars spongia aqua calida imbuta fovenda, vel in vapore aquæ continenda, ut sanguis per foramen apertum fluere possit, per 2. vel 3. horas, pro viribus ægroti, collocando v. g. patientem supra solium ferventis aquæ, cui vasculum innatet sanguinem destillantem recipiens.

VII.

Vacuandus sanguis ad unc. iv. v. si mediocriter agendum: ad unc. x. si ad summum. Si foramen casu ante tempus coalescat, fluxus promovendus, vel per alias substitutas Hirudines, vel Cucurbitulam anno affixam, cujus ope sanguis in debita copia excerni possit, si nimium fluat, sistitur linteo combusto parti bene abstersæ applicato, vel gallis ust. aut goffyp. combust. Vulnusculum quandoque consolidatu difficile, theriac. vino commista crebrius detergendum; Hirudo, si fortè casualiter anum irrepserit, digito statim eruenda, vel aqua falsa calida, clysteris modo aliquoties injecta, eluenda & elicienda.

A R T I C U L U S III.

*De Officio Medici, in præcipienda ad-
ministratiōe Fonticulorum.*

I.

Cauteria, Fonticuli seu Fontanellæ; licet per se tantum pus plorent, ex sanguine & nutrimento rorido loci fonticulo exulcerati in pus mutato, nihilominus tamen præter hoc etiam varia salia sanies ac fordes, vitio vel lœsæ in sanguine fermentationis, vel depravatae cuiusdam partis nutritionis emergentes simul evacuant, & revellunt, idque non raro cum sensibili, in morbis Chronicis præsertim ex colluvie serosa, ac lymphæ vitiis natis, ægrorum levamine, materia ichorosa & serosa acri sale imbūta, sensim educta.

I I.

Conveniunt igitur Fonticuli, in cephalæa, epilepsia, præservatione ab apoplexia, & affectibus soporosis, vertigine, paralysi, lœsione visus, auditus defluxionibus catarrhalibus ad oculos, nares, palatum, dentes, fauces, pulmones, unde etiam in thoracis affectibus, ut raucedine, asthmate, tussi, perniciem minitantibus commodè excitantur, ut etiam in phthisi incipiente, prophylacticè pro humorum falsorum, & acriumi affluxu capite divertendo. Prætereà in morbis lieni vulgo adscriptis, teste experientia, ut mania, melancholia, palpitatione cordis, affectione hypochondriaca, scorbutica, affectibus hæmorrhoidum, summotum afflunt levamen, ut si hujus tetri humoris remotum è cerebro ad inferiores partes ignobiles re-

vellere volueris, Fontanella in levo crure aperienda sit.

III.

Licet Catiteria maximè prosint, ubi serum seu latex plus nimirum abundat, cum archæus à stagnante latice oppressus, ab evacuatione per cauteria melius vivificatus, vires insperato reassumat, sicut etiam in hydrope videantur esse proficia, nihilominus cautè his utendum. Nam ex Hippoc. 6. apb. 8. aqua inter cutem laborantibus, exorta in corpore ulceræ, non facile sanariunt; hinc iis utendum, ubi crura nondum sunt tumida. Præterea conveniunt in affectu Ischiadico, in affectibus uterinis vitio mensium exortis, fluore albo, passione hysterica, pedibus ulcerosis, pro affluxu intercipiendo, ac uno verbo omnibus aliis affectibus, in quibus vel totalem crux mas-
sam vel laticem minuere, aut revellere, vel derivare decretum est.

IV.

IN horum administratione, observet Medicus, 1. Fonticulos sensim, & sensim operari, sique magis tantum convenire in morbis Chronicis. 2. Cum ultio sit inter remedia extrema, non deveniendum esse ad Fonticulos, nisi ubi præsidia mitiora nihil proficisse videmus, aut non profutura existimamus. 3. Corpus prius per purgationem, & V.S. si opus, disponendum, & præparandum esse. 4. Ratione anni temporum, si morbus inducias ferat, vernum esse omnium maximè aptum, & quidem declinante luna. 5. Ratione ætatis pueros tenellos, & senes decrepitos non facile tolerare fonticulos, nisi urgeat morbus valde gravis, ut Epilepsia, Apoplexia, Catarrhus suffocativus. 6. Eodem minus convenire emaciatis, & morbo depressis, magis vero obesis, edacibus &c.

V. Quoad

V.

Quoad loca Fonticulorum, demonstrantur hæc à scopo, vel evacuationis, vel revulsionis, vel derivationis; observata tamen ubique rectitudine vasorum, partis affectæ cum loco fonticuli. Sic v. g. in nucha inter 2. & 3. vertebram, loco molestissimi veterum setacei poni solet, pro capite & oculis. In brachio, & quidem in Intersticio inter musculum deltoideum, & bicipitem. 5. Digitis, à flexura pro affectibus capitinis, vertigine, apoplexia, affectibus oculorum, aurium, faucium & laryngis &c. In Cruribus vel supra vel infra genu in parte interna, ubi fasciæ crurales ligantur, in affectibus uteri, mensium, lienis, hæmorrhoidum malo Ischiadico, aliarumque partium medii & infirmi ventris R. R. etiam in bregmate, seu sincipite aliquem ponunt, pro humoribus à cerebro ad exteriora evocandis, item intra scapulas. Item intra septimam thoracis vertebram, intra costas, pro vomica pulmonum; sed hi minus usitati.

V I.

Excitatur Fonticulos vel *ferro*, dum simpliciter cutis elevata scalpello inciditur, foramen debitæ magnitudinis faciendo, quod ad suppurationem deductum, fonticulum suggerit, vel *igne actuali*, per ferramentum ignitum ad debitam profunditatem intrusum, vel *igne potentiali*, seu medicamento *corrosivo*, vel *alcalino* ex cineribus, quod tamen non ita commodum, quia facile liquefando, locum exulcerationis mutat, vel *acido*, v. g. per *crystallos lunares*, quantitate pisí, vel *butyr. antimon.* ad gut. v. vel *vij. pennæ anserinæ* loco, ubi excitandus est Fonticulus impositæ, vel *globulo ligneo*, hora una ante fonticuli parationem *aqua fortæ imprægnato*.

VII. Ex-

VII.

Excitato Fonticulo, eschara & caro mortificata, butyro vel unguento digestivo separanda, & si exciderit, ac ulcus satis dilatatum fuerit, globulus ex ligno hederæ, vel cera, vel radice Ireos, vel pisum majus, aut galerus argenteus aut inauratus imponendus, superimposito Empl. diapalm. vel sparadrapo: hinc locus deinceps lamina, subdito minuto pulvinari arctius constringitur, quo profundior fiat Fonticulus. Si non sufficienter ploret, globulus indi potest ex rad. gentian. vel fortior ex rad. elleb. nig. vel ex hedera inuncta Bals. sulph. vel ex cera & paucō Mercur. præcipi. quo etiam nihil melius sordidos, & putridos Fonticulos mundificat; vel ex cera & cantharid. caro in Fonticulis luxurians, optimè absumitur, insperso aluminio usq.

VIII.

Fonticulos nunc excitatur unus tantum; ninc simul duo, in affectibus præsertim contumacibus, uti Practicorum aliqui asserunt: quo in casu communiter observant, ut vel decussatim applicentur, id est, v. g. unus in brachio dextro: alter in crure sinistro, vel vicissim. Præstant subinde etiam duo in quovis latere, ne unum magis exinde debilitatum, totum humorum impetum eo trahat, ac hemiplexia quan- doque excitetur. Ad cauterii diu jam gestati clau- suram, non facile Medicus consentiat, nisi vel æger atatis magnum habeat adminiculum, vel membrum fonticulum getens gracilescat, vel fluxione copiosiori tentetur, ac ulcus evadat sordidum, aut malignum, vel si supra articulum descendat, vel sponte exsicce- tur. Tum vicariæ singulis mensibus subrogandæ eva- cuationes, seu per purgationem, seu per sudorem, seu per alia loca.

ARTICULUS IV.

De Officio Medici, in praescribendis Remediis, pro usu, & administratione Fonticulorum, usitatis.

I.

LApis septicus ruptoriis. *R. Ciner. clavellat. calc. viv. ciner. fag. vit. an. p. aq. F. lixiv. fort. & inspiss. ad formam lapid.*

Lapis infernalis, seu Crystall. lunar. *R. Limat. m. gent. unc. ij. aq. fort. duplum vel triplum, solve, si luto abstrahatur in cucurbita, caput mortuum, qual formam salis repreſentat, calcinetur in crucibulo ample, donec materia non amplius ebulliat, hinc ign. parum augeatur, ac materia effundatur in vas calidum. Refrigerata quasi lapidem repreſentat, sed friabilem, aſſervandum in loco calido & ſiccо. S. ut ſupra*

Lapis cauſticus Heurnii, ſequi horæ ſpatio cutes perforans. *R. Vitriol. uſt. un. ij. ſal. armon. unc. i. calc. viv. ciner. e face vin. an. unc. iii. tritis atque permixtis affunde lixivium fculneum, vel titbymalinum quod ſubinde colatur, dum iſtorum materia ferē diſſoluta ſit. Lixivium dein in olla nova aperta coquitur ac fervescit, dum crassescat ac lapidescat. Recondatur in loco ſiccо, in ampulla vitrea & obturata.*

Unguent. digestivum. *R. Tereb. Venet. unc. ss. vitelliov. dr. ii. croc. orient. fer. ss. M. S. Unguentum digestivum, quo à principio fonticuli utendum uſque pretredo excidat.*

Sparadrapum. *R. Cer. flav. unc. ii. ol. oliv. unc. i. tereb. unc. i. fluent in tigillo, insperrando ceruſſ. dr. ss. obſervando, ne materia nimis ferveat.*

Aliud

Aliud. R. Ol. ros. unc. ij. ss. cer. alb. vel citrin. unc. ij. sev. cerv. dr. x. M. F. Sparadrap.

Aliud R. Ol. oliv. lib. i. min. lib. ss. coq. Super len-
to igne semper agitando donec incipiat fusco colore tin-
gi: hoc factio in alio cacabo liquefiat cer. citrin. lib. ss.
M. cum priori materia, & coq. omnia ad justam consi-
stentiam, amotis ab igne, add. camph. rasæ unc. ss.
tege, donec camphora liquefiat, nec odor evanescat.
Ultimo scindatur ex charta papyracea longa 3. trans-
versorum digitorum lata, ducantur per dictum cerat. li-
quid. & f. cum forfice Emplast. debitæ magnitudinis.

Aliud viride. R. Seu. hirc. cer. cit. an. unc. i. ss. ol-
ros. dr. vj. coloph. unc. ss. virid. aer. scrup. i. M. intin-
gatur tela quartarium ulnae lata & 6. longa. Quidam
loco Sparadriapi utuntur Empl. Noribergensi, alii sola
cera alba & si fonticuli fordes & putredinem contra-
hant, addita cera viridi.

Globuli caustici Fonticulos apertos servantes, eorum-
que fluxum promoventes. R. Virid. aer. gr. xxij. rad.
gent. canthar. pulv. an. gr. xvij. cum cer. alb. dr. i. ss.
f. Globuli ut Pisa majora.

Cerat. Sculteti, Fonticulos ab omni symptomatum
injuria vendicans. R. Cerat. de ceruss. seu alb. coct.
unc. xij. pulv. ceruss. unc. iv. thur. tragac. an. dr. vj. Ir-
for. benz. an. dr. v. styrac. lig. ol. spic. odorat. an. dr. ii.
sapon. Ven. unc. ij. cer. unc. M. S.

Aliud Magni Ducus Hetruriæ. R. Succ. beder. lib. i.
nicotian. unc. iv. tereb. resin. pin. ung. ros. Mes. cer. cit-
anc. un. iv. pulv. cyper. odorat. drach. ij. ss. ceruss. ol-
unc. iv. M. f. Cerat. S. ut supra.

ARTICULUS V.

De Officio Medici, in præcipienda applicatione Vesicatoriorum.

I.

QUOD fonticuli, pedetentim, hoc Vesicatoria faciunt confertim, adeoque ferè urgentiori in malo, & ubi præsentaneum magis indicante auxilium, hæc ipsa in usu vocantur. Exscrunt vim suam cum revellendo, tum evacuando, & quidem tum excitando dolorem, quatenus acribus suis particulis, fibras irritant, unde ex fibrarum concitatione tremulations & fibratione, provocatur eò, ac citius fertur spirituum impetus, unde in loco prius male habente, per spirituum a dolore vesicante alio avocatorum motum, fit alteratio, & successiva correctio causæ morbificæ, atque ita per accidens prioris symptomatis curatio; tum evacuando, quatenus salinæ Cantharidum particulæ hinc inde pungunt, vellicant, & rorem partis nutritum, aut etiam M. S. penetrant, attenuant & colligent, sicque etiam particulæ heterogeneas & excrementitias, eidem non ritè permiscibiles, ibidem ex arctatis poris & constrictis meatibus hærentes, evanuant.

II.

QUAM maximè igitur convenientiunt Vesicatoria in diathesi sanguinis crassa, viscida, & ad coagulationes & stagnationes disposita, ac affectibus inde oriundis, veluti in cephalalgia, apoplexia, & affectibus soporosis, paralysi, epilepsia, in morbis convulsivis, & affectibus nervosis sine febre, ad ardenter

in-

inclinante, oculorum pathematibus, ut suffusione, gutta serena, ophthalmia &c. In dolore dentium, in catarrhis ac defluxionibus, irruptionem comminanti- bus in pulmones, vel aliam nobiliorem partem; vel in naribus, oculos, fauces, pectus &c. in doloribus fixis, chronicis, & acriter partem aliquam divellenti- bus, ut v. g. dolore ischiadicus. Item in petechiis, vel variolis retrocedentibus.

III.

IN Febribus continuis & malignis non promiscue statim applicanda, sed observandus status sanguinis. Sicuti enim in diathesi ejus crassa, viscida & ad coagulationes, stagnationesque disposita, quæ exilissimum pulsu, extremitatibus frigidis, anxietate, ad morbos soporosos propensione, aliisque coagulationis indicis stipata est, maximè proficiens afferunt effectus, & quidem multò magis, si tempus hyemale, temperies ægri ad humidum inclinans, habitus pinguis &c. Ita contra in constitutione sanguinis acri, & colliquativa, ubi febris plus minus ardens; ac magna adest sanguinis agitatio, & impetus, quam maximè nocent: dum accedunt convulsiones, deliria majora, febris maximum incrementum, ac tandem mors, coquimur; si habitus ægri gracilis, ac tempus adsit æstivum; hinc delirantes cum febre acuta, & lingua arida, ex usu Vesicatoriorum plerique moriuntur, & quidem convulsi.

IV.

Ex observatione Georg. Bagliv. de usu & abuso vesicant. c. 3. in Pleuritide, ubi circa quintum vel septimum, vel aliis intermediis diebus appetet magna spirandi, & expectorandi sputi difficultas, paientem in summum vitæ discrimen conjiciens, irritis

aliis, duò Vesicantia tibiis, vel cruribus admota; non solum expectorationem (quæ primaria crisis morborum pectoris) promovent ad stuporem ferè, sed etiam spirandi difficultatem leniunt, cum morbi mutatione in melius, acri cantharidum sale incipientes coagulationes solvente, ac humores pristinæ circulationis restituente. Idem sentire videtur Hippoc. l. 2. progr. 67. dicens: *in Pulmoniis, quicunque tumores sunt in crura boni, nec potest aliud quidquam melius accidentem præsentim si mutato sputo si appareant.* Fatetur predictus author, ex centenis ejusmodi ægrotantibus vi paucissimos obisse, præfata methodo tractatos, ac in super observasse, post adhibita in pleuritide vesicatio, diarrhœam si aliqualis aderat, imminutam, prorsus suppressam esse, atque subinde copiosiorem factissime urinam.

V.

Locus applicationis Vesicatoriorum est vel unversum caput, juxta *Vvillifium*, quod tamen rorò usu venit, nisi in apoplecticis, vel ponè aures, cephalalgia, dolore oculorum, dentium, aurium, ad nucham seu intra scapulas in iisdem affectibus, & soporosis minoribus, aut supra carpum, in pars musculosa brachii, & in cruribus seu prope inguinem, seu quod frequentius, 4. digitis supra malleolum interiorem in febribus malignis, affectibus soporosis majoribus &c. Prout animus vel revellendi, vel derivandi, vel evacuandi. Parantur vel ex *Emplast.* vesicator. vel ubi fortius agendum, in subjectis præcipue diuinis, ex ferment. vet. aceto forti & pulv. cantharid.

VI. A

V I.

Applicata Vesicatoria, parte prius aceto calido fricata & rubificata, (plus minus prout levius vel fortius agendum, cum acidum figat sal vol. cantharidum) 7. 8. vel ordinariè 12. horis relinquenda, hinc removenda, vesicas forfice inscindendas, locumque lenientium *folio brasice* per aquam bullientem prius tracto, vel in eam intincto, & *butyro non salito* incrustati, vel *diachylo simplici*, singulis 8. horis illud renovando. Si animus, diutius vesicatoria in fluore conservandi, cum alias vix ultra 4. vel 6. dies ita humida obseruentur, utile est *Empl. de sperm. ran.* vel *alb. coll. 3.* partes & unam *Emplast. vesicator.* exactè mistas applicare, vel *Empl. diachyl.* cum *pingued. lepor.* vel addere parum *pulv. cantharid.* Si verò locus exulceratus nimis doleat, aut inflammationis metus adsit, aut animus consolidandi, optimum usum præstat *Emplast. de sperm. ran.*

V I I.

Vesicatoriis applicatis, sitis, & linguæ ariditas supervenit: subinde etiam observantur motus tedium veluti subsultorii, & convulsivi, quandoque sudores plus minus copiosi, pulsus etiam veluti obscuratur, quæ tamen omnia, si res bene succedat, per triduum circiter durant, usque dum acres cantharidum sanguini inhærentes, eliminati: subinde mictum sanguineum, vesicæ inflammationem, urinæ ardorem, aliaque gravia excitant symptomata præsertim dorso applicata, vel in gracili habitu, æstivo tempore, sub ardore caniculae, non nisi multis emulsionibus ex seminibus frigidis majoribus, cum aliqua *fem. fænic.* cantharidum alexipharmaci, quantitate curabilia. Subinde ulceræ a vesicatoriis excitata desinunt in gangrænam,

nam , vel in difficillimam eorum cicatrizationem ; præsertim si maligna aeris accedat constitutio , vel in subjectis cachecticis , atro-melancholicis , valetudinariis , & lue gallica detentis ; quo in casu pro mundificatione commendatur *mel ros.* si bis vel ter de die codem obliniantur , & pro cicatrizatione inspersus pulvis tutiæ , in subtilissimum alcohol redact . vel *fia carpta* in decoct . alum . crud . ebullita , exsiccata , aquæ hinc applicata .

VIII.

Vesicatoria non conveniunt , sed contraindican-
tur a summa virium resolutione , in gravidis ,
instante fluxu menstruo ; in urinæ ardore , inconti-
nentia , mictu sanguinis , ulcere sphincteris vesicæ ,
item ius , qui lue venerea semel laborarunt , cum ab
adhibitis vesicantibus summopere lœdantur , in quo-
cunque tandem morbo adhibeantur , hinc nonnisi , in
maximis coagulationibus & morbis soporosis præscri-
benda . Item non conveniunt , ubi acrior & colliqua-
tiva sanguinis constitutio , præsertim in habitu corpo-
ris gracili . In febribus acutis nonnulli aliqua signa-
doctionis exspectant , antequam applicentur : in chry-
nicis verò morbis nervosi generis phases lunæ , ut du-
uno vel altero ante novi vel plenilunium applicentur .
Lethale signum est , si in gravioribus morbis nullan-
faciant operationem vesicationis , cùm etiam in ca-
davere nihil operentur .

ARTICULUS VI.

*De Officio Medici, in prescribendis
Vesicatoriis.*

Emplast. Vesicator. *R.* Emplast. Vesicat. *August.* *an-*
dr. *i.* *ss.* *ij.* *iii.* *unc.* *ss.* *detur ad chart.* *S.* Empla-
strum vesicatorium illinatur pelli in magnitudine
Scudi, vel palmae manus. & impositum custodiatur
emplastris affixoriis.

Aliud pro 4. Vesicator. *R.* Emplast. vesicat. *August.*
unc. *i.* *vel.* *R.* Empl. de melil. de mucilag. *an.* *unc.* *ss.*
caubar. *pulv.* *dr.* *ij.* *M.* *S.* Emplastrum Vesicatorium,
manibus & pedibus imponendum, uti dictum.

Aliud in Dolore dentium valde proficuum, *R.* Can-
tharid. *præp.* *pulv.* *dr.* *ij.* *terebinth.* *dr.* *j.* *myrrh.* *mast-*
campb. *an.* *gr.* *xv.* *ol.* *ros.* *dr.* *ij.* *cer.* *dr.* *ijj.* *M.* *f.* Em-
plastrum Vesicatorium in dolore dentium quod q. f. s.
post aures, vel cervici imponendum.

Cataplasma pro 2. Vesicat. *R.* *Canth.* *præp.* *scrup.*
iv. *euphorb.* *scr.* *j.* *ferment.* *acerrimi* *unc.* *i.* *acet.* *squill.*
q. *f.* *M.* *f.* *pasta* pro 2. vesicat. *S.* 2. Vesicator.

Aliud. *R.* *Canth.* *præp.* *scr.* *iv.* *snap.* *pyreth.* *an.* *scr.*
j. *ferment.* *dr.* *v.* *acet.* *squill.* *q.* *f.* *M.* *f.* *Mass.* *indu-*
unda corio pro 2. vesicat.

Aliud pro uno. *R.* Ferment. parum, caricam ping.
N. *i.* *canth.* *præp.* *gr.* *vj.* *cum acet.* *squillit.* *f.* *q.* *M.* *f.*
Mass.

CAPUT IV.

De Officio Medici , in Affectibus indicantibus Balnea & Acidulas .

ARTICULUS I.

De Officio Medici , in considerandis differentiis Balneorum , tam in genere quam in specie .

I.

BAlneum . 1. aliud est acreum , quod laconicum vocant : aliud aqueum , de quo in præsenti . Aqueum 2. aliud est naturale & simplex : aliud artificiale , quod arte ex incoctis pluribus ingredientibus ad diversos fines ordinatur . 3. Naturale , vel est Balneum aquæ dulcis , vel solius , vel additi subindumenti butyri , olei , lactis &c. ad majorem humectationem , qui liquores subinde etiam seorsim apud ditiones balneum constituunt , in doloribus partium nervosarum , dolore iliaco , nephritico , convulsione a siccitate , urinæ suppressione &c. vel Balneum aquæ mineralis virtute mineralium imprægnatæ . 4. Balneum minerale : vel est actu frigidum vel calidum è sua scaturigena profluens , ut statim sine alio ignis adminiculo usurpari possit , propriè thermale dictum , quale v. g. Fabrianse , seu Piperinum , Castaneense , Badense . Utrumque pro varietate ingredientium mineralium quorum vires & naturam æmulantur , aureum , argenteum , ferratum , plumbeum , falsum , nitrosum , alu-

aluminosum, sulphureum, bituminosum, vel ex variis hisce mixtum.

I I.

Probatur Aquæ minerales, eas probè considerando, vel quatenus manent integræ, contemplando saporem, odorem, colorem, qualitatem tactilem, contenta, vires atque effectus, perpendendo quoque simul extra aquam loci naturam, ostium scaturiginis, canales, ahenum; vel quatenus consumuntur, seu per insolationem, seu per evaporationem in loco calido, seu destillationem, seu decoctionem; vel examinantur per præcipitationem, ponderando ac trutinando postmodum residuum: præcipue gustu & olfactu. Ut autem Aquæ mineralis probatio ritè instituatur, eadem haurienda recens ac pura ex scaturigine, & quidem m. vel v.

Aquæ sulphureæ v. g. tam calidæ quam frigidæ, dignoscuntur 1. Ex odore sulphureo notabiliter nares feriente. 2. Ex pinguedine quadam in superficie innatante. 3. Quod in deluxu taliū Aquarum; dum aetis injuriæ subjiciuntur, cernatur corpus aliquod viscosum, album & lœve, inter se cohærens simile lacti sulphuris. 4. Quod omnes tales Aquæ argentum in iis suspensum instar communis sulphuris, jam citius, jam tardius denigrent. 5. Quod aestuantes præbeant flores sulph. inflammabiles, in cryptis reperibiles.

I I I.

BAlneum aquæ dulcis. 1. Mundificat, & fordet strigosas è sudore, pulvere & excrementis massa sanguinea ad peripheriam latis, abstergit atque eluit, hinc in scabie præsertim sicca, fetore alarum, inguinum & pedum, aliisque impuritatibus corrigen-

dis, atque abigendis utile. 2. Poter aperit, per cosse insinuat, transpirationem promovet, & excrementa in ambitu corporis hærentia discutit. 3. Totum corpus refrigerat, ac viscerum, & epatis præsertim fervorem, atque intemperiem calidam corrigit: humectat quoque ac serum restituit, hinc aridis, squalidis, strigosis ac tabidis maximè convenit, & præsertim Melancholicis à totius corporis habitu talibus. 4. Fibras tensas laxat, emollit, ac paregoricum est hinc quoque utile in doloribus colicis, nephriticis facilitando partu, ultimo præsertim mense gestationis usurpatum.

I V.

BAlnea mineralia, & præsertim *Thermæ* agunt in nostrum corpus calefaciendo, humores pituitosus, congelatos quasi, aut minimum gelatinosos, & flegnes calore suo colliquando, floxiles, & ad motum quemcunque non solum circularem, sed & fermentativum, dum activas eorum particulas caliditate sua excitant, inutiles dissipant: singulariter vero spiritus vitales serenant, ac a particulis excrementitiis expurgant, aptos reddendo, superfluas quoque serositates extirpando, ut natura postmodum sic adjuta, mediante circulatorio sanguinis motu, & sedes movere, & urinam pellere, ac sudores elicere valeat. Partium etiam laxitatem, remissumque fibrarum tonum contrahendo, firmando ac roborando, ut adeo pateat, Aquathermales potissimum convenire cacochymiae pituitosæ ac serosæ, affectibusque frigidis pituitosis & serosis, sine omni intemperie calida; hinc etiam in universum mulieribus magis quam viris salutares existunt, ut-pote frigidioribus, & magis pituitosis.

V.

A Generalibus ad specialia deveniendo, cōveniuntur *Thermæ* in Paralysi, modo affectus non sit nimis radicatus in cerebro, pessimè disposito, ac spiritus animales adhuc sint activi, nec omnino superabundanti humiditate absorpti, aut nimia visciditate irretiti, item quam maximè in Paræsi, quæ etiam balneatione acidularum tollitur. In Chiragra, Podagra &c. non conveniunt, & quidem nec in paroxysmo, in quo motus veluti criticus, neque extra eum, cum causam ac radicem ejus in stomacho ac liquore gastrico hærentem, non tollant; hinc teste *Timeo*, *Thonero*, pluribusque aliis, vix ullus horum usu ab insultibus podagrīcis liberatus: plures tamen in vita periculum, vel graviora incommoda præcipitati fuerunt, humoribus vel magis attenuatis, fluxibus que redditis, vel iis ad partes nobiles ex robore articulis conciliato refluētibus, vel articulis magis exinde laxatis, emulitis, & ad receptionem magis dispositis.

VI.

Prosunt ulterius *Thermæ* quam maximè in mulierum sterilitate, orta ex intemperie frigida, & humida, in chlorosi, in mensium suppressione, vasis uteri obstructa mucilagine pituitosa, vel dependente a cruditate M. S. In nimio etiam eorum fluxu, si oriantur a sanguinis fluxibilitate serosa, aut etiam nimia ejus aquositate: non verò si a sanguine biliosiori, & actiori, item in fluore albo, nephritide, ischuria, lassando, emolliendo spasmos, ac contracturas ureterum fistendo, sicque vias, & meatus patentiores reddendo, ut calculi, atque alia postmodum excerni valeant. Item in urinæ incontinentia, ubi unicum & summum sunt remedium. Quoad affectus externos, conveniunt *Ther-*

Thermæ in corpulentia nimia tum potatæ, tum pro Balneo adhibitæ, in scabie quacunque, & omnibus affectibus cutaneis, omni tandem cutis immunditia, inveteratis atque exedentibus ulceribus, fistulis, vulneribus & læsionibus minus ritè curatis, lepra incipiente Arabum, tumoribus pedum œdematosis &c.

VII.

Sicuti autem in paulo antememoratis affectibus apprime convenient: ita nocent econtra Phthisicis, Emphyticis, Vomica, aut alio abscessu interno laborantibus, corporibus etiam nimium repletis sanguine, va cacockymia ob humorum colliquationem, ac fusionem varios excitantem morbos; catarrhos etiam, ac varias fluxiones patientibus, ictericis quoque, dydropis, viscerum scirrho, vel ulcere detentis, obnoxio quoque suffusioni, erysipelati, ac abundantibus humoribus acribus, biliosis, scorbuticis &c. Prægnantes etiam a quam plurimis excluduntur, quia ex usu Thermarum saepius moventur catamenia, vel supervenit purgatio aut alvi fluxus fœtui nocivus, unde difficulter Thermarum fontes adeunt, quin aliqua molesta creentur; quæ tamen etiam omnia intelligenda de gravidis jam longo tempore, nempe 7. vel 8. mensium, vel gracilibus, macris, vel jam ante abortui obnoxio, cum experientia contrarium testetur, gravidas primis saltem mensibus, Thermas sine ullo damno usurpasse, licet cautela hic opus, & mulieres tales constitutionis pituitosæ, aut serosæ sint, necesse sit. Metuitur quidem nimia prolis accretio, vel ejusdem suffocatio, cum tamen contrarium exempla probent, & absque hoc aquæ innatet fœtus.

VIII.

DEveniendo tandem ad *Aquas minerales*, in spēcie hic loci circa tractum Oenipontanum repe-ribiles, caremus quidem Thermis proprie sic dictis, & per se calidis, & aestuantibus, ut ignis adminiculo non indigeant; sulphureas tamen frigidas, & limpi-das habemus, & primo quidem extra civitatem Hal-lensem *Balneum ad S. Crucem*, quod aestate præser-tim haud exiguum sulphuris odorem spirat; fortius est, *Minsterense* infra *Schvazium*. His efficacius, & ad Thermas proximè accedens, utpote tepidum, & non-nihil fumosum, quod in monte *Brenner* invisitur, in affectibus præcipue externis ulcerosis, nempe fistulosis maximè præcellens. His Balneis sulphureis omnes predicti effectus plus minus convenient, in subjectis tamen magis pituitosis & serosis, quam calidis, siccis & biliosis. Minus etiam commode hæ aquæ potan-tur, viscera interna nimis calefacentes, siccantes, & situm Tantaleam excitantes. *Balneum* etiam minera-le habemus in *Seelrain* ad fontem rubrum, copioso croco martis imprægnatum. Hoc mulieribus eorumque affectibus præcipue dicatum, utilissimum in sup-pressione mensium, nimio eorum fluxu, obstructioni-bus viscerum, & uteri passione hysterica, abortus præ-cautione, debilitate & laxitate uteri, fluore albo &c. Interim minus convenit, admodum calidis, gracili-bus, siccis & biliosis. Aliud *Balneum* frequentatur in *Valle Volders*, nitro, alumine, vaporibus martiali-bus, & paucissimo sulphure imprægnatum; hinc ca-lecit, siccatur, roborat, effectusque jam ante in gene-re propositos edit. Temperatiora, mitiora subjectis de-bilioribus, ac calidioribus magis apta *Balnea* sunt, illud quod est in *Egerbacci* & illud *Pamkirchi* infra *Halam*, nephriticis, & hypochondriacis multum pro-ficia. Reliqua *Balnea*, in monte *Veneris* in *Foramine* fer-

fornacis in valle Cerasorum minus de mineralibus participant, sive magis ad dulcia accedunt.

ARTICULUS II.

*De Officio Medici, in, ante, & post
Balneorum usum.*

I.

UT Balnea utiliter instituantur, quædam ante, quædam in, & post illius usum observanda sunt Medico. 1. Igitur pro exigente necessitate corpus purgandum, & quidem magis per epicrasin lenioribus, ut v. g. nodulo laxativo, quam fortioribus & draisticis, ac vena, si opus fuerit: secunda. 2. Quoad tempus anni, commodissimum præbent menses non est Rati; quia & dies magis protracti, tempus hilarius, ac homo ipse ad omnes curas magis dispositus, hisque temporibus nocentissima illa antiperistialis, ne ex balneo calido exeuntes, lædantur frigido immmediato, præcavetur. 3. Luna decrescente, si fieri possit, illud inchoandum.

II.

RAtione temporis diei, optimum est tempus matutinum: non exclusis tamen horis pomeridianis, Ante prandium jejunè si fieri possit balneandum: seclus jusculum, ex decocto carnis vel gallinae in aqua thermali concedendum. Post prandium aquis non insidendum, nisi 3. vel 4. horis a prandio, ne lædatur digestio; & variæ cruditates generentur. Consultum est, manè hora quarta vel quinta surgere, bal-

neum frequentare hora quarta vel quinta , ac post prandium hora tertia . In principio nec calidè ; nec profundè insidendum , ita tamen , ut calor successivè aliqualiter intendi possit , cavendo semper ne quid nimis . Ex intensiori enim calore balnei succedunt vigilæ , sitis , dolor capitis , defluxiones , appetitus prostratus , asthma &c. Dignoscitur autem calor intensior , si corpus ad introitum quasi aduratur , si facies more galli Indici excandescens rubeat , aut corpus ipsum quasi sudore dissfluat , intendatur sitis &c.

III.

IN sessus non sit nimis profundus , ac pluribus ad umbilicum tantum usque suadetur , in quo tam certa haud potest dari regula . Profundius enim insidere possunt seniores , melancholici , phlegmatici , ventriculum frigidorem habentes , qui etiam majorem calorem ferunt ; vel affectionibus colli , scapularum vel brachiorum detentis : minus Juvenes cholericis , astutantem habentes ventriculum . Labrum semper sit mundum , tegendum media parte versus collum assercalis ligneis : ex altera vero parte tapete , vel aliis integumentis ; caput etiam lienteis mundis circumligandum , & a calidis balnei ascendentibus vaporibus defendendum . Si Aqua mineralis non per se sit calida : per trihorium prius spumosa ebullitione coquatur , & singulis infessionibus renovetur .

I V.

Longitudinem & horas Balneandi quod attinet, communiter balneum primo die per horum ; altero per duas vel unam & dimidiā, & sic singulis diebus per horam, vel dimidiā crescendo pergitur, usque ad horas 5. 6. 7. tum per 12. 15. vel etiam 20. dies in eodem consistendum, vel eousque, donec quis se alleviatum senserit, & balneum quasi nauferit, quod signum perfectæ curæ, atque hinc demin eo, quo ascensum est modo & tempore, descendendum. Ante prandium semper plus temporis insumentum, adeo, ut si de die per 5. horas balneetur, balneum manè per 3. cum dimidia : vesperi per 2. & dimidiā partem horæ balneandum sit. Alii sequentem observant Tabellam,



OFFICIOSUS; FIF

INSTRUCTION FUNDAMENTALIS,

Qua ratione Hora in secessus Balnei sunt observanda.

Die Horis antemeridianis. Horis pomeridianis.

Inte-

Interim tamen hæc Tabula non est universalis; sed habenda est ratio naturarum, sexus, ætatis, temperamenti &c. multi enim de die ultra 4. vel 5. horas non tolerant, præsertim biliosi, sicci, melancholici; alii plures, ut robustiores, & durioris texturæ homines, ut etiam ad 4. 5. vel 6. septimanas Balneum continuare possint. Quilibet pro regula habeat vires, earumque conservationem, ac balnei tolerantiam; quæ enim læditur balneo, ac cui appetitus dejicitur, abdomen inflatur, ac alia perversa accidentia, quæ ordinario a balneo non procedunt, patitur, satius est, ut vel abstineat, vel cautè balneo utatur. Interim nephriticæ, colico dolore laborantes, hystericæ, in principio Balnei alterationem sentientes, non statim defistere debent, sed cum certiori spe valetudinis pergere, juxta vulgare illud. Quod balneum affert, balneum atrum aufert.

V.

Finita lotione corpus detergendum, lecto per diuidiam saltem horam committendum, ac sudor forte superveniens non impediendus. Si durante balneatione superveniat excoriatio, pruritus, maculæ, scabies &c. quod tamen non est necessarium, balneum tam diu continuandum, donec cutis lævigata priorem formam receperit; si autem aqua tepidior, neque diu tuis eidem immoretur, sed sæpius de die inde exeat, oportet. Consultum etiam est, si nimis diu hoc malum protrahatur, industria quædam in aqua thermali sæpius intincta, & per se exsiccata, peracta balneatione perpetuo gestare, ac m. excoriatas vino calido lavare.

VI. Act

VI.

Aer vitetur frigidus, & si talis sit, hypocaustum moderate calefaciendum, vel corpus sufficientibus vestimentis etiam pelliceis tegendum, neque tamen etiam radiis solaribus exponendum; prandium & cana semper aequalibus instituantur horis, ac quo parcus comeditur. & bibitur thermarum tempore, eo melius est. Extra pastus vini usus vitandus. Urgente siti, vel alias etiam circa medium balneandi tempus, potus aquarum thermalium frigidarum post prandium, vel calidarum ante prandium, cum incoctione *sem. fænic. coriand. vel cinam.* concedendus est. Longa mensa in prandio nocet: minus in cena. Caveatur a varietate ciborum, a satieta, ab acetariis, infumatis, fructibus horariis, lacticiniis, frixis, ex pasta coctis; nimium aromatixatis, saccharatis, salitiis, flatulentis; cibi sint boni succi, ac laudabilis concoctionis, & paucorum excrementorum, ut carnes vitalinae, hædinæ, capreol. leporin. juniores, capon. pull. gallinac. gallin. gallir. indic. avieul. mont. ex piscibus trut. thymal. gobii, fundul. lucii minores, hordeacea, ova sorbilia &c. Pro potu utendum vino albo diluto, pro eiususque natura, & consuetudine. Alvis serveur laxa. Vitandi vehementiores corporis & animi motus.

VII.

Tandem etiam accidentium morbosorum, usui Thermarum subinde supervenientium habenda ratio, & i. *cephalalgiae*, par clyster. lotiones per dum, laxantia, frontalia, & unguenta. *Vigiliarum*, per hordeata, emulsiones, pediluvia, frontalia. *Somnolentiae*, per clysteres acriores, frictiones, caput purgantia, vel cessationem a balneo, si natabilis sit.

Defluxianum, per diætam exquisitam, & aeris correctionem, vel cessationem a balneo, si gravis, donec remittat. *Febris*, per cessationem a balneo, & abstinentiam vini. *Sitis*, per julepos acidulos, emulsiones &c. *Inappetentia*, per evacuationem, appetitum extantia. *Alvi constipationis*, per spinachium, prunus dulcia, poma cocta, ova sorbilia, pilulas Francofurti vel Emanuel. clyst. vel suppositor. *Exulcerationis se efflorescentie cutis*, per continuationem balnei blandioris & tepidioris, vel si etiam major, per V. purgationem, sudorifera &c. *Mensium*, per cessationem, si vehementius fluxus instaret; secus non.

A R T I C U L U S III.

De Officio Medici in prescribendis non nullis Balneis artificialibus.

Balneum Thermale expertissimum, Paul. de S. bait. R. Sulph. viv. apyr. calc. viv. an. lib. 1. M. f. Pulv. qui aliquot ebullitionibus coq. cum ag. fuscum. viij. hinc ab igne removeatur, ut subsideat & refrigerescat per noctem, altero die fiat Balneum pulvnum ex aqua font. calida, ad cuius refrigerium decantetur lixivium pridiè ex speciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere. Post usum Balnei ex eiusdem aqua tantundem reaffundatur ad ollam, in qua pulvis ille subsedit, serveturque reliqua Balnei aqua in cupa bene tecta. Altero die eadem aqua calefacta, altera in olla existens iterum ad refrigerium reaffundatur per decantationem, remanente semper in fundo pulvere. Taliter, quater procedi potest, hinc novæ species recipiendæ. Balneum hoc euporiston Thermi vix cedit, omnibus nervorum, & articulorum doloribus, matricis affectibus, paralysi, calculo &c. accommodatissimum. Ab experientia arthriticis eximiatur exco.

excoriationes creat, quibus copiosus evacuatur ichor cum levamine.

Balneum in Nephritide. R. Herb. veron. pariet. mercurial. malv. cum tot. saxifrag. ononid. an. m. ii. fl. cham. m. iij. sambuc. m. ij. rad. alt. petrosel. fœnic. an. unc. j. ss. sem. lin. unc. iij. fænugræt. unc. j. bacc. Junip. unc. iij. M. incis. dentur S. Species pro balneo.

Aliud R. Stramin. aven. flor. calend. an. q. s. Mi-
see.

Balneum in Scabie. R. Rad. oxylap. unc. ij. enul. camp. malv. an. unc. j. herb. saponar. nepeth. fumar. agrim. veron. an. m. ij. fl. cbamom. m. ij. herb. s. emoll. an. m. j. bacc. laur. unc. ij. sulph. viv. nit. alum. an. unc. ii. M.

Aliud. R. Rad. bryon. unc. i. oxylap. irid. flor. an. unc. i. enul. camp. unc. ii. herb. fumar. scabios. mer-
curial. an. m. i. alum. dr. vi. sulph. dr. x. tart. unc. i. ss. M. S. Herbae & species pro balneo.

Balneum in Fluore albo. R. Herb. artemis. calam. puleg. meliss. ment. satur. hyssop. serpill. thym. arig. absinth. ros. rub. cham. melil. an. m. i. rad. cyper. long. calam. aromat. an. unc. ss. Irid. flor. unc. i. ss. Gumm. ladan. unc. i. saccula inclus. coq. in s. q. aq. pro Balno. Herbae singulis tribus diebus renoventur, ut sinum muliebrem intimius penetreret, per syringam, annexa vesica suilla aqua intropellatur, vel lana, eadem aqua bene madida, in uteri collum intrudatur.

Balneum in suppressione Mensium. R. Rad. aristol. lil. alb. artemis. alth. rub. tint. an. unc. iii. sem. lin. unc. vi. fœnic. unc. i. carv. cumin. petrosel. an. unc. i. ss. bacc. laur. unc. iii. Juniper. unc. vi. herb. malv. melilot. puleg. meliss. mercurial. an. m. ii. fol. sabin. m. iv. fl. cham. m. iii. cent. mint. m. ii. incis. & con-
quass. includ. saccul. qui ex aq. s. q. pro insessu & fo-
tu muliebrium. Prodest etiam hoc Balneum in partu
difficili, foetu mortuo, retentis secundinis &c.

Aliud efficacissimum, teste Riverio. R. Rad. alth.

lil. alb. enul. camp. bryon. cucum. agrest. an lib. ij.
 fol. malv. violar. mercurial. puleg. matricar. meliss. an.
 m. iv. sem. lin. fenugræc. leviter contus. an. unc. ii.
 cog. in aq. s. q. pro Baln. Usu hujus Balnei , ali-
 quando in tertio vel quarto balneo profluxerunt men-
 tes, per longum tempus retenti.

Balneum adstringens , in procidentia Uteri . Rx.
 Fol. beton. agrim. Salv. laur. voris. myrt. puleg. orig.
 fl. stach. arab. baist. an. m. i. rad. consolid. mai. unc.
 iii. bistort. torment. aristol. long. an. unc. ss. alum. roch.
 unc. ii. M. incis. dentur ad chart. cog. in aq. fabr. pro
 Balneo .

Aliud. Rx. Herb. ment. puleg. orig. hyssop. rut. me-
 liss. serpill. salv. maior. lavend. an. m. i. nuc. cupress.
 ros. rub. spic. nard. cort. grand. capul. gland. an. unc. i.
 mespil. immat. acac. an. m. i. scob. lig. Juniper. qua-
 zac. an. unc. iv. sal. nit. sal. commun. an. lib. ss.
 alum. lib. i. M.

Balneum contra Atrophiam Hecticam . Rx Amigd.
 cum cortic. gross. mod. contus. lib. ii. farin. bord. lib.
 vi. indantur facco ampliori , & cog. in aben. cum aq.
 pluv. s. q. tertio die renovetur.

Baln. Hordeaceum . Rx. Hord. crud. si simul abstern-
 gendum , vel excorticat. si magis refrigerandum , &
 humectandum 2. vel 3. mensuræ saccul. indit. cog. in
 s. q. aq. pro Baln. Tertio vel quarto Balneo renove-
 tur hordeum .

Balneum articulos , nervos & ligamenta roborans.
 Rx. Herb. absinth. arthemis. orig. hyper. serp. ill. la-
 vend. an. m. ii. vorism. maior. an. m. i. rad. alth. asar.
 lil. alb. an. unc. ss. fl. cham. sumit. aneth. an. m. ii.
 turion. abiet. conor. seu strobil. eiusdem an. m. iii.
 sem. lin. fænug. an. unc. ss. M. incis. & contus. pro
 Balneo .

Aliud in hunc finem parari solet , ex solis summi-
 tatis , & baccis Juniper .

Balneum formicarum . Rx. Formicarum integrum
 cubi-

tubile , quod sacculo inclus. coq. in si. q. aq. pro Baln. addendo subinde alias herbas vel etiam Mineralia . Prodest in Paralyssi , dolore Ischiadicō &c.

Balneum antiparalyticum . R. Alum. sulph. bacc. laur. an. lib. j. bacc. & sumit. Juniper. an. m. j. vel iij. salv. nob. m. j. M.

Aliud. R. Herb. major. chamæd. chamæpyth. fol. primul. ver. an. m. iij. rorisor. salv. an. m. iij. fl. lavend. primul. ver. an. m. j. bacc. Juniper. m. iij. sulph. lib. iii. nit. lib. i. M. pro Balneo.

Balneum expertum in Sterilitate . R. Rad. bryon. imperat. valerian. Ireos , enul. camp. an. unc. iii. fol. major. arthemis. nept. pulg. mercurial. salv. laur. an. m. iv. bacc. laur. Juniper. an. unc. i. coq. in s. q. aq. pro semicup. Alii etiam addunt acervum formicarum . Sedeat in hoc Balneo , noctu cubitum itura per i. horam: hinc egressa , & abstersa calidis pannis in sellam perforatam sedeat , ac fumum excipiat ex thur. mast. succin. benz. gumm. tacamaab. gumm. anim. troch. alipt. mosch. &c.

Balneum carminativum , & anodynum , in Colica . R. Herb. orig. calam. rut. an. m. iij. fl. chamom. m. iii. malv. cum tot. m. i. ss. melil. m. i. sumit. aneth. m. ii. sem. sing. unc. ii. fænug. unc. i. anetb. unc. i. ss. bacc. Juniper. unc. iii. incif. & conquass. coq. in s. q. aq. pro Balneo .

A R T I C U L U S IV.

De Officio Medici, in consideranda vi & effectu Acidularum, tam in genere, quam in specie.

I.

Acidulæ (quæ nihil aliud sunt, quam vitriolum martis dissolutum: fit autem vitriolum martis, quando minera martis dissolvitur, à spirit. sulph. addo) variis etiam modis probari solent, ut supra dictum de Thermis. Optimus est per præcipitationem: fallax econtra, qui fit per destillationem & evaporationem, tum quia multum de volatili substantia evanescit, tum quia remanens mediante igne alteratur, ac aliam acquirit texturam. Decoct. gallar. infusum, acidulas nigrore tingit, si de marte participant. Infusa aqua salsa turbantur, & quasi lactescunt, si de nitro quid participant. Si quid de alumine, optimi evaporatione dignosci potest. Nobis hic Oeniponti in usu pratico sunt Brusenses, & Egrenæ seu Egrenses. Illæ martiales, vitriolicæ, sulphureæ & aluminoæ: hæ, prioribus magis efficaces, licet minus gratae, nitrosa salina sulphurea aciditate præpollent.

I. I.

Vim suam in corpore exercent Acidulæ, suaviter calefaciendo humiditates superfluas abscondendo, & exsiccando, salia sylvestria sanguinis temperando, hinc æstum viscerum corrigendo, scorrias tartareaes ex latice & tota massa sanguinea avertendo & elutriando, tum per alvum, tum per urinam

nam & sudores, viscerum ac vasorum infarctus detergendo, discrasiam viscerum emendando, ac partibus tandem debitum tonum restituendo; præterea salia acida vitiœsa in corpore absorbendo, & per inferiora eliminando. Dum enim potatur aqua acidula, fermentum stomachi acuit atque exaltat, unde singularis fames: hinc ventriculum a quisquiliis elutriat, tonum fibrarum restaurat, & dum ad intestinum duodenum defertur, vi bilis alcalina pars metallica maris præcipitatur, quæ postmodum iterum apta est, ab omni acidi præternaturalem alterationem suscipe-re, acidum in tertium quasi falsum immutare, illud destruere, absorbere; & hinc excrementa nigro colore plerumque tinguntur, ut illud postmodum per alvum, sèpè etiam per urinam & sudorem eliminetur.

I I I.

EX dictis patet, quod sicuti Thermæ magis præsunt in cacochymia pituitosa & serosa, ita Acidula magis in cacochimia biliosa, & melancholica. Ut autem ad specialia deveniamus, sciat Medicus, Acidulas prodeste, i. In affectibus capitis, non quidem essentialibus, sed per sympathiam partium inferiorum excitatis, a corruptis & vitiosis humoribus idem stabulantibus, ut v. g. in catarrhis calidis, acribus, salfis, vigiliis, vertigine, tremoribus, convulsionibus; ac epilepsiis, si fomes morbi sit mesenterium, lien, uterus, ventriculus, vel causæ sint lumbrici. Item in cephalalgiis & hemicraniis, ex vitio sanguinis aut chylificationis oriundis. In metu apoplexiæ cautè iis utendum. Pareses & contracturas, si non omnino inveteratae fuerint, radicitus extirpant, tam potatæ quam balneo adhibitæ.

IV.

PRæterea quoque auferunt ruborem faciei oculorumque : singulariter verò fermentum ventriculi erigunt, unde appetitum procurant, digestionem promovent, rectus ejiciunt, cardialgias sodas & vomitum maximè matutinum materiae pituitosæ & aqueæ compescunt, inflationes ejus sopiunt, & mineram flatuum evacuant. Præterea prosunt in Veterum antipraxia, vel R. R. chylosi læsa, obstructionibus viscerum, icteritia, chlorosi, & specialiter in colica convulsiva vomitibus infestante, ac malo hypochondriaco, cuius sunt quasi sacra anchora, ac alter Rhizotomus.

V.

ITem maximè conducunt, in nephritide, gonorrhœa, arthritide, rheumatismo, scabie, fluore albo, suppressione mensium, eorum superfluitate, vermibus quoque, quorum certissima sunt antidotus; sterilitatibus quoque multoties opitulantur, febres omnis generis intermittentes tollunt, non tam potæ, diluendo cruditatem nidorosam, ac infringendo acidum volatile oleosum atque corrosivum, verum etiam, si in iis balneetur, præsertim imminentे rigore. Malignis quoque febribus prosunt diluendo, inflammatos spiritus potenter ligando ac pacando, eosque sua vitriolacea, ac quadantentus anodyna vi sopiendo, & causam occasionalem irritantem emendando.

VI.

QUoad affectus externos, juvant Acidulæ præser-
tim omnis generis arthriticos, ischiadicos, po-
dagricos, ophthalmicos, & singulariter paralyticos
ex colica, per modum Balnei adhibitæ. Tollunt ca-
lidè gargarizatæ, scorbutum oris. Virtus quoque illis
adscribitur medendi ozænæ, vermiculis aurium &c.
Balneo usurpatæ, conducunt etiam in pruritu, sca-
bie, serpigne, ulceribus sordidis; corrosivis, rheu-
maticis, phagadænis, & disepuloticis, fluore albo,
sterilitate, suppressione mensium &c.

VII.

Sicuti autem Acidulæ in modo dictis affectibus pro-
sunt, ita necesse est, bibentes præditos esse sto-
macho robusto, pulmonibus que validis, cum omni-
bus ad phthisim pulmonalem inclinantibus Acidulæ
infensissimus hostis sint, hydropici quoque ex eorum
usu plerumque intereant; nocent etiam magis, quam
prosunt, ubi viscera haud integra, ac vel scirrho vel
abcesso, aut tuberculis detenta. Omnia igitur prius
bene examinanda, causæque morborum perpendendæ,
antequam ægroto Acidularis cura præscribatur.



A R T I C U L U S V.

*De Officio Medici, in, ante, & post
usum Acidularum.*

I.

ANte usum Acidularum corpus evacuandum, non quidem fortioribus, M. S. exagitantibus & turbantibus, partesque solidas laedentibus; sed potionē quādam *mannata*, vel *rhabarbarina*, vel *pilul*. *Emmanuel*. aut *nodulo laxativo*, &c. si opus, licet ut plurimum necesse non sit, vena secanda. Tempus optimum bibendi Acidulas, est *Majus*, *Junius*, *Augustus*, nam: *Mensibus in quibus R. non debes bibere*

Vvasser.

Licet urgente necessitate etiam hyeme concedi possint, dummodo vasculum aquæ potabilis adhuc obturatum, lente ad fornacem calefiat, vel per noctem in hypocausto calido steterit, vel aquæ calidæ immergitur, vel dum scyphus argenteus retinetur in aqua ferventi, & infunduntur unc. *iii.* vel *iv.* pro vice mos exauriendæ.

I I.

IN loco scaturiginis bibens, manè hora *4.* vel sufflare debet, excrementa per meatus convenientes excernere, ac una vel altera hora post solis exortum, fontem sine violento motu frequentare, & quidem jejunus, nisi esset tenerioris constitutionis, ac humoribus prædictis tenuibus, fibrisque satis rarib: exilibus; quo in casu vel jusculum carnis, aut ovum foribile, si confortantia ex officinis non videantur suffici-

sufficere, concedi potest: immo in hoc passu, ne ventriculus ita debilis a frigore fontis laedatur, conducibilis est, calidiusculè modo supra dicto, lympha potare.

III.

Bibiturus ac prædispositus, dum ipsum fontem adiit, vel eò vectus est, aquarum potum incipiat, inchoando a 2. 3. vel pluribus vitris successivè ebibitis, prout appetitus exigit, ac natura non gravatur, hinc singulis diebus unum, 2. vel 3. vitra addendo, usque dum deveniatur ad eam quantitatem, quam quis habere poterit absque ullo incommodo, ut v. g. gravitate, dolore, flatibus, vomitu &c. habita tamen semper ratione ætatis, sexus, constitutionis fortis vel debilis, capacitatis ventriculi, ac consuetudinis, maxime autem respiciendum ad tolerantiam. In Acidulis Bruzenibus 4. 5. 6. 8. &c. mensuræ bibuntur. In Egranis quotidie ampulla terrea dimidia cista pro dimidia cura, vel 16. aut 18. una cista integra pro una cura integra. Non autem una vice Acidulæ actu frigide assiatim, & præcipitanter ingurgitandæ, sed 2. vel 3. vitra pro una vice, interpositis dein discursibus, levibus deambulationibus, assumptis stomachicis, ut *confect. sem. anis. fænic. condit. z. z. vel calam. arom. cort. cit. arant. morsell. &c.* ita tamen, ut tota mensura intra horam & dimidiæ ebibatur.

I V.

Potus Acidularum continuandus per dies 10. aut 20. immo per mensem, & ultra, pro morbi magnitudine & longitudine. In morbis contumacibus etiam anno sequenti frequentandæ: secus in levioribus & prophylacticè tantum bibitis; sicuti autem in summa dosi, quæ intra triduum haberi potest, per aliquos dies perseverandum, & præsertim eousque, donec quæ se alleviatum (quod signum erit perfectæ curæ) sentiat; ita rursum gradatim denuo descendendum, quis unam vel alteram tantum biberet mensuram, descendens opus non est; olim etiam vesperi Acidulæ methodicè bibebantur: hodie verò ad sitim denaturat, si forte urgeat tollendam, unum vel alterum vitrellum potatur; vel in affectibus externis Acidula ante prandium potari, post prandium pro Balneo usum pari solent.

V.

Operatio Acidularum diversa, & pro varia corporis complexione, ac humoribus in eo prædominantibus, hinc motus naturæ observandus, ac per convenientia loca adjuvandus. Optima est operatio, si primò per alvum, hinc per urinam, ac tandem per sudorem operentur. Si per alvum, ut melius operentur, consultum est, ut æger noctu, hora 1. ante canam sumat, vel pilul. aloeticas, FF. vel Emanuel. vel in primo vitro Acidularum dissolvat, syr. ros. sol. vel fl. persic. vel ita simpliciter in majori quantitate, vel pulv. syr. aut rad. gial. acuatum vel crem. tart. vel sumatur manè morsul. purg. &c.

V I.

HAUSTIS Acidulis, neutiquam violentis exercitiis utendum, cum etiam in lecto subinde non sine fructu sumantur, sed reliquum tempus ad prandium usque, levibus deambulationibus, discursibus, ludis &c. transigendum, ad aliqualem lassitudinem, eruptionem sudoris. Prandum non accedendum, nisi hora xj. vel saltem 4. horis ab assumpto potu, donec tota vel potissima ejus pars sit excreta, ac urina prius alba, hinc nonnihil colorata fiat. Interim aquas initio potus, vel etiam in ascensu, ægrè reddens, non tamen statim desistere debet, si animosè perieverare, & summitatem curæ exspectare, modo etiam intra 2. horas transeant.

V I I.

EFficaciores sunt Acidulae, suds serenoque, quam nubiloso & pluvioso cœlo, hinc etiam aliò transportandæ, hauriri debent tempore sereno existente, & quidem omni anni tempore. Bruzenses nostræ mensæ Martio collectæ optimæ, antequam nix colliquefcens intimiora terræ penetrando, fontem inquiet. Vitandus igitur in cura acidulari aer intemperatus, frigidus, pluviosus, nebulosus; hinc tali existente: Acidulae domi in hypocaustis calidis bibendæ, aut lectus petendus. Interim etiam vitandi radii solares.

VIII.

IN Diæta vitanda satietas, multa ciborum varie tas, edulia falsa; nimis aromatizata, crassa, viscosa, dura, lacticinia, legumina, acetaria, fructu horarij, caro suilla, infumata &c. econtra conveni bubula junior, caro vitulina, vervecina, leporina hædina, volucres montanæ, caro pul. gallinac. capon. columb. pisces saxat. &c. Pro potu vinum amerum, vel rubellum tenue, non tamen Acidulis lutum. Fugiantur somnus meridianus, exercitia violenta, ludi intensi; mœror, tristitia, ira, venu alvus quotidie sit aperta, secus vel enemato ferò incto, vel infusione sennæ ante potum sumpta, vel emzart. acuato, in primo cyatho sumpto laxanda.

I X.

TEmpore curæ Acidularum, symptomatum ementium quoque habenda ratio, ut v. g. reversionis aquarum, per laxantia, ut rhab. gial. cret. tart. acuat. syr. ros. sol. acuat. vel per cessationem curæ. *Vomitus*, per clysteres, roborantia interna & externa, vel cessationem curæ. *Colicæ*, per clysteres vel cessationem curæ. *Suppressionis alvi*, per pannulas, pruna, poma cocta, spinach. bet. pilul. Emanu clyst. crem. tart. acuat. *Diarrhææ* vires diminuentis per abstersiva, tam per os assumpta, quam clysteres injecta, & roborantia. *Commotionis humorum*, extantis quandoque dolores dentium, lumborum, podagram &c. per continuationem curæ, & abstinentiam a vino. *Fluxus mensium*, per defensionem genitalium à frigore, & potationem Acidularum calidiarum.

X.

Finita Acidularum cura , mediantibus cōviviis & poculis non valedicendum , iter dormum versus citra festinationem instituendum , diæta deinceps exactè servanda , aliquid Acidularum domi adhuc , si placet , bibendum , purgatio , si quis ex retentis aquarum reliquis gravatum se sentiret , instituenda : secus eadem abstinendum . Sicuti autem Acidulæ efficaciores sunt ad scaturiginem potæ , quam aliò delatæ : ita etiam Acidularis cura domi instituta , (quod nonnulli faciunt , vel ut sumptibus parcant , vel quod iter exhorrefcant , vel ob occupationes urgentes domo abesse nequeant) raro singulari cum fructu instituitur ; præser-tim in iis , qui manè Acidulas ad plures libras ingurgitant : postmodum seriis negotiis hinc inde irretiti , spiritibus aliò avocatis & dissipatis , ventriculum debilitant , vel ante prandium lymphis , post prandium verò Baccho litant ; unde his magis consultum , ut ommissa solenni cura , manè lib. 1. vel 1. ss. bibant , leviter de-super obambulando , & exactam diætam servando : post prandium etiam rursus vitrum Acidularum hau-riant , atque sic curam ad 30. dies , & ultra conti-nuent .



A R T I C U L U S VI.

De Officio Medici, in praescribendis Remediis, pro debito usu Acidularum.

I.

R Confect. sem. anis. vel fœnic. aut coriand. prep. lib. i. detur ad scatul. S. Confectio anis. vel fœnic. aut coriand. tempore usus acidularum sumenda.

Morsell. R. Spec. diarrhod. Abb. aromat. ros. complet. an. dr. ii. cort. arant. condit. minutim incis. cir. an dr. iii. nuc. mosch. in ind. condit. dr. ii. confect. sem. anis. fœnic. coriand. an. scr. i. ss. cardam. min. scrup. ii. sacch. in aq. ceras. nig. & cinam. dissol. q. s. M. f. Morsul. S. Morsell. stomach. quorum Tempore usus acidularum unus vel alter sumatur.

Aliud. R. Spec. pro morsul. Imperat. unc. i. condit. z. z. Chinens. cort. cit. nuc. ind. condit. an. um. ss. cardam. dr. i. ss. cubeb. dr. ii. ol. dest. cinam. gut. v. mac. gutt. vii. caryoph. gut. iv. cit. gut. iii. sacch. albiss. in aq. sassaf. cum cinam. destill. solut. lib. i. M. f. Morsell. S. ut supra.

Alii magis temperati pro hypochondriacis, R. Cort. cit. recent. minutissime quadratim incis. dr. iii. sacch. albiss. in aq. spirituof. cinam. dissol. unc. iv. M. f. Morsul.

Tragæa. R. Spec. aromat. ros. diaxyloal. diarrhod. Abb. an. scr. i. cinam. elect. dr. i. unc. mosch. dr. ss. mac. caryoph. an. scr. ss. sacch. albiss. unc. iii. M. f. Tragæa stomach. quæ durante cura acidularum, cum pane & vino post prandium sumenda.

Pilulæ laxativæ. R. Mass. pilul. FF. vel Emmanuel. dr. ii. fermentur. ex scr. i. N. vii. aspergantur cinam.

cinam. S. Pilulæ laxativæ vel Emanuel. Francofur-tenses, quarum 7. una hora ante cœnam sumendæ.

Pulvis pro transitu Acidularum promovendo. *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *ss.* *rad.* *gial.* *scr.* *j.* *M.* *f.* *Pulv.* dentur 8. dos. S. Pulvis laxativus, cuius una dosis in primo potu contrita sumenda.

Alius. *R.* *Pulv.* *epat.* *rub.* *scrup.* *j.* *diagryd.* *rosat.* vel *sulphurat.* *gr.* *viii.* (plus minus) *M.* dentur 8. vel 10. dos. vel *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *i.* *tart.* *vitriolat.* *sal.* *absinth.* *an.* *dr.* *ss.* *ocul.* *canc.* *præp.* *dr.* *j.* *ss.* *sacch.* *albiss.* *dr.* *ij.* *M.* *f.* *Pulv.* ad scatul. S. *Crem.* *Tart.* mixt. cuius dimidia drachma in primo potu sumenda.

Syrupus pro eadem intentione. *R.* *Syr.* *ros.* *sol.* *aur.* vel *j.* *persic.* *lib.* *ss.* detur. ad fistil. S. Syrupus Ros. vel florum persic. cuius tria cochlearia plena in primo potu acidularum sumenda.

Alius. *R.* *Syr.* *ros.* *sol.* *unc.* *iv.* *crem.* *tart.* *scr.* *i.* *ss.* *pulv.* *syr.* *sem.* *mel.* *subact.* *scr.* *i.* *M.* *f.* *a.* vel *R.* *Syr.* *de cich.* *cum rhab.* *diaser.* *ros.* *sol.* *aur.* *an.* *unc.* *i.* *pulv.* *dar.* *gial.* *dr.* *ij.* *M.* *S.* Syrupus laxativus, cuius, antea bene conquassati, unum vel duo cochlearia plena, in primo potu acidularum sumenda.

Morselli, pro eadem intentione. *R.* *Mag.* *gial.* *gr.* *gum.* *gott.* *gr.* *viii.* *conf.* *cit.* *borrag.* *cort.* *cit.* *condit.* *an.* *scr.* *j.* *ol.* *cinam.* *gutt.* *ij.* *sacch.* *albiss.* *in aq.* *borrag.* & *cinam.* *dissol.* *q.* *f.* *M.* *f.* *Morsul.* *N.* *z.* vel *R.* *Pulv.* *rad.* *gial.* *dr.* *ij.* *spec.* *pro morsul.* *Imperat.* *crassifuscule incis.* *flaved.* *cort.* *cit.* *rec.* *an.* *dr.* *j.* *sacch.* *in aq.* *ros.* *solut.* *unc.* *ij.* *f.* *Morsul.* *N.* *iiij.* *æqual.* *magnitudinis.* S. Morselli laxativi, quorum unus ante potum acidularum sumendus.

Electuar. ad eundem finem. *R.* *Polp.* *tamarind.* *unc.* *j.* *cass.* *extract.* *dr.* *vj.* *conf.* *ros.* *unc.* *j.* *rad.* *gial.* *dr.* *ij.* *magist.* *scammon.* *dr.* *ss.* *M.* *S.* Electuarium laxativum, quod in magnitudine parvæ nucis una cum acidulis sumendum.

C A P U T V.

De Officio Medici, in Affectibus indicantibus Purgationem.

A R T I C U L U S I.

De Officio Medici, in Humorum evacuandorum Præparatione.

I.

Cum experientia testetur, ac Medicis in prænotum sit, in quartana, scorbuto, affectione hypochondriaca, cachexiis, aliisque morbi chronicis & lentis, Purgationes fieri quandoque graves, cum torminibus, variis spasmis, violenta humorum agitatione, intestinorum exulceratione, deliquio, passione hysterica &c. quæ omnia symptomata cum contingere soleant, vel ex acrimonia nimia, & corrosivitate humorum evacuandorum, vel quod iidem nimium crassi, viscidii, fixi, immorigeri & a chæo resistentes sint, factis etiam viarum impedimentis, ac exinde natis obstructionibus; indicant remedia Præparantia, quæ nempe alterando, vitiosas humorum qualitates apparant, & quasi præparant subsecuturæ eductioni. Nam ex Hippoc. 2. apb. 9. corpora ubi quispiam purgare vult, fluida faciat oportet. Vocantur etiam digestiva, quasi pepasmum, & coctionem humoribus inducentia.

I I.

*P*reparantia seu digestiva, alia dicuntur universalia, quæ generaliter motui humorum promovendo, convenient, quæ sunt polychresta, & maximè infimi ventris cruditatibus corrigendis debita, ut v. g. trem. tart. vitriolat. &c. Alia particularia seu specia-*lia*, quæ diversos humores peccantes respiciunt, & quadruplici cacochymiae corrigendæ destinata sunt. Sic bilem præparant, quæ sal vol. urinosum plus minus oleosum temperant, amaritatem ejus ac acrimoniam infringunt, obtundunt, saliaque diluunt, qualia sunt nitrata, aqua, acidula, & subamaricantia, *Melan-*
cholicam, quæ acidum fixum absorbent, in salsum mutant, obtundunt, diluuntque, qualia sunt terrea, urinosa, martialia, antiscorbutica, aqua, humoresque adustos diluentia. *Pituitam*, quæ ejus visciditatem corrigunt incidendo, attenuando, eamque fluxilem reddendo, qualia sunt aperientia, salsa, acida, amara, acria, aromatica. *Serum*, quæ salsum & acre ejus corrigit, illique nimis tenue incrassant, qualia sunt glutinosa, mucilaginosa, oleosa, dulcia, terra, & papaveracea.

I I I.

*P*ro legitima præparantium administratione, Medicis officium erit, observare 1. Ea potius convenire in morbis chronicis quam acutis 2. Ex præparatis feligenda, vel saltem admiscenda esse speciran & appropriata, quæ vel huic aut illi visceri specifica, ut v. g. in suppressionem mensium hysterica, in inapetentia, stomachica, in affectibus capitis cephalica &c. 3. Vel texturam fomitis morbifici specificam, contraria specifica textura destruunt, ejusque sapo-

tem p. n. emendant, ut v. g. si acidam non in genere, sed austерum, acerbum &c. corrigitur 4. Sensim ac sensim a debilioribus ad fortiora progredendum esse.

I V.

PRæterea, 5. Notabit Medicus, *præparantia* non nimis diu continuanda esse, & subinde interpolanda *purgansia*, ut, quod separatum ac digestum, capitis mortui instar abstergatur & evacuetur, unde in Germania, ubi longiores curæ haud tolerantur, *præparantia* & *purgantia* simul miscentur, ut contingit in nodulis laxativis, ut una fidelia duo dealbentur parites. 6. Dulcia, ut syrups, qui in italia præsertim *præparantium* vices obeunt, in arodo carnis vel aqua destillatis dissolutos plus nocere quam prodesse, cum saccharata sint fermentativa, erodentia stomacho hostilia, ac quosvis etiam succos corporis viscidiore, & minus activos reddant, hinc utiliora sunt digestiva in forma pulv. decoct. succ. essent &c. 7. In agris calidioribus, siccioribus vel atrophia laborantibus, emperatoria, humidiora & liquidiora eligenda, ut brodia alterantia, serum lact. decocta &c.



ARTICULUS II.

De Officio Medici, in præscribendis Præparantibus, seu Digestivis.

I.

Pulvis digestivus in affectu Hypochondriaco. *R.*
Crem. *tart.* *dr.* *j.* *cryst.* *tart.* *dr.* *ss.* *sal.* *absinth.*
scolopend. *frax.* *an.* *scr.* *i.* *ol.* *mac.* *scr.* *ss.* *M.* *f.* *Pulv.*
S. Pulvis digestivus, cuius magna cuspis cultra plena
una hora ante prandium, & cœnam in juscule petro-
sel. sumenda.

Alius *R.* *Cryst.* *tart.* vel *pulv.* *epat.* *rub.* *scr.* *iv.* *sal.*
absinth. *cich.* *an.* *scr.* *j.* *pulv.* *mac.* *scr.* *ss.* *M.* *f.* *Pulv.*
divid. in *4.* *p.* *&q.* S. Pulvis digestivus pro quatuor
viciose.

Alius in Febribus intermittentibus. *R.* *Crem.* *tart.*
dr. *j.* *ss.* *sal.* *absinth.* cert. *min.* *tamarisc.* *an.* *scr.* *i.*
ii. *frax.* *scr.* *ij.* *flor.* *armon.* cum marte sublimat. *scr.* *i.*
M. *f.* *Pulv.* *divid.* in *ix.* *p.* *&q.* S. Pulvis digestivus
in febribus. Detur unus ex brodio decoct. rad. petro-
sel. cichor. fœnic. &c.

Alius in Cachexia. *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *j.* *tart.* *vi-*
nat. *sal.* *absinth.* *an.* *dr.* *ss.* *ocul.* *canc.* *præp.* *scr.* *j.*
M. *f.* *Pulv.* *divid.* in *4.* *p.* *&p.*

Alius in Scorbuto. *R.* *Tart.* *vitriolat.* *sal.* *genist.* *ab-*
subh. *an.* *scr.* *j.* *ss.* *ocul.* *canc.* *fœculari.* *an.* *scr.* *j.* *elæo-*
sach. *cit.* *anis.* *an.* *gutt.* *ij.* *cinam.* *gut.* *j.* *M.* *f.* *Pulv.*
divid. in *4.* *p.* *&q.* detur una dos. ex seq. Brodio.
R. *Herb.* *rec.* *cochlear* *nasturt.* *aquat.* *acetos.* *Hispan.*
an. *P.* *j.* *contusis* *affund.* Brod. carn. non salit. & ferv.
unc. *iv.* Coletur.

Pulvis absorbens Wedelii. *R.* *Vitriol.* *mart.* *gr.* *vj.*
conch. *præp.* *ocul.* *cant.* *corall.* *rub.* *præp.* *antim.* *diaph.*

einnab. antim. an. scr. ss. laud. op. gr. j. ol. dest. ca.
ryoph. gut. j. M. f. Pulv. divid. in 6. p. & q. S. Pul-
vis absorbens, pro 6. vicibus. Utiles sunt in cardial-
gia, affectu hysterico, hypochondriaco &c.

Julepus digestivus in affectibus Capitis frigidis. R.
Aq. fœnic. hyssop. an. unc. iv. beton. salv. an. unc. ii.
syr. de hyssop. unc. ii. de stachad. de beton. an. unc. i.
oxymel. squillit. unc. i. ss. essent. rorism. dr. ii. M. S.
Julepus digestivus de quo mane & vesperi dimidium
octavae partis sumatur.

Alius in affectibus Mulierum frigidis. R. Aq. hy-
sop. fœnic. arthemis. meliss. puleg. an. unc. iv. cinam.
unc. ij. syr. aperit. Minderer. unc. iii. de arthemis. com-
pos. unc. ij. spirit. sal. gut. xxx. M. S. Julepus digesti-
vus pro 6. aut 7. vicibus sumendus.

Alius anti Scorbaticus. R. Syrup. scelotyrb. Forest.
unc. iii. syr. de core. cit. de pom. s. an. unc. ij. aq. scorz.
q. s. claris. & aromatiz. cum. aq. cinam.

Apozema digestivum in affectibus Pectoris frigidis.
R. Rad. fœnic. enul. glycyrr. an. unc. ss. Ir. flor. dr. ij.
herb. marrub. capill. ven. hyssop. agrim. beton. an. m.
ss. sem. fœnic. dr. ij. urtic. dr. j. fic. N. v. passul. min.
dr. vi. incis. coq. ins. q. aq. font. in col. lib. j. ss. dis-
sol. syr. de prass. de hyssop. de liquir. an. unc. j. oxymel.
s. unc. j. ss. squillit. unc. ss. aq. asthm. unc. j. ss. ci-
nam. dr. vi. M. S. Julepus digestivus pro 6. vel 8. vi-
cibus sumendus.

Aliud in affectibus Melancholicis. R. Rad. cichor.
bugloss. an. dr. vi. polyp. q. unc. ss. liq. dr. ii. herb.
borrag. bulg. an. m. ii. capill. ven. meliss. ceter. an.
m. ss. fol. senn. dr. x. sem. cit. fœnic. anis. coriand.
præp. an. fer. i. fl. Borrag. bulg. anth. an. p. ii. pas-
sul. unc. i. ss. coq. in s. q. aq. font. ad. unc. xv. in
Col. dissolv. syr. de fumar. de . lupul. de cort. cit. an.
dr. vi. M. f. apoz. pro 3. dos.

Succi digestivi cum brodiis alteratis, in affectu hy-
pochondriaco. R. Succ. depurat. & per setac. trait. cichor.

cichor. borrag. endiv. vel agrimon an. unc. i. Juris pulli vel gallin. in quo coct. sint. malv. endiv. meliss. lupul. unc. iv. M. pro una dosi , & sic pro ceteris, interiectis subinde lenitivis.

Mixtura & Essentia in Obstructionibus. R. Spirit. sol. spirit. tart. an. scr. ii. Elix. vit. Marib. propriet. P. an. scr. i. M. ad vit. S. Mixtura & essentia aperiens, vel digestiva, cuius circiter 15. aut 20. guttae in juscule petrosel. mane & vesperi fumenda . Vel R. Elix. prop. P.scr. ii. spirit. tart. aperit. Penot. sal. armon. an.scr. i. M. S. ut suprà.

Alia . R. Mixt. simpl. unc. ss. Essent. cent. min. co-
chlear. an. dr. iii. scolopend. dr. ii. tinct. mart. dr. i. ss.
M. S. ut supra .

Atque hæ formulæ sufficient , ut pro varietate
Affectionum , mutatis paulisper mutandis , Neopracticus
has imitari possit .

ARTICULUS III.

De Officio Medici , in evacuatione corpo- ris Lenitiva .

I.

CUM catharsis , seu evacuatio per alvum , alia di-
catur selectiva , quæ è secunda vel tertia re-
gione humores vi selectiva evacuat : alia lenitiva ,
quæ leniter , & sine vi primæ regionis quoscunque
humores educit , de hac præsenti loco mentio facien-
da. Intelligitur autem per primam regionem ventri-
culus , intestina , mesenterium , pancreas , lien , &
pars concava epatis , sicuti per secundam , epatis pars
convexa , vena cava , arteria aorta , & quidquid in-
ter alas , & inguina situm est : per tertiam verò mu-

sculi, ossa, omnisque corporis moles ad extimam usque
superficiem.

II.

Indicatur medicamenta *lentiva*, in quavis caco-
chimia, vel potius cacochylia primæ regionis
succis vitiosis jam à sanguini commixtione separatis
præsertim ubi alvus non est aperta, & quando ve-
ob virium debilitatem, vel ob acidi excessivi copiam,
aliorumque humorum fermentescibilem qualitatem
& effrænam spirituum excandescentiam, ipsa purgan-
tia vera exulare jubentur, ut v. g. in colica hypochondriaca,
affectu hyttérico, scorbutico, pathematibus
convulsivis, spasmodicis, morbis acutis, febribus in-
flammatoriis, morbis acutis puerarum, gravida-
rum, hæmorrhagiis, tabe hectica, phthisi &c.

III.

Medicamenta *lenitiva*, (dicta etiam laxativa,
minorativa, eccoprotica, benedicta) virtutem
suam in corpore exerunt, vel emolliendo & lubrican-
do, qualia sunt *aquea mucilaginosa*, *oleosa*, *unctuosa*,
& *pinguia*; vel fordes detergendo; qualia sunt *salina*,
acidula, *terrea* ut *tartarea*, *nitrosa*, *salsa*, vel leniter
irritando & stimulando; qualia sunt *purgantia tum li-*
niora, tum alia minori dosi exhibita.

IV.

Pro debito usi remediorum *lenitivorum* observet
Medicus. 1. Ea semper exhiberi posse, ubi alvum
apertam esse bonum est, sine etiam praecedente co-
ctione. 2. Ea vel per os assumi vel per clysteres infun-
di. 3. Lenitiva lubricantia magis convenire in siccita-
te intestinorum: stimulantia & detergentia in eorum
repletione. 4. Lenientia a multis commodissime ex-
hiberi hora una ante prandium, v. g. *pruna cocta*,
superhibendo parum vini lymphati: ab aliis hora una
ante cœnam, ut v. g. *pilulae Francofurt.* 5. Pilulas
leuentes aloeticas obesis magis convenire, quam gra-
cilibus, & hypochondriacis, in quibus pro nunc qui-
dem juvant, alvum aperiendo: in futuram autem
nocent nimium exsiccando & calefaciendo hinc major
postmodum alvi stipticitas.

V.

Præterea 6. notabit, cavendum esse, ne natura
frequentioribus clysteribus affuescat. 7. Remedia
pallulata in alvi siccitate cum viscerum servore & ca-
lore ceteris omnibus præferenda esse. 8. Pruna subin-
de ob acidum occultum, præsertim in colicis affecti-
bus minus profuisse. 9. Purgantia seu lenitiva plan-
tis pedum, vel umbilico illita, incerta & infida es-
se, tortmina saepius excitantia. 10. Huc quoque spe-
ciare suppositoria, vel mellea, vel globuli ambra-
irritando alvum moventia.

ARTICULUS IV.

*De Officio Medici, in prescribendis formulæ
Remediorum Lenientium.*

I.

Pruna laxativa facile parabilia. *R. Fol. senn. scr. ii. z. z. incis. scr. i. sacch. unc. ss. ligata in linteolo coq. cum prun. dulc. N. xiii. inf. q. aq. addendo in fine mann. dr. vi. M. S.* Pruna laxativa una hora ante prandium sumenda.

Alia *R. Fol. senn. f. unc. ii. z. z. cinam. an. scr. i. aq. endiv. vin. alb. an. unc. vii. infund. per hor. 10 bull. ad consumpt. 3. part. in express. prun. Hungar. enucleat. ad lib. ss. coq. ad syrup. consist. cum facili unc. ii. add. syr. ros. sol. unc. i. ss. aq. cinam. at ii. M. S.*

Alia *R. Prun. damascen. enucleat. lib. ss. coq. f. q. aq. simpl. de Colat. ferventiss. R. lib. i. ss. fol. senn. sel. f. unc. i. crem. tart. dr. ii. ss. cinam. acut. dr. ii. stent in infus. per hor. 4. in loco calido, bim. ebull. semel atque iterum, exprim. & col. Colatura a fundatur prunis. S. ut supra.*

Passulæ laxativæ paratu faciles. *R. Passul. Corin. vin. alb. lot. unc. vi. fol. senn. f. in linteolo ligat. unc. vel j. ss. affund. aq. q. f. ut tegantur passul. lenite ebulliant, stent vase probe tecto in loco calido. 5. vel 6 horis: hinc abieclo sacculo, utere passulis, pro cætate & viribus patientis.*

Alix *R. Fol. senn. f. unc. ii. coq. in aq. lib. i. ad consumpt. 3. part. in Colat. infund. passul. min. exanimat. lib. ss. coq. ad mollit. add. syr. ros. sol. dr. vi. M. S.*

Alix

Aliæ r. Fol. senn. f. unc. ii. z. z. dr. ii. cinam.
mac. galang. an. scr. ii. in aq. coq. font. lib. ii. ad con-
sumpt. med. stent. in loco calido per noct. mane col. cum
express. dissolv. sacch. alb. unc. vi. coq. ad consist. Julep.
ul. iniiciantur passul. vin. alb. lot. unc. vi. repone in
vase fistili S.

Aliæ fortiores. r. Passul. min. mund. lib. ss. vin.
alb. opt. lib. i. stent in infus. per noct. m. adde sacch.
albjs. unc. iv. coq. ad consumpt. vin. hinc insperge resin.
gial. subtiliss. pulv. scr. iv. M. exactissime.

Vinum passulatum Timæi. r. Passul. mai. min.
an. unc. iii. fol. senn. f. unc. i. cinam. acut. dr. iii. con-
tund. in mortar. ad. past. affund. vin. Rben. opt. lib. iv.
sent. in infus. per diem. & noct. Colat. exprim. & col-
per chart. emporet.

Aqua passulata eiusdem. r. Passul. min. mund. unc.
ii. ceras. nig. exsiccat una cum nucleis unc. i. contund.
in mort. marmor. ut fiat quasi pasta, affundendo aq. fluv.
lib. iv. ss. cog. ad remanent. lib. iii. in colat. ferventiss.
infund. fol. senn. f. dr. vi. fl. viol. p. i. cinam. acut. dr.
ii. stent. in loco calido per hor. iv. Col. & filtretur per
chart. emporet. S. ut supra.

Alia vulgaris, & facile parabilis. r. Fol. senn. f.
unc. i. passul. min. unc. iv. cinam. dr. iii. fl. viol. m. i.
crem. tart. dr. ii. bis super affunde aq. fervet. lib. iii.
sent per noctem, hinc colentur.

Decoct. Prunor. cum fol. senn. crem. tart. sem. anis.
cinam. &c. idem præstant.

Brodium Mannatum. r. Mann. el. ab. unc. i. ad. 2.
succ. cit. rec. express. dr. i. ss. vel ii. vel crem. tart. dr. i. M.
dissol. in f. q. Brod. carn. vel gallin. Col.

Aqua laxativ. Viennensis. r. Aq. laxat. Vienn.
unc. iii. iv. vel iv. succ. cit. rec. express. dr. ii. vel crem.
tart. dr. ss. ag. cinam. bugl. vel fl. nymph. dr. ii. M. S.
Aqua laxativa Viennensis in una vice sumenda.

Alia vulgaris. r. Aq. laxat. commun. lib. ss. nit.
Drap. gr. xii. M. vel r. Aq. laxat. vulg. unc. iv. mu-
char.

char. vel *syr.* *ros.* *sol.* *unc.* *i.* *ss.* *crem.* *tart.* *scr.* *i.* *nd*
præp. *scr.* *ss.* *M.* *S.* Aqua laxativa communis, ve
mixta in una vice sumenda.

Julepus laxativus. *R.* *Fol.* *senn.* *f.* *scr.* *iv.* *liqui*
ruf. *scr.* *i.* *cinam.* *scr.* *ij.* *contus.* *affund.* *aq.* *feruen*
lib. *i.* *stent* per horam dimidiam, *Colat.* *sine expre*
add. *syr.* *viol.* *unc.* *ss.* *M.* *bibantur.* *unc.* *iii.* *vel* *in*
subfrigidæ.

Pilul. laxat. *R.* *Mass.* *pilul.* *F.* *F.* vel *Emanuel.* dr.
formentur ex *scr.* *i.* *N.* *vii.* *viii.* vel *ix.* *S.* suo nomin
Quorum *7.* *8.* vel *9.* hora ante cœnam sumenda. A
idem valent, pilul. Clariss. *D.* *Grembsii*, vel Aqu
pendent.

Pulv. laxativ. *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *iii.* *divid.* ad *2.*
æq. *S.* *Crem.* *tart.* *præparat.* cuius una dosis in una
ce in brodio una hora ante pastum sumenda.

Alius. *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *ii.* *diagryd.* *scr.* *i.* *M.*
Pulv. *S.* *Crem.* *tart.* *acut.* vel *mixt.* cuius unus vela
ter cuspis cultri plena in brodio carnis sumenda.

Alius. *R.* *z.* *z.* *tart.* *alb.* *an.* *dr.* *i.* *sacch.* *albiss.* *fo*
senn. *f.* *an.* *dr.* *ii.* *M.* *f.* *Pulv.* *in juscule carnis ve*
haustu vini exhibendus.

Alius *R*habarbarinus. *R.* *Crem.* *tart.* *dr.* *iii.* *rhab*
el. *dr.* *ii.* *cort.* *flav.* *arant.* *dr.* *i.* *M.* *f.* *Pulv.* *cuius D*
dosis dr. *i.*

Bolus. *R.* *Cass.* *rec.* *extr.* *unc.* *ss.* vel *dr.* *vi.* Detur
semel vel bis in septimanda.

Electuar. lenitiv. Burrhi. *R.* *Mann.* *el.* *unc.* *iii.* *ss*
de alth. *Fernel.* *rosar.* *sol.* *violar.* *solut pom.* *redol.* *ca*
extract. *pulp.* *tamarind.* *sol.* *senn.* *sel.* *pulv.* *an.* *unc.* *i*
Mannæ contusæ immisce syrup. *¶ his adde reliqua.* *S.*
Electuarium laxativum, cuius *z.* aut *3.* *drachmæ*, vel
dimidium cochleare plenum sumendum.

Aliud. *R.* *Cass.* *rec.* *extr.* *pulp.* *tamarind.* *an.* *dr.* *vi.*
mann. *el.* *cum aq.* *viol.* *dissol.* *unc.* *i.* *ss.* *pulp.* *fol.* *senn.*
dr. *ii.* *cum f.* *q.* *syr.* *viol.* *M.* *f.* *Elect.* *moll.* vel *R.*
Pulp. *passul.* *min.* *mund.* *tamarind.* *fl.* *cass.* *an.* *unc.* *ss.*

andit. cort. arant. dr. iii. pulv. rad. gial. dr. i. ss. cum
de cich. cum rhab. f. q. M. f. Elect. S. ut supra.
Clyster. Domesticus simplicissimus. R. Brod. carn.
i. mell. crud. cochl. v. ol. oliv. cochl. vi. sal. comm.
i. M.
Alius. R. Brod. carn. non salit. lib. i. sacch. rub.
ii. ol. oliv. vel lin. unc. ii. vel iii. cum vitell. ov.
pauco sale M. f. Clyster.

Alius magis compositus. R. Herb. malv. m. ii. fl.
chamom. m. i. sem. carv. dr. ii. coq. in s. q. aq. font.
in Col. lib. i. dissolv. sacch. vel mell. crud. vel mell. ros.
aut mercurial. unc. ii. ol. oliv. vel sem. lin. violar. cha-
mom. lil. alb. unc. ii. vel iii. vel loco horum butyr. rec.
sal. scr. i. M.

Alius lacteus. R. Lact. vaccin. rec. mulct. lib. i.
vel i. ss. sem. carv. dr. ii. subinde & fl. cham. m. i.
coq. ad lib. i. add. sacch. rub. unc. ii. ol. sem. lin. unc.
ii. butyr. rec. unc. i. vitell. ov. N. i. M. f. Clyst.

Alius R. Decoct. emolt. lib. i. dissolv. cass. extr. pro-
cyst. dr. vi. sacch. rub. unc. i. ss. ol. amygd. lib. alb.
chamom. an. unc. i. vitell. ov. dr. i. sal. scr. i. M. f.
Clyst.

Suppositorium. R. Suppositor. ex melle parat. N. 2.
S. Suppositoria mellea, quorum unum post alterum
sumendum.

Aliud fortius. R. Vitell. ov. addurit. coct. N. i. fell.
bov. liquid. q. f. M. f. Supposit. quod Viennæ supposi-
toria Imperatoris appellant, vel paretur ex sapone,
clumine &c.

Plura vide infra de Purgantibus.

ARTICULUS V.

*De Evacuatione per alvum.
selectiva.*

I.

PURGATIO per alvum propriè sic dicta , ex secunda & tertia regione evacuans , indicatur a *cacochymia* , quæ est redundantia humorum vitiosorum , sanguinis consortio separatorum , vel eidem superstantium , ut adeò pateat , Purgantia in omnibus morbis convenire , qui dependent a faburra vitiosorum humorum sanguini haud intimè commixtorum . Sicut autem non tantum indicantium , sed etiam coindicantium , vel contraindicantium habenda ratio ; ita etiam in purgatione hæc consideranda : vires nempe , temperamentum , habitus corporis , ætas , sexus , confusudo , clima , &c.

II.

QUOAD Vires , sint hæc ad purgandum semper validæ , vel falso mediocres ; præsertim autem a vehementibus purgantibus cautè abstinentiam ex Hippoc. 1. aph. 3. *Evacuationes* , quæ ad extremum ducunt , pericolosæ ; & 2. aph. 51. plurimum & repente evacuare pericolosum . Habent enim fortiora purgantia virulentiam quandam nocivam , ac malignitatem absconditam , qua indiscriminatum , tam rocrementosi , quam alimentitii corporis succi resolvuntur , colliquantur , ac in fôrdes convertuntur ; hinc vires maximè debilitant , tormina spasmodica , subinde in manifestas convulsiones terminantia excitant , hyper-

hypercatharses tetras & perniciosas creant, ac mortem sàpè inferunt.

III.

Quoad *Temperamentum*, facilius purgationem ferunt, qui sunt temperamenti calidi & humidi, habitusque eusarchi & carnosí, quam corpora calidiora, sicciora; graciliora, vel nimis pinguia. Quoad *Etatem*, facilimè fert purgationem ætas media, difficillimè infantia & senectus, & non nisi benigniorum. Tempore *Menstruationis*, mulieres minime purgande, neque etiam, si mors instet. *Gravidæ*, ex *Hippoc. 4. aph. 1.* tutiùs a mense 4. ad 7. evacuantur, dum ait: *Prægnantes purgabis, si materia turget, quadrimestres, & usque ad septimum mensem, sed bas parcius.* Quia tunc temporis fœtus utero fortius adhæret, sumpta similitudine a fructibus arborum, primò & ultimo tempore facilius decidentibus. Hoc seculo Purgationes lenitivæ, & blandiores, quolibet ferè graviditatis mense exhiberi solent, in morbis a cacochymia oriundis, seu turgente, seu concocta materia, ubi majus impendens periculum ex parte cacochymie morbum producentis, quam ex commotione a purgante excitata, licet tutius mediis, cautius verò primis & ultimis mensibus procedendum sit: immò, nisi cacochymicæ quædam gravidae evanescunt, sàpius statim a puerperio in morbos graviores incident. *Puerpere*; lochiis naturaliter fluentibus nanquam purgandæ, bene tameu, si quantitate diminuta, vel qualitate vitiosa peccaverint, non tamen in principio, sed, materia cocta, transactis 8. 10. vel 12. diebus a partu, & quidem eo tutius, quo longius puerpera distat a partu. Teste enim experientia, mulieres laborantes suppressione lochiorum, si post septimum, vel nonum fluxu alvi corripiantur, ut plurimum liberari: si ve-

si verò primis diebus, puta 2. 3. vel 4. ut plurimum interire solent.

I V.

QUoad Aeris statum, Purgationi maximè conveniens est temperatus vernalis, hinc autumnalis, De priore Hippoc. 6. apb. 47. ait: *quibus venesectio aut medicamentum purgans confert, iis verno tempore sanguinem detrahere, aut medicamenta purgantia exhibere oportet.* Minus frigidior & æstivus, ex Hipp. 4. apb. 5. ubi ait: *sub canicula & ante caniculam, difficiles ac molestæ sunt purgationes.* Feliciori successu etiam exhibentur luna decrescente quam crescenti, in qua humores & tumores augentur; interim haec coindicatio aut contraindicatio desumpta ab astris, vel anni temporibus, attendenda tantum absente uigentia, in purgatione præservativa. Quoad reliqui assueti facilius purgantur, quam inassueti; morbi calidi etiam minus tutè admittunt purgantia validiora. Quod parvo etiam utuntur alimento, in purgationibus facile in animi deliquium incidunt, ex Hippoc. 2. apb. 36. Tandem quibus *alvus* nimis *suppressa*, catharticum exhibere minus tutum est, nisi præmisso encamate.

V.

QUoad Tempus morbi purgationi aptissimum, si lud est ejus principium vel declinatio. Nam ex Hippoc. 2. apb. 19. in principio morborum, si quid manendum videtur, move, cum vero consistunt, ac viagent, quiescere melius est. Item 2. apb. 30. circa initia & fines morborum, remissiora sunt omnia, in vigore vehementiora.

Ut autem Medicus hoc in passu ritè suo fungatur officio, obserbat 1. Purgationem lenitivam, ut potius eva-

evacuantem succos primæ rogionis, a sanguinis commixtione jam separatos, semper fieri posse etiam sine præcedente coctione. 2. Purgationem selectivam etiam fieri posse, non exspectata coctione, in principio omnium morborum descendantium, ex vera cacochymia, humoribus pravis a sanguine, vel jam omnino separatis, vel eidem saltem supernatantibus, dummodo absit febris continua. 3. In morbis acutis cum febris, ut v. g. febribus continuis, malignis, viscerum inflammationibus, purgationem non convenire, nisi existente materia cocta, vel turgenti, & de his præcipue intelligendus est *aphorisi*. *Hipp.* I. *aph.* 22. *que cocta, maturaque sunt, medicamento purgante educere convenient, non cruda, nec per initia morborum, nisi humores turgeant; plurimi verò non turgent.*

V I.

UT autem allegatus *aphorismus* rite intelligatur, sciendum, materiæ cruditatem in alio non constere, quam in tali humorum statu, quo sanguini uniti, & intimè permisti, naturalem ejus fermentationem turbant, & eam in effervescentiam febrilem concitant. *coctionem seu pepasnum econtra, in debita separatione, & quasi præcipitatione per motum fermentativum, quo recrementa, & heterogenea salia cœciota, instar capitis mortui a sero imbibita, per viscerum cibra, & quasi filtra secerni, & per consuetas vias evacuari solent.* Sicuti enim cerevisia novella, sed mustum turbidum, per quæcunque instrumenta colatum, non reddetur clarum, bene tamen quod fermentando depuratum fuit; ita quamdiu fæces recrementosæ, per fermentationis motum separatæ aut præcipitatae non sunt, tam diu inutilis, immò perniciosa erit purgatio, nihil aut parum educens, vel humores simul utiles evacuans, corpus liquefaciens, hu-

mores magis turbans; hinc tormina, animi deliquia, vertigines, convulsiones ac sudores syncopticos excitant. *Turgescentia* tandem, seu *orgasmus* materia consistit in humoribus impetuose in corpore discurrentibus, partesque lacescentibus, & in vias evacuationis vergentibus, seu in impetuosa effervescentia, dum materia morbifica abundans, immoderatè nimis effervescit; & rapidè per vasa movetur, instar multe ex vino generoso impetuose nimis ebullientis, & vasa nimis arctè conclusa rumpentis; hinc observamus in tali casu, in principiis; vel augmentis morborum quandoque excitare vomitus, diarrhoeas, aut hemorrhagias symptomaticas. In tali *turgescentia* Hippocratis purgationem admittit statim instituendam dum 4. aph. 10. ait: *purgandum in valde acutis, ad sui excretionem invitet materia, eodem ipso differre enim in talibus, malum est.* Cum periculum sit, ne humores mobiles, impetu illo concitati, partem aliquam principem ruant; interim & magna cautela, & circumspectione opus est, ne tempestivè irritentur crabrones, hinc multi in hoc casu præferunt purgationi, venæsectionem.

V I I.

SIcuti verò materia morbifica febrilis cruda, cura regulari evacuari non debet; ita de cura coacta eam subinde tollere oportet, per purgationem minorativam, dum nempe humores pravi ita copiæ luxuriant, ut venæsectione tolli nequeant omnes, a natura sive velutini incoctiles vel insuperabiles, imineatque magnum vitæ periculum, nisi per minorativam aliqua portio prius tollatur, & natura alleviatur. Vomitoria hoc in passu optima sunt, sequentes in leni abstersivo cathartico, de quibus infra. Praeterea quoad tempus purgationis, in morbis exacerbatio-

bationes vel paroxysmos habentibus, convenire purgatio die remissionis, vel intermissionis, vel ipso die paroxysmi; ita tamen, ut affectum suum ante paroxysmi invasionem compleat, qua ratione Pet. Monav. apud Craton. l. 2. consil. fol. 417. apparente aliqua coctione, plurimas febres intermittentes sustulit.

VIII.

Locus, per quem instituenda Purgatio, demonstratur tum a natura humorum, tum ab eorum subsistentia seu vergentia. Nam ex Hippoc. i. aph. 21. que educere oportet, quo maxime vergunt, eò ducito per loca conferentia. Quantitas purgationis, ostenditur a quantitate humoris peccantis, cum omnis sit evacuandus: nec si minus, camarina tantum moveatur, vel si plus, hypercatharsis excitetur. Evacuandus simul & semel totus humor, si materia pauca & vires robustæ, vel levioribus æger non moveantur, vel assuetus sit purgantibus, aut corpus habeat durius, & laboribus exercitatum: econtra partitis vicibus, & per epicrasin, si materia multa, et si vires robustæ, vel si vires debiles, aut æger a quovis assumpto facile purgetur, vel sit inassuetus, aut habitu corporis molli prædictus. In dubio, præstat naturam, haud satis perfectam & cognitam, mitioribus explorare, quam valentioribus temerè aggredi.

I X.

Signa perfectæ purgationis sunt, appetitus rediens, urina denudò naturalis redditæ, corpusque insigne alleviatum. Sic Hippoc. quoque duo proponit signa, & quidem primum. 1. apb. 23. si talia evanescunt, qualia oportet, & si plurima sint, & æger beneferat, (id est, utilitatem ex purgatione recipiat) Alterum, 4. apb. 19. ubi ait: qui potionē medica, purgantur, non sitiunt, ipsorum purgandorum finis non fit, donec sitiverint. Oritur autem sitiis non ob calorem sed ex aliquali humiditatis ventriculi, partiumq; vicinarum absumptione.

X.

Medicamenta *Purgantia*, licet ab humoribus quos evanescere credebantur, Veteribus alia dicuntur *Phlegmagoga*, quæ pituitam alia *Cholagoga*, quæ bilem, alia *Melanagoga*, quæ melancholiam, alia *Hydragoga*, quæ humores ferosos, alia *Midaga*, quæ mixtos, alia *Panchymagoga* seu *catholica*, quæ omnes humores evanescant; probabilius tamen est juxta RR. nullum catharticum celestivè purgare, id est, specialem aliquem humorē educere; sed ab omnibus, primò per irritationem fæces alvi ordinarias, seu scybala crassiora, hinc aquosa vel saltem liquida, bilem nempe, ac succum pancreaticum, tandem mucosa, variaque heterogenea, quæcumque in sanguine contenta eliminari, ita tamen, ut fæces seu fôrdes tam variæ, & subinde tam horide, fœtentes, non semper formaliter in corpore ita existant, sed tales evadant, nunc ex actione medicamenta colliquativa, & quasi putrefactiva, nunc ex ipsis remediis tingentibus, & nauseosum aspectum excremen-

tis conciliantibus, nunc etiam ex mutua sordium miscela, tum inter se, tum etiam cum bile & succo pancreatico.

X I.

Licet autem *purgantia* nullum selectivè humorem purgent, nihilominus tamen non promiscuè usurpanda, sed distinctio inter eadem facienda, tum quia *purgantia* nonnulla præter vim laxativam, alias proprietates certas conjuncta habent, tum quia subjectum purgandum, nunc facilioris, nunc difficilioris est laxationis, nunc certis affectibus obnoxium, qui per *purgantia* vel irritantur, vel exasperantur, tum quia materia evacuanda nunc plus, nunc minus obsequens, variumque situm, & subsistentiam habet.

X I I.

Vim suam catharticam exercent *purgantia*, tum sua acrimonia salino sulphurea, irritando tunicam membranaceo glandulosam ventriculi & intestinalium, ac orifica ductus pancreatici, & choledochi, ac vermiculationes crebriores, & repetitas spasmoidicas contractiones, atque contentorum excretiones concitando, tum vi fermentativa humores, seu massam sanguineam resolvendo, ejusque contenta nunc excrementitia, nunc etiam quandoque alimentitia alterando eorumque texturam dissolvendo, fundendo, & in liquaminis serosi consistentiam colliquefaciens, ut adeò actus purgationis sit instar actus cuiusdem febrilis, cum sanguis in sua mixtione turbetur, nova & insolida inducatur fermentatio, contextus glandulosi & fibrillæ intestinales irritentur, humores quasi a febre colliquativa, collquentur, symptoma febrilia, ut sitis, nausea, inappetentia, lasitudo, dolor capitis, &c. excitentur: immò per abu-

sum etiam horrendæ convulsiones , ac ipsa quandoque mors.

X I I I .

QUo ad usum & regimen *purgationis* , obseruet Medicus . 1. In libera & electiva purgatione , eligendam diem temperatam , ac vitandas esse luna quadraturas . 2. Assumendum esse purgans manè junè , nisi vel paroxysmus manè infestet , vel urgens impellat affectus , vel animus sit sumendi pilulas , quæ si leviores , commodius hora una ante cænam , si fortiores , duabus post cænam assumuntur . 3. Purgantia potulenta calidè , vel potius tepide propinata , citim operari : difficilius autem sumi & retineri , ob nauseam , pro qua tollenda , & Vomitu impediendo , naribus obstruendæ , linteolum vel panis tostus acetosidus , naribus admovendus , buccella cydoniati fomenta , vel cortex cit . aut amygdalæ , aut aliud saponem medicamenti obscurans masticandum , vel vino ac spiritu ejus eos colluendum . 4. Aerem ac potum frigidum hoc tempore cane pejus & angue vitandum . Si purgans nullam vel parciorem post 4. vel 5. hora operationem eliceret , eadem promovenda erit suppositioriis , clysteribus , exhibita desuper aqua laxativa moderata deambulatione , & commotione ; uti constat ex Hipp . 4. aph . 14. & 15. sicuti econtra , si modum excedat purgatio , eadem sistitur somno , quiete , iunctionibus , sudore , applicatis & exhibitis adstringentibus , theriacalibus atque , opiatis .

XIV.

Præterea considerabit Seto , sumpto benigniori & mitiori cathartico , non desuper dormiendum esse : bene tamen quandoque post fortiora , quæ difficulter in actum deducuntur , ac vim purgantem fixius & tenacius inhærentem habent . 7. Duabus vel tribus horis post assumptum purgans , Brodum abstergens & abluens , addito , si libet crem. tart. immò ad secundam vel tertiam operationem , cochlearum vel alterum brodii assumendum esse . 8. Purgantia in forma liquida , præsertim ex infusione parata , citius , & cum minori molestia operari , ac i primis convenire in temperamentis , naturis , & affectibus biliosis ac melancholicis , uti etiam in tollendis obstructionibus . 9. Purgantia in forma pulveris vel pilularum , minus convenire in siccioribus , tabidis , hecticis , melancholicis , febre detentis &c. econtra felicius operari in obesis , succulentis , torosis & carnosis subjectis utpote humidioribus . 10. Vinum generosum . purgantium vim cohibere , hinc etiam utile est , post purgationem citra noctem assumere parum theriacum hausto vini generosi , ut omnia iterum in pacatum statum redeant .

ARTICULUS VI.

*De Officio Medici, in prescribendis variis
Remediorum Purgantium formulis.*

In forma Potionis.

MAnna Julepata . R. Crem. tart. dr. ii. dissolv. in aq. tarax. vel viol. unc. vi. hinc lento iij. dissolv. Mann. el. unc. iii. col. per pann. lin. bx clarif. cum alb. ov. addendo parum aq. cinam. vel namph. M. est Potiuncula visu & gustu suavis , Mgnatibus familiaris . S. Manna julepata clara in uice sumenda .

Alia acuata & fortior . R. Crem. tart. dr. i. cog. aq. font. unc. vi. in col. unc. iv. dissolv. Mann. el. ux. ii. vel ii. ss. clarif. cum album. ov. & colat. add. pul. syr. cum sem. melon. subact. gr. v. vi. succ. cit. ag. j. namph. an. dr. i. ss. M. S. Manna julepata fortior mane jejune sumenda , & post duas horas brodium accipiendum .

Potio lenitiva ex Manna . R. Mann. el. dr. vi. v. unc. i. dissolv. in aq. destill. vel laxat. s. q. add. si rof. sol. aur. de cich. cum rhab. duplic. unc. i. ss. v. horum loco syr. diafer. de mann. laxat. Horst. ag. v. nam. bugl. dr. i. ss. M. f. Pot. irroranda vapore coll. rec. S. ut supra .

Alia utilis in Febribus . R. Mann. calab. unc. i. ssi. rof. sol. unc. ii. elect. lenit. Flor. dr. ii. crem. tart. sit. ii. cum s. q. aq. scorz. vel laxat. M. f. Potio , aromatizanda , cum succ. express. cort. cit.

Alia ubique ferè usualis . R. Fol. senn. s. dr. ii. agar. vel mechoac. dr. i. ss. (Rhabarb. etiam si placet dr. ss. vel tamarind. unc. ss.) sem. anis. z. z. an. sit. j. dr.

i. rad. liq. dr. j. passul. unc. ss. coq. in aq. s. q. ad unc. iij. m. in col. dissolv. mann. el. unc. j. ss. vel unc. ij. aq. cinam. parum M.

Potio Mannata cum extractis. Rz. Mann. el. unc. i. ss. extract. diacarth. scr. ij. vel dr. j. mag. gial. gr. iii. aq. lavat. unc. iij. cinam. dr. j. M. Utilis est in affe-ctibus catarrhalibus. Vel Rz. Mann. el. unc. j. vel dr. x. extr. dicarth. scr. ij. de rhab. vel de citro solut. scr. j. M. f. Potio brevis aspergenda ol. cort. cit. rec.

Aqua laxativa Viennensis acuata. Rz. Aq. laxat. Vien. unc. iij. vel iv. crem. tart. dr. j. vel ss. aut hu-jus loco succ. cit. rec. express. dr. iij. Pulv. syr. a gr. v. ad x. xij. aq cinam. bugl. vel fl. namph. dr. ii. M. f. Pet. loco pulv. syr. etiam sumi possent mag. gial. vel spec. diagialap. Mins. ad dr. i. dr. ss. vel scr. i. Est Potio suaviter, & energetice purgans.

Alia vulgaris. Rz. Aq. laxat. vulg. unc. v. much. ros. unc. i. vel much. ros. syr. ros. sol. an. dr. vi. Pulv. syr. agr. vi. ad x. nit. præp. gr. xii. M. f. a.

Potio ex infuso. Rz. Fol. senn. sel. dr. ii. agar. vel mechoac. dr. i. ss. rhab. dr. i. cinam. opt. scr. ii. mac. scr. ss. F. infus. in s. q. aq. tot. cit. in Col. dissolv. syr. ros. sol. aur. mann. calab. an. dr. vi. vel unc. i. M. f. Potio.

Potio phlegmagoga. Rz. Crem. tart. dr. i. rad. me-choac. dr. ii. vel iii. sem. fœnic. vel cit. excort. dr. ss. incif. bull. in s. q. aq. ad consumpt. 3. p. in colat. in-fund. fol. senn. s. dr. iii. rhab. dr. i. schœn. scr. in Col. dissolv. mann. el. unc. i. extr. diacarth. scr. iv. vel dis-solv. (si bilis magis evacuanda) elect. de tamar. de succ. ros. an. dr. ij. syr. ros. sol. unc. i. mann. el. unc. ss. vel dissolv. mann. el. syr. ros. sol. an. unc. i. scamm. sulpb. gr. iv. M.

Potio colagogga. Rz. Tamarind. unc. ss. fol. senn. s. dr. ii. rhabarb. dr. ss. vel dr. i. sem. anis. scr. i. Coq. in s. q. aq. font. ad unc. iii. in Col. dissolv. mann. el. syr. ros. sol. an. unc. i. elect. de succ. ros. dr. ii. (si serum

ferum simul evacuandum) syr. de spin. cerv. unc. ss.
vel dr. vi. M.

Potio phlegma-hydragoga. R. Rhab. el. dr. j. agar.
trock. dr. i. ss. spic. z. z. calam. aromat. an. gr. vii.
inf. per noct. in s. q. aq. font. vel destill. appropriata
mane facta levi ebullit. & express. dissolv. mann. el.
unc. j. Pulv. mechoac. scr. ii. vel dissolv. mann. el. vel
syr. de spin. cerv. an. dr. vi. vel unc. i. pulv. gial. cryst.
tart. an. scr. i. aq. cinam. bugl. dr. ii. M.

Potio melanagoga. R. Fol. senn. s. dr. ii. ss. agar.
opt. dr. i. fibr. elleb. nig. scr. ii. sem. anis. z. z. an.
scr. i. mac. cinam. an. gr. vii. fl. cord. an. p. i. possal.
unc. ss. coq. in s. q. aq. borrag. ad consumpt. 3. p. stem.
per noct. in col. express. dissolv. mann. el. unc. i. ss.
vel ii. cryst. tart. scr. ii. M. vel mann. el. syr. ros. sol.
an. unc. i. M.

Potio mictagoga, ex Electuariis & Extractis, pro
cura vernali vel autumnali usitata. R. Elect. de succ.
ros. dr. iii. diacarth. ar. ii. extr. rhab. scr. i. vel onito-
pharm. scr. ii. mann. el. unc. i. aq. lax. q. s. M. f. Pot.
irror. vap. cort. cit. rec.

Alia. R. Elect. bier. cum agar. diacarth. an. dr. ii.
vel elect. diacathol. aut lenit. Forenz. de succ. ros. an.
dr. iii. mann. el. vel much. ros. aut syr. ros. sol. vel de
Cich. cum rhab. duplicit. unc. i. extr. diacarth. agar. ve-
de cit. solut. Zwelf. an. scr. j. M.

Potio purgans, in fluxibus alvi. R. Aq. lax. Viena.
unc. iii. rhabarb. leviter tost. & pulv. dr. ss. syr.
cich. cum rhab. triplicat. vel de myrobal. cum rhab. nat.
i. aq. cinam. bugl. dr. ii. M.

Alia. R. Rhab. el. pulv. & vino albo irrorat. dr. i.
ss. vel ii. inf. in s. q. aq. plantag. manè in col. cum
express. dissolv. mann. el. unc. i. vel i. ss. pulv. rhab.
scr. i. vel dr. ss. syr. de myrob. cum rhab. vel de cichor.
cum rhab. 4. druplic. dr. vi. M.

Alia in Diarrhoea & Dysenteria utilis. R. Tam-
bind. dr. ii. fol. senn. s. dr. iii. cort. arang. dr. ss. possal.
mitt.

min. p. ij. mac. scr. ss. coq. in s. q. aq. ad 3. in colat. inf. per noct. rhab. opt. dr. i. ss. spic. gr. iiiij. mane colat. dissolv. mann. el. unc. i. syr. de myrob. cum rhab. dr. vij. aq. cinam. dr. i. M.

Potio in fluxionibus sanguinis. Rz. Mann. el. unc. i. ss. dissolv. in aq. plantag. unc. iij. add. rhab. pulv. dr. ss. vel scr. ij. syr. de cich. cum rhab. vel de myrob. unc. i. M. haec eadem usurpari potest in gravidis.

Potio cholagogia. Rz. Rhab. el. cort. myrob. cit. an. dr. i. ss. pulp. tamarind. unc. ss. fol. fenn. sel. dr. iii. inf. per noct. in s. q. aq. destill. cich. mane facta levi ebullit. in col. dissolv. mann. el. unc. ij. fl. nit. gr. vi. crem. tart. dr. ss. M.

Alia. Rz. Mann. el. unc. i. ss. elect. de succ. ros. dr. ii. iij. pulv. gial. cryst. tart. an. scr. i. aq. lax. q. s. M. f. Potio.

Potio mictagogia. Rz. Agar. rec. troch. mechoac. an. dr. ij. rhab. el. dr. i. ss. fol. fenn. s. dr. iij. z. z. scr. ij. mann. el. unc. i. ss. bis superaffund. aq. bull. unc. v. stent in infus. per noct. mane facta levi ebull. in colat. cum album. ov. clariss. dissolv. elect. de succ. ros. dr. ii. vel i. ss. crem. tart. scr. ii. spirit. mac. vel es- sent. cit. scr. ss. M.

Alia. Rz. Tamarind. unc. ss. fol. fenn. s. dr. iii. rhab. mechoac. an. dr. i. ss. cort. arant. dr. ss. crem. tart. scr. iv. fl. cord. an. pi. sem. anis. dr. ss. Coq. in s. q. aq. font. stent in infus. per noct. in col. express. dissolv. mann. el. dr. x. pulv. mechoac. scr. i. aq. ci- nam. cochl. ss. M.

Atque haec formulæ selectæ sufficiunt, ut mutatis pro varietate circumstantiarum mutandis, millesimæ formulæ ex arte concinnari possint.

In forma Pulveris.

PULVIS CORNACHINUS CHOLAGOGUS. R. Crem. tart.
scr. i. ad ii. scammon. sulph. à gr. viii. ad xii. xv.
antim. diaph. gr. vi. viii. M. f. Pulvis. S. Pulvis
CORNACHINUS CHOLAGOGUS mane jejune in brodio su-
mendus, & postea per 2. horas jejunandum.

Est pulvis in omni cacochymia summe utilis. Si
simil vomitum conciliare animus, add. gr. i. vel i-
ss. lart. emet. Misinch.

PULVIS HYDRAGOGUS. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. si-
vel scr. ii. scam. sulph. vel gumm. gutt. scr. ss. ve-
magist. gumm. gutt. gr. v. vi. tart. vitriol. gr. vii. M.
fiat Pulvis. S. ut suprà.

Alius mictagogus. R. Rad. gial. rec. pulv. vel spec.
de gialapp. Mins. scr. i. diagryd. sulph. gr. ix. crem.
tart. scr. ss. ol. destill. cinam. vel fænic. gutt. iii. M.
Pulvis. S. ut suprà.

PULVIS ARTHRITICUS. R. Rad. hermodact. turb. ali-
gummos. gial. scam. sulph. an. scr. i. gumm. gott. g.
xvi. sal. prunell. gr. xii. M. f. Pulv. divid. in 4. p. ad.
S. Pulvis arthriticus pro 4. vicibus.

Alius. R. Oss. human. calcin. vel rasur. cran. hun-
turb. hermodact. gial. senn. crem. tart. diagryd. ca-
ryoph. an. dr. i. M. f. Pulv. subtiliss. cuius dos. à d.
i. ad scr. iv.

PULVIS PURGANS ANTHELMINTICUS. R. Spec. diaturi-
cum Rhab. scr. ii. scam. sulph. gr. ix. vel troch. ali-
band. gr. vi. viii. crem. tart. gr. xii. ol. destill. cor-
arant. gutt. iv. M. f. Pulvis. S. Pulvis purgans An-
thelminticus in mulso sumendus.

Alius. R. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. vel dr. ss.
mercur. dulc. gr. xv. sal. absinth. gr. iv. sacch. fin. ve-
cand. scr. i. M. f. Pulv. S. ut suprà.

PULVIS CHOLAGOGUS. R. Sal. absinth. crem. tart.
scr. i.

scr. i. diagryd. sulph. gr. xii. ol. destill. mac. gutt. ii.
M. f. Pulvis.

Pulvis laxativus . R. Pulv. senn. Montagn. scr. ii.
spec. diaturb. cum rhab. scr. i. diagryd. gr. iii. magist.
gumm. gott. gr. i. ii. ol. cinam. anis. an. gut. i. M. f.
Pulvis .

Pulvis antihydropicus . R. Rhab. opt. scr. ii. pulv.
exter. cort. gial. scr. i. gumm. gott. gr. xiii. sp. vitriol.
gut. v. M. f. Pulv.

Alius . R. Rad. gial. pulv. dr. ss. mercur. dulc. ritè
præp. gr. xvi. vel magist. gial. gr. xii. ol. dest. mac.
gut. ii. M.

Pulvis purgans , in fluxibus alvi . R. Rhab. levi-
ter rost. à dr. ss. ad dr. i. myrob. citr. scr. ss. nuc.
musc. vel lign. aloes pulv. gr. viii. ol. dest. mac. gut. i.
M. f. Pulv.

Pulvis purgans carminativus . R. Pulv. cort. flav.
rant. rhab. cryst. tart. an. dr. ii. ol. mac. gut. v. sac-
ch. ros. tabul. ad pondus omnium M. f. Pulvis . S. Pul-
vis purgans carminativus , cuius 2. aut 3. magnæ
cuspides cultelli plenæ una hora ante pastum su-
mendæ.

Pulvis solutivus usualis . R. Resin. gial. dr. ii. Jem.
melon. encort. scr. iv. misceantur exactissime in morta-
rio lapideo , add. crem. tart. unc. ss. confect. alk. dr. i.
M. f. Pulv. cuius dos. dr. ss. ex brodio carnis .

In forma Pilularum.

Pillulæ Cephalicæ . R. Extr. coch. dr. i. troch. al. band. gr. xii. pulv. syr. gr. vi. ol. destill. fœnic. gut. iv. cum s. q. ag. beton. M. f. Pilul. No. xxxiii. S. Pilulæ cephalicæ , quorum &c. in una vice 2. horæ post cœnam sumendæ , in cochlearie pleno vini, vel in pomo assato, vel in iusculo, aut succo, in pruno excavato, hebulis involutæ.

Aliæ . R. Extract. pilul. coch. aur. panchym. Croll. an. scr. ss. troch. alband. gr. v. cum ol. succin. J. q. M. f. Pilul. No. xix. deaur. S. ut suprà.

Pillulæ Catarrhales . R. Mass. pilul. de succin. Crat. dr. i. magist. gial. gr. xii. ol. destill. succin. gutt. iv. cum s. q. ag. beton. M. f. Pilul. No. xxxiii. deaur. S. ut suprà. dos. N. xi.

Aliæ usuales . R. Mas. pilul. de succin. Crat. dr. i. ss. marocost. Minderer. dr. ss. troch. alband. scr. ss. cum ol. succin. M. f. Pilul. No. c. xxx. deaur. dentur ad scatul. cum pulv. ros. rub. S. Pilulæ catarrhales , de quibus in una aut duabus vicibus , in hebdomade , sumendæ .

Pillulæ Ophtalmicæ . R. Extract. coch. vel luc. maior. scr. i. panchym. scr. ss. troch. alband. vel magist. gial. gr. iv. v. sal. euphras. gr. iii. ol. destill. fœnic. gut. ii. cum s. q. ag. beton. M. f. Pilul. No. ix. deaur. S. Pilulæ ophthalmicæ & cephalicæ in una vice sumendæ .

Pillulæ Catholicæ . R. Extract. panchym. vel catbol. scr. i. troch. alband. pulv. syr. magist. gial. (vel unius aut duorum simul commixtorum) a gr. vi. ad. viii. ol. destill. fœnic. vel lig. Rhod. gutt. ii. cum syr. sol. s. q. M. f. Pilul. N. xi. deaur. S. Pilulæ purgantes.

Pillulæ simul Anthelminticæ . R. Mass. pillul. de nit. Trall.

Trall. scr. i. ss. extract. colocynth. gr. vi. vel mercur. dulc. scr. ss. ol. destill. sabin. gutt. ii. cum f. q. aq. vel succ. absinth. M. f. Pilul. N. xi. deaurantur.

Pilulæ anti-Hypochondriacæ. R. Mass. pilul. tartar. Querc. scr. i. de ammoniac. eiusdem scr. ss. extr. elleb. nig. gr. vi. resin. gial. vel scam. sulph. gr. vi. cum f. q. aq. fumar. vel tinct. tart. M. f. Pil. N. xiii. deaur. S. Pilulæ Anti-Hypochondriacæ in una vice sumendæ.

Aliæ. R. Mass. pilul. tartar. Schrod. scr. i. extr. cent. min. croc. an. gr. iv. gumm. ammon. gr. viii. pulv. syr. gr. iv. v. cum f. q. syr. de fumar. vel de pom. M. f. Pil. N. xi. deaur. S. ut suprà.

Aliæ usuales. R. Aloes succotrin. scr. i. ss. gumm. ammon. croc. mart. aperit. an. scr. i. maggial. gr. xv. cum elix. prop. f. q. M. f. Mass. f. Pilulæ No. C. inaur. pro pluribus dosibus.

Pilulæ hydragogæ. R. Magist. gum. gamand. gr. v. resin gial. gr. vii. extr. enul. gr. vi. ol. dest. mac. gut. ii. M. f. Pil. N. ix. deaur. ac sumantur ex aq. cinnamonom.

Aliæ. R. Magist. gial. gr. x. elater. gr. v. or. mac. gutt. ii. cum f. q. syr. de cinam. M. f. Pil. N. vii. deaur.

Pilulæ melanagogæ. R. Extract. panchym. vel melanagog. Quercet. vel mass. pilul. tart. Quercet. aut Schrod. scr. i. extr. elleb. nig. fer. ol. dest. cit. gut. ii. cum syr. de fum. f. q. M. f. Pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ purgantes in lue Venerea. R. Extr. panchym. Croll. elleb. nig. an. scr. ss. resin. gial. gr. vii. vel mercur. dulc. scr. ss. ol. destill. cit. gutt. iii. cum f. q. syr. de fumar. M. f. Pilul. N. xi. deaur.

Pilulæ anti-Arthriticæ. R. Extr. panchym. scr. i. hermodact. gr. vi. diagryd. sulph. gr. iii. ol. fenic. gut. iv. cum f. q. syr. ros. sol. M. f. Pil. N. xxi. deaur. vel R. Mass. pil. de hermodact. diagryd. sulph. an. gr. vii. troch. alband. gr. ij. extr. calam. arom. gr. i. tart. vitriol.

vitriol. gr. ii. ol. anis. gut. ii. cum s. q. aq. arthrit. M. f. Pilulæ. N. ix. deaur.

Aliæ usuales . R. Extract. pil. coch. extr. troch. alband. extr. turb. nn. scr. i. extr. elleb. nig. gr. xxv. extr. lign. aloes pœon. an. gr. vi. tart. vitriol. scr. i. ol. unc. mosch. satv. anis. an. gut. iv. cum s. q. aq. epil. Lang. M. f. Pil ex scr. i. N. vi. Sumentur 3. diebus ante & post novilunium , ita ut prima die duæ: secunda tres , & tertia 4. mane iejune assumantur .

Pilulæ sanguinem mundificantes , in Scabie , & similibus affectibus . R. Extract. panchym. Croll. mercur. dulc. an. ser. ss. mag. gial. gr. vii. ol. dest. mac. gut. ii. cum s. q. aq. ceras. nig. M. f. Pilul. N. xxi. deaur.

Pilulæ Emanuelis uterinæ . R. Mass. pilul. Emanuel. dr. iii. extr. croc. gr. ix. caltor. gr. iii. cum s. q. aq. meliss. M. f. Pilul. N. LX. dentur ad scatul. cum pul. cinam. dos. N. vii. vel viii. Si lubet, potest addi stimulus , de pulv. syr. vel magist. gial.

Pilulæ Somachicæ . R. Mass. pilul. aggregat. vel angel. vel Emanuel. dr. i. mag. gial. vel pulv. syr. gr. xiii. ol. dest. absinth. gut. vi. cum s. q. aq. absint. M. f. Pil. N. xxxix. deaur. dos. N. xiiii.



In forma Boli.

Bolus Melanagogus . Rz. Conserv. fumar. dr. ii.
confect. alkerm. scr. i. extr. elleb. nig. scr. i. resin.
gial. gr. iv. M. f. Bol. aspergendorus sacchar. S. Bolus
Melangogus pro una vice sumendus.

Bolus hydragogus . Rz. Rob. sambuc. vel ebul. dr. ii.
confect. alkerm. scr. i. resin. gial. gr. ix. xii. ol. destill.
tit. gut. ii. M. f. Bol. asperg. sacch. S. ut suprà.

Alius . Rz. Conserv. res. vel viol. vel fl. persic. dr. i.
vel i. ss. resin. gial. gr. ix. vel xii. vel pulv. rad. gial.
g. xv. gumm. gott. gr. vii. vel viii. ol. destill. anis.
vel fenic. gut. ii. cum sacch. s. q. M. f. Bol.

Bolus cholagogus . Rz. Conf. ros. vel pulp. tama-
rind. aut passul. vel cass. dr. ii. iii. pulv. syr. gr. viii.
ol. dest. anis. gut. i. M. f. Bol.

Bolus in lue Venerea & Gonorrhœa . Rz. Conf. fu-
mar. dr. i. vel scr. iv. pulv. gial. dr. ss. mercur. dulc.
gr. viii. syr. de cich. cum rhab. parum M. f. Bol. vel
Rz. Pulp. cass. rec. extr. unc. ss. vel dr. vi. rhab. el.
pulv. scr. ii. vel hujus loco pulv. syr. vel mag. gial.
gr. vii. mercur. dulc. scr. ss. ol. dest. fenic. gut. iv. M.

Bolus purgans & Anthelminticus . Rz. Conf. fl. per-
sic. dr. i. mercur. dulc. a gr. xv. ad. scr. i. scam. sulph.
vel mag. gial. gr. v. vel rad. gial. aut spec. de gial.
Mins. gr. ix. x. cum s. q. syr. fl. persic. M. f. Bolus .

Bolus purgans minutissimus . Rz. Extr. diacarib. dr.
ss. resin. scammon. scr. ss. sacch. q. s. M. f. Bolus .

Alius . Rz. Rad. gial. rec. pulv. scr. i. gr. v. vel dr.
ss. Essent. cit. vel aq. aut syr. cinam. q. s. M. in mort.
plane in Bolum minutulum, involvendum nebulis.

His Bolis apud Principes & Magnates delicatulos
& naufragos, Rolfinkius magnam obtinuit sui com-
mendationem. Idem fieri potest cum spec. bier. pic. Galen.
spec. diagialap. Mins. &c.

Bolus purgans ex Electuariis . R. Elect. de tammarind. vel lenit. vel diaprun. laxat. aut cass. dr. ii pulv. syr. tart. vitriol. an. gr. vii. cum s. q. syr. viol. M. f. Bol. Vel si serum magis evacuandum , adde Electuar. pulv. gial. scr. i. gut. gamand. gr. iv. cl. def. anis. vel cinam. vel cit. gut. i. M.

In forma

Julepi, Syrupi, Spiritus vini, Morsellorum, Emulsionis &c.

JUlepus purgans . R. Mag. gial. gr. xii. pulv. syr. iv. nucl. pin. N. ii. probē subact. add. Jul. ros. ii. aq. cinam. vel ceras. nig. unc. ss. M. f. a. S. Julepus purgans pro una vice sumendus .

Syrupus purgans . R. Syr. de cinam. vel rib. dr. iii. pulv. syr. a. gr. viii. ad xii. aq. cinam. bugl. dr. i. M. f. a. S. Syrupus purgans pro una vice sumendus

Alius . R. Syr. rub. idæ . dr. ii. confect. alk. comp. scr. i. mag. gial. vel pulv. syr. sem. mel. subact. vel sp. vin. dissolut. gr. viii. xii. &c. aq. cinam. bugl. dr. ss. M. S. ut supra .

Spiritus Vini purgans . R. Mag. gial. gr. xii. spirit. ceras. nig. dr. ij. Jul. ros. vel viol. dr. ss. M. S. Spiritus vini purgans pro una vice .

Alius . R. Elix. vit. Mattbiol. dr. ij. mag. gial. gr. xii. vel pulv. syr. mag. gial. an. gr. vii. Jul. ros. scr. ii. M. S. ut supra .

Morsuli purgantes . R. Pulv. rad. gial. dr. ii. di. gryd. dr. i. crem tart. unc. ss. sem anis. dr. ii. sacchar. in aq. cinam. dissol. unc. iii. M. f. Morsul. oblinient. ol. cinam. caryph. an. gut. ii. M. S. Morsuli purgantes, quorum 6. brachmæ pro una vice sumendæ .

Alij magis hydragogi . R. Magist. gumm. gutt. dr. levig.

levigetur in marmore cum ol. destill. mac. add. resin. gial. s. a. solut. dr. ij. cinam. acut. scr. iv. caryoph. scr. jj. mac. scr. i. aromata groppo modo incid. & cum Sacch. in aq. cinam. sol. q. s. M. f. Morsell.

Morsuli Imperatoris purgantes. R. Sem. melon. excort. unc. ss. aq. ros. opt. unc. iiiij. ss. M. f. Emuls. in sua dissolv. Sacch. albiss. lib. i. resin. gial. dr. v. add. spec. pro morsul. Imperat. dr. vi. M.

Morsulus purgans pro una vice. R. Spec. diagial. Min. vel rad. gial. rec. pulv. gr. xv. magist. gumm. gott. scammon. an. gr. ij. condit. cort. cit. minutim ins. scr. i. ss. vel conserv. cit. borrag. an. scr. i. ol. cinam. gut. ii. Sacch. canar. in aq. cinam. dissol. q. s. vel dr. vi. M. f. Morsulus S.

Emulsio purgans. R. Sem. melon. excort. à dr. ss. ad dr. i. resin. gial. a. scr. ss. ad gr. xii. scamm. sulph. gr. ii. M. in mort. marmoreo, affundendo sensim Jul. ros. unc. i. M. f. Emuls. S. Emulsio purgans pro una vice.

Alia. R. Amygd. excort. N. iii. resin. gial. gr. viii. xii. conterantur simul, hinc affunde aq. ros. unc. ss. scr. de cinam. dr. i. M.

Alia R. Amygd. excort. dr. i. nuc. pinear. dr. ss res. gial. gr. ix. aq. ros. ceras. nig. an. dr. vi. cinam. bugl. dr. i. ss. M. f. Emulsio.

Atque hæ formulæ maximè inserviunt pro delicatis, & nauseosis, ceteras Purgantium formulas refuentibus.

In forma

Noduli, aut Sacculi laxativi.

Nodus laxativus v. g. in Febribus intermittentibus. Rx. Rad. cichor. dr. iiiij. fænic. polypodium. q. an. dr. ii. Herb. absinth. Rom. card. b. cent. min. chamæd. adiant. utriusque an. p̄j. fol. senn. f. unc. ss. agar. rec. troch. rhab. el. an. dr. iiiij. gial. dr. passul. min. unc. j. cinam. vel galang. min. dr. i. sal. tart. dr. ii. M. incis. & contus. ad saccul. ex sind. ali. S. Nodus herbarum laxativus; pro una & dimidia mensura vini albi, & una dimidia mensura aquæ choreæ distillatæ.

Nodus in obstructionibus viscerum Hypochondriacis. Rx. Rad. gram. cichor. bugloss. vel filic. aſperg. vincetox. &c. an. dr. ij. herb. meliss. m. i. cuscuta. adiant. alb philirid. ceterach. vel chamædr. nob. agric. absinth. pont. cent. min. an. M. ss. fol. senn. f. unc. ii. rhab. el. fibr. elleb. nig. an. unc. ss. agar. trach. dr. vi. cinam. acut. dr. i. sem. anis. fænic. cit. an. f. ii. cort. flav. arant. dr. ss. crem. tart. dr. ii. M. incis. & contus. ad Nodul. S. Nodus herbarum laxativus, quibus affundatur una & dimidia mensura vini albi, & una dimidia mensura aquæ ebullientiæ apertus relinquatur in loco calido, per 12. aut 24 horas, postea asservetur in cella aut cubiculo, de quo quotidie octava pars, aut paulum minus jejune benda.

Nodus in suppressione Mensium. Rx. Rad. bryoniae. dr. iii. aristol. rot. hirundinar. asar. an. dr. ii. Her. meliss. matricar. puleg. chamæd. nob. an. mi. fol. senn. f. unc. ii. rhab. el. unc. ss. agar. troch. dr. vi. fibr. elleb. nig. dr. iii. croc. orient. mac. an. scr. ii. sem. anis. fænic. an. dr. i. cort. flav. arant. dr. ii. cinam. acu-

acut. scr. iv. passul. unc. i. sal. tart. dr. iii. interdum etiam addi potest limat. mart. aut chalyb. præp. unc. ss. vel i. M. incis. & contus. ad Nod. pro una & dimidia mensura vini albi, & una mensura aquæ. Dos. unc. v. vel vi. post aliquot cochlearia assumptæ offæ.

Vinum medicatum purgans ordinarium. R. Fol. senn. f. unc. ii. agar. troch. unc. ss. turpeth. opt. pulv. dr. ii. z. z. incis. dr. i. ss. nuc. mosch. ras. dr. i. herb. beron. cord. b. agrim. ceterach, summit. absinth. fl. horrag. anib. an. pi. incisa excipiantur sindone pro Lib. iii. vin. alb. & lib. aq. borrag.

Vinum hydragogum probatissimum. R. Fol. senn. f. unc. ii. rad. gial. unc. ss. troch. de eupat. de rhab. an. dr. ii. cort. ebul. median. sambuc. an. dr. i. ss. rad. Ir. noſt. lapp. mai. an. dr. ii. scyll. præp. dr. i. fol. gratiol. soldanell. an. mi. tart. crud. Venet. unc. ss. passul. min. mund. unc. i. M. incis. & contus. ad Nodul. pro mens. ii. vini.

Aliud Antihydriopicum. R. Herb. absinth. card. b. cent. min. agrim. veron. epat. nob. an. M. incis. cort. tamisc. median. frax. an. dr. i. bacc. laur. Juniper. an. dr. ii. rad. raph. mar. bryon. ebul. asar. elleb. nig. Irid. noſt. polyp. gialap. an. dr. ii. rhab. noſt. fol. senn. f. an. dr. vi. z. z. alb. dr. i. crem. tart. dr. ii. chalyb. cum sulph. præp. unc. ss. sem. anis. fœnic. an. dr. ss. dentur ad Nodul. pro mens. i. & dimid. vel 2. vin. Neccarin.

Nodulus laxativus antiasthmaticus. R. Herb. salv. rorism. maioran. hyssop. veron. marrub. capill. ven. an. pi. rad. enul. fœnic. calam. aromat. caryophyllat. an. dr. ii. rhab. el. dr. iii. fol. senn. f. unc. i. agar. troch. turb. el. scammon. elleb. nig. præp. polyp. q. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. ss. mac. scr. i. tart. alb. crud. dr. iii. sem. anis. fœnic. an. dr. ss. M. incis. dentur ad Saccul. pro lib. iii. vin. alb.

Nodulus in affectibus capitis. R. Rad. paeon. calam. arom.

arom. Ir. flor. caryophyllat. an. dr. ii. herb. absint. Pon
card. b. beton. salv. meliss. puleg. maior. rorism. an.
fl. antb. til. stach. an. pi. rhab. el. dr. iii. fol. senn.
unc. i. gial. agar. troch. turpeib. polypod. an. dr. ii.
nam. opt. dr. i. mac. nuc. mosch. an. scr. i. tubeb
dam. an. scr. ss. incis. dentur ad Nodul. pro lib.
vin. alb.

Nodulus in affectibus Uteri, R. Rad. enul. can
rub. tint. arist. rot. an. dr. i. herb. absinth puleg.
meliss. summit. cent. min. an. m. ss. fl. cordial. calend.
pi. fol. senn. f. unc. i. ss. rhab. el. mechoac. an. dr.
agar. troch. dr. i. sem. anis. fœnic. an. scr. iv. mac.
i. passul. min. incis. & contus. dentur ad Nodul.
mens ii. vin. alb.

Nodulus anti Cachecticus. R. Rad. cich. enul.
nic. an. dr. i. bryon. dr. ii. herb. meliss. bissop. card.
an. pii. fl. calend. m. ss. cordial. cent. min. an.
rhab. mechoac. turb. agar. troch. an. dr. ii. chalyb. pi.
unc. i. crem. tart. dr. ii. ss. cinam. scr. ii. z. z. zed.
sem anis. fœnic. coriand. præp. an. scr. i. M. ad sc.
cul. pro lib. iii. vini.

Nodulus ante Ictericus. R. Rad. cich. asparag.
dr. ii. chelidon. mai. polypod. querc. an. dr. i. ss.
senn. f. unc. ii. rhab. fel. dr. vi. fibr. elleb. nig.
alb. gummos. an. dr. iii. herb. cuscut. chamed. nob.
mæpyth. cent. min. marrub. an. pii. ss. curcum. dr.
sem. cit. scr. ii. coriand. præp. anis. an. scr. i. galan.
min. cinam. el. an. scr. i. ss. croc. scr. i. tart. crud.
iii. M. incis. & contus. ad Nodul. pro mens. i. ss. vi.
alb. & mens. ss. aq. font.

Nodulus ex solo Rhabarbaro. R. Rhab. el. unc.
vel dr. iii. cort. flav. arant dr. ss. contusa grosso med.
ac Nodulo tigata inf. in aq. destill. cichor. & vin. vi.
an. lib. ss. vel lib. i. vin. alb. Dos. unc. iv. vel v.

Boccherum Rhabarbarinum. R. Aq. font. mens.
ebull. per med. quadrant. horæ infund. rhab. el. dr.
fiant. cit. dr. ss. cinam. & sacch. parum. Col. pro pa-

ordinario. Utile hoc præsertim Infantibus in cache-
xia, contumacibus obstructionibus viscerum, morbisque
chronicis exinde oriundis.

Nodulus pro Infantibus. *R. Rad. gram. fol. senn.
f. an. dr. j. tamarind. unc. ss. in petia ligatis supe-
raffund. aq. calend. lib. iv. detur pro potu ordinario
infantibus 4. 5. vel 6. annorum, quo plurimos cache-
cicos, & hydropicos restituit Sorbair.*

Formulæ

Clysterum & Suppositoriorum.

Cum purgantia per os assumpta sèpè contraindi-
centur, eorum loco Clysteres evacuantes pra-
scribi solent nunc lenitivi, nunc mediocriter, nunc
fortiter purgantes & revellentes, quorum aliquæ sele-
ctæ hic proponuntur formulæ, ad imitationem.

Clyster lenitivus. *R. Decocct. emoll. lib. i. vel emoll.
& carmin. an. lib. ss. sacch. rub. unc. ij. elect. diaca-
thol. vel cass. pro clyst. dr. vj. ol. viol. chamom. an.
unc. i. cum sale & vitell. ov. M. f. Clyst.*

Alius in Febribus usualis. *R. Herb. malv. alth. mer-
cur. violar. acetos. an. mi. bord. m. ss. fl. viol. chamom.
an. pii. sem. anis. dr. ii. coq. in f. q. aq. ad 3. in Col.
unc. x. dissolv. elect. lenit. unc. i. cass. pro clyst. unc.
ss. ol. viol. chamom. an. unc. i. ss. vitell. ov. No. i.
cum paucō sale M. f. Clyst.*

Alius. *R. Rad. alth. dr. iii. herb. malv. violar.
pariet. an. mi. sem. lin. fænug. an. dr. ii. fænic. dr. i.
ss. bord. excoct. m. i. incis. & contus. coq. ad consumpt.
3. p. in col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. i. ss. elect.
lenit. vel diacathol. dr. vi. ol. viol. amigd. d. an. unc. i.
cum sal. & vitell. ovi M. f. Clyst.*

Clyster paulo fortior. *R. Fol. rut. branç. urs. mer-
curial. parietar. malv. cum rot. an. m. ss. fl. cham. mi.*

summit. aneth. fl. melil. an. m. ss. Rad. alth. unc. ss.
sem. aneth carv. ar. dr. ii. cog. ex aq. s. q. in Col.
unc. x. dissolv. elect. lenit. dr. vi. bened. laxat. unc. ss.
hier. s. vel elect. de sacc. ros. dr. ii. ol. aneth. rut. an.
unc. ss. salis gemm. dr. i. M.

Clyster mediocriter à capite revellens . R. Rad.
alth. dr. vi. lil. alb. dr. iii. herb. meliss. beton. rut.
byssop. salv. rorism. an. m. ss. fl. cham. malv. cum tot
an. min. cent. min. pi. sem. carv. fœnic. an. dr. ii. cog.
in s. q. aq. s. in Col. unc. x. dissolv. elect. diaphæn.
hier. s. an. unc. ss. mell. anthos. dr. vi. ol. rut. cha-
mom. an. unc. i. sal. gemm. dr. i. M. f. Clyst.

Alius fortior . R. Herb. mercurial. orig. cent. min.
pubeg. calaminth. bethon. an. ss. sem. cartham. in pet.
lig. dr. vj. agar. in pet. lig. dr. ii. fl. stæch. Arab. dr.
ii. incif. cog. in s. q. aq. font. in col. unc. x. dissolv.
elect. hier. s. logad. vel hier. cum agar. bened. laxat.
an. dr. iii. ol. rut. unc. i. cham. aneth. an. unc. ss. sal.
gemm. dr. i. M.

Alius clyster acris , utilis in affect. Soporosis . R.
Herb. absinth. cent. min. rut. an. mi rad. pyreth. dr. vi.
pulp. colocynth. in pet. lig. dr. ii. incif. & conquass.
cog. ex s. q. aq. in col. unc. x. dissolv. elect. hier. s. lo-
gad. bened. lax. an. dr. iii. ol. rut. unc. i. cham. aneth.
an. unc. ss. sal. gemm. dr. i. M.

Clyster simplicissimus fortiter revellens , ac utilissi-
mus in affectibus Soporosis , Asthmate , Colica con-
tumaci &c R. Pulp. colocynth. in pet. lig. à dr. i. ad
dr. iii. cog. ins. q. brod. carn. in col. lib. i. dissolv. saccb.
rub. unc. ii. vitell. ov. No. 2. si mitius agendum , add.
ol. viol. vel chamom. unc. i. ss. M.

Clyster in Gravida . R. Brod. gallin. vel carn. al-
terat. malv. pariet. unc. viii. vel x. ol. amygd. d. cham.
an. dr. vj. vel unc. i. mell. anthos. unc. i. ss. saccb.
rub. dr. vi. vitell. ov. No. i. M.

Clyster laxativus anti-Colicus . R. Herb. s. emoll.
an. m. ss. fl. chamom. summit. aneth. an. m. ss. rad.
alth.

alb. lil. alb. an. dr. ii. sem. lin. fœnug. an. dr. iii.
 Col. f. decoct. in s. q. brod. carn. in Col. unc. x. dissolv.
 ss. elect. lenit. diacathol. an. dr. vi. mell. ros. sol. unc. i.
 an. vitell. ov. N. i. salis parum M.

Suppositorium acre in affectibus Soporosis. R. Pulv.
 euphorb. scr. ss. colocynth. gr. iv. elleb. gr. ii. sal. dr. ss.
 ad. mell. coct. unc. ss. M. f. Supposit. s.

Aliud. R. Spec. hier. pic. Gal. scr. i. troch. alband.
 ad. scr. ii. sal. gemm. scr. ss. mell. coct. q. s. M. pro
 ur. Aliud mitius. R. Spec. hier. pic. dr. i. sal. comm.
 to. scr. i. mell. coct. q. s. pro Supposit.

Aliud mitius. R. Spec. hier. pic. dr. i. sal. comm.
 scr. i. mell. coct. q. s. pro Supposit.

ARTICULUS VII.

*De Officio Medici, in evacuandis humo-
ribus per Vomitum.*

I.

CUM humores pravi, vitiosi & cacochymici non tantum per alvum, sed etiam per vomitum evacuari soleant, observet Medicus, *Vomitum* non tantum indicari a materia vitiosa in primis viis, ventriculo nempe, duodeno, mesenterio, pancreate, lie-ne, cava epatis parte existente, verum etiam & quidem potissimum ab ejus tenuitate, proclivitate ac mobilitate sursum versus. Nam teste Coo. i. aph. 21. quo natura vergit, eò ducenda est; non autem solum humores tenues, biliosi, spumescentes, aquei, volatiles ac facile mobiles evacuantur, sed phlegma quoque viscidum, & tunicis ventriculi firmiter impactum excutitur, unde *Emeticorum* ope, contumaces morbi ad miraculum saepius eradicantur, & cum impetu frequentius evellitur, quod communia purgantia non attingunt. Hinc teste Galen, *Vomitus omnium purgantium saluber-*
rimus.

rimus, modo facile fiat, & moderatè. Licet autem principaliter primam: tamen mediate, & consecutive etiam secundam & tertiam regionem expurgat.

I I.

COnveniunt igitur *Vomitoria*, 1. In continuatum & malignarum Febrium principio, vel etiam augmento, si vires nondum attritæ fuerint; præsertim si adsit nausea, vel inanis vomendi conatus, sapor & ructus amari, cardialgia, præcordiorum anxietates, vel haustum contagium, prodens se nausea & anxietatibus, cum per hæc non tantum æget præmuniatur à diarrhœa, anxietatibus, deliriis, aliisque gravissimis symptomatibus, sed etiam sæpius morbus in ipsis incunabulis suffocetur, & una quasi falce demetatur. 2. In Febribus intermittentibus, & præcipue quartana, duabus vel tribus horis ante paroxysmum exhibita. 3. In Inappetentia, cardialgia, affectu Hypochondriaco, & morbis chronicis ex acido primarum viarum exortis, præsertim si bilis acido jungatur, aut acidum tertius ac mobilius sit, & quidem non tam præservativè, quam etiam curative.

I I I.

PRæterea. 4. Profundunt in capitis dolore sympathico, vertigine biliosa, si primi ejus natales in ventriculo, & partibus vicinis delitescant. In Apoplexia *postrema*, aut ex ingluvie orta; dum nervorum oscula validè concutiunt, ac impedimenta spirituum, & causam morbisica tollunt. 5. In Mania, Melancholia, Asthmate humoroso, & præcipue stomachali, cum per ea magna pituitæ copia rejiciatur tum ex stomacho, tum ex pulmonibus per constrictiōnem pectoris simul concurrentem, vel saltem concussione illa humor iste tenax è tubulis pulmonum, & aliis partibus abraditur,

ejici-

ejicitur, fluxilis redditur, ut denuo cum sanguine circulari, corrigi, vel ad ignobilem partem deponi possit. 6. Tandem convenient in præcautione Arthritidis, Podagræ, Nephritidis, ac irritis etiam aliis, in Partu difficile &c.

IV.

Coindicatur *Vomitus*. 1. Ab habitu corporis, unde Hippocrates 4. aph. 6. ait: *Graciles*, (intellige natura tales, ob humores magis mobiles, vias patulas, ac fibras magis fluxiles,) & ad movendum faciles, per superiora purgare convenient, nisi hyems ad sit. 2. A tempore anni; hinc præservativè vernum magis & æstivum eligendum; unde etiam prædictus Senex 4. aph. 4. ait: *Æstate quidem superiorem magis ventrem, hyems inferiorem purgare convenient*. 3. A consuetudine, a natura ad vomitum prona ac facili. 4. A ventriculi & viscerum robore, ac præcipue a viribus, cum in hoc viscera valide concutiantur, ipsæque fibræ non raro insigniter convellantur, ut spiritus animales in impetus inordinatos adacti, gravissima sæpè inducant symptomata. 5. Ab ætate, juvenili nempe & virili; ac ultimo tandem, a symptomatibus quibusdam & accidentibus, de quibus Hippoc. 4. aph. 17. ait: *non febricanti, eibi fastidium, cordis dolor, vertigo tenebricosa, & oris amaritudo, per superiora purgandum opus esse significat*.

V.

Contraindicatur *Vomitus*. 1. A constitutione corporis inepta, ut v. g. gibbosa, scrophulosa, aut quibus pectus angustum, vel depresso, vel qui obesi, aut alias ad vomitum difficiles; unde Hippoc. 4. aph. 7. ait: *ægre vomentes, & modicè carnosos, quos Græci eufarcos appellant, per inferna purgato &c.* 2. A pro-

procidentia quadam corporis in abdomine, ut Intestinorum, uteri &c. 3. A graviditate. 4. A capitis affectione per essentiam, systemate præsertim nervoso debili existente. 5. Ab oculorum affectu, & præsertim inflammatione. 6. In pulmonum læsione essentiali, ac præsertim hæmoptysi, nam ex Hippoc. 4. aph. 8. *Tabi obnoxios, supra ne purgato.* 7. Ab affectibus abdominis convulsivis ac dolorificis, tumoribus abdominis inveteratis, abscessibus internis, mensium defectu ex vitio uteri, atrophia, virium languore, ægris præsertim lypothymiaæ obnoxiis existentibus.

V I.

Medicamenta *Emetica* alia sunt *primaria*, & propriè talia, quæ vim exserunt irritando, dum nempe acrimonia sua salino-sulphurea, & quidem volatiliori, quam habent purgantia per inferiora, particulisque suis aculeatis, profundius sese insinuant, ac fibrillas nervorum per ventriculum copiosè diffeminatorum, tracto etiam in consensum intestino duodeno, cum ductu choledoco & pancreatico, inordinate móvent ac vellicant, ut spiritus animales copiosius in fibras irruant, motum peristalticum invertant, & veluti motu convulsivo contenta in ventriculo sursum expellant. Alia *secundaria*, impropriè vomitoria dicta, quæ laxando, lubricando, & ventriculum gravando, & resupinando vomitum carent, ut v. g. *ol. commun.* vel *amygda.* cum *sperm. cet.* & *butyr.* liquefact. cum *cerevisia* *Juscule pingui* *lrc.* ac locum tantum habent in excernendis per vomitum venenis corrosivis, vel ubi vomitus vomitu curatur, ut v. g. in *Cholera*.

VII.

QUoad regimen & usum *Emeticorum*, observet Medicus, 1. Ea exigente necessitate quovis anni tempore exhiberi posse, præservationis tamen gratia maxime vernali. 2. Melius etiam suam operatione exercere, assumpta in forma liquida. 3. Antimonia & Mercurialia tutius in infuso, colando ea per chartam emporeticam, quam in substantia exhiberi; cum secus ventriculi tunicis ac plicis adhaerentia, subinde cieant lethales hypercathartes, vel enormes vomitus, qui tonum ventriculi destruunt, ac viscera impensè debilitant. Hinc licet talia exempla, & formulæ apud *Rolsink.* & *Willis.* prostent, non tamen facile & tutò imitandæ. 4. In horum infusione non tantum considerandum esse, quantum sumatur de vomitorio, quam quantum accipi debeat, de menstruo nempe ab unc. ss. ad unc. 1. vel 1. ss. ad summum. 5. Eadem etiam tutius præscribi, in dosi refracta, præsertim in febribus malignis, in quibus alias fluidiora sunt contenta. 6. Vomitoria liquida tepidè sumenda esse, cum sic facilius nauseam concident, & expultricem ad expulsionem molestent. 7. Si forma Boli exhibeantur, post dimidiā vel integrā horam elapsam, liquorem aliquem tepidam desuper bibendum esse. 8. Horam eo bibendi vomitivi in morbis chronicis esse matutinam, jejunio ventriculo; in febribus intermittentibus subinde exhiberi una hora ante paroxysmum; in noxia quavis re assumpta, vel exhibito veneno, quamvis horam idoneam esse. Si humores sint crassi, viscidii, lenti, post cibum expeditius & minori cum labore evomuntur.

VIII.

SUbinde Vomitus ab assumpto emetico nullus vel parcus nimis excitatur , quod contingere potest, vel ob mucum viscidiorem parietes ventriculi incrassantem , ac sic eum , quasi sensus expertem reddentem , vel ob vomitorium acidis nimis fixum redditum : hinc quartanarii ac melancholici difficulter vomunt ; vel ob robur ventriculi omnia deorsum potius promoveris , vel ex sensus defectu in morbis lethabilibus. Si igitur subinde non operentur , vel non sati , formidandum non est , cum subinde utiles sequantur salivationes , vel purgationes per alvum ; interim promoveri potest , si consultum videatur , assumpto Jusculo calido bene salito , vel intrusione digiti in fauces , vel extremitatis plumosæ calami scriptorii oleo imbutæ ; sicuti econtra , si nimius fiat , fistendus vino generoso tepide propinato , & si prima vice rejiciatur , reiterato cum buccella panis , opiatis aromaticis sociatis , & speciatim theriac. cum laud. op. in vino assumpto , uti etiam exterius cum spirit. vin. crocato applicata .



ARTICULUS VIII.

De Officio Medici, in prescribendis Emeticorum formulis.

Potio Emetica ex vitriol. mediocriter sine multa molestia vomitum ciens, & ex solo ventriculo evacuans. Nam Vitriolum, ob mitem agendi operationem, Manna vomitoriorum à nonnullis intitulatur. *Vitriol. alb. præp. dr. ss. vel scr. ii. oxymel. f. dr. iii. aq. dest. cich. vel ment. unc. i. M. S.* Potio emetica pro una vice.

Pulvis Emeticus maximè usualis. *R. Crem. tart. vel sal. armon. gr. xv. sal. absinth. gr. v. tart. emet. Minf. gr. i. ii. iii. M. f. Pulv.* Si simul per inferiora purgandi animus, add. scamm. sulph. gr. viii. x. ol. dest. mac. gut. ii. *M.* Notandum est, hodiè apud selectiores Practicos, optimum & usitatissimum vomitorium constituere, *tart. emet.* qui raro fallit, adeo ut etiam infantibus, quarta vel sexta pars grani à nonnullis exhibeatur.

Potio Emetica, ex infuso Croc. Metall. valida sed tuta satis. *R. Croc. metall. rite præp. a gr. vi. ad viii. xii. ebull. parumper in f. q. vin. alb. Col. per Chart. emporet.*

Alia ex Vitro Antimon. vel Mercur. vit. *R. Mercur. vit. vel vitr. antim. vel croc. metall. gr. v. infund. in vin. Rben. q. f. stent in loco tepido per noct. manē R. de filtratura per chart. emporet. facta unc. ss. i. vel i. ss.* Eodem modo procedi potest cum nummis, annulis, globulis, & scyphis ex regulo antimonio paratis.

Potio ex Syrup. Emet. *R. Syr. emet. Angel. Sal. dr. ii. iii. unc. ss. Julep. ros. unc. ss. aq. cinam. dr. ii. vel R. Aq.*

R. Aq. card. b. syr. emet. Ang. Sal. ritē præp. an. d.
iii. aq. cinam. dr. ii. M.

Bolus Emeticus . R. Conf. fl. tunic. à scr. i. ad d.
ss. tart. emet. Mins. gr. ii. iii. crem. tart. gr. v. M. f.
Bol. S.

Pilulæ Emeticæ . R. Extr. asar. vel panchym. gr.
vi. tart. emet. gr. ii. ol. destill. zedoar. gut. i. M. f.
Pilul. N. vii. S. Pilulæ emeticæ pro una vice.

C A P U T VI.

*De Officio Medici , in Affectibus indican-
tibus sudorifera , diuretica , salivantia ,
errhina , sternutatoria , apophlegmat-
zantia , & expectorantia .*

A R T I C U L U S I.

*De Officio Medici , in præscribenda evacua-
tione per Sudorem .*

I.

Cum Sudor in corpore humano soleat contingere , dum occasione vel causæ externæ , ut v. g. exercitii , caloris ambientis &c. vel medicamenti interni , attenuatur sanguis , magis fluxilis redditur , plusque minus liqueficit & resolvitur , hincque velocius circulatur , intensius fermentatur , & incalescit , cum sanguine etiam serum , à calore attenuatum , imbibit copiosè particulas minus reliquis cohærentes , seu permistas , & in specie salinas , ac cum illis varias sordes , & fermenta , quæ simul absterguntur ; hinc successivè circa corporis habitum subin-

subintrat copiosissimè glandulas intercutaneas, ex quibus per vasa excretoria, corporis poros constituentia, emanat. Cùm igitur Sudor tali modo contingat, Medicus exinde colliget, 1. In Sudore sanguinem, & omnes humores attenuari, in motu suo debito ac circulatione optimè conservari, stagnationes tolli, ac partes heterogeneas, & fermenta peregrina optimè sic eliminari, atque adeò Sudorem esse universale sanguinis, & partium solidarum purificativum, absterrivum, ut etiam particulare peripheriae ipsius corporis, morborum nempe cutanearum. Colliget 2. Sudorem sèpè maximè necessarium esse, quod elucescit, tum ex ipsa cutis, quæ tot millibus spiraculorum abundantia structura, ad sudores elicendos aptissima, tum ex plurimis morbis, qui sudoribus criticè solvuntur, tum ex sensibili transpiratione, quæ aliis evacuationibus, teste Sanctor. in sua statica copiosior est; unde ex hac impedita, tot morborum oriuntur genera, quæ omnia tolluntur Sudore, ut adeò nonnulli censeant, tertiam morborum partem curari sudoriferis, quæ etiam purgantibus magis tutiora.

I I.

Ex præsuppositis patet, Sudorem convenire, 1. In omnibus febribus, excepta hectica, & quidem tam intermittentibus, quam continuis, ac præcipue malignis, quarum nulla ferè sine sudore perfectè curata dicitur. 2. In inflammationibus, doloribus, tumoribus, tanquam effectibus circulationis impeditæ. 3. In cruris extravasione, vel revera tali, in vulneribus, contusionibus, vel quasi tali, ut in pleuride, erysipelate, arthritide, affectu ischiadicō &c. 4. in morbis omnibus ex humoris serosi colluvie oriundis, ac in specie defluxionibus catarrhalibus. In gruñescientia & coagulatione sanguinis, ut in palpitatio cordis, scabie, scorbuto &c. 6. Tandem non tam

evacuationis, quām alterationis gratia, ut nempe viscidā attenuent, aut humores coagulati, & stagnantes resolvantur in morbis chronicis, & contumacibus, quorum causæ altiores ægerunt radices, ut v. epilepsia, paralysi, arthritide, malo Ischiadicō, lū venerea, doloribus ac fluxionibus capitis inveteratis catarrhis, cachexia &c. qui purgantibus atque aliis alterantibus curari haud potuerunt.

I I I.

Sicuti autem coindicantur Sudorifera à viribus constantibus, ætate habili, & loco calido: ita contraindicantur ab aere & loco frigidiori, ac viribus præcipue exsolutis; cùm per sudores præcipue largiores spiritus exhauriuntur, corpus emaciatur, colliquetur, rosque nutritivus nimis resolvatur. Item subjecta calida & biliosa, minus, & non diu ferunt sudores, præsertim à sudoriferis calidioribus excitatos: item contraindicantur, ubi vel serum deficit, in maniacis, cholericis, gracilioribus, senibus, squalidis ad marasmodum & phthisin inclinantibus, vel ubi serum nimis abundat, ut in hydropicis, ubi simul est extravasatum.

I V.

Medicamenta *sudorifera*, nonnullis etiam dicuntur *diaphoretica* & *hydrotica*, licet ab invicem distinguantur; Illa enim sensibilem magis humidam & rivulosam seri evacuationem perficiunt: hæc tiderem vel madorem potius cent, evacuando magis insensibilem materiam vaporosam, & halituosam. Vnde autem suam exferunt Medicamenta sudorifera & diaphoretica, vel *positive*, calore, & tenuibus suis particulis humores M. S. attenuando, incidendo, colligefaciendo, ac ad cutis glandulas cum aliis obvi-

propellendo, in guttas ibidem condensando, vel insensibiliter evaporando; vel *privative*, acidum coagulativum absorbendo, imbibendo, & quod serum ligat, ac fixius reddit resolvendo: & sic per accidens sanguinem attenuando. Hæc locum magis habent, ubi resolutio virium timetur, & fræno potius eget sanguis & serum, quam stimulo: illa ubi sanguis ad motum & fermentationem magis ciendus. Motus igitur naturæ observandus, quæ, si ipsa officio satisficiat, & in sudores prompte solvatur, modicè juvanda est, non pellanda: si deficiat, stimulatida; si excedat, refrænanda.

V.

PRO debito usu *sudoriferorum*, sequentes Medicus observabit cautelas: 1. Primas vias debere esse emundatas, & à vitiosorum humorum illuvie libertas. Nam in materia nimis copiosa, minus tutæ sunt sudorifera, cum metus sit, ne vel cutis spiracula occludantur, vel commoti ad partes principes ruant humores. 2. Exhibenda esse ventriculo jejuno existente, seu propinentur in forma liquida, quæ citius, seu solida; quæ tardius operantur. 3. Sumptis sudoriferis corporis plus solito esse tegendum; ut pori magis paudent, humoresque magis fundantur, ac tegumenta circum circa potius, quam supra ponenda, cum pori cutis, ab onere stragulorum & tegumentorum nipsis pressi, sudores difficillimè transmittant. Nonnulli, ut ægri in lecto melius fudent, sudorem lagenis aqua calida plenis, vel lateribus calidis linteo involutis, sub axillas ad latera ægri positis, promovoent. In Diæta sudorifera, sic dicta per synecdochen, quod in ejus usu exacta & accurata vivendi ratio sit observanda, Decoctum lignorum exhiberi solet in robustioribus corpore in stupha seu laconico existente, ac excitato vaporoso calore per affusionem alicujus decoct. vel

spirit, vin super lateres vel silices ignitos, ut sudor magis proliciatur. 4. Melius esse, si ægri non vio- lenter cogantur ad sudorem, præsertim si corporis textura, & sanguinis dispositio non respondeant. Minus enim sudant, quibus sanguinis status magis condensatus, ac fibræ, pori & meatus cutanæ adstri- eti, & contracti; hinc præstat sæpè, præsertim etiam in febribus malignis & expellendis variolis, diaphoresin continuare, & naturæ tempus concedere, quam eandem cogendo pessum dare, cum sic seri proportionis absumatur, sanguis ipse ad fermentationem ma- gis cieatur & naturæ bene agentis conatus interrum- patur. Præstat igitur naturam sequi, & ducere, quam pellere, cum præstet sæpè tenuis uodor, quod non præstat sudor.

V I.

PRæterea. 5. Observabit Medicus, sudorem ad horam unam vel dimidiā, raroque ultra duas horas continuandum esse, præsertim si satis rivulosis fluat, cum ad vires maximè respiciendum sit. In cura lignorum sudorifera, una vice de die frequentius, & quidem mane ad unc. vi. calidè eibito decocto, sudor prolicitur, licet subinde in robustis, valde p- tuitosis & copiosis excrementis refertis, etiam circa vesperam idem usus decocti repeti possit. In febribus continuis, malignis, variolis, bis vel etiam ter de die, si magna adsit malignitas, sudorifera exhiberi pos- sunt. 6. Cavendum esse, ne fluente adhuc vel etiam absterto sudore, aer frigidus per poros adhuc patulos admittatur; hinc post sudorem linteamina & induisia (calidè prius corpore absterto) mutari, & alia tepida indui possunt. 7. Durante sudore, si æger sitiat, potum largiorem concedi posse, cum sudorem coadju- vet, præsertim si calidus sit, frigidus autem magis cum impedit, maximè confertim haustus, licet ma-

gis recreet. Post sudorem, moderate acidula conueniunt, ut sanguis attenuatus & resolutus, blande iterum coeat.

VII.

Item advertet Medicus. 8. In diæta sudorifera, pro majori vel minori morbi vehementia & contumacia, per dies 15. 20. 30. & ultra persistendum, (nisi vires deficiant) ac talem victus rationem observandam esse, ut æger utatur assis potius quam elixis, aviculis nempe montanis, pullis columbinis, gallinaceis &c. pane bis cocto, passul. amygd. tost. &c. pro potu Boccheto, id est, Decocto lignorum secundario, ut alvus, si fuerit obstructa, clystere emolliatur, & quod optimum, singulis 6. vel 8. diebus purgatio instituatur, omissa illa die potionē sudorifera, ut etiam crassior materia, quæ assumptis partibus tenuioribus restagnare solet, per alvum deturbetur. 9. Decoctum hoc sudoriferum etiam usurpari citra sudorem, pro solo scopo alterativo, in affectibus chronicis, & præser-tim exulcerationibus internis, additis vulnerariis, ut quotidie bis vel ter haustus de eo sumatur. 10. Tandum quoad tempus in febribus notandum, quod, nisi febres nimis sint malignæ, aut erysipelati, vel pleuritidi juncta, melius sit coctionis signa exspectare, ut materia excrementitia non cruda sit, ac vitiosè in sanguine ebulliat, sed præcipitata & separata, alias enim vel nullus sequitur sudor, vel nudus latex aquosus; cum spirituosis halitibus tantum exhalat, sine ephoria æ gri, & cum insigni potius ejusdem damno, nam nihil separari potest ex liquore, cuius porulis intime unitum est. Hinc ad imitationem naturæ: vel in declinatione universali morborum, vel particulari paroxysmorum tantum sudores movet, ac eadem variolas & petechias, non nisi post aliquot dierum febrim, salubriter & sufficienter expellere solet; ut adeò aphorismus

mus Hippoc. decoctis evacuandis, non tantum de purgantibus sed etiam sudoriferis & diureticis intelligendus sit.

A R T I C U L U S II.

De Officio Medici in præscribendis formulis Remediorum Sudoriferorum.

DEcoctum Sudoriferum famosum in lue venerea, multis pro arcano habitum R. Rad. chin. s. lib. ss. add. sarsapar. non carios. lib. ss. sassafr. unc. ii. antim. crud. pulv. & aq. font. prius lot. ad separacionem pulveris nigricantis, unc. i aq. font. lib. iv. coq. ad consumpt. madet. post refrig. col. S. Decoctum sudoriferum, de quo mane octava pars jejune calidebenda, & postea sudandum.

Aliud Zvwolfferi. R. Ling. guaiac. torna deraſ. un. vi. sassafr. rec. unc. iii. rad. chin. sarsapar. an. unc. ss. liq. ras. unc. i. passul min. unc. iv. mercur. vivi antim. crud. contus. in pet. ligatorum an. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incif. infund. per 14 horas, post coq. f. a. ad remanent. lib. xvi. Colat. detur ad vas vitreum vel terraeum, nullo modo autem metallicum. Dentur quotidie unc. v. vel vi. vel manę hora sexta & vesperi hora quarta, unc. iv. calide.

Præ Potu. R. Chin. opt. sarsapar. an. unc. ii. lign. sassafr. rec. unc. i. ss. rad. liq. ras. unc. i. passul. min. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incif. stent per hor. 24. hinc coq. f. a. reman. lib. xviii. Col. S. postpotus ad bibendum in diæta sudorifera.

Aliud in Gonorrhœa virulenta. R. Rasur. lign. guaiac. sarsapar. an. unc. iv. cort. lig. sanct. dr. vi. infund. in aq. puriss. lib. vi. stent in loco calido per 24 horas, coq. in diplom. ad cunsumpt. 3. p. add. in media coq.

codd. rad. liq. enul. an. unc. ss. cinam. ac ut. dr. iii. sem. anis. fœnic. an. dr. ii. Col. Dos. unc. vij. provocatis in laconico sudoribus.

Aliud. R. Lign. sanct. unc. x. cort. ejusdem unc. j. sarsapar. unc. iii. inf. in aq. lib. xij. decoq. ad mediet. col. resident. affund. lib. xij. coq. ad consumpt. 3. part. add. passul. unc. ij. liq. dr. ii. M.

Diceta sudorifera in Paralysi vera. R. Ling. guajac. ver. unc. iv. cort. ejusdem dr. ij. lig. sassaf. dr. vij. rad. peon. enul. Ir. an. unc. ss. incis. stent. in infus. in loco calido per 24. horas. Coq. ad remanet. lib. iv. ss. add. in fine fl. salvo. primul. ver. anth. lavend. stæcb. Arab. an. dr. ii. cinam. acut. unc. ss. ebull. semel atque iterum col. sudetur in laconio, suscitato vapore ex decocto herbarum cephalicarum, scoriis vel lapidibus ignitis assuso.

Alia in Suffusione. R. Rad. sarsapar. unc. ij. lign. sanct. unc. j. sant. rub. unc. ss. rad. liq. dr. vi. asperge sp. sulp. scr. i. inf. per hora. 24. in aq. lib. vi. add. passul. min. unc. iii. cibeb. uno. i. ss. herb. euphras. cum fl. mi. fl. cyan. beton. an. m. ss. sem. coriand. fœnic. an. dr. i. ss. coq. f. a. ad reman. lib. iv. Col. Dos. unc. iv. vel v.

Decoctum sudoriferum temperatum, in Catarrhis & affectibus Capitis. R. Rad. chin. sel. incis. unc. i. scarsaparill. vino purgat. a pulvere & contus. unc. i. ss. sassaf. limat. dr. i. ss. inf. in lib. xii. aq. font. stent per horas 24. coq. ad consumpt. medietat. col. addi etiam posset aliquid de visco querc.

Decoctum sudoriferum in Podagra. R. Scob. lig. guaiac. rad. sarsapar. an. unc. ii. lig. sassaf. crassé limat. dr. i. ss. affund. aq. font. lib. vi. coq. in B. M. per hor. 6. col. Subinde Decoctum fieri potest, ex solo ligno sassaf.

Decoctum sudoriferum in Scabie. R. Scob. lig. sassaf. guaiac. an. unc. vi. rad. chin. sarsapar. an. unc. ss. cinam. acut. dr. i. sic. lig. an. unc. ss. passul. min. unc. iii. sem.

iii. sem. anis. fænic. an. dr. ss. coq. in aq. font. lib. xv.
ad tertias Col.

Decoctum alterans, putredinem inhibens, exsiccans
& consolidans, in Ulceribus & Abscessibus internis
usuale, sine sudoris provocatione. R. Rasur. lign.
sanct. unc. iii. rad. sarsapar. unc. ii. scorz. unc. i. ss.
fragar. consolid. mai. min. glycyr. an. dr. vi. herb. ve-
ron. m. ii. coriand. præp. dr. ii. passul. min. unc. iv. Cog.
in aq. lib. xv. ad med. col. S. Decoctum alterans, de
quo mane vesperi, & nocte, 4. aut 5. unciaæ su-
mendæ.

Aliud magis temperatum. R. Rad. chib. ponderos.
unc. iii. sarsapar. unc. i. scorz. unc. ii. caryophyllat. unc.
i. macerata per noct. bull. m. in f. q. aq. font. add.
herb. scabios. alchimill. beder. terrest. an. m. i. fl. ro.
rub. m. i. violar. m. ss. sem. fænic. dr. i. passul. unc. ii.
decoct. traic. per manic. Hippoc. Col. S. ut supra.

Brodium columbinum, exsiccans & sudoriferum,
in Catarrhis, & incipiente Phthisi utile, vulg.
R. Rad. chin. sel. in taleol. sciss. dr. ii. lig. lentis. dr. ii.
mac. scr. ss. M. ad chart. S. Species pro brodio co-
lumbino in quibus una dimidia columba in vase aper-
to ebullienda, usque dum caro ab ossibus separetur.
Et sic pro ceteris dosibus, per 14. vel plures dies.

Aliud Brodium Catarrhale, suave & proficuum in
Catarrhis diuturnis, viscera corroborans, & materiam
serosam absumentis. R. Chin. sel. unc. i. lign. len-
tisc. dr. vi. rad. Rhod. dr. ii. incid. & infund. ali-
quamdiu, hinc cog. cum gallin. iuvene in lib. v. vi. aq.
font. ad debitam cocturam, cap. m. unc. vi. vel viii.
aromatiz. cum paucō mac. Singulis tribus diebus pare-
tur recens.

Potio sudorifera in Febribus continuis & malignis.
R. Elect. discord. Fracast. scr. iv. pulv. rub. pannon.
vel spec. de hyac. aut liberant. scr. i. lap. bez. orient.
vel sal. vol. C. C. gr. vi. syr. acetos. cit. unc. ss. aq.
card. b. vel scorz. unc. ii. ss. acetos. vel tot. cit. aut

xv. cordial. frig. unc. ss. M. S. Potio sudorifera imalignitatem purgans pro una vice sumenda.

Alia. R. Ag. scabios. card. b. scord. an. unc. i. acet. bezoart. dr. iii. diacord. Fracast. dr. i. vel mithrid. confect. alk. an. scr. i. C. C. philos. præp. antim. diaph. terr. sig. vel unicorn. fossil. an. scr. i. nit. perlat. gr. vi. syr. de scord. vel rub. idæ. dr. vi. vel unc. i. M.

Alia. R. Mixt. f. scr. ii. antim. diaph. C. C. phil. præp. an. scr. i. ag. fumar. card. b. an. unc. i. ss. syr. acetos. cit. unc. ss. M.

Emulsio sudorifera in Variolis & Febribus malignis. R. Semin. aquileg. nap. cit. an. dr. ii. pæon. dr. i. ag. fumar. card. b. galeg. scorz. an. unc. i. cordial. frig. dr. vi. M. f. Emuls. add. C. C. phil. præp. scr. i. antim. diaph. scr. ss. sacch. perlat. parum. S. Emulsio sudorifera pro una vice sumenda.

Alia. R. Sem. mel. dr. ii. card. b. aquileg. an. scr. ii. ag. acetos. fl. calend. fumar. an. unc. i. vel decoct. C. C. rasp. unc. iii. add. C. C. phil. præp. scr. i. vel dr. ss. Jul. ros. unc. ss. M. S. ut suprà.

Bolus sudoriferus, in Erysipelite, Scabie &c. R. Rob. sambuc. unc. ii. C. C. phil. præp. scr. i. bezoart. mineral. vel antim. diaph. gr. xv. vel pulv. rub. pann. C. C. phil. præp. an. scr. i. lap. bez. gr. v. M. S. Electuarium sudoriferum pro una vice sumendum, postea bibantur 1. aut 2. cochlearia aquæ Florum. Sambuci.

Alius. R. Theriac. vel mithrid. opt. scr. i. ss. confect. alk. scr. i. C. C. phil. præp. scr. i. antim. diaph. scr. ss. syr. de card. b. parum M.

Bolus sudoriferus in Febribus malignis. R. Dia cord. Fracast. scr. ii. confect. hyacinth. scr. i. C. C. phil. præp. scr. ss. lap. bez. orient. gr. vi. M. S. Electuarium sudoriferum pro una vice.

Electuarium sudoriferum pro pluribus dosibus. R. Rob. Juniper. diacord. Fracast. an. unc. i. ss. ther.

An.

Androm. mitbrid. an. dr. ij. terr. sigill. files. dr. i. syr. acetos. cit. q. f. M. f. Elect. 8. Electuarium sudori-ferum in magnitudine nucis pro una vice sumen-dum.

Pulvis sudoriferus & expulsivus, in Variolis & Fe-bribus malignis . R. *Pulv. rub. pannon. dr. ss. spec. de hyac. scr. j. lap. bez. occident. gr. xv. vel orient. gr. vij. vel loco bez. sal. vol. C. C. gr. xv. M. f. Pulv. divid. in 3. p. æq. S.* Pulv. sudoriferus & expulsivus pro tribus vicibus sumendus.

Alius . R. *Spec. liberant. de hyac. unicorn. fo- an. scr. ss. sal vol. C. C. vel lap. bez. orient. gr. vi. M. f. Pulv. subinde unum vel alterum gr. camphora addi potest.*

Alius . R. *Unicorn. veri , antim. diaph. cinnab. antim. sal. vol. viper. vel C. C. an. gr. viij. M. f. Pulv. detur ex aquis e typh. cerv. card. b. scorz. su-mar. &c.*

Pulvis alexipharmacus & sudoriferus Minderet.
R. *Sacch. cand. dr. ij. camph. dr. j. M. f. Pulv. cuius Dos. dr. j.*



ARTICULUS III.

De Officio Medici, in instituenda evacuazione per Urinam.

I.

Cum cacochyiae curatio, non tantum purgantibus & sudoriferis, sed etiam quandoque perficiatur evacuatione per Urinam, quod clare patet ex perfectis crisibus, quas natura subinde in pleuritis, empyicis, aliisque morbis detentis instituit per urinam, ea hic etiam inter evacuationes universales consideranda; dum remediiorum diureticorum ope, salia massa sanguineæ, aut superflua, aut vitiosa, tartarea & peregrina, sub lixivii urinosi forma, per renum tubulos in eorum pelvim præcipitant, ac per vias urinarias eliminant, quæ evacuatio eò jucundior & tutior, quod nec vires prosternat, nec sanguinem aut corpus conturbet, sed cum ephoria humores, ex secunda aut etiam tertia regione evacuet.

II.

Cum igitur hæc sanguinis depuratio per Urinam locum sibi vendicet, ubi vel tartarea, salinæque particulæ in corpore abundant, ac massam sanguinem, & speciatim serum inquinant, vel colluvies ferosa hinc inde in visceribus, seu etiam in insigni alia corporis cavitate delitescit, in usum trahenda erunt diuretica. 1. In vitiis urinæ, ut ejus defectu, Ischuria, dysuria &c. 2. In fero peccante, in quantitate vel motu, ut in cachexia, hydrope, & præser-tim ascite, anasarca &c. 3. In fero in qualitate pec-cante, ut Ictero, scorbuto, affectione hypochondriaca, & qui-

& quibuscumque aliis lienis affectibus, vel revera talibus, vel ipsi saltem attributis, in quibus urina quandoque atramento similes, vel cum copiosis arenulis, vel potius salibus concretis & præcipitatis cum insigni levamine rejiciuntur, 4. In gonorrhœa, fluore albo, arthritide; nimia obesitate, calculo, declinationes, febrium, aliisque pluribus affectibus.

III.

Operationem suam exercent *diuretica*, vel abster-
gendo, qualia sunt tum aqua & liquida, serum
substantialiter augmentia, ac uberem aquosamque ma-
teriam suppeditantia, ut Acidulæ, Serum lactis,
Thermæ &c. tum aquosa mucilaginosa, acrimoniam
seri temperantia, ut glycyrr. althæa, sem. 4. frigid. m.
&c. quæ diuretica frigida & impropriè talia, vel po-
tius uretica dicuntur, vel sanguinem attenuando,
resolvendo, & speciatim laticem serosum in eo fun-
dendo, ac ita lotii copiam è toto corpore prolicien-
do qualia sunt sale volatili prædicta, ac omnia salsa,
tartarea & nitrofa; hinc sal primum esse diureticum,
rectè scribunt chymici. Proinde etiam acida & ter-
rea alcalina, in alium saporem plus minus salsum con-
vertuntur, ut fiant diuretica, vel serum acrius, in-
deque absterfivum, & viscidorum plus minus attenua-
tivum, ac nonnihil colliquefactivum, & hinc renum
stimulativum reddendo, qualia sunt herbæ diureticæ;
alcalinæ, ocul. canc. &c. vel acrimonia volatili re-
nes irritando, & ad frequentiorem excretionem stimu-
lando, qualia sunt cantharid. & raphanacea. Vel
tonum renum conservando, & vim transcolatoriam
non absque aliquali stimulo promovendo, qualia sunt
juniperina, terebinthinata; vel tandem præcipitando,
& sic separationem partium serosarum, à sanguineis
facilitando.

IV. C I T R A

Nusu remediorum *diureticorum* Medicus observabit, 1. Ante eorum usum præmittenda esse universalia, tum quia in principio plerumque materia crassior & copiosior est, ut frustra per urinam duci possit, tum quia metus est, ne copia sua, dum ad angustas vias ruit, eas obstruat, ac sibi & aliis viam intercludat. 2. Diuretica magis convenire in morbis chronicis quam acutis & calidis, ut v. g. in febribus ardentibus, heptica, phthisi &c. nisi aquea sint & temperantia. 3. Eadem in genere magis convenire in subjectis eularchis, & suseulentioribus, phlegmaticis nempe & sanguineis, quam acrioribus, cholericis & melanocholicis, cum in talibus continuo usu ad atrophiam & tam disponant. 4. Eadem magis locum habere in statu & declinatione, quam in principio & incremento.

V.

Præterea. 5. observabit, eadem jejuno ventriculo longè ante pastum exhibenda, nec cibis tam facile permiscenda esse, cum citius quam par est, chylum in vasa præcipitent. 6. Ipsis vasis & visceribus urinæ excretioni velificantibus, affectis ac detentis, v. g. inflammatione, ulcere &c. cautus danda esse diuretica, vel non nisi terrea, alcalina, vel temperantia & simul traumatica usurpanda esse. 7. Eadem in calculo renum, præsertim etiam in paroxysmo Nephritico minus tuta esse, nisi præmissis emollientibus, lubricantibus, ac oleosis, cum vel impuritates corporis deducant ad partem affectam, vel iisdem calculis præcipitetur ac, deturbetur in vasa, cum lethali sape Ischuria.

ARTICULUS IV.

*De Officio Medici, in præscribendis for-
mulis Diureticorum.*

I.

DECOCTUM DIURETICUM, experientia probatissimum
R. Sem. malv. alth. an. dr. iii. cic. rub. unc. iii.
fr. m. an. dr. ii. bord. mund. m. i. caric. ping. N
viii. sebest. N. vii. rad. liq. ras. dr. vi. incisa indan-
zur Nodul. ex serico alb. & coq. in aq. font. lib. in-
ss. ad tertias. Col. S. Decoctum diureticum, de quo
bibatur octava pars mane, vesperi, & ante cubitum.

Subinde uno haustui indi possunt: spirit. sal
vi. vel vii. Forestus huic decoct. addit. rad. ononid.
fœnic. petrosel. ad unc. ss.

Julepus Diureticus. R. Decoct. Forest. lib. ss. ve-
aq. ononid. fragor. petrosel. an. unc. ii. syr. de alth.
Fern. unc. i. ss. sp. sal. q. f. M. posset etiam addi-
ocul. canc. dr. ss. S. Julepus diureticus qui cochleatin
sumendus.

Terebinthina liquida. R. Tereb. cyp. cum. vitell.
ov. dissolut. dr. v. brod. cum carn. vel vin. Rben.
opt. unc. iii. M. super lente carbonum igne. Alii etiam
addunt succ. lim. dr. vi. vel unc. i.

Alia. R. Resin. terebinth. cyp. unc. ss. dissolv. tunc
vitell. ov. f. q. addendo paulatim syr de alth. Fern
unc. ii. vin. malv. unc. vi. M. Dos. unc. i. ss.

Potio diuretica suavis & efficax. R. Succ. limon.
succ. express. ex corticibus raph. acut. vin. malv. aq.
frag. an. unc. ii. sacch. q. f pro dulcorat. R. Vin. ali-
unc. iii. succ. lim. unc. i. spirit. tereb. scr. ii. M.

Mixtura Diuretica. R. Aq. anonid. petrosel. saxi-
frag.

frag. an. unc. i. spirit. juniper. dr. iiij. ocul. canc.
prep. scr. i. Bals. sulph. tereb. scr. j. syr. de alth.
Fernel. unc. ss. M. detur cochleatum cum gutt. xv. se-
quentis Balsami Diuretici. R. Spirit. sal. tart. Bals.
sulph. terebinth. an. scrup. ii. sal. vol. succin. gran.
vi. M.

Lixivium Diureticum, Hydropicis perquam pro-
ficiuum. R. Ciner. genist. vel summit. Juniper. lib. i.
vin. Rben. lib. iv. infunde frigide addendo sal. ab-
sinth. vulg. p. i. vel p. ii. de colatura mane & sero
unc. iv. potentur, usque dum tumor diminutus sit,
ul R. de colat. unc. iv. succ. cit. dr. vi. syr. de alth.
Fernel. unc. i. M.

Vinum Diureticum. R. Gr. alkek. unc. i. rad. eryng.
nnid. an. unc. ss. bacc. juniper. matur. unc. ss. incis.
& in sindone ligat. affunde vin. alb. lib. iii. Dos. unc.
præmisso fusculo decoct. petrosel. cic. rub. cum butyr.
& modico sale.

Bromidum Diureticum. R. Cic. rub. cochl. i. rad.
petrosel. alth. an. dr. ii. halicacab. gr. x. coq. cum quar-
ta parte Gallin. vel media pulli columbin. Col. subin-
te additur succ. lim. vel cum eo sumantur gut. viii. vel
& spirit. terebinth.

Emulsio Diuretica. R. Sem. violar. unc. ss. litho-
sperm. contus. dr. ii. aq. fragor. q. s. M. f. Emuls. dul-
cor. sacch. S. Emulsio diuretica pro una vice sumen-
da.

Alia. R. Sem. melon. dr. vi. papav. alb. dr. i. vic-
lar. dr. i. ss. nucl. persic. unc. ss. aq. petrosel. alkek.
frag. an. unc. iii. M. f. Emuls. add. ocul. canc. præp. dr.
i. sacch. cand. q. s. pro edulcorat.

Boli ex Terebinthina. R. Terebinth. cyp. aq. malv.
sepius lot. unc. ss. troch. de alkek. s. op. scr. i. pulv.
subtiliss. glycyrr. gr. xxv. cum sacch. s. q. M. f. Boli 3. mi-
nores, m. v. & nocte sumendi.

Pilulæ Diuretricæ. R. Ocul. canc. præp. dr. ss. sal.
nonid. scr. i. vol. succin. scr. ss. tereb. aq. malv. lot.
& coct.

De coct. dr. iii. M. f. Pilul. pist magnitudine, dentur ad scarul cum pulv. glycyrr. S. Pilulae diureticæ & ex pulsivæ, quorum 10. aut 12. pro una vice sumendæ.

Pulvis Diureticus. R. Cryst. tart. dr. iii. magist. ocul. canc. sal. ononid. an scr. iv. M. f. Pulv. S. Cremor tartari diureticæ mixtæ cujus tres cuspides cultri plenæ pro una vice sumendæ.

Alius. R. Ocul. canc. præp. dr. i. sem. mil. sol. scr. i. ss. tart. vitriolat. gr. xv. M. f. Pulv divid. ad 3. p. eq. summendas ex brodio cic. rub. vel aq. ononid. petrosel. malv. cum spirit. sal.

Alius fortior. R. Milleped. præp. scr. i. ocul. canc. gr. xv. sal. vol. succin. gr. v. vel vi. M. f. Pulv.

Clyster Diureticus terebinthinatus. R. Herb. malv. parietar., mercurial. beton. an. mi. fl. chamom. melilot. summit. aneth. an. m. ss. sem. anis. fœnic. carv. an. dr. ii. lin. dr. iii. coq. in aq. s. q. ad 3. in col. unc. x. dissolv. eleck. lenit. vel cass. pro clyst. dr. vi. bier. s. bened. lax. an. dr. ii. ol. scorp. chamom. an. unc. i. tereb. vitell. ov. dissolv. unc. ss. mell. antbos. dr. vi. sal. parum M. f. Clyster.

Unguent. ad renes & vesicam. R. Ung. de alth. resac. infrigid. Gal. an. unc. ss. ol. scorp. unc. i. succ. limon. dr. vi. M. S.

Aliud. R. Ung. de alth. dr. vi. ol. amygd. scorp. an. dr. ii. pingued. cunic. dr. ii. petrol. dr. i. ol. destill. spic. Juniper. an. dr. ss. M.

Cataplasma Foresti, expertum in Ischuria vesicali. R. Pariet. mii. chærefol. mi. ss. incis. coq. in s. q. aq. vel lact. ad mollit. Alii etiam addunt cep. sub cineribus coct. add. butyr. rec. unc. ii. ol. scorp. unc. i. ss. M. applicetur calide.

Aliud fortius. R. Cep. alb. crud. N. vi. capit. allii N. ii. contus. in mortar. add. pingued. anser. D^r ol. scorp. q. s. cum guttis paucis ol. destill. Juniper. M. pro Catapl. applicando renibus & vesicæ.

ARTICULUS V.

De Officio Medici, in evacuatione salivali, ac ordinandis Remediis Salivantibus.

I.

Inter hactenus dictas, universales corporis evacuationes, postrema est *salivatio*, seu universalis *ptyalismus*, quo mediante per copiosiorem salivæ effluxum, veluti per universalem apophlegmatismum, universa massa sanguinea sero suo, una cum vitiosis fermentis in eo contentis liberatur. Indicatur hæc evacuatione principaliter à lue venerea, & ea præsertim quæ sudoriferis non cedit, ossa tamen nondum exesit; sed ubi ulceræ, serpiginæ, tubercula faciei, aut penis & corporis totius sicca, membrorum lancingationes; Secundario verò etiam ab aliis morbis rebellibus & contumacibus, ex vitio graviori seri oriundis, ut v. g. lepra seu elephantiasi Græcorum, epilepsia, arthritide contumaci, scabie maligna, ulceribus crurum cacoethitis, affectibus cutaneis gravioribus, asthmate humoso, cancro, scorbuto frigido, idque magis, quando in his malis aliquid venerei intercurrit.

II.

Materia remedii salivatorii est potissimum *Mercurius*, qui ob partes suas volatiles, elasticas ac summè evaporabiles, & sulphur peregrinum arsenicale, succum alimentosum, seu massam sanguineam lymphaticam colliquefaciendo, ac coagulata fluxiæ, serumque turgescens reddendo, ut torulis suis

consistere haud valens exitum affectet, in causa est ut illud cum absorptis vitiosis fermentis venereis aliisque ad os & fauces continuo confluens & affluens sub forma salivæ evacuetur. Modum hunc *pyralismus* excitandi duplex est, unus, qui per interna peragatur, dum in usum trahitur *mercur. dulc.* vel *turbu. mineral.* *Croll.* vel *arcanum corallinum*: alter, quod per externa, ut *unguenta suffitus*, qui tamen periculosi, *emplastrum*, quæ tamen, sicuti gummata, dolores ac tumores venereo potenter resolvunt, ita salivationem excitandam segniora sunt, licet ea promovendi gratia, subinde in usum trahi queant. Idem fermè dicendum, de *cingulo sapientiae*, quod nihil aliud est, quam *pannus lanceus mercur. vivo pingued. porc.* subacto imprægnatus, qui dein lumen per modum cinguli applicatur, cum in levioribus statum malis, scabie nempe & phthiriasi, ubi salivatione opus non est, adhibetur, ut interdum eam erit. Supradictis igitur Mercurialibus in usum traditis, fluxus salivæ succedit primo tenuis, hinc mucilagineæ, tertio denique viscidioris, & fœtidæ, quæ finis est perfectæ salivationis.

I I I.

SIcuti autem coindicant evacuationem salivalen-
tis vires constantes, ætas Juvenilis & Virilis, tem-
pus vernum & æstivum, regio magis calida, quam
frigida; ita contraindicant corpus debile, emacia-
tum, vires exhaustæ, malum nimis radicatum, ætas
puerilis & sensilis; ulcera ac inflammations viscerum,
phthises, nervorum nativa debilitas, scorbutus bilio-
sus, hæmoptysis, nimia hæmorrhagia, tempus au-
tumnale; tum ob frigus, tum ob humores tunc tem-
poris magis lento, & minus fluxiles, hyemale, pro-
fensi quoque vomitus, diarrhœa, sudor vehemens: illi
tandem subjecta, quæ ante morbum gallicum ulceri-

bus oris, vel angina, tremore, paralysi, convulsione, macie &c. fuerunt detenta.

I V.

PRO debita hujus curæ administratione, Medici officium erit observare, 1. Cautum debere esse ejus usum, cum *mercurialia* plerumque post se relinquent characterem indebilem, adeoque non administranda, nisi urgente necessitate, morbo nempe ita pertinaci existente, ut decocto lignorum non cedat, vel illud ob alias circumstantias exhiberi non potuerit. Hinc etiam utile erit, ut Medicus ante hujusmodi curam, præmuniat se prognostico, prædicendo quæ fieri solent seu bona seu mala; subinde enim efficacissima hæc cura deprehensa, ut mox exsiccantur ulcera, crustæ evanescant, tubercula, calli destruantur, ac omne seminium morbosum perfectè eximatur, sine metu recidivæ, & quidem tutò, si cum debitæ cautelis instituatur. 2. Nonnullos corpus prius ad hanc curam per V. S. & purgationem disponendum esse jubere: immò balneum aquæ dulcis, cui æger ante curam quotidie semel vel bis infideat, adhibere, ut humores attenuentur, & pori magis patuli, faciliorem penetranti Mercurio aditum concedant: nonnullos econtra omittere has præparationes, ut ægris nullis evacuationibus debilitati, salivationis impetum multo melius sustinere valeant. 3. Ægrum nudatum collocari debet ad fornacem calidam, inungendo propriis manibus unguento Mercuriali plantas pedum, talos, genua, carpos, & in malo urgentiori etiam cubitum: immò etiam in pertinaciōri affectu, sed raffissimè, spinam: ac continuando aliquandiu hanc inunctionem, donec labia intumescant, parotides doleant, lingua infletur, ac salivatio prodire incipiat. 4. Instituendam manè jejunio stomacho, vel nocte, nam rarò bis eodem die sit inunctio in loco conclu-

fo. 5. Peracta inunctione (cui simul inter inungandum concinna frictio jungatur) ægrum lecto calido committendum esse, ut sic transpirabili servato corpore, magis actuetur vis mercurialis.

V.

PRæterea 6. notabit Medicus, inunctionem, si ci-
tius labore defungi velimus, vel æger robustus sit,
altero die statim repeti posse: aliàs interpolationem
unius diei faciendam, ac tertio demum die reassu-
mendam esse. Non enim præscribi potest certus inun-
ctionum numerus, cum subinde primo vel altero sta-
tim die incipiat salivatio: ordinariè verò circa quar-
tum vel quintum superveniat, ac ut plurimum per se
intra dies 15. finiatur. Interim ubi malum valdè con-
tumax, tardius, & 14. demum die subinde superve-
nit. 7. Desistendum esse ab hac cura, si non sequa-
tur salivatio, sed hujus loco superveniant ventris tor-
mina, dysenteriæ, dolores ventriculi, sudores frigidi
&c. 8. Unicè in hac cura procurandum esse, ut sali-
vationis actus moderetur ad euphoriam naturæ, id est,
ne vel nimium evehatur cum ægri vitæ periculo, ne-
que plus aequo deprimatur, ut elanguescat, antequam
symptomata penitus disparuerunt. Prius sit per muta-
tionem linteorum & indusiorum, post quartum diem
à statu salivationis, uti etiam per alvum ducentia,
quæ eam ad oculum diminuunt; hinc si eadem con-
servanda, non nisi quarto die levis clyster injicien-
dus; præterea eam cohibent opiata, & theriacalia,
posteriorius fit, tenendo in ore globulum ex *Mercur. dulc.*
cum tragac. parat. vel juncturis & volis manuum ac
plantis pedum applicando *Emplast. Vigon.* *cum Mercur.*
vel intus etiam sumendo *Mercur. dulc.*

V I.

Insuper 9. sub ipsa salivatione, quam maximè debitum diætæ regimen observandum esse, jubebit Medicus, præscribendo diætam tenuem, pro potu decoct. lignorum, non tamen nimis forte, ne sequatur sudor salivationem impediens, cavendo quam maximè aerem, vel potum etiam frigidum, ne materia cumulatim ad fauces ruens, repercutiatu cum metu suffocationis, vitando insuper vinum, utpote noxium, ac graviores animi affectus, prospiciendo etiam symptomatibus, quæ cidentur à salivatione, qualia ordinariè sunt febris longa, uliginosus & fastidiosus fœtor, dentum vacillatio, nigredo &c. Sic dum salivantes tribus vel quatuor primis diebus acerbos sufferunt dolores, ob gingivarum & colli inflammationem, lacte tepido gargarizato adjuvandi, & dentes hoc tempore unctuosis non illinendi, ne à mercurio denigrentur, difficulter vel rursus nunquam dealbandi; præterea etiam si tempore salivationis magna succedat gingivarum hæmorrhagia, ea non statim sistenda, nisi limites excedat.

V II.

Andem 10. notandum, salivationem, quæ convalescente ægro in dies minuitur, leniter adhuc promovendam esse Mercurio dulci, semel adhuc in septimanâ exhibito, immò etiam postquam convaluit æger, & sub dio rursus versatur. Cessante autem omnino fluxu, ægrum denuo purgandum, ac decoct. lign. sudoriferum propinandum esse nonnulli suadent, ad eliminandas sordes, hinc inde forsitan restitantes, uti & penitus extirpandum è corpore Mercurium. Alii econtra id præstant, per flores sulph. cum foliis auri assumptos, vel auri frequenter in ore gestationem, rursus, si albescit, per ignem depurandi, frictiones, Balnea

sulphurea &c. II. Sciendum, curationem hujus luis per *suffumigia* magis periculosam esse, quam per inunctionem, sicque non adhibendam, nisi omnibus reliquis frustra tentatis. Sunt autem duplia, & quidem vel *universalia*, toto corpore excepta, dum æger per dies 4. 5. vel 6. sub labro stragulis cooperto, ut caput superemineat, vel etiam eodem inclusa, si pu-stulae & ulcera sint in eodem, ut etiam in fronte, temporibus & collo, ita tamen, ut per fistulam foris prominentem aerem hauriat, ignitabulo vivis cathonibus instructo, & infra sellam patientis posito, pulvereque suffitus insperso, fumum excipit per quadram tem, aut dimidiā horam, hincque in lectum se confert, exspectando operationem Mercurii; vel *particularia*, quæ magis in usu, certisque partibus, ut cruribus, vel brachiis, tophis aut ulceribus malignis vexatis, adhibentur.

Formulæ

Salivantium internorum.

R. *Mercur. dulc. ritè præp. gr. x. dentur cum vi-
tell. ov. ascendendo quotidie cum uno grano, us-
que dum deveniatur ad gr. xxxv. & ultra. Vel
R. *Mercur. dulc. dr. ss. vel scr. ii. extract. scorz.
scr. i. M. f. Pilul. N. xxx. dentur pro Dos. vi. vel
x. ascend. cum grano quotidie.**

*R. Turb. mineral. Croll. cum spirit. sulph. parat.
vel Mercur. præcipit. speciatim cum spirit. nitr. alias
Arcanum corallinum dictum gr. iiiij. vel iv. sequenti dī-
t. v. hinc vi. &c. donec omnes doses simul 15. vel 20.
grana compleverint, cum raro plus requiratur.*

Formulæ

Salivantium extenorū.

Unguentum suplicissimum. R. Mercur. crud. unc.
i. axung. porc. unc. ii. M. in mortar. S. Unguentum
Mercurii simplicissimum: quod, uti notum,
applicetur.

Aliud. R. Mercur. viv. cum s. q. tereb. extinct. &
inviscat, ab unc. i. ad ii. ung. pomat. ab unc. iii. ad
ii. ol. laur. unc. ss. ol. destill. lig. Rhod. scr. ss. M.
S. ut suprà.

Aliud magis compositum. R. Axung. porc. lib. ss.
Agripp. martiat. ol. laur. tereb. an. unc. i. ss. Mer-
cur. viv. extinct. unc. iii. sublim. dr. i. ss. thur. myrrb.
an. dr. i. lytharg. dr. vi. M. f. Ung.

Suffitus. R. Cinnab. unc. iii. antim. unc. i. ss. thur. benz.
forsac. an. dr. iii. succin. mirr. an. dr. ii. M.

Altis. R. Mercur. cinnab. antim. oliban. sulph. an.
unc. ss. M.

Cingulum sapientiæ magis compositum. R. Argente.
viv. unc. ii. ol. vitriol. unc. ss. caryoph. dr. i. pic. sulphur.
an. dr. ii. album. ov. N. xii. sal. gemm. cor. an. q. s.
M. f. Ma.



A R T I C U L U S IV.

*De Officio Medici, in evacuatione parti-
culari, per Errbina, Sternutatoria,
Apophlegmatixantia, & Ex-
pectorantia.*

I.

INter particulares evacuationes, & præsertim ~~ca-~~
pitis, principalem locum habet illa, quæ sit per
errbina, & sternutatoria; quorum illa lympham seu
pituitam per nares prolixiunt sine sternutatione, hac
autem, quæ etiam ptarmica dicuntur, id præstant cum
sternutatione; hinc majori vel minori tantum acrimo-
nia, & gradibus inter se differunt, sitque operationes
rhinorum, dum serum liquant, & fundunt, è papillis
glandosis narium, illudque salinis suis spiculis irritant,
& titillant glandulosam seu spongiosam carnem, quæ
nares intus vestiuntur, & hinc successivè lympham
seu pituitam per eam excerni solitam, versus illam
prolixiunt, ejusque excretionem facilitant, tenuioribus
etiam earum partibus, uti juxta veteres haud impro-
babile est, cerebrum per os cribrosum, & nervos ol-
factorius penetrantibus, in eoque humores attenuanti-
bus & serum ad nares deduentibus, vi particularum
acriorum salinarum nitrosarum, aquearum, & deter-
gentium. *Sternutatio* verò sit, dum interior membra-
na narium, majori particularum suarum acrimonie &
acutie, irritatur & vellicatur, hinc spiritibus vehe-
mentius commotis, ac meningibus in consensu tra-
ctis, cerebrum cum membranis se per vices contrahit,
& explosis una spiritibus in nervos paris vagi, vel jux-
ta alios per consensum irritatis intercostalibus, cum
mem-

membrana narium, mediantibus nervis consentientibus diaphragma quoque, & musculi thoracis exspirationi inservientes, veluti spasmo convulsivo contracti, subitaneo impetu aerem elidunt, quousque res irritans excutiatur.

II.

Conveniunt igitur, 1. Motum seri promovendo, illudque evacuando, tum mediate ex cerebro, tum immediate ex naribus; hinc etiam vulgo caput-purgia appellantur, ac prosunt in affectibus catarrhalibus, ac morbis capitis diuturnis, in excretione mucus per nares abolita vel imminuta, ut in coryza, amiso odoratu, obstructione narium &c. 2. Non tam profundi humores liquando, liquatosque deplendo, vel maternam morbificam displodendo, quam vel maximè sopitum archæum, aut spiritus excitando, ut in apoplexia, affectibus soporosis, hystericis, secundina retenta, & partu difficiili, muscularis abdominis quoque versus fortiora compressis. Sic Hipp. 5. aph. 35. ait: *Mulieri hystericas, aut difficulter parienti, sternutatio superveniens, bona est.* Singultu etiam, teste eodem Hipp. 6. aph. 13. *Singultu fatigante, sternutatio superveniens liberat.* 3. Caput quoque simul virtute sua cephalica, subtili, volatili, aromaticâ, roborando, ut in memoria debili, corpore ac defectu spirituum animalium, capite & cerebro debili, vertagine &c. 4. Prosunt abstergendo atque exsiccando, ut in ozæna, polypo &c. Huc quoque spectant Medicamenta lichenistica, seu sanguinem sistentia, in narium hemorrhagia naribus intrusa.

I I I.

Sicut igitur errhina vel sternutatoria in prædictis affectibus indicantur: ita contraindicantur præsertim *sternutatoria*, 1. Organis sensuum affectis, ac in primis debilitatis, ut in ophthalmia, auditus difficultate, tinnitus, aurium dolore &c. 2. In infantibus, senibus, mulieribus gravidis. 3. Partibus, quæ ad sternutationem necessario concurunt, male habentibus, ut in doloribus capitis, fracturis vel luxationibus costarum, phthisi, hæmophysi, stillicidio sanguinis, procidentia ani, uteri, intestinorum &c. 4. In nimium siccis, biliosis, melancholicis; cum magis convenienter pituitosis, quibus serum est copiosius, ac cuius coagulationem plurimum prohibent.

I V.

PRo legitima harum administratione Medicus obserbat, 1. Ea ordinariè non convenire, nisi præmissis universalibus. 2. Minus ea administranda esse, ubi serum peccat in nimio motu expulsivo. 3. Ptarmica nec nimis frequenter, nec acriora convenire, cum commotio cerebri majoris sèpè mali causam præstare soleat, ex conatu ad expellendum fortiori facta. 4. Moderate usurpata, præsertim si simul sint confortantia & cephalica, vegetam reddere naturam, extirpare sensus, roborare cerebrum, serumque abundans evanescere; immoderate econtra partes à tono dejicere, serumque nimis evanescere, idque non tantum superfluum, sed etiam utile, ptarmica enim purgantium more, humores aliàs etiam laudabiles corrumpunt, & quasi tales priùs corrupti fuissent, evacuant; hinc facile patet, quid de usu vel abusu tabaci per nares atrahendi sentiendum, ac qualis distinctio adhibenda sit, habita etiam consideratione subjecti siccioris vel humili-

umidioris. 5. Nimiam sternutationem sisti, lacte vel amygd. attracto; sic etiam ex observat. Frid. Sennanni, oculi angulo compresso sternutationem imdiri. 6. Errhina vel praescribi in forma liquida, & his ægrum tepide, manè duabus horis ante pranum, vel etiam ante cænam, ex vola manus aliquid nares attrahere, ore aqua pleno, idque ter vel quater, vel forma linimenti, quod digito vel pennulaibus, vel ad radicem nasi ad oculi angulum maiorem illinitur, vel forma pulveris, de quo vel vaporatum, aut parum aliquid attrahendo inspiratur, mediante calamo unum vel alterum granum in ure insufflatur.

V.

Andem particularis capitis evacuatio fit per palatum, mediante salivatione particulari, dum saliva moderatè è glandulis oris, locisque vicinis evanescatur, indeque consequenter caput, lympha præternaturali onustum liberatur; unde etiam medicamenta præstantia dicuntur *apophlegmatizantia*, à phlegmate scil. eliciendo, uti & salivantia, eò quod serum sive coagulatum, quod phlegma dicitur, sive fluidum, quod salivæ nomine comprehenditur, illuc trahant. Dicuntur & *masticatoria* ab effectu, quod masticata, affluxum ad fauces promoveant, & restituant ibidem lympham, vel serum eliminent. Sic g. mastix masticata, intra paucas horas ad uncias aliquot sputum elicet. Vim suam exserunt hæc medicamenta, cum glandulas miliares faucium in motum ciendo, ac earum poros, & motu & calore aperiendo, sive dilatando, tum particulis suis salinis, acutatis, incisoris & fundentibus, humores seruos prosumus circa faucium isthmos restitantes fundendo, ligando & incidendo.

V I.

Conveniunt prædicta remedia, atque indicantur.
 1. Tam præservatorie quam curatoriè, in catarhalibus capitis, & vicinorum locorum affectibus, dentium, maxillarum, gingivarum &c. In vertigine, memoriæ debilitate, affectibus soporosis, suffusione, surditate, auditu difficiili, tinnitus, oris fætore, & aphonia. 3. Prophylactice, pro evitando maligno, & contagioso miasmate, quod plerumque salivæ se associat; hinc masticata myrrha, zedoaria, vel rad. angelicæ cort. cit. &c. optime malignorum morborum sunt præservativa. Contraindicantur econtra a fero fluxili, tenuiori & salso; hinc apophlegmatismi in phthisi, tussi, pulmonumque affectibus, cane pejus & angue ingrediendi: item ab ipsis oris affectibus, ut uligine gingivarum scorbutica, cum laxitate & putredine, ac uvulae lapsu, nisi adstringentibus maritata, nunquam enim per locum affectum evacuandum. Prescribuntur apophlegmatismi, vel in forma sicca, dum aut simplicia, vel pulvis horum cum mastiche panno lineo raro, sed forti per modum noduli exceptus masticatur, aut exinde fiunt trochisci lupinares, quorum unus masticatur, & saepius in ore volutatur manè jejuno stomacho, vel etiam duabus horis ante cænam per semihoram, ac capite prono saepius expuitur, quod dissolvitur, abluendo postmodum os vino vel aqua tepida, vel in forma liquida, per modum gargarismi.

V I I.

Tandem ultima evacuatio particularis sit ex pulmonibus, per *anacatharsin* seu *expectorantia*, quæ pectori mediante tussi superfluos humores ejiciunt. Circa hæc observabit Medicus, 1. Ea pro humoris expectorandi qualitate esse duplia, & accuratam inter ea esse

elle faciendam distinctionem; alia enim humores crassos, viscidos & lentes incident, attenuant, detergunt, atque membranam interiorem, fibrasque pneumonicas ad contractionem, & excretionem irritant, maximè utilia, in tussi humida, asthmate, phthisi, pleuritide, catarrho suffocativo; unde etiam audiunt *bechica*, *arteriaca*, & *pneumonica*. Alia, quæ agunt humores tenues, acres, falsos, titillantes & rodentes incrassando, pepasmum inducendo, orgasmum tollendo, & aerumniam fluxilem retundendo, moderando ac figendo; unde etiam audiunt *intercipientia*, quod in via ituros ad pulmones humores quasi remorentr, utilia quam maxime in tussi ferina, hæmoptysi, catarrhis falsis; ubi materiam acrem tenuem, quæ aerem circumfluendo ab illo sursum ferri nequit, temperant & incrassant. Ea præscribi ut plurimum, vel forma syrapi & linclus, qui pitissando, seu sensim ac sensim blande lambendo, seu lingendo assumitur, ut in ore dissolutus paulatim defluat; in quem finem sæpius etiam præscribitur *baculus Glycyrrhizæ*, id est, particula radicis hujus, ut altero extremo leniter contuso intingi, & in ore sugi possit; vel forma rotularum, quæ subinde aliis expectorantibus præferuntur, tum quia gratiore, tum quia sensim liquefcentes, magis ingredi censentur laryngem, & pulmones; vel forma aq. destillat. *sacch.* *cand.* *edulcoratae*.

VIII.

Præterea circa hæc notabit. 3. Expectorantia longius a pastu, vel ante eundem m. & v. sumenda, neutquam vero cum cibo, vel mox ab illo: cum sic exhibita coctionem turbent, lacteas obstruant, & chylem viscosiorem reddant: immo nec potum desuper statim capiendum, ac roscidum illud parietibus bronchiorum allidens, abluatur. 4. Eadem præsertim dulcia, minus prodesse in subjectis, quæ iisdem abhorrent, ut

feminis hysterics, hypochondriacis &c. s. In conuatione horum medicamentorum, aureum illud nitum *Cratonis* observandum esse: ne nimis saep diu utamur dulcibus expectorantibus, cum non illabantur pectori, quam ventriculum & epar lœda dulcia enim, præsertim continuatus, parietes triculi laxant, calorem obtundunt, fermenta dicunt, coctionem & appetitum diminuunt, eparstant, ac obæstructiones generant.

A R T I C U L U S VII.

De Officio Medici, in præscribendis Remediis Errbinis, Sternutatoriis, Apophlegmatizantibus & Expectorantibus.

Formulæ

Errhinorum & Sternutatoriorum.

I.

ERthinum liquidum. R. Fol. salv. major. bet. mi. contus. affund. aq. destill. majoran. vel vin. aliq. s. exprim. per linteum. Errhinum liquidum, de quæ mane 2. aut 3. cochleariae plena jejunantibus intenda.

Aliud. R. Aq. majoran. unc. i. mann. calab. dr. ii. vel vitriol. alb. gr. v. M. vel simul. adde sem. nigra. scr. i. fol. beton. scr. ss. amb. gr. iii. M. S. ut suprà.

Aliud fortius in affectibus Soporosis. R. Sal. vitriol. alb. dr. ii. aq. major. unc. i. spirit. lil. convall. dr. M. S. Errhinum liquidum, per syringam naribus injiciendum. Hoc injectum per syringam in nares, inf.

gnem quantitatem muci per os, nares, oculos & palatum extrahit.

Balsamus pro Naribus obstructis. R. Pingued. ans. cum aq. majoran. ter. lot. unc. ss. ol. dest. maior. gut. v. salv. beton. an. gut. iii. M. S. Balsamus pro naribus obstructis, de quo quantitas pisi naribus immittenda.

Aliud Linimentum. R. Ung. ros. pomat. de alth. an. sc. ss. ol. maior. gut. vi. lavend. gut. i. M. S. ut suprà.

Aliud fortius. R. Rad. elleb. alb. elater. an. dr. ss. succ. bet. dr. ii. ol. maior. & cer. an. q. f. M. f. Linum. cuius portiuncula instar ciceris naribus admoveatur.

Pulvis Sternutatorius Timæi, expertus in affectibus soporosis. R. Elleb. alb. piper. alb. castor. an. scr. i. ol. destill. rut. majoran. salv. an. gut. ii. M. f. Pulvis subtiliss. S. Pulvis sternutatorius fortius de quo unum, vel alterum granum calamo naribus insufflandum.

Alius Hartmanni, in Apoplexia usualis. R. Fol. maior. dr. ii. sem. nigell. dr. i. rad. elleb. nig. ser. ii. mosch. opt. scr. ss. amb. gr. v. M. f. Pulv. de quo magnitudo pisi calamo fortiter insuffletur in utramque narem.

Alius tam curative, quam præservativè proficuus. R. Herb. maior. fl. anth. an. dr. ii. sem. nigell. dr. i. rad. elleb. alb. scr. ss. mosch. gr. v. amb. gr. iii. ol. lign. Rhod. gut. v. maior. cinam. an. gut. iii. caryoph. gut. ii. Bals. apoplect. ser. ss. M.

Alius in Catarrhis. R. Fol. lil. convall. p. iii. herb. maior. basilic. an. p. ii. tabac. dr. i. M. f. Pulv. tenuiss. cui add. amb. mosch. an. gr. ii. ol. anis. maior. an. gut. iii. M.

Alius in Coryza, R. Pulv. lil. convall. maior. tabac. brassil. an. gr. xv. ol. an. gr. xv. ol. anis. gut. i. Bals. apoplect. gr. iv. ambr. gr. iii. M. f. Pulv. S. Pulvis sternutatorius.

Alius.

Alius . R. Tabac. ind. unc. ss. major. lil. convall. an. dr. ii. ol. destill. anth. gut. vi. caryoph. gut. iii. amb. gr. iii. mosch. gr. ii. M.

Tabacus præstans , Cerebrum simul corroborans. R. Herb. major. lavend. rorism. an. dr. ii. rad. Ir. flor. dr. ix. herb. basilic. dr. i. Pulv. tabac. opt. dr. ii. cinam. mac. caryoph. an. scr. i. lig. Rhod. Santal. cit. an. scr. iv. ol. lig. Rhod. gut. xxx. mosch. opt. gr. xv. amb. grys. gr. iii. ziberb. gr. ii. M. f. Pulv. S.

Alius Catarrhalis & simul corroborans, colore albus. R. Sacch. albiss. unc. vi rad. Ir. flor. dr. x. elleb. alb. dr. vi. Bals. apoplect. scr. ss. Peruvian. gr. vii. mosch. gr. v. amb. gr. iii. ol. lig. Rhod. gut. v. cinam. caryoph. an. gut. ii. M.

Pulvis Sternutatorius Helmont. R. Rad. elleb. nig. Pulv. sacch. an. p. æq. f. Pulvis.

Alius Papalis dictus. R. Rad. Ir. fl. part. 2. major. part. i. M.

Pulv. sternutatorius Mulleri , R. Flor. beton. para. lys. salv. lavend. an. scr. i. lil. convall. dr. ss. spec. diamosch. d. dianth. an. scr. ss. diair. scr. ii. sacch. cand. ad pondus omnium , add. ol. mac. succin. anif. an. gut. iii. M.

Plures formulas addere supersedeo, cum ex his variè mixtis, infinitæ concinnari possint.

Formulæ

Remediorum Apopblegmatizantium.

Masticatorium in Catarrhis . R. Nuc. mosch. dr. i. mastich. gumm. Arab. an. dr. ss. redig. in Pulv. & cum s. q. aq. ros. M. f. Troch. S. Masticatoria , quorum unum vel alterum in ore masticandum.

Aliud v. g. in difficultate Auditus. R. Rad. pyreth. dr. i. Ir. dr. ss. agar. troch. scr. ii. cubeb. nuc. mosch. an. dr.

an. dr. ss. cardam. dr. i. ex subtiliss. pulverisat. cum
f. q. mastich. in mortar. calid. dissol. f. Pastilli, quo-
rum quilibet pendeat scr. i.

Aliud in metu Paralyxis vel Apoplexia. R. Mast.
dr. ii. ss. rad. pyreth. nuc. mosch. cubeb. mac. sem. anis.
an. dr. ii. maioran. scr. ss. alipt. mosch. gr. iv. cum
cer. & mell. inspiss. f. q. M. f. Troch. masticator. pon-
dere gr. xxv. teneat unum vel alterum in ore, masticetur,
& collecta pituita expuatur.

Aliud in dolore Dentium. R. Mac. nuc. mosch.
an. scr. i. cubeb. gr. xxv. rad. Ir. flor. pyreth. sem.
knop. an. gr. viii. piper. z. z. an. gr. v. pulverisat.
subtiliss. excipiantur pauxilla cera & f. Troch. lu-
pinar.

Apophlegmatismus liquidus. R. Rad. Ir. Hor. unc.
i. fol. orig. salv. stoech. rorism. an. m. ss. cubeb. dr.
iii. lig. dr. i. ss. coq. in aq. partibus ag. & vin. alb.
sub finem additi ad lib. i. in Col. dissolv. oxymell.
squillit. unc. ii. M.

Alius. R. Scob. lign. guaiac. unc. ss. rad. pyreth.
kr. iii. herb. salv. nob. pi. alum. sal. nit. an. dr. i.
sem. urtic. sinop. an. scr. i. acet. vini opt. unc. iii. aq.
muss. unc. vi. M. f. Decoct. quo os calide eluendum,
quod magnam copiam phlegmatis extrahit.

Alius in amissa Loquela. R. Acor. ver. unc. i. ga-
lang. cyper. cost. an. unc. ss. mosch. dr. ii. herb. maio-
ran. salv. an mi. f. Decoct. cum aq. & vin. add. mell.
anthos. q. f. M.

Alius in dolorem Dentium. R. Rad. pyreth. unc. ss.
fil. nicotian. cort. rad. mandrag. an. dr. ii. fol. sabin.
perflear. serpill. an. m. ss. cubeb. unc. ss. alum. scr. i.
coq. in vin. & aq. p. aq. ad 3.

Alius. R. Rasur. lign. sanct. unc. i. coq. in aq. f. q.
vel R. Mastich. dr. i. camph. dr. ss. coq. in vin. vel
acer. lib. ss.

Alius. R. Origan. maioran. serpill. an. mi. fol. nico-
tian. p. iii. pyreth. uns. ss. sem. nigell. dr. ss. cardam.
cubeb.

cubeb. an. scr. i. ss. mast. dr. i. coq. in aq. f. g. in Col.
unc. viii. dissolv. syr. de Nicotian. unc. i. de beton. unc.
ss. oxymell. squill. dr. iii. M.

Huc quoque spectat Suffitus Nicotianæ per tubulum, vel simplex ejus masticatio.

Rotulæ in foetore Oris . R. Troch. de gall. mosch.
dr. i. myrrb. zedoar. an. scr. ii. cort. cit. cubeb. caryoph.
cinam. an. scr. i. extr. acor. galang. an. gr. iii. cum
sacch. in aq. ros. & fl. cit. solut. M. f. Rotulæ.

Formulæ

Remediorum Expectorantium, in materia tenui.

Linctus . R. Ol. amygd. d. rec. unc. ii. sacch. cand.
subtiliss. pulv. q. f. M. f. Linct. S. Oleum amygdalarum dulcium, mixtum cum saccharo candito,
quo sœpius sumendum. Utilis præcipue infantibus.

Alius . R. Ol. amygd. d. unc. iii. syr. viol. unc. i.
M. alii etiam addunt cons. ros. vel R. Ol. amygd. d.
unc. i. sperm. cet. dr. i. syr. viol. de hyssop. an. dr. ii.
M. S. Linctus pectoralis.

Alius . R. Syr. jujub. papav. errat. vel de liquir. an.
unc. i. ss. M. S. Succus pectoralis , de quo interdum
unum cochleare plenum lente absorbendum.

Alius in Pleuritide usualis . R. Mucilag. sem. psyll.
aq. violar. extr. unc. i. ol. amygd. rec. f. igne expiss.
unc. ii. (apud pauperiores ol. lin. depur.) syr. viol.
sacch. cand. alb. an. q.f. M. f. Linct. detur cum baccul.
glycyrrb. S. Syrupus in tussi .

Alius . R. Syr. de liq. unc. ii. jujub. unc. i. ss. exymell.
squill. unc. i. M.

Rotulæ . R. Rotul. diacod. alb. vel de succ. violar. ve
succ. liquir. inspiss. rotulat. unc. i. dentur ad scatul. S. Ro
tulæ in tussi .

Ali

Aliæ in Tussi & Raucedine expertæ. R. Spec. diafrag. fr. diair. s. an. scr. ii. extract. rad. enul. vel liq. scr. i. sacch. fin. in aq. scabios. & tussilag. dissol. q. s. vel unc. iv. M. f. confect. in Rotul. S. Rotulae pectorales in tussi de quibus interdum sumendum.

Aliæ Catarrhales. R. Spec. diafrag. diamarg. fr. an. dr. i. Bol. armen. orient. dr. i. confect. alk. complet. dr. ss. cons. ros. rub. unc. ss. cum sacch. in aq. fl. acac. s. q. dissol. M. f. confect. in Rotul. S. ut suprà.

Aliæ. R. Succ. glycyrrb. inspiss. unc. ss. spec. diair. diafrag. fr. gumm. arab. rad. Ir. flor. an. dr. i. sacch. cand. alb. unc. iii. cum mucilag. gumm. tragac. M. f. Trochisc.

Aqua Clareta pectoralis. R. Aq. tarax. scabios. an. unc. iii. sacch. cand. alb. unc. i. M. & filii. Vel R. Aq. tarax. scabios. tussilag. veron. an. unc. i. ss. cinam. dr. ii. sacch. cand. dr. v. M. S. Aqua pectoralis in tussi, de qua cocheleatim sumendum.

Alia R. Aq. scabios. veron. tussilag. tarax. an. unc. i. ss. cinam. bugloss. unc. ss. fl. arant. dr. ii. sacch. cand. alb. unc. i. fl. sulph. scr. i. lacq. sulph. scr. ss. eleosacch. anis. dr. i. M. ad vitr. S. Aqua respir. in tussi.

In materia crassa & viscosa.

Linctus. R. Oxymell. squill. unc. i. ss. syr. viol. unc. i. extr. croc. scr. ss. Bals. sulph. anis. gut. vii. M.

Item R. Oxymell. squill. unc. ii. aq. cinam. vel spir. ceras. nig. dr. iii. M. Utiles sunt in Asthmate.

Alius Wepferi. R. Syr. de crysm. Lobel. unc. i. ss. oxymell. elleb. Gesner. dr. ii. gumm. ammon. in acet. squill. dissol. dr. i. essent. croc. scr. ss. ol. destill. anis. R. gut. iii. aq. hyssop. unc. i. ss. M. f. Linct.

Alius expectorans. R. Oxymell. squill. syr. de hyssop.

an. unc. ii. extr. croc. scr. i. fl. sal. armon. gr. xxiv. M.
dos. coct. i. cum sperm. cet. scr. ss.

Alius. R. Oxymell. squillit. pectoral. Crat. vel loch.
san. & expert. an. unc. i. syr. de marrub. unc. i. ol.
sulph. acid. gut. vi. M. Vel R. Syr. de prass. de b.
sop. an. dr. vi. viol. oxymell. Squill. an. dr. vii. aq.
asthmatis. unc. ss. M.

Rotulæ. R. Rottul. diair. usitat. unc. i. ss. dentur ad
scarul.

Aliæ. R. Looch. san. & expert. unc. ss. spec. diair.
dr. ii. fl. benz. gr. v. sacch. albiss. in aq. fœnic. dissol.
unc. iv. M. f. Rotulæ.

Aliæ. R. Antim. diaphoret. ex regulo dr. i. fl. benz.
dr. ss. succin. alb. præp. mastich. subtiliss. pulv. spec.
diatrag. fr. an. scr. iv. croc. orient. gr. xv. Essent. ambo.
ficc. gr. xvi. ol. anis. gut. vi. fœnic. gut. iv. sacch. al-
biss. in aq. ceras. nig. dissol. unc. ii. M. f. confect. in
Rotul.

Aqua pectoralis. R. Aq. ceras. nig. hyssop. an. un.
ii. epilept. Lang. asthmatis. an. unc. ss. spirit. cephal.
Anhalt. complet. vel elix. vit. Matth. dr. ii. spirit. am.
opt. dr. ij. sacch. cand. alb. unc. ss. M.

Alia expertissima. R. Condit. rad. enul. unc. i. n.
cort. arant. cit. an. unc. ss. incisa contund. in mortar.
affunde aq. hyssop. unc. v. fœnic. unc. ii. exprim. for-
tissime. Colat. add. aq. asthmatis. unc. i. cinam. unc. i.
looch. san. & expert. unc. ss. M.

Alia. R. Aq. asthmatis. unc. vi. cinam. dr. iii. sacch.
cand. rub. unc. ss. M. f. ebullit. ut sacch. dissolvatur
sumantur. 2. Cochli. pro tubitu. Vel R. Aq. asthmatis.
unc. ii. ss. spirit. anis. unc. ii. sacch. cand. rub. unc.
ss. M.

Plura vide de Medicamentis Thoracicis:

CAPUT VII.

De Officio Medici, in Affectibus exigentibus curam Lactis, Chalybis, usum Theeè, Capheeè, Chocolatæ & Laudani opiat.

I I.

De Officio Medici, in ordinanda cura Lactis, vel Seri lactis.

I.

LAc, cuius utilitas & necessitas, tum in usu cibario, tum Medicinali verbis vix exprimi potest, è 3. conflatum est substantia; quarum prima pinguis, & oleosa sive butyrosa, quæ aerea. Secunda crassa, sive caseosa, quæ terrena; & tertia tenuis seu serosa. Pinguis temperata est, caseosa frigida & sicca, serosa frigida & humida. Lac ergo totum in activis qualitatibus temperatum, potius tamen ad frigidum inclinans: in passivis verò humidum, ratione pinguis & serosæ substantiæ. Quoad secundas, & reliquas facultates, ratione butyri est epicrasticum, & contemperatorium, sive mitigatorium, ratione seri, abstersorium, ratione substantiæ caseosæ, emplasticum & incrassans.

I I.

LAc illud optimum esse, ex Galen. & Dioscoride colligat Medicus, quod colore candidum, clarum, purum ac sincerum; sapore dulce, omnisque amaritudinis, acrimoniae, falsedinitatis & aciditatis expers, odore suaveolens, aut boni saltem odoris exiguum quid spirans; consistentia moderatum, hoc est, neque nimis crassum & caseofum, neque nimis tenue & serosum, sibi ipsi continuum, & ungui instillatum cohærens, neque disfluens, recens mulctum, & ab animali bene pasto & habito petitum. Inter ejus differentias in usu Medico usuales, 1. *Vaccinum*, quod omnium pinguisimum & crassissimum est, substantia caseosa habens plurimum, serosa minimum; hinc magis quidem nutrit: minus tamen alvum subducit. Sic etiam ob substantia crassitiem ægrius concoquitur, citius in ventriculo coagulatur, tardius descendit, difficiliter distribuitur, magisque viscera obstruit. 2. *Aasinum* prion contrarium, seri habens plurimum: casei & butyri minimum; hinc alvum magis movet: minus autem alit, concoquitur facile, descendit velociter, ac distribuitur promptè & expedite. 3. *Caprinum*, quod mediae est consistentiae, neque ita tenue & serosum ut asininum, neque ita crassum ut vaccinum. 4. *Ovillum*, capri no crassius, minus usitatum est. Lac vernum dilutius est æstivo, alvumque magis emollit. Hoc in medio suæ naturæ consistit, ac post id tempus sensim crassescit, & evanescit.

I I I.

HIppoc. 5. apb. 64. curam Lactis 1. præscribi tabidis, non admodum valdè febricitantibus, est, pulmonum ulcere detentis, si non adsit febrifugia, & quidem tum, quia acrimoniam salinam

sanguinis contempnerat, eamque edulcorat, tum quia parte serosa abstergit, caseosa glutinant, ac butyrosa reficit: præterea Lac assumptu suave, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca pueritia familiaris; insuper visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur lævigans, ad ejcendum pituitam spiritum facilem reddens, ac inferiorem exitum lubricum efficiens; maximè autem tunc convenit in Phthisi, si dolor molestus cum phlogosi in gutture percipiatur. Cura hac Ludovicus XIII. Rex Galliæ phthisicus diu sustentatus fuit. 2. Idem Hippoc. loco citato lacteam diætam commendat, in præter naturam extenuatis, ac atrophia quacunque detentis, dum modo nullum adsit prohibens, aut contradicans. Est enim Lac ex omnibus ferè ferculis optimi succi, quod facilè digeritur, levique negotio in sanguinem vertitur, sufficienter quoque alit, corpus robustosat, utque impinguat.

I V.

Præterea 3. Convenit in hypochondriacis, hysteris & scorbuticis, præsertim calidioribus, & emaciatis, ac ad tabem inclinantibus. 4. Prodest in renum exulcerationibus, ac præcipue mictu cruento. 5. In Dysenteria, ubi non tantum per os assumptum, præsertim coctum cum sem. plantag. & rad. torment. aut symphyt. vel silicibus ignitis, aut ferro cadenti ustulatum prodest, sed etiam per alvum injectum, adeò ut Sydenham testetur, se plurimos curasse dysentericos solo lacte, vel ejus sero tepidè inferius injecto, & frigide superius in copia propinato. 6. Hippoc. lib. de morbis, lac itidem commendat in affectu podagrico præservando, quod testatur etiam experientia & ratio, cum non tantum Lac præbeat alimentum simplex optimum, naturæ summè familiare, sed insuper sanguinem dulciores mitioremque reddat, particulas in eo aciores

contemperet, ac humorum turgescientiam reprimat; licet Podagræ causæ originali, concoctionum nempe ac fermentorum debilitati non contrarietur, siveque etiam omnem paginam non absolvat.

V.

Sicuti autem in prædictis affectibus Lactis usus maxime proficuus censetur: ita haud raro etiam contraindicatur Hippoc. allegato aphor. 64. sed. 5. ait: *Lac præbere, capite dolentibus, febriculosis, & quibus elata hypochondria murmurant, ac siticulosis, malum.* Item quibus febres acutæ, biliosæ dejectiones, ac copiosa sanguinis evacuatio facta est &c. Non igitur convenit. 1. Capite dolentibus, quia halitusosum est, ac facile corrumpitur, 1. Acutè febricitantibus, cum in his ob acrimoniam caloris depravetur, ac nidorosum evadat. 3. Quibus hypochondria elata, id est, suspensa ob tumorem aliquem, vel abscessum, aut murmurantia ob flatum inclusorum copiam; In his enim facile acescit, ac in flatus vertitur. 4. Siticulosis, eò quod tales bile ut plurimum abundant, in quam facile laceri solet. 5. Biliosa diarrhœa correptis, ob eandem causam. 6. Quibus copiosa sanguinis evacuatio facta, cum calore nativo depauperati naturales facultates habeant infirmas, ut lac facile vitiari, & acescere possit; licet enim lac alimentum sit euclymum, facile tamen etiam corrumpitur, & quidem in ventre præcalido in nidorem: in frigido autem in acorem. *Dioscorides* his addit epilepticos, vertiginosos, & nervorum vitio detentos. 8. Minus etiam prodest, præfertim assiduus ejus usus, dentibus & gingivis; has enim flaccidas, illos cariei obnoxios reddit; hinc post ejus usum, vino diluto aut meraco, aut cui mellis quid admixtum, os colluendum.

VI.

Cura Lactis alia potest dici *levis*, alia *stricta*, alia *mediocris*. *Levis* est, in qua solum quotidie manè hora circiter sexta vel septima, recenter ex asina vel capra emulctum Lac, vel etiam bubulum, addita dimidia parte aquæ, adjecto quoque faccharo, ne coaguletur, ita tepidum assumitur, vel citra ascendendum & descendendum, ad unc. vj. x. xij. & ultra, vel ascendendo, ab unc. vj. per auctas quotidie unc. ij. usque ad lib. i. i. ss. ii. non exclusis tempore prandii & cænæ, aliis alimentis boni succi & facilis coctionis. *Stricta* diæta lactea est, in qua excluso omni alio cibi potusque genere, æger solo lacte, vel saltem addita sola medulla panis albissimi contentus vivere debet; ea quantitate illud sumendo, quam stomachus, vires, ac ipsa necessitas videtur exigere, ita tamen, ut tota, quantitas, quæ singulis diebus bibitur, in 3. partes divisa, una manè, altera in prandio, & tertia cænæ loco acipiatur. *Mediocris* est, qua lactis usus tempore matutino ritè adhibetur, in prandio vero, parca licet manu conceduntur, quæ cum lacte analogiam habent, ac naturam pro necessitate, & rerum circumstantiis corroborare, stomachi tonum conservare, ac inappetentiam arcere valent, ut v. g. pulli gallinac. gallin. capon. solo lacte & furfuribus nutriti, caro vitulina, hædina, ova tremula, oryza, lac-ticinia pulmenta lactea, amygdalat. hordeata &c. In cæna hec eadem non prohibentur, longo tamen parciori quantitate, quam in prandio; vel si pro ratione circumstantiarum ægro consultius sit, solum etiam lac in cæna assumendum, in potu ab omni vino, in cuius abstinentia plurimum situm, abstineat æger, contentus aqua simplici, vel cocta cum china, lentisc. vel mixta cum lacte.

V I I.

EX triplici hac lactea methodo, prima & ultima præsertim veluti via media, & magis secura, plurimis tenetur, Stricta vero, quæ in podagrīi plerumque præscribitur, multis suspecta est, & ob sequentes rationes minus tuta censetur. Nam 1. Experientia teste, prout refert *Sydenham*, licet hæc cura multis profuerit, quamdiu ne latum unguem ab eas cesserunt, tamen quam primum ad sanorum diætam, ut ut lenem mitemque sese receperunt, podagra confessim reversa, ægrum longè pejus, quam antea vexavit, labefactatis nempe naturæ principiis, morbo pellendo minus sufficientibus, ut adeò periculosius & diuturnius infestaret: hinc plurimi vel doloribus recenter ingruentibus ab hac cure desistere coacti fuerunt, vel podagricos dolores intercurrentes lubentes tolerare, quam perpetuam & molestissimam solius lactis potationem sustinere maluerunt, 2. Si post continuatam aliquot mensibus lacteam curam, febris, vel morbus aliquis magnus cum virium jactura ægrum prehenderit, vel universalis inappetentia, & languor supervenerit, a lacte abstinentem erit, cum tamen periculum sit, ne ventriculus tanto tempore lacti absuetus, omne aliud genus ciborum respuat, aut difficillimè sustineat, atque adeò imbecillis patiens viribus prius deficiat, quam ad alia assuefacta natura iterum refocilletur; unde etiam aliquos, postquam diu strictioris lactis curæ sese subjecerant, atque paulo melius exinde habere videbantur, magno tandem aliquo morbo deprehensos, citò interiisse observarunt nonnulli; hinc meritò hæc atque alia, cautum in hac cura reddere debent Medicum, eligendo potius viam medium utpote magis tutam.

VIII.

Pro debito Laetæ Diætæ regimine Medicus notabit, 1. Corpus prius debitè evacuandum, obstrunctionesque, si quæ adsint, referandas esse 1. Lac vel asinum, ubi refrigerandum & detergendum, vel caprinum, ubi magis nutriendum, vel vaccinum in podagricis recenter ex ubere emulctum, calidum quatuor horis ante cibum sumendum esse, ita ut æger ab ipso assumpto neque dormiat, neque corpus validius exerceat. 3. Ne Lac in ventriculo corrumpatur aut acescat, ad unc. viij. vel x. addendam esse uncam facch. vel mell. 4. Signum boni eventus curæ Lactis esse, si urina cocta, nec valde tincta, nec nimis aquosa, si fæces alvi non crudæ, copiosæ, fetidæ, si nullam fitim causetur. Secus, si stomachus infletus, hypochondria tantum, alvus indurescat, accedit vomitus vel diarrhœa, fitis magna &c. quæ signa sunt corrupti Lactis; hinc vel corpus melius evacuandum, vel ab ejus usu cessandum. 5. Antequam æger strictæ se addicat curæ Lactis, natura paulatim ad eam assuefacienda, utendo lacticiniis, cibisque cum lacte analogiam habentibus, ut oryza in lacte cocta, amygdalat. hordeat. pineat. avenatis, ovis sorbilibus, pullis gallin. capon. carne hædin vitulin. &c. usque dum tandem solo Laete, pro totali alimento uti possit æger, seu etiam frigido, in quantitate stomacho & gustui tolerabili, abstinentia a vino & omnibus aliis. Prædictis cibis uti etiam æger potest, in diæta lactea leviori & mediocri.

I X.

PRæterea 6. observabit, primo & secundo mensis, corpus subinde blando medicamento Rhabarbarino vel aloetico evacuandum, & quidem, quo natura Lacti magis assuevit, majoribus interpositis intervallis: quo minus, minoribus. 7. Si Lac acesceret, vel coagularetur, uti supradictum, addendum sacch. alb. si corpus exinde calefieret, osque & fauces accenderentur, addendam quartam partem aquae simpl. vel hordei. Si ventrem nimis fluidum faceret, ebulliendum, eique addenda salis communis aliquot grana, si constipetur, Rhabarb. pulverifat. in primo haustu sumendum. 8. Si sitim excitet, extra pastum aquam f. vel coctam cum sacch. permitti, tam solam, quam lacti permixtam. 9. Abusu Lactis non desistendum esse, nisi febris, aut gravis dolor podagræ supervenerit, neque etiam ob accidentia a lacte causata tam facile cessandum, nisi vomitus & dolor capitum accedant. 10. Quantitatem Lactis assumendi, assignari a tolerantia ventriculi, in cura leviori ad unc. vij. lib. j. ii. in mediocre, totidem etiam cænæ loco, in stricta, finitis diætæ diebus, manè unc. 10. 18. 20. & totidem etiam loco prandii & cænæ sumendas, augendo dosin ad unc. 40. usque. 11. Tempus continuandi diætam lacteam esse ad mensem 1. 2. vel 3. immò in affectibus contumacibus, præsertim podagrīcis ad annum, vel plures extendendam esse, nisi recidivam experiri velint; quibus tamen ex supradictis suadendum, ut prandii saltem tempore ad cibos boni succi, & facilis coctionis successivè transfeant, ita tamen, ut nec varietas ciborum corruptelam, nec satietas cruditates generet; abstinendo simul a vino, quod melius, vel non nisi lymphato parcissimè utendo.

Quibus Lactis usus quandoque contraindicatur, vel ob febrem, aut borborygmos in hypochondriis, aliasque causas, vel epatis ac renum ardor, per veri & aestatis decursum temperandus, humoresque adusti melancholici, ardores vagos & phlogofes praesertim excitantes, uti etiam variolos fluxus sanguinis, maniam, scabiem, canctum, scorbutum, aliosque affectus ex acido melancholico oriundos, temperandi ac evacuandi, quique plus contemperatione, quam nutritione indigent, Serum lactis, vel cum laco cit. vel acet. aut crem. tart. vel tamarindis patatum, & quidem vel simplex vel herbis alteratum, usurpare possunt. Hoc enim non tam bilem flavam quam atram, exustosque ac falso humores temperat, vi sua nitrosa abstergit, obstruções referat, ardores compescit, atque acria & peregrina salia per Urinam educit. Sumitur quotidie per mensem ad unc. vi. viij. lib. i. quatuor horis ante cibum, vel etiam ascendendo quotidie per unc. ij. ad lib. j. ii. iii. Hinc præposta serie sensim ad primam dosin redundo.

Sequuntur nunc paucæ formulae remediorum Lactis, ut Seri lactis alterari.

Formulæ

Lactis, vel Seri lactis alterati.

SErum Lactis in Scabie proficuum. R. Ser. lact. cum succ. cit. parat. lib. i. col. bulliat, (tum quia flatulentum, tum ut quidquid adhuc in est casei subsideat) hinc infund. per noct. fumar. m. i. cichor. vel acetos. m. ss. Col. add. sacch. unc. i. M.

Serum Lactis anti Scorbuticum. R. Herb. rec. nasturt. aquat. cochlear. an. m. ij. rad. raph. rust. unc. i. contus. & conquas. in mortar. marmor. affund. lib. ij. vel iij. ser. lact. depur. stent in loco tepido per noctem vaso clauso. Col. add. ag. cinam. unc. ss. M.

Aliud. R. Herb. rec. cochl. m. i. rad. belen. armorac. an. unc. j. bacc. juniper. dr. iii. passul. min. unc. j. cornutus. affund. ser. lact. cap. lib. ij. vel iij. Col. dulcor. paucō sacch. vel sgr. de succ. cit. vel scelotyrb. Forf. Dos. unc. iv.

Serum Lactis destillatum anti Scorbuticum. R. Herb. rec. beccabung. m. iij. cochl. nasturt. an. m. ij. acetos. cichor. an. m. j. Pom. cit. N. 3. vel incid. & pist. in mort. marmor. affund. ser. lact. q. s. destill.

Serum. Lact. Tamarind. Fonsec. item aliud alterat. herbis pro cura vernali, vid. superius de Remediis post V. S. praescribendis.

Lac Caprinum anti Scorbuticum. R. Lact. caprin. unc. viii. lib. j. ebull. in eo fol. cochlear. nasturt. beccabung. endiv. cich. a. p. ij. Col. add. sacch. puriss. parvum, ne coaguletur.

Lac anti Dysentericum. R. Lacer. rec. lib. j. sem. plantag. dr. j. rad. torment. vel symph. dr. ss. contus. coq. & Col. dentur subinde 2. vel 3. cochl. alii addunt terr. sigill. ser. i.

Lac in Mictu cruento. R. Lact. ovill. rec. Mulct.
lib. ss. mell. ros. purif. dr. ii. bull. leniter. add. Bol.
arm. scr. j. Eximum est in hoc affectu, ex observat.
Forest.

Lac Cancerinum, in Phthisi incipiente proficuum.
R. Cancer. viv. N. ii. contus. in mortar. affund. lat.
vaccin. lib. i. ss. coq. hinc atque col. Vel R. Lact. vac-
cin. lib. j. ss. cancer. elix. N. ij. contund. una cum chel.
eg. test. f. Col. vel per pannum, in delicatis, ubi mi-
nus agendum, vel colatorium ferreum ut pulvis præ-
cipitans simul transeat, si efficacius agendum, licet mi-
nus gratum sit.

Lac artefactum, si forte Lac naturale vel Serum
lactis contraindicaretur. R. Sem. melon. mund. unc. i.
Jm. cucurb. angur. an. unc. ss. iur. pull. unc. vii. M. F.
Emul. adde si placet., iulep. viol. un. i.

Aliud anti Histicum. R. Chin. sel. unc. i. rasur.
bor. dr. ii. repleatur bis pullus bene saginat. coque in
lib. vi. aq. ad. debitam cocturam lento igne. Do Col.
R. unc. vi. add. sem. melon. rec. amygd. d. excort. an.
unc. ss. nucl. pin. rec. dr. ii. M. F. Emul. aromatizan-
da modico mac. Alii accipiunt Decoct. carnis Gallin,
& cum eo faciunt prædictam Emulsionem,



ARTICULUS II.

*De Officio Medici, ordinanda cura
Chalybis.*

I.

Chalybis, qui aliud nihil est, quam ferrum artificialiter magis depuratum & induratum, duplarem juxta Veteres obtinet virtutem, aperitivam unam, *adstringentem* alteram. Illam adscribunt particulis volatilibus; hinc non exiguum præstat usum in morbi ab obstructione oriundis: hanc terrestribus atque fixis; unde crodum martis *adstringentem* paraturi, Chalybem eosque calcinant, usque dum absimpti partibus volatilibus, remaneant fixiores, eoque utuntur in diarrhoea, dysenteria, aliisque fluxibus sanguinis p. n. R. R. considerantes Martis corpus homogenium, quod sub æquali tenore in ignis tortura perfeverat, & quod mars semper *adstringat*, ac omnia etiam ex marte parata gustui saporem *adstringentem* subministrent: fundamentaliter asserunt, eum per se semper *adstringere*, aperire verò tantum per accidentem quatenus nimirum intra corpus assumptus, reperta in corpore falia sylvestria acida & facile coagulabilia, a quibus induci solent obstructions, absorbet, absorpta que secum per alvum educit, ut adeò hoc modo sublata causa, tollantur obstructions.

I I.

EX dictis facile elucescit, *Martem* 1. optimum esse Melancholiæ digestivum. Cùm enim materialis ejus causa modernis statuatur, acidum vitiosum in primis viis hærens, illud ad mortem assumptum accurrit, eumque corrodendo sua amittit spicula ac acrimoniam, & postmodum simul cum marte per seculum eliminatur; hinc post ejus assumptionem fæces ut plurimum nigro colore tinguntur, præcipitato per bilem marte cum absorptis acidis in colorem subnigrum. Non male igitur à *Zacut. Lusit.* Melancholia, & mali Hypochondriaci verum alexipharmacum, ac rhizotomus appellatur, quod idem dicendum de affectu hysterico. 2. Insignis panacea est Cachexiarum, tam virorum, quam etiam mulierum, & virginum in chlorosi, fluore albo, suppressione mensium; quæ si inveterata, citra materiaリア vix curari potest, in Cachexia icterica &c. Hinc etiam omnes pulveres cachecticos mars ingreditur. Non enim tantum, dum humor acidus, ac veluti causticus chalybeata aggreditur, & in substantiam eorum operatur, ferociam & acrimoniam suam proprio veluti ense jugulat, infringit, ac rendit; sed insuper sublato coagulo massæ sanguinis jam effæctæ & languescenti, quasi calcar fugientur, spiritus sopiti & penè emortui, ac pondepressi, rursus eriguntur, excitantur ac restaurantur, quod vel maxime in puellis cachecticis observatur, dum assumpto chalybea, pulsus nanciscuntur etiorem, validiorem, faciemque magis rubicundam & vividam.

I I I.

PRo legitima ejus administratione Medicus notabit, 1. Curam chalybis commodissime administrari vere & autumno. 2. Ejus præparationem, quo simpliciorem, eò meliorem esse. 3. Haud immerito damnari, & explodi ejus præparations nimiis acidis factas, cùm Mars acido saturatus, nullas amplius in corpore exserat virtutes, sed potius ventriculum oneret, utpote calx fixissima nullo liquore solubilis. 4. Cæteris præparationibus palmam præferre, quæ sit cum alcalinis, aut blandis acidulis. 5. Etiam limaturam Martis crudam intus exhibitam, fructu suo non destitui, dummodo ventriculus non adsit admodum debilis, vel dosi majori exhibeat. In his enim periculum est, ne Mars in ventriculi fundo subsistens, vim ibi vitriolicam & vomitivam acquirat, aut ruetus nauseumque cieat, vel appetitum dejiciat; hinc etiam refert Panarol. se post mortem eorum, qui usi fuerint Martialibus, in ventriculo limaturam Martis adhuc crudam reperisse, ob ventriculi debilitatem.

I V.

PRæterea 6. notabit Medicus, corpus prius ad hauc curam per universalia disponendum esse. 7. Martialia exhiberi, vel in forma sicca, ut v. g. pulv. elect. pilul. &c. vel in humida, ut vini, tintetur. essent &c. In forma liquida ceteris præferuntur ex eo, quod in iis Mars magis solutus: in illis autem magis compactus, majores in ventriculo parias molestias, Nonnulli hæc ita distinguunt, ut in complexionibus humidioribus eum exhibeant magis in forma sicca: in siccioribus verò, & quorum stomachus sensibilior, in forma humida. 8. Post ejus assumptionem manè jejuno stomacho facta, deambula-

tione per unam vel duas horas corpus excrecendum esse, capiendum postmodum Brodium carnis vel gallinæ, alteratum rad. petrosel. vel rad. aperit. & pafilis. 9. Signum Chalybis ritè operantis esse, fæces nigras per alvum excretas: econtra malum, si post dumpta Martialia non tingantur colore nigro, cum sanguinem sit, Martem non absorbisse salia vitiosa corpori noxam minitantia. Item si superveniant vomitus, nausea, inappetentia, dolores stomachi &c.

V.

10. Observabit in hac cura, tertio vel quarto die clysterem injiciendum, vel lenitivum exhibendum, aut pilulas aloeticas. Aliqui quartu hora quarta pomeridiana, magnitudinem castana exhibent de Elect. parato ex rob. sambuc. vel dul. aut pulp. tamarind. unc. iij. cum diagrydii ro-
an. scr. ij. Alii & præsertim *Sydenham*, præcipue in affectu Hysterico Martialia exhibent, sine interje-
cta purgatione, ne una die destruatur, quod per
dutes ope chalybis resarcitum. 11. Curam hanc
mane 15. nunc 20. nunc etiam 30. diebus & ultra
continuandam esse, pro majori, vel minori contu-
maci affectus. 12. Durante hac cura, legitimam
instituendam Diætam, & præcipue omnia acida,
seu in cibo, seu in potu, vitanda esse, quia Mar-
tæ saturant, ut postmodum saturatus vitiosa salia
elinquant intacta.

ARTICULUS III.

*De Officio Medici, in præscribendis formulis
Remediorum Chalybeatorum.*

Vinum Chalybeatum, *re. Croc. mart. operit. unc. iii. spec. aromat. caryoph. dr. ii. deniur ad faccul. ex sind. alb. S. Sacculus Chalybeatus, cui affundendæ 2. mensuræ vini venusti, relinquatur per 2. dies; postea jejune de ipso bibantur 3. aut 4. unicæ.*

Aliud. *re. Chalyb. prep. unc. i. caryoph. dr. i. mac. dr. ss. inde faccul. oblong. instar agiti, affund. vin. mens. ii. &c. Quantum de hoc bibitur, tantum semper reaffundatur.*

Aliud ex spuma Chalybis. *re. Spum. chalyb. dr. i. vin. alb. unc. ii. M. & sic pro reliquis dosibus.*

Vinum chalybeat Riverii. *re. Chalyb. cum sulph. prep. unc. i. rad. enul. cort. med. tamarisc. an. unc. ss. fol. senn. f. unc. iii. epithyn. unc. i. secul. bryon. cinam. an. dr. iii. spec. diatrion. sant. dr. i. ag. defl. agrim. vin. alb. an. lib. i. inf. per trid. in B. M. de col. sumantur unc. iii. vel iv.*

Vinum chalybeatum attenuans & deobstruens. *re. Rad. levist. unc. ss. rhab. el. unc. i. chalyb. cum acet. tamarind. prep. unc. i. sal. tart. dr. ii. ment. crisp. m. ss. cort. flav. arant. dr. ii. galang. min. dr. i. incis. & contus. indantur in vas vitreum, affundendo vin. malvat. lib. iii. digerantur loco calido, movendo aliquotias, per biduum. Facta dein remotione à loco calido, ne acefcat, bibendo quotidie unc. iii.*

Claretum Martiale Minsicht. probatissimum. *re. Vin. alb. opt. lib. iii. chalyb. cum acet. tamarind. prep. unc. i. rad. scorz. acid. tart. an. unc. ss. galang. min. cass. lig.*

*lg. caryoph. an. dr. i. M. indita in vas vitreum digere
loco calido, movendo aliquoties, per biduum, Dein
col. per manic. Hippoc.*

Aliud Vinum Martiale anti-Cachecticum. *R. Herb.
salv. rorism. an. m. ss. absinth. mi. fl. cent. min. p. iv.
hab. el. unc. i. ss. cinam. galang. z. z. an. dr. ii. li-
mat. mart. rec. unc. i. ss. incis. dentur ad Nodul. cui
superaffund. vin. alb. lib. iii.*

Syrupus chalybeat. *R. Chalyb. præp. unc. iii. affund.
net. vin. ad eminent. 4. digit. transvers. stent in loco
sild. donec extrahatur tinctura, tum inclinato vase
sparetur liquor, cui add. sacch. albiss. q. s. coq. len-
nigae ad consist. Syrup. S. Syrupus chalybeatus,
de quo unum cochleare plenum cum brodio, aut vi-
malbo sumendum.*

Essentia Martis Hartmani. *R. Limat. mart. can-
isid. lib. ss. extingue semel atque iterum in lib. iv.
in. malv. Dos. ab unc. ss. ad unc. ii. ex juscult vel
laustu aq. eicbor.*

Tinctura Mart. *R. Tinct. mart. Zvvelff. vel Vi-
tol. mart. Ludovic. vel cum succ. cit. parat. Sorbait.
S. unc. ss. detur ad Vitr. S. Tinctura chalybea-
ta, de qua 15. usque ad 30. guttæ in brodio su-
menda.*

Bolus chalybeat. *R. Chalyb. præp. dr. i. caryoph.
y. vi. cum vin. f. q. M. F. Bol. qui nebulis involutus
deoretur, superbibendo 3. vel 4. cochl. vin. absinthit.
et malvat. & sic pro cæteris dosibus.*

Electuarium Chalybeat. *R. Limat. chalyb. præp.
unc. i. ss. conserv. fumar. unc. iii. ss. condit. cort. cit.
dr. vi. confect. alherm. unc. ss. syr. de cort. cit. q. s. S.
Electuarium chalybeatum mixtum, de quo magnitu-
do castaneæ sumenda, & postea bibatur paulum vi-
ni, vel Malvasiæ.*

Aliud. *R. Limat. mart. acet. præp. unc. vi. cinam.
mosch. an. dr. iii. rbab. dr. ii. spec. arom. ros.
iii. mell. opt. sacch. alb. an. unc. xiiii. cum*

lento igne F. Elect. Dos. unc. ss. v. horis antepredium, superbibendo unum vel 2. coctil. vin. Malv. v. absinth.

Morselli chalybeat . R. Chalyb. præp. unc. i. cas. lig. scr. iv. croc. scr. ss. mac. scr. ii. caryoph. scr. i. sacch. fin. in aq. cinam. dissol. unc. iii. F. Morsul. N. viij. capiat m. unum.

Tabellæ chalybeat . R. Chalyb. cum sulph. præp. vel pulv. cachect. Quercet. unc. ss. confect. alk. ii. ambr. grys. scr. i. sacch. fin. in aq. ros. & namp. dissol. unc. iv. f. Tabell. capiat dr. ii. quotidie man.

Pilulæ chalybeatæ Sydenham. R. Limat. mart. subtiliss. gr. viii. cum s. q. extract. absinth. M. f. Pilul. N. viii. sumantur summo mane, repetanturque hunc quinta pomeridiana per dies 30. superbibendo haustu vin. absinthit. vel malvat.

Utiles quam maximè in affectu hysterico, chlorosi, ac omnibus morbis chronicis, ex acido oriundis.

Aliæ in morbis Chronicis usuales. R. Limat. mart. subtiliss. gr. xv. rhab. pulv. scr. i. cum succ. absinth. q. s. M. f. Pil. N. xv. vel xxi. superbibendo brodium amarum & diureticum.

Aliæ chalybeatæ Riverii . R. Chalyb. cum sulph. præp. unc. ss. aloes opt. senn. s. agar. troch. rhab. el. an. dr. i. spec. diarrhod. Abb. dr. ss. croc. scr. ss. cum syr. ros. sol. f. mass. Pilul. de cuius dr. i. form. Pilul. N. xxiii. deaur. quas capiat æger m. singulis diebus. 3. horis ante pastum, continuando per 15. dies.

Pulvis chalybeatus anti Cachecticus. R. Pulv. cachect. Quercet. dr. ss. S. Pulvis chalybeatus per 15. dies mane in brodio sumendus.

Alius. R. Chalyb. præp. dr. vi. sal. absinth. tamaris. card. b. an. scr. i. fœcul. aron. dr. i. ocul. can. præp. scr. iv. cryst. tart. unc. ss. Pulv. caryoph. scr. iv. M. f. Pulv. detur cum pondere plumbeo unius dr. sumatur omni mane dr. i. ex brod.

Alius.

Alius. R. Chalyb. præp. unc. i. ss. cass. lig. opt. fæcul. aron. cryst. tart. an. dr. ii. ol. caryoph. gut. xx. cinam. gut. vii. sach. rosat. tabul. dr. vi. M. Dof. dr. i. m. ex Jusculo.

Alius simplex in suppressis Mensibus utilis. R. Mart. cum sulph. præp. dr. vit. cass. lig. dr. i. M. f. pulv. divid. in xvi. p. æq. de his una quotidiè sumatur, obambulando desuper per 1. vel 2. horas, & tertio quolibet die 4. horis a pastu, magnitudinem castaneæ de Elect. laxat. sumendo. Cura hæc, teste Sorbait, intra 16. dies plerumque hunc tollit affectum.

ARTICULUS VI.

De Officio Medici, in suadendo usu Thee,
Caffè & Chocolate.

I.

THee & Thea, folium fruticis cuiusdam, quem plures inter species sumach referunt, in China & Japonia nascens, atque inde siccando involutum, & conglomeratum in Europam delatum: quoad qualitates primas, calidum est in primo gradu, & siccum ferè in secundo; duplicem possidet substantiam, quarum una volatilis & spirituosa, odore suo suavi & jucundo, aquæ communicatur; altera verò fixa & terrestris, sapore suo amaro, & nonnihil adstringente se prodit. Commendatur hæc Herba, i. Ad somnum pellendum, a cæna præsertim assumptum, quod præstat, tum quia calor actualis, quo potatur, spiritus agitat, tum quia spirituosa, volatili, & odorifera parte, spiritus dissipatos reparat: amara verò & diuretica, alimentorum humiditatem somno necessariam absorbet, & per urinam pellit, tum quia superius orifi-

cium, constringendo vapores ad somnum necessarios, fr̄xnat & impedit. Ob easdem causas prodest etiam in vertigine, affectibus soporosis, & catarrhis. 2. Medetur doloribus capitis, impediendo cruditates, ac vapores disertiendo. 3. Solvit ebrietatem, corpusque nimis a Baccho pessum datum, integritati suæ restituit. 4. Moderate siccatur, cerebrum purgat, memoriam firmat, mentem purificat, ac alacriorem reddit. 5. Stomacho, digestionique juvandæ inservit, aciditatem nimiam corrigendo, ac stipticitate fibras constringendo. 6. In Nephritide, calculo, & arthritide, cæteris paribus præservat, cum experientia testetur, Chinenses hujus potui indulgentes, hisce affectibus non esse obnoxios. 7. Alii etiam commendant ad lumbricos, vapores hypochondriacos & hystericos phthisin quoque, si lactis vaccini calidi, quod leviter prius ebullit, aquæ duos cyathos, in quibus dr. i. Thee infusa, admiscueris, cum facch. unc. ss. & calide per menses. 2. propinaveris.

II.

Modus utendi *Thee* in hoc consistit, ut accipiatur cyathus aqua plenus, qui immittitur in vas peculiare ad hunc usum destinatum, quod igni apponitur, & dum aqua effervescit, ab eodem removetur, & dr. ss. vel dr. i. fol. *Thee* injicitur, hinc vas tegitur, ac folio fundum petente in vasculum porcellanum, vel faventinum effusum calide sorbillatur, addito si placet paucō faccharo. Quod in fundo remansit folium, etiam secunda vice adhiberi potest, sed tum cum aqua coquatur necesse est. Jabonenses, pulverem foliorum aquæ ferventi injectum, simul hauriunt. In Persia parum anis. fœnic. vel caryoph. injiciunt. Sumitur plerumque manè, vel in affectibus stomachi ac capitis, per consensum Ventriculi, statim a prandio, vel quacunque hora, ac pro somno impediendo, a cæna.

III. Si-

III.

Sicuti autem usus hujus herbae *Theeē* subinde maxime proficuus; ita ejus abusus, ac frequentior compotatio improbatum, præsertim in subjectis calidioribus & siccioribus, dum humidum nativum cito nimis absunit, caloremque ac vitam instar flammæ lampadis oleo consumpto extinguit, ut adeò extrema non solum in morali Philosophia, sed & in Medicina, vitirosa sint. Cæterum plures his temporibus proprietates *Theeē* adscriptas, tribuunt quoque simplicibus sub nostro cœlo crescentibus, quæ substitui haud immerito possunt, si eodem modo præparata sumantur. Sic in affectibus capitum uti possumus *Roremarino*, *betonica*. In affectibus pectoris *salvia Veronica*, *pulmonaria*. In affectibus renum *Veronica gran.* *Juniper*. In athriticis *chamædry* *linc.*

IV.

Coffee, vel *Caphee*, est leguminis peregrini species, magnitudinis nostratum fabarum, a quibus non admodum abludit, orta ex arbore *Evonymo* vel ceraso simili, ex Arabia felici in Europam delata, quæ debita modo pulverisatur ac torretur, ut phlegma spiritus ejus irretiens exhalet, usque dum semiusta & colore castaneo vel subnigro tincta apparet, ac panis veluti adusti odorem referat. Coctio ejus paratur, dum accipitur olla ansata stanno obducta, illique infunduntur *ag. unc. x.* vel *lib. i.* quibus, cum super igniculo carbonario efferbuerint, injiciuntur *puto. dr. iii.* sedulè cavendo, ne quidquam effundatur, cum pulvere aquæ immisso illico celeriter in spumam agatur, unde, quam primum aqua olæ labia attingit, igne amovenda rursumque admovenda

venda , usque dum duodecies circiter ebullierit ; hinc
cineribus calidis imponenda , donec magma fundum
petierit & decoctio flava & limpida supersit , tunc
calici Porcellano vel Faentino , calide forbillatur , ad-
dito si placet pro delicatis , paucō sacch.

V.

Qualitates primas quod attinet , *Coffeē* calidum
& siccum statuitur , prius deducitur ex amaricie
& acuto sapore , posterius ex tostione , reliquæ exin-
de emergentes qualitates , cum sulphure & sale vola-
tili scateat , sunt robore stomachum , detergere ,
obstructiones referare , urinam movere , vapore in
cerebrum ascendentibus retundere , somnum avertere
&c. Quoad affectus , convenit illud , 1. In adjuvanda
coctione stomachi ; ubi vinum locum non habet , ut
v. g. in abstemiis , cephalalgia detentis , laborantibus
stomacho ex prægressa ebrietate , idque præstat , tum
volatili ac subtili sua substantia , nimiam fermenti
stomachici aciditatem obtundendo , ac terrestri adstin-
gendo & humiditates exsiccando , tum alcali suo aci-
das cruditates absumendo , & corruptioni resistendo .
2. In necandis lumbricis . 3. In referandis obstrunctioni-
bus , in chlorosi , suppressione mensium . In præser-
vando hydrope , calculo , podagra , 4. In febribus in-
termittentibus diuturnis . 6. In cephalalgia per con-
fensem stomachi . 7. In somno arcendo , poros cere-
bri apertos tenendo , liberumque spiritibus transitum
sternendo . 8. Cum lacte decoct. vel cum aqua para-
tum , & cum æquali vel majori parte lactis mixtum ,
vel ante vel post lac assumptum , prodest in Phthisi .

VI.

DE hoc decocto *Coffee* sumiter manè unus vel alter crater. Qui ad stomachi invalitudinem eo utuntur, sumunt immediate post prandium, additis *caryoph. contus.* vel *cinam.* vel *cardam.* vel *sacch. ambrat.* Sicuti autem in prædictis affectibus suo modo locum habet, atque indicatur usus *Coffee*, ita minus idoneus ac contraindicatur, in nimium macilenta, biliosis, stomachis nimium calidis, eisque, quibus vasa sanguine subtili, rapidiusque circulante sunt repleta. Item quibus tussis, & sputum frequens, ab acriori sanguine oriundum, uti & Phthisicis consummatis.

VII.

Chocolata seu *Succolata*, est species solidæ Pastæ Americanis frequens, & forma Pastilorum vel Tabellarum ad nos delata, ac ex variis ingredientibus, quorum præcipuum est *Cacao*, quæ est fructus cujusdam arboris, ac species quædam amygdalarum composita. Ex hoc fructu exprimitur succus, inspissatur, additurque *cinamom.* *piper. mexican.* *caryophyll.* *Vanilli,* *achiota* & *sacch.* Alii etiam adunt *aq. nampb.* *amb. moscb.* alii alia, ut adeò inter authores pro locorum usu, vel pro cuiusque sapore, aliqua discrepantia in ejus compositione observetur. Bonitatis signum est, ne mucidum oleat, nec vermiculis erosa sit, nec masticando quid displicens, aut nimis aromaticum sapiat. Modus ejus bibendi vulgarissimus est, dum aqua bulliens infunditur crateri, quem ebibere cupis ad medietatem: inde Chocolatæ tabella una aut altera dissolvitur, donec inspissata satis appareat, mox probè ligno denticulato agitatur & in spumam vertitur: tandem reliqua crateris medie-

tas

tas aqua calida cum saccharo repletur , ac calidissime forbillatur . Aliqui dissolvunt eam in aqua frigida , ligno denticulato agitant , spumam elevatam in alio reponunt vase , reliquum cum s. q. sacch. igni apponunt , & ubi adhuc calidum est , spuma prius separatae assundunt , totumque epotant . Nonnulli citò eam parantes aquam calefaciunt , ei derafam Chocolatæ tabellam admiscent , dissolvunt , ligno agitant , & necedum separata spuma hauriunt . Sunt , qui ante ejus haustum aq. frigidæ haustum sumunt , aut biscoctorum par intingunt . Alii eam glacie refrigeratam potant , quæ palato potius quam valetudini conveniens est . Si sanitatis gratia bibatur , sufficit ad duas vices quotidie ad summum , & potius horis matutinis eam sumere . Diebus canicularibus eadem abstinere melius est .

VIII.

Qualitates ejus quod attinet , temperata est , si præcipue piper & caryophylli eximantur , prout nonnulli faciunt , frigidis cacao particulis ab ingredientibus calidis temperatis . Bibitur a plurimis potius ex consuetudine & deliciis , quam morbi curandi aut præcavendi gratia , interim utilis est stomacho debili , exhausto & flatulento . Utilis iter facientibus , & quidem tam mane , antequam itineri se committant , quam vesperi , absoluto diei penso . Item Prædicatoribus , seu ante seu post sermonem . Ante eum enim , pectoris & vocis vires diutius quam Jusculum sustinet , post verò exhaustas corporis vires reparat . Utilis etiam ob vim ejus unctuosam ac nutritiam Hecticis & atrophia laborantibus : præterea semen auget , ac in scorbuto acidum falsum temperat , imprimis si cum late sumatur . Abstineant ab ejus usu Juvenculæ chlorosi laborantes , aliquique omnes obstructionibus detenti , ac chylo corrupto , & crudis indigestisque humoribus

ribus in stomacho stabulantibus prædicti ; tollendus etiam abusus , ac nimia ejus potatio , cum pingues ac butyrosæ ejus partes , quibus abundat , non ritè ubique per corpus distribuantur , & necessario in venarum angustiis hæreant , ac obstrunctiones & infarctus generent .

ARTICULUS V.

*De Officio Medici , in prescribendo
Laudano Opiato.*

I.

Laudanum Opiatum , sic dictum , quasi Laudatum ex Opio Medicamentum . Paratur enim ex Opio , quod est succus expressus & condensatus , vel capitum papaveris cuiusdam peregrini , præsertim Thebaici , thyrsis seu scapis vulneratis , vel ex tota planta , & hoc a nonnullis dicitur *Meconium* . Præparationes fere tot sunt , quot authores . Optima ejus correctio consistit in ejusdem depuratione , in leni sulphuris fœtidi , inflammabilis , immaturi evaporatione , ac virtutis extractione per menstrua , qualia nonnulli accipiunt *salina* , *lixiva* , ut v. g. alcahest vel tinct. tart. alii *sulphurea* , ut spirit. vin. quia opium abundant sulphure , quod vappidas & halituosas opii particulas naturæ amicas reddit , neque vires ejus obtundit ; alii *aquea* , ut v. g. aq. destillat. vel destill. ror. majal. quia opium non privant virtute salina , ut acida , nec illam secum auferunt , ut spirit. vin. alii tandem *salina acida* adhibent , ut verb. gr. acet. destillat. succ. cydon. &c. tum quia acidum ejus correctivum venenis adversatur , tum quia acrimoniam & caliditatem ejus corrigit , tum quia sal volatile ab

le ab acidis fixatur, ac acida etiam stomachum roborant. Nobis hic in usu est *Augustanum*, & quod priori multo præstantius, minusque caput turbat, Laudanum cydoniatum *Helmont*.

I I.

Qualitates ejus quod concernit, statuunt aliqui illud esse *frigidum*, quia effectus producit frigidos, ut stuporem, somnum profundum, ac quia corrigitur calidis, & propinantur calidissima, si periculum ab assumpto opio immineat. Alii *calidum* pronuntiant, quia frigiditate in tam modica quantitate nocere non posset, quod odore grave, sapore amarum, atque inflammabile; sudorem etiam excitat, pruritum & sitim causatur. Alii vim ejus Narcoticanum occultæ adscribunt qualitati, alii in eodem partes heterogeneas agnoscunt, calidis tamen prædominantibus: alii juxta principia ejus chymica, (cum constet sulphure copioso vaporoso cum sale volatili, præsentibus etiam partibus aqueis & terreis, una cum salinis fixis in capite mortuo residuis) vim agenti adscribunt effluviis vaporosis, quæ porulos cerebri apertos & dilatatos obstruunt, spirituum animalium effrænem influxum impediunt, eosdem volatili sulphurea visciditate figunt, ad invicem agglomerant, ligant, sopiunt, & quasi torpidos reddunt.



III L.

USus generalis *Laudani Opiati* est, ut si veluti Panacea omnium dolorum, fluxionum evacuationum nimiarum & vigiliarum, Specialem quod attinet, convenit 1. In febribus intermittentibus, praemissis emeticis & purgantibus, mixtum pulveribus antifebrilibus. 2. In continuis malignis caute cum eo mercandum, nec usurpandum, nisi mixtis alexipharmacis, ac in minori dosi, & in primis vel in augmento morbi, tum quia spiritus, ne tam citè resolvantur, quasi coercet, tum quia gravior mitigae symptomata, vel præcipue in declinatione, si jungantur dolores intensi, vel excretiones humorum quæcunque impetuosa, ac in specie catarrhi, tusses, vomitus, diarrhoeæ, Instante crisi vel die critico non temere dandum, ne natura in conatu suo impediatur. In variolis & morbillis dandum mixtis expulsivis, tum pro sistendo alvi fluxu & præcavendis nervosi generis symptomatibus, tum pro mitigandis urgentioribus symptomatibus & promovenda excretione cutanea. Cum etiam sudorem moveat, hinc Theriaca & Mithridatum dempto opio, nullum vel parcum excitant sudorem. Videtur autem excitare sudorem, vel quod natura refocillata excretionem per sudorem moliatur, vel quod somnus fluxiones omnes fistat excepto sudore; vel quod sulphur ejus tenuius a sale volatile propulsum, per cutim exspiret.

I V.

Quod ad affectus *Capitis*, prodest *Laudanum opiatum in Cephalalgia & Hemicrania*, mixtum præcipue cum specifico *cephalico*, in *Vertigine* per consensum, figendo humores ac subtile spiritus, in *Mania*, sanguinis fervorem, ejusque inordinatum motum spirituumque effrænem impetum sistendo, somnumque, a cuius defectu delirium augetur, procurando. *Epilepticis* mixtum quoque prodest, acrimoniæ humorum vellicantium sistendo, vel eos in centro ligando & partem roborando, maxime in infantibus ac adultis, ubi simul tormina & partium membranosarum vellications adsunt. Videndum tamen, ut caute procedatur, ne si natura ad exteriora contendat expellere causam morbificam, hæc motu inhibito circa cor restitet, & suffocationem excitet. *Catarrhos* tenues & acres ad miraculum usque sistit, eosque ad pepasnum deducit.

V.

Quoad affectus *Pectoris*, optime prodest *laud.opiatum in Tussi*, exorta a materia tenui & acri, si thorax non est infarctus a materiæ copia. Sunt, qui nullam tussim sine opiatibus feliciter tolli posse putant, unde licet minus convenienter, ubi viscosi crassi & glutinosi humores in Bronchiis pulmonum continentur, tamen & in hoc casu convenire possunt, dosi refracta & secundaria, cum incidentibus maritata, vel interposita, cum archæum sopiant, naturam rōborent, tussim sedent, ac materiam concoquant. Prodest quoque in *Asthmate hypochondriaco*: non vero in Asthmate hydropicorum, vel ubi restagnans ichor, spiritualibus partibus jam intentat periculum. In *Pleuritidis* initio, specificis volatilibus misceri potest

par-

parcius, sicuti in declinatione fixioribus. Expectoratio enim sic melius succedit, vires confortantur, & ipse morbus longe felicius ad finem decurit. In Phthisi, optimum est, si oriatur ex defluxu humorum acrium & salsorum ad pectus, vel a sputo sanguinis; non vero, si ab ulcere pulmonum, cum sic sputum sistat, & agros suffocet maxime, si dosi ordinaria exhibeat, dosi vero refracta commode etiam hic in usum vocari, & cum aliis misceri potest.

VI.

IN affectibus *Cordis*, a resolutione spirituum oriundis, cordialibus parcissimè admixtum, maximè prodest; sic quoque in palpitatione *Cordis*, *Lipothymia*, aliisque symptomatibus *hystericis* & *hypochondriacis* nihil præsentius Laudando opato, resolventibus & præcipitantibus mixto, hinc additum pulv. absorb. Wedel. plurima in his affectibus, eodem teste, præsttit. Quodam affectus *Ventriculi*, utilissimum est in *Cholera*, dummodo non intempestive exhibeat, cohibendo causam morbificam. Solatur etiam *Cardialgiam*, mixtum carminativis vel præcipitantibus. In *Singultu* quoque prodest, mixtum castoreatis. In *Vomitu* etiam, seu ab hypercatharsi, seu ab aliis causis excitato, mixtum cum *Theriac*. & confect. alk. vel datum in pilul. cum ol. ment. vel cinam. In *Appetitu* nimio valet, datum cum absorbentibus. In *hypocondriacorum* & *scorbuticorum* quibusdam affectionibus, inquit Willis, semper quovis medicamentorum genere, quam opiatorum usu destitui, non enim solummodo contra Dolores & Vigilias pertinaces, verum in paroxysmis Asthmaticis, in *Vomitu*, *Diarrhoea*, quin etiam in Vertigine & pathematibus Convulsivis, nullum præstantius expertus est remedium.

VII.

QUoad symptomata *Intestinorum*, prodest in doloribus *Colicis*, modo non adsit humorum in intestinis infarctus, cui prius mendendum, tam per se exhibitum, præsertim in colica biliosa, quam cum purgantibus dosi refracta mixtum. In *Ileo* est sacra anchora & extremum solatium, vel mixtum cum purgantibus, ut una fidelia & dolor & materia morbitica tollatur, vel quod magis in praxi & usu, primò doloribus succurrentum per opiatum, hinc purgante alviñæ fæces exstimulandæ. In *Diarrhœis*, statim sapè fluxum sedat, magna cum ipsius ægri & adstantium admiratione. In *Dysenteria*, licet opiata quibusdam male audiant, & narcotica necroœica dicantur, tamen sine iis vix vera dysenteriae curatio fieri potest; neque enim tam fluxum sifit Opium, quam cum moderatur & corrigit, dolores minuendo, morbumque in centro detinendo. Datur optimè maritatum cum bezoarticis, præsertim in epidemica. Si dolor & fluxus urgeat, majori dosi opus est. In *Dysenteriis* indolentibus, & ex inflammatione intestinorum ortis, caucius eodem utendum. Prodest etiam in *Hæmorrhoidibus* immodicis & dolentibus.

VIII.

QUoad affectus *Renum & Articulorum*, prodest quoque in *Calculo*, dextre adhibitum, id est, si dolor & vigiliæ urgeant, additum temperatoribus, lithontripticis & nervinis, v. g. *ocul. canc. succin. cinnab. &c.* præsertim si calculus nondum e renibus fuerit egressus, vel saltē leviter inde motus; immo dum jam hæret in ureteribus, dato Laudano, non in totum sopitur expultrix facultas, ut nihil amplius agat, sed dolores sopiuntur, ut facultas expultrix roborata

eo valentius insurgere possit. In *Podagra*, si diri ac diurni dolores ac vigiliæ infestent, ut causæ vestem induant, & urgendo ad se curationem trahant, ad Laudanum ceu asylum confugiendum, alias cautè prodendum, cum malum contumacius reddere, motum naturæ impedire posset. Maximè prodest in Arthritis vaga scorbutica p. p. Exterius quoque in articulari morbo prodest, mixtum cum spirit. formic. umbrie. & sal. ammon. Cavendo tamen, ne opiatis, humor peccans in tophaceam duritiem transeat.

I. X.

In affectibus Hystericis, hysteralgia, mensibus immobilitis, fluore albo, divinum est auxilium, seu mixta castoreo, seu aliis appropriatis vel absorbentibus. Cum ambratis maritatum, aphrodisiacum evadit non contemnendum. An in amputatione crurum sphaerulitorum, narcotica sint adhibenda, dubitatur, aliis negantibus cum levia non juvent, & valida sunt periculosa: aliis affirmantibus, ut sanguinis fervor, motus ac inflammatio inhibeantur. Alii, circumstan-
cas omnes bene attendendas esse jubent, neque obsta-
re arbitrantur, quo minus præcedente operationem
nocte opiatum moderata dosi propinari possit, cum
eger hinc animo sit alacriori, & multa præcavean-
tur symptomata. Par ratio est in sectione calculi,

X.

Quoad usum externum variis dolorum generibus auxiliatur opium. Sic in doloribus capitis, mania, phrenitide, vigiliis; unguentis additur; illius teinporibus & naribus, vel epithematibus: A Podagram opium cum lacte muliebri dilutum commendatur. Agit autem extrinsecus, non stuporem patis excitando, prout credebant veteres, sed quaten per poros subtilior pars sulphurea, & mercurialis sanguini communicatur, & hinc vires suas ordinaria licet remissiori longe gradu, & refracte exserat. Stit etiam extrinsecus haemorrhagiam a vulnere, rium, ab emulso dente oriundam. Item prodest in labore dentium, pilula ejus denti excavato indita. clysteribus id etiam nonnulli addunt, si extremitate geant dolores, sed non in magna dosi, v. g. Philo Rom. vel theriac. rec. ad dr. i. vel laud. opiat. v. vel vii. sed caute, cum usus internus longe tutus sit. Suppositoriis additum, prodest exulcerationi testinorum, quod tamen ultra quadrantem horae non detinendum.

X I.

Pro debito Regimine ac legitimo usu, sequentia Medico observandæ sunt cautelæ. 1. Laudanum opiatum exhiberi posse forma solidâ, media & liquida; in forma solida vel in electuar. cum confect. vel in Pilulis cum aliquo extract. vel trochisc. vel pulv. cum sacch. cand. vel magist. mat. perlar. imm omnibus pulveribus misceri potest. Sic mixtum cu CC. phi!. pr. ep. & cinnab. nat. laudatum est medicamentum, in arthritide vaga, vel miscetur cum pulcephalico, bezoartico, adstringente &c. Potest etiam talis pulvis misceri emulsionibus. In forma liquida cu

hibetur, sub titulo tincturæ anodynæ, essent. aut
tinct. opii. Dissolvitur etiam laud. opiat. in syrup.
aq. destill. emuls. vino, brod. aliisque liquidis. 2. Do-
sin laud. opiat. vel esse ordinariam vel extraordinariam.
Ordinaria est *infima*, *media* & *summa*. *Infima* in
adultis est gr. dimid. vel 1. *Media* gr. iij. vel iiij. *Sum-
ma* gr. iv. v. quæ tamen non facile exhibenda, nisi
præcedentes doses absque effectu jam sint exhibitæ.
Præterea notandum ex praxi medica, laudanum opia-
tum præscribi, vel intentione *primaria*, v. g. dolores
vel vigiliæ, vel excreta, aliaque symptomata ur-
gentia attendendo, & sic ad gr. i. ii. iii. præscriben-
dum, vel intentione *secundaria*, v.g. ad roboran-
dum, sanguinem fluxilem concentrandum, addendum
illud aperientibus, hystericis, cephalicis &c. Et sic
in dosi *refracta* & *remissa*, quarta nempe, tertia vel
dimidia pars grani, miscenda, prout in formulæ Syl-
vianis videre est. Dosis *extraordinaria* varia, tum
ex consuetudine, tum ex morbi urgentia, tum ob
temperamentorum diversitatem; hinc si adsit urgens
indicatio, nec dosis minor juvet, ad gr. viij. vel scr.
ss. ascendendum. Interim in omni dosi *perpetuo* ob-
servandum, tutius esse infra subsistere, vel repetita
vice voti compotem fieri, quam peccare in excessu,
& extrema tentando, opprobrium sibi aaccersere.



XII.

INsuper 3. Notabit, ubicumque materia peccans in majori quantitate reperitur, quam ut subigi & vincī possit, illud locum primum habere, premissis universalibus, vel saltem tutius ac felicius tunc operari, nisi dolorum, aliorumque symptomatum nimia adsit urgentia; quo in casu etiam citra illa præmissa exhiberi valet, 4. Non exhibendum esse viribus valde imbecillibus existentibus, sed in tempore usurpandum, si vires adhuc constent. In rebus enim desperatis, & ubi æger vix non agonizat, & viribus pene ecclypsantibus, mortem accelerat. 5. Illud etiam contraindicat in Phthisica ulcerosa dispositione, asthmate humoroso, hydropicis &c. cum in talibus sit viaticum ad vitam æternam, dosi primaria præstimum datum. 6. Quo ad tempus exhibendi, si detur primaria intentione, tempus nocturnum optimum esse 2. vel 3. horis a cæna, si secundaria, etiam manè & post meridiem. In dosi primaria una die bis non facile dandum. 7. Post assumptum Narcoticum, purgationem altero desuper die institutam, debita operatione destitui. 8. Cavendum esse, ne exhibetur in ipsis paroxysmis, v. g. hemicraniæ, febrium & epilepsia, ne natura à pugna suscepta revocetur. Interim tamen hoc ipsum limitari potest ab urgentibus circumstantiis, illudque concedi in dosi succisa. Idem dicendum de aliis motibus criticis, ut diarrhœa, variolis, morbillis &c. Item de partu instanti, cum dolores necessarios inhibeat.

XIII.

Rætorea, 9. Observabit, illud minus convenire
 in affectibus frigidis quam calidis, item in hu-
 moribus crassis, pituitosis & viscidis. In affectibus
 ventriculi, nisi urgente dolore inflammatorio, fu-
 giendum esse Opium, monet *Septal.* prout etiam in
 iis, quibus debilis appetitus, qui facilem habent al-
 vum, & infirmum ventriculum, in his enim appe-
 titum prosternit, & alvum solvit; vel etiam prout
 subinde observatur, vomitum ciet, quod videtur
 contingere, vel a relicto sulphure fœtido ventricu-
 lum relaxante, præsertim si rite non fuerit præ-
 paratum, vel a cacochymia humorum in ventricu-
 lo existentium, 10. Damnari quoque ab aliquibus
 Opium in doloribus aurium, & oculorum lippitu-
 dinibus, cum ob amarorem mordeat, & dolores
 augeat. In odontalgia quoque, melius esse idem in-
 terius assumere, quam dolentibus partibus applica-
 re. 11. Ratione ætatis infantibus & pueris, ra-
 tius, & parcus, illud dandum esse, licet, dum in-
 dicatur, exhibitum dosi ipsis proportionata, non
 multum noceat, testante quotidiana experientia.
 Senibus quoque non adeò convenit, ac aliis ætati-
 bus; interim si moderatè detur, usus ejus tutissi-
 mus. 12. Cum Narcotica plerumque corpus exsic-
 cent, nunquam offerenda esse sine humectantibus,
 vel ante vel post ejus assumptionem exhibendis.
 Ultimò videndum, ut Opium rite sit præparatum,
 neque statim desperandum esse, si legitima obser-
 vata Methodo, datis opiatis æter per longum tem-
 pus dormiat, præfertim si vigiliae continuatae præ-
 cesserint.

XIV.

EX dictis patet, quod *Laudanum opiatum* rite exhibitum sit munus quasi Divina, & sacra vita anchora: cymba autem Charontis in manu imperiti, & gladius in manu furiosi. Nonnulli, præsertim mi-lochymici illud damnat, quia 1. Odorem habet viro-sum. 2. Quod sit venenum. 3. Quod multi ex ejus usu interempti fuerint. 4. Quod tutiora sint hypnotica. 5. Quod Opium sæpius adulteretur. 6. Quod palliativam solum præbeat curam, nec tollat causam morbificam, hincque ad exiguum tantum tempus profit. Verum Respond. ad 1. odorem virosum corrigi & tolli, neque omnia fætentia virosa esse. Ad 2. non esse venenum propriè dictum, quod peculiari vi cordi infestum, & vita omnibus modis insidiatur, sed posse dici venenum impropriè dictum, quod nimia copia assumptum, eneare possit. Ad 3. abusum non tollere usum. Ad 4. hypnotica sæpius nihil proficere. Ad 5. observandas esse notas bonæ electionis Opii. Ad 6. subinde etiam ipsam causam tollere; sæpius verò urgente occurrere sympto-mati; satius enim est, cum Galen. symptomatibus oc-currendo, ad causæ continentis ablationem roborare naturam, quam cum morbo ægrum de medio tollere. Non igitur solis utendum opiatis; sed causæ simul invigilandum, stultum tamen est, semper causæ ablationi intentum esse, neglecto urgenteri sympto-mate. Redit quidem sæpè dolor, redit excretio, si-mulac evanuit vis medicamenti, sed interim natura per has inducias confortatur, ut promptius dein con-tra causam morbificam insurgat.

ARTICULUS VI.

De Officio Medici, in prescribendis formulis Remediorum Opiatorum.

I.

Syrupus Narcoticus. *R. Syr. fl. papav. errat. unc. ss. confect. alk. dr. ss. laud. Opiat. Helm. gr. ij. aq. cinam. bulg. dr. iii. vel violar. dr. vi. M. S.* Syrupus narcoticus pro una vice duabus vel tribus horis post cænam sumendum.

Emulsio Opiata. *R. Sem. mel. excort. dr. ii. sem. papar. alb. dr. ii. aq. nymph. viol. solan. an. unc. i. ss. M. F.* Emuls. add. magist. perlar. cum gr. ii. laud. op. in mortar. subact. scr. i. spirit. ros. gut. viii. man. christ. perl. dr. i. *M. S.* Emulsio opita ante cubitum sumenda.

Bolus Narcoticus in nimio Vomitu, Hypercatharsi & Singultu. *R. Teriac. dr. ss. confect. alk. scr. i. laud. op. gr. i. vel ii. M. S.* Electuarium vel saccharum narcoticum. Vel *R. Teriac. Androm. scr. ii. lig. aloes ver. scr. ss. ol. destill. mac. gut. ii. laud. op. gr. i. m. F. Bol.*

Alius. *R. Conf. ros. vitriol. dr. i. confect. alk. vel de hyac. dr. ss. terr. sig. scr. j. laud. op. gr. i. vel ij. ol. destill. cinam. gut. j. cum s. q. mir. cyd. M. F. Bol.*

Alius in Diarrhœa. *R. Conf. ros. rub. dr. j. ibery. And. scr. j. laud. op. gr. ij. magist. coral. perlar. an. gr. v. m. F. Bol.*

Bolus Narcoticus. *R. Laud. op. Helm. gr. iii. mitrid. opt. confect. alk. an. sc. j. M.*

Bolus Stegnotico anodynus. *R. Conf. symphyt. dr. i.*

dr. j. pulv. stipt. Croll. vel stegnor. Guttman. scr. j. laud. op. gr. j. ss. M.

Electuar. Opiatum anti Dysentericum, usu & præxi P. P. probatissimum. R. Cons. ros. vet. unc. j. the. riac. wet. diaf. cord. an. dr. j. terr. sigill. corall. rub. præp. sem. plantag. as. scr. j. ss. C. C. philos. prep. scr. j. lap. bez. occiden. gr. v. laud. op. Helm. gr. iv. cum s. q. syr. de ros. sicc. M. F. Elect. S. Electuarium Dysentericum, de quo cunctis quatuor horis magnitudo castaneæ sumenda.

Pilul. Opiat. in Tussi & Catarrho tenui. R. Mass. pilul. de cynogloss. gr. vii. ol. sem. coriand. gut. ii. M. F. Pilul. N. iv. vel R. Mass. pilul. de cynoglos. dr i. ss. succ. glyc. inspiss. scr. i. ss. succin. alb. præp. scr. ss. M. F. Pilul. N. xxiv. asperg. pulv. ros. rub. S. Pilulæ in Tussi & catarrho, de quibus octo sumende duabus, vel tribus horis post cænam.

Aliæ in Phthisi incipienti utiles. R. Antipect. Poter. scr. i. sacch. sat. scr. ss. extr. croc. gr. iv. laud. op. Helm. gr. ii. vel iii. cum s. q. Bals. peruv. M. F. Pilul. N. xx. pro 2. dosibus.

Pilulæ opiatæ in Colica. R. Extr. castor. gr. ii. laud. op. gr. iii. M. F. Pilul. N. v. R. Extr. lig. aloë castor. zedoar. laud. op. an. gr. iii. cum syr. de papav. M. F. Pilul. N. vi. vel ix.

Aliæ anodynæ, in doloribus Podagrīcis. R. Extract. papav. errat. dr. i. castor. gr. vi sal. vol. C. C. vel succin. gr. iv. cinnab. nativ. scr. ss. laud. op. gr. iii. M. F. Pilul. N. xl. dos. a gr. vi. ad scr. ss.

Pilulæ opiat. anti Dysentericæ & contra Hypertharsin. R. Extr. theriac. gr. vi. torment. scr. ss. laud. op. gr. ii. M. F. Pilul. N. ix.

Pulvis absorbens opiatut Wedel. videatur de præparantibus.

Alius. R. Cinnab. nat. scr. i. corall. rub. præp. C. C. phil. præp. an. gr. xv. marg. præp. gr. x. laud. op. Helm. gr. ii. ol. caryoph. gut. iii. N. F. pulv. cuius dos. scr. i. Pul.

Pulvis Diaphoretico anodynus in Arthritide. *R.*
Ocul. canc. præp. conch. præp. an. gr. xv. cinnab.
nat. scr. ss. laud. op. gr. ii. vel iii. M. F. Pulv. pro
2. dos.

Alius Nephriticus anodynus. *R.* *Ocul. canc. præp.*
scr. i. cinnab. nat. vel antim. scr. ss. laud. op. gr. i. vel
ii. M. F. Pulvis.

Mixturus quoque quibusunque, unum vel alterum
gr. Laud. opiat. pro indicatione misceri potest, ut ne-
 cessitatem non sit, plures hic subnectere formulas.



C A P U T V I I I .

De Officio Medici, in Affectibus exigentibus Alexipharmacis, Antifebrifuga, Anthelmintica, Carminativa & Lithontriptica.

A R T I C U L U S I .

De Officio Medici, in ordinandis Remediis Alexipharmacis.

I.

Medicamenta Alexipharmacata sunt, quæ venenis & malignitati humorum resistunt, dicta etiam *Alexiteria* & *bezoartica*. Est autem *venenum* illud, quod particulis machinæ humanæ peregrinis & destructoriis, citra aliam causam manifestam corpus humanum, ejusque principia vitalia violenter destruere, ac in vita periculum vel mortem conjicere valet. 1. Venenum hoc vel corpori inferatur, & propriè dicitur *venenum*, vel in eodem producitur, & dicitur *malignum*, seu *veneno analogum*. 2. Aliud venenum lædit *inspiratu*, ut seminaria pestis & febrium malignarum. Aliud *baustu*, quod ore sumitur, aliud solo contactu, iactu vel *morsu*. 3. Aliud ex *externum*, aliud *internum*. 4. Aliud magis *citum* & *activum*, quod exiguo temporis spatio interimit, aliud *tentum* & *temporarium* quod efficaciæ remissoris, post multos demum dies necat. 5. Aliud est *soli homini* tale, aliud *brutis*, multa

multa enim homini sunt venena , quæ aliis animantibus , in alimoniam cedunt , & vicissim , ob diversum nexus principiorum vitalium . 6. Aliud est *universale* , quod omnibus ac singulis animalibus ad verum , ut v. g. arsenic. mercur. sublim. aliud *particulare* , cuius in homine aliud nervis & spiritibus animalibus inimicum , ut solanum furiosum , aliud pulmoni , ut lepus marinus , aliud ventriculo , ut omne corrosivum , aliud vesicæ , ut cantharides . 7. Aliud magis officit partes *spirituosas* , aliud *humidas* , aliud *solidas* . 8. Aliud est *vegetabile* , ut aconitum , cicuta , napellus ; aliud *animale* , ut scorpius , vipera , canis rabidus ; aliud *minerale* , ut arsenicum mercur. sublim. cobaltum .

II.

Venena non tam occultis , quam manifestis quoque agunt qualitatibus , adeò ut sint vel *corrosiva* , vel *fermentativa* , vel *vaporosa* , vel *mista* . Corrosiva , ventriculo escharam , & necrosis inducunt , atque talia plerumque sunt mineralia , hinc si statim revomantur , delicatori Archai sensu & naturæ robore , non nocent , ut etiam si ingerantur inventriculum plenum , vel pinguibus præsumptis repletum , acrimonia nempe obtusa , & facilitiore con sequente vomitu . Fermentativa , morum in M. S. præternaturalem , cumque vel absolute lethalem , vel summe periculosum inducunt , unde calor febrilis , æstus , deliria &c. Atque tali vi fermentativa peregrina , agunt potissimum venena animalia , quatenus cum saliva ejusmodi sal peregrinum , irato præsertim animali , in vulneratam partem illatum , mox serum & sanguinem immutat , ut corrumpantur , ac fermentationem præternaturalem & necrosis patiantur ; hinc facta statim exsuctio , vel destructione hujus fermenti peregrini , vel non nocent planè , vel citius de-

debellari possunt. Vaporosa, spiritus præsertim animales obnubilant, suffocant & destruunt, atque hujusmodi vaporositate peregrina, agunt potissimum venena vegetabilia quatenus sulphure, v. g. impuro, mucilaginoso, ac nervis inimico pollent. Mixta, pluribus vel omnibus nunc recensitis modis nocent. Sic v. g. venenum in corpore genitum, in febris malignis, nunc fermentationis peregrinæ soboles, nunc simul etiam irritatione & vaporositate nocet; sic pestis venenum corrosivum, demonstrant carbunculi, dysenteriæ, cardialgiæ; fermentativum, febres, bубones, anxietates &c. Vaporosum, deliria, sopores, vertigines.

I I I.

Sicuti igitur diversus agendi modus in *Venenis*, ita etiam *alexipharmacorum* diversa est agendi ratio. Nam 1. præter occultam qualitatem, aliqua horum putredini resistunt, ac balsamo nativo roborato, calore item exsuscitato, circulatione ac motu sanguinis & lymphæ restituto, fermentum peregrinum excludunt. 2. Alia Veneni particulas acutas & corrosivas involvunt, & obtundunt. 3. Alia in Veneno vaporoso poros cerebri reserant, illamque volatilem & figentem glutinositatem attenuant, & in halitus resolvunt. 4. Alia fermentativum despumant, & orgasmum massa sanguineæ invertunt. 5. Alia ichorescentiam, resolutionem & rarefactionem sanguinis nimiam impediunt. 6. Alia tandem sanguinis ac serum promovent, ejus coagulationem resolvunt, ac fermentum malignum per sudores eliminant. Sicuti igitur diversa sunt Venena, ita etiam diversa sunt Bezoartica, cum nullum sit alexipharmacum, quod omnibus æque venenis ex asse conveniat,

IV.

Circa usum & legitimam horum administratio-
nem, Medicus notabit: 1. *Alexipharmacæ* alia
dici *universalia* & *communia*, quæ ubique exhiben-
tur, si veneni natura specialis haud sit cognita, ut
v. g. *Tberiac.* *Orvietam.* *tinct.* *bezoart.* &c. Alia par-
ticularia seu *antidota*, quæ huic vel illi veneno spe-
cialiter adversantur. 2. Venenis mineralibus genera-
lem præbere antidotum, quæcumque corrosivitati sunt
opposita, qualia sunt, tum pinguia, quibus inviscari
& obtundi solent particulae salinæ acres, ac obliniri
& defendi parietes ventriculi, ut v. g. *amygd.* *d.*
buty. *rec.* &c. Tum præcipitantia, & acorem cor-
rosivum infringenta, ut *crystall.* præpar. 3. Alexi-
pharmacæ in malignis præcipue febribus usurpanda,
alia esse fixa, & quidem vel mineralia, ut v. g. *an-*
tim. *diaph.* *unicorn.* *foss.* &c. Vel animalia, ut v. g.
lap. *bez.* *unicorn.* *ver.* &c. Alia *volutilia*, & quidem
vel *macra salina*, ut v. g. *sal.* *vol.* *C.* *C.* *viper.* *succ.*
cit. &c. Vel *aromatica* & *sulphurea*, ut v. g. *the-*
riacalia. Item alia simul esse *opiata*, ut *Theriac.* *dia-*
cord. &c. alia *Camphorata*.

V.

Fixiora locum magis habent in statu, & declina-
tione, ubi alteratione & præcipitatione opus,
conquiescente jam tumultu, & devicta per præmissa
potentiora malignitatis atrocità. In statu enim violen-
tiora exhibere, esset novas turbas ciere in massa san-
guinea, astum intendere, ac varia capiti pathema-
ta inferre. Item profunt, ubicunque volatilia contra-
indicantur: ut in infantibus, quorum sanguis est tex-
turæ tenuioris, ut facile nimis effeſari possit, vel in
gravidis, ne in orgaſym ruat sanguis, & menses

cum abortus & vitæ periculo superveniant ; vel in fluoribus sanguinis , ob nimiam ejus rarefactionem , vel in debilibus cum pulsu frequenti , qui alias in malignis , si a principio talis sit , plerumque funestus .

V I.

Volatilia salina macra , locum habent , ubi calor febrilis paulò est intensior . Aromaticæ vero & sulphureæ , in principio & incremento morbi , dum adhuc sudare possunt ac solent ægri . Activiora enim & manis Heroica primò hosti sunt opponenda , ad maiorem penetrationem & ciciore discussionem , præfertim ubi mitior urget æstus , intimior est malignitas , ec febris mitis vel nulla adest ; hinc principis , si ullibi , sane in Peste & similibus febribus , obstandum , mature sumendo antidotos , antequam cibus capiatur , vel somnus ineatur . Sic enim saepius in ipsa radice morbus jugulatur , cum alias prompte vitalia subeat malum , radicesque figat , vix nisi cum morte finiendas . Præterea convenient , ubi natura ab expulsione v. g. petechiarum , variolarum vel morbillorum cessat , vel hæc exanthemata retrocedere videntur , neque hoc in passu timendus calor , utpote productum feminii morbos , brevi compescendus , modo exclusum sit peregrinum hunc motum excitans .

V II.

REmedia Camphorata tum maxime convenient , cum adsunt inquietudines , deliria ; vigilæ &c . Cum præter vin veneni correctivam , simul aliqualem vin spirituum quasi fixativam obtineat , hinc Ettmullero teste , Medicus in Peste absque camphora , est miles in prælio sine gladio ; unde cautius iis utendum in illi ægrotis , quibus caput , vel alias cam-

phora inimica existit. Alexipharmacæ, quæ simili
piata sunt, locum præcipue habent in augmento
morbis, tum quia sudorem magis promovent, tum
quia spiritus, ne tam cito resolvantur, quasi coerc-
tent, tum quia potissimum graviora mitigant sym-
ptomata, ut vigiliae, inquietudines, imminentia de-
liria &c. Interim sciendum, Medicamenta hæc Alexi-
pharmacæ varianda, & subinde fixiora volatilibus
interpolanda, ac varie invicem miscenda esse, pro
vario malignitatis aut putredinis gradu, pro vatis fe-
bris intentione vel remissione, pro vario ægrorum
temperamento, ratiisque circumstantiis.

Præterea, 4. observavit Medicus potentiora su-
dorifera, tutius usurpari possunt si corpus perspira-
bit, & ad sudorem inclinet, secus mitioribus
utendum esse, ne turbetur & magis exagitetur mas-
sa sanguinea. 5. Corpora impura volatilibus magis
agitari & lredi, unde hoc in casu præmittenda vomi-
toria. 6. Aleximarcis aromaticis & sulphureis, in-
terponenda esse subinde acida, ac in specie composi-
tiones theriacales, in vehiculo acido propinatas, me-
lius & citius operari. 7. Quo major est malignitas,
eo frequentius & copiosius provocandum esse sudore-
rem, adeo ut in malignioribus ter sint propinanda
utra 24, horas. Interim cavendum, ne nimius exci-
statur sudor, cum ex hoc illata ephoram imperato,
et pejus habeant ægri; hinc prudenter agunt, qui
vixit habitu ratione, ægrum linceis aut stragulis
non opprimunt, sed tolerabiliter saltem tegunt, vel
prima tantum vice sudorem imperant: non vero am-
plius sequentibus præbiis, cum plus saepè præstet udor.
Ne serum nimium exhauriatur, illud potu largio-
ri resarcendum esse, & pro viribus conservandis, post
sudorem, vel etiam eodem actu fluente, blandis aci-

dulis utendum: hinc male agunt, qui continuo udore cruciatis, etiam potum denegant, cum potu & levetur sitis, ac simul etiam magis promoveatur sudor.

I X.

ITem, 9. Notabit; sudorem continuandum esse per horam dimidiā, integrā, vel etiam ultra, habita tamen ratione sedula naturæ ægri, raræ vel densæ, virum infirmarum vel validarum, malignitatis majoris vel minoris 10. Sudorifera etiam continuanda esse, licet maculæ, bubones vel anthraces cum levamine appareant, ut saltem impediatur recidiva. 11. Ægrum sudantem a somno arcendum esse, utpote impediente, convenientem veneni per sudorem expulsionem, hinc eodem infestante, spongia aceto camphorato imbuta, naribus applicanda. 12. Post sudorem, ægrum nonnihil leviter abstergendum esse, linteis probe calefactis & fumigatis, maxime cavendo, ne frigidior aer eum offendat. 13. In Peste, conjuncta cum febre ardente, uti jam supra insinuatū, theriacalia, excepto diacord. Fracast. minus tuta esse, vel saltem non nisi acidis temperata; sicuti econtra si febris nulla vel mitis adsit, illico natura suppetiæ serendæ, eaqué spirituosis volatilibus, multum ignem vitalem foventibus adjuvanda, quæ fermentum stomachicum resuscitant, sanguinem vigorant, ejus coagulationem impediunt, spirituascen-tiam promovent, ac vacillantem vitæflammam multiplicant. 14. Acidæ in his febribus nunquam omitenda, atque nunc sudoriferis addenda, nunc sudoris declinatione vel post eum usurpanda, cum ægrum reficiant & simul malignitati resistant: Ipsiſ tamē etiam semper aliquid sudoriferi addendum, ut corpus si non in perpetuo sudore, saltem in perpetua diaphoresi, plus minus aucta contineatur.

ARTICULUS II.

De Officio Medicis, in prescribendis Remediis Alexipharmacis.

Potio Alexipharmacum. Re. Elect. diascord. Fracast. scr. iv. pulv. rub. pannon. aut spec. de hyac. vel spec. liberant. scr. i. sal. vol. C. C. vel lap. bez. an. vi. aq. card. b. scabios. an. unc. i. ss. syr. acetos. unc. ss. M. S. Potio Alexipharmacum pro una vice sumenda.

Alius. Re. Aquæ scabios. unc. ii. ss. scord. unc. ss. succ. cit. rec. expr. dr. vi. theriac. vel diascor. Fracast. scr. iv. vel dr. ii. antim. diaph. vel spec. liberant. dr. ss. camph. gr. v. syr. card. b. unc. ss. M. S. ut supra.

Alia fortior. Re. Aq. card. b. & typh. cervor. an. unc. i. ss. sal. vol. C. C. gr. xv. vel. spir. C. C. dr. ss. Elect. diascord. theriac. opt. vel. elect. de ov. an. dr. i. acer. theriac. camph. dr. i. M.

Emulsio Alexipharmacum Craton. Re. sem. card. b. dr. i. ss. cit. dr. ss. nap. dr. i. aq. card. b. q. s. M. Emuls. add. syr. aceros. cit. unc. ss. possunt quoque addi, C. C. phil. præp. ocul. canc. terr. sigil. lap. bez. S.

Bolus Alexipharmacum. Re. Diascord. Fracast. scr. ii. confect. de biac. scr. i. C. C. phil. præp. scr. ss. lap. orient. gr. vi. M.

Alius. Re. Theriac. confect. hyac. an. scr. i. ss. lap. or. gr. xii. vel hujus loco spec. liberant. aut antim. diaph. scr. i. vel fl. sulph. dr. ss. camph. iv. M.

Electuar. Bezoardicum. Re. Spec. liberant. dr. i. theriac. diascord. an. dr. i. ss. confect. de hyac. scr. ij.

condit. cort. cit. arant. rob. rib. an. dr. iiiij. syr. acetos. cit. q. s. M. f. Elect. S. Electuarium expulsivum sudoriferum; de quo, mane, vesperi & nocte, magnitudo castaneæ vel nucis sumenda, & postea sudandum.

Electuar. præservativum a Peste & Febris malignis. R. Pom. cit. rec. N. iv. incid. una cum cort. & semin. coq. ex s. q. aq. res. ad consist. pulv. & trajic. per cribr. add. spec. liberant. s. aloë, de hyac. de gemm. fr. cordial. temperat. an. dr. i. confect. alk. dr. ii. ss. spirit. rub. id. dr. i. syr. acetos. cit. q. s. M. f. Elect. S. Præservativ. Electuarium, de quo mane magnitudo nucis jejune sumatur.

Morselli præservativi in Malignis. R. Spec. liberant. dr. ii. de hyac. d. i. Bol. armen. terr. sig. lign. aloë an. dr. ss. rad. zedoar. contrayerv. an. dr. i. ss. condit. rad. scorz. enul. angel. an. dr. iii. cort. cit. dr. vi. confect. alk. dr. ii. sacch. in aq. bezoard. sol. lib. i. M. f. Morsell. S. Præservativ. Morselli, de quibus mane unus sumendus.

Alii. R. Condit. nuc. Jugl. unc. j. cort. cit. rad. scorz. an. dr. iii. confect. alk. dr. ii. spec. de hyac. dr. i. liberant, dr. i. ss. diatrion. sant. dr. ss. extr. angel. zedoar. an. scr. i. sacch. albiss. in aq. cort. cit. sol. unc. x. M. f. Morsul. S. ut supra.

Trochisci Alexipharmaci præservativi. R. Cort. cit. sicc. dr. i. ss. cubeb. dr. i. cardam. dr. ss. zedoar. scr. iv. cass. lign. acutiss. dr. i. ol. dest. angel. cit. an. gut. vi. sacch. albiss. lib. ss. mucilag. tragac. cum ag. bezoard. extract. q. s. M. F. Troch. S. Præservativ. Trochisci præservativi, de quibus in exeundo e domo, vel in visitandis ægrotis unus sub lingua detineatur & liquefiat.

Pulvis Alexipharmacus. R. Spec. de hyac. vel pulv. rub. Pannon. C. C. phil. præp. an. scr. i. lap. bez. orient. vel sal. vol. C. C. gr. viii. M. F. Pulv. S. Pulvis Alexipharmacus calorem expelleens pro una vice sumendus.

Alius.

Alius. R. Spec. liberant. dr. ss. campb. gr. v. fl. sulph. scr. ss. M. f. Pulv. S. ut supra.

Alius. R. Flor. sulph. ter. sublim. spec. liberant. corrall. rub. præp. bez. orient. an. scr. ss. croc. vel campb. gr. iii. M. f. Pulv.

Alius pretiosus. R. Spec. de hyac. dr. ii. C. C. phil. præp. scr. iv. unicorn. ver. off. de cord. cerv. lap. bez. marg. præp. an. scr. i. M. f. Pulv. dos. scr. ii.

Acetum Alexipharmacum præservativum Timxi. & Orvietam. unc. i. diacord. Fracast. dr. iii. ther. Androm. unc. ss. rad. angel. contrajerv. enul. torment. pimpinell scorz. dictamn. alb. betasit. an. dr. iii. fol. scord. rut. millefol. an. p. ii. fl. calend. tun. an. p. i. cort. cit. frax. an. dr. ij. bacc. iuniper. unc. i. mac. zedoar. an. dr. i. ss. campb. scr. i. croc. dr. ss. myrrb. dr. ii. acet. opt. vel rub. idæst q. s. mixta flent infusa in loco calido, bene tecta, donec extrahatur Tinctura Col. S. Præserv. Acetum Alexipharmacum præservativum, de quo cochlear plenum mane jejunè sumendum, aut post sumpta offa, cui buccula panis immergatur.

Vinum præservativum. R. Rad. enul. pimpinell. scorz. an. unc. j. cort. cit. frax. an. dr. vij. fol. card. b. scord. dictamn. Cret. an. m. j. comar. absinth. m. ij. grosso modo incisa indantur saccul. ex sind. alb. suspendingo in vin. alb. lib. xxxviii. optimè clauso dolio. De hoc aliquid manè in jentaculo vel prandio bibendum.

Balsamus anti Pestilentialis. R. Ol. destill. angel. cit. an. scr. ss. rut. scr. j. lavend. caryoph. an. gut. viij. cinam. gut. iv. lig. Rhod. gut. xv. theriac. Androm. scr. iv. confect. alk. scr. ss. mosch. & amb. in sp. ros. sol. an. gr. iii. M. f. Balsam. S. Præserv. Balsamus anti pestilentialis, in morbis acutis, de quibus nares & arteriæ illinendæ.

ARTICULUS III.

De Officio Medici, in usurpandis Febrifugis, & præcipue, cortice China China.

I.

REmedia febrifuga seu *antipyretica* dicuntur, quæ febriles paroxysmos sistunt, sive Febres intermitentes, quæ raro solis evacuantibus cedunt, ex integro tollunt. Exercent autem suam vim, vel cruditates comminuendo, ac aciditatem infringendo & absorbendo, sive fermentum febrile corrigendo, vel effervescentiam ejus præcipitando, aut vi stiptica humores densando & figendo, vel somitem febrilem alterando, per diaphoresin discutiendo, ac vitiatam crasis massæ sanguineæ emendando, vel sanguini compagem firmiorem reddendo, ut minus in febriles effervescentias sit concitabilis.

II.

PRo debita horum administratione & usu Not. 1. Ea non exhibenda esse, nisi corpore prius sufficierter expurgato, ac universalibus præmissis, cum secus vel recidiva, vel multiplicatio febris, vel colicæ, hydrops, cachexiæ vel pédum saltem tumores superveniant. 2. Eadem exhibenda esse, una, duabus, vel tribus horis ante paroxysmi invasionem, ita ut junctis viribus cum natura operentur. 3. Desuper sudorem imperandum esse, cum teste experientia, fe-

febres, quarum paroxysmi singuli cum sudore fiunt, longe breviores, & facilioris curationis sint, quam illæ, quæ absque eo desinunt; unde multis Febris intermittens nulla tuto curata esse dicitur, nisi per sudorem successivè finita fuerit. 4. Si æstus multum urgeat, abstinendum esse a nimis calidis, volatileibus, aromaticis & theriacalibus. 5. Ubi frigus magis urget, salia fixa convenientiora esse. 6. Fixis calcinatis & aluminosis, minus fidendum esse, cum facilius recidiva superveniat. 7. Opiata febrifugis usitatis mixta, locum habere, vel quando paroxysmi potius ex consuetudine naturæ febrienti sæpius recurrent, quam ex fomite morbo, vel quando durante paroxysmo, graviora quædam vel etiam molestiora contingunt symptomata, usu laud. opiat. corrigenda. 8. Etiam exterius Carpis quædam applicari antifebrifuga, quæ vel febrilem fermentationis motum sedando, vel particulas in massam sanguineam evibrando, cruditatem ejus imminuunt, vel ipsa ligatura, aut dolore aliquo excitato, effectum hunc producunt. 9. Inter febrifuga, maxime specificum ac decantatum esse, cort. chin. chin. de quo in sequentibus.

III.

Cortex china chinæ, est cortex arboris cuiusdam, quam aliqui gentianam Indicam vocant, in America peruviana crescens, dictus etiam idèò *Peruvianus*, & a virtute, *febrifugus*. Olim etiam Pulvis adm. R. R. P. P. Soc. Jes. appellabatur, cum hi ex Peru redeentes, eum secum attulerint, ac Anno salutis 1649. non tantum per Hispaniam, verum etiam Italiam, Romam usque, eorum ope, ac conatibus imprimis Reverendissimi *Joan. Cardinal. de Lugo* Soc. Jes. usus ejus pervenerit. Usitatus quam maxime in Febribus intermittentibus tollendis, ac imprimis tertiana & quartana, tam simplici quam duplici. Vim

suam exerceat, juxta nonnullos, facultate stiptico amara eruditates minuendo, aciditatem infringendo, fermentationes & effervescentias sistendo, ac sanguinem compagem firmorem, roburque conciliando: juxtra alios fermentum febrile deleterium, in spiritibus extens, qui dein M. S. agitant & fermentant, vi quasi Alexipharmacum, antidotorum more infringendo configendo. Ut autem hoc præstet, oportet suum esse genuinum & sincerum, non sucatum, supposititum, spurium, effetum & putidum. Ille, colore cinamomi, sapore aromatico amaro, odore mucidum quid licet suave & aromaticum spirante, qui etiam dentibus attritus, vel alio modo fractus, friabilis existit: hic, colore nigricans, injucunde amarus, vel intense acerbus, nihil mucidum spirans, viscidus etiam, glutinosus, crassus, liqueus, & putidus.

I V.

Circa illius usum & exhibitionem Nota: 1. Eum efficacius operari, exhibutum in substantia, modo in pollinem seu alcohol arte prius redactus fuerit, ut melius deglutiri ac per habitum corporis trajici valeat. 2. Eum prima vice in majori dosi exhibendum, ac ordinarie ad dr. ij. infus. in vin. malvat. absque colatura duobus circiter horis ante paroxysmum, cum sic plus operetur talis dosis, quam decem aliæ. 3. Eum non facile exhibendum, ubi magna adhuc cruditatum congeries, & corpus debite haud evacuat, nisi ob labentes, fractasque vires, & febris acerbitudinem, ægri in summum vitæ discriminem concitantur, ut ad Corticem hunc, seu sacram anchoram, per curam saltem palliativam confugiendum sit; præmittenda igitur universalia & præcipue vomitoria. 4. Fugatis a Cortice paroxysmis, febrem post dies 8. 14. vel aliquot septimanas recrudescere ut pluri-

num, nisi ejus usus continuetur; hinc suadendum
adultis in usu & praxi, ut Corticem adhuc, ablata
jam febre, per dies 8. vel 14. ad unc. unam vel alte-
ram continent, exhibendo tertia vel quarta aut
Sexta, hora, dr. i. prædicti Corticis, jubendo etiam,
ut æger ab injuriis aeris & diætæ erroribus abstineat.
Cum pharmacum hoc natura sua non admodum
gratum sit, & sæpius exhibendum, Medicum instru-
ctum esse debere, variis formulis hujus febrifugi,
haustus nempe, boli, electuarii, pilul. tintæ. &c. ut
æger naufragiatus, vel præjudiciis in Corticem præ-
occupatus, honeste decipi possit. 6. Operari hoc
Medicamentum sæpius per sudorem, interdum per
vomitum, raro per sedem, subinde etiam sine omni-
bus hisce febrem profligare.

Præterea observandum, 7. In Febris diutius &
perspicue intermittentibus, ejus usum esse tutissimum,
ac præcipue in tertianis & quartanis autum-
nalibus, nec non vernalibus minus exquisitis: econtra
tutum in Febris magis æstuosis, & calidioribus
obscurius intermittentibus, præsertim si temperies &
anni tempestas calidior; hinc etiam, si nullum exin-
de sentiatur levamen, sed febris potius incandescat,
ab ejus usu desistendum. 8. Post ejus exhibitio-
nem, propinata vel vomitoria, paroxysmos prius
abactos revocare, unde si catharsis a Corticis usu
exigatur, nonnulli eam instituant lenioribus catar-
ticis, cum laudano & Cortice mixtis. 9. Si præ-
sertim ab appetitu minus vigente, recidivam mox
futuram præfigire liceat, saltem ad spatium unius
lunæ intervallo, nempe 8. vel 10. dierum, unciam
unam Corticis repetendam esse, ita ut dr. i. in for-
ma quayis gratissima, ter in die assumat æger, su-
perhibendo vinum Malvaticum, vel aliud album ge-
nero-

nerosum. 10. Cortici china chinæ ab aliis admixtis medicamentis febrifugis vix ullam accedere virtutem multam econtra saepe detrahi. Interim si simul Febris jungatur cholera, vomitus, vel diarrhoea præsertim torminosa, colica &c. aliquid laudani opiatii eidem admisceri potest. 11. Regimen calidum, decubitum in lectulo, vinorum & cardiacorum generosiorum usum, Corticis operationem eludere aut remorari; sic ulcus quoque internum, pulmonum nempe, renum &c. non solum ejus affectum protelare, sed nonnunquam exacerbare, & paroxysmos prius abactos, paucis diebus revocare. 12. Paroxysmum ab ejus usu vehementiorem observari, qui tamen febris discessum plerumque præfigit, quod etiam significant paroxysmus ab ejus usu diminutus, aut in melius conversus; item sudores liberiiores, aut urina copiosa & limpida, quæ plerumque, teste *Sydenham*, ejus usum sequitur. 13. Corticem hunc non tantum febrem, sed nonnunquam etiam hydropem inde exortum depellere, ac hecticis puerorum febribus occurrere, cruditates absumendo, & effervescentias reprimendo.

VI.

Ultterius 14. Observandum, Febres intermitentes subinde obscuras ac protheiformes esse, alios quandoque simulantes morbos, quæ tamen etiam Corticis usui cedunt, præsertim si urina intense rubra, sedimentum lateritium præcipitaverit, quæ febrilis fermenti delitescentis haud obscurum indicium. 15. Si in Febribus calidioribus obscure remittentibus, ac continuas redolentibus, urgenti aliqua de causa Corticem usurpare visum fuerit, eum exhibendum esse in vehiculo frigido & acidiusculo, accedente potu ordinario frigido, præmissa V. S. & clyst. ac re quoque ad frigidum magis vergente, nec ægro nimis integumentis onerato. 16. Corticem in liquore infu-

infusum & decantatum, convenire magis ventriculo delicato & sordescente: citius vero & certius operari, in substantia sumptum, licet diutius moretur in ventriculo; interim tinctura saturata multoties repetita, substantiae fere æquivalet, vel infusio simplex loco Potus ordinarii. 17. Ex observatione Adriani Helvet. Chinam Chinæ a dr. ij. ad unc. j. aquæ ferventi benè mixtam, frequentius in enematibus adhibitam, easdem exercere vires, ac per os assumptam, quod pueris, aliisque Corticem, & medicamenta nauseantibus, commodum foret.

VII.

Licit Corticis hujus magna in febribus tollendis sit efficacia, & modo vix non ab omnibus ejus usus receptus; olim tamen plures, & modo paucissimi ex modernis ejus usum improbant: quia, 1. Fæces deleterias & fermenta morbosa in corpore relinquunt, unde novæ tragœdiæ & funesta symptomata repullulant; hinc paucos ab ejus usu per septennium supervivere asserunt. 2. Febres tollit absque sensibili evacuatione, sive non fidendum. 3. Cortex hic est nimis calidus, siccus, æstuosus, febrem augens, ac crassa & terrestri substantia humores magis coagulans ac incrassans. 4. Quia ab ejus usu febres plerumque recidivant, hinc Medicamentum infidum, & febrem potius suspendens, quam tollens censendum. Sed hisce Respondetur, ad 1. Nihil metuendum, si debitum cum cautelis exhibeat, cum insuper quoad omnia reclamat quotidiana experientia, Ad 2. Operari per sudorem, interdum per vomitum: rarius per sedem, neque semper sensibilem evacuationem requiri in tollendis morbis, qui saepius per specifica & antidota expugnantur. Ad 3. Multa alia febri-fuga esse calidiora, quam hunc Corticem terreo-salinum; immo febrem tollere, non augere, neque hu-

humores incrassare, sed acidum infringendo emendare potius humores viscosos, crudos, coagulatos. Ad 4. Febris recidivam (quæ sœpius etiam fit, quod Cortex non sit genuinus) impediri per continuatum ejus usum; & licet etiam febris denuo redeat, tamen inducit interim procurantur, ut natura assiduitate paroxysmorum attrita, se recolligat, & robustior evadat.

A R T I C U L U S IV.

De Officio Medici, in præscribendis Remedii Antifebrilibus.

I.

DEcoctum amarum febrisfugum. R. Fol. matric. card. b. com. absinth. summit. cent. min. fl. chamaom. an. m. j. sem. card. b. cit. an. dr. ii. sal. absinth. dr. i. ss. coq. in f. q. aq. ad lib. j. ss. Col. Dos. unc. iii. vel iv. S. Decoctum febrisfugum, de quo cunctis quatuor horis, extra paroxysmum medium octavæ partis bibendum: si laxare simul animus, add. fol. senn. a dr. i. ad iii. in decocto calido infundenda.

Mixtura antifebrilis Crollii, R. Sal. absinth. dr. ss. spirit. sulph. scr. i. aq. card. b. unc. iii. M. S. Aqua antifebrilis ante paroxysmum sumenda, postea bene coperte sudandum. Teste River, raro ter fine effectu repetitur.

Alia Potio antifebrilis. R. Aq. card. b. unc. j. ss. spirit. sal. armon. a dr. ss. ad dr. i. ocul. canc. præp. scr. i. ol. destill. caryoph. gut. ii. syr. card. b. dr. iii. M. S. ut supra.

Infusum ordinarium Cort. Chin. Chin. expertissimum. R. Cort. Chin. Chin. subtiliss. pulv. dr. ii. infund. (2. horis ante paroxysmum) in vin. malva. S. g. per

da. per 2. hor. detur absque colat. S. Potio China Chinæ, duabus horis ante paroxysmum sumenda, & postea sudandum. Rarissime fallit, præsertim si Cortex genuinus.

Vinum antifebrile. R. Cort. Chin. Chin. subtiliss. pulv. unc. i. sal. tart. scr. i. herb. absinth. card. b. an. i. vin. Rhen. seu alterius albi opt. lib. i. ss. infund. per noct. in loco calido per hora ix. Col. per chart. S. Vinum antifebrile, de quo, die libero mane, & ante cibum quatuor unciae sumendæ, sicuti etiam duabus horis ante paroxysmum.

Aliud. R. Cort. Peruv. subtiliss. trit. unc. i. irror. spirit. vin. rectif. s. q. addito etiam ol. sulph. campanat. digerantur in vase clauso per horas aliquot, hinc add. vinc. matur. mens. j. digeratur rursus per dies aliquot, & Col.

Aliud. R. Cort. Chin. Chin. dr. vij. cort. guajac. dr. ii. summi. cent. min. m. j. cinam. dr. ii. caryoph. scr. i. ocul. canc. præp. dr. i. sal. tart. dr. iii. M.F. Pulv. infund. in vin. absinth. vel Rhen. mens. i. ss. subinde agitando. Usus tempore omnibus bene commixtis, capiatur bonus haustus in quartana, quarta quavis hora, intertiana, tertia.

Tinctura antifebrilis. R. Cort. Peruv. crasse pulv. unc. iii. coq. leniter in ag. font. lib. i. ad dimid. Col. reliquis decocti rursus affund. eandem aquæ quantitatem, coq. & col. iterum ut supra, idque tertia vice repeat, donec tota corticis vis extracta, hinc omnes collutas misce, adde si lubet. syr. fl. tunic. unc. iv. De hac tinctura æger unc. iv. v. vel vi. quarta quoque hora extra paroxysmum, vel saepius ad libitum asfumat.

Bolus febrifugus. R. Cort. Peruv. subtiliss. trit. dr. i. syr. de rub. idæ. vel fl. tunc. q. f. M. f. Bol. mol- lis, repetendus quarta vel sexta quaque hora ad 8. 10. vel 12. vices extra paroxysmum, sanguibendo vin. alb. vel julep. cordial.

Electuar. Febrifugum . R. Cort. Peruv. in subtiliss. pulv. redact. unc. i. vel i. ss. syr. derub. id. vel alterius gratioris q. s. Bals. Peruv. scr. i. M. f. Elect. de quo sumat. eger. quantitatem iuglandis vel nucis mosch. quarta vel sexta quaque hora.

Aliud . R. Cort. Peruv. subtiliss. trit. unc. i. sat. cart. dr. ii. pulv. viperin. antim. diaph. an. scr. v. rob. juniper. q. s. M. f. Elect. cuius usus ut supra.

Pilulae febrifugæ . R. Pulv. Cort. Chin. subtiliss. trit. unc. i. vel. i. ss. succ. absinth. vel mucilag. gumm. tragac. in aq. plantag. extract. q. s. M. f. Pilul. mediocres deaurandæ , quarum viii. x. vel xii. quarta vel sexta quaque hora intermissionis deglutiat , superbibendo vin alb. vel malvat parum.

Pulvis antifebrilis specificus . R. Antim. diaph. C. C. phil. præp. ocul. canc. præp. corall. rub. præp. pulv. antifeb. Croll. pulv. stomach. Poter. an. scr. i. sal. absinth. cent. min. card. b. an. scr. ss. M. f. Pulv. Detur ad scatul. S.

Alius . R. C. C. phil. præp. corall. rub. præp. ocul. sanc. præp. ebor. s. igne præp. magist. sacch. satur. an. dr. i. ss. M. F. Pulv. S. ut supra.

Alius . R. Fl. chamæm. subtiliss. pulv. scr. i. antim. diaph. sal. absinth. an scr. ss. M. f. Pulv. sumendus ex aq. destill. cent. min.

Alius Pulvis antipyreticus . R. Cinnab. naz. vel antim. sal. vol. C. C. an. dr. ii. Chin. Chin. unc. i. M. f. Pulv. in vase clauso asservandus , cuius dos. dr. i. ante paroxysmum.

Alius ex alumine . R. Alum. crud. scr. i. vel dr. ss. nuc. mosch. scr. ss. M. Vel R. Alum. crud. nuc. mosch. an. dr. i. olibam. piper. an. gr. vi. ol. caryoph. gut. i. M. f. Pulv. dos. dr. i.

Pulvis antifebrilis , ubi æstus prævalet . R. Sal. armon. scr. i. vel dr. ss. antiheat. Poter. vel arcan. dupl. Mins. scr. ss. M. f. Pulv.

Alius simul opiatu s . R. Corall. rub. præp. sal. absinth.

iss. fintb. an. gr. xv. ol. dest. caryoph. gut. ii. laud. op. gr.
dimid. vel. i. M.

Unguentum antifebrile. Rx. Ung. popul. dr. vi. tel.
aran. dr. i. ss. op. thebaic. cum acet. fl. sambuc. dissol.
gr. iv. ol. ranar. parum M. Imponatur pulsibus ante
paroxysm.

Emplast. simile. Rx. Fulig. sum. splendid. unc. i.
ii. tereb. dr. vi. tel. aran. unc. i. campb. for. ii. ol. aran.
q. s. M. f. Empl. Carpis manuum applicandum.

Cataplasma. Rx. Ungul. allii N. iii. contund. pistill.
dein. add. sal. commun. dr. ss. croc. pulv. scr. i. acet.
parum M. f. Carapl. alligandum parvo digito sinistræ
manus, ac per 9. dies ibidem relinquendum. Alii
id parant ex fulig. allio, & cepis cum album. ev.
& paucō acet. atque carpis applicant.

ARTICULUS V.

*De Officio Medici, in præscribendis Re-
mediis Antihelminticis, eorumque
formulis.*

I.

Medicamenta antihelmintica sunt, quæ lumbricos
enecant, quod præstant vel focum & mine-
ram vermium destruendo, ac putredini resistendo,
qualia sunt, tum amaricantia & Balsamica, tum aci-
da, tum nitrosa, partim ob amaritatem, partim ob
acidum in iis emicans, partim quod putredini resi-
stant; tum acria, & sale volatili, vel sibi relicto vel
oleoso imprægnata, tum terreo-alcalina & lixiva sa-
lina, vel eos suffocando, & transpirationem, in qua
vita vermium & infectorum consistit, impedien-
do, per oleosa & pinguia omnia, poros obstruentia,
vel

vel eos specifica virtute interimendo , aut si malis per manifestas qualitates explicare , substantiam eorum mucosam & glutinosam liquando , resolvendo , annihilando , & corruptendo ; qualia in primis sunt *mercurialia* , vermis & cuivis seminio animato summe inimica , vel tandem eos exturbando per purgantia , amara , acria & resinosa , qualia sunt *aloes* , *coccygyn* , *rhab* , *agar* . *spec* . *diaturb* . *cum rhab* .

Circa horum exhibitiones & usum , Not . i. An thelmintica præcipue propinanda esse luna de crescente . 2. Eadem optima esse , quæcunque simul expellunt & necant vermes , nam & nidi , & inhibitulantes vermes exturbandi sunt . 3. Dulcia , ut saccharata & mellita per se vermes non generare , tum quia putredini resistunt , aliaque a corruptione præservant , tum quia facile bilescent , eos tamen agitare & commovere , cum vermium illecebrae existant : maritanda igitur anthelminticis , ut his ipsis inescati , pro melle fel , ac pro lacte venenum hauriant ; hinc optime exhiberi soleat cum lacte , vel mulsa , aut panatella saccharata , vel in forma rotul . 4. Eadem propinanda esse jejuno ventriculo , neque statim de super aliud comedendum . 5. Eadem aliquando mutanda & varianda esse , ne vermes hisce assuefcant . 6. Eadem quoque ad tempus continuanda , cum lumbrici saepius , præsertim lati contumaces sint , & a mitioribus sensim ad fortiora progrediendum .

III.

Præterea 7. Not. plures, præsertim agyrtas pro potentissimo remedio exhibere ipsos lumbricos, vel etiam terrestres torrefactos & pulverisatos, cum plures exinde lumbrici dejiciantur, cui tamen non fidendum, dum semina vermium hoc modo propagari, & lumbricus produci potius, quam enecari, experientia plurimorum Authorum certum sit. 8. Mercurium dulcem maxime utilem esse, addito præsertim stimulo scamm. sulph. vel resin. gial. in infantibus autem minus tutum esse, nisi robustioribus, cum omnia in hac ætate fluxilia & laxa sint, atque intimis ossa & nervi, quibus Mercurius inimicus. 9. Clysteres ex anthelminticis paratos non convenire, cum lumbrici eos adversantes superiora petant, ac gravissima excitent symptomata, nisi magna adsit præsumptio, eos morari in intestinis crassis, cum sic vix amplius in intestinia tenua ascendere possint; hinc præferendi clyst. ex lacte, melle & sacch. parati, ut eos inferiora versus allicant. 10. Anthelmintica & purgantia etiam exterius umbilico applicari, quia est centrum abdominis, ac pars magis perspirabilis, & quidem præcipue in subsidium remediorum internorum, ac pro solamine symptomatum, ut v. g. ad dolores; tormina &c. 11. Vermes ascarides magis curari Balneis, suppositoriis, clysteribus & unguentis, 12. Anthelmintica etiam se extendere ad quævis animalia p. n. corpus afflgentia, ut pediculos, lentes, hausta bafonum vel serpentum semina, ulcera verminosa &c.

Formulæ

Remediorum Anthelminticorum.

DEcocum amarum Vermifugum . R. Summit.
cent. min. fl. chamom. agrim. an. m. ss. sem. card.
b. cit. an. dr. i. ss. fl. calend. p. ii. rad. gent. dr. ii.
jenn. dr. vi. Rhab. dr. i. aq. font. lib. i. cog. ad di-
mid. f. Col. pro 3. vel 4. dos.

Vinum Anthelminticum . R. Rad. filic. dr. vi. di-
ctamn. cret. unc. ss. angel. Zedoar. an. dr. ii. cort. cit.
frax. an. dr. iii. sem. santon. dr. v. citr. portul. an. dr. ii.
incis. & conquass. affunde vin. absinth. lib. ii. stent in
infus. per hor. 24. Col. dentur m. & v. aliquot uncie.

Aqua Vermifuga Helmontiana . R. Mercur. crud.
rite purgat. unc. i. aq. gram. portulac. an. unc. iv. ma-
ceretur per 2. horas , sape ac fortiter agitando , hinc
aquam decanta & colla , relicto in vase Mercurio . S.
Aqua vermifuga de qua in die ter tria cochlearia ple-
na sumenda .

Electuar. Vermifugum . R. Fol. elleborast. pulv. unc.
i. mell. despum. unc. iii. M. f. Elect. cuius dos. à scr.
iv. ad dr. ii.

Rotulæ Anthelminticæ . R. Sem. santon. dr. ii. curb.
el. dr. i. Rhab. opt. dr. i. ss. resin. gial. f. a. sol. scr. ss.
corallin. dr. ss. ol. cit. gut. iii. sacch. albiss. in aq. fl.
persic. sol. q. f. M. f. Rotul. S. Rotulæ vermifugæ .

Aliæ . R. Corallin. sem. santon. plantag. C. C. phl.
præp. an. scr. i. rhab. agar. troch. an. scr. ii. rad. di-
ctamn. scr. i. sacch. in aq. gram. dissol. unc. iii. M.

Aliæ non purgantes . R. Pulv. C. C. crud. ebor.
an. dr. vi. corallin. dr. ii. sacch. alb. unc. iv. muci-
lag. tragac. q. f. F. Rot. pond. dr. ss. dentur N. iii.
bis in die .

Aliæ . R. rad. gent. dr. ss. agar. albiss. zedoar.
tanacet. an. scr. i. C. C. ust. mercur. dulc. an. dr. ss. sacch.
in

in aq. gram. dissol. q. s. M. f. Rotul. que ab infantibus & pueris facile assumuntur.

Pulvis Anthelminticus. R. Sem. santon. unc. ss. fol. card. b. fl. tanacet. rad. filic. an. dr. i. vitriol. calcin. scr. ii. M. in mortar. marmor. f. Pulv. Dentur scr. ii. de crescente luna ex hydromelite.

Alius. R. C. C. ust. rhabarb. corallin. sem. santon. an. p. & q. M. f. Pulv. S. Pulvis Antelminticus, de qua 20. grani, aut dimidium drachemæ sumendi.

Alius. R. Myrrh. zedoar. cort. cit. an. dr. ss. cinnab. nim. scr. i. camph. ser. ss. ol. destill. succin. rut. an. br. ss. M. f. Pulv. dos. scr. i. ex aq. zedoar.

Alius. R. C. C. ust. corallin. an. dr. i. rad. gent. Cr. ii. myrrh. scr. ss. ol. eiusdem gut. iii. tanacet. gutt. sacch. alb. unc. i. M. f. Pulv. dos. scr. i.

Unguentum ad Vermes. R. Ung. de arthanit. seu contra verm. unc. ss. elix. prop. P. dr. i. M. Vel R. cog. contra verm. August. unc. i. fellis taur. inspiss. dr. i. ol. dest. absinth. tanacet. an. gut. vi. M.

Cataplasma. R. Farin. lupin. unc. ii. myrrh. aloe an. dr. ii. fell. bov. q. s. ol. absinth. unc. ii. M. f. Catapl. admovendum ventri.

Aliud. R. Colocynth. dr. vi. terebrum cum felle bov. ac vin. mixt. impone umbilico. Vel. R. Fol. perficar. vel absinth. contus. q. s. adde fell. bov. liquid. q. s. pro Catapl.

Emplast. Vermisugum. R. Pulv. aloe unc. ss. colocynth. myrrh. an. dr. i. ss. fol. sabin. rut. absinth. tanacet. rad. bryon. an. dr. i. cer. resin. an. unc. ii. ol. rut. unc. i. M. f. mass. Empl. pro umbilico.

ARTICULUS VI.

*De Officio Medici, in præscribendis Remediis
Carminativis, eorumque formulis.*

I.

Medicamenta *carminativa* dicuntur, quæ fatus tollunt ac discutiunt, utilia in affectibus quibuscumque a flatuum copia oriundis; ut v. g. inflatione stomachi, lienis, epatis, tympanitide, colica flatulenta, vertigine, cardialgia &c. Exercent autem vim suam diversimode, nonnulla resolvendo & discutiendo humorem stagnantem, & vitiose rarefactum, hinc plurima sunt diaphoretica, quæ & carminativa existunt, & quidem tanto excellentiora, quod & resolvant, & per sudorem vel diaphoresin dispellant. Hæc quoque calorem debilitatum restituunt, & halituosa sua virtute undique penetrant, ac vaporositate sua subtili & volatili exhalationem vaporum crassiorum adjuvant. Alia id præstant per fermentationem, ex qua fatus suscitantur, compescendo, acidumque fermentativum absorbendo, invertendo, & præcipitando, sicque phlogoses impediendo, bilem quoque, si una simul rarefacta concurrat, domando & infringendo. Alia id efficiunt, vel coctionem & calorem ac menstruum ventriculi corruptum roborando, hinc stomachica pleraque carminativa; vel viam flatibus laxando, aut partium, quibus continentur, poros aperiendo; ut transpirare possint, vel denique visciditate sua illos captivando, ligandoque ad se invicem, vel etiam dolores leniendo.

II.

Circa usum & debitam horum administrationem , Medicus notabit : 1. Carminativa displosiva , seu calidiora resolventia , præsente calore præternaturali minus commoda esse , sic v. g. in hypochondriacis , in quibus saepe viscerum phlogoses concurrunt ut plurimum temperatoria magis convenient . Sic Mercato monente , si calidiora carminativa in tympanitide non profint , ad frigidiora transeundum esse , Sicuti igitur calidiora non convenient , in flatibus conjunctis cum æstu & ardore , ita non temperatoria , humoribus crassis , viscidis & pituitosis existentibus . Non convenire carminativa , si adsit copia materiae , si fæces duriores obstruktione causentur , hoc enim in passu , nisi prius evacuatio fiat materiae , & sufficiens depletio , frustra non solum sunt omnia , sed etiam in statum longe pejorem ægrum præcipitant . 2. Carminativis viam sternere non tantum purgantia , sed & imprimis bonam diætam , vitando cruditatem , legumina , olera , humido excremento abundantia , dulcia , pinguia , crassa , lenta , fæculenta , fructus horarios &c.

III.

Præterea 4. Not. in discutiendis flatibus , magis causam , quem effectum respiciendum esse . 5. Pauiores flatus displodendos : copiosiores educendos esse . 6. In flatibus semper respiciendum esse ad ventriculum . 7. Flatus dolorificos maxime obtemperare carminativis , opiatis seu anodynis & evacuantibus . 8. Clysteres carminativos maxime quoque usuales esse mixtis emollientibus , quibus & fæces emolliuntur , & flatus simul discutiuntur . 9. Sicuti carminativa in-

terius præstant in forma humida & liquida, ita ex-
terius in forma sicca, ut saccorum &c.

Formulæ

Remediorum Carminativorum.

Mixtura Carminativa. *R. Aq. ment. unc. iii. unc.
mosch. dr. vi. spirit. vin. vel elix. vit. Matthiol.
sp. sal. an. scr. i. M. S.*

Alia. *R. Aq. ment. chamom. an. unc. iv. physagon.
unc. i. spirit. anis. unc. ss. vel hujus loco elix. vit.
Matth. dr. ii. spirit. sal. dr. i. ss. saccb. cand. rub.
unc. i. M. S. ut supra.*

Alia. *R. Aq. ment. cort. arant. an. unc. i. ss. spi-
rit. nit. dulc. gut. xv. syr. de cort. arant. dr. ii. M.
Vel R. Aq. zedoar. unc. ii. physagon. unc. iii. spir-
mac. dr. i. M.*

Aqua carminativa & simul anodyna. *R. Aq. dest.
cinam. physagon. carminat. an. unc. i. ss. tint. cort.
arant. dr. i. ss. laud. op. Helm. gr. iv. ol. dest. mac.
gut. ii. M. dentur. 2. Cochli. urgente dolore.*

Alia. *R. Aq. ment. chamom. zedoar. an. unc. i.
effent. castor. dr. iii. spirit. sal. armon. dr. i. ss. effent.
op. scr. i. syr. de cort. arant. dr. iii. M.*

Balsam. carminat. ex Brodio. *R. Ol. dest. anis. scr.
ii. fenic. scr. i. cort. arant. gut. xii. chamom. gut.
cit. gut. iii. M. ad vitr. parvum. Dos. gut. v. vel vi.
ex Brod. carn. Vel R. Ol. dest. mac. dr. i. succin. scr.
i. M. Vel R. Ol. dest. cort. arant. anis. carv. an. scr.
ss. M. dos. 6. guttae.*

Electuar. Carminativum. *R. Conserv. rad. cich.
unc. iii. ros. rub. unc. ii. condit. cort. arant. unc. i.
citr. unc. ss. spec. aromat. ros. dr. ii. diarrhod. Abb.
dr. i. conf. alk. dr. i. ss. sp. cit. vel mac. dr. i. syr.
de cort. arant. q. s. M. f. Elect.*

ex. Bolus Carminativus. R. Theriac. vel mitrid. scr. i.
pulv. cort. arant. dr. s. castor. pulv. gr. vii. ol. cort.
arant. gutt. ii. M.

Tabellæ Carminativæ. R. Cardam. crassè pulv. unc.
ss. flaved. cort. arant. minutim incis. dr. x. sacch. opt.
in aq. ros. & cinam. dissol. unc. viii. M. f. Tabell.

Aliæ. R. Pulv. cort. arant. recent. spec. aromat. ros.
an. dr. ii. sacch. alb. in aq. fl. arant. sol. unc. iv. M. f.
Tabell.

Pulvis carminativus. R. Cort. flav. arant. scr. iv.
mac. scr. ss. ol. deft. cit. gut. vi. M. F. Pulv. divid.
ad 2. p. æq.

Alius simul præcipitans. R. Cons. flav. arant. unc.
i. ss. maxill. lucii pisc. ocul. canc. an. dr. i. s. tal. lepor.
succin. zedoar. an. dr. ii. M. F. Pulv. cuius dos. à dr.
ss. ad. dr. i.

Alius simul laxativus. R. Pulv. cort. arant. dr. ii.
tard. b. scr. iv. fol. senn. s. dr. iii. fæcul. aron. scr. ii.
ol. fænic. gut. xv. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium
M. F. Pulv. S. Pulvis carminativus, de quo 2. aut
3. cuspides cultri plenæ ante pastum sumendæ.

Alius. R. Pulv. cort. arant. Rhab. el. cryst. tart. an.
dr. ii. ol. mac. gutt. x. sacch. ros. tab. ad pond. omn.
M. F. Pulv.

Elæosaccharum carminativum. R. Sacch. alb. unc.
ii. ol. nuc. mosch. express. dr. i. ol. deft. chamom. scr.
i. fænic. anis. an. scr. ss. cort. arant. gut. iii. M. dos.
dr. ii. cum aq. carminat.

Tragæa carminativa. R. Spec. aromat. ros. dr. ii.
cass. lig. acutiss. dr. i. ss. cardam. min. scr. ii. sacch.
ros. tabul. unc. iv. ol. deft. carv. fænic. an. gut. ix. ci-
nam. gut. vi. caryoph. gut. iii. M. F. Trag. S. Tragæa
singularis carminativa.

Alia. R. Coriand. præp. dr. ij. sem. anis. fænic.
an. dr. i. cinam. acut. dr. ii. cort. cit. dr. i. cardam.
min. dr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. sacch. fin. q. s. M.
F. Tragæa.

Sacculus Carminativus extra applicandus. R. Aven. in sartag. calcfact. & tost. ac vino irrorat. q. pl. vel cumin. milii, furfur. &c. Inde saccul. calide applicando.

Alius. R. Fl. sambuc. chamom. aneth. an. m. i. mel. m. i. ss. sal. m. i. sem. aneth. carv. cumin. an. dr. ii. bacc. laur. dr. ii. includ. saccul. vin. coq. & applic. aut calefacta ind. saccul. calide applic.

Fomentum Carminativum. R. Fili crudi coq. in li- xiv. vel aq. vel lact. addenso simul cumin. unc. ss. ex- pressum applicetur calide.

Placenta Carminativa, utilis in dolore Colico. R. Vitell. ov. N. vi. agitatis fortiter add. pulv. anis. foenic. cumin. an. dr. i. vel fol. maioran. vel ment. absinth. incis. ol. laur. vel chamom. q. s. M. F. Pla- centa.

Unguent. Carminat. R. Ung. popul. unc. ss. ol. laur. dr. iii. ol. carv. scr. iv. M. Vel R. Ung. carmi- nat. Mins. unc. ii. ol. dest. caryoph. gut. ii. lig. Rhod. gut. iii. M. S. Unguentum carminativum ad ungen- dum.

Emplast. Carminat. R. Empl. de bacc. laur. gemm. tacamah. an. p. &q. malax. cum ol. chamom. & aneth. ac extend. super alut. obducta sindone.

Clyster carminativus. R. Herb. calam. rut. puleg. an. m. i. fl. chamom. sambuc summit. aneth. an. M. ss. sem. anis. carv. cumin. aneth. sesel. an. dr. ii. bacc. laur. unc. ss. incis. & conquass. coq. ex s. q. aq. in Col. unc. x. dissolv. vin. malv. unc. iii. elect. de bacc. laur. unc. ss. bened. lax. unc. i. ol. rut. aneth. an. unc. i. M.

Alius hypochondriacis plurimum utilis. R. Caput i. castrat. seu vervec. sem. cumin. unc. ss. coq. in aq. lib. iii. ad 3. p. consumpt. add. fl. chamom. melilot. aneth. an. p. i. coq. rursus per medianam horam in Col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ii. elect. hier. s. dr. iii. ol. cha- mom. cheir. an. unc. i. s. sal. dr. i. M. F. Clyst.

Alius R. Decoct. carmin. lib. i. dissolv. elect. diaphen. unc.

unc. i. ol. cham. laur. an. dr. vi. carv. dr. i. ss. melt.
anthos. unc. ii. sal. comm. p. i. M.

Alius simul anodynus. R. Lact. Vaccin. lib. i. ss.
sem. carv. m. ss. fl. cham. m. i. coq. usq. ad lib. i. col.
add. melt. crud. vel anthos. unc. i. ss. ol. chamom. aneth.
lin. an. unc. i. sal. dr. ss. M.

ARTICULUS VII.

*De Officio Medici, in ordinandis & præ-
scribendis Remediis Lithontricticis,
eorumque formulis.*

I.

Medicamenta Lithontriptica ea dicuntur, quæ sa-
linis suis particulis, amurcam & coagulum re-
solvunt, ac fabulum exturbant, vel incidentibus, ri-
gidisque suis particulis, in calculum continuo impel-
lendo, eum paulatim atterunt & abradunt, vel ap-
propriatam proportionem cum poris calculi habentia,
texturam ejus penetrant, quæ propriè dicuntur calculum
frangentia seu lithontriptica, necessaria in cal-
culis renum & vesicæ, qui ob magnitudinem aut via-
rum angustiam excludi nequeunt.

I I.

Circa usum & naturam horum remediorum, Medicis officium erit, Not. 1. ea locum magis habere, dum calculus saltem mollior, fabulosus, & topheæ magis naturæ, quam siliceæ. 2. Dari talia medicamenta, probari ab ipsa experientia subinde facta, licet rara ac paucissima sint, neque omnia in omnibus praestent, cum nimis multæ reperiantur conditiones ad medicamentum calculum dissolvens constitutendum, nempe, ut locum affectum tangat, ut habeat vim solvendi repagula calculi, sitque nec acidum, nec alcalinum, sed compositum ex utroque, prout est calculus, ut longo transitu ad vesicam vi sua lithontriptica non infringatur, ut sit amicum naturæ, nec corrosivum, ut sit subtile ac quaquaversum distribui possit. 3. Talia remedia non tantum per os propinari, sed etiam in calculo vesicæ injici per syringam Catheteri applicatam. 4. Exhibenda hæc esse quotidie mane, injectio prius clystere emolliente & refrigerante. 5. Usu horum sequi subinde febrem, calorem, sitem, dolores circa pubem; hinc succurrendum diæta convenienti, abstinentia a vino, julep, frigid, &c. 6. Boni effectus signum esse, si ab eorum usu primis diebus urina prodeat crassa & exigua, hinc copiosior, cum remissione caloris, doloris, ac excretione fragmentorum calculi. 7. Interdum unum vel alterum diem quieti concedendum, ac ab usu eorum cessandum.

III.

Præterea sciendum, 8. In defectu remediorum lithontripticorum, tentanda esse diuretica selectiora, quæ etiam prophylactice usurpanda, non tamen adeo frequenter, cum saepius malum augeant, vel cruditates ad renes devehendo, vel renes magis intemperatos reddendo, vel pituitam calculum obvolventem abstergendo, eumque sic exasperando, vel cum majorem in ureteres cum periculo deturbando. 9. Remedia terebinthinata pro calculi præservatione ceteris præstantiora esse, cum alvum simul laxent & humores crassos evacuent. 10. Remediorum hominum vim & efficaciam adjuvare clysteres, balnea, unguenta, sacculos &c. 11. Si lithontripticis nihil efficiatur, atque æger in calculo vesicæ lithotomiæ se subjecere nolit, curam palliativam institui debere: per sola epiceraistica & anodyna, ut v. g. Clyst. ex lacte bub. cum dr. i. phil. Rom. ol. amygda. d. per os exhibitum, cum paucō succ. lim. ex brod. decoct. malv. item aq. ser. lact. destillatam cum syr. de alth. Fernel. vel Emuls. cum prædicta. ag. vel decoct. Forrest. addit. troch. alkek. iniect. in vesicam ex lact. vel decoct. malv. vel Emuls. sem. papav. cum aq. solan. semicup. vel foment. cum magna spong. imbut. decoct. emoll. sequente inunctione cum ung. alth. ros. popul. cum ol. viol. nymph. hyosc.

Formulæ
Remediorum Lithontripticorum.

DEcōt. lithontript. R. Rad. fœnic. petrosel. eryng.
pimpinell. ononid. rub. tinct. enul. an. dr. iii.
herb. heder. terreſt. veron. saxifrag. absinth. matrīſylv.
an. m. ss. fl. geniſt. p. ii. gr. iuniper. unc. i. cic. rub.
unc. i. ss. fruct. alkekeng. N. vii. ſem. anis. urtic.
fœnic. dauc. petrosel. 4. frig. mai. an. dr. i. incis. &
conquass. ex ſ. q. aq. font. in Col. lib. iv. diſſolv. mell.
puriss. unc. ii. ebull. ſemel atque iterum & cum album
ov. claris. S. Decoctum lithontripticum, de quo
quatuor unciae in Die ter ſumendæ.

Julepus anti Nephriticus. R. Decoct. prædict. vel
ad calculum Forest. lib. i. ſyr. de altb. Fernel. acetos.
cit. an. unc. i. spirit. ſal. dr. ss. M. S. Julepus anti-
Nephriticus pro duabus aut tribus vicibus.

Alius utilis in paroxysmo Calculoſo. R. Aq. frag.
ſaxifrag. an. unc. ii. vin. alb. generos. unc. vi. ol.
amygd. d. unc. ii. spirit. vitriol. dr. i. M. pro 3. doſ.
prima detur calide, quantum ferre potest æger; poſt
horas 6. ſecunda, etſi hæc etiam inefficax, quod reſte
Riverio raro contingit, detur tertia.

Elixir anti Nephriticum. R. Sal. tart. albiss. unc.
i. ſolv. in aq. petrosel. lib. i. diger. cum cort. cit. arant.
an. unc. i. per 3. dies filtretur per chart. add. ol. de-
ſtill. cer. arant. mac. an. gut. viii. M. diger. iterum
per aliquot dies S. Elixir antinephriticum, de quo
mane & vespere, dimidium cochlear plenum in vino
Mosellæ ſumenda.

Nodus vino vel cereviſiæ infundendus. R. Bacc.
iuniper. contus. unc. i. fruct. cynosbat ſicc. & crasse
pulv. unc. ii. fol. heder. terreſt. veron. pariet. an. m. i.
absinth. m. ss. rad. eryng. ononid. an. dr. vi. lig. ne-
phrit. unc. ss. uv. paſſ. enucleat. unc. iii. M. incif. &
contus. ad Nodul. infund. in vin. vel cereviſ. lib. viii.
Inſu-

Infusum Diureticum. R. Raph. acerrimi deraſ. unc.
vin. alb. unc. iv. maceretur per aliquot horas hinc
fortiter exprim. & Col. valet etiam rad. armorac. vino
infusa aliquoties hausta.

Aliud Præservativum. R. Heder. tereſt. m. i. capit.
lli N. ii. vel iii. disceptis in frustula affund. sp.
in. lib. i. ſtent per dies aliquot bene clausa, hinc de
gitato liquore detur cochl. i. singulis noviluniis.

Emulſio anti Nephritica. R. Sem. 4. frigid. mai.
m. dr. ii. violar. dr. i. s. nucl. persi. dr. vi. decoct.
vord. cum. sem. dauc. fact. unc. vi. aq. petroſel. liq.
petulæ deſtil. an. unc. i. f. Emulſ. add. lapid. canc.
prep. dr. i. ſacch. cand. q. f. ad gratiam.

Brodium Lithontripticum. R. Cic. rub. cochl. i.
rad. petroſel. unc. ss. coq. cum f. q. aq. vel brod. carn.
col. unc. v. add. ſucc. lim. unc. i. ſang. hirc. præp.
ſer. ij. myrrb. el. ſcr. i. Vel R. Jur. cic. rub. unc. x.
ſpirit. iuniper. ſcr. ii. afell. præp. a ſcr. i. ad dr. i. M.

Bolus Nephriticus. R. Tereb. venet. coct. & pulv.
dr. i. ocul. canc. præp. ſcr. i. tart. vitriol. ſcr. ss. ſal.
vol. ſuccin. gr. iv. ſyr. de alth. Fernel. q. f. M. F.
Bol. ſumatur mane, ſuperhibendo liquorem aliquem diu-
reticum.

Electuar lithontripticum. R. Sem. urtic. milii ſol.
bardan. an. dr. ss. lap. Judaic. præp. magift. ocul.
canc. crystall. mont. an. ſcr. i. farin. lycopod. virg. aur.
sem. dauc. pulv. an. ſcr. ii. conf. ering. unc. i. ss. caſſ.
unc. i. cum f. q. ſyr. de limon. f. Elect. S. Electuarium
lithontripticum, de quo magnitudo caſtanæ ſu-
matur.

Aliud Præservativum. R. Pulv. ſem. hyperic. iulio
vel autumno collect. & exſicc. unc. i. ss. conf. roſ. vel
viol. lib. i. M. Dos. unc. ss. qualibet septimana 2. vicibus.

Pilulæ anti Nephriticæ. R. Ocul. canc. præp. dr. i.
farin. ſemin. lycopod. ſcr. i. ſal. ſim. columb. gr. xii.
volat. ſuccin. gr. xv. tereb. cyp. aq. malv. lot. & coct.
q. f. M. f. Pilul.

Pulvis Nephrocatharticus. R. Lap. lync. præp. Judaic. præp. an. dr. i. s. ocul. canc. præp. dr. iii. sal. juniper. dr. i. asell. præp. dr. s. sem. lithosperm. dr. i. s. ol. succin. rectif. gut. iv. sacch. alb. unc. i. s. M. F. Pulv. C. Pulvis nephrocatareticus, de quo una drachma, pro una vice sumatur.

Alius. R. Magist. cryst. mont. sem. mil. sol. lapp. mai. an. scr. s. borrac. renet. glaciei Mariæ, pulv. priap. cerv. an. gr. v. M. F. Pulv. pro i. dos.

Clyster usualis in paroxysmo Nephriticō. R. Rad. alib. dr. iii. malv. melilot. pariet. bord. an. m. i. sem. lin. fœnug. an. dr. iii. fœnic. dr. i. incisa bull. in s. q. aq. ad consumpt. 3. part. in Col. lib. i. dissolv. sacch. rub. unc. ii. tereb. clar. vitell. ov. dissolv. dr. iii. vel unc. ss. ol. viol. chamom. an. unc. i. cum paucō sale M. F. Clyst. vel dissolv. cass. pro clyst. elect. lenit. an. unc. s. vel diacathol. dr. vi. bier. s. bened. laxat. an. dr. ii. M.

Alius. R. Spec. decoct. carmin. fl. verbasc. an. m. i. pariet. m. ii. coq. in s. q. brod. carn. in col. lib. i. dissolv. cass. pro clyst. unc. i. tereb. vitell. ov. dissolv. unc. s. sacch. rub. ol. chamom. an. unc. i. s. M. F. Clyst.

Alius lacteus anodynus. R. Lact. vaccin. rec. mult. lib. i. sacch. rub. unc. ii. ol. chamom. unc. i. scorp. dr. ii. ung. rub. potab. unc. j. vitell. ov. N. i. M.

Alius ex solis oleis. R. Ol. anetb. chamom. an. lib. s. amygd. d. unc. ii. rutac. unc. i. Vel R. Butyr. rec. ol. amygd. d. an. unc. iv. calefiant & loco Clyst. initiantur.

Unguentum. R. Ung. de alib. unc. s. ol. amygd. d. dr. ii. scorp. dr. i. s. petrol. alb. dr. i. M. vel R. Ung. popul. vel infrig. Gal. ros. Mes. de alib. an. dr. vi. ol. scorp. simp. succ. lim. an. unc. s. camph. gr. iv. M. S. Unguentum pro lumbis.

Cataplisma. R. Fol. malv. pariet. an. m. i. petrosel. cum rad. m. i. raph. dr. ii. coq. in aq. vel latt. ad putrilag. & contud. adde cep. sub. cin. coct. M. ii. ol. amygd.

amygd. am. lil. alb. butyr. rec. an. unc. ij. vel vittell.
ov. M. ij. ol. scorp. unc. i. ung. de alth. unc. j. s. M.

Sacculi anodynī . R. Herb. malv. alth. pariet. saxi-
frag. fl. chamom. melil. aneth. an. m. iv. rad. alth.
unc. jv. herb. chærefol. m. ii. sem. lin. fœn. græc. an.
m. i. anis. dr. ii. M. incis. dentur. ad. chart. pro. 2. Sac-
cul. in aqua vel lacte coq. & alternatim applicandis.

Balnea vide supra de usu Therm. & Balneorum.
Atquæ , hæc , ex infinitis hæc de materia conseptis re-
mèdiorum Formulis , pro praxi sufficiunt , uti & illa ,
quæ supra de Diureticis insinuavimus . Sicuti enim il-
la & hic quoque spectant , ita etiam pleraque horum
ad illa reduci possunt .



M

C A.

C A P U T I X.

De Officio Medici in considerandis &
præscribendis Appropriatis
& Confortantibus.

A R T I C U L U S I.

*De Officio Medici, in ordinandis & præ-
scribendis Remediis Cephalicis.*

I.

Medicamenta *Cephalica* dicuntur, quæ cerebro magis amica, ejusque affectibus tollendis magis destinata sunt, hinc etiam pro varietate affectuum, varia sortiuntur nomina, ut *antapopletica*, quæ contra apoplexiā, *antiepileptica*, quæ contra epilepsiam, *antispasmodica*, quæ contra motus convulsivos, *antidynica*, quæ contra vertiginem, *antilethargica*, quæ contra lethargum, *antiephaltica*, quæ contra incubum specifica & appropriata existunt; idem dicendum de *antiparalyticis*, *antimelancholicis*, *anticatarrhalibus* & similibus. Agunt hæc medicamenta, vel respiciendo membranas & nervos, quorum irritationem, tensionem ac vellicationem demulcent, acrimoniam causæ absorbent, eamque discutiunt; vel respiciendo humores & inprimis lympham, quam temperant, corrigunt, excedentem absument, vel deficientem restaurant; vel respiciendo spiritus, quos sopitos & deficientes excitant, re-

stant, æstuantes & effusantes ligant & compescunt; vel respiciendo vapores & poros cerebri, dum illos discutiunt: hos vel nimis occlusus & obstructos aperiunt, præfertim volatilia, & in primis urinosa, vel nimis hiantes & dilatatos claudunt.

I I.

IN usu horum Not. 1. Medicamenta *cephalica* alia esse *volatilia*, & quidem vel sulphure oleoso aromatico suavi pollentia, vel volatilia urinosa aut acida, alia *fixa*, & quidem vel terrea, vel acida, vel nitrosa: alia ex his mixta. 2. Nimis calida, oleosa, spirituosa ac vaporosa, spiritus subinde nimis effera-re, turbare ac caput ferire, præfertim in iis, quibus *sistema cerebri* & *nervorum sensibilius*, spirituumque textura tenerior. 3. Ex his camphorata præcipue iis nocere, quibus debile; & spiritus tenerioris ac laxioris compagis, 4. Cephalica hæc magis con-venire & principaliter, capite per se & essentialiter affecto: minus & non nisi restrictè, & secundario, ubi per consensum. 5. Lymphan in capite nec ni-mis absumentam, nec nimis fundendam vel concen-trandam esse per cephalica. 6. Sicuti vitanda spiritus nimis efferos reddentia, ita eos non nimium ligan-dos esse, per opia incautius, & frequentius data, præfertim in Infantibus. 7. Cephalica etiam nervis amica esse, ac symbolizare quoque cum stomachicis & uterinis.

Formulæ

Remediorum Cephalicorum.

JUlepus ant-Epilepticus . R. Aq. ceras. nig. unc. v.
epilept. Lang. unc. i. syr. fl. paeon. unc. i. conf. alk.
compl. dr. ss. sp. vitriol. q. f. pro grata aciditate
M. S. Julepus anti Epilepticus cochleatim sumendum.

Mixtura ant-Apoplectica . R. Elix. vit. Matthiol.
unc. i. ss. sp. ceras. nig. unc. iii. aq. cinam. unc. ii. ef-
fent. rorism. dr. ii. man. Christ. perlart. unc. ss. M.
Vel R. Elix. vit. Matthiol. unc. vi. sp. ceras. nig. dr.
vi. iulep. ros. unc. i. ss. effent. amb. dr. iii. N. S. Eli-
xir ant-Apoplecticum , de quo cochlear plenum , & ad
præservationem , & in paroxysmo sumendum.

Alia . R. Aq. ceras. nig. meliss. lil. convall. an. unc.
i. ss. apoplect. dr. vi. cinam. dr. ii. elix. vit. Matthiol.
dr. i. ss. conf. alk. dr. i. ss. magist. corall. perlart. an.
scr. i. man. Christ. perl. dr. ii. M. S. Mixtura ant-A-
poplectica , de qua bene conquassata duo cochlearia in-
terdum sumenda .

Aqua Cephalica confortativa . R. Aq. apoplect. per-
lat. officinal. an. unc. ii. cinam. bugl. dr. iii. marg. orient.
præp. corall. rub. præp. an. scr. i. confect. alk. complst.
dr. ss. sp. lil. convall. ceras. nig. an. dr. ii. cephal.
Anhalt. dr. i. sacch. perlart. dr. ii. M. S. Aqua cordia-
lis , & cephalica confortativa .

Vinum anti-Catarrhale . R. Lign. sassafr. iuniper.
lentisc. an. unc. ii. rad. caryophyllat. unc. i. herb. rorif.
rec. hyssop. cent. min. an. m. i. serpill. m. ss. cinam. dr.
ii. cubeb. cardam. an. dr. i. Incisis assund. vin. opt. mens.
iv. stent in infus. De hoc vino bibatur haustus in prin-
cipio pastus .

Emulsio ant-Epileptica . R. Sem. paeon. dr. ii. C.C.
vft. præp. scr. iv. aq. ceras. nig. lil. convall. an. unc. ii.
bor-

borrag. unc. i. ss. M. F. Emulf. add. lap. bez. orient. gr. vi. sacch. cand. alb. unc. ss. M. posset etiam addi pulv. March. antepilep.

Electuar anti Catarrhale . R. Conf. fl. anth. unc. iii. ros. rub. unc. i. nuc. indic. condit. dr. vi. medull. nuc. ind. condit. dr. ii. cubeb. dr. ii. ss. coriand. præp. dr. i. ss. thur. oliban. scr. ii. essent. salv. dr. ii. syr. de ros. sicc. q. ss. M. F. Elect. De quo sub horam decubitus magnitudo nuc. jugl. sumenda .

Electuar confortans Cephalicum . R. Conserv. ros. damasc. fl. anth. salv. primul. ver. an. unc. i. ss. cort. cit. condit. & incis. dr. x. calm. arom. condit. & incis. vel z. z. dr. vi. caryoph. incis. spec. arom. ros. an. dr. iii. syr. de cort. cit. q. f. M. F. Elect. S. Electuarium confortans cephalicum , de quo mane & vesperi magnitudo castaneæ sumatur .

Electuarium anti-Epilepticum . R. Conf. fl. pæon. unc. i. nuc. moscb. condit. unc. ii. cort. cit. condit. unc. ii. spec. aromat. ros. dr. i. ss. syr. fl. pæon. q. ss. M. F. Elect. Vel quod pretiosius . R. Pulv. epilept. unc. ii. medull. nuc. ind. condit. dr. vi. conf. alk. de hyac. an. dr. ii. tinct. lun. dr. ii. sp. til. lil. convall. ros. an. scr. i. essent. amb. dr. ii. syr. de pæon. q. ss. M.

Electuarium contra Vertiginem . R. Conf. ros. rub. unc. ii. majoran. beton. an. unc. ss. nuc. ind. condit. dr. ij. confect. alk. compl. dr. i. ss. spec. diamb. contra apoplex. an. dr. ss. specific. cephal. scr. j. vel succin. præp. syr. de cort. cit. vel de stœchad. q. ss. M. F. Elect. S. Electuarium contra vertiginem , de quo mane & vesperi magnitudo nucis sumatur .

Electuar. anti Melancholicum . R. Conserv. fl. anth. borrag. nymph. bugloss. an. unc. ss. myrob. condit. dr. vj. conf. alk. scr. iv. spec. latif. Rhaf. de gemmis frig. an. dr. j. Elix. vit. Mattb. dr. j. syr. corall. ss. Vel quod pretiosius . R. Confect. de hyanc. unc. alkerri. dr. iii. lap. bez. scr. j. smaragd. præp. scr. ung. alk. ss. igne præp. dr. j. magist. succin. alk.

perlar. corall. rub. præp. an. scr. i. sp. ros. rub. idæ lil.
convall. an. gut. xiii. syr. fl. pœon. q. s. M. f. Elecl.

Morsuli Cephalici. R. Spec. diamb. diamosch. d. an.
dr. ii. cubeb. dr. ii. cardam. dr. i. nuc. ind. condit.
unc. i. cort. arant. condit. dr. vi. medull. nuc. ind. dr.
ii. macer. dr. i. sacch. albiss. in aq. lavend. solut. q. s.
M. F. Morsul. ol. destill. nuc. mosch. aspergendi. S.
Morsuli confortantes cephalici de quibus juxta placi-
tum sumatur.

Tabellæ ant-Apoplecticæ. R. Spec. diamb. dr. ii.
pulv. rad. pœon. mar. zedoar. an. dr. i. ss. marg. præp.
dr. j. ol. succin. puriss. dr. ss. sacch. albiss. in aq.
pœon. sol. & ad tabulac. coct. unc. vi. M. F. Tabell.
pond. dr. ss.

Morselli pro confortanda Memoria. R. Confect.
alk. dr. j. ss. thur. opt. dr. ii. smaragd. præp. dr. i.
marg. præp. dr. ss. ol. nuc. mosch express. scr. ii. ss.
cinam. gut. iii. lig. Rhod. gut. ii. amb. mosch. an. gr.
iv. sacch. in aq. ros. dissol. q. s. f. confect. in Mor-
sell. S. Morsuli pro confortanda memoria mane jejune
sumendi.

Aliæ. R. Spec. diamb. diamosch. dulc. an. scr. ii.
succin. alb. præp. scr. ss. confect. alk. compl. scr. i. ol.
carv. scr. ss. ol. succin. gut. v. sacch. albiss. in aq. la-
vend. sol. q. ss. M. Vel sequentes Horstii. R. Con-
fect. anacard. dr. i. thur. el. dr. ii. piper. z. z. an. dr.
ss. sacch. in aq. maior. sol. lib. i. add. ol. cinam. gut.
vi. rorism. gutt. iv. M. F. Tabellæ, de quibus dr. ii.
dentur matutino tempore.

Rotulæ gratissimæ Cephalicæ. R. Spec. diamb.
dr. ii. confect. alk. compl. scr. ii. amb. grys. gr. vi.
sacch. albiss. in aq. nuc. mosch. vel ros. & cinam. dis-
solut. q. ss. M. F. Rotul. Alii addunt etiam succ. lim.
q. ss. S.

Aliæ contra Vertiginem. R. Ol. destill. carv. scr.
ss. nucif. gut. vii. confect. alk. rad. doron. pulv. an. dr.
ss. extr. lig. aloë gr. xv. sacch. in aq. salv. & beton.
dissol.

dissolv. q. s. M. F. Rotul. quibus ad finem addi potest
mosch. ad scr. ss. amb. gr. iii. M.

Aliæ ant-Apoplecticæ . R. Spec. diamb. compl. dia-
mosch. an. dr. j. succin. albiss. scr. j. ol. anis. gutt. iii.
sacch. in aq. lavend. sol. unc. iv. M. F. Rot.

Pulvis Cephalicus corroborans , Fabri . R. Confect.
diamb. unc. ij. diamosch. dulc. unc. j. cubeb. mac. do-
non. cost. ver. cass. ligneæ succin. alb. præp. lig. aloes
m. scr. j. amb. grys. scr. ss. mosch. gr. vij. ol. dest. ci-
ram. scr. j. for. aur. N. vij. sacch. seu manus Christ.
tabul. ad pondus omnium . M. F. pulv. S. pulvis Cé-
phalicus corroborans , de quo cuspis cultro plena-
mane & vespero lente in ore liquefacienda.

Pulvis ant-Apoplecticus . R. Cinnab. nat. cin-
tab. antim. spec. contra apoplex. complect. an. unc. ss.
M. F. Pulv. de quo m. dñ v. sumatur scr. i. ex. aq.
eras. nig.

Alius . R. Succin. alb. pulv. dr. ii. spec. diamb.
dr. j. sem. carv. dr. ss. M. F. Pulv. subtiliss. de quo
sumatur cuspis cultelli singulis mensibus , primo die post
novilunium .

Pulvis ant-Epilepticus . R. Pulv. de Huttet. vel
March. epilept. dr. j. cinnab. antim. gr. xxiv. (subin-
de etiam lapid. bez. unicorn. an. scr. ss.) M. F. Pulv.
divid. in 3. p. æq. S. Pulvis antiepilepticus pro tribus
vieibus.

Alius . R. Pulv. March. mirab. epilept. Minf. an. scr.
cinnab. nat. præp. cinnab. antim. an. scr. j. magist.
an. hum. magist. ungu. alc. an. scr. ss. M. F. Pulv. dos.
m. dñ v. cuspis cultell. ex seq. aq. R. Ag. ceras. nig. fl. til.
peon. an. unc. i. pil. Lang. unc. ss. syr. fl. pœon. unc. ss.

Tragæa specifica in Vertigine . R. Fl. euphras. dr. iii.
mac. dr. j. corall. rub. præp. dr. j. succin. alb. præp.
xv. sacch. ros. tabul. unc. iv. ol. destill. carv. fænic.
auc. mosch. an. gut. viij. M. F. Tragæa .

Alia . R. Spec. diamosch. d. dr. ij. diamb. dr. ss. mac.
pulv. rad. doron. an. scr. iv. sacch. fin. unc. iii. M. F.

Trag. cui add. amb. gr. xv. Vel R. Sem. carv. præp. coriand. præp. anis. fœn. an. unc. ss. cardam. cubeb. an. dr. i. ss. nuc. mosch. dr. i. mac. scr. ss. caryoph. scr. ss. sacch. q. ss. M. F. *Trag.*

Tragæa confortans Cephalica. R. Spec. diamb. complet. diamosch. d. an. dr. ss. diaxyloaloe, scr. i. cinam. opt. dr. ii. succin. alb. præp. marg. præp. ar. scr. i. nuc. mosch. dr. i. mac. cubeb. cardam. caryoph. an scr. ss. sacch. albiss. unc. iii. fol. aur. N. ii. M.

Cucupha in Catarrhis. R. Fol. meliss. maioran. orig. an. p. ss. fl. ros. rub. dr. ii. lavend. stæch. Arab. rorism. pœon. tunic. an. dr. i; thur. nuc. mosch. cinam. caryoph. gr. kerm. vel succin. alb. præp. an. dr. ss. gum. elem. benz. an. dr. i. storac. calam. dr. ii. grossa modo trita includ. sind. rub. frequentique filo interbasata in formam Cœcuphe redigantur.

Alia in Vertigine & Incubo, R. Herb. rorism. maior. salvo. an. p. iii. fl. ros. anth. pœon. chamom. an. p. i. storac. calam. mast. succin. an. dr. ss. sem. coriand. præp. scr. ii. cubeb. caryoph. an. dr. ss. nuc. mosch. dr. i. rad. Ir. flor. Spec. diamb. an. scr. i. M. crassifuscule incid. & conquass. ac cum sind. rub. f. Cucupha.

Alia spiritus animales confortans. R. Herb. maior. rorismar. beton. meliss. puleg. an. m. ss. fl. ros. rub. lavend. anth. an. p. i. thur. mast. rad. Ir. flor. cort. cit. sandarach. an. scr. i. caryoph. mac. cubeb. cardam. an. scr. ss. spec. diamb. complet. dr. i. ss. sem. coriand. nigell. an. dr. ss. succin. cit. scr. i. ss. mosch. gr. vii. ambr. gr. iii. M. S. Species pro Cucupha.

Pulvis Crinalis. R. Rad. cyper. long. calam. arom. ros. rub. an. dr. vi. benz. unc. ss. xyloval. dr. iii. corall. rub. succin. an. dr. ii. farin. fab. unc. ii. rad. Ir. flor. unc. iv. M. f. Pulv. subtil. add. mosch. zibeth. an. gr. v. M. S. Pulvis crinalis peculiaris pro confortando capite & memoria, & crescendis crinibus.

Odorament. in affectibus Soporosis. R. Sp. sal. armon.

non. urinos vel C. C. dr. i. ss. indatur vitro angusti officii. S. Spiritus peculiaris ad odorandum.

Odoramentum spiritus animales excitans. R. Aq. meliss. lil. convall. unc. i. apoplect. cum amb. & mosch. unc. ss. acet. rutac. dr. i. M. S. Aqua pro spiritibus animalibus naribus, & temporibus aspergenda. Vel r. Aq. ros. in B. M. destill. unc. i. lavend. cinam. an. br. vi. Elix. vit. Matthiol. dr. ii. acet. fl. tun. unc. i. ros. dr. vi. sp. ros. dr. i. M.

Nodulus & Aqua odorisera. R. Fol. meliss. p. i. ci-
cam. mac. galag. caryoph. an. scr. ss. M. incisa includ.
Nodul. ex sind. alb. in aqua sequenti madefaciens.
R. Aq. ros. fragrant. unc. ii. odorif. Fuchsii unc.
spirit. cephal. Anhalt. compl. dr. ss. acet. ros. rub.
i. an. unc. ii. mosch. gr. ii. M.

Balsamus Cephalicus. R. Ol. nuc. mosch. express.
r. iv. Bals. apoplect. scr. i. ol. rut. scr. ss. succin.
gut. vii. M. S.

Alius ant-Epilepticus & contra Vertiginem. R. Bals.
rut. scr. i. mac. caryoph. ros. an. scr. ss. ol. dest. succin.
gut. v. carioph. gut. iii. M.

Alius ant-Apoplecticus. R. Bals. apoplect. succin.
majoran. nucif. an. scr. ss. ping. castor. gr. i. M. S.
Balsamus antapoplecticus mixtus, quo nares, tempo-
ra, & vertex illinendi.

Alius Memoriam confortans. R. Bals. apopl. scr.
i. majoran. succin. an. gr. v. ping. castor. gr. ii. ol. suc-
cin. gut. ii. M.

Pediluvium anti Catarrhale. R. Herb. absint. orig.
artemisif. serpill. salv. fl. chamom. ros. rub. an. m. i. ci-
ner. sal. ar. mi. M. F. Decoct. in aq. f. q. vel in li-
xu. ex cin. lig. juniper. parat.

Aliud. R. Herb. salv. hyssop. orig. thym. beton. ma-
jor. an. m. i. fl. cbam. m. i. ss. stæch. summit. aneth. an.
m. i. bacc. juniper. unc. ii. sal. unc. iii. incid. grosso modo
pro Pediluvio, à cuius abstersione plantæ pedum inun-
gantur calidissime medulla cervina.

Aliud simplex in dolore Capitis. R. Aq. dulc. mens. viij. sal. comm. m. ii. salu. bort. m. iii. acet. lib. ii. coq. in vicem & usurpentur pro Pediluvio.

A R T I C U L U S II.

De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Remediis Ophthalmicis.

I.

Medicamenta *Ophthalmica* dicuntur, quæ Oculis amica affectibus eorum succurrunt, & quidem vel eos roborando ac visum acuendo, dum conjunctim spiritus, humores, nervos & caput respi- ciunt, atque hæc dicuntur *oxydorcica* ac proprie*ophthalmica*, suntque cephalica fere, nervina ac balsamica, utilia, in amaurosi, visus imbecillitate, & caligine; vel exsiccando & derergendo in Cataracta, ungue, excrescentiis &c. Vel demulcendo ac dolorem mitigando, in doloribus oculorum, vel vi traumatica eis subveniendo, in vulneribus; vel humores influentes repellendo, ut in ophthalmia incipiente; vel consistentes ibi seu halitus & vapores, seu humores in coagulum abituros discutiendo, ut in su- gillatione, ophthalmia &c.

I I.

Circa usum horum haud immerito cautelæ quædam observandæ , nam juxta vulgatam parœmiam .

Non patitur lusum , fama , fides , oculus .

Not. igitur 1. in Oculorum affectibus non solum locum , sed & focum spectandum esse ; nam licet locus sit Oculus , focus tamen sèpissime tum caput , tum hypochondria , tum tota M. S. acris , serosa & scorbutica . 2. Repelentia non debere esse nimis frigida , adeo quidem ut repellant , sed non impellant ac impingant , atque etiam locum magis habere capite evacuato , præfertim in ophthalmis gravioribus , 3. Suppurationem interiorem oculis funestam esse , & sic arcendam frigidiusculis , discutientibus , V. S. & vesicatoriis ; hinc etiam emollientia , emplastica ac anodyna oculis inflammatis magis nocent , quam prosunt . 4. Opiata caute quoque in doloribus ac inflammationibus oculorum usurpanda esse , utpote quæ magis ob acrimoniam morsicant , quam dolorem leniunt . Idem fere dicendum de lacte muliebri , quod etiam tum ob unctuositatem suam , tum ob facilem acescentiam suspectum est in doloribus oculorum , saltem illud non diu ibidem relinquendum , sed singulis horis mutandum .



I I I.

PRæterea 5. Notandum : acriuscula in tempore ap-
plicata optima esse ophtalmica . Observavit
enim Plater . Cuidam ex casu mercurium sublima-
tum , loco sacchari inspersum fuisse sine noxa . We-
del . idem observavit de spirit. vitriol. ut adeo oculus
acriora ferat medicamenta . Interim non promiscue
inferenda oculis acriora , cum morsicatis fibris , & ci-
tato affluxu , inflammatio angeri possit . 6. In affe-
ctibus oculorum vitanda esse sternutatoria , caput con-
cutientia & lacrymas ex oculis cidentia . 7. Remedia
ophthalmica debere esse a fordibus optime purgata ,
diligentissime insuper trita & cribrata . 8. Topica in-
fusione & gutta serena plus promittere , quam præ-
stare : interim tamen aliqua tentari posse . 9. Topi-
ca in ophthalmia debere vergere ad frigiditatem , si
repellendum ; ad caliditatem , si discutiendum . 10.
Topica adstringentia , temporibus , pro influxu in-
tercipendo , applicanda esse .

Formulæ

*Remediorum Oxydorcicorum &
Opthalmicorum .*

Vinum Euphragiatum . R. Rad. enul. unc. iv. sol.
& fl. euphras. m. iiiii. sem. fœnic. siler. mont. an.
unc. ii. inclusa Nodulo suspend. in musto , donec ef-
feruerit .

Electuar. Ophthalmicum , longo usu probatissi-
mum , Timai . R. succ. euphras. unc. ii. fœnic. unc.
i. chelidon. rut. lavend. ros. pallid. an. unc. ss. mell.
virg. probe despum. unc. ix. cog. ad consist. syrup.
add.

add. pulv. eupbras. rec. siccata. unc. i. sem. fœnic. dr. ii. ss. siler. mont. dr. ii. mac. cubeb. cinam. an. scr. i. M. F. Elect. S. Electuarium ophtalmicum confortans, & conservans, de quo quantitas castaneæ sumatur mane & vespero.

Aliud. R. Cons. fl. beton. anib. an. unc. ii. myrob. condit. N. ii. ther. vet. dr. ii. cubeb. dr. ii. sem. sil. mont. scr. ii. succin. alb. præp. scr. i. mac. scr. ii. sp. eupbras. dr. ii. Essent. rorism. dr. i. cum syr. de sech. ss. q. M. F. Elect.

Pulvis oxydorcicus. R. Sacch. cand. alb. canariens. confect. sem. fœnic. an. unc. i. pulv. fl. eupbras. dr. ii. sem. fœnic. dr. iii. rad. valerian. dr. vi. ol. destill. fœnic. gut. xi. maior. gut. iv. M. F. pulv. S.

Alius. R. Rad. pæon. unc. ss. valerian. dr. iii. sem. pæon. dr. ii. fœnic. dr. i. sal. eupbras. dr. i. ss. C. C. phil. præp. ungul. alc. præp. an. dr. i. tart. chalyb. dr. ii. antim. diaph. dr. i. ss. cinnab. nat. dr. i. cryst. præp. dr. iii. man. Christ. perlat. unc. i. ss. M. F. Pulv.

Tragæa Visum corroborans. R. Fol. Eupbras. cum fl. unc. ss. sem. coriand. acet. præp. dr. iii. fœnic. dr. i. ss. carv. scr. ii. ss. cinam. acut. dr. i. nuc. mosch. scr. iv. pellicul. intern. ventric. Gallin. scr. ii. rotul. man. Christ. unc. iii. ss. ol. fœnic. gut. xi. carv. gut. viii. nuc. mosch. gut. v. M.

Alia. R. Sem. coriand. præp. rapar. anis. fœnic. an. dr. ii. Pulv. eupbras. siler. mont. carioph. cardam. min. cubeb. cinam. an. dr. i. nuc. mosch. dr. ii. sacch. rosat. tabul. ad pondus omnium M. F. Tragæa.

Sal usualis oxydorcicus. R. Sal. comm. unc. ii. Eupbras. sicc. dr. ii. nuc. mosch. dr. i. cinam. scr. ii. M. S. Sal peculiaris oxodorcicus, quo cibi co-diendi.

Fomentum ophthalmicum Plempii, utile in Gutta serena & Suffusione. R. Fœnic. rut. hyssop. eupbras. chelid. verben. beton. puleg. an. m. ss. sem. anis. fœnic. carv. ameos. siler. mont. an. dr. ii. eupbras. unc.

unc. ss. mac. cinam. caryoph. nuc. mosch. an. dr. i.
incis. & conquass. coq. ex s. q. aq. vel si fortius agen-
dum in vino addito postmodum etiam sp. vin. ap-
plicetur cum petiis duplicatis quotidie ter vel quater.

Aqua Ophthalmica Quercet. Visum clarificans, ac
utilis in Suffusione incipienti. R. Croc. metall. dr. i.
aq. chelidon. m. unc. vi. infund. bujus. aq. tepidae 3.
vel. 4. guttae homine resupino jacente intra oculos, in-
funduntur ter vel quater de diem, & quidem per mul-
tos dies.

Alia. R. Aq. fenic. chellid. m. euphrag. an. unc. i.
vitriol. alb. scr. ss. aloes scr. i. M. F. Collyr.

Collyrium anti Ophthalmicum expertum, R. Al-
bum ov. N. i. agitetur cum frusto aluminis in patina
stannea ad. consistent. Unguent. quod extend. super lin-
teum & tepide oculis applicetur.

Aliud in forma Aquæ expertissimum. R. Aq. ros.
plantag. an. unc. ii. solan. unc. i. vitriol. alb. scr. i.
dissolv. & colat. add. tut. præp. scr. i. alii etiam ad-
dunt flor. zink. scr. ss. vel sacch. sat. camph. &c. S.
Aqua ophthalmica.

Aliud. R. Aq. ros. alb. fenic. euphrag. an. unc.
ii. sp. vin. rectif. dr. i. sacch. alb. tut. præpar. dr. i.
M. S. ut supra.

Collyrium aliud anti Ophthalmicum. R. Ov.
Gallin. ad duritiem coct. & dempta testa & vitello
cavati, inde sacch. sat. gr. vi. camph. gr. ii. vi. vitriol.
alb. gr. iii. mell. ros. unc. ss. postquam paulisper ita
mixta steterint, fortiter exprim. & si liquor nimis
crassus, add. aq. ros. q. ss. Alii cavitatem replent
vitriol. alb. hinc suspendunt ovum in cella, ut liquor
in aquam rosar. Suppositam defluat, & exprim. Cola-
ture guttae aliquot in oculos infunduntur, linteoque
madido teguntur.

Collyrium in forma Linimenti. R. Butyr. recentiss.
q. pl. lapid. calaminaris in alcohol redact. q. ss. ut
fiat Ung. Vel R. Butyr. rec. q. aq. ros. lot. unc. ss. tut.
præp.

præp. dr. i. camph. dr. ss. Vel R_{2.} Axung. porc.
absque sale, vino lot. unc. i. camph. scr. ss. his mixtis
add. sacch. satur. scr. i. tut. dr. ss. ocul. canc. præp.
corall. rub. præp. marg. præp. an. gr. xv. M. de his
ung. tempore somni, magnitudo lentis immittatur can-
tho maiori, & palpebræ inungantur.

Cataplasma Anodynum, expertum in doloribus
Oculorum & præsertim in contus. & vulneribus. R_{2.}
Pom. dulc. N. iii. coq. ex aq. ros. & plantag. f. q. ad
wollit. traiic. per crib. pulpæ add. sacch. albiss. dr. ii.
camph. gr. xi. croc. gr. v. M. F. Catapl. applican-
dum tepide ac sèpius iterandum.

Collyrium in Vulneribus. R_{2.} Aq. ros. fœnic. eu-
phras. an. unc. i. tut. dr. i. camph. gr. iii. stef. alb. ss.
& vel sacch. sat. scr. i. sacch. cand. alb. dr. i. M.

Collyrium pro maculis & nebulis detergendis. R_{2.}
Croc. metall. subtiliss. pulv. dr. i. vitriol. alb. scr. ss.
aq. ros. rub. unc. ss. flor. cichor. per deliq. unc. iii.
macerentur tepide per horas 6. filt.

Aliud. R_{2.} Tut. præp. dr. ss. marg. præp. scr. ss.
camph. vitriol. alb. an. gr. ii. sacch. cand. alb. dr. i.
M. F. Pulv. subtiliss. m. & v. oculo pisces magnitudine
inspergendas. Hoc absoluto, R_{2.} Pingued. Thymal.
pisces. scr. ii. fel. lucii pisces. scr. i. M. F. Mixt. m. &
v. lentis quantitate oculi cantho maior. indenda.

Aqua experta Timæi in Epiphora. R_{2.} Tormentill.
grossò modo pulver. dr. i. alum. gr. v. aq. ros. plant.
an. unc. i. stent in loco calido per diem & noctem, filt.

ARTICULUS III.

De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Remediis Oticis.

I.

Medicamenta *Otica* dicuntur, quæ Auribus amica, affectibus eorum succurrant, & quidem vel intrinsecus cerebrum roborando spiritusque vigorando, ut influant, nec stationem suam deserant, qualia sunt cephalica; vel extrinsecus, seu detergendo, mundando, ac obstructiones referando, vel humiditates superfluas exsiccando seu discutiendo, vel flatus resolvendo vel dolorem leniendo.

II.

IN usu horum Not. 1. in affectibus Aurium etiam semper magis respiciendum esse ad caput: immo ad alia viscera, quam ad aurem ipsam. Sic in affectibus aurium quibuscumque, qui non oriuntur a sola causa externa, Medicamenta martialia, splenetica & hypochondriaca sunt optima. Proinde etiam in otalgia diaphoretica unice prosunt, cum lympha plerorumque, si non omnium affectuum aurium potissima causa sit. 2. Cavenda esse in affectibus aurium, quæ spiritus vel nimis confundunt, ut sternutatoria, vel obtundunt, ut frigida nimis actu vel potentia. 3. Tepida debere esse *Otica* auribus indenda, quæ blandè demulcent, cum frigida nervis & nervosis partibus sint adversa. 4. Priusquam topica applicentur, fordes aurium probe esse removendas, ut scil. aditus pateat, nec viscositate illa folidia virtus remedii obtundatur.

5. To-

5. Topica forma suffitus magis exsiccare, vaporosa humida magis demulcere, oleosa & spirituosa magis discutere; in singulis tamen cavendum, ne quid nimis, cum vaporosa frequentius usurpata, partem debilitent, & aquea membranulam laxent.

III.

Præterea. 6. Not. præstare Injectiones & decocta clysteris modo parata omittere, nisi urgeat necessitas. 7. Si emolliendum vel demulcendum, topica immediate instillari posse: contra quando roborandum, cum bombace immitti. 8. Tres vel quatuor guttas de liquidis pro una dosi sufficere; neque enim consultum est, hunc angiporum obruere. 9. Immissis topicis, in autem oppositam cubandum esse, ut melius penetret, & profundius illabatur medicamentum. 10. Valde unctuosa & viscida, quæ meatum obviant, non temere auribus indenda esse, hinc non convenient olea crassa, rancida, pinguedines, limenta &c. si ol. amygd. & pingued. anguillæ vel serpent. excipias. 11. Acriora auribus nunquam instillanda esse, cum tenuis membrana lædi, & facile erodi possit, unde dolor & inflammatio. Valet id in primis in oleis destillatis, quorum hæc est differentia, ut in primis quædam possint ad paucas guttulas immitti, ut leniora, si præsertim refracta dispergantur; hinc commodissime olea carminativa permiscentur cum ol. amygd amar. quædam vero bombace excepta, possunt faltem indi, ut v. g. ol. destill. anis. quædam vero plane vitanda sunt, vel non nisi parce aliis remiscenda, ut v. g. ol. destill juniper. succin. aliaque calidiora. 12. Immissis topicis, autem obturandam esse gossypio moschato, quod solum subinde prodest. 13. Masticatoria in applicatione topicorum non esse negligenda, ut meatus auditorius qui ab ante ad os

^os tendit, magis aperiatur; hinc masticetur cinam.
vel cubeb. vel mastix. &c.

Formulæ

Remediorum Oticorum.

INjectio auricularis in Surditate & dolore. R. Anth.
m. ii. coq. in urin. puer. lib. i. ss. ad lib. i. Col.
add. Rhodomell. unc. iv. M.

Decoctum pro evaporatione in Aures. R. Ment.
salv. puleg. rorism. cent. min. cinam abrot. an. m. i. bull.
in vin. alb. generof. ss. q. ad 3. part. consumpt. Vel
R. Sem. carv. dr. ii. bacc. laur. N. ii. fl. chamom. fol.
salv. rorism. an. m. ii. coq. in. ss. q. aq. tempore decu-
bitus excipiatur vapor. Hinc R. Zibeth. gr. iv. mosch.
gr. ii. ol. dest. salv. rorism. an. gut. iv. hac mixtura im-
buatur gossypium quo aures obturentur.

Aliud. R. Herb. serpill. maior. meliss. rut. puleg.
absinth. tamacet. cent. min. an. m. i. rorism. m. ss. flor.
lavend. beton. stæch. salv. an. m. ss. bacc. laur. unc. ii.
Juniper. unc. i. coq. ex aq. & vin. alb. f. q. colatura
servetur pro evaporatione, masticando sub ea mast. ve-
cinam. a fomentatione auribus imponatur gossypium ma-
defactum Elix. vit. Matth. vel aq. apoplect. vel essent.
acovist. Minis. vel spirit. Anhalt. aut aq. Regin. Hun-
gar. vel pingued. anguill. aut serpent. cum paucis gut-
tis ol. destill. anis. vel succin. vel cum Bals. peruv. Vel
R. Ol. amygd. amar. dr. iii. Bals. peruv. scr. iv. ol. de-
still. rorism. gut. iii. M.

Aliud fortius. R. Elleb. alb. dr. ii. pulp. colocynth.
scr. ss. castor. dr. ss. orig. serpill. rut. an. m. ss. fol.
laur. unc. ss. cubeb. dr. ss. coq. in vin. & aq. an. p. & q.
excipiatur vapor.

Suffitus siccus. R. Thur. mast. succin. an. unc. ss.
castor. scr. i. lign. guaiac. dr. i. ss. ladan. benz. an.
dr. ii.

dr. ii. confract. & incis. dentur ad scat. Post suffitum.
 v. Bals. peruv. gut. xv. ol. dest. anis. gut. ii. zibet. opt.
 gr. ii. M. inting. bombax ac particula eius auribus im-
 ponatur.

Alius. R. Lign. aloes dr. ss. mast. thar. an. scr. iv. alipt.
 mosch. gr. iv. M. profumo, quem accipiat æger per in-
 fundibulum inversum ter de die. Hinc R. Ol. dest. lig.
 Rhod. gut. iv. anis. gut. iii. succin. gut. ii. amb. grys.
 y. iv. dissolv. s. a. & M. cum bombac. moschat. ad scr.
 Col. ss. detur in Charta S. Bombax mixt. moschat. de
 qua auribus imponatur paulum.

Alius. R. Lig. aloc dr. i. thymiam. benz. an. scr.
 iv. mast. dr. i. M. pro Suffit hinc R. Ambr. gr. iii.
 mosch. gr. ii. rotul. man. Christ. N. ii. M. exactissime
 insperge bombac. madefact. cum ol. anis. post suffi-
 sum immitte particulam auribus noctu, & repete ali-
 quot diebus.

Mixtura experta Plateri, in Tinnitu aurium ex ca-
 fii. R. Aq. vit. cochl. i. succ. cep cochl. dimid. ol. dest.
 spic. gut. iv. M. & auribus instill.

Turundæ acovisticæ. R. Galb. pic. naval. an. dr. ii.
 elleb. alb pulv. scr. v. zibeth. gr. vi. M. divid. in p.
 viii. vel x. forma instar caryophyllorum in sindone ra-
 vij. vell. involvendas, filo ad extremitates maiore ap-
 penso, ut ex aure extrahi possit.

Mixtura in Dolore aurium vehementi. R. Ol.
 mygd. d. vel lact. mulieb. dr. ii. castor. croc. an. gr.
 ss. pulv. op. gr. iii. cum gossypio indatur auri dolent
 alide.

Evaporatio anodyna. R. Fol. plantag. solan. an. m.
 fl. chamom. melilot. an. p. i. coq. in lact. pro suffu-
 g. Vel R. Malv. bismalv. violar. lactuc. an. m. i.
 malv. cydon. an. dr. i. ss. fl. cham. melil. ros. an.
 i. f. Decoc. pro evaporat. vel ferment. Hinc R.
 ad. mulieb. unc. ii. album. ov. in liquorem versi unc.
 i. instill. tepide.

Cataplasma anodynnum. R. Herb. malv. bismalv.

an. m. i. medull. pan. alb. unc. iv. coq. in s. g. lach.
 vacc. vel capr. ad consist. pul. adde vitell. ov. N. ii.
 ol. ros. unc. ii. croc. scr. i. M. F. Catapl. moderate
 calide applicandum. Vel $\frac{1}{2}$. Cep. sub. cineribus coct. N.
 i. butyr. rec. unc. ii. ol. chamom. ros. an. unc. i. croc.
 scr. i. M. applic. tepide.

ARTICULUS IV.

*De Officio Medici, in præscribendis Remediis Odonticis, aliisque Oris & fau-
cium affectibus destinatis.*

I.

Medicamenta odontica sunt, quæ Dentibus amica, eos roborant, sordes detergendo dealbant, vitiosum acidum gingivis & dentibus hostile absorbent, & blanda vi adstrictoria gingivarum tonum conservant & roborant. Ad hæc referuntur ea etiam remedia, quæ in affectibus linguae, gingivarum, uvula ac faucibus convenient, ut ex infra annexis formulis videre est.



Formulæ

Remediorum Predictorum.

PUlvis Dentifricitus. RE. Off. sep. C. C. ust. pumic.
præp. an. unc. iii. mosch. scr. i. asperge spirit. ros.
unc. ss. & sicc. Hinc RE. Cr. kerm. sant. rub. an.
unc. ss. sp. vin. q. f. pro extrahenda tinctura, qua
irrora aliquoties prædictum Pulv. & sicc.

Alius. RE. Mandib. luc. pis. corall. alb. C. C. ust.
alum. ust. rad. Ir. an. unc. ss. sal. gemm. dr. i. M.
Vel RE. Rad. bistort. alum. corall. alb. an. unc. i. M.
F. Pulv. subtiliss. Vel RE. Lapid. pum. subtiliss. pulv.
unc. i. pulv. Ir. dr. iii. Gall. mosch. ver. dr. i. ol. ros.
rosmar. salv. cinam. an. gut. vi. silic. fluv. albiß. cal-
cin. & pulv. unc. iv. pan. sigil. tost. pulv. & crib. unc.
ii. cin. rosmar. salv. juniper tabac. an. dr. i. myrrb.
alum. rock. an. dr. ss. M. f. Pulv. tingi possunt, si
placet, hi pulveres vel tinct. santal. & gr. Kerm. vel
coctioniglia in aq. aluminosa solut. & pulveribus aspe-
ra, qui exinde rubescunt, vel leni admoti igni, pur-
purascunt.

Aqua Dentifricia. RE. Aq. font. dilue in ea spirit.
vitriol. vel alum. q. f. ne nimium acceſcat. Hoc lava-
mento quotidie m. & v. cum laccinia lanea fricentur
dentes. Vel RE. Alum. ust. subtiliss. pulv. dr. ii. cinam.
integ. dr. i. ss. aq. ros. fontan. an. unc. iv. bull. in
phiala vitrea supra cineres calidos ad 3. p. consūpt.

Pasta Dentifricia Dominarum. RE. Crist. præp. dr.
i. ss. pulv. later. lap. pum. an. unc. ss. off. sep. coral.
uir. an. dr. ii. margarit. caryoph. rad. Ir. fl. an. dr. i.
Mosch. gr. iv. syr. de ros. sicc. vel mell. ros. q. f. ut fiat
Pasta mollis pro dentibus fricandis, colluendo postmo-
num os vino.

Dentifricium Infantum dentientium. RE. Butyr. rec.

unc. j. mell. despum. dr. vj. corall. rub. præp. unc. ss.
f. mixt. qua fricentur Gingivæ bis vel ter in die ad
dentitionem facilitandam.

Opiata Borelli, dentes mundificans, corroborans,
ac carnem gingivarum restituens. R. Parum alum.
solve in unc. i. sp. sulph. add. cons. ros. vel bugloss.
unc. vi. M. Et deterso Dentium tartaro admoveatur.

Alia. R. Alum. dr. ss. dissolv. ad ignem in unc.
iii. acet. hinc add. mell. unc. ij. cog. simul donec re-
deant in formam Opiatæ molis. Hac mixtura m. &
v. gingivæ fricentur.

Dentilavium scorbuticum. R. Rad. bistort. sem. co-
chlear. an. dr. ij. alum. dr. i. mast. dr. iii. coq. in aq.
font. s. q. ad lib. j. col. add. mell. ros. unc. ij. M.
F. Lot. S. Dentilavium calidum sæpè in ore deti-
nendum.

Aliud in Gingivarum erosione. R. Herb. cochlear.
veron. salv. prunell. an. m. j. polyp. q. unc. ss. mast.
myrrb. an. dr. ij. alum. dr. ss. incis. Et contus. coq.
in aq. salv. lib. ii. Col. add. mell. ros. unc. iii. M. S.
ut supra.

Gargarismus expertus in Prunella febrium. R. Her.
semperferv. rec. m. iii. canc. viv. N. iv. aq. semper-
ferv. maj. unc. iv. acetos. fl. nymph. an. unc. iii. M.
contund. Et exprim. add. acet. fl. sambuc. ros. an. unc.
i. ss. dissolv. sal. nit. præp. scr. i. diamor. unc. i. M.
S. Gargarismus probatus pro angina.

Alius. R. Aq. prunell. unc. iv. acetos. frag. plantag.
an. unc. ii. semperferv. mai. unc. i. diamor. dr. vi. vel
unc. j. vel mell. ros. diamor. an. unc. ss. troch. de nit.
præp. scr. i. vel dr. ss. vel spirit. vitriol. gut. x. M.
f. Garg. a cuius usu lingua & fauces illinantur dia-
mor. unc. i. syr. viol. dr. vi. sp. vitriol. gut. iv. M.
Vel R. Aq. semper viv. mai. prunell. an. lib. i. succ.
semper viv. m. unc. i. sal. prun. vel armon. dr. i. M.

Gargarismus albus in Aphthis & Anginæ princi-
pio. R. Aq. plantag. ros. rub. spermac. ran. an. unc.
iv.

iv. album. ov. in aquam agitando redact. N. iii. sacch. cand. vel crystall. unc. i. M.

Gargarismus in dolore, ulcere & inflammatione Uvulae & Tonsillarum. R. Decoct. hord. com. m. i. vel ii. fl. malv. hort. aut ros. rub. lib. i. rob. diamor. mell. ros. an. unc. i. ss. vel diamor. mell. ros. syr. de ros. sicc. an. unc. ss. sp. vitriol. scr. ss. M. pro Gargarisme. S.

Alius in Angina. R. Aq. plantag. solan. ros. caprifol. vel equis. an. unc. iii. vel R. Rad. bistort. dr. ij. capul. gland. dr. i. fl. ros. rub. m. ss. balaust. p. i. herb. plantag. scabios. an. m. ss. incis. & coquass. cog. ex aq. f. q. in Col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. ss. diamor. unc. i. ss. alii etiam addunt sp. sulph. q. f. ad notabilem acidit.

Alius simul anodynus, Foresto maxime usualis. R. Lact. capr. aq. plantag. an. lib. ss. M.

Gargarismus suppurans fit, ex decoct. ficuum & mal. in lacte cum integro croco vel R. Rad. alth. dr. vi. glyc. dr. ii. fl. malv. lil. alb. an. m. ss. sic. arid. N. vi. coq. cum aq. malv. vel lact. ad 3. in col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. i. M.

Gargarismus in Faecium ac gulæ exulceratione, fistulis ac ardore utilis. R. Hord. mund. m. i. C. C. rasp. unc. i. herb. prunell. fl. malv. arbor. an. m. ss. fol. semperviv. m. m. i. sem. cydon. plantag. an. dr. ii. gammar. fluv. contus. N. vi. incis. & contus. cog. ex aq. font. lib. iii. ad 3. p. consumpi. Colatura hac saepius os colluatur, forbillando subinde unc. i. vel ii. Hinc de sequenti Mixtura cochl. j. sensim frequenter lingat. R. Mucilag. sem. cyd. aq. ros. fact. meli. ros. an. unc. ii. succ. semperviv. rec. cochl. iv. M.

Gargarismus detergens; in rupto Abscessu. R. Scab. fl. ros. an. m. i. cog. ex aq. hord. f. q. in col. lib. i. dissolv. mell. ros. unc. ii. M.

Alius in Ulceribus Faecium. R. Herb. prun. cochl. plantag. an. m. i. cog. ad lib. i. in col. dissolv. diamor.

mell. ros. an. unc. i. sp. sulph. scr. i. M. vel seq. in morbo Gallico probatus . R. Ros. rub. balaust. an. m. ii. Gall. dr. ii. gland. unc. ss. plantag. sicc. m. i. ss. cort. arant. alum. ust. an. dr. iii. coq. in aq. plant. ad consumpt. 3. p. add. mell. ros. col. unc. iii. M.

Collutio oris in Dentium vacillatione . R. Cort. gran. unc. i. ss. balaust. dr. i. ros. rub. dr. ss. alum. dr. ss. herb. salv. m. i. rorism. dr. i. ss. sem. coriand. dr. ii. incis. & contus. dentur ad chart. de his cochl. i. bull. in f. q. vin. aq. & acet. teneatur in ore.

Alia in Gingivarum laxitate . R. Fl. ros. rub. balaust. malv. arbor. an. dr. ss. fol. nasturt. aquat. ment. satur. an. m. i. hyssop. salv. an. m. ss. f. Decoct. in aq. fab. ad lib. i. in colat. dissolv. alum. dr. i. diamor. mell. ros. col. an. unc. i. ss. M. hinc fiat inunctio . R. Mell. ros. col. diamor. an. unc. i. sp. vitriol. q. s. M.

Linctus in Prunella . R. Mucilag. sem. psyll. cydan. malv. cum aq. rub. id&e. vel spermat. ran. exirr. an. unc. ss. succ. semperviv. maj. vel syr. viol. aut portul. dr. vi. nit. depur. dr. ss. vel scr. ii. M. S. Syrupus pro angina.

Alius in Fauci & Palati excoriatione à colore febrili . R. Sem. psyll. cydon. an. dr. i. ss. Gum. tragac. dr. i. cum s. q. aq. ros. extrahatur mucilago sat. liquida , add. syr. viol. parem quantitatem , f. in star Gelatin. qua utatur eger frequenter ex cochl. diuq. in ore continet.

Linimentum melluminatum ad Ulcera Fauci & Gingivarum R. Pulv. aquileg. salv. ment. nuc. mosch. an. dr. ii. alum ust. unc. ss. mell. unc. ii. M. S.

Aliud . R. Alum. crud. dr. i. ss. fl. aquileg. fol. salv. an. dr. ii. rad. Ir. flor. dr. i. ss. myrrh. el. scr. ii. mell. ros. cum sp. sal. acific. q. s. M. f. Linim. vel R. Syr. de ros. sicc. mell. ros. an. dr. ii. ss. mast. elect. pulv. dr. ss. sp. vitriol. gut. iii. M.

Cataplasma in Angina . R. Rad. alth. unc. i. ss. fol. malv. violar. an. m. i. fl. cham. melil. an. p. i. coq. in aq.

in aq. ad. mollit. pist. add. farin. sem. lin. fœnugræc.
bord. an. unc. i. nid. hirund. in pulv. redact. unc. ii.
ol. amygd. viol. butyr. rec. an. unc. ii. ol. cham. unc.
i. M. f. Catapl. ab aure ad aurem per collum collide
applicandum.

Aliud. R. Farin. bord. fab. an. unc. iv. nid. bi-
rund. unc. ii. sterç. canin. alb. exficc. unc. i. ss. mell.
unc. ii. ol. ros. q. s. M. f. Catapl. Vel R. Mid. bi-
rund. N. i. sterçor. can. alb. i. coq. in vin. vel lact.
ad consist. pul. vel pistentur. cum mell. & axung. porc.

ARTICULUS V.

*De Officio Medici, in prescribendis
& considerandis Medicamentis
Thoracicis.*

I.

Medicamenta Thoracica seu Pneumonica sunt,
quæ pulmonibus appropriata eorum tonum
fartum tectumque conservant, ac humores in iis con-
tentos ad anacatharsin præparant. Actionem suam
exercent, vel humores cassos viscidos incidendo, at-
tenuando, & detergendo, ac membranam interiorem
ad contractionem & excretionem irritando, atque
hæc dicuntur præ ceteris Bechica & arteriaca, quæ
conveniunt in tussi, asthmate, expectoratione diffi-
cili, catarrho suffocativo &c. de quibus supra. Vel
humores tenues, acres, falsos, titillantes & roden-
tes incrassando, pepasmum inducendo, orgasmum
tollendo, & acrimoniam fluxilem retindendo; at-
que hæc audiunt intercipientia, utilia in tussi ferina,
hemoptysi, catarrhis falsis &c. Vel stagnantem san-

guinem, serunque spissescens & in coagulum abitum, resolvendo & discutiendo, ut in asthmate; vel palmones laesos, erosos & ulcerosos, vi balsamica & vulneraria detergendo & consolidando, ut in Phthisi &c.

I I.

Circa usum horum Not. 1. in Bechicis semper hu-
moris expectorandi qualitatem attendendam es-
se, ut inter incidentia & incrassantia accurata fiat
distinctio, neque dentur incrassantia, ubi viscosi &
tenaces peccant humores, nec incidentia & attenuan-
tia, ubi tenues, falsi & acres. 2. In affectibus subinde
magis prodesse resolventia, quam expectorantia,
cum sint quasi anima pectoralium. Sic in pleurite
& asthmate magis resolventia: in tussi & Phthisi ma-
gis Bechica convenient, interim pro re nata hæc va-
rie misceri possunt. 3. In pectoralibus vitanda nimis
exsiccantia, vel saltem cum humidis miscenda. 4.
Vitanda quoque nimis laxantia, tam interna, quam
externa. Illa tonum debilitant, ventriculum dejiciunt,
ac inappetentiam cident, hinc bechicis linctibus in ma-
gna copia & continuo uti, non est consultum: hæc
verò poros ampliando & magis dilatando, ad fluxum
recipiendum magis disponunt, unde in unguentis pe-
ctoralibus etiam cautio esse debet. 5. Bechica sensim
magis ac pedetentim, quam una vice deglutienda,
pitifando nempe & sorbendo ut scil: pars ad asperam
arteriam feratur & derivetur magis. 6. Decocta
pectoralia præferenda sapienter esse linctibus dulcibus.
7. Pectori inimica esse frigida, acida, salina, nitrosa,
& vitriolica; illa serum coagulando: reliqua partim
irritando, partim fundendo. Intelligendo tamen hæc
singula de pectori vel debili, vel erofo & essentiali-
ter affecto; hinc acida in generè convenient aliqui-
bus in casibus, sed ordinarie pulmonibus nulla erosio-
ne

ne contaminatus, sic v. g. prosunt, in pleuritide, protrusso juvanda & conservanda; in asthmate, incidenti fine, mixta tamen & refracta cum dulcibus.

Formulæ

Remediorum Thoracicorum.

Decocatum Pectorale in Pleuritide & Peripneumonia usuale. R. Rad. liq. unc. ss. tussilag. dr. iii. herb. scabios. capill. ven. chærefol. heder. arbor. card. b. an. m. ss. fl. bellid. papav. errat. an. p. ii. viol. p. i. sic. N. v. jujub. sebest. an. N. ix. passul. min. mund. unc. i. sem. melon. excoct. malu. an. dr. ii. coq. ex. aq. bord. s. q. in Col. lib. i. dissolv. syr. fl. rbaad. unc. i. ss. de lig. de succ. card. b. an. unc. i. spirit. sulph. acid. gut. xv. M. S. Decocatum pectorale pro 3. vel 4. vicibus.

Decoc. ad Tussim, aliasque Pulmonum lassiones. R. Rasur. lig. sassafr. unc. i. maceretur in aq. font. lib. vi. add. rad. levist. unc. ss. enul. dr. iii. herb. heder. terrest. scabios. pulmonar. an. m. ii. sem. anis. fenic. an. dr. iii. coq. ad. 3. addendo in fine rad. liq. unc. ss. passul. min. conquass. dr. vi. Col.

Aliud ad Tussim. R. Rad. enul. Ir. flor. an. dr. vi. herb. scabios. veron. hyssop. heder. terrest. an. m. i. sic. ping. N. v. sem. anis. dr. iij. incisa coq. ex cerevis. vel R. Fic. N. vii. passul. m. j. zibeb. un. ss. Jujub. N. z. siliq. dulc. dr. vi. mell. unc. ii. ss. coq. in s. q. ad 3. addendo sub finem acet. opt. unc. iij. Col. & clarif. den- tur lib. iij. bibat quotidie bis lib. ss.

Apozema antiphthisicum. R. Rad. chin. incis. dr. iij. rasur. ebor. dr. i. ras. C. C. dr. i. ss. dactyl. N. vi. viij. infund. in aq. font. s. q. per noct. mane add. fol. arnogloss. bugul. agrimon. veron. virg. aur. capill. ven. an. p. ii. hord. p. ii. uv. pass. enucleat. m. s. coq. ad. lib.

lib. ij. col. add. conf. ros. rub. unc. ii. stent simul per horas 3. Col. S. Apozema antiphthisicum, de quo mane, vesperi & nocte haustus sumendus.

Aliud. *R. Rad. chin. in taleol. incis. unc. i. sassafr. sant. cit. an. unc. ss. macerentur in aq. fonr. mens. ii. ss. add. herb. bed. terrestr. pulmon. scabios. an. m. ij. sem. anis. fœnic. an. unc. ss. rad. liq. dr. iii. passul. min. unc. j. coq. ad 3. Col.*

Aliud. *R. Rad. symph. maj. glyc. an. unc. ss. fol. marub. tussilag. pulmonar. veron. sanic. agrimon. bugul. an. m. ss. fl. scabios. viol. an. p. ij. passul. min. dr. vi. sant. rub. dr. ij. ss. coq. in f. q. aq. in Col. lib. i. ss. dissolv. looch. de pulm. vulp. de symph. Fernet. de Jub. an unc. ss. vel injice conf. ros. rub. rec. unc. i. ss.*

Julapium Pectorale. R. Aq. farfar. scabios. veron. hyssop. an. unc. iij. syr. de jujub. de liq. an. unc. i. ss. M. S. Julapium pectorale pro 4. vicibus.

Mixtura Pectoralis anti Asthmatica Timei. R. Looch. san. Dr expert. unc. i. aq. asthmatis. unc. iv. cinnamon. unc. iii. fœnic. unc. ii. veron. scabios. an. unc. i. ss. sp. card. b. angel. an. dr. i. M. S. Mixtura pectoralis anti Asthmatica cochleatim adhibenda.

Aqua Asthmatica. R. Aq. ceras. nig. hyssop. veron. fl. acac. an. unc. i. asthmatis. unc. i. spirit. anis. essent. sacch. an. dr. ii. Bals. sulph. anis. terebinth. an. scr. i. confect. Alk. incompl. dr. ss. extr. croc. gr. vi. sacch. perlata. unc. ss. M.

Alia. R. Pulv. Gumm. ammon. dr. i. aq. hyssop. vin. Rhen. an. unc. ii. M. Vel R. Aq. ceras. nig. hyssop. an. unc. ii. pil. Lang. asthmatis. an. unc. ss. spir. ceph. Anhalt. vel Elix. vit. Matth. dr. ii. anis. opt. dr. ii. ss. mosch. amb. an. gr. i. sacch. cand. alb. unc. ss. M.

Aqua Pectoralis, & antiphthisica. R. Aq. antiphthis. Min. unc. ix. magist. corall. perl. an. scr. ii. lach. sulph. dr. i. fl. sulph. scr. i. ss. sacch. cand. alb. pulv. unc. ss. M.

Mixtura Pleuretica. R. Aq. card. b. scabios. cherefol.

an. unc. i. ss. ocul. canc. præp. antim. diaph. an.
i. vel dent. apr. mandib. lucii pisc. spirit. sal.
mon. an. scr. ss. laud. op. gr. dimid. iul. viol. dr.

M.

Emulsio antipleuritica. R₂. Sem. mel. excort. unc. ss.
d. Mar. card. b. an. dr. ss. amygd. d. dr. iii. pi-
x. dr. ii. aq. scabios. fl. rhœad. card. b. an. unc. i.
M. f. Emulf. add. pulv. antipleurit. scr. i. vel ras.
nt. apr. ocul. canc. an. scr. ss. man. christ. perl. dr.

ss. M.

Emulsio in Phthisi utilis. R₂. Sem. melon. excort.
vi. papav. alb. dr. i. amygd. d. excort. N. xxx.
m. alb. probe rost. unc. i. ss. aq. veron. scabios. hy-
p. an. unc. iii. borrag. viol. an. unc. iv. facch. cand.
b. unc. i. M.

Brodium antiphthisicum. R₂. Pullum exenteratum
in ventre pone facch. ros. unc. iii. item veron. heder.
rest. vel aliam herbam antiphthisicam coq. lento igne
olla cooperata in s. q. aq. relinquatur per noctem
præ cineres calidos, mane sumatur pullus contusus
um Brodio.

Aliud. R₂. Succ. express. nasturt. bellid. chærefol. ad.
toblear. ii. vel iii. cum pauxillo mell. ros. dissolv. in s.
brod. carn. Vel R₂. Herb. prædictas aut alias huius
virtutis ad m. ii. vel iii. contus. affund. brod. carn. sa-
uci, ebulliant unc. iv. vel v. Cod. add. mell. parum.

Brodium antiastrmaticum. R₂. Sperm. cer. dr. i.
dissolv. in s. q. brod. carn.

Aliud antipleuriticum. R₂. Ol. depur. lin. unc. ii. ol.
antis. gut. iv. dissolv. in s. q. brod. carn.

Decoct. Galli veteris, in affectibus Thoracis. R₂.
Rad. enul. tussilag. an. dr. vi. liq. unc. s. herb. heder.
rest. scabios. an. m. ii. veron. pulmon. tussil. an. m. i.
art. alb. unc. i. agar. dr. ii. incisa indantur ventri
Galli veter. exenterat. coq. in aq. s. q. tamdiu, donec
annis caro ab ossibus abscedat, exprim. & col. dos.
quotidie unc. iv. vel v. cum gut. ix. Bals. sulph. anis.
Ele-

Electuarium Antiphthisicum. R. Cons. ros. veterunc. ii. pulv. baly. rec. præp. dr. ii. antiheat. Poter. dr ss. Bals. sulph. anis. gut. vii. syr. de symph. Fernst. q. s. M. F. Elect. vel R. Cons. ros. rub. fl. bellid. anunc. i. looch. san. & expert. de pulm. vulp. de farfar. an. unc. ss. pulv. Haly. anonym. an. dr. ss. sulph. scr. i. spec. diatrag. fr. scr. ii. syr. viol. papav. erran. an. q. s. M. F. Elect. S. Electuarium singulare Antiphthisicum, de quo ter in die quantitas nucis sumenda.

Electuar. Asthmaticum. R. Fl. sulph. unc. i. ss. cinam. dr. ss. z. z. scr. ii. croc. dr. i. mosch. gr. vi. mell. despum. unc. iii. vel q. s. M. F. Elect. S. Electuarium anti asthmaticum de quo 3. drachmæ bis in die sumendæ.

Elegma antiphthisicum ex succis. R. Succ. symphyt. mai. lib. i. sanguisorb. veron. ros. rub. salv. min. heder. terrestr. farfar. portul. an. unc. iv. depur. & s. q. sacch. albiss. redig. in formam Looch.

Looch album. R. Ol. amygd. d. sacch. penid. an. p. & q. M. exacte, ut abeant in massam albiss.

Looch domesticum. R. Ol. amygd. d. rec. unc. iv. syr. Jujub. capill. ven. an unc. ii. sacch. alb. dr. ii. M. in mort. marmor. S. Syrupus pectoralis.

Linctus contra Tussim, Pleuritidem & Asthma, vid. supra de expectorantibus.

Morselli Pectorales. R. Looch. san. & exper. dr. v. spec. diair. dr. ii. condit. rad. enul. unc. i. cor. arant. dr. vi. fl. benz. gr. v. sacch. albiss. in ag. fœnit. sol. lib. ss. M. F. Morsul. S.

Trochisci pectorales. R. Extr. glyc. dr. ii. amyl. dr. vi. mosch. zibeth. an. gr. i. ss. ol. anis. gut. vi. sacch. albiss. unc. vi. mucilag. gumm. tragac. q. s. M. f. Trochisci.

Rotulæ antiphthisicæ. R. Succ. glyc. inspiss. unc. ss. spec. diair. scr. iv. fl. sulph. spec. diatrag. frig. an. dr. i. sacch. penid. unc. i. ss. ol. anis. gut. vii. cum s. q. mucilag.

lag. frag. f. Troch. maiores. S. Rotulæ peculiares perior : & in Tussi de quibus juxta placitum sumatur . Aliæ . R. Pulm. vulp. præp. dr. i. extr. enul. pulv. baly. an. scr. ii. ss. fl. sulph. scr. i. benz. gr. v. ch. fin. in aq. tussilag. dissol. unc. ii. ss. M. f. Rotul. d. ol. anis. gutt. x.

Aliæ præstantes . R. Antim. diaph. ex regul. dr. i. benz. ss. succin. alb. præp. mastich. subtiliss. pulv. diatrag. frig. an. scr. iv. croc. orient. gr. xv. eff. amb. sicc. gr. xvi. ol. antis. gut. vi. fœnic. gut. sacch. albiss. in aq. ceras. nig. dissol. unc. iii. M. Confect. in Rotulis.

Pulvis antiphthisicus . R. Fl. sulph. unc. i. ss. tabulat. unc. ss. M. F. Pulv. S. Pulvis antiphthisicus , de quo pondus ducati aurei , in ovo renti ebullito sumendum .

Alius . R. Bals. sulph. dr. ii. impast. cum sacch. alb. unc. ii. pulv. succ. glyc. rad. enul. Ir. flor. sulph. an. scr. ii. spec. diatrag. frig. dr. i. M. Pulv. Vel R. Fl. sulph. ter sublim. scr. ii. ss. pulv. anonym. pulm. vulp. præp. Haly. an. dr. i. perm. cet. dr. i. sacch. penid. unc. i. M. F. Pulvis

Alius . R. Pulv. Haly. spec. diair. diatrag. fr. an. i. fl. sulph. ter sublim. scr. ii. benz. gr. xv. sacch. alb. unc. ii. s. fol. aur. N. vii. M. F. Pulv. S. Pulvis antiphthisicus de quo una drachma in juscule hordei sumenda .

Alius . R. Visc. querc. herb. salv. an. unc. i. pulmon. veron. an. unc. ss. rad. enul. pulm. vulp. præp. an. dr. ii. exsicc. & seorsim pulveris , add. sacch. albiss. ad pondus omnium . Detur ter in die ad cochl. i. super buccella pan. vino madid.

Pulvis antipleuriticus . R. Sal. prun. dr. ii. Pulv. papav. errat. rorall. rub. an. dr. i. magist. dent. ap. vel mandib. luc. pifc. ocul canc. an. scr. i. sacch. viol. unc. M. f. Pulv. dos. a scr. i. ad ii. ex aq. papav. errat.

Pulvis antiasthmaticus . R. Fl. sulph. dr. i. benz. dr. ss. Vel

Vel R. Spec. diamosch. d. compl. scr. ss. Gumm. ammon. gr. v. benz. gr. iv. croc. Aust. gr. v. M.

Pulvis pectoralis Michaelis. R. Rad. aron. crud. pulv. unc. i. sulph. opt. commun. benz. pulv. an. dr. ii. antibed. Poter. unc. ss. saccb. q. s. vel pro lubitu M. f. Pulv. cijus dos. a dr. ss. ad dr. i.

Tragæa in affectibus Pectoris. R. Liq. raf. dr. ii. sem. anis. fænic. an. dr. i. ss. cass. lign. dr. ij. cubeb. dr. i. rad. Ir. flor. dr. i. ss. saccb. ros. tabul. unc. iv. ol. destill. anis. vel fænic. gut. xi. M.

Lotio pedum in Astmate. R. Herb. maior. rorism. an. m. i. hyssop. orig. lavend. serpill. fl. chamom. an. m. ii. ros. calend. an. m. i. M. pro lavacro pedum. S. Species pro lotione pedum.

Unguent. pectorale. R. Ung. pectoral. unc. i. de alth. unc. ss. ol. irin. amygd. d. an. dr. ii. croc. scr. i. M. Vel R. Pulv. cep. sub. cineribus coct. unc. iii. cui add. ol. viol. irin. lin. an. unc. ss. ung. pectoral. unc. i. croc. orient. scr. i. M. S.

Aliud antipleuriticum. R. Ung. de alth. pingued. mur. mont. an. unc. i. ol. amygd. d. unc. ss. camph. scr. i. M.

Cataplasma pectorale, expectorationem promovens. R. Hord. crust. ad mollit. coct. in aq. malv. lib. ss. pietetur. add. ol. viol. amygd. d. an. unc. i. croc. scr. i. M.

Aliud in dolore pleuritico. R. Rad. alth. lil. alb. an. unc. ii. fol. malv. violar. parietar. an. m. i. sem. lin. fænugræc. an. dr. iii. fl. chamom. melil. papav. errat. an. p. ii. cog. in s. q. laet. ad mollit. coniuf. add. ol. amygd. d. chamom. lil. alb. an. unc. i. ss. ping. gallin. vel ung. rub. potab. unc. i. farin. sem. lin. q. s. M. f. Catapl.

Ex speciebus prædicti decocti, parari etiam possunt Sacculi & Fomenta &c. Plura de his vide superius in remediis. expectorantibus.

ARTICULUS VI.

De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Remediis Cordialibus.

I.

Medicamenta *cordialia* seu *cardiaca* sunt, quæ cordi familiaria, illud respiciunt, vel flammam vitalem depresso, nec satis emicantem instaurando, & particulis suis volatilibus sulphureis, seu oleosis & balsamicis, seu spirituosis, alacriorem sanguinis in corde rarefactionem, & in spiritus exaltationem promovendo; qualia conveniunt in languoribus cordis, lassitudine cum malignitate, senio, pallore, frigore, cachexia, virium debilitate, aliisque affectibus, ubi spiritus deficiunt, ac particulæ sulphureæ volatiles & spirituose, vel obtuse, vel non sufficienti quantitate vigoratæ sunt, vel illud respiciunt, candem loculam vitalem p. n. exardentem, ut alienis quasi urat flammis, particulis suis aqueis, acidis, nitrosis, mucilaginosis & adstringentibus refrænando, sulphureasque, balsamicas & mercuriales volatiles particulas, nimis efferatas deprimendo, obtundendo & præcipitando, vel agunt sanguinis grumescentiam & coagulationem corrigendo, acidumque illud inspissans & coagulans absorbendo, vel nimis fusam & rarefactam M. S. ut spiritus suos vix contineat, constipando, firmando, ac sulphur concentrando, vel peregrinum malignum fermentum, calidum vitale oppugnans disutiendo, vel spiritus recreando, restaurando, vel eos veluti torpidos & sopitos excitando.

II. Quo.

I I.

Quoad legitimum horum administrandi & applicandi modum . Not. 1. Alterationem excessivam in utramque partem cordi non convenire , hinc que cavendum esse , & animis refrigerantibus , quæ motum spirituum præpediunt , & ab excessive calefacientibus , quæ eundem dissipant . 2. In debilitate virium non statim ad confortantia cordialia , nec ad illa quidem sola confugiendum , sed causas insuper removendas esse , nisi urgeat indicatio vitalis : præterea convenire aerem liberiorem & diætam convenientem . 3. Cordialibus volatilibus , rarefacientibus & resolventibus , interponenda esse tonica quæ calorem conservant ; ac villos & fibras nerveas tuentur . 4. Cordalia debere esse quam maxime penetrantia , tum præcipue interna , tum etiam externa ; hinc epithematibus acetum & camphora additur , ac eadem ex penetrantibus spirituosis composita , omissis fixioribus , quæ in poros non admittuntur , non sunt de nihilo . 5. Cordalia omnino non posse omnia , sed eadem ab invicem distinguenda , neque confundenda fixa cum volatilibus , generalia cum specialibus , neque alimenta cum medicamentis . Sic fixa præstantiora sunt , si humores acidi absorbendi , vel fermentatio & orgasmus biliosus sedandus : volatilia vero & aromatica , ubi spiritus magis intendendi & excitandi . 6. Moschatis & ambratis non abutendum esse , cum nimis rarefaciant , ac in motum cieant spiritus , eosque inquietos reddant , præsertim in febribus , palpitatione cordis & hæmorrhagiis .

Formulæ

Remediorum Cordialium.

JUlepus Cordial. R. Aq. borrag. bugloss. rub. idæ. an. unc. i. cinam. bugl. dr. ss. succ. cit. rec. dr. vi. confect. alk. dr. i. syr. de rub. idæ. unc. ss. M. S. Julepus cordialis cochleatim adhibendus. Vel R. Syr. rub. idæ. unc. i. conf. alk. scr. ii. spir. ros. scr. i. aq. ceras. nig. unc. iii. sp. vitriol. q. f. M.

Julapium vitæ. R. Vitell. ov. rec. N. ii. sacch. albiss. unc. ss. ol. cinam. gut. iii. vin. alb. vel Hispan. aut malvat. unc. vi. M. exacte. Si efficacius velis, add. ambr. gr. ii. ol. dest. cit. gut. iii. conf. alk. scr. ii. M.

Julapium Perlatum. R. Aq. cit. borrag. meliss. ceras. nig. an. unc. iii. spirit. ceras. nig. unc. i. sacch. albiss. dr. vi. marg. præp. dr. i. ss. M. agitentur optimè f. a. S. Julapium perlatum, de quo 3. aut 4. colearia plena in languore sumantur.

Aqua cordialis in Febribus malignis. R. Aq. borrag. bugl. an. unc. i. ss. ceras. nig. acetof. an. unc. i. ros. cinam. an. dr. vi. marg. præp. à scr. i. ad dr. i. bez. orient. gr. vi. man. christ. perl. dr. vi. M. S. Aqua cordialis perlata.

Alia. R. Aq. borrag. bugl. fl. cit. scorz. an. unc. i. ss. card. b. card. M. an. unc. ss. cinam. bugl. dr. ii. spec. de byac. smaragd. præp. an. scr. i. ss. bez. orient. scr. f. man. Christ. perl. q. f. ad gratiam saporis.

Aqua cordialis in Hypercatharsi & fluxibus alvi. R. Aq. card. frig. unc. ii. ss. rub. id. frag. ros. an. unc. i. cinam. bugl. unc. ii. carbunc. unc. i. marg. præp. scr. i. C. C. ust. scr. ii. corall. rub. præp. scr. i. smaragd. præp. scr. ss. spirit. rub. id. dr. ss. ros. scr. i. myro. cydon. unc. ss. M. S. Aqua cordialis peculiaris ad confortandum & fistendum.

Aqua perlata. R. Aq. 4. cord. ceras. nig. an. unc. i. cit. ex toto namph. an. unc. ss. cinam. bugl. unc. ss. marg. orient. præp. scr. ij. magist. corall. scr. i. ss. C. C. ust. præp. scr. i. man. christ. perl. dr. ii. M.

Aqua Confortativa cum confect. Alkerm. R. Aq. borrag. bugl. an. unc. i. ss. ceras. nig. acetos. ros. an. unc. i. cinam. unc. ss. conf. alk. compl. dr. i. marg. præp. scr. i. vel dr. ss. man. christ. perl. unc. ss. M.

Alia in fluxibus sanguinis. R. Aq. perlat. usitat. ceras. nig. cordial. temperat. borrag. bugl. an. unc. j. cinam. cydoniat. dr. iii. corall. rub. præp. marg. præp. an. scr. i. C. C. ust. præp. scr. i. s. lap. bez. orient. gr. iiii. syr. acetos. cit. unc. ss. man. Christ. perl. dr. ii. M.

Aqua confortativa in Gravidis. R. Aq. perlari. usitat. ceras. nig. cord temper. borrag. an. unc. ii. cinam. cydoniat. unc. ss. Bals. embryon. unc. i. lap. bez. or. gr. vii. marg. præp. corall. rub. præp. C. C. philos. præp. an. scr. i. confect. alk. incompl. dr. i. syr. gran. man. Christ. perl. an. unc. ss. M.

Emulsio perlata Montagnanæ R. Aq. Borrog. à flor. in vit. destill. lib. i. marg. præp. dr. iii. aq. cinam. unc. i. M. in mort. marmor.

Alia Craton. R. Marg. orient. præp. vel magist. perl. dr. i. vel perlari. præp. dr. ss. aq. fl. borrag. unc. iii. cordial. frig. unc. i. cinam. bugl. unc. ss. Jul. ros. q. s. M. S. lac perlatum.

Alia. R. Amygd. d. excort. dr. vi. sens. 4. fr. m. excort. an. dr. i. aq. borrag. bugl. an. unc. i. ss. typb. cerv. unc. i. M. f. Emuls. add. magist. perlari. dr. i. sp. ros. rub. idæ. an. gut. xi. man. Christ. perl. q. s.

Electuarium Cordiale. R. Conf. ros. rub. vitriolat. unc. iv. pulp cit condit. unc. ii. condit. cit. unc. i. ss. fl. cit. condit. unc. i. magist. perlari. corall. an. scr. ii. conf. alk. de byac an. dr. ii. syr. perlari. orient. & gran. dulc an. q. s. M. f. Elect. S.

Aliud. R. Conf. ros. rub. unc. iv. bugl. unc. ii. affund.

effund. sp. vitriol. gut. xiii. M. in mortar. lapid. add.
conf. alk. dr. ii. spirit. rub. id. dr. i. syr. fl. tun. q. s.
M. F. Elect. tegend. fol. aur. S. ut supra. de quo interdum quantitas castaneæ sumenda.

Aliud in plapitatione Cordis. R. Conf. ros. rub.
unc. ii. meliss. cit. an. unc. i. conf. alk. de hyac. an.
dr. i. spec. diamarg. fr. diarrbod. Abb. an. dr. ss. cor-
all. rub. præp. scr. i. syr. de limon. q. s. M. f. Elect.
Morselli Cordiales. R. Confect. alk. de hyac. an.
unc. ss. pulv. cordial. Timæi dr. ii. condit. cort. cit.
unc. i. ss. fl. cit. dr. vi. sp. ros. rub. id. an. dr. i. sacch.
albiss. in succ. cit. sol. lib. i. M. S.

Alii simul Stomachici, R. Confect. alk. compl. spec.
morsul. Imperat. an. unc. ss. cort. rec. cit. arant.
dr. iii. amygd. d. excort. unc. i. sacch. in aq. ros.
lib. i. M.

Tabulæ Cordiacæ. R. Cort. exter. cit. condit. dr.
limon. unc. ss. arant. dr. ii. confect. sem. fænic.
alc. dr. i. ss. coriand. dr. iii. carv. dr. i. incid. in
pulv. & leniter contund. add. nuc. mosch. pulv. dr. ss.
pec. aromat. ros. scr. iv. amb. grys. scr. ss. sacch. opt.
unc. vi. mucilag. sem. cydon. aq. meliss. extract. q. s.
M. F. Tabul. s. a.

Aliæ prætiosæ. R. Marg. præp. dr. ii. corall. rub.
ep. succin. alb. præp. dr. i. magist. C. C. ebor. an.
i. ss. sacch. alb. unc. ii. mucilag. sem. cydon. q. s.
M. F. Tabell.

Rotulæ Cordiales. R. Magist. corall. perl. an. dr. i.
conf. alk. dr. ii. ol. destill. cinam. gut. iii. cit. gut. ii.
sacch. albiss. in aq. carbunc. sol. unc. ii. vel q. s. M.
Rotul.

Pulvis Cordialis. R. Corall. rub. præp. dr. vi. marg.
ep. dr. ii. sacch. opt. unc. i. ol. destill. cinam. gut.
M. F. Pulv. S.

Pulvis Cordialis analepticus. R. Corall. rub. præp.
ii. ocul. canc. præp. dr. i. marg. præp. dr. ss. pulv.
analept. frig. Mind. dr. ii. mac. scr. i. sal. acetosell.

gr. xv. sacch. albiss. unc. ii. M. F. Pulv. de quo post pastum cochleare minus, vel per se, vel cum pane vino imbuto sumatur.

Trigæa Cordialis R. Marg. præp succin. præp. corall. rub. præp. C. C. usf. præp. magist. ocul. cane. matr. perl. an. scr. ii. man. Christ. s. unc. i. ss. amb. gr. vii. ol. cinam. gut. iii. carioph. gut. iv. fol. aur. N. vii. M. ad scat. S. Trigæa Cordialis, de qua parvum cochleare plenum, supra bucella panis in vino madidi post pastum sumendum.

Alia pretiosa. R. Marg. orient. præp. corall. rub. præp. scr. iv. lapid. s. pretios. an. scr. i. C. C. usf. præp. scr. iv. amb. opt. scr. ss. mosch. gr. v. man. Christ. s. unc. iii. ss. fol. aur. N. vii. M.

Epithema Cordiale frigidum, in Febribus utile. R. Aq. meliss. borrag. lavend. ros. an. unc. iii. acet. f. run. vel ros. aut fl. famb. vel rub. idem. unc. i. vel ii. spec. pro epiph. cord. dr. i. ss. gr. kerm. pulv. vel spec. diairion. sant. aut cordial. temper. vel lig. aloes aut cort. cit. dr. ss. eroc camph. an. scr. i. album ov. conguass. N. i. M. S. Epithema cordiale & arteriale.

Aliud, quo Spiritus Vitales subito reficiuntur. R. Aq. meliss. lib. i. fl. cit. ros. an. lib. ss. spec. cord. temper. dr. ii. diamb. diamosch. d. an. dr. i. succ. cit. unc. iii. acet. ros. unc. i. vin. alb. lib. ss. M. pro Epithem.

Unguent. Cordiale, R. Ung. ros. unc. ii. spec. pro epithem. cord. subtiliss. pulv. dr. i. diamb. dr. ss. ol. lig. Rhod. vel Bals. ros. scr. ss. camph. scr. i. M. possunt etiam addi ol. deft. cinam. gut. vi. mac. scr. ss.

Aliud. R. Ung. pomat. unc. ss. ol. lig. Rhod. gut. vii. carioph. cit. an. gut. iv. spec. cord. temper. scr. ii. mosch. gr. ii. M.

Saculi Cordiales pro corde & pulsibus. R. Spec. cord. temper. dr. iii. fl. ros. rub. lavend. an. dr. i. meseb. gr. iv. Mi. f. 2. Saccul. cum sind. rub. pro pulsibus &c unus pro Corde, madefiant seq. liquore. R. Aq. ros. lavend.

lavend. an. unc. iij. aq. cinam. unc. ss. acet. ros. dr. x. croc. scr. ss. camph. gr. v.

Alii. R. Fl. borrag. bulg. viol. meliss. anth. an. p. i.
spec. cord. temper. pro epiph. eord. an. scr. ii. cort. cit.
rec. dr. ss. M. f. 2. Saccul. madefac. aqua seq. R. Aq.
Borrag. unc. i. ss. cinam. meliss. an. unc. i. odorif.
Fuchs. dr. vi. acet. ros. unc i.

Aqua odorifera. R. Aq. odorif. Fuchsii unc. i. sp.
uphal. anhalt. camph. dr. i. aq. cinam. destill. dr. i.
ii. M. Vel R. Aq. ros. fragrant. odorifer. Fuchs. an.
unc. ss. acet. rub. idæ. dr. ij. S. Aqua odorifera na-
tibus, cordi, & arteriæ aspergenda.

Alia. R. Aq. ros. frag. unc. i. lavend. cinam.
Elix. vit. an. dr. vi. acet. fl. tun. unc. i. ros. dr. vi.
spirit. ros. dr. i. M.

ARTICULUS VII.

*De Officio Medici, in considerandis &
præscribendis Remediis Stomachicis.*

I.

Medicamenta Stomachica sunt, quæ stomacho
appropriata, illi succurrunt, & quidem, vel
particulis suis volatilibus ignem vitalem adjuvando, &
calorem stomachi promoverendo & conservando, vel
particulis incisivis cruditates liquando, vel villos seu
fibras ejus constringendo, siveque sanguinem & spi-
ritus ejus magis uniendo; atque talia locum habent
in anorexia, dysorexia, læsa chylificatione, ructi-
bus, singultibus, cardialgia, inflatione stomachi,
vertigine sympathica, aliisque ventriculi à frigiditate
orundis symptomatibus, siveque vel aromatica, vel
oleosa balsamica, vel sale volatili in primis oleoso re-
laxata, vel spirituosa, vel carminativa, vel leniter

adstringentia, quæ stomacho succurrunt, fermentum ejus iners & deficiens aciendo & instaurando, qualia sunt omnia sale vel acido, vel volatili potissimum referta, vel fermentum exceedens acrimonia, sive salina, sive biliosa corrigendo, qualia convenient in omni excessiva acredine, ut Cholera, diarrhoea, cardialgia, singultu, soda, aliisque ejusmodi affectibus

I L.

IN usu horum pro debito Regimine Not. 1. In omnibus remediis adhibendis videndum esse, quomodo se habeant erga ventriculum, ac ita semper corrigerendum esse, fermentum, ne calorem vel tonum ventriculi negligamus, ipsique noxam inferamus, & vice versa ita calorem temperandum, ne negligamus fermentum: præ omnibus vero ejus parietes, & villo moderatè adstringentibus firmandos esse. 2. Nimirum refrigerantia ventriculo nocere, cum sit viscus natura sua frigidum, ut etiam nimium laxantia, ut tenuipa, pinguia, oleosa, &c. 3. Ita alterandum evitatur ventriculum, ne contrarius præternaturalis status inducatur. 4. Cavendum esse, ne in alteratione ventriculi alia viscera laedamus, sic in externis providendum, ne laedatur epar, quod proximè incumbit in internis vero, ne vel nimis calefaciendo bilent acuamus, vel nimis refrigerando eam reddamus intertem. 5. Stomachicis calidis minus ex toto resolubilibus, non fidendum esse, quia grossiores particulae remanent, & ventriculum gravant, vel irritant. Non obruendum esse ventriculum copia medicamentorum quorumvis, tum sibi, tum aliis dicatorum. 7. Roborantia magis vacuo ventriculo danda, exceptis alimentis medicamentosis, interim spirituosis quædam, ventriculo à repletione gravato, modice concedenda esse. 8. Topica stomachica frequenter & usitatius parte antica applicari, ubi epate ex parte

parte tegitur, aliquando tamen postica, ubi orificium superius recumbit.

Formulæ

Remediorum Stomachicorum.

DEcoctum amarum, vid. superius de *Antifebribus.*

Aliud in Anorexia proficuum. R. Fol. agrimon. absinth. cent. min. an. m. i. coq. in s. q. ag. font. ad lib. ss. dissolv. sacch. unc. i. M. Vel R. Rad. cichor. herb. absinth. Rom. card. b. an. m. cent. min. m. s. coq. in vin. & ag. cichor. an. mens. dimid. ad 3. p. consumpt. Col. detur m. & v. bonus haustus.

Julapium Stomachale. R. Ag. cinam. opt. unc. vi. ment. meliss. an. unc. iii. ol. vitriol. rite parat. gut. iiij. cinam. gut. vi. syr. de ment. unc. i. ss. M. S. Julapium stomachale de quo 2. aut 3. cochlearia plena sumantur.

Aqua clareta Stomachalis. R. Cinam. crassissim' trit. unc. i. maceretur in lib. i. ag. vit. per se in vase vitro; in alio vase vitro per se & seorsim macer. sacch. albiss. unc. vi. ag. ros. lib. ss. stent seorsim in infus. per 2. vel 3. dies, saepius de die agitando, tandem simul misceantur, & per manicam transmittantur. Dos. cochl. i. vel iiij. jejuno stomacho.

Vinum Hippocraticum. R. Cinam. acutiss. unc. iiij. mac. caryophb. an. dr. ii. cardam. min. dr. i. ss. cort. cit. extern. unc. i. infund. in vin. alb. generos. lib. vi. stent in loco tepido per triduum Colat. edulcor. Sacch. alb. unc. x. Col. iterum bis vel ter per manicam Hippoc.

Rosa folis. R. Ros. sol. rec. m. iiij. nuc. mosch. coriand. anis. ros. rub. sicc. an. unc. ss. galang. zz. caryophb. an. dr. ii. glyc. unc. i. cardam. zedoar. gr. parad. calam. arom. an. dr. ss. sant. cit. dr. i. sant. rub.

cinam. an. dr. vi. aq. vit. opt. lib. vi. infunde per dies aliquot. Col. per manicam Hippoc. add. sacch. opt. lib. i. M. Dos. Cochl. i. vel alterum.

Vinum absinthiacum. R. Herb. absinth. lib. ii. ss. card. b. rorism. an. lib. s. summit. cent. min. unc. iii. rad. caryophyllat. lib. s. fl. sambuc. cort. cit. arant. an. unc. iii. M. incis. & contus. ad saccul. pro amphora musti. S. Species pro vino absinthiaco. Mutata dos. etiam in minori quantitate lib. aliquot vini infundi poterunt, vel solus spiritus absinthii in vino disolvit.

Aliud Vinum Stomachicum. R. Rad. enul. dr. vi. zz. vel zedoar. dr. iii. herb. ment. crisp. absinth. an. m. i. sem. anis. dr. iii. cinam. acut. dr. ii. incis. dentur ad Nodulum pro mens. i. vin. alb.

Mixtura Stomachica. R. Elix. propriet. P. dr. ii. Essent. absinth. scr. ii. ol. mac. gut. vi. M. S. Mixtura Stomachica, de qua 20. vel plures guttae ex brodio sumenda: Alii etiam addunt tinct. chalyb. Vel Sp. sal. armon. Alii solum Elix. prop. P. ad gutt. 20. vel 30. propinant.

Electuarium Stomachicum calidum. R. Conserv. rorism. unc. iii. fl. tunic. unc. ii. condit. zz. chinens. unc. iii. cort. arant. unc. i. ss. spec. diacinam. arom. ros. an. dr. vi. cubeb. unc. ss. cardam. dr. iii. syr. de cinam. q. s. M. f. Elect. S. Electuarium stomachicum confortans de quo bis vel ter in die quantitas nucis sumenda.

Morsuli Stomachi. R. Spec. pro morsul. Imperat. unc. i. condit. zz. chinens. cort. cit. nuc. ind. an. unc. ss. cardam. dr. i. ss. cubeb. dr. ii. ol. destill. cinam. gut. v. mac. gut. vii. caryoph. gut. iv. citr. gut. iii. sacch. albiss. in aq. sassaf. cum cinam. dissol. lib. i. M. f. Morsul. S.

Alii. R. Gr. paradis. dr. ii. affund. aq. cinam. unc. iv. stent in infus. per noct. manè col. in Col. dissolv. sacch. albiss. unc. ix. add. spec. arom. ros. dr. ii. diar-

diarrhod. dr. i. cardam. min. scr. ii. cubeb. dr. ii. condit. cort. cit. arant. cydon. an. dr. vi. zz. Chin. dr. ii. Condit. & aromata incidentur grosso modo f. s. a. Morsul. asperg. spirit. ros. in quo amb. gr. vi. dis-
sol.

Alii, vaporum ascensum ex stomacho prohiben-
tes. R. Sem. Coriand. aut. præp. unc. ss. spec. aro-
mat. ros. diatrion. sant. an. dr. i. Condit. nuc. ind.
unc. ss. carn. cydon. dr. vi nuc. mosch. scr. iv. conf.
ros. vet. unc. i. sacch. albiss. in aq. ros. sol. lib. ss.
M. f. Morsel.

Alii contra Sodam. R. Spec. diacret. Mins. dr. vi.
ebor. ust. dr. i. ocul. canc. præp. unicorn. foss. corall.
rub. præp. an. scr. ii. nuc. mosch. dr. i. cum sacch. in
aq. portulac. s. p. solut. M. f. Morsul. S. Morselli con-
tra Sodam.

Rotulæ Stomachales. R. Rotul. man. Christ. f. unc.
ii. ol. destill. cinam. gut. iv. caryoph. nuc. mosch. an.
gut. iii. cit. gut. ii. M.

Aliæ etiam Bibitoriaæ dictæ. R. Sem. Coriand. præp.
scr. i. fœnic. anis. carv. an. dr. i. nuc. mosch. scr. ii.
mac. scr. i. zz. cardam. cubeb. caryoph. an. scr. j. piper.
alb. long. an. gr. xv. cum s. q. sacch. in aq. carmi-
nat. solut. M. f. Rotul. S.

Aliæ contra Sodam. R. Succ. liquir. inspiss. sacch.
cand. alb. an. unc. i. cret. colon. dr. ii. cum mucilag.
gum. tragac. vel arab. ex aq. veron. fact. M. f. Tro-
chise. Lupinar. S. Rotulæ contra Sodam.

Pulvis Stomachicus. R. Pulv. stomach. Birkman.
unc. ss. vel i. detur ad Scatul. S. Pulvis stomachalis
de quo tres cuspides cultelli plenæ ex brodio vel vino
sumendæ.

Alius. R. Pulv. cort. arant. dr. ii. tart. vitriol.
sal. absinth. an. unc. i. M. f. Pulv. Vel R. Rad.
aron. sicc. pulv. unc. ii. sal. armon. unc. ss. rad. ca-
lam. aromat. dr. ii. cinam. mac. an. dr. i. caryoph. scr.
i. M. f. Pulv.

Alius.

Alius . R. Pellicul. interior. ventric. capon. unc. ii.
nuc. mosch. mac. sem. coriand. anis. fœnic. an. dr. i.
ss. glyc. dr. i. rhodosacch. unc. i. M. f. Pulv. cuius
dos. a dr. i. ad dr. ii.

Pulvis Pepticus . R. Flaved. cort. exter. arant. can.
defact. & minutim incis. unc. ii. confect. sem. coriand.
unc. ii. anis. carv. fœnic. an. unc. i. spec. arom. ros.
dr. ii. sal. absinth. dr. ss. ment pulv. scr. ii. sacch.
cand. ad pondus omnium M. f. Pulv. gross. dos. dr. i.
post singulos pastus.

Tragæa Stomachica . R. Cubeb. dr. ii. cardam. zz
nuc. mosch. an. dr. i. caryoph. dr. ss. cinam. acut. dr.
ii. ol. cit. gut. ix. sacch. ros. tabul. ad pondus omnium
M. f. Trag. S. Tragæa stomachalis , de qua cochlear
plenum post omne pastum, vel supra buccola panis
in vino madidi sumendum.

Alia . R. Coriand. præp. unc. ss. sem. fœnic. anis.
an. dr. ii. cinam. caryoph. an. dr. i. ss. sacch. ad
pondus omnium duplum M. f. Pulv. de quo capiat co.
chl. i. post singulos pastus nihil desuper edendo vel
bibendo.

Alia . R. Sem. anis. fœnic. coriand. an. dr. i. pan.
biscoct. Hispan. nuc. mosch. an. dr. ii. caryoph. scr. iv.
cinam. opt. dr. ii. sacch. fin. unc. iii. M. f. Trag.

Alia . R. Sem. coriand. præp. unc. ss. cinam. spic.
arom. ros. zz. mac. sant. cit. rub. an. scr. i. confit.
man. Christ. unc. iv. ss. M.

Alia in ardore stomachi . R. Nuc. mosch. N. ii.
magist. ocul. canc. mat. perl. succin. præp. C. C. us.
præp. an. scr. i. sacch. cand. alb. unc. ii. fol. aur. N.
vii. M. f. Pulv.

Linimentum Stomachicum . R. Ol. nuc. mosch. per
express. dr. i. ss. succin. rectif. bals. Peruv. an. scr. i.
M. Vel R. Bals. Peruv. ol. nuc. mosch. express. an.
dr. ii. caryoph. scr. i. mastich. destill. scr. ss. laurin. dr.
ii. gumm. ladan. in ol. absinth. dissol. dr. vi. M. S.

Balsamus stomachalis . R. Ol. dest. Juniper. dr. i.
ment.

ment. absinth. an. dr. ss. mac. caryoph. an. scr. ss. cinam. gut. v. Bals. Peruv. scr. i. ol. nuc. mosch. q. s. M. f. Bals. S. Balsamus stomachalis, cum quo stomachus, & os ventriculi calidè illinendus, cui postea pannus calidus imponatur.

Emplast. stomachale Craton. R. Ladan. unc. ii. cer. unc. iv. ol. nuc. mosch. expr. dr. iii. M. S. Emplastrum stomachale linteolis circumbatum, imponatur stomacho.

Aliud. R. Empl. de mast. unc. i. spec. arom. ros. dr. i. ol. nuc. mosch. expr. q. s. M. f. Empl. Vel R. Cerat. stomach. Galen. unc. i. ladan. ol. unc. ss. ol. mast. vel nuc. mosch. q. s. M.

Aliud. R. Empl. de crust. pan. de tacamah. an. dr. iii. malax. cum ol. mastich. add. Bals. Peruv. parum. Vel R. Gumm. tacamah. ladan. an. dr. iii. mast. dr. i. caryoph. dr. ss. cer. flav. dr. iii. ss. ol. destill. mast. gut. xv. ment. absinth. an. scr. ss. Bals. Peruv. scr. i. M.

Cataplasma Stomachicum, pro sistendo Vomitum. R. Ferment. pistor. unc. ii. vel iii. Pulv. ment. crisp. nucif. mastich. an. dr. i. theriac. Androm. dr. ij. acet. ros. q. s. M. pro Catapl.

Aliud stomachicum corroborans. R. Panem mel-lit. q. pl. coq. in vin. Hisp. vel Malv. s. q. ad confit. Catapl. add. mac. cinam. nuc. mosch. caryoph. q. pl. M. S. Cataplasma stomachicum, stomacho calidè imponendum.

Sacculus stomachalis. R. Comar. ment. absinth. lavend. an. m. i. mast. nuc. mosch. tacamah. an. dr. i. fl. anth. lavend. ros. an. m. omnia incisa & sp. absinth. irrorata includ. Saccul. qui gestetur in regione stomachi.

Alius. R. Menth. absinth. an. m. bacc. laur. unc. ss. rad. cyper. galang. caryoph. cort. cit. cinam. mac. an. dr. i. mixta & conquass. includ. Saccul. ex sidon. rub. vino incoq. & calidè applicando.

Alius

Alius pro compescendo Vomitu . re. Herb. absinth. ment. crisp. an. m. i. rad. torment. unc. i. thur. mast. an. unc. ss. coriand. dr. ii. ros. rub. nuc. mosch. mac. an. dr. ss. incisa dentur pro Saccul. coq. in vin. & acet. an. p. &q. qui calide ventriculo admoveatur .

A R T I C U L U S VIII.

De Officio Medici , in considerandis & prescribendis Remediis Epaticis .

I.

REmedia *Epatica* sunt , quæ respiciendo vel vasa , quibus refertissimum est Epar , vel humores & in primis bilem , vel villos , tonumque fibrarum & robur acinorum glandosorum , eidem amica sunt , ac affectibus ejus succurrunt . Hinc agunt , vel vasa obstructa aperiendo , eadem extricando , bilisque amurcam , ac viscedinem mucilaginosam expediendo , qualia sunt amara , aromatica , acrida , ac absorbentia salino-alcalina & martialia ; atque horum usus est in Ictero , cachexia , hydrope , affectu hypochondriaco &c. Vel agunt bilem inertem , aquosam , vel viscidam , aut particulis salinis & sulphureis volatilibus haud instructam acuendo & restaurando , qualia sunt incidentia tum sulphurea , oleosa , aromatica , spirituosa , balsamica , tum imprimis sale volatili polient , & acrida , tum absorbentia humores austeros , acidos , figentes ; atque horum usus est in cachexia , hydrope , anasarca , scirrhis , tumoribus pituitosis &c. Vel agunt bilem acriorem & copiosam , vel nimis mobilem temperando , ac refrænando , qualia sunt diluentia , acida , terrea absorbentia , vel tonum roborando & villos firmando , qualia sunt leniter stiptica , cum partium tenuitate , ac in primis amara , uti etiam absor-

forbentia vitriolata & martalia, quæ maximè sunt Epatica, Icteri, chlorosis, hydropsis, scorbuti, affectus & Melancholiæ hypochondriacæ unicum & summum remedium; magis tamen in laxis & præhumidis, quam siccis subjectis.

I I.

Circa horum usum, Not. 1. Non esse aperientum, citra diluentia ac humores fluxiles reddentia, hinc acidulæ, asylum & extremum plurium morborum sunt remedium, quod vires aperientes, Vitriolicas & martiales, plurimo diluente humore habent immersas. 2. Acidulas, de quibus jam supra specialiter dictum, conducere, ubi salvis pulmonibus, & visceribus, diluendi ac temperandi humores præcipue biliosi, ac laxitas villorum corrigenda, & quidem in habitu corporis magis sicciori & squalido; Thermas econtra, ubi humores acidi magis exsuperant, & corpus laxiori gaudet habitu. 3. Dulcia, exceptis passulis facile bilesendo epar lœdere. 4. In affectibus Epaticis ita adstringentibus tonicis, utendum esse, ne obstruamus; hinc consultissimum, aperientia moderari adstringentibus, & vicissim. 5. Etiam exterius Epatica locum habere, quatenus mediantibus poris virtutes interius fibrant, licet refracte agant, in primis in dolore vel ardore dextri Hypochondrii.

Formulæ

Remediorum Epaticorum.

Decoctum ante-Ictericum. Lindan. Rz. Rad. cich. aut tarax. unc. ii. chelidon. m. a dr. vi. ad unc. i. herb. endiv. aut cich. m. i. ss. vel m. ii. fragar. m. i. ss. marrub. m. ss. tart. alb. ab unc. ss. ad dr. vi. fol. sena. dr. vi. coq. in aq. & vin. an. f. q. vase clauso;

Hinc

Hinc R_E. lib. ij. pro usu, addendo, si præstantius volueris, cui liber dos. sp. tart. rectif. scr. i. M. præmisso Vomitu saluberrimum est.

Aliud. R_E. Stercor. anser. raf. cbor. an. unc. i. chelidon. cum tot. ling. cerv. fl. or. hyper. an. m. ij. croc. dr. ss. vin. alb. aq. font. an. lib. i. coq. ad dimid. f. Col. add. sacc. alb. q. s. & clarif. iv. album ov. dos. unc. v. bis in die.

Infusum ante Istericum Riverij. R_E. Rad. rub. tinct. unc. ss. fol. chelidon. m. m. i. summit. absinth. pont. cent. min. an. p. j. cinam. dr. ss. croc. scr. ss. inf. per noct. in vin. alb. unc. viii. Col. add. sacc. alb. unc. ss. M. capiat m. 3. horis ante Pastum. Hoc, p. p. Istericum recentem plerunque radicitus evellit, per 6. vel 7. dies usurpatum.

Decoct. anti-Hydropicum. R_E. Rad. bryon. rec. unc. i. asar. unc. ss. sal. tart. dr. iii. infund. in f. q. aq. s. stent in loco tepido per noctem, manè add. rad. vincetox. dr. iii. summit. absinth. mi. fl. bellid. m. s. bacc. Juniper. dr. iii. incis. & cantus. confund. simul. ac coq. in aq. s. q. de Col. R_E. lib. i. ss. add. sp. sal. armon. dr. ii. de hoc Decocto capiat ter in die bonum haustum.

Mixtura antihypochondriaca. R_E. Mixtur. f. unc. ss. Essent. cent. min. cochlear. an. dr. iii. trifol. fibr. dr. ii. tinct. mart. dr. i. ss. M. S.. Mixtura aperiens, de aqua 15. gutta ex brodio vel vino sumendæ.

Vinum anti-Cachecticum. R_E. Chalyb. præp. dr. vi. rad. enul. rec. unc. ii. fol. absinth. utriusque an. m. ii. passul. corinth. dr. vi. fol. senn. unc. ii. vin. alb. lib. iv. infund. frigidè per 24. horas, dos. unc. iv. m.

Cerevisia medicata anticachectica & anti-hypochondriaca. R_E. Rad. cich. rec. lib. ss. enul. rec. unc. ii. herb. scolopend. lib. ss. card. b. m. iii. bacc. juniper. lib. iii. incis. & contus. dentur ad Saccul. pro 60. mensur. cerevisie, qui in liquore relinquendus, donec eius peracta fermentatione fiat transvasatio.

Alia Buttleri . R. Beton. salv. agrim. cochlear. absinth. Rom. an. m. iii. rad. enul. raph. rust. an. unc. iv. M. f. Saccul. procerevis. cong. viii. mutatis mutandis , etiam ex his Vina alterantia fieri possunt .

Bodium aperitivum . R. Rad. cich. fœnic. petrosel. an. unc. ss. passul. exacín. unc. i. croc. scr. i. mac. scr. ss. incid. & ventri Gallinæ abscissis alis , collo & pedibus indantur , coq. in s. q. aq. donec caro ab ossibus separetur , servetur jusculum , pro pulv. aperitivis in eo exhibendis .

Electuar. Epaticum. R. Conf. ros. cichor. cochlear. an. unc. i. spec. diatrion. santal. diarrhod. Abb. an. dr. i. arom. ros. dr. ss. condit. rad. cich. unc. ss. nuc. ind. dr. ii. syr. capill. ven. q. s. M.

Aliud . R. Conf. fl. absinth. capill. ven. tamarisc. an. unc. i. condit. rad. enul. cort. cit. an. unc. ss. myrob. condit. N. i. nuc. mosch. condit. dr. iii. confect. alk. dr. ii. spec. diarrhod. Abb. dr. i. sal. absinth. tamarisc. an. scr. ii. croc. scr. i. amb. grys. scr. ss. cum syr. de cort. cit. M. f. Opiat. cuius dos. magnitudo Casan. per 15. dies .

Aliud . R. Passul. corintb. mund. lib. ss. coq. in vin. vet. ad consist. pult. per setaceum trajectis add. conf. anth. cort. cit. condit. an. unc. i. cinam. acut. spec. arom. ros. diatrion. sant. an. scr. ii. aloes odorif. scr. i. croc. scr. ss. M. S. Electuarium epaticum confortans .

Pulvis aperitivus & digestivus . R. Sal. absinth. cent. min. card. b. magist. ocul. canc. tart. vitriolat. an. scr. ii. M. f. Pulv. S.

Alius . R. Croc. mart. aperit. scr. iv. pulv. Epat. rub. sal. absinth. chelidon. mai. cent. min. an. scr. i. divid. in viii. p. æq. sumendos ex brodio aperitivo . Pulveres Cachectici , videantur superius de Chalybeatis .

Pulvis ante Ictericus expertus Timæi , R. Semin. aquileg. dr. vi. croc. oriental. dr. i. tart. vitriolat. dr. ss. M. F. Pulv. divid. in 7. p. æq. sumendus ex vino calido per 7. dies continuos .

Pulvis præcipitans absorbens. R. Ocul. canc. præp. corall. rub. præp. an. dr. ii. matr. perl. præp. C. C. j. ust. præp. an. dr. i. fol. aur. N. v. M. F. Pulv. dol. scr. ii. vel dr. i.

Alius specificus. R. Ocul. canc. præp. corall. rub. præp. unicorn. ver. an. dr. i. antihæcl. Poter. dr. i. ss. cinnab. nat. cinnab. antim. an. scr. ss. extr. castor. scr. i. M. F. Pulv. vel cum solutione tragac. Pilul. potest pro re nata etiam aliquid addi de laud. op. vel theriac. cœlest.

Tragæa Epatica. R. Spec. diarrhod. Abb. scr. in. diatrion. sant. arom. ros. an. scr. ii. sacch. ros. tab. unc. i. ss. sacch. cand. alb. unc. ii. ol. destill. anis. gut. xv. M. S.

Alia, viscera abdominis roborans. R. Spec. diarrhod. Abb. diatrion. sant. an. scr. ii. diacurcum. diatacc. an. scr. i. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr. mac. caryoph. cubeb. cardam. an. scr. ss. corall. rub. præp. dr. i. fol. aur. N. ii. sacch. albiss. unc. viii. M. F. Trag.

Epithema Epaticum frigidum. R. Aq. endiv. ros. portul. nymph. acetos. an. unc. i. ss. acet. ros. unc. i. pulv. ros. sant. rub. spic. ind. an. scr. ss. spec. diarrhod. Abb. diatrion. sant. an. dr. ss. M. S.

Ung. deoppilativum. R. Ung. deoppilat. unc. i. ss. vel. ol. destill. carv. scr. ii. M. Vel R. Ung. deoppil. carmin. an. unc. i. ss. ol. dest. caryoph. gut. v. mac. gut. iii. lig. Rhod. gut. ii. M. Vel R. Ung. santal. dr. x. deoppil. dr. v. ol. dest. lig. Rhod. scr. ss. ol. absinth. q. s. M. S. Unguentum epaticum.

Aliud. R. Axung. molendar. ping. capon. an. uni. i. ol. capp. rut. absinth. an. dr. iii. ung. de alth. popul. an. unc. ss. cer. parum. M. S. Unguentum axungiæ.

Unguentum Epaticum frigidum. R. Cerat. san-
gal. unc. i. succ. cichor. rec. expr. unc. ii. bull. ad succ.
consumpt. add. ol. ros. de capp. an. unc. ss. acet. ros.
dr. ii.

dr. ii. M. Vel. R. Succ. endiv. cich. portul. an. unc.
C. j. mass. cerat. santal. unc. ii. coq. ad succ. consumpt.
dof. add. ol. ros. nymph. ung. infrigid. Galen. an. unc. ss.
M. S.

ub. Emplast. Hepaticum. R. Ung. santal. dr. vi. pulv.
. i. ros dr. i. ss. ol. deft. lig. Rhod. gut. xiv. camph. gr.
ca. iv tereb. & ceræ parum M. F. Emplast. inducendum
Pi. corio coopert. sind. rub. S.

op. Plura de Hepaticis, vide de Præparantibus &
Martialibus, quæ omnia huc spectant, & de quibus
in supra.

ARTICULUS IX.

De Officio Medici, in considerandis Re-
mediis Spleneticis. Antiscorbuticis,
& Nephriticis.

I.

Medicamenta Splenética sunt, quæ Lieni familiaria, affectibus illius succurrunt, & quidem vel motum sanguinis & seri in colatorio hoc suo retardatum tollendo, ac humores ponticos, acidos & austeros, sanguinis partes volatiles figentes corrigo-
ndo, qualia sunt aqua, diluentia & temperantia, leniter amara & aromatica, alcalina fixa & volatilia, alcalina terrea & præcipue Martialia, quæ merito hypochondriacorum & scorbuticorum panacea sunt ac dicuntur, atque hæc prosunt in obstructionibus viscerum, initio hydropsis, cachexia, palpitatione cordis, doloribus & tumoribus hypocondriorum. Immò cum hypochondria sint fomes quasi omnium morborum, hæc p̄sa quoque ad affectus capitis & nervorum sympathicos spectant; vel agunt seri statum volatiliorem,

seu ejus acrimoniam & lixiviositatem respiciendo, unde phlogosēs, ebullitiones, & rarefactio sanguinis major, dolores arthritici, scorbutici vagi, sudores colliquativi nocturni, vigiliæ, inquietudines, pavores &c. quibus medentur tum aqua diluentia, tum acidula, austriuscula, stiptica, terrea; vel respiciendo obstrukiones, ac recrementa pituitosa, tartarea limosa sero immersa, & facile in fabulum cœnosum, arenuias vel calculum ipsum fatiscentia, qualia sunt aperientia generosiora, ut acida, alcalina & enixa, aromaticā, abstergentia, diuretica & nephritica.

I I.

Circa usum remediorum spleneticorum, Not. 1. Ut jam supra dictum, acidulas & thermas unicum sœpè esse spleneticorum remedium. 2. Martialia hypochondriacorum panaceam esse & dici. 3. A præcipitantibus hypochondriacos & scorbuticos haud exiguum quoque accipere levamen. 4. Variare splenética pro vario & diverso ægrorum spleneticorum statu. Nam sicuti volatilia, tam salina quam spirituosa aromaticā, nocent in affectu lienis calido, ita prosunt in frigido. 5. Acida subinde etiam inter spleneticā numerari posse, præsertim vi incisoria in humorum fixitate, vel fixatoria in nimia eorum rarefactione. 6. Diluentia, uti aperientium ita & spleneticorum actionem adjuvare, præsertim ubi serum non abundat, vel stagnat. 7. Lienem volatilioribus, & magis activis gaudere medicamentis, quam Epar. 8. Dulcia etiam spleni minus amica esse, eo quod vi fermentativa potius exsuscitent fervidos, falsos & acres humores, adaucta simul bile, quæ in omnibus Melancholicis simul peccat, unde hysterica, epileptica similia symptomata, facile si non excitant, saltem exasperant.

III.

AD Medicamenta *splenica*, reducentur etiam remedia *antiscorbutica*, scorbuto præcipue dicata, quæ sale volatili abundantia, fermentationes corrugunt, crassos & crudos humores penetrant, eosque subtilem & tenues reddunt, acidum vitiosum destruunt, obstructiones reserant, humoresque peccantes hinc inde discutiunt, & per urinas evacuant. Circa usum horum, Not. 1. Calidioribus & acrioribus cautè utendum esse, præsertim in corporibus rarioris texturæ, & calidioris temperamenti, vel saltem temperatis & blandè acidis miscenda, ut v. g. *Cichor. acetos. succ.* it, vel quod optimum *fero lactis*. 2. Dulcia non facile exhibenda, ac præcipue à faccharo nimio abstinentum esse. 3. Simplicia antiscorbutica recentia & torum succos aut conservas præferenda esse, compositis artefactis, & præcipue decoctis vel extractis, cum sal volatile eorum facile dissipetur & evanescat. 4. In corum usu per 14. dies & ulterius infistendum esse, & 5. vel 6. die lenitivum exhibendum.

Formulæ

Remediorum Spleneticorum, & Antiscorbuticorum.

REmedia Splenetica eadem ferè sunt, quæ Epatica, Martialia & præparantia Aperitiva, hinc suis locis videantur.

Vinum antiscorbuticum. 14. Rad. Armorac. rec. tef-
sulatum incis. unc. iv. sem. erac. quonquass. unc. i. af-
fund. vin. Rben. lib. iv. stent in infus. per triduum
binc Col. dein re. Fol. rec. cochlear. nasturt. beccabung.
an. m. ii. incid. & terantur in mortar. marmor. assund.

colat. superiorē, stent per diem & noct. hinc exprim. sub prælo fortissime, & col. per chart. emporet. addendo tantillum sacch. pro delicatiōribus.

Aliud. R. Herb. rec. cochlear. nasturt. aquat. an. m. iiij. beccabung. acetos. an. m. i. contund. in mort. marmor. affundendo vin. Rbenan. in quo rad. armorac. tefulatim incis. per triduum macerat. lib. iv. stent in Infus. per diem & noctem, hinc exprim. fortissime & Coler. add. succ. cit. rec. unc. iv. sacch. parum M. dos. ab unc. iii ad vi.

Aliud. R. Herb. Cochbl. rec. nasturt. fumar. an. m. i. rad armorac. N. l. enul. unc. i. passul. dr. vi. confus. & conquass. includ. Nodulo infundendo vino, vel si phlogoses excitet, sero laet. vel laet.

Cerevisia Antiscorbutica. R. Fol. cochlear. cardamin. beccabung. trifol. fib. an. m. vi. epat. agrim. ling. cervin. an. m. ii. absinth Rom. m. i. rad. raph. rust. unc. iii. rad. s. aperient. cichor. an. unc. ii. sem. carv. unc. i. ss. cort. exter. limon. N. vi. uv. pass. exacinat. lib. ii. f. Saccul. pro cong. vi. cerevisie.

Mixtura Antiscorbutica. R. Mixtur. s. spirit. coobl. nasturt. bacc. juniper. Essent. trifol. fib. an. dr. iii. M. S. Essentia Antiscorbutica de qua 20. usque 30. gutt. sumendæ.

Succi Antiscorbutici. R. Succ. rec. expr. cochlear. lib. ss. nasturt. aquat. beccabung. an. unc. iii. fumar. cichor. acetos. an. unc. ii. mixta præcipit. cum succ. cit. S. Succus antiscorbuticus, de quo quotidie 4. unc. in brodio sumendæ.

Alii. R. Succ. rec. expr. cich. fum. beccabung. nasturt. aquat. cochlear. an. dr. iii. ser'i laet. capr. unc. iv. M.

Brodium Antiscorbuticum. R. Beccabung. nasturt. aq. cochlear. acetos. Hispan. an. m. ss. raph. mar. unc. ss. minutissime concis. affund. brod. carn. ferv. lib. i. per pannum fortiss. exprim. dos. m. & v. unc. v. cum gut. xv. vel xx. Essent. trifol. fib.

Electuarium Antiscorbuticum. R. Pom. cit. rec. una cum cort. incis. N. iii. fol. cochl. rec. m. iii. nasturt. aq. m. ii. acetosell. m. i. Contund. in mort. marmor. & cum pauco saccb. f. Elect. S.

Aliud. R. Conf. ros. antiq. unc. i. fumar. cochlear. an. unc. i. ss. pulv. troch. de viper. unc. ss. syr. scelotyrb. Forest. dr. vi. vel q. s. M. ad fistil.

Pulvis Antispleneticus. R. Crem. tart. cryst. tart. an. dr. ii. scolopend. tamarise. frax. juniper. tan. dr. ss. ol. mac. scr. ss. M. F. Pulv. S. Pulvis antisplene-
ticus digestivus aperiens.

Unguent. Spleneticum. R. Ol. Chamom. laur. cap-
par. absinib. an. dr. ii. ung. carmin. Minf. unc. i.
Cerat. de cicut. unc. ss. M. S.

Emplastrum Spleneticum. R. Empl. de bacc. laur.
fr. vi. tacamah. unc. ss. Bals. peruv. dr. i. cer. dr.
ii. M. F. Empl. sindone contegendum. Vel R. Empl.
splenet. Cerat. de ammon. an. dr. vi. M. Vel R. Ce-
rat. de Cicut. santal. de bacc. an. vi. malax. cum ol.
capp. & F. Emplastrum.



Formulæ

Remediorum Nephriticorum.

Videantur de Diureticis & Lithontripticis.

ARTICULUS X.

De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Hystericis seu Uterinis.

I.

Medicamenta *HystERICA* seu *Uterina* sunt, quæ utero appropriata, affectibus illius succurrunt, & quidem 1. Vel menses movendo, quatenus vel vias uteri occlusas reserant, vel sanguinis qualitatem vittiosam, pituitosam, acidam, ad motum ineptam corrigit, ut orgasmum menstruum recipiat, vel sanguinem fundunt, & archæum uteri extimulant, vel humores acidos, austeros, stipticos, sanguinem nimis figentes & concentrantes tollunt, uti maximè sunt chalybeata, sine quibus vix aliquid proficitur, vel uterum immedietè abstergunt, ac humores pituitosos, tartareos ac mucilaginosos, vasa obviscantes expellunt, poros dilatant, & uno verbo vias liberas & patulas reddunt, naturamque ad excretionem blandè sollicitant, atque hæc remedia dicuntur *Emmenaga-* *ga*, suntque vel volatilia oleosa, vel salina, volatilia, amara, aromatica, ac præsertim martialia. Vel 2. Fœtus & secundinarum exclusionem promovendo, quatenus vel acrimonia irritante, fœtum ad calcitra- tiones & agitationes irritant, aut uterum stimulant, vel naturam roborant, aut vias emolliunt, aut spiri- tus animales majori copia ad fibras uteri prolixiunt, atque

atque hæc dicuntur *partum facilitantia*, suntque ve
emollientia, vel confortantia, balsamica & nervina,
vel stimulantia, tum salina, tum sulphurea. Vel 3.
Agunt fibras uteri nerveas & membranosas roboran-
do, per nervina, spirituosa, aromatica. Vel 4. Fla-
tus & halitus, seu impuritates, circa & in utero
stabulantes discutiendo. Vel 5. Tandem humores
extravasatos, circa uterum stagnantes resolvendo,
aut humores acidos, lancinantes, absorbendo ac
figendo.

I I.

IN usu horum Not. 1. *Emmenagoga* urgente & au-
rigante natura, non quieta vel invita existente
propinanda esse. 2. Eadem etiam esse fœtum extur-
bantia, hinc gravidis nunquam exhibenda. 3. Ea-
dem justo tempore, id est, ante solitum fluxum vel
novilunium imprimis data, & sèpius repetita, felici-
ssimè juvare. 4. Optimum tempus movendorum
mensium esse vernum, hinc maximè consultum, illo
tempore 6. vel 8. diebus ante mensium tempus ope-
rari. 5. In fœtu excludendo, naturam malle duci,
quam pelli; unde talia medicamenta non propinan-
da, nisi constet de doloribus aperitivis portarum, &
actuali nisu ad excernendum, sicque quo natura ma-
gis indiga, eo magis juvanda, ut in fœtu mortuo,
secundina retenta. 6. Non exhibenda esse partum ju-
vantia, nisi constet de situ Infantis naturali ad par-
tum. 7. Tum puerperis in genere, tum speciatim in
secundinis retentis, convenire bezoardica, putredini
resistentia, & uterum purgantia. 8. Dulcia Hysteri-
cis exosa esse, & quidem illis maximè, quibus vel
fermentum peregrinum uterum inquinat, vel nervo-
sum genus affectum, vel vaporosa miasmata infe-
stant; nam iis subinde conserunt, quibus vis fermenta-
tiva sanguini inducenda, ut in suppressione men-

Cum. 9. Acida pariter vix non omnes l̄dere hystericas, sixatis humoribus & irritatis membranis, licet uterum non ommnia l̄dant. 10. in casu dubio, amenses sint suppressi, vel fœmina grāvida, vix ultra martialia ascendendum, cum hæc non noceant, sed simul roborent. 11. Clysteres uterinos egregiè quidem elutriare & abstergere uterum: virginibus vero & grāvidis non convenire, velut & pessos ac similia topica.

Formulæ

Remediorum Hystericorum & Uterinorum.

Decoctum Emmenagogum. R. Rad. fænic. ap. rub. tinct. pimpinell. an. unc. ss. herb. puleg. arthemis. serpill. calaminth. mont. meliss. an. m. ss. f. cheir. calend. an. p. i. cic. rub. unc. i. ss. bacc. laur. unc. ss. sabin. dr. iii. sem. mil. sol. anis. an. dr. iii. cinam. acut. dr. vi. incis. & conquaſſ. cog. in s. q. aq. f. in Col. lib. i. ss. diſſolv. syr. de arthemis. unc. iii. mixta clarif. & filt. add. effent. croc. gut. xxx. M. S. Decoctum contra menstrua retenta de quo mane, & vesperi potus sumendus.

Aliud. R. Arthemis. rub. m. i. ss. calaminth. orig. meliss. mentast. puleg. an. m. ss. rad. ostrut. fænic. petrosel. pimpinell. cort. arant. an. dr. ii. ss. bacc. juniper. unc. i. sem. fænic. petrosel. genift. hyper. an. dr. iii. cog. in vin. alb. s. q. Cal. & bibatur m. bonus haustus.

Julepus Emmenagogus. R. Succ. limon. lib. ss. cum s. q. facch. f. instar. Julapii ad ignem, addendo sub finem croc. q. f. ad saturatam flavedinem s. Julepus emmenagogus, de quo bis in die 3. cochlearia plena sumenda, & per quatuor dies continuandum.

Jula-

Julapium Hystericum camphoratum . Rx. Camph. dr. ij. incende & saepè extingue in aq. font. lib. i. ad totalem camph. consumptionem Col. dentur cochl. 4. vel s. saepè in paroxysmo Hysterico .

Julapium Hystericum foetidum . Rx. As. foetid. dr. i. ss. solv. in aq. ceras. nig. unc. vi. sine calore in mortar. frig. ut lactescat; sumatur cochl. i. in initio & fine paroxysmi .

Julapium Hystericum moschatum . Rx. Ag. namph. unc. vi. mosch. scr. ss. sang. drac. scr. i. M. pro 2. dos. in paroxysmo .

Potiuncula ad Dystociam vel centies experta . Rx. Aq. meliss. arthemis. cinam. hysteric. an. unc. i. myrrb. el. scr. i. ss. succin. alb. præp. scr. i. croc. scr. ss. M. f. Potiuncula actu calide baurienda & intra 4. horas repetenda, si prima non sortiatur effectum .

Mixtura Hystericia . Rx. Aq. meliss. borrag. an. unc. ij. ss. marg. præp. scr. i. ss. Castor. gr. v. campb. gr. ij. M. S. Mixtura hysterica cordialis cochleatim sumenda .

Alia . Rx. Aq. Ceras. nig. rut. hysteric. alb. an. unc. iii. castor. in dodulo ligat. & in vitro suspens. dr. ss. Sacch. q. s. M. F. Julap. de quo capiat cochl. 4. vel s. in omni languore , instillando primæ dosi , si Paroxysmus urgeat , sp. C. C. gut. xx.

Alia . Rx. Aq. meliss. puleg. fl. chamom. an. unc. i. ss. tinct. castor. cum sp. sal. armon. fact. dr. ss. spirit. meliss. scr. i. ol. destill. succin. gut. iiij. syr. de ment. vel cort. arant. unc. ss. M.

Mixtura in suppressione Lochiorum . Rx. Elix. prop. P. dr. i. ss. Essent. castor. dr. i. M. dos gut. xv. ex vino calido , in quo tantillum croc. mac. & cinam. ebullierit .

Alia . Rx. Aq. arthemis. hysteric. Mins. an. unc. i. ss. cinam. unc. ss. pulv. myrrb. el. sar. i. succin. alb. præp. castor. an. scr. ss. M. pro una vice , & sic pro ceteris .

Potio ad expellendam Secundinam . R. Troch. de myrrh. dr. i. cinam. acut. testicul. eq. præp. an. scr. i. croc. orient. scr. ss. Borrac. gr. v. aq. arthemis. unc. ij. M. pro una dosi.

Vinum Emmenagogum . R. Rad. Curcum. scr. ii. dictamn. alb. dr. ss. coss. lig. cinam. acut. an. scr. iii. herb. meliss. puleg. an. m. ij. cort. flav. cit. arant. an. scr. iv. croc. orient. scr. i. M. incisa dentur ad Nodul. pro mens. i. vin. alb. & mens. s. aq. meliss. destilla. Dos. unc. iv. cum gut. vij. vel viii. tinct. chalyb.

Aliud fortius, pro Secundina quoque aut Fœtu mortuo ejiciendo utilis . R. Fol. sabin. arthemis. dictamn. ceret. rorism. puleg. an. m. ss. rad. aristol. rot. apii. Ireos, rub. tinct. an. unc. ss. bacc. laur. dr. vi. borras. venet. troch. de myrrh. an. dr. iiiij. cass. lign. acutiss. unc. ss. croc. integ. dr. ij. incis. & conquass. affunde vin. generos. q. s. stent. in infus. perpetua in loco calido optime clausa. Detur singulis horis matutinis haustris calidus.

Brodium Emmenagogum, fit ex Decoct. Rad. enul. petrosel. cic. rub. cum cinam. croc. & mac.

Electuarium Lochia provocans . R. Cons. absinth. Rom. rut. an. unc. i. troch. de myrrh. dr. ii. castor. croc. sal. vol. salis armon. ar. fætid. an. dr. ss. cum s. q. syr. de S. rad. M. F. Elect. de quo capiatur magnitudo nuc. mosch. major. tertia quaque hora superbibenda cochl. 4. vel 5. seq. Julepi . R. Aq. rut. meliss. an. une. iiiij. sacch. cand. q. s.

Pilulæ hystericeæ . R. Castor. dr. i. sal vol. succin. dr. ss. cum s. q. Bals. Peruv. M. F. Pilul. N. xxiv. capiat tres singulis noctibus, superbibendo cochl. ii. vel iiiij. aq. hyster.

Aliæ. R. Myrrh. el. galban. an. dr. i. ss. castor. gr. xv. cum s. q. Bals. Peruv. M. f. Pilul. ex dr. i. N. xii. sumat 3. singulis noctibus.

Aliæ Camphoratæ . R. Campb. scr. ii. castor. dr. i. ss. fætid. scr. iv. sem. dauc. sylv. dr. i. ss. syr. de ar-

ib.

zhenis q. s. M. F. Pilul. 6. ex dr. i. vel R. Pulv.
sem. vitic. unc. ss. rut. as. fætid. campb. an. dr. i. ca-
stor. dr. ii. ol. succin. gut. xx. syr. de artemis. q. s.
f. mass. Pilular. Dos. à scr. ss. ad g. xv. tertia qua-
que hora in paroxysmo Hysterico, & præterea hora somni
extra paroxysmum singulis noctibus.

Pilulæ in Mensium diminutione & conjuncto dolo-
re. R. Extract. aloes, eroc. myrrb. castor. an. gr. viii.
laud. op. gr. vi. ol. sabin. gut. v. M. F. Pilul. N.
xxviii. Dos. N. vii. tribus diebus ante eruptionem
mensium, sub hora decubitus.

Pulvis Hystericus expertus Timæi. R. Fæcul. bryon.
scr. ii. marg. præp. scr. i. castor. gr. xxv. ol. dest. rut.
succin. alb. an. gut. v. M. F. Pulv. divid. in 3. p. æq.
& repetitis vicibus, si opus fuerit, ori infundatur
cum vino calido, in quo tantillum mac. & croc. bul-
lierit.

Pulvis Partum provocans. R. Myrrb. el. scr. i.
succin. alb. borrac. an. scr. ss. cinam. gr. viii. M. F.
Pulv. sumendus ex aqua lil. alb. hyster. & puleg.

Alius. R. Epat. anguill. exsicc. & pulv. vel æga-
gropil. aut testic. eq. præp. à dr. ss. ad dr. i. Borrac.
venet. scr. i. M. detur ex aq puleg. meliss. & hyster.

Pulvis Emmenagogus. R. Bacc. laur. massa panis
circumdact. & in clib. coct. unc. ss. sumit. cent. min.
myrrb. rub. croc. an. scr. i. cinam. sabin. aristol. rot.
dictamn. alb. an. gr. xxiv. M. F. Pulv. Dos. a dr. ss.
ad scr. ii.

Alius. R. Rhab. cl. dr. ii. puleg. absinth. sabin.
bacc. laur. an. dr. i. mac. dr. ss. croc. scr. i. M. F.
Pulv.

Alius. R. Rad. dictamn. alb. dr. iii. zedoar. calam.
arom. cinam. mac. croc. cort. cht. an. dr. i. troch. de
myrrb. borrac. venet. an. scr. iv. sem. nigell. dr. ii.
fænic. cumin. anis. bacc. laur. an. dr. i. M. F. Pulv.
cujus dos. dr. i.

Alius. R. Crem. tart. cryst. tart. an. dr. ii. sal.
aribe-

arthemis. absinth. puleg. meliss. spirit. sal. coagul. an.
dr. ss. pulv. agar. rad. asar. gial. an. dr. ii. Rhab.
ver. dr. i. croc. orient. scr. i. troch. de myrrb. dr. i. ss.
ol. mac. sabin. an. scr. ss. M. F. Pulv. subtiliss. cuius
dos. dr. i. ex aq. meliss. puleg. &c.

Tragæa Emmenagoga . R. Spec. dianth. diarrhod.
Abb. an. dr. i. pulv. asar. Rad. Ir. cyclam. dictamn.
alb. aristol. rot. Cyper. gentian. zedoar. an. scr. ii. suc-
cin. alb. myrrb. cinam. an. dr. ss. sem. sesel. dauc.
an. scr. i. Essent. cit. saccharin. ad pondus omnium f.
Trag.

Pediluvium in suppressione Mensium . R. Herb. ar-
tbemis. meliss. puleg. rorism. an. m. ii. s. fl. chamom.
calendul. an. m. i. bacc. laur. unc. i. ss. M. incis. &
contus. ad chart. S. Species pro pediluvio.

Emplastrum Matricale . R. Empl. matrical. Au-
gust. vel gumm. carann. unc. i. extend. super alut.
Vel R. Galb. tacamah. an. unc. ss. dissolv. & extend.
super alut. ac infra umbilic. applicetur . Vel R.
Galb. in tinct. castor. solut. col. dr. iii. tacamah. dr.
ii. M.

Suffitus humidus in suppressione Mensium vel Lo-
chiorum . R. Herb. matricar. puleg. an. m. i. sabin. m.
ii. bacc. laur. juniper. an. unc. i. pom. colocynth. unc. i.
incis. grosso modo dentur ad chart. S. Species pro fo-
mento . ebull. in aq. commun. cuius vapor fervidus
excipiatur per infundibulum , in sella undique clausa .
Si citius liquor deferveat , injectione silicis vel chalyb.
igniti denuò calefieri potest .

Suffitus siccus in eundem finem . R. Sabin. m. ss.
myrrb. dr. ii. asphalt. troch. alband. an. dr. i. M. F.
Pulv. Vel R. Caryoph. cinam. mac. an. dr. ii. bacc.
juniper unc. ss. sem. nigell. dr. i. styrac. calam. dr. ii.
M. F. Pulv. gross.

Odoramentum in passione Hysterica . R. Castor. as.
fætid. an. dr. ss. ol. succin. scr. ss. M. & in serico in-
volve f. Nodul. naribus admotendus . Vel R. Galb. as.
fætid.

fætid. an. dr. ii. castor. dr. i. ss. sal. vol. succin. dr. ss.
M. f. Nodul. vel sepius olfaciar sp. sal. armon.

Enema Hystericum. R. Decoct. commun. vel Emoll.
unc. x. camph. dr. i. ol. rut. unc. ss. mell. mercurial.
unc. iii. M.

Aliud . R. Herb. mercurial. pariet. arthemis. puleg.
rut. calam. an. m. i. sem. carv. cumin. bacc. laur. an.
dr. ii. coq. ad lib. i. in Col. dissolv. elect. bier. pic. be
nedit. laxat. an. unc. ss. vel dr. vi. ol. rut. unc. ii.
camph. ser. ss.

Aliud in Partu difficulti . R. Herb. mercurial. malv.
arthem. fl. chamom. an. m. i. fl. lil. alb. p. i. rad. alb.
bryon. arist. rot. an. dr. vi. coq. in s. q. aq. in Col. unc.
viii. dissolv. Elect. lenit. dr. vi. ol. lil. alb. amygd. d. an.
dr. vi. vitell. ov. N. i. Borrac. venet. dr. ss. M.

ARTICULUS XI.

*De Officio Medici, in considerandis & pre
scribendis Remediis Arthriticis.*

I.

Medicamenta Arthritica seu articularia sunt, quæ articulis appropriata, affectibus eorum succurrunt, tum respiciendo serum, quod vel exsiccant, ejusque quantitatem absumunt, ut v. g. china, sassafras &c. Vel qualitatem ejus acrem diluunt & temperant, ut lac, emuls. &c. Aut invertunt & absorbent, ut martialia, antiscorbut. &c. Vel resolvunt, feroque fluxibilitatem fœnerantur, ut cinnabarina, tum respiciendo nervos, membranas, tendines & ligamenta per roborantia, qualia sunt, quæ sulphure balsamico oleoso suavi & roscido pollent, tum mitigando dolorem ipsum urgentem, à tensione & vellicatione membranarum criundum, tum intus, per emuls. cinn-

cinnabarina, tum extrinsecus, per paregorica ac nervina, spirituosa sulphurea & urinosa, ac præsertim è lumbricis & formicis parata.

I I.

Circa usum horum Not. 1. Sæpè optimum Medicamentum topicum arthriticum esse, non uti topoico, cum sanè præstet internis tollere causam morbificam, roborare genus nervosum, & acrimoniam demulcere, quam externis inhærere. 2. Cavendum esse, ne, dum per externa juvare intendimus, articulorum tonum destruamus, vel serum nimis exhauriendo, vel nimis laxando ut magis influat, vel ad partes principaliores repellendo. 3. Dextro oculo corpus: sinistro articulos respiciendos esse, nisi malum fuerit à causa externa. Videndum igitur, ne ipsi negligantur articuli, neque etiam ipsa viscera & massa sanguinea. 4. Topica, dum blandiuntur sensu, sæpè insidiosa esse motui, adeoque ita sensui tristi medendum esse, ne motum cum sensu auferamus. 5. Non constantem æquè affectum exspectari posse à quocunque topoico, cum localia sæpè exasperent dolores & morbum, ac quæ una vice profundunt, altera noceant, atque ex his feliganda, in primis defensiva & roborantia. 6. Quæcunque magis impingunt & figunt humores, præ ceteris nociva esse articulis, ut repellentia. 7. Unctuosa quoque, pinguis & emplastica, minus competere certum est in arthritidis, hinc frequens docet experientia, unguenta, emplastra & similia, plus damni dedisse podagrīcī: immò plures ex arthritide vaga hoc modo fixam sibi accessivisse, plurimos etiam tophos; adeò, ut tales podagrīci contracti & consummati revera captivi fiant, ex intempestivo topicorum emplastrorum, aliorumque usu. Distinguenda igitur sunt articularia Medicamenta, pro distinctione morborum, quibus obsidentur articuli.

Formulæ

Remediorum Arthriticorum.

VINUM Arthriticum purgans. RE. Chin. sarsapar.
an. unc. ii. polyp. querc. unc. iii. Rhab. senn.
an. unc. i. gial. dr. vi. caryoph. dr. i. vin. alb. lib.
vi. inf. f. a. & Col. dos. unc. iv. quotidie per dies
viii. vere & autumno, vel etiam imminente Paroxysmo.

VINUM Arthriticum alterans. RE. Sarsapar. guajac.
an. unc. i. visc. querc. dr. vi. fol. sicc. chamæd.
chamæpyth. salv. an. unc. iii. fl. primul. ver. rorism.
lil. convall. an. unc. ss. hyper. dr. vi. vin. alb. lib. x.
inf. per dies 3. f. Col. dos. unc. ii. bis in die per dies
30. vel post usum vini prioris.

VINUM Antipodagricum Paracelsi. RE. Rad. caryophyllat. acor. an. unc. i. fol. majoran. m. iv. fl. sambuc. p. iv. infund. in vin. lib. iii. stent. in infus. per
viii. dies sumatur ex hoc m. & v. haustus.

Aliud. RE. Sarsapar. rad. chin. lig. sassafr. an. dr. i.
ss. rad. Pœon. irid. flor. an. dr. ii. caryoph. dr. i. herb.
chamæd. dr. ii. beton. salv. an. dr. i. fl. hyper. primul.
ver. an. dr. ss. mac. dr. ss. sem. coriand. præp. scr.
iv. incid. & contund. pro vin. alb. mens. iii. ss. detur
primus haustus ad pastum.

Electuarium amarum Antipodagricum Sydenham.
RE Rad. angel. calam. aromat. imperat. enul. fol. absinth.
vulg. cent. min. marrub. alb. chamæd. chamæpyth.
scord. calaminth. hyper. virg. aur. serpill. ment.
salv. rut. card. b. puleg. abrot. fl. cham. tanacet. lil.
convall. croc. sem. thlasp. cochlear. carv. hacc. juniper.
an. q. pl. mell. despum. & vin. Canariens. q. s. M. F.
Elect. dos. dr. ii. m. & v.

Aliud. RE. Sarsapar. unc. iv. sem. hyper. fol. chamæpyth.
camæd. an. unc. iii. arist. rot. dr. vi. angel. cinam.

cinam an. dr. ii. caryoph. scr. iv. croc. scr. ii. omnia
in tenuissimum pulverem redacta incorpor. cum s. q. mell.
Hispan. coct. f. Opiat. qua natatur æger per integrum
annum, sumendo quotidie diebus veris, hyemis & au-
tumni dr. i. ss. aestate dr. ij. diebus canicularibus omni-
no abstineat.

Pilulæ Antipodagricæ. R. Rad. aristol. rotund. long.
an. unc. ss. polyp. querc. dr. ii. C. C. phil. præp. sal.
vol. lumbric. terrest. an. dr. ss. cran. bum. præp. dr. ss.
cum gelat. C. C. M. f. Pilul. ex dr. i. N. xxxx. as-
perg. pulv. sant. cit. sumantur N. viij. m. & v. pro
integrum annum, si affectus radicatus.

Alix. R. Pulv. castor. opt. unc. ss. succin. alb. cha-
mæd. chamæpyth. an. dr. vi. sal. succin. ceruss. antim.
Bals. Tolut. an. unc. i. rad. petaſit. dr. iii. tereb. ve-
net. unc. ii. Bals. sulph. tereb. q. s. M. F. massa pi-
lularis dos. dr. ss. bis in die, per menses duos vel
tres, bibendo propotu decoct. Jarsapar. chin. rad. peta-
ſit. cum uv. pass.

Pulvis Antipodagricus. R. Pulv. fol. chamæd. cha-
mæpyth. cent. min. maior. salv. beton. rad. gent. aris-
tol. rot. an. unc. i. sacch. lib. i. M. f. Pulv. Vel R.
Pulv. fol. salv. vel chamæpyth. lib. ss. ocul. canc. sacch.
an. unc. ii. M. F. Pulv. alii etiam addunt ossa huma-
na ped. calcinat.

Pulvis Arthriticus Wepferi. R. Lumbric. terrest.
præp. unc. ss. C. C. phil. præp. ungul. alc. præp. an.
dr. ii. ol. nuc. mosch. expr. gut. iv. sacch. albiss. unc.
i. ss. M. dos. m. dr. i. & v. dr. ss.

Alius ejusdem. R. Antim. diaphoret. cum triplo nit.
deton. dr. i. ss. sal. vol. lumbric. vel viper. scr. ii. cinnab.
antim. ter cum cinnab. nat. sublimat. scr. i. C. C. phil.
præp. dr. i. ss. ol. cinam. gut. ii. M. F. Pulv.

Pediluvium Podagricum. R. Rorism. hyper. puleg.
laur. arthemis. an. m. iii. sal. nig. lib. i. sal. armon. unc.
ii. surf. mac. unc. vi. Cog. in aq. cong. ii. add. sapon. venet.
unc. ii. sp. vin. lib. ii. M.

Aliud

Aliud ad firmando articulos podagra debilitatos, ac simul à crebriore recidiva præservans. R. Bacc. Juniper. lib. ss. herb. rorism. m. vi. serpill. salt. an. m. ii. M. S. Species coq. in s. q. lixivii commun. non adeò acris. Decoct. decantato cum vel sine Col. immittuntur pedes, coercendo balitus integumento vase superimposito, conservando cestum vel novo decocto, vel silice candefacto immisso.

Aliud. R. Salv. rorism. chamom. arthemis. hyper. absinth. vulg. an m. vi. sal. nig. m. iii. coq. in aq. cong. iii. ad ii. f. col. pro Fatu.

Fomentum in doloribus Arthriticis frigidoribus. R. Aq. Arthrit. vel Anhalt. unc. ii. spirit. iuniper. unc. iv. spirit. vin. opt. lib. ss. M. Vel R. Spirit. iuniper. unc. iii. rorism. lavend. an. unc. i. alum. crud. dr. iii. M. S.

Aliud in dolore Dorsi. R. Aq. vit. unc. vi. quibus infund. fl. rorism. salv. lavend. maioran. an. p. ii. cardam. dr. i. castor. scr. i. stent in vitro probè clauso in digestione, vitrum quotidianè agitando, de hac aqua. R. Unc. ii. aq. salv. destill. spic. scr. i. M. manus imbuatur hoc liquore & f. unc. ss. ol. destill. Friccio supra dorsum.

Aliud expertum in dolore Ischiadico. R. Bacc. juniper. unc. ss. piper. nig. mast. el. an. dr. ss. M. F. Pulv. gross. indendus vitro angust. orificii, superaffund. Spirit. vin. alkoholis. unc. iv. sp. iuniper. unc. ii. stent. in digest. per hor. 4. vel v. postea in Col. in mortar. frig. dissol. sapon. venet. dr. ii.

Fomentum in dolore Podagrico. R. Lapid. pum. dr. iii. medicamentos. Croll. dr. v. alum dr. ii. sal. comm. dr. i. sulph. scr. ii. castor. mum. an. scr. i. myrrb. scr. iv. croc. gr. xii. infund. per hor. xii. in loco calido in aq. spermat. ran. unc. viii. verbasc. unc. iii. vin. alb. unc. iv. acet. squill. unc. i. ss. add. mell. despum. unc. i. bull. parum in duplice vase. Col. add. sp. tart. scr. iv.

Aliud. R. Tinct. croc. cum spirit. vin. parat. unc. iv. camph. op. an. dr. i. diger. loco calido ad dis. solut.

Aliud. R. Spirit. vin. rectif. unc. viii. sp. Sal. ar. mon. dr. iii. camph. dr. ss. tinct. op. castor. an. scr. ii. M. Vel seq. Wepferi. R. Butyr. antimon. dr. i. sp. vin. lib. ss. M. Vel seq. Grulingii, quod intra 2. horas dolorem sedare dicitur. R. Caput mort. vi. triol. acet. destill. an. unc. ss. opii thebaic. dr. i. aq. chelidon. maj. fl. sambuc. an. unc. viii. M.

Unguentum Antiparalyticum. R. Ol. lumbric. unc. ii. philosoph. unc. ss. vulp. laur. rutac. an. unc. i. ol. dest. succin. scr. i. major. salv. rorism. an. gut. xv. pingued. castor. dr. ii. M. inung. spinam & latus paralyticum bis in die premissis frictionibus.

Unguentum Nervinum. R. Ung. nerv. unc. i. ss. ol. laur. unc. ss. lumbric. dr. iii. vel R. Ol. juniper. petrol. an. unc. i. succin. dr. ii. vel R. Ung. nerv. unc. ij. Ol. tereb. chamom. aneth. an. dr. ii. juniper. philosoph. petrol. an. dr. i. sem. urtic. scr. i. M.

Emplastrum Antipodagricum. R. Op. sapon. v. net. an. unc. ss. Emplast. diacalcit. unc. ii. M. f. a. Vel R. Sacch. saturn. rub. unc. ix. olei lib. i. sapon. alb. unc. ii. cer. unc. i. coq. s. a.

Emplastrum Ischiadicum. R. Gumm. carann. vel apud vulgares pic. naval. unc. i. ss. extend. super alut. Vel R. Pic. naval. unc. ii. sulph. commun. subtiliss. dr. iii. mast. dr. i. tereb. unc. ss. M. posset etiam addi castor. vel Gumm. ammon. aceto dissol.

Aliud. R. Emplast. de melilot. diapalm. an. unc. ss. vel Empl. diapalm. diaphoret. Mins. an. unc. i. sal. armon. scr. ii. malax. cum ol. chamom. & lumbric.

Cataplasma anodynum Antipod. R. Medull. pan. alb. unc. iii. macerentur in lact. ebull. ac coque parum, binc adde vitell. ov. N. ij. pulv. fl. chamom. dr. i. croc. scr. i. M.

Aliud

Aliud Domesticum. R. Herb. rap. ex aqua compressa postea in frixura frixa, imponatur calide.

Suffitus in doloribus Articulorum. R. Succin. cit. unc. i. ss. lign. iuniper. unc. i. thur. dr. ii. myrr. dr. iii. M. incis. & contus. dentur ad scatul. Vel R. Succin. flav. unc. ii. mast. et. unc. ss. sum. mit. rorism. lavend. fl. calend. an. dr. vi. bacc. iuniper. unc. i. M. F. Pulv gross. cuius suffitus in linte molli aliquoties complicato excipiatur, ac applicetur.



C A P U T X.

De Officio Medici in Affectibus indicantibus Adstringentia, Stegnotica, Hypnotica, Anodyna & Vulneraria.

A R T I C U L U S I.

De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Remediis Adstringentibus,
& Sanguineis fistentibus.

I.

Medicamenta Adstringentia sunt, quæ quidquid laxum est adstringunt, utilia præsertim in vomitu, diarrhœa, lienteria, dysenteria, gonorrhœa, fluore albo, aliisque similibus affectibus; vim suam exercent, vel villos seu fibras molliores, flaccidas & expansas cogendo, roborando, contorquendo & uniendo, vel poros cutis, vasorum, meatuum & viarum corrugando, crispando, colligando, incuneando, contrahendo, obliniendo, replendo, ac obstruendo; quo etiam spectant condensantia & emplastica, vel humores efferatos, fluxiles, tenues & impetuose motos, in impetu suo coercendo, ipsosque incrassando, inviscando, concentrando, cohibendo & refrænando. Inter adstringentia sunt, tum terrea exsiccantia & absorbentia, tum acerba & austera, tum acida humores fluxiles coagulantia & quasi figrantia, tum emplastica, tum narcotica, martialia, tum etiam escharotica, non quidem propriè, sed quatenus & humorem

rem fluentem absumunt, & crustam inducunt partibus propugnaculi loco, atque adstrictionem post se relinquunt. Huc etiam refero Medicamenta *Isthema*, seu *stegnotica* & sanguinem sistentia, ut intra alveos suos commoretur, nec extravasetur; qualia itidem sunt, vel respicientia sanguinis orgasmum, rarefactionem, & ebullitionem ejus sistentia, ut præcipitantia, terrea, temperantia aqua, refrigerantia acida; vel respicientia sanguinem seroitem, fluxiliorem & acriorem, ut incrassantia, adstringentia, opata; vel vasorum oscula aperta, ut consolidantia, glutinantia, sanguinem imbibentia, coagulantia, & sanguinem in crustam quasi redigentia, cauterizantia, quæ torrefaciendo sanguinem, & vasa crispando ac occludendo, sanguinem fistunt.

II.

IN usu horum omnium. Not. 1. Adstringentia debere esse convenientia tum partibus, quibus debentur, tum humoribus & causæ, sit ventriculo magis convenientia adstringentia aromatica vel acida: in affectibus pulmonum miscenda resolventia: in affectibus epatis penetrantia acida, in affectibus capitum balsamica, si materia fluxilis & acris, magis mucilaginosa, si maligna, quæ simul bezoardica. 2. Nunquam nimis adstringendum esse, ne subsident nimis pori, & hinc vix relaxari queant, praesertim etiam, cum subinde fluxus moderari potius quam sisti petant. 3. In affectibus pectoris in genere parci adstringentibus utendum esse, tum quia tonus pulmonum laxitate gaudet, tum quia facile vitiosa materia ob viciniam ad cor repelli potest. 4. In usu adstringentium semper rationem habendam esse ventriculi, nec fermentum ejus destruatur. 5. Adstringentium vim augere anodyna vel opata, ac moderari resolventia, perpetuo miscenda in sputo ac vomitu cruento,

casu ab alto , &c . 6. Vim adstringentium , ubi paulo post remittit , novis dosibus juvandam esse .

I I I.

Præterea 7. Not. Adstringentibus liquidis , vel particulas laxiores habentibus , minus fidendum esse , ut v. g. dulcibus , syrups , clysteribus , fomentis , balneis , unguentis &c . 8. Adstringentia non commodè dari cum cibis . 9. Fluxu sanguinis , oriundos vel ab obstructione vasorum , & ordinario dengato spatio , vel humorum orgasmo & copia , minus tolerare adstringentia : plus verò , ut v. g. purgantia , aperientia & imprimis acida . 10. Adstringentia alimentosa , ventriculum debiliorem habentibus , ante cibos reliquos assumpta , adstringere : post assumpta , alvum laxare , fibris nempe superioribus constrictis , & inferioribus laxatis . 11. Adstringentia externa actu frigida applicari , v. g. ubi repellendum , ubi sanguinis rarefactio , impetus & effusio sistenda , v. g. adhibita testibus , hypochondriis , & in primis fronti , unde anacollemata & frontalia , ex adstringentibus actu frigidis confici & adhiberi solent , cum cerebro nocere nequeant , obstante ossium vallo : minus frigida locum habent in thoracis , ventriculis , epatis & uteri affectibus . 12. Adstringentia uti & opiate , in dysenteria intra 6. 7. horas efficaciam suam deperdere ; hinc repetenda , neque ab eorum usa cessandum . 13. Adstringentia longè efficacius adhiberi in forma sicca , ut pulv. trochisc. pilul. quam humida , utpote citius defluente extrinsecus etiam in forma emplast. cerat. frontal. quam foment. Bals. clyst. unguent. &c . 14. Adstringentia non debere esse in usu , quibus alvus siccior & quibus menses fluxuri sunt ; observandum tamen in hoc casu , quid magis urgeat . 15. Aromatica adstringentia , ut v. g. nucem mosch. mastich. terreis mixta ; diarrhoeis , dysenteriis & vomitibus maximè amica esse .

esse. 16. Topica sanguinem sistentia, illis locis applicanda esse, ubi vel immediatè id opus est, vel sanguis magis refrigerari potest, sic applicantur bregmati, fronti, sub lingua, nuchæ, naribus, collo, hypochondriis, testibus, plantis pedum, sub axillis &c. 17. Ligaturas leviores extermorum, pro remorando sanguine non esse inutiles, quo nomine quoque frigida, ut lapides & similia, præter affluxia, quæ præstant, arctius manu vel sub axillis detenta, commendantur, in quibus tamen non excedendum, præsertim, si impetuosus sanguinis motus conjunctus. 18. Caustica & corrosiva, ad hæmorrhagias sistendas, non æque semper tuta esse. Nam licet initio venas adstringant ob partes stipticas, corrodendo tamen postmodum & irritando, gravia symptomata inducere valent, hinc ignis actualis melior.

Formulæ

Remediorum Adstringentium & Sanguinem sistentium.

DEcoctum *Timæi* comprobatisimum, ad Hæmoptysim & reliquos fluxus sanguinis. *R. Rad. Symp. mai. unc. i. ss. plantag. pimpinell. an. dr. ij. tormentill. unc. ss. alth. liq. an. dr. iii. herb. burs. past. prunell. polyg. chærefol. consolid. med. sanic. an. m. i. fl. ros. rub. hyper. bellid. cum tot. an. m. s. sem. hyper. dr. iii. incis. grosso modo inf. per noct. in s. q. aq. manè coq. de *Colat.* cum album. ov. clarif. *R. Lib. ii. ss. add. syr. de Symp. unc. iii. de alth. unc. ij. oxymell. s. unc. i. ss. M. S.**

Aliud. *R. Rad. Symp. torment. glyc. an. unc. ss. herb. veron. centinod. sanc. millefol. alcbimit. agrim. an. m. ss. fl. ros. balaust. bellid. min. an. p. ii. nuc. pin. unc. i. santal. rub. unc. ss. coq. in s. q. aq. font. de*

Colat. R. Lib. ii. dissolv. syr. de ros. sicc. de symph.
Fernel. an. unc. i. M.

Julepus in Hæniorrhagiis. R. Aq. frag. unc. vi.
burs. past. endiv. cich. ros. an. unc. iii. syr. corall. unc.
iii. frag. papav. errat. an. unc. i. ss. succ. cit. acid.
unc. ii. M. Vel R. Tint. ros. cum s. q. sp. vitriol. lib.
ii. Vel R. Syr. pro tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font.
lib. ii. sp. vitriol. q. s. M.

Mixtura stegnotica Sylvii. R. Aq. plantag. unc. iii.
cinam. dr. iii. acet. vin. dr. iii. corall. rub. præp. terr.
fig. vel sang. drac. an. scr. i. laud. op. gr. iii. M. Ca-
piat cochleatim.

Alia. R. Aq. plantag. fol. querc. burs. pastor. centi-
nod. an. unc. i. ss. lapid. hæmat. præp. corall. rub.
præp. carneol. præp. an. scr. i. sperniol. Croll. scr. ss.
syr. corall. papav. errat. an. unc. ss. M.

Emulsio adstringens, in Fluxibus sanguinis. R. Sem.
papav. alb. dr. iii. 4. frig. m. excort. an. dr. i. amygd.
d. unc. ss. aq. plantag. portul. ros. an. unc. i. ss. M.
F. Emuls. add. pulv. Stegnor. Guttman. scr. i. corall.
rub. præp. scr. ss. rotul. man. Christ. perl. dr. i. spirit.
frag. gut. xi. M. S. Emulsio adstringens fluxum san-
guinis, ante cubitum sumendæ.

Alia. R. Amygd. d. rec. unc. ss. sem. melon. excort.
dr. ii. papav. alb. dr. i. ss. plantag. dr. ss. aq. fol.
querc. plantag. burs. past. an. unc. i. ss. M. F. Emuls.
add. lap. hæmat. præp. corall. rub. præp. an. scr. i. vel
lap. crysolit. sang. drac. nit. perl. an. scr. ss. faceb.
perlat. dr. ii. M.

Alia anti-Dysenterica. R. Amygd. d. non rancid.
unc. i. ss. aq. dysenter. Dorncreull. unc. iii. ros. fol.
querc. an. unc. ii. M. F. Emuls. cui add. C. C. ust.
præp. dr. i. marg. præp. corall. rub. præp. an. sc. i.
spirit. rub. id. rosar. an. scr. i. rotul. man. Christ. dr.
ii. ss. M. S. Emulsio adstringens.

Alia. R. Amygd. d. excort. unc. i. ss. ag. in qua
aur. ignit. ter. extinct. vel decies chalybeat. lib. i. ss.
M. F.

M. F. Emuls. add. man. Christ. perl. dr. vi. M. Vel
R. Amygd. d. unc. i. sens. melon. dr. vi. papav. alb.
dr. ii. C. C. ust. præp. scr. ii. aq. plantag. lib. i. M.
F. Emuls. add. Jul. ros. unc. i. M.

Bromium anti-Dysentericum. R. Pimpinell. sanguisorb.
fol. cicbor. millefol. plantag. an. m. i. fl. ros. rub.
p. i. cum frusto carnis. f. Juscul. cui add. Rhab. tost.
dr. ss. vel scr. ii. M.

Electuarium in Hæmoptysi, longo usu probatum.
R. Conserv. ros. vetustiss. unc. iii. pulv. rad. consolida.
trum. utriusque, sem. portulac. mastich. bol. armen.
tragac. scr. i. ss. cum syr. de symph. F. Elect.
molle.

Aliud. R. Cons. ros. rub. unc. iii. symphyt. unc. i.
pulv. sem. hyosc. papav. alb. an. dr. i. spec. diatrag.
frig. dr. i. ss. lap. hæmat. præp. carneol. præp. corall.
rub. præp. croc. mart. adstringit. an. dr. ss. vel bol. armen.
terr. sig. sang. drac. &c. syr. papav. errat. q. f.
M. F. Elect.

Electuar. adstringens in Diarrhoea. R. Cons. ros.
rub. vet. unc. iii. diacydon. cum spec. unc. i. condit.
cort. cit. unc. ss. spec. arom. ros. dr. i. corall. rub. præp.
scr. ii. lig. aloes scr. ss. terr. sigill. scr. i. mir. cydon.
q. f. M. f. Elect. possent etiam add. nux mosch. C. C.
ust. pulv. rad. torment. rub. pannon. &c.

Electuarium pro fistendo Vomitu. R. Cons. ros.
vet. unc. i. ss. ment. unc. ss. cort. cit. condit. unc. i.
rad. acor. condit. unc. ss. rob. rib. unc. i. diacydon.
cum spec. dr. vi. corall. rub. præp. dr. ii. nuc. mosch.
cynam. an. dr. ss. ol. destill. caryoph. gut. ii. scyr. acetos.
cit. q. f. M.

Electuarium anti-Dysentericum. R. Cons. ros.
vet. unc. ii. carn. cydon. condit. unc. ss. condit. fl. cit.
erant. an. unc. ss. Bol. armen. terr. sigill. an. dr. i.
tragac. dr. ss. corall. rub. præp. marg. præp. an. scr.
i. smaragd. præp. scr. ss. cum f. q. vin. granat. M.
F. Elect. S.

Aliud comprobatissimum. R. Conf. ros. vet. unc. j. theriac. vet. diascord. an. dr. i. terr. sig. corall. rub. præp. sem. plantag. an. scr. i. ss. C. C. phil. præp. scr. i. lap. bez. occid. gr. vi. laud. op. gr. iv. cum syr. de ros. sicc. f. q. M. f. Elect. S. Electuarium adstringens de quo omni quarta hora quantitas nucis sumenda.

Electuarium adstringens in Gonorrhæa. R. Conf. ros. rub. vet. unc. iv. carn. cydon. condit. dr. vi. nuc. Ind. condit. unc. ss. medull. nuc. Ind. condit. dr. ii. pulv. torment. balauft. an. scr. ii. terr. sig. corall. rub. præp. an. scr. i. C. C. ust. præp. scr. i. ss. cum f. q. syr. gran. acid. M. f. Elect.

Aliud contra Abortum. R. Conf. ros. unc. ii. cort. cit. condit. dr. vi. pulp. dactyl. myrob. condit. an. unc. ss. corall. rub. præp. marg. præp. rasur. ebor. an. dr. i. cum syr. cydon. f. q. M. Elect.

Electuarium in nimio Mensium fluxu. R. Conf. ros. sicc. unc. ii. troch. de terr. sig. dr. i. ss. rad. torment. corall. rub. præp. an. scr. ii. lap. hæmat. sang. drac. bol. arm. an. scr. i. cum f. q. syr. corall. M. F. Elect. de quo sumatur magnitudo nuc. mosch. maioris m. & v. superbibendo Cochl. 3. vel 4. aq. burs. past. vel seq. Jullappii. R. Aq. fol. querc. plantag. an. unc. iii. cinam. cydoniat. syr. de ros. sicc. an. unc. i. sp. vitriol. q. f. ad grata. tam aciditatem.

Aliud. R. Conf. ros. rub. vet. unc. iv. condit. cydon. unc. i. ss. spec. aromat. ros. diarrhod. Abb. an. dr. i. eroc. mart. adlt. dr. iii. corall. rub. præp. scr. iv. marg. præp. smaragd. præp. an. scr. i. bol. armen. terr. sigill. an. scr. ii. syr. corall. q. f. M. f. Elect.

Tabulæ Corallinæ Timæi, in omnibus fluxibus sanguinis utiles. R. Corall. rub. præp. dr. ii. marg. præp. dr. i. exit. symph. scr. iv. torment. ros. an. scr. i. ss. troch. de carrab. de terr. sigill. an. dr. i. Carneol. præp. scr. i. ss. smaragd. præp. scr. i. carn. cydon. condit. unc. i. Conf. ros. rub. dr. vi. sacch. albiss. in suoc. berber. & aq. hæmopt. Dorncrefill. sol. q. f. m. f. Morsuli.

Tabulæ contra Abortum. R. Sem. coriand. præp. dr. ij. rad. bistort. rasur. ebor. corall. rub. an. dr. i. succin. crystall. præp. an. scr. i. cocc. infect. scr. ss. sacch. in aq. ros. sol. unc. iv. f. Tab. pond. dr. i. Capiatur una alternis diebus mane.

Pilulæ adstrictivæ, pro fistenda Gonorrhœa. R. Tereb. venet. aq. ros. lot. & coct. unc. j. Pals. peruv. dr. ss. pulv. rad. consolid. maj. torment. an. dr. j. ocul. canc. præp. mercur. dulc. an. dr. ss. M. F. mass. Pilul. dos. scr. ss. m. & v. pro valetudine plena restituenda, in fine Gonorrhœe.

Pulvis contra Abortum. R. Gr. Kerm. scr. i. sant. rub. dr. ss. caryoph. nuc. mosch. an. scr. i. fol. aur. N. iii. M. F. Pulv.

Alius. R. Pulv. contra abort. August. dr. ij. mag. corall. ebor. s. igne præp. mast. an. scr. ii. pellicul. ventric. Gallin. scr. j. M. f. Pulv. Vel R. Corall. rub. præp. scr. iv. Santal. omnium lig. aloë an. dr. i. spodii ex ebore magist. ungul. alc. an. scr. ij. C. C. ust. præp. dr. ij. magist. mat. perl. Succin. præp. an. dr. i. nuc. mosch. pulv. dr. i. ss. lapid. ss. pretios. an. scr. i. spirit. sal. guttatum affus. scr. i. Sacch. ros. tabul. ad pondus omnium, fol. aur. N. viij. M. f. Pulv.

Pulvis specificus contra Fluorem album. R. Magist. osteocoll. dr. ii. carneol. præp. dr. i. ss. corall. rub. præp. marg. præp. terr. sig. mastich. gumm. Arab. torment. an. scr. i. taleol. porc. præp. dr. ii. M. F. Pulv. cuius dos. scr. ii. ex vino rubro.

Alius. R. Chalyb. cum acet. præp. dr. x. cass. lig. ver. dr. iii. sant. rub. spod. ex ebor. succin. alb. præp. an. dr. i. fœcul. bryon. scr. iv. croc. scr. ss. camph. gr. iii. sacch. fin. unc. ii. ol. cinam. gut. iv. M. f. Pulv. cuius dos. scr. iv.

Pulvis contra Diarrhœam. R. Pulv. gr. act. corall. rub. præp. terr. sigill. rub. C. C. ust. præp. an. scr. iv. M. f. Pulv. divid. in 4. p. æq. Vel R. Corall. rub. præp. dr. i. rad. torment. nuc. mosch. an. dr. it. C. C. ust. præp.

præp. dr. i. ss. M. dos. dr. i. vel scr. ij. bis in die, cum vino rub. vel vin. cydon.

Pulvis anti Dysentericus. *R. Corall. rub. præp. gr. xxiv. C. C. ust. præp. gr. xvij. croc. mart. adstric. dr. ss. terr. sig. rad. bistort. gum. tragac. nuc. mosch. an. dr. ss. M. f. Pulv. pro 3. dos. ex ovo sorbili sumendis. Vel R. Corall. rub. præp. dr. i. C. C. ust. præp. rad. torment. troch. de carab. sem. plantag. nuc. mosch. an. dr. ss. terr. sigill. croc. mart. adstr. an. dr. i. M. f. Pulv. cuius dos. a dr. i.*

Pulvis specificus Americanus ad Dysenteriam. *R. Ipecacoanhæ pulv. a dr. ss. ad dr. i. detur ad chart. sumatur ex uno vel altero cochleari brodii, vel vin. lymph. jejuno stomacho, vel si necessitas exigat. 2. horis a pastu; detur per 3. dies continuos. Vires habet per superiora & inferiora purgandi & detergendi, ac simul roborandi & malignitati resistendi. Curare dicitur omnem diarrhoeam & dysenteriam, nisi jam adsit gangrena, vel diarrhoea phthisica aut hydro-pica.*

Pulvis Vomitum sistens. *R. Sal. absinth. dr. i. vel scr. ij. detur cum cochl. i. succ. limon. Vel R. Xyloal. dr. i. nuc. mosch. mast. an. scr. ij. magist. corall. scr. i. galang. scr. ss. M. f. Pulv.*

Pulvis stegnoticus, in nimio fluxu Mensium. *R. Croc. mart. adstr. dr. ss. bol. armen. lap. haem. sang. drac. an. gr. xxv. mag. corall. scr. i. sem. plantag. rad. torment. an. gr. xv. M. F. Pulv. subtiliss. dos. dr. i. ex aq. sequenti. R. Aq. torment. unc. ii. ss. burs. pastor. plantag. an. unc. i. ss. sp. vitriol. gut. vi. M.*

Alius. *R. Corall. rub. præp. ser. iv. lap. chrysol. præp. carneol. præp. marg. orient. præp. an. scr. ij. pulv. rad. torment. gr. Kerm. an. dr. ss. M. F. Pulv. divid. in 6. p. aq.*

Tragæa in Vomitu gravidarum. *R. Spec. diarrhod. Abb. diatrion. sanct. an. scr. ij. cinam. opt. dr. ii. nuc. mosch. dr. i. mac. caryoph. cubeb. cardam. an. scr. ss. lig.*

nig. aloes scr. i. corall. rub. præp. marg. præpar. an.
scr. i. ss. sacch. albiss. unc. iv. fol. aur. N. iii. M. F.
Trag. cum pane vino madido sumenda.

Unguentum in Diarrhœa & Dysenteria . R. Ung.
comitiss. unc. ii. ol. laur. unc. ss. nuc. mosch. expr. dr.
ii. cerat. santal. unc. ss. ol. mast. q. s. M.

Unguentum contra Abortum . R. Ung. Comitiss. dr.
vi. theriac. Androm. dr. ii. vel iii. terr. sigill. dr. ii.
cera parum M. F. Emplast. umbilico applicandum.
Vel R. Theriac. terr. sigill. an. unc. i. M. pro Empl.
ventri imponendo. Vel R. Empl. de crust. pan. unc. i.
ung. Comitiss. dr. ii. ol. nuc. mosch. dr. iii. mastich. q.
s. Vel R. Empl. diaphæn. calid. de crusta pan. an.
dr. vi. melon. cum ol. mastich.

Emplastrum præsens in Vomitū . R. Pic. unc. ii.
ol. cydon. unc. ss. liquefiant simul. & f. Drovax.

Emplastrum contra Abortum . R. Rad. bistort. sem.
coriand. an. dr. ii. nuc. cupress. santal. rub h-pocist.
an. dr. i. ladan. mastich. an. unc. ss. thur. bdel. an.
dr. corall. succin. an. dr. i. pulveris. excip. ol. mast.
& cum s. q. cer. & tereb. F. Empl. applicandum re-
gioni lumborum.

Cataplasma abortum impediens . R. Thur. mascul.
unc. ii. album. ov. N. v. agitentur simul super prunas
semper movendo, ne concrecant, addendo terebinth.
excipiatur stupr. & calidissimè umbilico applicetur, bis
in die, per triduum.

Aliud . R. Pulv. gr. act. unc. ii. cort. pan. nig. tost.
lib. ss. mast. thur. an. unc. i. F. Pulv. in mortar. &
cum vin. cydon. vel vino rubro F. Catapl. cuius pars
dimidia inducatur linteo, & apponatur ventri inferiori.

Cataplasma in fluxu immodico Mensium . R. Pulv.
bol. armen. vel fulig. camin. q. pl. album ov. & acet.
acerrimi q. s. pro Catapl. ad lumbos & os sacrum applic.

Cataplasma adstringens in Diarrhœa & Dysenteria .
R. Pan. secalin. unc. iii. cydoniat. unc. i. coq. in vin.
rub. vel acet. ad consist. Catapl. add. pulv. torment. rad.

consolid. m. an. dr. vi. terr. sigill. unc. ss. Nonnulli ad-
dunt mast. nuc. mosch. mac. fl. ros. &c.

Aliud. R. Bol. arom. unc. i. alum. unc. ss. farin. fab.
unc. i. ss. album. ov. N. i. acet. vin. q. s. M. f. Catapl.
ventri applicandum.

Cataplasma pro Vomitu sistendo. R. Ferment. acerr.
unc. iii. ment. pulv. dr. ii. caryoph. mast. an. dr. i. M.
pro Catapl.

Nasale in Hemorrhagiam narium. R. Lacc. pictor.
alum. an. p. &q. vel sterco. porc. dr. iii. pulv. ros. rub.
dr. ss. excip. cum album. ov. & cum gossyp. f. Turunda.
Vel R. Thur. aloe sang. drac. farin. vol. tel. aran. p. i.
lepor. minutim. incis. an. dr. ss. Vel R. Lanug. cydon.
tragac. mast. sang. drac. bol. arm. lap. hemat. aloe fa-
rin. vol. an. scr. i. M. F. Pulv. excip. cum album. ov.
& gossyp.

Anacollema seu Frontale, in Hæmorrhagia narium.
R. Aq. plantag. sperm. ran. equiset. nymph. vel ros.
an. unc. i. acet. fortiss. unc. iii. album. ov. conquass. N.
ii. cret. Coloniens. vel bol. arm. unc. ss. vel terr. sig.
bol. arm. lap. hemat. an. dr. i. ss. M. f. Frontale fri-
gidè applic.

Aliud. R. Croc. mart. adstrict. bol. arm. sang. drac.
terr. sig. an. dr. i. decoct. gallar. & cum m. i. millefol.
ad. unc. vi. vel aq. ros. plantag. an. unc. iii. acet. ros.
unc. i. ss. nit. præp. dr. ss. M.

Suffitus in Diarrhœa. R. Succin. thur. mast. an.
scr. iv. fl. lavend. p. ii. ros. p. i. tereb. coct. ad pondus
omnium; confracta dentur ad scat. pro Suffitu. Potest
etiam addi lig. aloes, storax, fl. verbasc. &c.

Enema adstringens & consolidans, in Dysenteria.
R. Rad. consolid. in torment. an. unc. ss. herb. polyg.
plantag. sanic. an. m. i. fl. verbasc. ros. balaust. an. p. i.
sem. plant. dr. i. ss. coq. ex lact. chalyb. f. q. in Col.
unc. x. dissolv. sev. hirc. dr. vi. ol. ros. cydon. an. unc.
ss. bol. arm. terr. sig. an. dr. M. Posset etiam dissolvi
theriac. Androm. ad dr. ii. vel Pilul. de cynogloss.
scr. i.

scr. i. ss. prius autem præmittantur Clyst. detergentes
ix decoct. bord. cum mell. ros.

ARTICULUS II.

De Officio Medici, in considerandis & præ-
scribendis Remediis Hypnoticis,
& Anodynis.

I.

Medicamenta *Hypnotica* sunt, quæ somnum conciliant; quod præstare videntur vel suaviter humectando, ac serum deficiente supplendo, vel aquosa frigidaque humiditate sua, aut crassitie spiritus gravando, vel fibrillosam cerebri compagem relaxando, vel sulphure vaporoso, blando, ac resolubili cerebrum replendo, vel spirituum vias ac nervorum initia non nihil opplendo, vel vi peculiari ac volatili sulphurea visciditate spiritus ungendo, ad se invicem conglomerando, ligando, ac quasi torpidos reddendo quæ posteriora propriè sunt & dicuntur *narcotica*, inter quæ principalissimum est Laudanum opiat. de quo superius peculiari paragrapho abundè dictum.



I I.

Medicamenta *Anodyna* seu *paregorica* sunt, quæ dolorem mitigant. Cùm autem dolor tribus modis sedari soleat, & quidem vel causam dolorem efficientem auferendo, vel sensum stupefaciendo, per narcotica, de quibus supra, vel caufa & morbo manentibus, ex parte saltem cum leniendo, per ea, quæ vel vim suam exerunt blando & moderato calore, quo pars affectu sovetur, & ad quandam æquilitatem reducitur, cutis relaxatur, fibræ plus justo tensæ & contortæ demulcentur, vel quibus humores dolorifici discutiuntur & resolvuntur, vi digerendi, discutiendi & carminativa præditis, vel quæ repellunt & affluxum humorum prohibent, atque ita sensum partis nonnihil obtundunt.

Formulæ

*Remediorum Hypnoticorum &
Anodynorum.*

JUlepus Hypnoticus. R. Syr. de papav. ss. unc. i. vel dr. vi. aq. nymph. unc. ij. hypnot. Lang. unc. i. M. F. Julep. S.

Emulsio Hypnotica. R. Sem. papav. alb. dr. iii. sem. melon. excort. unc. ss. vel sem. 4. fr. m. an. dr. i. aq. nymph. viol. solan. an. unc. i. ss. M. F. Emuls. add. magist. perl. scr. i. sp. ros. gut. viij. man. Christ. perl. dr. i. M. S.

Alia. R. Sem. melon. excort. unc. ss. aq. frig. nymph. rub. id. an. unc. i. M. F. Emuls. add. man. Christ. perl. dr. ij. sal. nit. perl. scr. ss. C. C. phil. præp. scr. i. ss. M. Alia.

Alia. R. Amygd. d. excort. dr. iii. sem. 4. frig. m. an. dr. ii. papav. alb. dr. i. ss. ag. violar. unc. ij. borrag. nymph. an. unc. i. ss. M. f. Emuls. add. jul. ros. unc. ss. man. Christ. perl. dr. iii. M.

Pediluvium Hypnoticum. R. Fol. lactuc. salic. vit. malv. violar. fl. nymph. an. m. i. summit. aneth. m. ss. capit. papav. alb. N. xvii. cort. rad. mandrag. dr. iii. coq. in s. q. ag. pro Pediluv.

Aliud. R. Capit. papav. cum semin. contus. N. vii. fl. ros. rub. m. ii. chamom. m. i. herb. beton. sal. comm. an. m. i. ss. M. incis. dentur ad chart. S. Species pro pediluvio Vel R. Capit. papav. alb. N. xx. sem. papav. alb. unc. i. fol. lactuc. m. iv. fl. nymph. m. vi. viol. m. i. s. bull. in ag. s. q.

Unguentum somniferum. R. Ung. popul. unc. i. alabast. ol. viol. papav. an. unc. ss. op. theb. acet. fl. sambuc. sol. gr. xv. ol. nuc. mosch. expr. scr. i. croc. gr. viii. ceræ parum. M. F. Linim. quo inung. tempora, nures & pulsas manuum vel R. Ung. alabast. refrig. Gal. popul. an. unc. ss. ol. nucifl. dr. i. nymph. papav. an. dr. ii. mandrag. dr. ss. M.

Oleum anodynnum intus exhibendum. R. Ol. amygd. d. rec. express. unc. i. ss. spermat. cet. dr. s. vel scr. ii. M. detur cum Brod. calid. vel cum vin. malvat. unc. s.

Epithema cephalicum in dolore Capitis frebrili. R. Nucl. persic. exosat. N. xi. sem. papav. alb. dr. ii. 4. frig. mai. an. dr. i. ag. fl. nymph. viol. an. unc. iii. fl. samb. unc. ii. acet. rutac. fl. sambuc. an. unc. i. M. F. Emuls. add. camph. scr. i. croc. orient. scr. ii. M.

Aliud. R. Nucl. persic. unc. i. amygd. am. unc. ss. sem. cannab. dr. iii. ag. verben. beton. ros. an. unc. i. camph. croc. an. gr. v. M.

Oxyrrhodinum. R. Album. ov. conquass. No. ii. ag. ros. lavend. an. unc. iii. acet. ros. vel fl. sambuc. dr. vj. ol. ros. vel nymph. unc. j. camph. scr. i. croc. gr. vj. M.

Unguent. pro dolore Capitis. R. Ung. alabast. pop. an. dr. iij. op. gr. viij. croc. scr. j ol. destil. anetib. gut. ij. M.

Unguentum in dolore Dorsi & Renum. R. Ung. infrig. Cal. rosat. Mes. anodyn. an. dr. vj. ol. scorp. succ. lim. an. unc. ss. M.

Liniment. in doloribus Suræ. R. Ol. hyosc. laur. de later. chamom. an. unc. ss. M.

Aliud in dolore Ischiadico. R. Ol. juniper. petrol. an. unc. i. succin. dr. ij. M.

Unguentum in dolore Hæmorrhoidum. R. Ung. de linear. unc. j. de liq. unc. ss. ol. ov. mast. an. dr. i. ss. M.

Aliud in eorum inflammatione. R. Mucilag. sem. psyl. cydon. aq. sperm. ran. extr. an. unc. i. sacch. sat. dr. i. camph. scr. ss. M.

Emplastrum in doloribus, ortis ex defluxione Catarrhoa. R. Gummi carann. p. i. tacamab. p. ij. cum pauca tereb. d ssol. extend. super alut. Vel R. Oxy. croc. Empl. diapalm. an. dr. vj. malax. cum ol. juniper. & f. Empl. appic. alii etiam addunt empl. diaph. Minsicht.

Cataplasma seu pulmentum in dolore Capitis. R. Fol. verben. rec. m. j. contund. in mortar. add.. ferm. accerr. unc. ij. ol ros. q. s. M. applicetur tepide fronti.

Aliud. R. Bacc. juniper. unc. i. nuc. i. nucl. persic. N. xx. sem. papav. alb. dr. ij. thur. scr. ij. ss. contund. cum aq. fl. scambuc. & verben. acf. Pulment.

Cataplasma probatissimum, ad dolorem Hæmorrhoidalem. R. Porrorum cum tot. m. iv v. mic. paplib. s. cog. in lact. capr. ad putrilag. contund. in mortar. addendo sub sinem, croc. Austriae. dr. s. vel q. s. ad intensam flavend. Hoc, teste Sorbait, miraculi instar tollit dolores.

Aliud expert. Grulingii. R. Fic. in mortar. ad pul. consist. contus. N. iv. vel v. mell. ros. unc. i. ss. M. Illinatur parvo linteo & applicetur.

Cataplasma anodynū generale, præsertim in Tumoribus & Abscessibus. Rx. Mic. pan. albiss. q. pl. cog. cum lact. s. q. ad consist. Catapl. add. ol. ros. vel simul etiam lil. alb. chamom. lumbrie. &c. unc. i. vel i. ss. croc. scr. ss. vel scr. i. subinde & vitell. ov.

Sacculus anodynus in Colica. Rx. Spec. decoct. emoll. carminar. an. m. iii. summit. orig. serpill. an. m. j. fl. chamom. Rom. m. iii. sem. carv. unc. i. incis. grosso modo & saccul. inclus. cog. in lact. & applic.

Alius in Pleuritide. Rx. Violar. malv. fl. chamom. an. m. ii. fl. papav. errat. m. i. sem. lin. fænug. an. unc. i. fol. hyosc. m. ss. M. F. Sacculus.

Alius in Nephritide. Rx. Herb. malv. alth. pariet. saxifrag. fl. cham. melil. aneth. an. m. iv. rad. alth. unc. iv. herb. artemisij. w. i. ss. chærefol. m. ss. sem. lin. fænug. an. unc. i. anis. dr. ii. f. ii. Saccul. in aq. decoq. & alternatim calide applic.

Clyster anodynus. Rx. Lact. vaccin. unc. x. saccb. rubr. unc. ii. ol. sem. lin. unc. iv. sal. dr. ss. M. Loco olei etiam sumi potest butyr. vel ung. de cynogloss.

Enema oleosum, in Colica & Calculo egregium. Rx. Ol. lin. unc. iii. chamom. aneth. an. unc. ii. scorp. vatac. an. unc. i. ol. terebinth. scr. i. M.



ARTICULUS III.

*De Officio Medici, in considerandis & prescribendis Remediis Vulnerariis,
atque ad ea spectantibus.*

I.

Medicamenta *traumatica* seu *vulneraria* sunt vel externa, vel interna. Interna sunt, quæ calorem innatum roborant, vi sua Balsamica, & sale suo volatili oleoso, quæ putredini resistunt, materiam probam pro generatione carnis suppeditant, sanguinis nimiam humiditatem absumunt, ejus tonum conservant, stagnationem, vappescentiam ac acescentiam, serique ichorescentiam corrigunt & absorbent, affluxumque ad partem vulneratam, moderata adstrictione inhibitent, Externa, vel sunt *suppurantia* seu *digestiva*, in vulneribus & ulceribus usualia, quæ sanguinem extravasatum, ac in poris hærentem in pus convertunt, vel *glutinantia* quæ viscositate sua emplastica, vel adstrictoria, labiorum parietes firmant, & seri nativam coagulationem promovent; vel sunt *sarcotica*, seu carnem generantia, quæ moderate exsiccando, ac superfluam humiditatem absumento, fordes blandè & citra acrimoniam detergunt, ac absorbent, leniterque adstringendo ac roborando, carnem firmant, sive etiam partium calorem conservant; vel sunt *Epulotica*, quæ cicatricem inducunt, efficaciter desiccando, serum in superficie absumento, & in pelliculam coagulando, cutemque contrahendo, densando & indurando; vel sunt *Porotica*, quæ callum generant, ac ossium alimentum vi siccandi & adstringendi in callum & firmitudinem osseam con-

convertunt. Huc quoque spectant remedia contra *ambusta*, quæ agunt extrahendo empyreuma, poros aperiendo, serosas & acres humiditates evocando, vel inflammationem sedando, vel calore & ardorem leniendo ac demulcendo, vel exulceratas partes moderate siccando & ad sanitatem perducendo.

II.

HUC brevitatis causa etiam ea referto, quæ ad affectus externos in usu sunt, qualia sunt: 1. *Grumos resolventia*, quæ sanguinem & serum in vasis suis, vel poris internis aut externis subsistente, in motum cident, & coagulum ejus futurum impediunt, vel etiam factum disjiciunt, & resolvunt. 2. *Repellentia*, reprimientia, & repercutientia, quæ extrinsecus applicata, materiam adhuc fluxilem, mobilem, volatilem, & ad partem fluentem, nondum tamen eidem impactam, vel extravasatam aliò repelunt, vel leviter saltem harentem, in alveum suum redire faciunt. Horum alia sunt frigida, terrea, ac adstringentia: alia actu & potentia frigida, aquea, mucilaginosa, viscosa. 3. *Abstergentias*, quæ duris, asperis & acutis suis particulis, vel vi nitroso, salasa, & saponaria abradunt, & evertunt fôrdes, humoresque vitiosos in meatibus harentes, uti etiam abscessum ruptorum, vel ulcerum fôrdidorum faniem, pus, aliaque excrementa abstergunt. 4. *Emollientia*, quæ emolliunt, tum humectando & laxando, fibras nerveas tensas & irritatas, tum poros adstrictos & angustatos, tum congelata & concreta resolvendo, fundendo ac per halitum digerendo. Talia sunt moderate calida & humida. Humida, ut corrigatur siccitas, laxetur densum, & diluat concretum. Calida, ut calor nativus roboretur, ac materia quasi coquatur. 5. *Diffuscentia seu rarefacentia*, quæ emollientibus calidiora, ac tenuioris substantiæ, unde facile penetrant,

cutis poros dilatant, humores attenuant, & in vapores convertunt, ut per insensibilem transpirationem seu diaphoresin evacuentur. 6. Tandem *attrahentia*, quæ destinata sunt, vel ex alto evocandis humoribus, vel a parte affectu avocandis & aliorum ducendis, vel advocandis utilibus.

I I.

IN usu horum omnium, Not. 1. Vulneraria interna semper ea eligenda esse, quæ peculiarem cognationem habent cum parte affecta. 2. Ea intrinsecus præcipue convenire, cum vulnera vel ulcera ob vitiosam partis constitutionem non facile curam suscipiunt, synoviaque infestat. 3. Non usurpanda hæc in principio, & ubi externa satisfaciunt, vel ubi adest febris, & inflammatio. 4. Respiciendum simul esse ad ventriculum, ne exinde lœdatur. 5. Suppurantia convenire præcipue tumoribus sanguineis, quæ discutientibus & resolventibus non cedunt. 6. In ulceribus, suppurantia non debere esse nimis humida, ne ulcera reddantur sordida. 7. Traumatica alcalinæ esse naturæ, & occultum alcali & quidem volatile in se continere, acidum vulnerum vel ulcerum perimens. Item Emplastra vulneraria ferè omnia in hoc convenire, quod vulnera ab aere defendant, ac vi balsamica & modicè siccante, partem lœsam demulcent. 8. In corporibus duris & siccis, & ubi caro durior generanda, convenire magis pulveres sarcoticos, ut etiam ubique ulcera superflua luxuriant humiditate. Item in vulneribus capitis: econtra in corporibus mollioribus forma linimenti vel unguenti. 9. Epilotica usurpanda esse, ulcere carne non omnino repleto, ne cicatrix fiat eminentior. 10. In Applicatione remediiorum ad ambusta, actu frigida esse cavenda, cum ob contrarietatem major oriatur ardor, fluxusque

que & dolor augeatur, hinc topica tepidè sunt applicanda. 11. Unguenta pro ambustis adhibenda, non debere esse dura, ne majorem dolorem excitent. 12. Interius quoque in ambustis ardorem restinguendum, ut v. g. nitro, ac maximè partem affectam respiendam.

I V.

PRæterea, 13. Notandum: Resolventia stipticis & traumaticis jungenda esse, eisque interius succenturiari universalia, ut v. g. pargantia, diaphoretica: exterius emollientia & paregorica. 14. Repellentia alia propriè talia esse, quæ ipsis partibus affectis applicantur. Alia *Intercipientia* dicta seu *defensiva*, quæ viis, per quas humor defluit, applicata, facultate frigida, sicca, terrea, adstringente, humoribus aditum intercludunt. 15. Repellentia non competere in omnibus fluxionibus; non etiam adhibenda: nec in partibus nobilibus; nec quando fluxio parti principi vicina est; nec partibus nimis profundo loco sitis; nec si materia maligna & venenata; nec ubi animalis venenati ictu vel morsu vulnus inflatum; nec si natura rectè agens, criticè materiam in partem aliquam propellat; nec si humor sit multus, & corpus adhuc plenum; nec si humor jam parti impactus, & dolor ad sit vehemens. 16. Not. tempus adhibendi repellentia, esse principium fluxionis: eodem versus augmentum tendente, digerentia admiscenda, hinc sola resolventia usurpanda. 17. Repellentia frigida & humida convenire, cum humor tenuis & paucus, aut superficiem corporis occupat, aut cum fluxiones accidunt, ob nimium partis calorem aut dolorem: frigida verò sicca & adstringentia, cum dolor non ita urget, & fluxiones sint ob partium debilitatem. 18. In Erysipelite, sub hoc climate, unctuosa, oleosa, immo

omnia humida vitanda esse, cum tutiora sint in forma sicca applicata. 19. Intercipientibus fortioribus utendum in habitu corporis duriore, ubi vasa ampliora, & influentis humoris major portio. 20. Repellentia apprimè convenire in cancro, non omissis universalibus.

V.

HOc amplius Not. 21. impropriè ad repellentia pertinere, quæ poros obstruunt, & fluentem materiam vitiosam cum sanguinis massa reduniunt, & sic retrocedere faciunt, ut v. g. Mercurialia in scabie. 22. Repellentia subinde sensum dolorificum obtundere, ac convenire etiam dorso applicata, in sudoribus colliquativis. 23. Inter emollientia imprimis conducere Cataplasma & Emplastra, illa magis ad suppurationem: hæc ad discussionem inserviunt; illicque meliora, cum Cataplasma facile frigefiant, & hinc materiam repellant. 24. Emollientia non convenire in tumoribus atrabilariis, v. g. cancris & scirrhis malignis, quæ acrimonia gaudent salina, instar Mercurii sublimati, magis enim per emollientia dilatantur pori, ut & affluxus humorum procuretur, & acrimonia corrosiva, in centro detenta & coercita, latius expandatur.

Formulæ

Remediorum Vulnerariorum, atque ad ea spectantium.

DEcoctum ad Casum . ℥. Rad. *symp.* mai. unc. ss. *plantag.* alth. *pimpinell.* an. dr. iii. herb. *veron.* *sanic.* *chærefol.* *prunell.* *beder.* *arbor.* *bellid.* cum tot. an. m. ss. rad. liquirit. dr. iii. sic. N. vii. coq. ex aq. & vin. rub. an. lib. i. ss. *Colat.* *clarif.* add. *syr.* de *sympyt.* de alth. an. unc. ii. *oxymell.* f. unc. i. ss. M.

Decoctum vulnerarium . ℥. Rad. *symp.* unc. i. rub. tinct. *aristol.* rot. an. unc. ss. herb. *millefol.* *veron.* *pyrol.* *sanicul.* *alchimill.* *agrimon.* an. m. ss. fl. *bellid.* min. *summit.* *virg.* *aur.* an. p. ii. ocul. *canc.* unc. ss. nuc. *mosch.* dr. ii. coq. in s. q. aq. font. in *Col.* lib. iii. dissolv. *syr.* de *symp.* *Fernel.* unc. iii. M. Dof. unc. iv. S. Decoctum vulnera sanans bis in die tribus horis ante pastum sumendum.

Aliud . ℥. *Scob.* *lign.* *sassafr.* rad. *chin.* *symp.* mai. an. unc. ss. herb. *veron.* *agrim.* *pilosell.* *consolid.* *sarcen.* *sanic.* *alchimill.* an. m. ss. *cinam.* liq. an. dr. ii. sic. N. v. *passul.* min. unc. ii. sem. *anis.* *fenic.* an. unc. ss. M. incis. coq. cum aq. font. lib. vi. & vin. alb. *odorif.* lib. ii. ad 3. de quo m. & v. bibantur unc. v.

Species pro decocto Traumatico. ℥. C. C. ust. unc. ss. *bord.* *integ.* unc. i. ss. herb. *agrim.* *veron.* *alchimill.* *sanic.* an. p. i. rad. *consolid.* mai. liq. an. unc. ss. spec. pro decoct. *pectorat.* unc. i. ss. *anis.* *fenic.* an. scr. i. M. incis. dentur ad chart. S. Species pro decocto vulnerum cum duabus mensuris, aut una & dimidia mensura aquæ, & una dimidia mensura vini ebulliendæ.

Deco-

Decoctum ad Herniam . R. Herb. sanic. salv. berniar. epat. nob. polyg. plantag. an. m. ss. pyrol. p. iii. rad. symp. m. unc. ss. bardan. dr. vi. torment. pentaph. an. dr. ij. sem. perfoliat. dr. iii. coriand. præp. dr. i. coq. in s. q. vin. & aq. chalyb. ad lib. ii. colat. dulcoretur sacch. albiss. ad gratiam.

Pulvis ad Casum . R. Pulv. contra casum August. dr. i. detur ex aq. chærefol. Vel . R. Ocul. canc. præp. rhab. sperm. cet. antim. diaph. sang. hirc. præp. an. dr. ss. mum. scr. i. M. F. Pulv. cujas dos. dr. i.

Pulvis ad Erysipelas Mins. R. Farin. vol. unc. vi. plumb. ust. bol. rub. an. unc. ii. mastich. olib. ceruss. an. unc. i. M. F. Pulv. subtiliss. qui chartæ ceruleæ inspersus, parti affecte applicetur . Vel R. Bol. arm. unc. ij. camp. unc. ss. M. ad idem valet. farin. bord. cum bol. pulv. glyc. campb. &c.

Fomentum in Ulceribus contumacibus usuale , Aqua Catapultorum vulgo dicta . R. Rad. aristol. rot. gent. raph. zedear. an. unc. i. coq. in vin. alb. lib. iii. ad mediet. dissolv. sacch. alb. unc. iv. foveatur hoc ulcus & imponatur fol. Brassicæ rub. hoc madefactum.

Fomentum polychrestum ad Erysipelata , Inflammationes , Exulcerationes humidas , metum Gangrenæ &c. R. Lythag. lib. ss. fl. ros. rub. m. ii. olib. myrrb. matt. an. unc. ss. decoct. seu aq. calc. viv. rec. lib. iv. acet. lib. i. coq. simul , usque dum lytharg. solut. add. in fine campb. unc. ss. Col. S. Fomentum quod linteolo circundatum vel pannis complicatis calidè , bis vel ter vel sapienter in die imponendum.

Aliud contra Gangrenam & Sphacelum , Aqua fusca dictum . R. Herb. rut. absinth. salv. sabin. fol. querc. an. m. ss. rad. aristol. rotund. dr. iii. enul. dr. ii. vitriol. Rom. unc. i. sal. armon. dr. i. ss. gal-

*ss. gallar. unc. ss. bacc. laur. unc. i. olib. mast. an.
dr. ii. ceruss. lytharg. alum. crud. an. unc. iii. Bol.
armen. unc. ss. cort. virid. nuc. jugl. dr. vi. camph.
dr. ss. M. do bis speciebus cochl. i. cum vin. alb. lib.
ii. coq. & cum intinctis spleniis vel linteis triplicatis
vel quadruplicatis calide applicetur.*

Fomentum pro Membro fracto, luxato vel distorto, ante vel post repositionem. *R. Herb. beton. chammom. rorism. an. m. i. summit. hyper. cum fl. m. i. ss. rad. aristol. rot. dr. vi. Symp. mai. dr. ss. sem. 4. calid. m. an. dr. i. ss. coq. in aq. s. q. Colat. lib. i. ss. add. vin. infus. fl. hyper. lib. ss. S.*

Fomentum pro membris à Gelu sideratis. *R. Spirit. vin. opt. rectif. lib. i. pulv. sal. armon. unc. i. camp. scr. i. M. ad vitr. S.* Fomentum pro pedibus.

Aliud pro rubedine, tumore & dolore Pedum. *R. Bol. arm. alb. dr. iii. lytbarg. unc. i. malt. myrr. an. unc. ss. olib. dr. vi. aq. plantag. sperm. ran. fl. sambuc. an. unc. viii. coq. & Col. servetur ad usum.*

Fomentum in tumore Pedum œdematoso. *R. Spirit. vin. opt. rectif. mensur. i. sal. armon. unc. iii. M. inting. linta, ac sub horam decubiti in lecto, pedibus tepide circumvoltantur. Optima etiam est aq. calc. viv. sic paranda. R. Frustul. calc. viv. ad magnitud. nuc. jugland. immittatur in aq. ferventem donec dissolv. hinc calx cum aq. agitetur, & postea redidere finitur. Deinde clarior aqua per inclinationem in aliud vas transfunditur, applic. cum intinctis linteis vel spongia nova.*

Aliud. *R. Herb. absinth. salv. rut. hyper. orig. rosm. lavend. major. an. m. i. rad. ebul. irid. cort. med. sambuc. an. dr. ii. fl. chamm. samb. spic. stœch. ros. melil. an. m. s. bacc. laur. juniper. an. unc. ss. M. concif. coq. in aqua font. s. q. pro Fomento pedum bis in die usurpando.*

Aliud in Tumore Manuum & Pedum . R. Lytharg. unc. vi. bol. arm. unc. i. sulph. viv. unc. i. ss. alum. crud. dr. ii. gallar. unc. i. myrrh. el. unc. i. ss. M. F. Pulv. de quo 2. vel 3. cochl. cum vin. alb. unc. xx. acet. vin. acerrimi unc. x. coq. ac cum intinctis linteis duplicitat. vel triplicat. saepius calide applicentur.

Unguentum digestivum Chirurgorum . R. Tereb. cum vin. vel aq. ros. ad albed. lot. unc. i. sev. cerv. unc. ss. ol. ros. dr. ii. cer. alb. olib. mast. an. scr. ii. camph. scr. ss. M. Vel R. Tereb. unc. ii. vitell. ov. N. i. myrrh. aloes an. dr. ss. ol. cer. gut. x. M. in partibus nerveis additur etiam Bals. peruv. Vel R. Tereb. unc. i. vitell. ov. N. i. mell. ros. unc. ss. ol. hyper. dr. i.

Linimentum ad Ambusta . R. Ol. oliv. vel lin. part. i. album. ov. conquass. part. ii. M. Illin. cum pluma Gallin. Vel R. Butyr. rec. q. liquefact. & lot. in aq. sperm. ran. unc. vi. ol. de vitell. ov. unc. ii. M.

Unguent. ad Ambusta Fabricii . R. Butyr. rec. si ne sale aq. ros. lot. unc. iii. ol. viol. de vitell. ov. amygd. d. an. unc. i. croc. scr. i. mucilag. sem. cydon. unc. i. cer. q. s. M.

Unguentum ad Scabiem. expertissimum . R. Pingued. suill. antiq. unc. vi. liquefiant ad ignem. Col. add. sulph. viv. subtiliss. pulv. bacc. laur. eodem modo pulv. an. dr. ii. ss. caryoph. arom. dr. i. pulv. lapat. acut. dr. ss. M.

Aliud certissimum & Infallibile , in Scabie humida . R. Pulv. cort. laur. sulph. cit. an. unc. iv. enul. unc. ii. vitriol. alb. unc. i. ss. styrac. liquid. q. s. M. F. Ung.

Aliud in Scabie sicca & pruriginosa . R. Succ. lapat. acut. plantag. an. unc. ii. solan. unc. i. ss. citri unc. i. ceruss. unc. ii. lytharg. unc. ss. fl. sulph. dr. i. ss. ol. ros. viol. an. unc. ii. ss. butyr. salit. unc. i. ss. tereb. cer.

cer. an. dr. vi. M. F. Ung. add. ol. doft. lig. Rhod.
gut. xxv. alipt. mosch. scr. ii. M.

Aliud in Scabie vulgatissimum. R. Tereb. vulg. vi-
tell. ov. dissol. unc. i. fl. sulph. dr. vi. butyr. rec. unc.
iv. M.

Emplastrum infallibile in Clavis pedum. R. Gal-
ban. gumm. ammon. acet. solut. an. unc. ss. sal. ar-
mon. scr. i. Empl. diachyl. magn. un. i. ss. M. Vel
R. Pic. naval. unc. i. galb. in acet. dissol. unc. ss. sal.
armon. scr. i. Empl. diachyt. magn. dr. ss. M. cum
panno super clavos ponatur ac tertio vel quarto die
mutetur.

Emplast. pro tumore Pedum. R. Empl. diaph.
Minf. unc. i. ss. oxycroc. unc. ss. malax. cum ol. cha-
mom.

Emplastrum diaf sulphuris Ruland. R. Bals. sulph.
unc. iii. cer. unc. ss. coloph. dr. iii. liquat. add. myrrh.
opt. pulv. unc. iii. ss. coq. s. a.

Emplastrum Mammillare, in omnibus Mammarum
tumoribus utilissimum. R. Spermat. cet. unc. i. cer.
alb. unc. ii. galban. acet. sol. unc. ss. ol. sambuc.
q. f.

Balsamus sulph. Ruland. R. Fl. sulph. unc. i. ol.
nuc. vel rap. unc. vi. vin. generos. unc. ii. macerentur
per dies 8. aliquoties agitando coq. leniter ad vini
consumpt.

Balsamus scolopetarius. R. Ol. lin. tereb. an. lib. i.
ærug. ær. unc. ss. coq. parum f. a.

Cataplasma suppurativum. R. Rad. alth. lil. alb.
an. unc. ii. herb. malv. alth. pariet. an. m. ss. sem.
lin. fœnug. an. unc. ss. coq. in f. q. ag. ad mollit. per
cribrum traject. add. farin. sem. lin. fabar. an. dr. vi.
ol. viol. axung. porc. an. dr. v. M. F. Catapl. S. Ma-
turius Cataplasma suppurativum panis illitum ca-
lidè imponatur.

Aliud. R. Herb. malv. cum tot. mic. pan. alb. an. p.
eq. coq. in lact. caprin. s. q. ad const. Catapl. add.
vitell.

vitell. ov. croc. & ol. ros. vel etiam ol. lil. alb. cha.
mom. amygda.

Injectio in Ulcera cava , mundificans , siccans ,
adstringens , putredinem arcens & consolidans . *R.*
Herb. cent. min. scord. ros. rub. an. m. ss. fl. balaust.
dr. ii. pulv. mastich. myrob. olib. aloes an. dr. ss. rad.
Ir. flor. aristol. rot. torment. an. dr. ss. Concif. coq.
cum unc. xx. aq. font. & x. vin. rub. in olla bene te-
cta , in Col. dissolv. mell. ros. col. unc. i. addi etiam
potest Bals. peruv.

Plura non addo , cum hæc magis spectent ad Chi-
rurgiam .



CAPUT XI.

*De Officio Medici, in præscribenda
debita Diæta.*

ARTICULUS I.

*De Officio Medici, in consideranda
Diæta in genere.*

I.

Per Diætam hic aliud non intelligitur, quam debita Victus ratio, vel potius methodicus usus sex rerum non naturalium. Hæc non minimum est fundamentum sanitatis, tum conservandæ, tum restituendæ. Si enim utilitatem ejus brevibus descriptam verbis desideres, hæc illa est, quæ morbos pellit, corpus agile, sanum, purum à fœtore, ac fœditate alienum præstat, longævitatem inducit, somnos jucundos & placidos conciliat, epulas communes suaves & gratas efficit, sensibus incolumitatem, memoria vigorem, ingenio perspicaciam & claritatem confert, passiones sedat, iracundiam & mærorem pellit, libidinis impetum frangit, denique corpus & animam maximis bonis replet, ut merito mater trium S. sanitatis nempe, sapientiæ, & senectutis dici possit.

I I.

DIæta alia spectat ad sanos : alia ad ægrotos. Il-
la in his præcipue consistit Regulis. 1. Ut vi-
tentur , quantum fieri potest , aeris in qualitatibus ve-
hementiores excessus & anomaliae . 2. Ut in quanto
non excedatur , quod cognosces , si ad satietatem non
comedas , si post cibum nullum sentias torporem ,
gravitatem & lassitudinem corporis , cum antea essem
multo agilior , si post cibum etiam aptus sis actioni-
mentis , si nulla appareant signa repletionis , qua-
lia sunt v. g. capitidis dolor & gravitas , somni longio-
res vel perturbati , in somniis turbulentia , somnus diur-
nus , segnities totius corporis , appetitus dejectio , cru-
ditates , ructus , alvi stipticitas vel profluvium , copia
flatuum , destillationes frequentes , multa narium
emunctio & expulso matutina &c. 3. Ut vitetur va-
rietas ciborum , præsertim inter se valde contrario-
rum in uno pastu , quæ est fons morborum uberrimus.
4. Ut cæna prandio sit parcior . 5. Ut casu aliquo ex-
traordinario , v. g. in convivio lautiori excessum fa-
ciens , sequentem pastum præscindas , aut unico hau-
stu vini diluti vel tantillo cibo absolvulas . 6. Ut vi-
num diluatur , præsertim meracum . 7. Ut debita fiat
corporis exercitatio , & motus moderatus , qui ad sa-
nitatis conservationem , excepta sobrietate , maxime
principalis est : immo etiam à Galeno ciborum pars-
moniae anteponitur . 8. Ut graviora vitentur animi
Pathemata , 9. Ut somnus sit moderatus , ac alvus
debitè respondeat .

III.

Dicta ægrorum, de qua potissimum hic sermo,
varia est, ejusque diversitas desumitur, a *victus*
forma, *quantitate*, *qualitate*, *utendi occasione seu op-*
portunitate, & *exhibendi modo*. Formam *victus* quod
attinet, ea desumitur a modo substantiae, estque pro
varia virium conservatione triplex apud Medicos.
Crassa nimirum, *valens seu firma*, quæ concedit ali-
menta firma solida, ac multum nutrientia, & proinde
vires auget. *Tenuis*, quæ alimenta habet infirma, pa-
rum nutrientia, ac proinde vires nonnihil diminutas
conservat. *Mediocris*, quæ inter *victum crassum & te-*
nuem media est, ideoque vires conservat. *Victus cras-*
sus convenit corporibus sanis, robustis, ac bene se
exercentibus; *victus tenuis, morbis acutis; mediocris,*
morbis diuturnis & chronicis. Pro *victu tenui*, mo-
derno tempore conceduntur *Brodia carnis gallin.*, vel
sola, vel cum ovi luteo permixta, eaque ut plurimum
tertia vel ad summum quarta hora, alterata etiam
vel succ. cit. arant. gran. acid. vel herb. endiv. acetos.
portul. lactuc. &c. Additur subinde paucum consum-
mat. item *crem. hord.* & si morbus minus acutus, pa-
natell. vel pulment. cum ov. vitell. vel carne gallin.
parat. bis aut ter in die, ov. forbile, contusum ex canc.
vel carnibus volatilium. In morbis longioribus *Victus*
nonnihil plenior convenit, ex carnibus pullorum gal-
lin. vitul. aliisque cibis exinde paratis. In morbis lon-
gis & periculosis, gravius est peccare in *victu nimis*
tenui, quam nimis *crasso*: econtra in morbis acutis
gravius est peccare in nimis *crasso*, quam nimis
tenui.

I V.

Quoad cibi quantitatem in morbis, plenius æger
cibari potest in morbi principio, dum ut cunque
melius se habet; propè statum verò, vel in ipso statu
valde tenuiter, quò enim statura magis in morbo ex-
pugnando occupata est, eò tenuior diæta imperanda,
& quo minus, eò plenior; hinc etiam in quolibet vi-
ctu triplex observatur dosis, summa nimirum, media
& insima. Prima convenit in morbi principio, media
in augmento, ac ultima in statu. Interim hoc non per-
petuo in omni morbo observandum, quia in initiis in-
flammationum, præsertim partium nobiliorum, duran-
te adhuc sanguinis ad partem affectam affluxu, utile
est, tunc minus cibare, ne augeatur fluxio: immo et-
iam in aliis morbis, si cruditas aliqua in ventriculo
vel intestinis lateat, quod rarissimè non accidit, præ-
stat tum parum cibi assumere, eamque victus parsimo-
nia absumere, quod Italis in primis frequens, qui
morbi curationem ut plurimum ab inedia incipiunt.
Interim gravius delinqueret, qui morbi initio nimis pa-
rum, quam nimis multum ederet, quod tamen contra-
rium est in statu morbi.

V.

Qualitatem Victus quod attinet, præscribitur illa
ab affectu, consuetudine & temperamento. In-
telligitur autem hic per qualitatem victus non illa qua-
litas, quæ victui inest, ut alimento seu merè cibo,
ut esse digestionis facilis vel difficilis, succi boni vel
mali, crassi vel tenuis &c. Sed quæ inest ipsi, quate-
nus simul est medicamentosus, calidus nempe, frigi-
dus, humidus, siccus, laxans, adstringens, incidens,

attenuans &c. Prout igitur est affectus, ita victum postulat contrarium, ut affectus calidus & siccus, victum frigidum & humidum &c. Ita tamen, ut consuetudinis & temperamenti simul habeatur ratio.

V I.

Occasio seu opportunitas in Victus ratione, desumitur ex ægri consuetudine, tempore sanitatis, ac virium tolerantia. Illo enim tempore debet æger cibari, quo minus a morbo patitur, eaque potissimum hora, qua ante morbum cibari consuevit, nisi morbi vehementia in illa hoc prohibeat, unde a sola consuetudine sumitur idoneum tempus in morbis, qui continentur seu sine typis affligunt. In morbis vero, qui accessiones, paroxysmos vel exacerbationes habent, nunquam cibus exhibendus, cum accessiones adsunt, vel proximè futurae sunt, sed cum cessant, vel quievunt, ne natura a pugna, pepasco & excretione materiae avocetur, nisi adsit magna virium jactura, vel accessio longior, vel corpus ægrotantis valde calidum & siccum, picrocholum, gracile, ac rarae texturæ, vel humor aeris ventriculum occupet, animi deliquium circa initia paroxysmorum efficiens, in quibus casibus in Paroxysmi initio, vel parum ante illum, aliquid cibi offerri potest. In intermittentibus subintransitibus, vel ubi saltem duæ vel tres horæ inter finem unius & principium alterius Paroxysmi intercedunt, æger cibandus in fine status primi Paroxysmi.

V I I.

QUod ad modum cibos exhibendi, hoc est, an paulatim, an repetitis vicibus? id deducitur ex viribus & morbo. Vires vel sunt debiles, vel mediocres, vel validæ. Debiles paucum, mediocres mediocrem, validæ copiosum postulant cibum. Morbus adjunctos habet humores multos, vel paucos, vel corruptos. Pauci cibum copiosum, multi paucum, corrupti pro eorum correctione copiosum exigunt cibum; hinc ubi in morbis vires validæ, & cum humorum copia conjunctæ, raro & parum adendum. Ubi vires validæ, cum humorum paucitate, ibi sæpius & multum cibandum, nisi obstant morbis tempora aut Paroxysmi. Ubi vires sunt debiles, cum humorum abundantia aut mediocritate, ibi raro & parum alendum; denique ubi vires sunt debiles, cum humorum paucitate aut corruptela, ibi parum ac sëpè cibandum. Interim juxta monitum Hippoc. i. aph. 16. aliquid datum consuetudini, temporis, regioni & etati.



ARTICULUS II.

De Officio Medici, in consideranda & præscribenda Diæta Refrigerante.

I.

MOrbi calidi, ut v. g. Febres cuiuscunque generis, inflammationes, aliique ex materia calida & biliosa oriundi, Diætam exigunt refrigerantem. Aer igitur sit natura frigidus, vel arte talis paretur, per aquarum transvasationem, pavimenti cubiculi conspersionem cum aqua & aceto, vel herbis refrigerantibus. Sicuti autem convenit aer frigidus inspiratio-ne attractus, corporis æstum mitigans, ita nocet corpore denudato exceptus, cum diaphoresin maximè necessariam impedit, & fuligines ac sudores intro repellat. Panis sit probè coctus & fermentatus. Ex carnis bus conceduntur carnes Gallin. capon. pull. gallinac. columb. hædin. vitul. &c. magis tamen elixæ. Item carnes avium montan. & sylvest. condiri possunt acet. vel succ. cit. arant. granat. A Piscibus abstinendum, nisi ægris gratificando, faxatiles quosdam excipias, ut fundulos, truttas, thymalos &c. Inter fructus, concedi possunt fraga, poma acida, pyra cocta, mala citria, punica, cerasa acida exsiccata & cocta, pruna cocta &c. Ex oleribus, lactuca, endivia, cichorium, spinachium, acetosa &c. Legumi-na omnino vitentur, nisi juscula pisorum, uti & ladicinia omnia. Prodest maximè Crem. hordei, qui sequenti modo optimè paratur: R. Hord. mund. q. pl. coque in aq. commun. lento igne, ita ut fer-
vfacta abjiciatur, novaque reaffundatur per ho-

ras 6. vel 7. donec in pulmentum abeat , postmodum in mortario lapideo reratur , ac tremor per pannum coletur , & exprimatur hinc in Juscule Gallinæ dissolvitur , ac iterum coquitur , ad consistentiam mediocrem instar tenuis contusi , aromatizatur subinde paucō macer. vol croc. Interdum etiam aliquid sacch. additur præfertim cand. , in affectibus pectoris . Hujus Cremoris summa est utilitas , in febris ac affectibus pectoris catarrhosis & hæticis . *Potus* sit vinum oligophorum , nisi febris & alia obstant contraindicentia , aut alijs refrigerans , uti in formulis annexis patet . Vitanda *exercitia* & *affectus animi* . *Somnus* sit consueto longior , ac *alvus* quotidie laxa .

Formulæ

Potum ordinariorum Refrig- rantium.

JUlepus . R. Aq. font. lib. iii. syr. herb. unc. i. rub. id unc. ii. acetos. cit. unc. i. spirit. vitriol. q. s. M. Alius . R. Decoct. C. C. vel aq. font. lib. ii. syr. de rub. id. unc. iii. spirit. sulph. campan. q. s. vel nit. antimoniat. dr. i. M.

Alius . R. Rad. scorz. rec. unc. i. coq. in s. q. aq. s. in Col. lib. ii. ss. dissolv. syr. de rub. id. viol. ceras. acid. an. unc. j. spirit. vitriol. q. s.

Tinctura rosarum . R. Tinct. ros. cum s. q. spirit. vitriol. acificat. lib. iii. vel R. Syr. pro tinct. ros. parat. unc. iii. aq. font. lib. ii. sp. vitriol. q. s.

Julepus Alexandrinus dictus . R. Aq. font. lib. i. aq. ros. succ. lim. sacch. alb. an. unc. iv. coque lento igne , dum despumaverint .

Alius . R. Aq. font. lib. iv. sacch. alb. unc. iii. san-
tal. cit. cinam. an. dr. i. coq. lento igne , despum. *U* Col.
Ju-

Julapium siccum. R. Succe. cit. herber. an. unc. ii. ss. sacch. albiss. lib. i. ponderis civilis. M. super marmore per agitationem, donec induat formam Julapii siccii. De hoc 3. vel 4. cochl. in mensura ap. font. solvantur, pro compescenda siti.

Limonada. R. Aq. font. vel decoct. C. C. lib. iv. succ. lim. unc. iii. sacch. albiss. q. s. M. possent etiam addi nit. perlat. dr. ij.

Alia. R. Decoct. C. C. vel aq. font. mens. i. ss. in hanc injiciantur 2. Poma citria in taleolas tenues secta, & cum sacch. fin. s. q. dulcorata, subinde dissolvi possunt seq. syrupi. R. Syr. acer. cit. e succ. viol. an. unc. ii. spirit. vitriol. q. s. Vel R. Julep. ros. syr. acetos. cit. an. unc. ii. sp. vitriol. gut. vi. aq. cinam. dr. iij. M.

Decoctum Cormu Cervi, vix non omnibus morbis competens. R. Limat. C. C. unc. ss. vel dr. vi. cog. in aq. font. mens. ii. tam diu, quamdiu ova diuriora coqui solent. Post refrig. col. interdum cort. cit. adduntur, & sacch. sub finem coct. interdum syrupi dissolvuntur.

Decoctum Hordei usuale in Febribus, affectibus Petoris & Renum calidis. R. Hord. crud. m. ij. rad. lig. dr. vi. aq. font. lib. vi. cog. ad consumpt. lib. ii. addendo in fine sem. fœnic. parum contus. dr. ii. post refrig. col. pro potu.

Aliud. R. Hord. integ. m. i. ss. passul. min. unc. ss. sem. anis. fœn. an. dr. ij. fl. cord. an. p. i. aq. font. pur. lib. iv. cog. ad hordei crepat. addendo in fine sacch. cand. unc. col. & cum album. ov. clarif.

Aliud. R. Hord. integ. m. ij. cog. in aq. font. mens. i. ad dimid. addi sacch. alb. unc. j. ss. crem. tart. dr. ii. ss. succ. lim. & sp. vitriol. q. s. ad gratum acorem, vel adde nit. præp. dr. i. ss. sacch. alb. unc. i. ss. cinam. in pet. lig. dr. i. ss.

Decoctum Hordei, in Pleuritide. R. Rad. lig. dr. iii. sem. fœnic. dr. ss. cinam. acut. scr. ij. sacch. cand. unc. ij. aq. bord. lib. vi. cog. ad. 3. in Col. dissolv.

Julep. viol. unc. ij. ss. spirit. sulph. gut. xv. M.

Aliud. R. Rad. liq. dr. ij. passul. min. bord. mund. spec. decoct. pector. an. m. i. dentur incisa ad Char. S. Species pro potu aquæ pro duabus mensuris, quarum dimidia mensura ebullitione consumatur.

Alio pro Angina. R. Hord. mund. & excort. cochl. 2. passul. min. sacch. an. cochl. in Coq. in mens. i. f. aq. ad. remanent. mensuræ.

Decoct. Hordei compositum, in Febribus ardenti- bus. R. Rad. acetos. scorz. an. unc. ss. bord. mund. m. i. C. C. rasp. unc. i. pom. cit. N. i. ceras. acid. m. ss. cinam. dr. i. ss. coq. in f. q. aq. font. ad lib. ii. in Col. dissolv. si placet, syr. rib. herb. an. unc. i. ss. sp. sp. vitriol. q. f. pro grata aciditate.

Aliud. R. C. C. rasp. vel ust. unc. i. bord. integ. unc. i. ss. anis. saenic. an. dr. ss. M. incis. & contus. den- tur ad Chart. S. Species pro potu ordinariorum dua- bus mensuris aquæ coquendæ.

Decoct. Tartari crud. R. Tart. alb. unc. i. vel. f. coq. in aq. font. mens. i. vel i. ss. remota subsidentia fit Potus limpidissimus.

Potus in Variolis. R. Limat. C. C. vel ust. præp. dr. vi. lent. excort. dr. iii. sem. foenic. coriand. passul. min. an. dr ii. rad. acetos. unc. ss. coq. in aq. font. lib. iii. vel iv. ad consumptionem dimidiæ.

Potus refrigerans & præcipitans in Febribus. R. Sal. nit. præp. C. C. phil. præp. an. unc. ss. sacch. al- biss. unc. i. M. F. Pulv. cuius unc. ss. misceatur cum mensur. i. aq. font.

Alius. R. Decoct. bord. & lib. ii. spirit. sulph. q. f. ad gratam aciditatem, C. C. ad albed. calcin. unc. ss. vel dr. vi. M. utatur pro Potu ordinario, vas usus tempore agitando.

Alius in Febre ardente, cum metu Prunellæ. R. Sal. nit. præp. unc. i. crem. tart. dr. ii. sulph. alum. crud. an. dr. ss. sacch. opt. unc. ii. M. F. Pulv. de quo cochl. parvum cum aq. font. mens. i. misceatur & agitetur.

Alius.

Alius. R. Nit. depur. C. C. phil. præp. vel Ebor. sn. igne præp. an. dr. ss. vel scr. ij. M. F. Pulv. dentur 4. doses quarum una cum ag. font. vel decoct. bord. aut decoct. limat. C. C. mensura una misceatur, & transvasetur pro Potu ordinario. Si Diarrhœa vel Fluxus sanguinis simul infestet, addi vel sumi potest C. C. ust. præp. terr. sigill. corall. &c.

ARTICULUS III.

De Officio Medici, in consideranda & prescribenda Diæta Calida.

I.

MOrbi frigidi, exorti a materia viscida, pituitosa, & frigida, Diætam exigunt calidam, quæ in hoc consistit, ut Aer sit serenus, tenuis, purus, ac calidus, panis probè fermentatus, ac modico sale & semine carvi conditus. Ex carnibus concedantur carnes gallin. capon. pull. gallinac. & columb. vitul. hædin. avium mont. & sylvest. Condiri possunt piper. z. z. mac. rorismar. thym. satur. salv. major. hyssop. abstinentia a piscibus, nisi saxatilibus, fructibus horariis, lacticiniis, leguminibus. Aromatum usū sit frequentior: Ex oleribus convenient, petrosel. brass. bet. asparag. raphan. nasturt. &c. potus sit vinum merum, aut modicè dilutum, vel si hoc contraindicitur, unus ex sequentibus; exercitia & vigiliæ sint moderatae, alvis laxa, animi Pathemata præter gaudium vitentur.

Formulæ

Potuum ordinariorum Calefacientium.

Aqua cocta fœniculi. *R. Sem. fœnic. dr. i. coq. in 2. men. aq. font. per quadrantem, injectis ind. cinam. opt. parum incis. un. ss. vel dr. vi. amove ab igne, vasque clausum repone, donec frigescat, tandem 2. vel 3. frustula panis sponginei impone, ibique permette.*

Aqua cocta Cinamomi. *R. Aq. commun. ib. iv. sacch. alb. dr. x. coq. donec ebull. add. cinam. acut. contus. dr. iii. mox ab igne remove operculoque tege, ac refrigeresce-re sine & cola.*

Aqua cocta Sassafras. *R. Lign. sassafr. crassé limat. dr. x. coq. in duplice vase in lib. xii. aq. 3. vel 6. bo-ris, ubi refrixerit. Col.*

Alia ex sassafras & cinam. *R. Aq. font. lib. ix. ci-nam. op. unc. ss. lign. sassafr. rasp. dr. i. indantur in vas bene clausum quod dein immergatur aquæ calidæ, in qua horis 4. vel 5. ebulliat.*

Aqua cocta grata. *R. Sem. coriand. præp. dr. ii. liq. ras. dr. iii. sem. anis. scr. ss. cinam. acut. dr. ii. decoq. in aq. mens. ii. s. aliquoties ebull. Col.*

Tragæa, Potum præbens gratissimum. *R. Lign.saf-safr. dr. x. chin. opt. dr. vi. liq. dr. i. cinam. opt. unc. ss. sem. anis. dr. ii. C. C. præp. dr. ii. ss. ocul. canc. præp. dr. i. M. F. Pulv. huius unc. i. seu cochl. coq. in lib. iv. aq. font. post colaturam in cellam repone, ut refrigeretur, sic enim subsidentibus speciebus in fundo vasis, aqua supernata clara & utilis.*

Alia. *R. Scob. lign. sassafr. rad. chin. an. unc. ss. ci-nam. opt. dr. ii. sem. anis. dr. i. C. C. præp. ocul. canc. præp.*

præp. an. dr. i. ss. M. F. Pulv. gross. de quo cochl.
i. mensura aquæ servidæ statim post affusionem opercu-
lo tegende iniiciatur. In affectibus Pectoris. unc. i.
passul. addi potest.

Alia. R. Scob. Rad. chin. unc. i. lign. lentisc. sant.
cit. an. dr. ii. cinam. opt. dr. i. sem. anis. dr. i. C. C. ust.
ocul. canc. an. dr. iii. M. F. Pulv. gross. de quo Co-
chl. i. lib. iv. aq. font. servid. iniiciatur. ac urceus
statim claudatur.

Potus gustu & colore suavis, in Podagricis con-
firmatis. R. Sarsapar. unc. vi. lign. sassafr. chin. C.
C. an. unc. ii. glyc. unc. i. cog. in aq. font. cong. ii.
per horam dimidiā, dein stent coperta in cineribus
calidis per horas 12. Postea ebull. ad 3, part. consumpt.
cum ab igne amovetur, add. anis. unc. ss. post 2. ho-
ras Col. & depur. per resident. ac liquor clarus re-
patur in lagenis vitreis probe clausis ad usum.

Bochetum in Arthritide. R. Rad. sarsapar. unc.
ii. lig. unc. i. cinam. anis. an. unc. ss. M. F. Pulv.
tenuiss. cuius Cochl. i. misceatur cum mens. i. aq. font.
agitetur in 2. vasis ter vel quater. hinc Col.

Aliud. R. Sarsapar. unc. vi. lig. sassafr. chin. c.
c. an. unc. ii. glyc. unc. i. sem. anis. unc. ss. M. F.
Pulv. tenuiss.

Decoct. in eundem usum. R. chin. incis. unc. ss.
c. c. ust. unc. i. sacch. comm. unc. ii. cog. in aq. mens.
ii. ss. ad consumpt. dimidiæ add. sub finem cort. cit.
rec. dempta pulpa alba N. i. cinam. dr. ii. M.

Potus ordinarius in Paralyssi. R. Rad. chin. unc.
i. ss. sem. anis. unc. ss. cog. in aq. font. mens. i. ss.
ad consumpt. 3. part. addendo circa finem cinam. el.
dr. ii.

Alius in Colica convulsiva. R. Rad. chin. dr. ii.
sem. anis. vel fœnic. dr. i. passul. mai. exacinat. unc.
ii. cog. per quadrant. horæ cum lib. iv. aq. font. col.

Species pro Potu ordinario. R. Rad. chin. unc. i.
sassafr. unc. ss. passul. min. unc. iv. c. c. ust. unc.

s. s. sem. anis. fænic. tart. præp. cinamom. an. dr. ii.
M. incis. & contus. dentur ad Chart. Species pro po-
tu aquæ de quibus duo manipuli in duabus mensuris
aquæ coquantur , ita ut dimidia mensura ebullitione
consumatur .

Aliæ . R. Sant. rub. unc. ss. sassaf. chin. an. dr. iii.
sarsapar. dr. ii. passul. min. sem. fænic. an. unc. i. ss.
cinam. sacch. cand. rub. sal. nit. præp. an. unc. ss. M.
incisa dentur ad Chart.

Aliæ . R. Sem. anis. fænic. an. unc. ii. cort. cit. dr. ii.
sassaf. dr. vi. sarsapar. rad. chin. an. unc. i. santal.
rub. polypod. an. dr. ii. Cinam. dr. vi. dentur incis. &
contus. ad chart.

Aliæ utiles in Hydrope . R. Rad. Chin. unc. i. saf-
safr. sant. rub. citrin. an. unc. ss. rad. glyc. sem. anis.
fænic. an. dr. iii. cinam. dr. ss. passul. min. m. i. de
bis speciebus sumantur Cochl. iii. & coq. cum aq. font.
lib. v. ad consumpt. 3. part.

Potus Ordinarius in Urinæ retentione . R. Herb.
agrim. m. i. rad. petrosel. unc. i. liq. dr. vi. bacc. juniper
unc. ss. sem. carv. vel anis. fænic. an. dr. i. ss.
coq. in 3. mens. aq. ad 3.

Potus Juniperinus . R. Bacc. juniper. lib. i. passul.
min. lib. i. & unc. iii. (alii horum loco accipiunt ber-
beres) tartar. venet. ab unc. ss. ad unc. i. fruct. cynos-
bat. cum arill. m. i. fruct. acac. cum nucl. m. i. infund.
in aq. commun. lib. xvi. in vase apto ligneo , & pone
fornacem vel loco quodam calido fermentare permitta-
tur , hinc transvasetur . Potus hic in Austria familia-
ris , ac hypochondriacis in primis & lumborum , re-
numque phlogosi ac æstu correptis , pro potu ordinarie
utilis .

ARTICULUS IV.

De Officio Medici, in ordinanda & præscribenda Diæta Siccante.

I.

Diæta exsiccante indigent morbi, exorti a superflua humiditate, item defluxiones catarrhales, fluxus alvi immodi ci, illique in primis, qui Diæta seu cura sudorifera curari solent. Aer igitur sit natura siccus, vel arte talis redditus per accensum ignem & suffumigium. *Panis* sic bis coctus, sale & semine carvi benè conditus. *Carnes* assæ potius, quam elixæ, maximè sylvestres, ut turtur. *turdor.* *verdic.* *attagen.* *urogall.* *lepuscul.* *capreol.* *damar.* &c. *A piscibus & carne suilla* abstinendum. *Olera* convenient ea, quæ in diæta calida proposita. *Ex fructibus* prosunt, amygdal. cost. nuc. avellan. castan. cydon. *Ex frugibus* oryza. *Aromata utilia*, ni quid obstat. Vitentur *lacticina* & multa juscula, nisi chalybeata sint. *Potus* sit admodum parcus. Utendum vino diluto, aqua chalybea, vel alio potu infra assignando. *Somnus* sit consueto brevior, *motus* & *exercitium* prosunt, *alvus* sit laxa.

Formulæ

Potuum ordinariorum Exsiccantium.

BOchetum recens. R. Chin. opt. sarsapar. an. unc. ii. lig. sassafr. rec. unc. i. ss. rad. liq. ras. unc. i. passul. min. unc. iii. aq. font. lib. xxiv. incis. stent per 24. bor. hinc coq. s. a. ad remanent. lib. xviii. Col. detur pro Potu ordinario.

Aliud non recens. R. Resident. decoct. primar. add. rad. chin. ponderos. scorz. an. unc. i. ss. cinam. acut. dr. iii. passul. min. unc. iii. sem. fœnic. unc. ss. coq. in lib. xxv. aq. s. ad remanent. lib. xvi. Col.

Potus exsiccans in defluxionibus, & affectibus Capitis humidis. R. Rad. chin. caryophyllat. pœon. an. unc. iii. ras. lign. sassafr. unc. ss. cinam. unc. iii. incis. grosso modo dentur ad Chart. S. Species pro potu ordinario, de quibus manipulus in duabus mensuris aquæ coquatur, usque dimidia mensura ebullitione consumatur.

Alius. Lign. sassafr. rad. chin. an. unc. i. cinam. acut. unc. ss. C. C. præp. ocul. canc. præp. an. dr. i. M. ad Chart.

Tragæa pro Potu exsiccante. R. Scob. lign. lentiso. sant. cit. rad. chin. an. unc. ss. cinam. opt. dr. ii. rafur. ebor. unc. ss. galang. min. dr. i. ocul. canc. præp. dr. iii. M. F. Pulv. gross. de quo Cochli. in urceo cum aq. ferventis mensura misceatur.

Potius ordinarius in Vulneribus, R. C. C. ust. unc. i. bord. integ. unc. i. ss. anis. fœnic. an. unc. ss. M. Vel R. C. C. ust. unc. ss. bord. integ. unc. i. s. herb. agrim. veron. alchimill. sanic. an. p. i. rad. consolid. liquir. an. unc. ss. sem. anis. fœnic. an. dr. i. M. incisa dentur ad Chart. possunt etiam addi passul. liquid. &c.

Potus in Dysenteria. R. Rad. torment. C. C. ust.
an. unc. j. coq. in aq. chalyb. mens. i. ss. ad 3. add.
cinam. dr. ii. M.

Alius in Disenteria maligna. R. Raf. C. C. unc. i.
ss. rad. torment. acetos. an. unc. iii. aq. puriss. lib. v.
coq. ad remanent. lib. iii. ss. in Col. dissolv. vin. gran.
unc. ii. syr. acetos. cit. de rub. id. corall. an. dr. vi. M.

Potus in Diarrhoea. R. C. C. ust. rad. torment. carn.
cydon. siccata. an. unc. ss. cinam. opt. dr. iii. sem. foenic.
dr. iii. coriand. dr. ii. M. incis. dentur ad Chart.

Alius. R. C. C. ust. præp. terr. sig. vel Bol. Arm.
spod. an. dr. ss. vel scr. ii. M. F. Pulv. subtiliss. permi-
scendus mensur. aq. chalyb. vel Emuls. amygd. d. cum aq.
chalyb. fact.

Potus gratus in Vomitu vel Diarrhoea. R. Mast. el.
dr. i. coq. cum unc. xxxx. aq. font. in olla bene te-
cta ad 3. cui post coctionem adbuc ferventi injiciatur
flavedo cort. cit. rec. & cinam. integri digitis confract.
an. dr. i. stent simul cooperta, donec refrigerescant.

Huc pertinent, formulæ quoque nonnullæ Potuum
Calefacentium, supra propositorum.

A R T I C U L U S V.

De Officio Medici, in ordinanda & præscribenda Dieta Humectante.

DIETAM HUMECTANTEM EXIGUNT MORBI A SICCITATE,
AC DEFECTU NUTRIMENTI & HUMIDI RADICALIS ORIUNDI,
UT FEBRES HECTICÆ, ATROPHIÆ &c. IN HAC AER
SIT HUMIDIOR, PANIS MEDIAE ÆTATIS. EX CARNIBUS ELI-
GENDÆ, EUCHYMAE, UT GALLIN. CAPON. COLUMB. PERDIC.
PHASAN. ATTAG. ALIARUM AVIUM SYLV. EARUMQUE CONTU-
SA & CONSUMMATA. ITEM CARO HÆDINA, VITULINA, VER-
VECINA JUNIOR, AGNINA, PORCELL. LACTANT. INPRIMIS ETIAM
CONDUCUNT EX COCHLEIS, TESTUDINIBUS & CANCRIS PARA-
TA.

ta. Elixa magis prosunt, quam assa. Gelatinæ quam maxime utiles, ut v. g. Gelatina Caponis, hunc in modum parata: Rz. Capon. ping. deplum. exenterat. & mundificat. incid. cum ossibus minutiss. indatur lagenæ stanneæ, affundendo aliquant. aqua font. addendo, parum mac. & croc. hinc lagenæ clavo cochlearo arctissimè clausa, lutoque Philosophico munita, in abena cuprea aqua ferventi repleta, per horas 6. ad ignem cog. postea lagenæ aperta, brodium per inclinationem in vas terreum vitreatum effundatur, in que locum frigidum vel cellam reponatur & ad usum servetur. Vel sequens Gelatina analeptica. Rz. Carn. vitul. lib. i. pedum vituli N. ii. ichthycoll. dr. ii. hepat. vitul. lib. ss. cinam. opt. dr. i. ss. mac. dr. ss. hæc omnia grosso modo incisa, indantur lagen. stann. affundend. aqua font. lib. ii. ponatur lagenæ bene obturata in abenum aqua plenum, cog. per hor. 5. hinc. f. fort. express. servetur in cela in loco frigido ad usum. Vel Rz. Carn. vitul. vel vervec. mac. lib. i. Gallin. mundat. dimid. epat. vitul. vel agn. lib. ss. ichthycoll. dr. ii. mac. dr. ss. incis. & lot. inde lagen. stanneæ add. pom. cit. in 4. frusta divis. N. i. vin. alb. vet. lib. i. aqua font. lib. ii. lagenæ bene obturata indatur lebeti aqua pleno cog. 5. vel 6. hor. Colat. exprim. fortiter. De hac Gelat. quoties Junculum comeditur, immisceri poterunt Cochli. iiiij. vel iv. Sequens Sanguinem simul mundificat. Rz. Raf. C. C. unc. ii. ss. ras. ebor. unc. i. ss. aqua font. lib. iiiij. stent in infus. per noct. in loco calid. mane add. rad. scorz. rec. vel siccat. N. vi fol. borrag. m. i. fl. 4. cordum, an. p. i. passul. min. unc. ii. coq. ad gelatin. consist. addendo sub finem coct. Conf. ros. unc. ii. & tandem Confect. alk. compl. dr. i. ss. M.

Ex oleribus convenient, malv. bismalv. borrag. viol. nymph. Ex fructibus nuc. pineæ, pistac. amygdal. jujub. ficus, passul. pomadulc. prunc. dulc. &c. Lactis usus, ni quid obster, optimus; item ova sorbilia, tremor hordei & hordeata, v. g. Hordeatum Imperatoris

ris in Phthisi. R. Hord. integr. m. iii. coq. in aq. font. mens. i. ss. per 10. horas ad perfectam mollitiem, semper aliquid. aq. calid. affundendo, ne aqua evaporet, & consumatur, exprime deinceps erem. per pannum & in vase mundo ad usum serva. Hinc R. Herb. pilosell. tussilag. endiv. an. m. ss. rad. scorz. unc. ss. Coq. in brodio Gallin. insuls. exprime per pannum; in hoc brodio dissolv. crem. bord. cochl. i. vel alterum. Vel sequens Ital. & Gallis consuetum. ad defluxiones tenues sistendas. R. Hord. mund. sel. q. f. maceretur per 6. horas, coque perfecte, ut dissolvi possit, post R. Amygd. d. excort. unc. iii. sem. cucurb. unc. i. ss. melon. unc. i. papav. alb. lactuc. an. unc. ss. contus. omnibus cum aq. bord. eliciatur lac, quod cum lib. ii. pulp. bord. permixt. coq. parumper, addendo parum sacch. Vel seq. resocillans. R. Hord. mund. lib. i. facta ablutione coq. in f. q. aq. ad formam pult. dein. R. Crem. unc. vi. sem. melon. excort. amygd. an. unc. i. nucl. pineor. unc. ss. contund. simul, f. Hordeat, sumat ad vesperas in principio mensæ, solvendo in Jure Gall. cochl. iii. ex. consumat. Capon. & aromatiz. cum modico cinam. vel mac.

Formulæ

Potum Humectantium.

DE Costa Hordei varia, vid. supra de formulis Potuum Refrigerantium.

Aliud in Phthisi & affectibus Pectoris. R. Hord. mund. m. iij. passul. min. unc. i. ss. Juiub. N. xx. sem. anis. fænic. an. dr. vi. cinam. unc. ss. incis. & contus. dentur ad Chart. de his sume ad mensuras aquæ tres, totidem manipulos, coq. ad consumpt. 3. part.

Decoct. humectans Pectorale. R. Chin. sel. dr. iii. liquir. dr. ii. passul. min. mund. majorum exacinat.

an. unc. ss. sic. ping. dactyl. unc. an. N. v. jujub. sebest. an. N. xii. sem. 4. fr. mai. anis. fæn. an. dr. i. concis. & conquass. bull. in 3. mens. aq. font. per horam dimid. Col.

Aliud. R. Fic. ping. N. vii. jujub. N. x. dactyl. f. nucl. N. viii. sem. anis. fænic. an. dr. vi. vel unc. i. incis. grosso modo dentur ad chart. S. Species pro potu ordinario.

Emulsio pro Potu. R. Amygd. d. excort. unc. ii. sem. melon. excort. unc. i. subinde etiam pan. alb. tost. unc. i. aq. font. vel decoct. bord. lib. ij. vel. iiiij. M. F. Emuls. edulcoranda facib. ss. q. Si magis refrigerare animus, ad nit. perlat. scr. ij. vel dr. i.

Alia anti Hæctica. R. Chin. sel. unc. i. rasur. ebor. dr. ij. repleatur pullus bene saginatus, cog. in lib. vi. ad debitam cocturam binc col. de col. R. Lib. ij. sem. mel. ree. amygd. excort. an. unc. i. nucl. pin. unc. ss. M. F. Emulsio.

Alia Epiceraistica. R. Sem. papav. alb. dr. iii. melon. unc. i. ss. Contund. in mort. marmor. addendo amygd. excort. & per 3. horas in aq. lactuc. infus. N. xxx. Contund. & cum Jure pull. vel seq. decoct. lib. i. ss. vel lib. ii. F. Emuls. R. Rad. liq. dr. iii. sebest. N. iv. jujub. N. vii. passul. unc. ss. fl. viol. borrag. an. p. i. sem. portul. lactuc. an. dr. i. Coq. in lib. iii. aq. ad consumpt. 3. part.

Decoctum Pulli vel Carnis Gallinæ, utile pro restauratione Virium, & in doloribus Colicis, ubi maxima veutriculi & intestinorum sensibilitas. R. Pullum dimidium, vel Carnem Gallin. ex alis & pectore, dempta omni pinguedine, Coq. cum 4. mens. aq. in duplice vase per 4. hor Coletur subinde: pro gratia addi potest aliquid de cort. citr. vel cinam.

Diæta composita, calida & sicca, frigida & humida &c. desumi potest ex simplicibus.



INDEX RERUM.

A

- A**bstergentia: vid. Vulneraria.
 Acetum alexipharmacum præservativum 261.
 Acidulae: eas probandi varii modi 118. vires
 119. usus ibid. seq. noxae 121. tempus bibeendi
 122. seq. dosis 123. seq. operatio 124. seq.
 Adstringentia: 356. quomodo agant ibid. notanda in
 eorum usu 357. seq. formulæ 359. seq.
 Ægri prognostico relinquendi quinam 15. seq.
 Æsculapii simulacrum 26.
 Alexipharmacæ: 252. eorum diversa agendi ratio 254.
 usus 255. seq. formulæ 257. seq.
 Anacatharsis quid 204.
 Anacollema in hæmorrhagia narium 366.
 Anodyna: 368. quomodo agant ibid. formulæ 369.
 Anthelmintica: 271. notanda circa eorum usum 272.
 seq. formulæ 274. seq.
 Antiscorbutica: 339. notanda in eorum usu ibid. for-
 mulæ 340. seqq.
 Apollinis simulacrum 3. 5. seq.
 Apophlegmatismus liquidus 208. & seq. in amissa lo-
 quela 209. in dolore dentium ibid.
 Apophlegmatizantia 203. seq. eorum indicantia & con-

- traindicantia 204. seq. formulæ 208. seqq.
 Apoplexia sanguinea V. S. curata 58.
 Apozema digestivum in affectibus pectoris frig. 134. in
 affectibus melancholicis 135. antiphthisicum 313.
 Aqua passulata *Timæi* 139. laxativa ibid. 155. errhī-
 na 211. clareta pectoralis 211. vermisuga *Helmon-
 tiana* 119. carminativa 278. odorifera 295. ophthal-
 mica *Quercetani* 300. in epiphora *Timæi* 301. den-
 tifricia 307. asthmatica 315. pectoralis & antiphthisi-
 ca ibid. cordialis in febb. malignis 321. in hyper-
 catharsi ibid. perlata 322. confortativa ibid. in flu-
 xibus sanguinis ibid. in gravidis ibid. odorifera 325.
 clareta stomachalis 227. catapultorum 379. fusca
 379. cocta fœniculi 466. cinamomi ibid. sassafras
 ibid.
 Aquæ minerales, circa tractum Oenipontanum quæ
 107. seq.
Aquapendente, inscriptio cubiculi 54.
 Arcanum arcanorum 41.
Aristoteles Medico data responsio 20.
 Arteria, si loco venæ aperitur, quid agendum 74. ca-
 rum incisio commendatur 82. quando & quæ inciden-
 dæ 83.
 Arteriaca : vid. Thoracica.
 Arthritica : 343. quomodo agant ibid. notanda circa
 corum usum 350. seq. formulæ 351. seqq.
 Astrologia Medica 10.
 Attrahentia : vid. Vulneraria:

B

B *Aglivus*; ejus consilium in pleuritide 97.

Balnea: eorum differentiae 102. seq. probationes 103. aquæ dulcis effectus 104. quomodo utiliter instituenda 107. seqq. instructio horarum infessus 111. formulæ 124. seqq.

Balneum thermale *Sorbait* 114. in nephritide 115. in scabie ibid. fluore albo ibid. in suppressione mensium ibid. *Riverii* ibid. in procidentia uteri 116. in atrophia hectica ibid. hordeaceum ibid. articulos roborans ibid. formicarum 117. antiparalyticum ibid. in sterilitate ibid. in colica ibid.

Balsamus pro naribus obstructis 207. antipestilentialis 304. carminativus 278. cephalicus 295. antepilepticus ibid. antapoplecticus ibid. memoriam confortans ibid. stomachicus 330. sulphuris *Rulandi* 381. sclopetarius ibid.

Bechica: vid. Thoracica.

Benedictio Divina in morbis curandis omne fert punctum 32.

Bochettum rhabarbarinum 166. in arthritide 395. recens 398. non recens ibid.

Bolus laxativus 110. melanagogus 161. hydragogus ibid. chalogogus ibid. in gonorrhœa & lue venerea ibid. anthelminticus ibid. purgans minutissimus ibid. emeticus 176. sudoriferus in erysipelate 185. in febris malignis ibid. diureticus de terebinthina 191. chalybeat 229. narcoticus in nimio vomitu, hypercatharsi & singultu 249. in diarrhoea ibid. stegnotico anodynus ibid. alexipharmacus 258. febrifugus 269. carminativus 279. nephriticus 285.

Botanica Medicinæ oculus 11. ejus necessitas ibid.

Brodium alterans 79. mannatum 139. columbinum in catarrhis 347. diureticum 191. lithontripticum 285.

antiphthisicum 315. antasthmaticum ibid. aperitivum 335. antiscorbuticum 340. emmenagogum 346. antidyfentericum 369.

C

Capivacii arcana quænam 41.

Camphorata ubi convenienter 266.

Cardiaca: vid. Cordalia.

Carminativa quid 276. vis operandi 277. notanda & usus ibid. seqq. formulæ 278 seqq.

Cataplasma pro vesicatoriis 101. in ischuria vesicali *Forresti* 192. antifebrile 271. ad vermes 275. nephriticum 287. ophthalmica 301. oticum 306. in angina 310. pectorale 318. pleuriticum ibid. stomachicum 331. antipodagricum 355. domesticum ibid. contra abortum 365. in fluxu immodico mensium 365. adstringens in diarrhœa & dysenteria ibid. pro vomitu sistendo 366. in dolore capitis 370. hemorrhoidali ibid. *Grulingii* 371. anodynum generale in tumoribus & abscessibus ibid. suppurativum 381.

Canteria ubi profint 105.

Cephalica; 288. eorum nomina varia 289. notanda circa usum ibid. seq. formulæ 290. seq.

Celsi effatum in curandis morbis 45.

Ceratum ad fonticulos *Sculpti* 95. Magni Ducis Hætruriæ ibid.

Cerevisia anticachectica anthypochondriaca 334. *Buttleri* ibid. antiscorbutica 339.

Chalibis quid 335. vires & usus 235. seqq. notanda 226. seqq. formulæ 229. seqq.

China Chinæ quid 263. ejus vires ibid. seq. usus & exhibitio 264. seqq. objectiones & responsiones 267. seq.

Chirurgiæ necessitas 12. seqq.

- Chocolata quid 235. modus bibendi 236. qualitates & usus ibid. seq.
- Chymia necessitas 11.
- Cibos exhibendi modus 388. seq.
- Cingulum sapientiae 199.
- Claretum martiale *Minsicht* 228.
- Clyster domesticus 141. seqq. lenitivus 167. a capite revellens 168. acris in affectibus soporosis ibid. in asthmate & colica contumaci ibid. in gravida ibid. laxativus anticolonius ibid. diureticus 192. carminativus 286. hypochondriacus ibid. nephriticus 280. hystericus 349. in partu difficulti ibid. adstringens & consolidans in dysenteria 366. anodynus 371. oleosus in colica & calculo ibid.
- Coffeè quid 234. ejus parandi modus ibid. qualitates & usus 234.
- Collutio oris in dentium vacillatione 309. in gingivorum laxitate ibid.
- Collyrium ophthalmicum 300. in vulneribus oculorum 301. pro maculis & nebulis detergendis ibid. in epiphora *Timæi* ibid.
- Condensantia 355. quomodo agant ibid.
- Confectio ad acidulas 146.
- Consultatio Medico utilis 33. honorifica 34. alterius Medici familiaris 35. quando & quomodo istituenda ibid. seqq.
- Cordialia ; 318. eorum agendi ratio ibid. seq. applicandi modus 329. seq. formulæ 321. seqq.
- Cucupha in catarrhis 343. vertigine & incubo ibid. spiritus animales confortans ibid.
- Cucurbitulæ , quando & ubi applicandæ 83. seqq.
- Curationis fundamenta 9. anima 42.

D

- D**Ecocatum laxativum 81. sudoriferum in lue vene-
rea 182. aliud *Zroolfferi* ibid. in gonorrhæa ma-
ligna 182. in catarrhis & affectibus capitis 183. in
podagra ibid. in scabie ibid. alterans in ulceribus &
abscessibus ibid. diureticum 190. *Foresti* ibid. amarum
febrisfugum 268. vermisfugum 274. lithontripticum
289. oticum 304. pectorale 313. ad tussim ibid.
galli veteris in affectibus thoracis 315. in anore-
xia 327. anteictericum *Lindan*. 333. antihydropic-
cum 334. emmenagogum 344. ad hæmoptysin *Ti-
mæi* 359. ad casum 377. vulnerarium ibid. ad her-
niam 378. C. C. 391. hordei in febribus ibid. in
angina 392. in arthritide 395. phthisi 401. hume-
ctans pectorale 401. pulli vel carnis gallinæ 402.
Dei præsides Medicinæ 3.
Dentifricium infantum dentientium 307.
Dentilavium scorbuticum 308.
Diæta sudorifera in paralysi 182. in suffusione ib.
Diaphoretica : eorum distinctio 179. vis operandi
ibid. cautelæ ibid. formulæ 181. seqq. usus 257.
seqq.
Digestiva quid sint 131. formulæ 133. seqq.
Discutientia : vid. Vulneraria.
Diuretica ubi conveniant 188. operandi modus ibid.
seq. observanda 189. seq. formulæ 190. seq.

E

EClegma: vid. Linctus.

Elæosaccharum carminativum 279.

Electuarium ad acidulas 129. laxativum *Burrhi* 140. sudoriferum 185. chalybeatum 219. opiatum antidysentericum 290. bezoardicum 257. in peste & febb. malignis 258. febrifugum 274. carminativum 278. lithontripticum 285. anticatarrhale 290. confortans cephalicum 291. antepilepticum ibid. contra vertiginem ibid. antimelancholicum ibid. ophthalmicum 298. antiphthisicum 310. asthmaticum ibid. cordiale 322. in palpitatione cordis 323. stomachicum calidum 328. epaticum 335. antiscorbuticum 340. lochia provocans 346. antipodagricum *Sydenham* 351. in hæmoptysi 361. adstringens in diarrhoea ibid. pro fistendo vomitu ibid. antidysentericum ibid. in gonorrhœa ibid. contra abortum 362. in nimio mensium fluxu ibid.

Elixir antinephriticum 284.

Emeticorum usus & regimen 284. formulæ 174. seqq.

Emollientia: vid. Vulneraria.

Emplastica 256. quomodo agant ibid.

Emplastrum vesicatorium 101. in dolore dentium ibid. antifebrile 271. vermifugum 375. carminativum 280. stomachale *Cratonis* 331. hepaticum 339. spleneticum 341. matricale 348. antipodagricum 354. ischiatricum ibid. præsens vomitu 365. contra abortum ibid. in doloribus catarrhosis 370. in clavis pedum 381. tumore pedum ibid. diasulphuris *Rulandi* ib. mammillare ibid.

Emulsio purgans 163. sudorifera in variolis & febribus malignis 185. diuretica 191. opiate 245. alexipharmacæ *Cratonis* 257. antinephritica 285. antepileptica

ptica 290. antipleuritica 315. antiphthisica ibid.
 perlata *Montragnanæ* 324. *Creationis* ibid. adstringens in fluxibus sanguinis 360. antidysenterica 361.
 hypnotica 368. humectans 476. antihectica ibid.
 epiceraistica ibid.

Enema: vid. Clyster.

Epithema cordiale frigidum in febb. 324. epaticum
 frigidum 336. cephalicum 369.

Epulotica: vid. Vulneraria.

Errhina 200. seq. eorum indicantia 201. contra indicantia 202. seq. observanda ibid. seqq. formulæ 206. seqq.

Essentia in obstructionibus 135. martis *Hartmanni* 229.

Evaporatio anodyna in dolore aurium 305.

Expectorantia quomodo agant 204. notanda & usus 205. formulæ in materia tenui 210. in crassa & viscida 211.

Experientia quid 13.

F

Ebrifuga: 262. seq. observanda circa eorum usum 263. seq. formulæ 268.

Fomentum carminativum 280. ophthalmicum *Plempii* 300. in doloribus arthriticis frigidioribus 353. in dolore dorsi ibid. ischiadicum ibid. podagricum ibid. in ulceribus contumacibus 378. ad erysipelata & exulcerationes ibid. gangrenam & sphacelum ibid. pro membris fractis vel luxatis 379. a gelu sideratis ibid. dolore & tumore pedum ibid.

Fonticuli quibus in morbis convenient 90. observanda 91. loca ibid. quomodi excitandi 92. iis excitatis quid agendum 93.

Frontale in hæmorrhagia narium 366.

G

- Argarismus in prunella febrium 308. in aphthis & angina 309. in inflammatione uvulæ & tonsillarum ibid. anodynus *Foresti* ibid. in faucium exulceratione ibid. detergens in rupto abscessu 310.
 Gelatina caponis 399. analeptica ibid. sanguinem minificans 400.
 Globuli caustici ad fonticulos 95.
 Glutinantia: vid. Vulneraria.
 Grumos resolventia: vid. Vulneraria.

H

- Æmorrhoides quibus sint salutares 87. seq. *Harpocrates*, silentii Deus 3.
 Hepatica: 332. eorum agendi modus ibid. seq. notanda circa usum 333. formulæ ibid. seqq.
 Hippocras; vid. Vinum Hippocraticum.
Hippocratis interrogata apud ægrotum 24. aphorismi de purgantibus explicatio 145.
 Hirudines ubi & quomodo applicandæ 80. seqq. quantum sanguinis per eas sit evacuandum 89.
 Hordeatum Imperatoris in phthisi 400. Italis & Gallicis consuetum ad defluxiones tenues 401.
 Hypnotica: 367. quomodo agant. ibid. formulæ 368.
 Hypochondriorum status probe explorandus 25.
 Hysterica: 342. quomodo agant 333. notanda in usu eorum ibid. seq. formulæ 344. seqq.

I

Infusum cort. china chinæ 268. diureticum 285.
anteictericum *Riverii* 333.
Injectio auricularis in surditate 304. in ulcera cava 382.
Intercipientia: vid. Thoracica.
Ischæma: vid. Sanguinem sistentia.
Italorum morbos curandi modus 385. seq.
Julepus digestivus in affectibus capit. frig. 134. in affe-
ctibus mulierum frig. ibid. antiscorbuticus ibid. laxa-
tivus 140. purgans 162. diureticus 290. antinephri-
ticus 284. antepilepticus 290. pectoralis 313. cor-
dialis 321. vitæ ibid. perlatus ibid. stomachalis 327.
emmenagogus 345. hystericus camphoratus ibid. fœ-
tidus ibid. moschatus ibid. in hæmorrhagiis 360. hy-
pnoticus 368. refrigerans 390. Alexandrinus ibid. sic-
cus ibid.

L

LAc: ejus substantia 213. seq. bonitatis signa 214.
differentiæ ibid. usus 214. seqq. noxæ 216. seq.
cura quotplex 215. seq. regimen & notanda 219.
seqq. formulæ 222. seq. caprinum antiscorbuticum
ibid. antidysertericum ibid. in mictu cruento ibid.
cancerinum in phthisi 223. arte factum ibid. antihe-
cticum ibid.

Lapis septicus ruptorius 94. infernalis ibid. causticus
Heurnii ibid.

Laudanum opiatum quid 237. ejus præparationes ibid.
qualitates ibid. usus 238. seqq. cautelæ 244. seq. ob-
jectiones & responsa 248.

Lenitiva: corum indicatio 130. operandi modus 137.
observanda ibid. seq. formulæ 138. seqq.

Limonata 391.

Linctus expectorans 210. in pleuritide ibid. Wepferi 211. in prunella 310. in faucium excoriatione ibid. antiphthisicus 316.

Linimentum pro naribus obstructis 207. ophthalmicum 300. ad ulcerata faucium & gingivarum 310. stomachicum 331. in doloribus suræ 370. in dolore ischiatrico ibid. haemorrhoidum ibid. ad ambusta 380.

Lithontriptica ; 281. notanda circa eorum usum ibid. seqq. formulæ 284.

Lixivium diureticum 191.

Looch album 316. domesticum ibid.

Lotio pedum ; vid. Pediluvium.

Lunæ appellatio 10. effectus 11.

M

MAnna julepata 152.

Masticatorium in catarrhis 208. in difficulti auditu ibid. in paralyssi & apoplexia 209. in dolore dentium ibid.

Medicamentum, vid. Remedium.

Medicina : ejus origo 1. soror germana 9. principia ibid. anima & mater 13. contemptores, quomodo refutandi 22. Deorum munus 50.

Medicus : ejus religio 1. cynosura ibid. cælites Medici 2. quando venerandi ibid. virtutes cardinales 3. vitia 5. scientiæ ac disciplinæ 7. seqq. Medicus cur dicantur Physici 9. vocatio 10. se ipsum non curet 16. quomodo erga hostes gulosos & ingratos se gerere debeat 17. seqq. quid in visitatione apud ægrotos ei considerandum 18. seqq. vestitus 22. defensio contra osores ibid. causam morbi probe investiget 23. quæstiones apud ægrotos quæ movendæ 24. cautelæ in prognosi 27. seqq. timidos consoletur 32. seq. Medicorum dissensus ægroto sâpe utilis

P

Palladis simulaerum 26.

Paregorica : vid. Anodyna.

Passulæ laxativæ 138.

Pasta dentifricia Dominarum 307.

Pediluvium anticitarrhale 295. in dolore capitis ibid.
in asthmate 318. in suppressione mensium 348. podagricum 352. hypnoticum 368.

Pharmaciæ necessitas 12.

Philosophia Medicinæ foror 9.

Pilulæ laxativæ 128. 140. cephalicæ 158. catarrhales
ibid. ophthalmicæ ibid. catholicae ibid. anthelmin-
ticæ ibid. antihypochondriacæ 159. hydragogæ ibid.
melanagogæ ibid. purgantes in lue venerea ibid. antiarthriticæ ibid. mundificantes in scabie 160. *Ema-
uelis* uterinæ ibid. stomachitæ ibid. emeticæ 176.
diureticæ 191. chalybeatæ *Sydenham* 230. *Riverii*
ibid. opiatæ in tussi & catarrho tenui 250. in phthisi
incipiente ibid. in colica ibid. anodynæ in podagra
ibid. in dysenteria & hyporcatharsi ibid. febrifugæ
270. hystericae 346. in mensium diminutione 347.
antipodagricaæ 352. adstrictivæ in gonorrhæa 363.

Placenta carminativa 280.

Pneumonica : vid. Thoracica.

Porotica : vid. Vulneraria.

Potio lenitiva ex manna 152. in febribus 153. phleg-
magoga 153. cholagoga ibid. hydragoga 154. mela-
nagogga ibid. miætagoga ibid. purgans in fluxibus
alvi ibid. sanguinis 155. in diarrhoea & dysenteria
154. emetica ex vitriolo 175. croco metallorum
ibid. vitro antimonii ibid. ex syrup. emet. sudori-
fera in febribus malignis 184. diuretica suavis 190.
alexipharmacæ 255. antifebrilis 268. antinephritica
285. ad expellendam secundinam 346. in variolis

392. refrigerans in febb. ibid. in prunella 393. in podagrīcī confirmatis 494. ordinaria in paralysi ib. in colica convulsiva ibid. in urinæ retentione 396. juniperina ibid. exsiccans in effectibus capitī humidis 398. ordinaria in vulnerib⁹ ibid. in dysenteria 399. in vomitu & diarrhoea ibid.

Potiuncula ad dystociam vel centies experta 345.

Potus: vid. Potio.

Præparantia quid sint 131. quæ circa ea observanda ibid. seq. formulæ 133. seqq.

Praxis sine Theoria fallacissima 12. seq.

Prognosis: ejus commoda 28. difficultas ibid. seq.

Pruno laxativa 138.

Pulsus: quid indigitet Medico 24. ei soli non fidendum ibid.

Pulvis digestivo-laxativus 80. ad acidulas 129. digestivus hypochondriacus 133. in febribus intermitt. ibid. in cachexia ibid. in scorbuto ibid. absorbens Wedelli 133. laxativus 140. 167. *Cornachinus* chologogus 156. hydragogus ibid. mictagogus ibid. arthriticus ibid. purgans anthelminticus 157. antihydropicus ibid. in fluxibus alvi ibid. carminativus ib. solutivus 157. emeticus 174. sudoriferus & expulsivus in variolis 186. alexipharmacus Mindereri ibid diureticus 192. sternutatorius 207. Hartmanni ibid. in catarrhis ibid. coryza ibid. cerebrum corroborans 208. Papalis ibid. chalybeatus cachecticus 230. in suppressione mensium 231. diaphoretico-anodynus in arthritide 251. nephriticō-anodynus ibid. alexipharmacus 261. antifebrilli 270. anthelminticus 275. carminativus 279. nephrocatharticus 286. cephalicus corroborans 293. antapoplepticus ibid. antepilepticus ibid. crinalis 294. ophthalmicus 299. dentifricius 307. antiphthisicus 317. antipleuriticus 318. pectorali Michaelis ibid. cordialis 323. analpticus ibid. stomachicus 329. pepticus 330. aperitivus & digestivus 335. anteictericus Timaei ibid. præ-

cipitans & absorbens 336. antispleneticus 341.
hystericus Timæi 347. partum provocans ibid. emmenagogus ibid. arthriticus *Wepperi* 352. contra abortum 363. contra fluorem album 363. contra diarrhœam ibid. antidysentericus ibid. Americanus ibid. vomitum sistens 364. stegnoticus in nimio mensium fluxu ibid. ad casum 378. ad erysipelas *Mynsichti* ibid.

Purgantium formulæ variæ generis 152. seqq.

Purgatio 130. ejus indicatio 142. obseranda ibid. 144. seqq. 150. seqq. tempus 144. locus 147. signa 148. differentiæ ibid. seqq. operandi vis 149. seqq. usus 150. seq.

R

R Emedia: quomodo iis utendum 43. vulgarium & simplicium præstantia 44. quibus abstinentum ibid. seq. quando 45. temere non sunt mutanda 46.

Repellantia: vid. Vulneraria.

Rosa solis 327.

Rotulæ in scutore oris 210. expectorantes ibid. in tussi & raucedine 221. catarrhales ibid. anthelminticæ 274. cephalicæ 292. contra vertiginem ibid. antapoplecticæ ibid. antiphthisicæ 316. cordiales 323. stomachales 329. bibitoricæ ibid. contra sodam ibid.

S

- S**Acculus carminativus 280. anodynus 286. cordialis 324. stomachalis 331. anodynus in cōlica 371. in pleuritide ibid. nephritide ibid.
 Sal usualis oxydorcius 299.
 Salivantium formulæ 199. seq.
 Salivatio quid 193. ejus materia ibid. indicantia & contraindicantia 194. observanda 195. seq.
 Sanguinem sistentia: 356. notanda in usu eorum ibid. seqq.
 Sanguis optimus quis 76. color ibid. consistentia 78. serum ibid. seq.
 Sarcotica: vid. Vulneraria.
 Scarificatio quomodo institienda 85. seq.
 Serum lactis 80. compositum ibid. Fonsecæ 81. in scabie 222. antiscorbuticum ibid.
 Signa: eorum fontes 26.
Socratis ultima verba 49.
 Sostrum: quid de illo Medico considerandum 49. seqq.
 Sparadrapum 94. viride, ibid.
 Species pro vino 79. pro decocto traumatico 377. pro potu ordinario 395. in hydrope 396.
 Spiritus vini purgans 162.
 Splenetica: 337. quomodo agant ibid. seq. notanda circa eorum usum 338. seq. formulæ 339. seqq.
 Stegnotica: vid. Adstringentia.
 Sternutatio quomodo fiat 200.
 Sternutatoria vid. Errhina.
 Stomachica: 325. eorum agendi modus ibid. seq. notanda in usu 326. seqq. formulæ 327. seq.
 Succi antiscorbutici 341.
 Succi digestivi in affectu hypochond. 134.
 Succolata vid. Chocolata.

- Sudor quomodo contingent 176. seq. ubi conveniat 177.
seq. coindicantia 178.
- Sudorifera vid. Diaphoretica.
- Suffitus oticus 304. humidus in suppressione mensium
vel lochiorum 348. siccus in eundem finem ibid.
indoloribus articulorum 355. in diarrhoea 366.
- Suppositorium 141. acre in affectibus soporosis 169.
- Suporantia vid. Vulneraria.
- Sydenham*: ejus cura dysenteriae 215.
- Syrupus ad acidulas 129. purgans 162. chalybeatus 229.
narcoticus 249.

T

- T**Abellæ chalybeatæ 230. carminativæ 279. anapoplecticæ 292. cardiacæ 323. corallinæ *Timæi* 362.
contra abortum 363.
- Tabula generalis pro V. S. instituenda 71. pro balneo 110.
- Terebinthina liquida 190.
- Theæ vires & usus 231. seq. abusus 233.
- Theoriæ necessitas ad Praxin Med. acquirendam 12.
seqq.
- Thermæ : earum agendi modus 104. usus ibid. seq.
noxæ 106.
- Thoracica : 311. eorum differentiæ & modus agendi
ibid. seqq. notanda circa usum 313. seqq. formulæ
313. seqq.
- Tinctura martis 229. antifebrilis 269. rosarum 390.
- Tragæa ad acidulas 128. carminativa 279. in vertigine 293. confortans cephalica 294. visum corroborans 299. in affectibus pectoris 318. cordialis 324. stomachica 330. epatica 336. emmenagogæ 348. in vomitu gravidarum 364. potum præbens gratissimum 394. pro potu exsiccante 398.
- Traumatica : vid. Vulneraria.

Trochisci alexipharmaci 260. pectorales 316.
Turundæ acovisticæ 305.

V

Venæsectio , quando indicantur 56. seqq. ubi non adeò necessaria 57. seq. pro cura prophylactica administranda 59. quæ circa eam observanda ibid. seqq. senibus prohibita 61. abortum præcavet 62. ejus impedimenta 63. revulsoria 64. locus ibid. quantitas 65. seq. tempus 67. seqq. tabula generalis 71. cautelæ 72. seqq. judicium de sanguine misslo 76. seqq.

Venarum distensio a flatibus 61. earum electio 63. seq. Venenum quid 252. seq. eorum agendi modus 254.

Vesicatoria , ubi convenientia , 96. seqq. locus applicatiois 98. observanda 99. seq. contraindicantia 100. formulæ 101. seq.

Victus quotuplex 385. quæ circa eum observanda 386. seqq.

Vinum passulatum *Timæi* 139. medicatum purgans 165. hydragogum ibid. antihypochondriacum ibid. diureticum 191. chalybeatum 228. *Riverii* ibid. attenuans & deobstruens ibid. anticachecticum 229. alexipharmacum præservativum 264. antifebrile 269. anthelminticum 274. anticatarrhale 290. euphragiatum ophtalmicum 298. *Hippocraticum* 327. absinthiacum 328. stomachicum ibid. anticachecticum 334. antiscorbuticum 339. emmenagogum 346. ad fætum motuum ejiciendum ibid. arthriticum purgans 351. alterans ibid. antipodagricum *Paracelsi* ib.

Vesitatio apud ægrotos quomodo instituenda 48. seqq.

Unguentum digestivum 95. ad renes & vesicam 192. antifebrile 271. ad vermes 275. carminativum 280. nephriticum 286. pectorale 318. antipleuriticum ib. cordiale 324. deoppiativum 336. hepaticum frigidum

dum ibid. spleneticum 341. antiparalyticum 354.
 nervinum ibid. in diarrhoea & dysenteria 364. contra
 abortum 365. somniferum 369. pro dolore capi-
 tis ibid. dorsi & renum 376. digestivum chirurgorum
 380. ad ambusta *Fabricii* ibid. ad scabiem ib.

Vomitus : ejus indicatio 169. seqq. contraindicatio
 171.

Urina : quid de ea sentiendum 25. seq. ejus mutabilitas
 ibid. evacuatio 187.


Uterina : vid. Hysterica.


Vulneraria quotuplicia & quomodo agant 372. seqq.
 notanda in eorum usu 374. seqq. formulæ 377.

Z


Zodiaci signa in V. S. quæ attendenda 69.


F I N I S.





Lyt - 3 - 12





6.531